




بالقزمية والاسطوخودوس والقرنفل والنباتات  
والبرسيم والذرة والبنجر والبنج

# إِدْوَارُ غَالِبِ الْمَوْسُوعَةِ

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مادة  
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملونة

## فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَيُولُوجِيَا



دارالمشرق بيروت



مخطوطات ،  
دار المشهورات ش م م  
ص.ب: ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

الطبعة :  
المكتبة الشرقية - ساحة البعثة  
ص.ب: ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان











الموسى وعنه في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان قرطباوي

جهاد جبر

سلم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثاني : ISBN 2-7214-2550-6

يحتوي هذا المجلد من

الموسيقى في سوريا والبلدات

١٠٢٠٨ مواد

٢٢٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة



الأورغانيك

مهندس زراعي

# الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور  
والبحر والشجر والأرض والحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها  
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقائق  
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :  
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، اليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثاني

من الرء إلى الفء



السرعويات . مستطيلة الجثة ، قصيرة القوائم ، غبراء الصفحة العليا من قفن الرأس الى الذنب ، سوداء الصفحة السفلى من الرأس الى الذنب . اذانها صغيرة . مستديرة . حلبيها كثيف وغلظ . اطرافها طويلة حادة || مسرحها من الغروب الى الفجر . قوتها الحسل والفسار والجردان والحيات والمصافير والدويبات والثآير ويجنور بعض الانحجار . له نوعان ، يليان .

#### ١١١٦١ - راتل أبو كعب \*

Mellivora leuconota, Ratelus capensis (S). Ratel du Cap (F). Ratel of Cap (E).  
نوع من الراتل موطنه افريقية الشرقية والجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ذنبه ٢٨ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم . يألف الجبال والاحراج والبراري على السواء ويتسلق الاشجار بخفصة .

#### ١١١٦٢ - راتل أبو كيم \* ، شُصْرُ ، لَصْلُوص

Mellivora Indica, Ratelus Indicus (S). Ratel de l'Inde (F). Indian ratel (E).  
نوع من الراتل موطنه الهند وبلاد فارس وجوارها . طوله نحو ٨٠ سم . ذنبه ١٢ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٤ سم . يألف الجبال والاحراج ، يرطب في المناطق الكثيرة الغصاب والوصاد .

١١١٦٣ - راتل ٥ . Pléiotrope (F). Pleiotropic (E).  
صفة الجين الوراثي الذي يحقق جمع السبات المتباينة .

#### ١١١٦٤ - راتنج

Résine (F). Resin (E).  
وبهم من قال راتنج . مواد ثلاثية صلبة لزجة تنفصها بعض النباتات لا سيما الصنوبريات والبطليات .

١١١٥٣ - راءة  
قال ابو حنيفة : « شجرة ترتفع على ساق ثم تنفرع لها ورق مدور احمر » . وقال غيره : « شجرة جبلية كانها غظلة ولها زهرة بيضاء لينة كانها تفل » . ج راء .

١١١٥٤ - رايض  
الرايض نيم نير من كوكبة التنين مركزة على اللسان .

#### ١١١٥٥ - رابيط حرارة

Thermostat (F). Thermostat (E).  
جهاز آلي يستخدم في تكييف الحرارة المطلوبة وتثبيت استمرارها على درجة معينة .

١١١٥٦ - رابطة  
Lieuse (F). Binder (E).  
اداة آلية تجمع غيوط الزرع وتربطها .

١١١٥٧ - رابطة ٥ ، خاضعة  
Phytophage (F).  
هي كل حشرة قوتها النبات .

١١١٥٨ - رابية  
Colline (F). Hill (E).  
ما ارتفع من الارض وكان دون الجبل .

١١١٥٩ - راتيب زراعي  
Rente convenancière (F).  
Fifty rent (E).

هو الذي ينشأ على ارض زراعية ولا يجوز لمستعته ان يسترده ولكنه يجوز للمدين بعد التحرر منه بالتخلي عن الارض .

#### ١١١٦٠ - راتيل ، اكيل العسل

Mellivora, Ratel (S). Ratel (F).  
جنس حيوانات راسه بطيئة الحركة ، كسولة من فصيلة



راتل ابو كعب



راتل ابو كيم

## ١١١٧٦ - رَاتِنَج الصَّنَوْبَر

Réactif (F).

Reactif, Reagent (E).

كل مادة كيميائية تساعد انفعالها على الكشف عن حقيقة الجسم للالوب معرفته .



راتون غاسل

## ١١١٧٧ - رَادَن

Safran (F). Saffron (E).

هو الزعفران ، اطليه .

## ١١١٧٨ - رَادِيُوم

Radium

عنصر معدني نادر الوجود اكتشف عام ١٨٩٩ بفرغور عام ١٩٠٤ على يد العلماء بيار وباري كوري وبيرون . لونه ابيض فضي يضيء في الظلام . اشتت فسفورية يرفيقها فسفي . يتفصح بسمرة اذا تعرض للهواء || يوزن (يو-٩٦٠) وزنه الانومي ٢٢٦,٠٥ رقه ٨٨ ينصهر في ٩٦٠ سغ . يتميز بنشائه الاشعاعي العظيم وبخاصته في اباداة الانسجة التي يستعملها الطب في معالجة الاجزاء المعطوبة من الجسم || يوجد في بعض انواع القار المستخرجة من مناجم بوهيمية وفي الكونوق والولايات المتحدة وكندا .



راتون منفي

## ١١١٧٩ - رَاوَر الجِلْدُوع \*، سَمِيَّة زَبَاء \*

Xanthochrous hispidus, Polyporus hispidus (S). Polypore hispide (F). Hardwood (E).

فطر من السيات يركب بعض الاشجار الحرسية والزراعية اغصانها الدلب والصرة والملث والتوت والجوز والتفاح . اروسه مستنيرة قطرها نحو ١٠ سم . وهي مقطعة الجانبي القائم على الجذع . لونها اصفر يرققالي ثم حنطي وينتهي بالسمرة . لبانها اسفنجي التركيب ، غزير العصارة ، اصفر اللون في اول عهده ثم حنطي عند ادراكه وذهاب من العصارة || يوفياته صفراء ، يضيء الشكل ، قياسها ٥x٧ ميكرون || مشيجه يدخل من الاجزاء اليابسة فيتمركز بين القشرة والخشب اليابس ثم ينشب في الشكير والخشب ويمتد حتى القلب || يكاتف بتفتيح وتطهير الجروح اليابسة وبطلي جروح الجذوع والاضغاب بأحد المالحين الخاصة او الشيتك .



رَار المِذْج

## ١١١٨٠ - رَاوَر الصَّنَوْبَر \*، سَمِيَّة الصَّنَوْبَر \*

Xanthochrous pini, Polyporus pini (S). Pourriture rouge du pin, Polypore des pins (F).

فطر من السيات يركب الصنوبر العسر الذي صار حزه لاحتلاب الراتنج . مشيجه يدخل رأساً الى قلب الجذع حيث يتمركز ثم ينتشر من الداخل الى الخارج ومن مركز انطلاقه الى اعلى واسفل بذات المساحة التي تراوح من المتر الى المترين فيغلب الخشب كما يبدو في الرسم بعد ان يفتن عروقه || اما الفطر فاروسه قنوسية الشكل ، جانبيه الانكاز عديده الاغادي المستنيرة . قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الصفرة الشبه . لبانها فلفني ناشف التسج حنطي اللون الزاقي || يوفياته شفافة تبني للمواج يضيء الشكل قياسها ٥x٧ ميكرون || يكاتف بتطهير جروح الحز عند نهاية الاحتلاب وبتارتاع فطوره قبل ادراكها .



رَار الصَّنَوْبَر

## ١١١٨١ - رَاوَر الكَشْمِش \*، سَمِيَّة الكَشْمِش \*

Xanthochrous ribis (S). Polypore du groseillier (F).

فطر من السيات يركب سوق الكشمش عند سطح التربة فيغلب اللحاء والشكير دون ان يتعداهما الى الخشب . اروسه قيعية الشكل فائرة الحافة المنحدرة المنعدلة ، لونها اصعب حنطي ثم يميل الى المؤزوة . لبانها اصفر نحاسي



رَار الكَشْمِش

## ١١١٨٥ - رَاتِنَج الصَّنَوْبَر

Barras

عصارة صمغية راتنجية تسيل من حز سوق الصنوبر البحري .

## ١١١٨٦ - رَاتِنَجِي

Résineux (F). Résineux (E).

اسم شامل يطلق على كل شجرة راتنجية العصارة اغصانها

## ١١١٨٧ - رَاتُون ، رَاكُون

Procyon (S).

Raton (F). Racocon (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الراتونيات . موطنها البلاد الامريكية . تشبه الدب والغرير . اصوالها لبدة قصيرة . اناثها تقسم نحو اربعة جراء تربها نحو الحلول || له نوصان الراتون الفاسل والراتون المنفي .

## ١١١٨٨ - رَاكُون غَاسِل \*، رَاتُون لَاصِر \*

Procyon lotor (S).

Raton laveur (F). Mapach (E).

نوع من الراتون . عروقه اربعة منتشرة من المكسيك الى السكا . طوله من ٨٠ الى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٣٢ الى ٣٦ سم . ثوبه المتقلب الى الطحلة التفرار يعلو موج اصفر || يالفت خطوط البحيرات والانهار يعيش في البر والماء وعلى الاشجار . لا ياكل شيئاً الا بعد غسلة بالماء . قوته الثمار والحبوب والجنود والطيور والاسماك .

## ١١١٨٩ - رَاكُون مَنَفِي \*

Procyon cancrivorus (S).

Raton crabier (F). Agouara, Crab-eater (E).

نوع من الراتون . موطنه امريكة الجنوبية . طوله نحو ٧٥ سم . ارتفاعه ٣٢ . ثوبه الى السمرة يعلو جسمه خطوط بيض حازية . لا يفسل اكله . قوته الثمار والجنود لكنه يرغب في بعض انواع السرطان اغصانها المنع .

## ١١١٩٠ - رَاتُونِيَات

Procyonidae (S).

Procyonidés, Rats (F). Procyons, Racoons (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات اللوامس القوازم . تأتي بين السنوريات والدييات . اجناسها خمسة : البساري والبندا والراتون والكواكي والكتيكاجو ، جميعا امر يكية المولن .

## ١١١٩١ - رَاكِجِيَّة

Probabilisme (F).

Probabilism (E).

الراكية مذهب فلسفي اجتاعي يقول بأباحة السلوك وفقاً لرأي الراكي .

## ١١١٩٢ - رَاَح ، رَاَف ، رَاهِيَق

Vin (F). Wine (E).

هي الخمر ، شراب كحول يحمّل من اغتار عصير العنب .

## ١١١٩٣ - رَاَحَة الْأَسَد

هو صليج الاسد ، اطليه .

## ١١١٩٤ - رَاَحِيَق

Melliphage (F).

Melliphagous (E).

نعت تعريفي يطلق على الطيور والغشرات التي ترتشف رحيق الازهار . ج رواحق .

## ١١١٩٥ - رَاَحِيَم

Couveuse (femelle) (F).

Brooding-hen (E).

انثى الطير في زين حفسها البيض . ويقال ارض المائر وراشمت اللداجية على يفضها فهي رمخ .

١١١٩١ - رَاسُ الثُّعْبَانِ Rastaban (F).  
Dragon's Head (E).  
رأس الثعبان ويسمى أيضاً رأس الثنين نجم ثير من الموائد وهي اربعة انجم مركزها على رأس الثنين .

١١١٩٢ - رَاسُ الْجَانِي Ras Algehi  
رأس الجاني ويدي أيضاً كلب الراعي ، نجم ثير من كوكبة الجاني مركزه على الرأس .

١١١٩٣ - رَاسُ الْحَشَشِ رأس الحشش هو الكرشون ، اطلبه .

١١١٩٤ - رَاسُ الدُّوَرِي رأس الدووري هو القطريون الاسمر ، اطلبه .

١١١٩٥ - رَاسُ الشَّيْخ رأس الشيخ هو الاقسن ، اطلبه .

١١١٩٦ - رَاسُ الْعُصْفُور \*  
Clinopodium vulgare, Melissa clinopodium (S).  
Clinopode, Grand basilic sauvage (F). Wild basil,  
Horse-thyme (E). Gemeiner wirebeldost (D).  
Basillico salvatico, Clinopodio (I).

نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الشفويات ينبت في هضاب وواد مناطق حوض البحر المتوسط . ساقه فراء منسوجة كثيفة الزغب . اوراقه لاطئة متقابلة صغيرة القعد . تصلها كثير المروق والشرابين ، مزغب الصفحة ، خشن الملس . ازهاره ابطية الاركاناز ، غمية التجميع ، مهدبة الكأس والقصص وهي بيضاء اللون ليلكية المواج . يقال ان اوراقه وازهاره طيبة تفيد المعدة .

١١١٩٧ - رَاسُ الْفُول Algol  
رأس الفول نجم ثير من كوكبة سيوس .

١١١٩٨ - رَاسُ النَّشْلِ Chaintre, Fourrière,  
Tournière (F). Balk, Headland (E).  
المكان في اول الحقل وآخره حيث تنشل سكة المخرات وتور الدواب .

١١١٩٩ - رَاسُ الْهَرَّ رأس الهر هو الجملج ، اطلبه .

١١٢٠٠ - رَاسُ مَالٍ ، وَرَسْمَال Capital  
هو مجموع الثروة المخصصة .

١١٢٠١ - رَاسُ مَالِ الشَّرَكَةِ ، وَرَسْمَالِ الشَّرَكَةِ Capital social (F). Registered capital (E).  
هو مجموع المبالغ المدفوعة او الاموال المقدمة الى الشركة .

١١٢٠٢ - رَاسِيبَ Précipité (F). Precipitate (E).  
عكر او دودي يحصل في بعض السوائل ويذهب سفلاً من جراه استعمال بعض المواد الكيماوية .

١١٢٠٣ - رَاسِيبَةِ Diluvium  
جرين جيولوجي قديم تجمع في الحقبة الرابعة او قبلها بتأثير مياه الانهر والبيحار والمناخ .

١١٢٠٤ - رَاسْمَائِيَّة Capitalat, Capitalisme (F).  
Capitalism (E).  
هي سيادة الرساميل والرأسمالين وهي من النظم الاقتصادية السائرة الى الاستغلال وذلك لان معظم العالم يدين بالتوسية ويستسلم الى سلطان الدولة .

مكون من طبقتين تفصلها اقباً غشاة ليفية صلبة سوداء اللون . الطبقة العليا اسنجية التركيب هشة والسفل فليزية جامدة || بوفاته سطحية مستديرة قطرها ٢ الى ٥ ميكرون || يكافح بانتازع الفطور قبل ادراكها ويظهر اللعاب والشكر بعد تظفله . ومن الضروري اجتناب زراعة الكشش في الارترية القوية الاندماج .

١١١٨٢ - رَازِيَانِيَج هو الشيار ، اطلبه .

١١١٨٣ - رَازِيَانِيَج كَبِير \* ، بَرَهِيلِيَّة Hippomarartrum (S). Hippomaratre (F). Rosemary frankincense (E). Languedockische nussdole (D). Ipomaratro (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحميات . انواعه عديدة منبتها الاراضي اللساح . اوراقها خرقية غمرزية . ازهارها صفر . عرفها مستحب الرائحة تفوح من اللس .

١١١٨٤ - رَازِيَانِيَّة \* ، مَشْغِيل ، إِيْنَانَةِ Ceanthe (S). Ceanthe (F). Water drapwort (E). Pferdesaat (D). Enanto (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحميات . انواعه نحو ٣٠ جميعها متفعية او مائية . اوراقها مشرحة النصل . ازهارها مزواجية بيضاء اللون || يستخرج من جذور بعض انواعها عصارة صفراء اللون سامة بيمت . اشهر انواعه الرازيانة المائية .

١١١٨٥ - رَازِيَانِيَّة مَائِيَّة \* ، مَشْغِيل مَائِي ، إِيْنَانَةِ مَشْغِيلِيَّة Ceanthe phellandrium (S). Phellandre, Fenouil d'eau, Cigué aquatique (F). Water hemlock, Horsebane (E). Echte pferdesaat (D). Fellandrio, Filpendula, Cicut aquatica (I).

نوع من الرازيانة يعيش في المناطق وعلى ضفاف الانهار . يملو نحو المتر . سمه نافع بيمت . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١١١٨٦ - رَاسُ Tête (F). Head (E).

عصر من اعضاء الجسم الحيواني يتكون من علية عظمية لا قياسية الشكل تدعى الجمجمة تحوى المخ والخيخ والنخاع المستطيل . غلافها اسنجية عضلية يلسفها الجلد الذي يكمو الشعر . ويمحو الرأس على فتحتين القم والالنت وهما طريقا التنفس والاكل وعلى اعضاء الحس وهي العينان والاذنان والالنت واللسان .

١١١٨٧ - رَاسُ الْأَسَدِ Razalas  
رأس الاسد نجم ثير من كوكبة الاسد الاصفر .

١١١٨٨ - رَاسُ الْأَفْعَى هو الاحيون ، اطلبه .

١١١٨٩ - رَاسُ الثَّيْنِ هو البيقران ، اطلبه .

١١١٩٠ - رَاسُ التَّوَلَمِ الْمُوَنْصَر Pollux  
نجم ثير من برج التوأمين ، يبعد عن الارض نحو ٣٢ سنة ضوئية .



رازيانج كبير



رازيانة



رازيانة مائية



رأس العصفور



راسن حسامي



راسن هيمي



راسن عين السج



راسن كبير الزهر



راسون



راسية الحدائق

جميعها صغيرة اللد اطولها تراوح من ١٢ الى ٢٠ سم. اجسامها اهليجية الشكل. رؤوسها غليظة ، قصيرة المخاط. زعانفها الظهرية مستطيلة ، تساعية المناسخ . اثوابها تراوح بين الطحلة والحمرة . سفنها ازرق الخثار || لحومها مستطيلة الصفت مأكولة .

١١٢١٤ - **راسية** \* Capitule (F). Capitata (E).

شكل من الزباني قوائم فواصل اسطوانية متتابة تملظ تدريجيا عند الفواصل الثلاث الاخيرة .

١١٢١٥ - **رأسيات** \* Céphalés (F). Cephalate (E).

قسم من الرخويات يشمل رأسيات الارجل ومعديات الارجل ومجنحات الارجل .

١١٢١٦ - **رأسيات الأرجل** \* Céphalopodes (F).

صف حيوانات من الرخويات . Cephalopods (E).

١١٢١٧ - **رأسية ، قيفالانثس** \* Cephalanthus (S).

Céphanthe (F).

جنس نباتات برية وريسية من فصيلة القويات . دحيت رأسية لان تنويرها انبثائي ويستدير كالرأس . انواعها عديدة جميعها شجيرات تملو من مترين الى ثلاثة امتار . تكثر في المواقع الرطبة وعلى ضفاف البحيرات والمنتقع . ازهارها فريدة طويلة متقابلة . اوراقها مستطيلة معتقة . ثمرها ثورية التجميع ، كبيرة الحجم ، بيضاء اللون || اشهر انوعها رأسية الحدائق .

١١٢١٨ - **رأسية الحدائق ، قيفالانثس غربي** \* Cephalanthus occidentalis (S).

Céphanthe occidentale, Bois à boutons (F). Button-bush, Globe flower bush (E). Amerikanische kopfblume (D). Cefalanto, Legno da bottone (I).

هو النوع الزراعي الرئيسي ، يملو نحو ٣ امتار . اوراقه بيضية ، مستطيلة ، ذلقة الزام الاخير . ازهاره عطرة لونها الى الابيض يملو موج اصفر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٩ - **رأسية** \* Rachis

الرائحة هي محور السنبلة والمهرقة والمنقود والاوراق المركبة وغيرها . ومن اسمائها الزند والنتق .

١١٢٢٠ - **رأسح** \* Filire (F). Filter (E).

اداة تصفى بها السوائل من ماء وغيره .

١١٢٢١ - **رأسية السدي** \* في لغة التجليل ، اطلمها .

١١٢٢٢ - **رأسين** \* Commensal

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تلازم غيرها وتعيش على حسابها .

١١٢٢٣ - **رأسيدة ، مجللة ، مقراب** \* Télescope (F). Telescope (E).

جهاز خاص برصد الاجرام السماوية .

١١٢٢٤ - **راع** \* Berger (F). Shepherd (E).

هو من ولي امر القطيع .

١١٢٢٥ - **راجي** \* Errai

الراجي نجم من كوكبة قيفاوس مركزة على الرجل اليسرى .

١١٢٠٥ - **رأسن** \* Inula (S). Aunée, Inule (F).

Inula (E). Alant (D). Enula (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الابنوبية الزهر . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها ربيسي . اوراقها متعاقبة لا قياسية الانتشاب . الزايرها علفية رؤوسية صفراء القرمس || اعرف انواعها واشهرها يتبع .

١١٢٠٦ - **رأسن البركاشيت** \* هو البرنوبس ، اطلمها .

١١٢٠٧ - **رأسن حسامي** \* Inula ensifolia (S).

Aunée ensiforme (F).

عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقها غليظة زباء اللحاء ، متتابعة الاوراق السنانية الضيقة ، فصلها خلي البشرة خاني المروق المتوازية . رؤوسها الزهرية متوسطة اللد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . قناباتها الخارجية مستطيلة حسامية الشكل || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢٠٨ - **رأسن دقيق** \* هو الطيون ، اطلمها .

١١٢٠٩ - **رأسن طيبي ، جناح رومي ، زنجبيل شامي ، قنسط شامي** \* Inula helenium, l. campana, Corvartia helenium

(S). Aunée grande, Elecampane, Cell de cheval (F). Common inula, Elcampane, Horse-elder (E). Echter alant, Alantaster (D). Enula elenio, Enula campana, Occhio di cavallo (I).

عشبة طيبة برية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها حافضة كبيرة اللد ، السفلية منها تطلو نحو ٨٠ سم . والمعلوية تطلو من ١٥ الى ٢٥ . فصلها ازرق المسفحة السفلى المجلدات اللون . علقها حديد التفرع ، رؤوسها الزهرية كبيرة اللد ، قطرها نحو ٧ سم . ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

١١٢١٠ - **رأسن عتير المسبح** \* Inula oculus-christi (S). Aunée cell du Christ (F).

عشبة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معتقة ، سنانية . فصلها خلي البشرة باهت الخضار الاطلحل . علق ازهارها كبير اللد ، رؤوسها معتقة قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١١٢١١ - **رأسن عديدي** \* Inula glandulosa (S).

Aunée glanduleuse (F).

عشبة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها زغبية اللحاء تنتهي بزهرة رؤوسية واحدة ، قناباتها غززية الشكل . اوراقها صغيرة اللد ، لسنة ، ضيقة . فصلها خلي البشرة على صفحتي . حثاره ميمر الغدد الدهنية الطاهرة . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٢ - **رأسن كبير الزهر** \* Inula grandiflora (S). Aunée à grande fleur (F).

عشبة سبروتية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لاطنة تطلو نحو ١٠ سم . رؤوسها الزهرية كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ سم . لسنتها برتقالية اللون . ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

١١٢١٣ - **راسون ، قارة البحر** \* Novacula (S).

Rason, Rasoir, Rat de mer (F). Razor-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكوسيات . انواعها المعروفة قليلة البد . اعطانها بحار البلاد الحارة .

11226 - راعي، إريوس، عمرو  
Eros, Amor (F). Eros (E).  
الراعي كوكب سيار يتبع النظام الشمسي. مركزه بين الأرض والمريخ. دورته حول الشمس تستمر نحو ٦٤٢ يوماً.



رايا الحمر

11227 - راعي الجوزاء  
راعي الجوزاء كوكب.

11228 - راعي الحور  
راعي الحور نجم ثير من كوكبة حور وسية مركزه على رأس الحور.



راقود

11229 - راعي الشتاء  
راعي الشتاء كوكبة نجوم شالية المقع تدعى عواء، اطلها.



11230 - راعي النعام  
راعي النعام كوكب.

11231 - راعيعة  
هي القامة، اطلها. والراعية ج. رواع من وضع اليازي.

11232 - راقين  
Prémonitoire (F).  
Premonitory (E).

نعت تعريفي يطلق على الأمراض أو الاعراض التي تستبق نشوب المرض. أو على العلامات التي تنذر بقرير وقوع الحوادث.



راقوش البنفسج

11233 - رالفيد  
هو الجدول، ج روافد.

11234 - رافعة، عتكة، ميخل  
Levier (F).  
Lever (E).

قصب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز يستعمل لرفع الاثقال والصخور وما اشبه || والرافعة انواع منها التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمقاومة. ومنها التي تقع فيها المقاومة بين القوة ونحو الارتكاز. ومنها التي تقع فيها القوة بين المقاومة ونحو الارتكاز.



راقوش اللويكيات

11235 - رافيا  
Raphia (F). Raffia (E).

جنس نخيل غليظ الجذع، مستطيل السنف، كبير الضبة المتدلية، حشوي الثآليل. انواعه صلبة، موطنها افريقية وامريكا الجنوبية وبغشكر || اعرف انواعه واشهرها يتبع.



راقوش الشوندرد

11236 - رافيا الحنجر  
Raphia vinifera (S).

نوع من الرايا الصناعية. ثمارها سكرية المادة سريعة الاختيار يصنع منها شراب كحولي يدعى نبيذ النخل.

11237 - راليا الرباط  
Raphia ruffa (S).

نوع من الرايا الزراعية الصناعية. سمها يطول نحو ٢٠ م. الايات سمها خفيفة متينة ناعمة عجيا تستعمل في عدة صناعات. وهي ايضا شائعة الاستعمال كرباط زراعي تشد به المطاعم وغيرها.



راقوش الهيشر

11238 - راقص  
Hercule (F). Herculus (E).

هو الجاني، كوكبة نجوم شالية المقع.

11239 - راقوش الدويكيات  
Ramularia primulae (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الدويكيات واخصها زهرة الربيع. مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٥ م. تملو نصل الاوراق وقد تصيب المالحق والازهار. تبدو صفراء اللون ثم تتحور الى الابيض تحورها حالات نيتية || يسبب يباس النسيج وتجعجج الاوراق وذبول الازهار || يكافح عنه ظهوره بالقطع الاوراق المبرودة وينضج النبات باسند الفوطير المرتكزة على النحاس.

11240 - راقوش الشوندرد  
Ramularia beticola (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الشوندرد في اواخر الصيف. مظهره الخارجي يقع صغيرة مقربة الزوايا قطرها من ٢ الى ٣ م. توهم النصل على صفحته. تبدو مستطيلة اللون حراء الاطراف ثم خلية بيضاء || اضراره زهيدة لا تستوجب المكاشفة.

11241 - راقوش الهيشر  
Ramularia cynarae (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الهيشر والاراضي شوكي القرم والكركزنت || مظهره الخارجي يقع فسيحة مقربة الزوايا تملو النصل على صفحته فتبدو على العليا صفراء اللون وعلى السفلى بيادية خلية كثيفة الزغب || اضراره زهيدة لا تستوجب المكاشفة.



٨ الى ١٥ سم. ازهارها قليلة العدد ، كبيرة الحجم ،  
بنفسجية اللون ، صفر المآبر || تنويرها صيفي .



رام

Podontus ater (S). \* راموس اسود \*  
Podonte noir (F), Podontus ater (E).

نوع من الراوس . حشرة من مفدمات الاجنحة تختلفات  
الاجزاء وفضيلة الحسبوليات . موطنها يمتد من الشرق الاقصى  
الى اوروبا . الحشرة الجملانة تعيش على الازهار . البرقة  
دائمة قوتها المواد الخشبية المنحلة ، ويكثر سوسها في جذوع  
واضغان الاججار النخرة || جسمه اعليجي الشكل ،  
محدب الصفة العليا ، يطول من ١١ الى ١٢ سم. عتاه  
بارتزان . زبانه غيظيان . غذاء لاحتفان . ثوبه الى  
السواد الاسفع الملاج .



رامندي

١١٢٥٨ - رامسي \* ، قنّب سيام

Boehmeria nivea, Urtica nivea, U. utilis, U. tenacissima (S). Ramlie argentée, Ortie argentée, O. de Chine, Chanvre de Saïgon (F). Ramee grass, China grass (E). Rame, Chlinalnessel (D). Ortica da lino, Canapa di Slam (I).

نبات عشبي ليني صناعي معمر من فصيلة القراصات .  
يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ابروته ضخمة ، كثيرة  
الفروع الكثيفة الانتشاب . اوراقه معتقة فضيصة  
اعليجية ، نصلها نفي الصفة السفلى ، يطول نحو  
١٥ سم . عتقه احمر اللون خالي البشرة || ازهاره عتقودي  
اسطواني . الياف مينة شائعة الاستعمال في صناعة الاوراق  
التقدي .



راموس اسود

١١٢٥٩ - رامسيات \*  
Myoporaceae (S). Myoporaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها نحو  
٥٠ اعطانها تحت من الشرق الاوسط الى اليابان || جمع  
نباتاتها لحيات وجنات . اوراقها معتقة في معظم الانواع  
ومتقابلة في بعضها . نصلها ضيقة ، مستطيلة ، لزجة .  
ازهارها ابطة الانتشاب وطرفية ، غمية التجميع او فردية .  
ثمارها عتية رباعية البزور || نصل اوراقها ولحاء سقها  
وافنادها ملينة بالجويوب الراتنجية الغنية بالادعانه والعلطرة  
المستحبة العرف || اشهر اجناسها الرام .



رامي

١١٢٦٠ - رانجس هو التاربييل المعروف ، اطله .

١١٢٦١ - رانين \*  
Ranina (S). Ranina (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات وفضيلة القراصات .  
انواعها المروقة قليلة العدد اعطانها البحر الاحمر والمحيط  
الهندي || اجناسها مبطلعة مستندة الحجم ، تقطن من ه  
الى ٧ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . دروسها قليلة  
الاحدياد . قوائمها قصيرة ، غليظة ، محرمة الاطراف .  
ملاقطها معبنة ، كلابية الشكل || اشهر انواعه الرانين  
المسن .



رانين

١١٢٦٢ - رانين مسن \*  
Ranina dentata (S). Ranine dentée (F).

نوع من الرانين يكثر وجوده في المحيط الهندي . يعيش  
قرب الشط . درعه جويوي اللون ، اسفع الملاج ، مسن  
الحافة الامامية .

١١٢٦٦ - راكون هو الراتين ، اطله .

١١٢٦٧ - راكل Autruchon (F). Young ostrich (E).  
هو المحقل اي ولد النعام المحولي يعني رات ، ج راكل  
ورثالة .

١١٢٦٨ - رام \*  
Myoporum (S). Myopore (F).  
جنس نباتات عتية معمرة من فصيلة الرايات انواعه  
نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقه متعاقبة  
مستطيلة التصل السيق . ازهاره نوردي التجميع ابطي  
الارتكاز . ازهاره بيض او حر . ثماره عتية رباعية  
البزور .

١١٢٦٩ - رامكة الرامة : مستنقع يجمع فيه الماء .

١١٢٧٠ - رامجس  
Leurre (F), Trap (E).  
الراجس : ملوج تصاد به الجوارح كالفقور ونحوها .

١١٢٧١ - راميس ، دجوي  
Nocturne (F). Nocturnal (E).

كل دابة مسرحها الليل هي رامس . وقد كثر اسناد  
الرواسل الى طير الليل .

١١٢٧٢ - رامقي Appelant (F). Decoy-bird (E).  
الرامق : الطائر الذي ينصبه الصياد ليقع عليه البازي  
فصيده .

١١٢٧٣ - راميل Sillicole (F). Sillicic (E).  
نمت تمريني يطلق على النباتات التي تعيش وتجد في الرمل .

١١٢٧٤ - رامندي \*  
Ramondia (S). Ramondie (F). Ramondia (E).

جنس نباتات عشبية برية وتزيينية معمرة من فصيلة  
الجسبريات . معقودة التعريف على اسم العلامة رامندي  
(١٨٢٣-١٧٥٣) || انواعه المروقة اربعة ، اعطانها  
الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية .  
جميعها سبروتية ، فريضة ، عادمة الساق ، قرصية الاوراق  
الخشنة المزجبة النصال . ازهارها قليلة العدد تركز على  
شراخ دقيق يطول من ه الى ١٥ سم .

١١٢٧٥ - رامندي اسفع ، رامندي صوفي

Ramondia serbica, Jankaea ferruginea (S).  
Ramondie de Serbie, Jankaea ferrugineuse (F).

نوع من الرامندي ، عشبة سبروتية ، فريضة ، معمرة .  
منبتها الطوسي بعض مناطق البلاد المحتلة الحرارة اعخصا  
سبريا || اوراقها مسنرة تقطن نحو ٣ سم . نصلها خلية  
الصفحة العليا البحرية اللون ، صفاء الصفة السفلى .  
شراخها الزهري يطول من ٧ الى ١٢ سم . ازهارها قليلة  
العدد متوسطة الحجم ، صفراء اللون ، زرق المآبر ||  
تنويرها صيفي .

١١٢٧٦ - رامندي ميكوني

Ramondia Myconi (S). Ramondie de Myconi (F).  
نوع من الرامندي . عشبة فريضة معمرة . منبتها المناطق  
المحتلة الحرارة من ارتفاع ٦٠٠ الى ١٦٠٠ م . من سطح  
البحر || اوراقها تقطن نحو ٧ سم . نصلها عشن للمسح  
مسنن الحافة ، زغبه غير اللون على الصفة العليا ،  
اصهبه على الصفة السفلى . شراخها الزهري يطول من

٢ - في الاساليب الكبائية المركزة على تطهير البذار قبل البذر. وهنا يجدر القول بأن استعمال الاسمدة الكبائية وأخصها السوبرفوسفات يخفف كثيراً من وفاة الراهور. ٣ - في استعمال بعض الاشعاعات. لقد دلت التجارب على ان استعمال اشعة ا ورا، البنفسجي تعطي نتائج ايجابية باهرة. واستعمال اشعة اكس اعطت ذات النتائج. وبهم من استحصل على نتائج جيدة بتعريض حب البذار نحو خمس ساعات الى اشعة الشمس اللافحة خلال شهر تموز.

#### ١١٢٧٢ - رَاهُوبُ الدَّبَّحِ \*

Ustilago scorzoneræ (S). Charbon du scors-onère (F). فطر مجهرى طويل العمر يعيش في الازعاج والخلايا، يصيب الدبغ في المواقع الرطبة حيث يعطب رويسات الازعاج || مظهره الخارجي بثور بوقية لونها الى السمره تملو الرويسات ثم تنطلق عن غيرات هبابية شديدة السواد. يكافح باجتنب زرع الدبغ في الاماكن الرطبة.

Ustilago crameri (S). \* رَاهُوبُ الدَّخْنِ \*  
Charbon du millet (F).

فطر مجهرى يصيب الدخن على اختلاف انواعه. مركب مبيض الزهرة فينبغ انتفاخه واحول مادته ثم تحوّلها الى كتلة بوقية قهظها نحو ٤ م. لونها الى السمره || اضراره تختلف باختلاف العوامل الجوية لذلك تراوح من ١٠ الى ٧٥ ٪. يكافح اما بتطهير البذار مدة خمس دقائق في ملوب الفرمول المحلول ٠.٢ ٪ حيث يمكن رفع الجيوب المملوطة لانها لا تنوص في الماء او باستعمال املاح النشيق او املاح النحاس وأخصها كربون النحاس.

#### ١١٢٧٤ - رَاهُوبُ الذَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ \*

Ustilago maydis, U. mayis-zeae, U. zeae (S). Charbon du maïs (F). Common smut of corn (E). Mais-brand (D).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب الذرة الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اعشائها التربة والهوائيه من الجذور الى الازهار فينبغها ويشورها او يعبها ويقتعجها. مظهره الخارجي كتل سود مختلفة الاشكال والاجسام، تركب الاضغاف بعد ان تحوّل نواحيها الى غيريات بوقية مشربة السواد يراوح قهظها من ٧ الى ١٥ ميكرون. يكافح باستعمال البورة الزراعية الثلاثية وذلك لان استعمال الفولفولير يظهر البذار ولكنه لا يظهر التربة التي يارى اليها والتي تحفنه من عام الى عامين.

١١٢٧٥ - رَاهُوبُ الزَّرْنَقِ \*  
Ustilago vaillantii (S). Charbon des lis (F).

فطر مجهرى يصيب بعض الزنيقيات انحصها الاشكيل والحمل. يعيش داخل نسج الاسطاط ويتكاثر في مآثر الازهار متطفلاً على جذرات اللوح ثم يحول اللوح الى حفار بوقية تنطلق عن غيرات هبابية لونها الى السمره الخفيفة. يكافح باقتلاع وتلف البصل المصاب.

#### ١١٢٧٦ - رَاهُوبُ الشَّعِيرِ \*

Ustilago nuda, U. segetum (S). Charbon nu de l'orge (F). Loose smut of barley (E). Gerstenflugbrand (D). فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب الشعير على اختلاف انواعه وضروبه. مركب السبال عند ازهارها فيعطب الزهر وقد يعبقى على كامل السبله تبسو بمجموعة متتامة منتصبة من الكتل السود. واذا تركب نصل الشتراف سبب اصفراره وذوبله بعد تحطيطه وتقرحه || يكافح بجمعه

١١٢٦٣ - رَالِيَّيَّاتَات \*  
Raninidæ (F). Raninidæ (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشرييات عشاريات الاجرل المتطلّثات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بجمار البلاد الحارة والاستوائية || اعرف اجناسها واشهرها الرانين الذي يعتبر قيس الفصيلة.

#### ١١٢٦٤ - رَاهِيَّيَّةٌ هِي الْبَيْخِيَّةُ ، اطلبها .

١١٢٦٥ - رَاهِيَّشُ Veine de l'intérieur du fémur (F).  
Vein of the inner femur (E).

الراشش والراششة : عرق باطن ذراع الدابة . وهما راهاشان . ج رواهش .

#### ١١٢٦٦ - رَاهَصَّةٌ

الصمغرة الثابتة . وألرواهص هي الصخور المترافسة الثابتة.

١١٢٦٧ - رَاهِمٌ Durable  
نمت وصنى للاختساب التي لا تبلى .

#### ١١٢٦٨ - رَاهُوبٌ \*

Ustilago (S).  
Charbon (F). Smut (E).

جنس فطور مجهرية طفيلية من الراهوريات . تتميز بطيالتها الفردية وبركاتها السريعة الانفلاق التي تنشأ وتتكاثر على الاضغاف النامية في النبات المنحار || انواعه عديدة . اشهرها ما يلي .

١١٢٦٩ - رَاهُوبٌ اسْوَدٌ \*  
Ustilago nigra (S). Charbon nu noir de l'orge (F).

فطر مجهرى يصيب سنابل الشعير فيعطبها . مظهره الخارجي كتل سود ميمّرة تركب جميع اغصية الزهر حتى الراشاش التي لا تقربها . بويقاتها طياله شفعية التكاثر الرباعي العرضي || اضراره زهيدة ، يكافح بتطهير البذار وباجتنب الزرع في المواقع الرطبة .

#### ١١٢٧٠ - رَاهُوبُ الثَّرْغُولِ \*

Ustilago bromivora (S). Charbon des bromes (F).

فطر مجهرى يصيب مختلف انواع الثرغول في ازهارها فيعطبها . مركب الزهرة يقضي على المبيض والاغصية بعد ان يحول الى بؤرة من الثبار والبورغ كلوية الشكل سراه اللون تبو جامدة لزجة ثم تنسل تدريجياً وتتطار من لسها كالفلاب || يكافح مكافحة رَاهُوبِ الدَّخْنِ اذا كانت زراعتة تدخل في نطاق النباتات الملغية .

١١٢٧١ - رَاهُوبُ الْحَفْطَةِ \*


Ustilago tritici (S).  
Charbon du blé (F). Loose smut of wheat (E). Welzenflugbrand (D).

فطر مجهرى طفيل واسع الانتشار يصيب الحفطة وقد شهود عليها في جميع اقطار العالم ما عدا امريكا الجنوبية التي لا تزال حطبها سليمة || مركب سنابل الحفطة فيعطب بعض حبها او شوبها برمتها . وقد تركب عقد السلايمات وانماذ العصف || مظهره الخارجي بثور بوقية كثيفة التجميع البشرة الناعمة السريعة العطب التي تنطلق عن غيرات كروية سود قهظها نحو ٥ ميكرون. يكافح باستعمال اللزائق المختلفة التالية :

١ - في الاساليب الزراعية القائمة على اجتناب المواقع الموبوءة او على تغيير البذار او على جمع وحرق جميع السنابل المصابة .



راهوب الثرغول راهوب اسود



راهوب الحفطة (٢)



راهوب الدخن



راهوب الدخن



راهوب الذرة الصفراء (١١)



راهوب الذرة الصفراء (٣)



راهوب الشعير

ريئاسي



راهوب الشعير المغلف (١)

المشج الشفاف. فيها يحوب اللافية والسج وقد يصيب الحلايا || تتميز بصفتها الدعاسي. دعماها جولية غير انقباضية. بويقاتها لا قياسية وكثيرة اللد || فطورها تسب عدة وصوم، أشهرها الوروم الفسقية والراهورية. أشهر اجناسها التكتفوره والراهورب والسجاد والشيزونه والطلول والفحمية والفريزة .

Abeille (F). Bee (E).

١١٢٨٤ - رَاهِيَة

هي التحلة سميت بالراهية لسكونها في طراها .

Rheum (S).

١١٢٨٥ - رَاوَنْد \*، رَوَنْد

Rhubarbe (F). Rhubarb (E).

جنس نباتات طبية عشبية جلندورية معمرة من فصيلة البليطليات. انواعها عديدة جميعها غنية الارواق الكبيرة القد، نصلها شارب الصفحة المشتمجة. ازهارها شوكلي يرتكز على شماريق قرصية الانتصاب. ازهارها متخوية. ثمارها غنية || امرف انواعها واعطرها ما يتبع .

Rheum australe (S).

١١٢٨٦ - رَاوَنْد الْجَنْتُوب

Rhubarbe australe (F).

نوع من الراوند الشرقي يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه صغرية القد قليلة الشكل تطول من ١٠ الى ١٤ سم. ازهاره حر || جذوره طيبة شائعة الاستعمال .

Rheum emodi (S).

١١٢٨٧ - رَاوَنْد حَمَلَايَا

Rhubarbe de l'Himalaya (F).

نوع من الراوند موطنه سفوح جبال حلايا. يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد تطول نحو ٦٠ سم. نصلها اخضر اللون ناعم البشرة. ازهاره وثماره حر .

١١٢٨٨ - رَاوَنْد ذَكَر ، أَطْرَاوَنْدِي

Rheum raphaniticum (S). Rhubarbe raphanitic, R. anglais, R. des moines (F). R. raphanitic, Garten rhubarb, Pie rhubarb (E). Pontischer rhubarber, Garten rhubarber (D). Barbaro raphanitic, Rapontico (I).

نوع من الراوند الزينبي يعلو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه قليلة الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. وعطرها كذلك. نصلها رغو التسج متنازع التصنيع عايق اخضر. ضلعها مأكولة || ازهاره كثيرة اللد لونها الى الياضر الاصفر.

١١٢٨٩ - رَاوَنْد رِيَّاسِي ، رِيَّاس ، رِيَّاص ،

يَمُصِيصَا

Rheum ribes (S).

Rhubarbe-groseille (F). Currant fruited rhubarb, Gooseberry currant (E). Persischer rhubarber (D). Rabarbaro acido, R. polposo (I).

نوع من الراوند ومونيات زراعي معمر موطنه الشرق الاوسط يعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة الشكل تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٤٠ نصلها جلدي التسج، لونه الى المحمرة الزرقاء، ضلعها مأكولة وترب. ثماره مأكولة لكنها حازمة الطعم وتتسلخ منها بين نصل الاوراق حامض اللبون. كما يصنع من عصير ثماره بعض المربيات الصحية المشهورة ويستخرج من ايضاً بعد التسخير نبيذ كحولي يعرف بجمر الرياس || ضروبه عديدة تختلف باختلاف لون البار بين الاسود والاحمر والابيض



راوند

ورقه فور ظهوره كما يحسن اجتناب الزرع في المواقع الرطبة .

١١٢٧٧ - رَاهُوبُ الشَّعِيرِ الْمُخْتَلَف \*

Ustilago hordei, U. jenseni (S). Charbon couvert de l'orge (F). Covered smut of barley (E). Gerstenhartbrand (D).

فطر مجهري مركب سنابل الشعير فيحول مواد الحب الى كل من الراهورب الاسود الفحسي وذلك بعد ان يعطب الراشة وجميع الانشية || يكاثف بكثرة من الراهورب.

١١٢٧٨ - رَاهُوبُ الشُّوْقَان \*

Ustilago avenae, Uredo segetum avenae, U. avenae foliicola (S). Charbon nu de l'avoine (F). Loose smut of oats (E). Haferflugbrand (D).

فطر مجهري مركب الشوكان فيعطل الحب وقد يقضي على كامل التحوكل || يبدو بثور كروية تكون داخل الزهرة على المبيض ثم تنم الزهرة مع اغشيتها وتظهر حبوب سود موهوبة بدلا من حبوب الشوكان || يكاثف بتطهير البذار اما تمغيراً بكميات النحاس او تمغماً بحمول القرمول او باستعمال غيرها من الفواظير الفعالة الحديثة .

١١٢٧٩ - رَاهُوبُ الشُّوْقَان الْمُخْتَلَف \*

Ustilago levis, U. avenae levis, U. kolleri (S). Charbon couvert de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوكان بعد تأخير زهره فيركب المبيض وينشأ عليه ثم يتم كامل اغشية الزهرة || منظره الخارجي ككل من الثور البويقة الزلزبة المسكة القليلة التفتح والاختلال || يكاثف باجتناب زراعت في المواقع الرطبة ويتطهير البذار .

١١٢٨٠ - رَاهُوبُ الْقَرَنْفَلِيَّاتِ \*، رَاهُوبُ بِنَفْسِيْهِ

Ustilago violacea (S). Charbon violacé (F).

فطر مجهري يصيب نحو ١٠٠ نوع من القرنفليات. مركب مآبر الزهر فيمنع تكون جذرات الوليع بعد ان يحول المآبر الى بثور بويقة لونها الى البنفسجي العايق. اضراره زهيدة لا تنوب المأكولة اما يحسن قطع وشرق الازهار المصابة اجتناباً لتفشي الورم .

١١٢٨١ - رَاهُوبُ الْمَصَّان \*

Ustilago sacchari, U. scitaminea (S). Charbon des cannes à sucre (F).

فطر مجهري مركب نولمي المصان على اختلاف انواعه من البري الى قصب السكر || منظره الخارجي تأثير الى النمو يعيقه شحوب عام فذليل القلب الناتج مع اوراقه الهامية ثم ظهور فتائل سود تملو الاظفار وتقتل منه وسمه || يكاثف بقتلح وشرق القصبان المصابة .

١١٢٨٢ - رَاهُوبُ التَّجِيرِ \*، رَاهُوبُ خَيْطِيْهِ

Ustilago striiformis, U. linearis, Tilletia striiformis (S). Charbon linéaire (F).

فطر مجهري طويل الحياة يعيش نحو خمس سنوات في التربة وعمل النبات المتحار. مركب التجير على اختلاف انواعه. منظره الخارجي خطوط خيطية فقية اللون تركب نصل الاوراق بمزائة اللورق تنفضي على التسج دون البثرة وتركب سيقان الماشكال الزهرية فتعطلها .

١١٢٨٣ - رَاهُوبِيَّات \*

Ustilaginaceae (S). Ustilaginaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية طفيلية من رتبة الدعمايات غزرة

**١١٣٠٠ - رُبَّاح**  
Genetta (S). Genette (F).  
Genet, Genett (E).  
جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزباديات . انواعه ستة  
موطنها افريقية واروية . والشرق الاوسط . اجسامها  
مستطيلة وذانها ايضا . قوائمها قصيرة خامية الاصابع .  
طويلة الاظافر المنقطة . اذنانها متوسطة القد . اذنيها منشرة ،  
تجيج ظهورها عايق للبرق وسيد الخط . تألف الجبال  
والبراري . تسرح في الليل . ترتاد اجوف الاشجار وصغارها .  
قوتها القوامش والحصابير والحشوات والحيوانات . الاثني  
تضع جرورا واحدا في الحول ترضعه نحو ثلاثة اشهر . اما  
انواعها الستة فهي ما يلي .

**١١٣٠١ - رُبَّاح اُرْقُط**  
Genetta pradina (S).  
Genette pradine (F).  
نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى الترسقال ،  
طوله نحو ٨٠ سم . صوفه قصير الحلب . ثوبه عايق للبرق  
كثيف التندير ، خطوط ذنبه ممتدرة .

**١١٣٠٢ - رُبَّاح اَصْدَا**  
Genetta rubiginosa (S).  
Genette rubigineuse (F).  
نوع من الرباح ، موطنه افريقية الجنوبية . طوله نحو  
٨٥ سم . ثوبه الى الصهوة الشهباء ، تنديره امفر . خطوط  
ذنبه متفرجة .

**١١٣٠٣ - رُبَّاح السنغال ، جَرَنْطِط**  
Genetta senegalensis (S). Genette du Sénégal (F).  
Pale genett (E).  
نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى القطب .  
طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصهوة الباهتة ، تنديره لا  
قياسي الشكل ، ريشته رصبة القد لا نطاسية .

**١١٣٠٤ - رُبَّاح الغابُون ، زُرَيْقَاء**  
Genetta felina (S). Genette féline (F).  
نوع من الرباح ، موطنه الغابون والكنغو وصفات النيل  
الازرق . وهو قريب الشبه من الزباد ، طوله نحو ٨٧ سم .  
ثوبه الى الصهوة الرملية . تنديره يبيضي الشكل .

**١١٣٠٥ - رُبَّاح دَنْقَلَة \* ، كَدَيْس الزَّيَاد**  
Genetta tigrina (S). Genette tigrine, Genette de  
Dongola (F).  
نوع من الرباح ، موطنه افريقية الشرقية اصعبها  
والذوبة . طوله نحو ٩٠ سم . ثوبه الى الصهوة الخطية .  
تنديره جزوي اللون . خطوط ذنبه مستعرة .

**١١٣٠٦ - رُبَّاح شَالِغ \***  
Genetta vulgaris (S).  
Genette commune (F). Common genett (E).  
نوع من الرباح ، موطنه الشرق الاوسط واروية . طوله  
نحو ٩٠ سم . جسمه ٥٠ وذنبه ٤٠ ا م ارتفاعه نحو  
١٥ سم . ثوبه الى الصهوة الغبراء ، تنديره الى الجفوة  
السراة . خطوط ذنبه متوسطة الغرض . يعيش في الجبال  
والوعدة وقرب الماء . يسرح في الليل يتسلق الاشجار ويمر  
في الماء ويسبح . يدين ويقتل العلم ، يصطاد الجراذين  
والفأر .

**١١٣٠٧ - رُبَّاح** هو القردوح البي ، اطلبه .

**١١٣٠٨ - رُبَّاح اَبُو اَهْوَل**  
هو القردوح الشبوت ، اطلبه .

**١١٣٠٩ - رُبَّاح زَيْتُونِي** هو قردوح الحشفة ، اطلبه .

والاصفر والمشيح . || والرياس يطلى\* الحيات ويقوي  
الاعضاء والهضم ويزيل ضمت الرغبة الجنسية والنفقات  
والبولابير .

**١١٢٩٠ - رَاوَنْد كَثِيف**  
Rheum compactum (S).  
Rhubarbe compacte (F).  
نوع من الراوند . هذه الصين . يملو نحو ١٠٠ سم .  
اوراقه كبيرة القد مفروسة . فصلها متجعج الصفحة ، جامد  
التسج السيك ، مسن الحافة ، جميل الخضار الزاهي .  
ازهاره بيض . || جلوده طيبة لكنها اقل جودة ونحوها  
من جلود الراوند الجنوبي .

**١١٢٩١ - رَاوَنْد كَفِي**  
Rheum palmatum (S).  
Rhubarbe palmée (F).  
نوع من الراوند الشرقي . يملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم .  
اوراقه كبيرة القد ، مستطيلة العنق ، كثيفة التنسل  
للمفصص الباقي الخضار . ثمراته الزهرية وضلوع اوراقه  
وعروقها الى الجفوة . || ازهاره الى البياض الاخضر .

**١١٢٩٢ - رَاوَنْد مَخْرُونِي ، رَاوَنْد صَبِي**  
Rheum officinale (S). Rhubarbe officinale (F).  
Rhubarb (E). Echter rhubarber (D). Rabarbaro, Rubar-  
baro (I).  
نوع من الراوند وهو نبات طبي وزراعي زَيْتُونِي . يملو  
من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد خماسية  
التفصيص فصلها جميل الخضار الباهت مسن الحافة .  
ازهاره كثيرة التسج خضراء اللون . || جلوده طيبة  
عديدة المنافع . تدخل في عدة مستحضرات وتساعد الهضم  
وتدر الصفراء . وهو مقو للمعدة ، منه الهضم ، يقضي  
عل البولابير والاسساك . ويستعمل في حوضه المسعدة  
واضطرابات الهضم لا سيما عند الاطفال .

**١١٢٩٣ - رَاوُونِي**  
Débourbeur (F). Cleanser (E).  
آلة تستعمل في ترويق الحمور البيضاء وفي تنظيف المساقل  
من البول والمعادن من التراب .

**١١٢٩٤ - رَاوَلِب ، حَاوَلِر ، مَحْشَر ، جَامِد**  
Caillé, Coagulé (F).  
لبن راب فشر ولا يزال ذلك اسمه حتى يتزع منه زبد .

**١١٢٩٥ - رَاوِيَة**  
Etendard (F). Flag (E).  
بنتل في الزهرة شدت عن رفيقها فقلت واصبحت كالراية .

**١١٢٩٦ - رُوبْ**  
Compote, Jus (F).  
عصارة الفاكهة المغلية المكثفة .

**١١٢٩٧ - رُوبَة الْعَمَل**  
Patron

**١١٢٩٨ - رُوبَا**  
Usure (F). Usury (E).  
الربا الاقراض بفائدة يتجاوز قيمتها عبق الفائدة القانونية  
او عبق الفائدة المتصالح به عادة بين المتقارفين .

**١١٢٩٩ - رُوبَا ٥**  
Stratocumulus, Cumulostratus (S).  
غبر من الغيوم وهو محباب متواصل الطبقات والارصفة  
ايضي اللون او اريد .



رباح دقطة



رباح شائع



رُبَاعِيَّة

١١٣٢٤ - رُباعِيَّة الأَزْهَار Quadriflore (F).

نمت تعريفي يطلق على التنوير الرباعي الزهر.  
Quadriflor (E).

١١٣٢٥ - رُباعِيَّة الأَسَدِيَّة Tétrandre (F).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره رباعية الاسدية.  
Tétrandrous (E).

١١٣٢٦ - رُباعِيَّة الأَعْلَاق Quadrilatéral (F).

نمت تعريفي يطلق على ما هو مركب من اربع اضلاع.  
Quadrilateral (E).

١١٣٢٧ - رُباعِيَّة الأَوْرَاق Quadrifolié (F).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه رباعية التجميع.  
Quadrifoliolate (E).

١١٣٢٨ - رُباعِيَّة الأَيْدِي Quadrumane (F).

نمت تعريفي يطلق على الحيوان الرباعي الايدي كالقرد مثلاً.  
Quadrumanous (E).

١١٣٢٩ - رُباعِيَّة البُؤُور Tétrasperme (F).

ما كانت يزوره رباعية التجميع.  
Tetrasperm (E).

١١٣٣٠ - رُباعِيَّة العِثَرَة Tétraploïd (F).

النباتات الرباعية العترة هي التي يبلغ عدد نسلها اربعة اضعاف عدد وسيدات العترة.  
Tetraploid (E).

١١٣٣١ - رُباعِيَّة الفُصُوص Quadrilobé (F).

من النبات ما كانت فصوص اوراقه أو ازهاره رباعية التركيب.  
Quadrilobate (E).

١١٣٣٢ - رُباعِيَّة القِيعَال Quadripétale (F).

نمت تعريفي يطلق على كل زهرة رباعية القعال اي البتلات.  
Quadriflor (E).

١١٣٣٣ - رُباعِيَّة القَوَاقِيم، ذَابَنَة Quadrupède (F).

صفة الحيوان الذي يسير على اربعة قوائم.  
Quadruped (E).

١١٣٣٤ - رُباعِيَّة المَرَاشِف Tétrastome (F).

نمت تعريفي يطلق على علم الحيوان على كل دودية مزودة بأربعة مراشف.  
Tetrasome (E).

١١٣٣٥ - رُباعِيَّة المُكَافِئ Tétravalent (F).

هو ما يلزمه أربع ذرات من الهيدروجين.  
Tetralency (E).

١١٣٣٦ - رُباعِيَّة الوُرُقَات Quadrifoliolé (F).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه رباعية الورقات.  
Quadrifoliate (E).

١١٣٣٧ - رُباعِيَّات الحَيَاشِيم Tétrabranchiaux (F).

رتبة من الرخويات وأسيات الارجل. مرتباتها وفصلاتها واجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها الساحق من متحمرات الازمنة القابرة || جمع حيوانات هذه الرتبة  
Tetabranchiate (E).

١١٣٣٨ - رُباعِيَّة \* Reteporus (S).

جنس حيوانات بحرية من الفيكليات التبعصيات فضيلة المسقاريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمتعددة الحرارة || مستمراتها شبكية التركيب، بوقية الشكل أو قدسية تنشب في الصخور وتصدر مئات الشنين.  
Rétépore (F), Reteporus (E).

١١٣٣٩ - رُباعِيَّة هو الرابند الرباعي، اطليه.

١١٣٤٠ - رُباعِيَّة Sous-cape

أداة من التتّن مستطيلة القطع مستعرة تستعمل لتعليق شحوة السيكار.  
Sous-cape

١١٣٤١ - رُباعِيَّة Accolure, Lien, Ligature (F).

ما يربط به.  
A tie, Bond, Ligature (E).

١١٣٤٢ - رُباعِيَّة Parpaing (F).

هو الحجر المقاطب الذي يلصق كامل عرصى الجدار.  
Parpen, Bond-stone (E).

١١٣٤٣ - رُباعِيَّة، وَصْل Linkage (F).

التحام يحصل بين جبينين في نشبة واحدة ألتقالها الوراثي يقسم فغات الالائتين.  
Linkage (E).

١١٣٤٤ - رُباعِيَّة أَصْفَر Ophisure serpent (F).

سمكة بحرية مستطيلة تدعى رسان البرق. اطليه.

١١٣٤٥ - رُباعِيَّة جَنْبِي، رُقِيدَة Pleure (F).

الرباط الجنبى غشاء مصلى المادة، متراكب الثنائى يجمع، عند المفصليات، بين العترة والرتوفين من الجانبين الأيمن والأيسر.  
Pleure (F), Pleure (E).

١١٣٤٦ - رُباعِيَّات Amphineures (F).

الرباطيات فئة من اللاقرويات البحرية. اجسامها مبطنة او دودية الشكل، متناسقة الجانبين مركزها السلي يأتي بين الرغويات والديدان.  
Amphineura (E).

١١٣٤٧ - رُباعِيَّات هي الأفلوس، اطليه.

١١٣٤٨ - رُباعِيَّة Quaterné (F).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو رباعي الانتساب كالاوراق مثلاً.  
Quaternate (E).

١١٣٤٩ - رُباعِيَّة الأَجْزَاء Quadrifide (F).

من الاعضاء النباتية ما كان رباعي الانقسام.  
Quadrifid, Four-cleft (E).

١١٣٥٠ - رُباعِيَّة الأَجْنَحَة Tétraptère (F).

نمت تعريفي يطلق على الحشرات الرباعية الاجنحة.  
Tetraptere (E).

١١٣٥١ - رُباعِيَّة الأَرْجُل Tétrapode (F).

نمت تعريفي يطلق على الحيوان الرباعي القوائم.  
Tetrapod (E).



رَبَاعَة

الظهر، جالس البطن. يطول من ٣٥ إلى ٥٠ سم. ثوبها جيل الالوان. ظهرها الى الزرقاء السنجونية. جانبها ويطبق الى الصفرة الذهبية. رأسها واعكاسها مرقوشة بالذهبي. ذنبها مبقع بالاسود. رأسها معتدل الجرم، قصير الخطم يعلو دلال ذهبي اللون فوق كل عين. شققها معتدل الانفراج. فكها متعادلان. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، ورباعيتها في الفك الاسفل. عينها كيرتان مستديرتان، جاحظتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة الشكل. زعنفتها الذيلية هلالية التغير. || لحما فاخر الصنف، مرغوب فيه.

١١٣٤٦ - رَبَّان ٥  
Naucrates (S).  
Pilote (F). Pilot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكتات الزعانف وفصيلته الاستعمريات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اهليجية الشكل. سفنها صغير القد. زعانفها الظهرية مستطيلة تتقدمها اربعة مناسخ متعقبة الحمة. زعانفها الشرجية فارقة || اشهر انواعه الريان المبلبل.

١١٣٤٧ - رَبَّان مَبْدُول ٥  
Naucrates ductor (S). Pilote commun, Fanfre (F).  
Common Pilot-fish (E).

سمكة من الريان. اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تتميز بمواكبتها البواخر والسفن في رحلاتها عبر البحر ذهاباً واياباً من بلاد الى بلاد || جسمها اهليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم. رأسها معتدل الحجم، شبه مخروطي الشكل. قصير الخطم. مستدير المقعر || ثوبها الى السمرة الفضية والذهبية والمزج يبق عند الظهر وبغير عند البطن ويمتدقه ثلاثة احزمة متفاوتة العرض شديدة السمرة || لحما كائن الصنف، مأكول قل من يرغب فيه.

١١٣٤٨ - رَبَّالِد ٥  
Archives (F).  
Archives, Record office (E).

هي المحفوظات الكتابية من وثائق وغيرها، واحداثها رييدة.

١١٣٤٩ - رَبَّيَّة  
Caroubier (F). Carob-tree (E).

هي شجرة الخرنوب الجوي او شجرة الخرنوب المأكولة الثار.

١١٣٥٠ - رَبَّيْح ٥  
هو قردوح بيوان، اطليه.

١١٣٥١ - رَبَّيْح  
Profit  
هو ما تحقق من مكسب. والربح يقسم الى قسمين :  
ربح اجمالي او قائم وربح صاف.

١١٣٥٢ - رَبَّيْح فَالْت  
Lucrum cessans  
هو الربح المتوقف حصوله فبا لو نفذ المتعاقد التزامه لان القاعدة في تقرير التمويه عن الضرر هي حساب الخسارة الفعلية التي وقعت والربح الفعلي الذي فات من عدم تنفيذ الالتزام.

١١٣٥٣ - رَبْد، عَيْنُ الثَّوَر  
Bupthalmum (S).  
Buptharme, Œil de bœuf (F).

الاسم العلمي من اليونانية بمعنى عين الثور || جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة بعضها زراعي تربسي، اوراقه متعاقبة. ازهاره وريسية ملقحة البتلات، حشوية الغلاف القرصي : يزهر متوجة باكليل مذهب || اشهر انواعه ما يقع.

رباعيات الحياشيم والكل والاذنيات، كثيرة الالوان الشكلية التي تحيط بالثمرة || اصداها شبه قرصية الشكل مجعولة عديدة الجيوب أو الجبر || اشهر مرتباتها وفصائلها المعنويات والنقيات والمقرنات.

١١٣٣٦ - رَبَّاعِيَّة  
Mitoyenne (F). Midway (E).  
من الانسان القاطنة الامامية وهي السن التي بين الثانية والثلاث.

١١٣٣٩ - رَبَّاعِيَّةُ الْأَجْزَاء  
Tétramères (F).  
Tetramera (E).

رَبَّيَّة حشرات من مخدات الاجنحة.  
١١٣٤٠ - رَبَّاعِيَّةُ الثَّوَرُوع  
Tétractinellidés (F).  
Tetractinellides (E).

رَبَّيَّة من الاسفنج الصواني.

١١٣٤١ - رَبَّاعِيَّة ٥، كُرْبُوع عَكْسِي \*  
Brassica oleracea napus (S). Rutabaga, Navet de

Suède, Turnep (F). Swedish turnip (E).

نبات جنس زراعي علفي يحول من فصيلة الصليبيات. جنه يبيهي الشكل كبير الحجم اسمر القشار اصفر اللباب الجامد || يزرع كالقوت يحد في جميع الاتربة لكنه يرغب في المواقع التي تكثر فيها الرطوبة الجوية ويقل فيها الاشعاع الشمسي || يستعمل كمكاف للبق والحيل والخنائير والقمم.

١١٣٤٢ - رَبَّاقِي  
Plotax  
هو الربي من الاسماك البحرية الصغيرة القد.

١١٣٤٣ - رَبَّالَك \*  
Chrysophrys (S).

Daurade, Daurat (F). Gilt-head (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات وربة شالكتات متنوعة في جميع بحار المناطق الحارة. اجسامها اهليجية الشكل، تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. فلوها صغيرة، زعانفها الظهرية مستطيلة شائعة. اثنائها مذبة اللون تشبه الفريدي. لحوها لذينة اللحم.

١١٣٤٤ - رَبَّالَك بَرْدَة \*، بَرْدَة، أَبُو بَصَل

Chrysophrys berda (S).  
Daurade rose (F). Pink dorado (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات وربة شالكتات الزعانف. اعطائها بعض اقارب البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. تتميز من اسماك المجازح والنفثاف، مسرحها الاضواط القرية الثور || جسمها اهليجي الشكل، طويلا يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الودي الذهبي المزج يعلو مشعة زرقاء في الظهر وغبرة فضية المزج في البطن. زعانفها حنطية اللون باستثناء الصدريه لانها شفافة. رأسها معتدل الجرم، قصير الخطم. شققها معتدل الانفراج. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، ورباعيتها في الفك الاسفل. عينها كيرتان، مستديرتان، جاحظتان. زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة. زعنفتها الذيلية فارقة || لحما ابيض اللون، فاخر الصنف.

١١٣٤٥ - رَبَّالَك مَبْدُولَة \*  
Chrysophrys aurata (S). Daurade vulgaire,

D. biluneé (F). Common Dorado, Gilt-poll, Gilt-head, Chad (E).

نوع من الرباك. اعطائها معطر اقارب البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تتميز من اسماك المجازح والنفثاف || جسمها شبه اهليجي الشكل، مقوس



رَبَاك



رَبَاك بَرْدَة



رَبَاك مَبْدُولَة



رَبَاك مَبْدُول



## التَفَاحُ



رَبْدٌ صَفْصَافِي الْوَرَقِ

الصفحة المقصصة. أزهارها بنفسجية. ثمارها صغيرة كروية سوداء اللون لا تؤكل || رَغَبٌ في الآفة المنسطة الالتساج والوطوبه. مغموم البالدنجان على الريق ينشر طوال السنة. نماره لذينة العلم.

١١٣٦١ - رُبُشِيَّاتٌ ٥  
Hypodermatacées  
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الرتيقات. تتميز بويصتها وسديناتها الفائرة في النسيج النباتية المنعارة. تكاثرها شفعية، رباعية أو ثمانية. تكاثرها عديدة، غيطية أو صفية، فراءه الرؤوس || اجتنبها عديده منها واحد يتم الاقتصاد الزراعي ينحى الذرب.

## ١١٣٦٢ - رُبَضٌ

ربض الكيش عن الفم: ترك شرابها عن عياه.

١١٣٦٣ - رُبَضٌ  
Intestins (F). Bowels (E).  
الربض هي الاسماء.

## ١١٣٦٤ - رُبُضٌ

Fondation (F).  
Foundation, Ground-work (E).  
الربض: أساس البناء وما س الأرض من التني.

## ١١٣٦٥ - رُبُطٌ

Attelage (F). Harnessing (E).  
قرون أو شد الدواب بالمجرور.

## ١١٣٦٦ - رُبُطٌ

Ligature (F).  
هو تكتيت أعضاء النبات أو بعضها برباط.

## ١١٣٦٧ - رُبُطُ الْكَرْمَةِ

Accolage ou accolement de la vigne (F). Nalling up or joining of vine (E).  
هو رفع وربط سروع الكرمة بالمسايمك.

## ١١٣٦٨ - رُبُطُ الشَّرَاحِ

Liaison de contentieux  
١١٣٦٩ - رُبْعٌ

الربيع نجم ثير صغير من كوكبة التنين مركزة في وسط الموائد.

## ١١٣٧٠ - رُبْعَةٌ

Eumétrique (F). Eumetrical (E).  
نعت تعريضي يطلق في تصنيف الدواب على كل حيوان مربوع الجلفة مشروط بالوزن.

## ١١٣٧١ - رُبْعٌ

Irrigation (F).  
الربيع والري والإسقاء واحد.

## ١١٣٧٢ - رُبْعٌ ٥ ، قَسِيدِيلَا

Phacidiella  
جنس فطور مجهرية من الرتيقات. يتميز بسدينه المنسطة المستديرة، ببوته البيضي الشكل الوحيد الخلية وبنتكاته البنفسجية الزاوم الاصل || أشهر أنواعه ربيع التفاح.

## ١١٣٧٣ - رُبْعُ التَّفَاحِ ٥ ، قَسِيدِيلَا ديسكولوره

Phacidiella discolor, Phacidium discolor, Phacidio-pyrcis furfuracea, P. malorum, Discula pyri, Fuckelia conspicua (S).  
فطر مجهرى يركب التفاح والاجاص والفسريرل في انصافها وثمارها فيؤذيها || يصيب اصنافا واثندا الاجبار الضعيفة فيفرج قشورها ويعملها. مظهره الخارجى بقع قميصة، منخفضة الوسط الاطحل، مرتقمة الحافة المحيطية المحددة.

وهو على البأر عند تمام ادراكها وفي اثناء خبزها ينسج



ربيع التفاح

## ١١٣٥٤ - رُبْدٌ صَفْصَافِي الْوَرَقِ \*

Buphthalmum salicifolium (S). Buphthalmum à feuilles de saule, Cèl de bœuf à feuilles de saule (F).

نوع من الربد يملو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. ساقه نحيلة اوراقه سنانية طولها نحو ١٠ سم. عرضها ٢، نصلها جابد النسيج الرقيق، ازغب البشرة على صفحته. ازهاره كبيرة القدرية الارزكاز.

## ١١٣٥٥ - رُبْدٌ ظَرْفِي \*

Buphthalmum speciosum, Telekia speciosa (S). Buphthalmum élégant, Cèl de bœuf élégant, Télékia élégant (F).

نوع من الربد يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، اوراقه قلبية الشكل منمقة، نصلها مائل بشرة الصفحة العليا، ازغب السفل. ازهاره كبيرة القدر قطرها نحو ٨ سم.

## ١١٣٥٦ - رُبْدٌ فَاحِشِر

Buphthalmum speciosissimum, Telekia speciosissima (S). Buphthalmum superbe, Cèl de bœuf superbe, Télékia superbe (F).

نوع من الربد، يملو نحو ٥٠ سم. ساقه غليظة قوية. اوراقه حاضنة كبيرة القدر مميكة النصل الجلدي الازغب. ازهاره كبيرة، قطرها نحو ٦ سم.

## ١١٣٥٧ - رُبْدٌ نَتْنٌ ، وَرْدُ الْحَمَارِ

Buphthalmum graveolens (S). Buphthalmum fétide, Cèl de bœuf fétide (F). Oxeye (E). Rindsauge (D). Buftalmo, Occhio di bue (I).

نوع من الربد، يملو نحو ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة المنح مميكة النصل الباهت الخضار. ازهاره شاذفة البتلات، لونها الى الصفرة العاقبة. يكثر في الاراضي البور المتصلة الالتساج.

## ١١٣٥٨ - رِبْدُورٌ ٥ \*

Rhipidura (S). Rhipidure (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الملبانيات. موطنه ماليزيه والجزر المجاورة. يأنث الغابات وصفات مجاري الماء. قوته الذباب والحوام || جسمه صغير القدر، مستطيل الذنب المروسي الشكل. ثوبه الى الشفحة الطحلاء. حمراه وزوره وانيقه الى التبره، ويعملو في مخبره، من قاعده الشفق الى المنق، جده عاقبة السرعة كما في الرأس || يأنث عشه في الاشجار الرقيقة. عشه كالكوب سيد الحبك بالحشيش الناعم. الانثى تحضن بتناوبة الذكر نحو ١٢ بيما.

## ١١٣٥٩ - رِبْرَبٌ

Troupeau de ruminants sauvages (F). Drove of savage ruminants (E).

جماة البقر الوحشي وسائر الحيوانات المجتره.

## ١١٣٦٠ - رِبْرَقِي ، أَفَاقِيَّةٌ ، مَعْدٌ أَسْوَدٌ ، عَنَبُ اللَّذْبِ

Solanum nigrum (S). Melongène noire, Morelle noire, Amourette, Tue-chien (F). Black nighthshade, Hound's-berry (E). Schwarzer nachtschatten (D). Morella, Solano nero, Solatro. orense (I).

جنية رية معمرة من الفصيلة الباذنجانية. ساقها غليظة، فراءه، شائكة. اوراقها كبيرة القدر منمقة، نصلها مائل

حتى اواخر ايلول . تسرح من الشروق الى نحو الساعة  
الثامنة ومن العصر الى الدغشة . تسافد بعد ظهورها بثلاثة  
اشهر . تنجح المكن في التربة على عمق ٥ او ٦ سم .  
البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري الذي يحصل بعد  
الثقف بنحو ٢٦ شهراً تظل نحو ٢٠ م . ثوبها الى البياض  
الابهر . جسمها مستطيل الجرم ، مقوس الشكل ، مستضخم  
الرأس الاسود ، ضلع التآشير ، سداسي الرواجب السرر  
طول الاكمام الذي يستر نحو عشرة اسابيع يتقضي في  
التربة على عمق نحو ٢٠ سم . داخل جراب غشن من  
التراب والغالب .

#### ١١٣٨٢ - رَيْبَة مُنْقَطَعَة \*

Pentodon punctatus (S). Pentodon ponctué (F).  
خنافس من فصيلة الجمليات . جسمها يطول نحو ٢٢ م .  
ويعرض نحو ١٤ م . رأسها مستعرض الشكل . ظهورها  
محدوب . ثوبها الى السمرة اسود المواج . غمداهما جذعان  
يضيوط دقيقان تبلو كالكثف المتتابع . ريقها كبيرة القد ،  
مقوسة الشكل ، غبراء اللون ، تعيش نحو ثلاث سنوات ،  
تركب جنود النباتات من اي جنس ونوع .

Dividende (F). Dividend (E). رَيْبِيْحَة  
هي الحصة من الربح الصحيح وقد تكون حقيقية او  
صورية .

#### ١١٣٨٤ - رَيْبِيْهَة الرِيد ، تمر نضد ثم نضج بالماء .

١١٣٨٥ - رَيْبِيْدَان ، رَجُلُ الطَيْر ، رَجُلُ الْعَصْفُور  
Ornithopus (S). Ornithope, Pled d'oiseau (F).  
Bird's-foot (E). Vogelfuss (D). Ornitopa (I).  
جنس نباتات عشبية برية وتعلف من فصيلة القطانيات  
القراشية . انواعه ستة ترغب في الآتربة الرملية والقليلة  
الانضاج . اوراقها متعاقبة مركبة وثرية ، وريقها  
اهليجية صغيرة . ازهارها محورية ، زنادية ، صوبانية  
التجميع ، يضاء اللون او وردية . ثمانية قرون دقيقة  
اسطوانية الشكل متفاوتة الطول حوية المقعدة تشبه رجل  
الطير . بزورها صغيرة شبه كروية . اشهر انواعه ما يلي .

١١٣٨٦ - رَيْبِيْدَان قَرْم Ornithopus perpusillus(S).  
Ornithope nain (F).  
نوع من الريبدان البري التنجسي الصغير القدر . ازهاره  
بيض . يقال انه من النباتات الطبية يدر البول .

#### ١١٣٨٧ - رَيْبِيْدَان مَرْعَوِي \*

Ornithopus sativus (S). Ornithope cultivé, Serradelle,  
Serradelle (F). Seradilla, Common bird's-foot  
(E). Serradella, Kleimer vogelfuss (D). Ornitopa sa-  
tiva, Serradilla (I).  
نوع من الريبدان الكلثاي ، زهره وودي اللون ، يزرع  
في الحقول والمراعي . علفه جيد الصنف ترغب فيه الماشية .

١١٣٨٨ - رَيْبِيْع Printemps (F). Spring (E).  
فصل من فصل السنة بين الشتاء والصيف . مدته ثلاثة  
اشهر من ٢١ آذار الى ٢٠ حزيران . يبتدىئ عند زوال  
الشمس من برج الحمل . وفيه يتسوي الليل والنهار ويتبدل  
الزئان وطيب الهواء ويهب التسم وتزدوب الثلوج وتسيل  
الابدية وتنبع العين ويورق الشجر ويتلاذ الزهر في الربو  
والخقل . يودم الى ان تبلغ الشمس آخر الجوزاء حيث  
يقبل الصيف .

مستديرة غنية خلية حنطية اللون تركب البشرة المهدوشة  
والمطبوقة فتجمل في اغلال الخلايا والنساذ || يكافح  
يقطع حرق الاغصان والافانق المصابة ثم تطهير الجروح  
بحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

#### ١١٣٧١ - رَيْبِيْعَات \* Phacidiaee

عزاة فطور مجهرية من فصيلة الفشاريات وثرية الزقيات.  
اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقصصها اللاقياسي الذي  
يتفصل عن النخيرة او يلتصم بها . مدبنتها مستديرة  
منبسطة . يوفها يضيي الشكل شفاف وحيد الخلية . نكتاتها  
بنفسجية الزام الامل || اشهر اجناسها التي تَعْمَرِي النباتات  
ثلاثة : الربيع والزئمة والقلاوية .

#### ١١٣٧٥ - رَيْبِيْعَة Emprise (F). Expropriation (E).

١١٣٧٦ - رَيْبِيْعِي ، رَيْبَاقي Plotax  
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات صغيرة القدر  
مفلطحة مستديرة زاهية الالوان المديدة ، تكثر في البحار  
الحساسة .

١١٣٧٧ - رَيْبِل ، قَرْنُصُ الْعُرْبَاب Randia (S).  
Randie (F). Ink plant, Ink-berry (E). Randie (D).  
Randia (I).

جنس جنبات وشجيرات برية وثرية من فصيلة الغويات.  
انواعه عديدة جميعها فراء السوك ، بعضها شائك . اوراقها  
متعاقبة او غصية ثلاثية ، اهليجية الشكل ، متايبة التصل ،  
منمقة . ازهارها فردية التجميع ابيلة الاوتكار . ثمارها  
عنية متينة ثنائية الفلقة . ترغب في الاراضي الرطبة . تكثر  
في المناطق رمل ضفاف الانهر . يستخرج من ثمارها صباغ  
ازرق قاصر الصفت .

#### ١١٣٧٨ - رَيْبُوش الشجرة العظيمة الواسعة .

١١٣٧٩ - رَيْبِي الشاة التي وضعت سدنياً . وقيل الربى من المزر والرفوش  
من الضأن وجسمها رباب .

#### ١١٣٨٠ - رَيْبِيْعَة النَخِيل \* Phyllognatus silenus (S).

خنافس من فصيلة الجمليات ، طولها نحو ٢٠ م . وعرضها  
١٢ ، رأسها عريض منسلق بقرن مدبب . لونها كستنائي  
مواحه الى السمرة . غمداهما مستدير الطرف . تعيش بين  
النخيل وترغب في المناطق الرملية . ريقها تركب جذور  
الكروية ويذويها على سطح التربة .

#### ١١٣٨١ - رَيْبِيْعَة غَسِيْبَة \* Pentodon idiota (S).

Pentodon nigaud (F). Pentodon idiota (E).  
حشرة خاملة دامت من فصيلة الجمليات وثرية سمندرات  
الاجنحة . موطنها الشرق الاوسط . تألف المزارع والبساتين  
والكروم والارواطين . خنافسها تعيش على اوراق النبات .  
يرقاتها تركب الجذور الثانوية والشجرية || جسمها يضيي  
الشكل ، متوسط القدر ، يطول من ١٨ الى ٢٠ م .  
ويعرض من ١٢ الى ١٣ م . ثوبها الى السواد اللامع يعلمو  
خلل دقيق . رأسها مستدل الجرم ، قصير الخط ، ضلع  
التآشير الذين . زباناها مستديرة ، صمغيا الاطراف  
عناها صغيرتان بارزتان . ظهورها مستدل الاحديداد  
مقطوع الطرف لا يلحف كامل البطن . غمداهما متتابعتان  
التحزيز الخفيف . اسرارها خاسية المعقل || جيلها ثلاثي  
الطول . تخرج الحشرة الجملانة من مكنتها في نيسان وتبقى



١١٣٨٩ - رَيْمِيَّة (E). Vernal(F). Vernal, Spring-like (E).  
نمت تزيين يطلق عل ما يخص بالربيع .

١١٣٩٠ - رَيْمِيَّات (S). Primulaceae (S).  
Primulacées (F). Primulaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة النعالة ، تشمل عدة اجناس وأنواع ، اشهرها زهرة الربيع وبخور مريم وسحيفة الخلة .

١١٣٩١ - رَيْمِيَّة (E). Autosome (F). Autosome (E).  
اسم يطلق على مجموعة الثشب الموجودة في كل حبيبة حيوانية .

١١٣٩٢ - رَيْمِيَّة (E). Sanglier (F). Wild boar (E).  
الرت هو الخنزير الوحشي . الذكر ينحى الغر والانيث الرث . انواعه عديدة موطنها العالم القديم ، اعرفها واشهرها الاربعية التالية :

١١٣٩٣ - رَيْمِيَّة أَغْفَر \* (S). Sus cristatus (S).  
Sanglier à crinière (F).  
نوع من الخنزير الوحشي يتميز بفرقه الطويلة الهلب الاسود الممتدة من القنن الى الكتفل . ذنبه قليل الهلب . اذنه مرطاه الصغمة الحارسية ، هلبة الباغلية . جثته متوسطة القد طولها نحو ١٥٠ سم . علوها ٩٠ || موطنه الهند حتى ارتفاع ٤٥٠٠ م . ويرتدي ب ويص الجوز الاخرى || اناته تقص من ٤ الى ٦ خنايص مرتين في العام .

١١٣٩٤ - رَيْمِيَّة قَرْم (S). Sus salvanus (S).  
Sanglier nain (F).  
نوع من الخنزير الوحشي ، موطنه سفوح جلابا . جثته صغيرة القد طولها نحو ٦٠ سم . علوها ٣٠ وذيله ٣ سم . يعيش تطلان صغيرة براوح عددا من ٥ الى ٢٠ . يألف الاجراع والادغال والبراري الطبيعية الريفية الاعشاب . اناته تقص مرة واحدة في العام من ٦ الى ٨ خنايص .

١١٣٩٥ - رَيْمِيَّة مَيْدُول \* (S). Sus scrofa (S).  
Common wild boar (E).  
نوع من الخنزير الوحشي ، ضروبه عديدة موطنها آسيا والشرق الاوسط واروبه وجزر المتوسط وافريقية الشمالية حتى مصر والسودان || جسمه غليظ الجثة ، طوله نحو ٢٠٠ سم . علوه ١٠٠ ذنبه ٢٥ . اما وزنه فيراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ كيلو . قوامه قصيرة قوية ، رأسه ضخم ، فنتليته مستطيلة . اذنه متضبة ، هلبة كثيث التجميع يغلف ويطول عند ثيب الظهر || يعيش جاعات مختلفة العدد . يألف الغابات والحقول المزروعة . يسرح في الليل . اناته تقص من ٦ الى ١٠ خنايص مرتين في السنة .

١١٣٩٦ - رَيْمِيَّة مُسْتَج (S). Sus vittatus (S).  
Sanglier rayé (F).  
نوع من الخنزير الوحشي ، ضروبه عديدة ، موطنها جابا وسومرا وبورنيو والهند الصينية . يتميز بثوبه المسج وبفرقه السمراء التي تمتد من القنن الى اوائل الظهر . جثته متوسطة القد طولها نحو ١٢٠ سم . وتبلغ ٦٠ || يألف الاجراع والمناقع والاعشاب الكثيفة الغضة . اناته تقص من ٦ الى ٨ خنايص .

١١٣٩٧ - رَيْمِيَّة (F). Phytotechnie (F).  
الرتاية مبحث من مجموعة مباحث علم النبات يخص بالتصنيف والتسمية .

١١٣٩٨ - رَيْمِيَّة (F). Lithologie (F).  
العالم بتركيب الحجارة .

١١٣٩٩ - رَيْمِيَّة (E). Lithologie (F). Lithology (E).  
علم الحجارة وتركيبها .

١١٤٠٠ - رَيْمِيَّة (E). Kraméria (F).  
Ratanhia, Krameria (S). Ratanhia, Kraméria (F).  
جنس نباتات جنينية طيبة معمرة من المستنرات وفضيلة البنيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الامريكية

تكثر في بوليفيا والبيرو . سوقها فراء . اوراقها سنانية متعاقبة ، نصالها صغيرة القد جالدة . ازهارها فردية التجميع محورية الايتكاز يكثر فيها اللون الاحمر . ثمارها كروية نافقة تلتف بعض البسات المستدرة || جلورها لينة التركيب انقطة الانتشاب والاستدادة ، نجها جوي اللون فني ببعض المواد المقوية النعالة الجزلة النفع || اشهر انواعها ما يبع .

١١٤٠١ - رَيْمِيَّة (F). Ratanhia ixina (S).  
Kraméria rouge, K. de Savanille (F).

١١٤٠٢ - رَيْمِيَّة (F). Ratanhia secundiflora (S).  
Kraméria grise, K. du Mexique (F).

١١٤٠٣ - رَيْمِيَّة (F). Ratanhia officinal (S).  
Kraméria officinale, K. triandra (F).

١١٤٠٤ - رَيْمِيَّة (E). Ordre (F). Order (E).  
هي في تصنيف الاحياء جماع الفصائل للمتشابه .

١١٤٠٥ - رَيْمِيَّة (E). Marche de l'escalier (F).  
Stair (E).  
الرتبة : الواحدة من رتبات الدرج .

١١٤٠٦ - رَيْمِيَّة (F). Retama (S). Rétama (F).  
جنس نباتات معمرة برية ورتيانية من فصيلة القرنيات . انواعه قليلة مهدا الشرق الاوسط . جميعها نباتات تملو من المترين الى الثلاثة امتار . سوقها فراء اسلية الشكل . فروعها الزهرية عريانة اما الماقرة فذات اوراق صغيرة بسيطة مستطيلة النصل المحوي او غسلة . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري الايتكاز . ازهارها صغيرة القد ، كثيرة العدد ، يضاه اللون || تنويرها يستمر من شباط الى اواخر نيسان .

١١٤٠٧ - رَيْمِيَّة (F). Gemmage (F). Tapping (E).  
استغلال او استحصال راتنج الصنوبريات وذلك بجز سوق هذه الاشجار والتقاط ما يسيل منها من الراتنج .

١١٤٠٨ - رَيْمِيَّة (F). Cul-de-sac (F).  
Blind alley (E).  
كل منجم لا غير فيه وكل طريق غير ناظ .

١١٤٠٩ - رَيْمِيَّة (F). Sous-ordre (F).  
Sub-ordre (E).  
الرتيبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الرتبة وتقبل الفصيلة .



رت اعفر



رت ميلول



رت

الصدية الى التي الاسمر . وراجها البطنية طول دقيقة ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوما يتقضي ضمن  
صلبة متينة الحرك تنسجها السرعة على سطح النمل بعد  
ان تطويه وتبكيه بخيوط حريرية متصالية .

١١٤١٧ - رتبة Ranger (F). To range (E).

رثت الدجاجة بيضا : جمته . ورث البيض في الحامضة :  
رتبه .

١١٤١٨ - رتبة الرجمة : يبيض في طرف انت الفرس.

Rhytisma

١١٤١٩ - رتبة

جنس فطور مجهرية من الرنيات وفصيلة الحشاريات  
يتميز بويمة تنشأ وتنمو في نصل الورقة المنحار تحت  
الساقة الادمية . تحضن في داخلها الاصلان التي تقسم البوغ.  
بوغها كيف الثمة ، بسيط التركيب ، خيطي الشكل ،  
شفاث || انواعه قليلة اشهرها رجمة القيقب ورجمة  
الصفصاف .

١١٤٢٠ - رتبة الصفصاف

Rhytisma salicinum, Melasma salicina (S). Maladie  
des croutes noires du saule (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق الصفصاف فيشوهها ||  
مظهره الخارجي يقع بمخنة ناعمة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها  
الى السمره ، تركب نصل الازراق على صفحات العليا  
تستجمد النصل وتحميه وتشوهه || اضراره طفيفة لا  
تستوجب المعالجة .

١١٤٢١ - رتبة القيقب

Rhytisma acerinum, Melasma acerinum (S). Maladie  
des croutes noires de l'érable (F). lar spot of maple  
(E). Pechfleckkrankheit des ahorns (D).

فطر مجهرى يصيب القيقب في اوراقه فيؤذيها . مظهره  
الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة.  
قطرها يراوح من ٧ الى ١٨ سم . تركب نصل الازراق  
على صفحاتها العليا تمتد بمخنة خضراء اللون ثم سمراء  
يعطيها اطراف مهدب || اضراره محدودة الاذى لا تستلزم  
المعالجة . على ان استعمال سائل بورود مرة واحدة عند  
الانواع يفيد . ومنهم من استعمل الاسمدة الازوتية لانها  
تقوي مناعة الازراق وتضع الرجمة .

١١٤٢٢ - رتبة Arthrite (F). Arthritis (E).

هي التهاب المفصل ، اطلبه .

Trechidae (S).

١١٤٢٣ - رتبة

Tréhidés (F). Trechidae (E).

فصيلة حشرات قانصة ناعمة من رتبة غدييات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الانعام  
الحارة والمتدلة الحرارة || جميعها صغيرة القند قل يتجاوز  
طول الواحدة منها ١٠ سم . رؤوسها كروية الشكل ،  
صغيرة العين الناشرة ، مستطيلة الزباني الحشائية الفصل .  
كواصلها قليلة الشكل . احمادها لاسقة ثنائية الاغاديد  
المتطابقة المتوازية . اطرافها مخففة الالوان || تسرح في  
التيار وتبيت في الليل . تنسى بسرعة ورشاقة وتعتبر مخففة ||  
قوتها ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والديدان || اشهر  
اجناسها الرثيمة والسحيرة والبنفس .

١١٤٢٤ - رتبة سبتوسيلندريوم

Septocylindrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . مشيجه داخلي

Tarentula (S).

١١٤١٠ - رتبة

Tarentule (F). Tarantula (E).

جنس حشرات من المناكب ينتمي الى فصيلة الخنثريات .  
انواعه قليلة جميعها متوسطة القند ، قانصة ، مفترسة وسامة .

١١٤١١ - رتبة

Araignée des caves (F).

دوبية من المناكب تدعى شبيشة ، اطلها .

Araneja (S). Aranéides (F).

١١٤١٢ - رتبة

Aranéids, Spiders (E). Spinnen (D).

هي المناكب رتبة من المنكبويات عديدة الفصائل والانجاس  
والانواع .

Lygodium (S).

١١٤١٣ - رتبة

Lygodier, Lygodion (F). Climbing fern, Snake's  
tongue fern (E). Schlingfarn, Kletterfarn (D).  
Ligodio (I).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة الرثيمات . انواعه  
المعروفة ١٥ جميعها نباتات عارضة ملتفة معمرة . يقال  
انها لا تخلو من الفوائد الطبية وقد تنفع الصدر والاعماء .

Schizeaceae (S).

١١٤١٤ - رتبة

Schizeacées (F). Schizeaceae (E).

فصيلة من السرخس اجناسها نحو ١٦ . انواعها كثيرة  
العدد جميعها رية ، منبتها المناطق الحارة اشهر  
اجناسها الرثيمة .

Laie (F). Wild sow (E).

١١٤١٥ - رتبة

انثى الرث اي الخنزير البري .

١١٤١٦ - رتبة ملوثة ، لاجمة اوزاق

الأشجار الثميرة

Lyonetia clerckella (S).

Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).  
Apple leaf miner (E). Obstbaum-Miniermotte,  
Schlangenminiermotte (D).

حشرة من فصيلة القوبيعات ورثية سرشقيات الاجنحة .  
اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية.  
تألف الموائع التي تكثر فيها التفاح والكرز والخوخ .  
فراشها جارية قوتها يحرق اجناسها صغرى ، بارزتان . زباناها  
غللايا نصل الازراق || جسمها نحيل قصيف ، يطول  
نحو ٤ سم . بطنها من ٨ الى ١٠ سم . رأسها معتدل الحجم ،  
شبه مكور الشكل . عينها صغرى ، بارزتان . زباناها  
عيطيان . ملابها قصيرة ، مرشفا معتدل الطول . جوشها  
اشهب اللون كالبلن . رواشها صغيرة ، الاسمانيا الى  
الصفراء تحت ملوها جده صغيرة وزراكن جزوية .  
الخلفان الى الشبهة المخففة . اما الاهداب فالى الشبهة  
الزاهرة || لها ثلاثة اجيال في الحول . تسرح في التيار  
وتستكن في الليل . تبشر الانثى متع المكن بعد الكوم  
بيومين وتستمر عليه نحو خمسة ايام وترز مبيدات في  
الصفحات السفلى من نصل الازراق . يتغذى المكن بعد  
متعه بنحو ٨ ايام عن اسراع دقيقة تلم النصل في نسجه  
المادي تحت البشرة وتغزل فيه افاقا مستطيلة ، متعربة  
تقيم فيها حتى نهاية الطور الاسروي اي نحو ٢٥ يوما ||  
السرعة عند بلوغها الادراك تمام تطول نحو ١٠ سم . جسمها  
وشمي الشكل ، تبي اللون ، اسمر الرأس . ملها ورواجها



رتبته



رتبته



رث



رتبته ملوثة



رتبته الصفصاف



رتبته القيقب



رَيْثِيَّةُ الْجُدُور



رَيْثِيَّةُ الْقَطَن



رَيْثِيَّةُ



دَجْرَج

١١٤٣٥ - رُجُوجُ \*  
Gnetum (S). Gnèta (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة العُلديات . مهدبا  
البلاد الحارة . أنواعها نحو ١٥ منها الجنبات للمادة المارشة  
ومنها الشجيرات الغراء المقداء . أوراقها معتقة ، متعاقلة ،  
بيضية النصل النسيم . ازهارها سنبل التجميع ابلي الارتكاز  
اشهر أنواعه الثلاثة التالية .

١١٤٣٦ - رُجُوجُ جَمَاوُ  
Gnetum gnemon (S).  
Gnèta de Java (F).  
نوع من الرجرج الزراعي . أوراقه النامية مأكولة وبلدوره  
كللك .

١١٤٣٧ - رُجُوجُ طَبِي  
Gnetum urens (S).  
Gnèta raffraichissante (F).  
نوع من الرجرج الزراعي . بلدوره مأكولة . يستخرج  
من سوقه عصارة لزجة مرطبة عديدة المنافع الطبية .

١١٤٣٨ - رُجُوجُ تَسِيْجِي  
Gnetum fumlucare (S).  
Gnèta textile (F).  
نوع من الرجرج الزراعي الصناعي . يستخلص من ثشوره  
الياف صناعية نسيجية .

١١٤٣٩ - رُجْعَمَة  
Récépissé, Reçu (F).  
Receipt, Received (E).  
عمر او وصل تدون فيه بالتفصيل والسعر البضائع التي  
صار استلامها .

١١٤٤٠ - رُجْعِي  
Rétroactif (F). Retroactive (E).  
جار مفعول على الماضي .

١١٤٤١ - رُجْعِيَة  
Rétroactivité (F).  
Retroactivity (E).  
هي رجعية الار اي نقل اثر القانون أو الحكم أو اي  
عمل قانوني الى الماضي .

١١٤٤٢ - رُجْعِيَّةُ الشَّرْطِ  
Rétroactivité de la condition (F). Retroactivity of  
condition (E).  
هي نقل اثر الشرط الى يوم العقد القانوني فاذا حل الشرط  
الموقف حدث اثره منذ يوم تحرير العقد وإذا كان الشرط  
فانصا اعتبر العقد كان لم يكن قط .

١١٤٤٣ - رُجْل  
Pied (F). Foot (E).  
هي القائمة وتسمى الحافر في الخيل والخلف في الابل والظلف  
في البقر والقصان .

١١٤٤٤ - رُجْل ، رُجْلَة  
Multitude, Troupe (F).  
Multitude, Troop (E).  
سرب او جماعة الجراد وما اشبه ، ج ارجال .

١١٤٤٥ - رُجْلُ الْأَرْثَبِ  
هو نفل البر ، اطلبه .

١١٤٤٦ - رُجْلُ الْأَسَدِ  
هو الذئبان الجلي ، اطلبه .

١١٤٤٧ - رُجْلُ الْإَوَزِ  
راجع أبنية .

١١٤٤٨ - رُجْلُ الْجَبَّارِ الْبَيْسَرِي  
Rigel Elgebar (F). Rigel (E).  
نجم نير من كوكبة الجبار اي الجوزاء . مركزه على القدم  
البيسري . ويدعى أيضاً رجل الجوزاء البيسري . يبعد عن  
الارض نحو ٦٠٠ سنة ضوئية .

الانتشاب ، جربه الكندية مهبة الوضوح ، شديدة  
القصر . كائناته قلادية ، مؤثورة ، ضمية التجميع . أنواعه  
نحو ٢٥ جميعها لا مؤذية أضرها رَيْثِيَّةُ الْجُدُور ورَيْثِيَّةُ  
القطن .

١١٤٢٥ - رَيْثِيَّةُ الْجُدُور \*  
Septocylindrium radicolium (S).  
فطر مجهرى يركب جذور الاشجار الخالصة الدلورية منها  
التفاح والكرز والليمون فيعفنها ويسرع في بياسها .

١١٤٢٦ - رَيْثِيَّةُ الْقَطْن \*  
Septocylindrium areola (S).  
فطر مجهرى يركب أوراق القطن دون ان يؤذيها || مظهره  
الخارجي لطخ مستطيلة طولها نحو ١٠ م . تغلظ النصل  
على سطحها العليا . تبدو غراء اللون ثم تتحول الى السمرة  
وتبقى على حالها ولونها حتى آخر عهدها .

١١٤٢٧ - رَجَاة ، رَجَاة  
Séismologie, Sismologie (F). Seismology (E).  
الرجاجة أو السيسمولوجية علم يبحث في الزلازل والاهتزازات  
الارضية .

١١٤٢٨ - رَجَاع  
Retour (F). Return (E).  
وقت الرجاء أو زين الرجاء هو زين رجوع الطير بعد  
قطاعها .

١١٤٢٩ - رَجَاة  
Stabulation (F). Scalling (E).  
الرجانة والرجن هي تربية الدواجن في المرباط والاصطبلات  
ولمراح لا في المراعي .

١١٤٣٠ - رَجْمَان \*  
Madrépore (F). Madrepore (E).  
نوع من الرجانة ، مهده بحار البلاد الحارة والاسوائية .  
ركبته مدسنة جسمية التركيب كثيرة الفروع والشعاب  
والانفاق .

١١٤٣١ - رَجْمَانَة  
Madréporaires (F).  
فئة من المرجانيات الزهرية وهي حيوانات بحرية من صف  
المحفرات تتميز بإفرازاتها الجسمية المتناسكة وبعلافها  
الكبيرة المتشعبة التي تصنع كالخشاف .

١١٤٣٢ - رَجْمَانِي \*  
Madréporique (F).  
Madreporic (E).  
نمت تعريفي يطلق على الخشاف والصخور البحرية  
النسوة والمتشعبة كدائع الرجان .

١١٤٣٣ - رَجْمَانِيَّة \*  
Rajanie (F).  
جنس نباتات جنبية عارفة من فصيلة البنيوتوريات .  
أنواعها المعروفة ستة أعطابها امريكية الوسطى والانتليل .  
سلورها عسقلية . سوقها لينة ملتفة . أوراقها معتقة  
متعاقلة قليلة النصل . ازهارها ثنائية المسكن . ازهارها  
سنبل التجميع ، ابلي الارتكاز . ثمارها تغلف بعض  
الزور الدقيقة الفردية الجناح . عسقلها ديماسية لبابية  
مأكولة تستعمل استعمال الانيام اي البطاطا الصيفية .

١١٤٣٤ - رَجْمَب  
رجب النخلة: بين عثمها دكائنا تمتد عليه لضفها . وضع  
الشوك حوطا لئلا يصل اليها اسد .

## ١١٤٦٥ - رجلُ القِطِّ المِزْمَارِي

*Antennaria plantaginifolia* (S). Pied-de-chat à feuilles de plantain (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو نحو ٤٠ سم. رواكها قليلة، مستطيلة، كاسية النواحي. أوراقها ضيقة، نصلها لسانى الشكل خلى البشرة ثلاثى الفصوص. رؤسيتها الزهرية بيض وخضر || أزهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١١٤٦٦ - رجلُ البَنَوَةِ اطلب كالية المروج.

## ١١٤٦٧ - رجلُ المعزَى\* ، حَشِيشَةُ المعزَى

*Aegopodium podagraria* (S). Aegopode podagraine, Egopode aux gousseux, Herbe aux gousseux, H. de St Gérard, Pied de chèvre (F). Goatweed, Bishop's weed (E). Gemeiner giersch, Podagrakaut (D). Egopodo podagraria (I).

نبات عشبي يري طبي معمر من فصيلة الخيميات ينبت في الاساكن الطليلة، منافهه الطلية عديدة ومهمة || ساقه غليظة سبواه تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. أوراقه كبيرة، مركبة، سداسية، وريقاته ثلاثية التجميع، بيضيه الشكل، سنة النصل الباهت الخضار.

## ١١٤٦٨ - رجلُ قِنَطَرُوس

نجم نير من كوكبة قنطورس.

١١٤٦٩ - رجلته هي البقلة الحماق، اطلبها.

## ١١٤٦٥ - رجلِيَّات

*Portulacaceae* (S). *Portulacacées* (F). *Portulacaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القنات. اجناسها وانواعها عديدة. اشهر نباتاتها الرجل.

## ١١٤٦٦ - رَجُونٌ

*Stabuler* (F). *To stall* (E). رجن ورجن الدابة : حبسها في مرابضها على اللف.

١١٤٦٧ - رَجُونٌ هي الرجاة، راجمها.

١١٤٦٨ - رَجُوعٌ هو الايلولة، اطلبها.

## ١١٤٦٩ - رَجُونَةٌ ٥

*Coralliphila* (S). *Coralliphille* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الرجونيات. انواعها المعروفة قليلة البد نحو سبعة. اعطائها بحار البلاد الحارة اغصنها البحر الاخر. تميش لاصقة بمذائع المرجان والرجان || اصداها صغيرة حوشة شبه بيضيه الشكل مقطوعة القاعدة تبدو كالجلبب الوسيع. اعقابها عازنة وشمللة.

## ١١٤٧٠ - رَجُونِيَّات ٥

*Corallophilidae* (S). *Corallophilidés* (F). *Corallophilidae* (E).

فصيلة من الرخويات مديات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها يعيش على مذائع المرجان والرجان في بحار المناطق الحارة || اصداها خشنه، خرشه، متباينة الاشكال الانحاسية، قليلة القليلة، قصيرة الحلزنة الصغيرة || اعرف اجناسها واشهرها الرجونية والسحيفة.

## ١١٤٦٩ - رجلُ الجَبَّارِ اليُمْنَى

نجم نير من كوكبة الجبار مركزه على القدم اليمنى. ويدي ايضاً رجل الجوزاء اليمنى.

١١٤٥٠ - رجلُ الحِمْيَام هو الكهان الصباغي، اطلبه.

## ١١٤٥١ - رجلُ اللَّبِ

*Arctopus* (S). *Oursine, Pied d'ours* (F). *Bear's paw* (E). *Bärenfuss* (D). *Plè d'orso* (I).

نبات عشبي يري من الخيميات. ساقه منتصبه تنتهي بضمه من الاوراق الكبيرة القده يملوها الازهار الصبواي التجميع. اوراقه معقفة كبيرة، نصلها حلبي المسام، فارش الصفحة اللابوية الخددة. ازهاره بيض.

١١٤٥٢ - رجلُ الذئب هي الخفيرة، اطلبها.

١١٤٥٣ - رجلُ المَنَقَافِ راجع غربق نجس.

١١٤٥٤ - رجلُ الغَرَابِ المدَّاد

هو الحوزان المداد، اطلبه.

١١٤٥٥ - رجلُ القَبْرَةِ اطلب عائق الحادق.

## ١١٤٥٦ - رجلُ القِطِّ، رجلُ الهِرَّةِ، أَثْنِيَّاتِيَّة

*Antennaria* (S). *Antennaire, Pied-de-chat, Hspidule* (F). *Cat's-foot, Cat's-ear* (E). *Echterkatzenpfötchen, Chatza-däpli* (D). *Piede di gatto, Zamba di gatto* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. انواعها عديدة معظمها يري وبعضها زراعي تزييني. سبواها زباه. اوراقها شتاقية، نصلها خلى الصفحة السفلى. ازهارها انبوية لا لسن لها. توجعها صفر. رؤسيتها بلون القناب || اعرف انواعها واشهرها الاربية التابعة.

## ١١٤٥٧ - رجلُ القِطِّ الأمريكي

*Antennaria microphylla* (S). *Pied-de-chat microphyllé* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو نحو ٢٠ سم. رواكها قصيرة كاسية النواحي، ساقها كثيفة الزغب اللبد. اوراقها السفلى ضيقة التجميع خلية النصل. رؤسيتها الزهرية كثيرة العدد، نورية التجميع، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١١٤٥٨ - رجلُ القِطِّ الجبلي

*Antennaria alpina* (S). *Pied-de-chat alpestre* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو نحو ١٠ سم. رواكها دقيقة كاسية. اوراقها السفلى اعليجية معلقة تطول نحو ٣ سم. نصلها خلى البشرة. رؤسيتها الزهرية الى الخضار الاامر. قناباتها مديبة الحافة المسنة || ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

## ١١٤٥٩ - رجلُ القِطِّ الشائع

*Antennaria dioica* (S). *Pied-de-chat commun* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو من ١٠ الى ٤٠ سم. فروجها عديدة. ساقها منتصبه كثيفة الزغب اللثني. رواكها مستطيلة كاسية. اوراقها صغيرة تطول نحو ٢ سم. نصلها خلى البشرة. رؤسيتها الزهرية يضاء اللون || ودية او تلبية || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.



رجل القط الشائع



رجل المعزى



## ١١٤٧٦ - رَحَاقِي، مَعْتَرِي

Mellifère, Nectarifère (F). Melliferous (E).  
هو كل نبات من أي فصيلة كان حوت أزهاره رحيقاً  
تجبره النحل || والنباتات الرحاقية عديدة أطولها في  
(نبات رَحَاقِي).

## ١١٤٧٧ - رَحَام

Métrite (F). Metritis (E).  
التهاب الرحم عقب الولادة .

## ١١٤٧٨ - رَحْبَة

Séchoir à fruits (F).  
Drying-room (E).  
هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار ، راجع جبرين .

## ١١٤٧٩ - رَحْبَة

الأرض الواسطة السريعة النبات . ج رحاب .



رجوم ثنائي التجذيع

## ١١٤٨٠ - رَحَة

Elaps (S). Elaps (F).  
جنس حيات خبيثة سامة من فصيلة الرحيات . أنواعها  
المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الاستوائية  
والحارة من أفريقيا إلى الهند وأمريكا وآستراليا || أجسامها  
شبه اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، قليلة الضخامة ، تغطي  
من ١٠٠ إلى ١٤٠ سم. رؤوسها صغيرة ، بيضبة الشوزن.  
أطوارها ملوكة ، مظلمة ، ملوكة . أطوارها سوداء اللون تحرقها  
خطوط بيضاء || أعرف أنواعها الرسة المرجانية Elaps  
corallinus (S). ثوبها إلى الحرة المرجانية السعفاء  
المواج يعلوها أطواق سود .

## ١١٤٨١ - رَحْل

Scénies (F).  
نمت تعريفي يطلق على الجماعات غير المستقرة في مكان  
مين واحد .

## ١١٤٨٢ - رَحْل هو الانخفاض ، الحلب .

## ١١٤٨٣ - رَحْل ، قَتَب

Bât (F). Pack-saddle (E).  
مركب الدواب يختص عادة بالبال والبال والحبر .

## ١١٤٨٤ - رَحِم

Matrice, Uterus (F).  
Womb, Uterus (E).  
جزء من أعضاء التناسل في الحيوانات العليا يدعى عضو  
الحمل يتصل بالهبل والفرج بواسطة قناة الرحم . وهو  
عضلي التركيب يبطن بنشا . غاملي وظفته الاحتفاظ  
بالبيض المخصبة التي تتحول إلى جنين .

## ١١٤٨٥ - رَحْمِيَّات

Hysteriaceae (S).  
Hystéricacées (F). Hystericacées (E).  
فصيلة الفطور الرحيمة . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد  
معظمها من الفطور المجهرية .

## ١١٤٨٦ - رَحَاشَةٌ

Protopterus (S).  
Protoptère (F). Protopterus (E).  
سمكة نهريّة وحيدة الجنس والنوع من مژذوجيات التنفس  
وفصيلة الرحاشيات. موطنها مستنقعات أفريقية الاستوائية ||  
جسمها مستدق التبيط يطول نحو ٧٥ سم. رأسها شبه  
غروطي الشكل . حياها صيرتتان صامختان . زعنفتها  
الظهرية مستطيلة ، قاطبة ، تتصل بالظهرية عن طرف  
الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية ضيقة ، مستطيلة ،  
عذبة الشكل . ثوبها إلى الشبهة السمراد يطولها تميم

## ١١٤٧١ - رَحْيِيَّات

Argiopidae (S).  
Argiopidés (F). Argiopidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . أجناسها وأنواعها  
كبيرة العدد الذي يتجاوز الألف || أعطائها البلاد الحارة  
والمعتدلة الحارة من المالحين القديم والجديد || أجسامها  
متباينة القد منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . جميعها ثنائية  
الرؤيا سداسية المثلثان بمجرى الشياش بقفات حادة  
محبة نحو الداخل || أطوارها مختلفة الألوان والزراكن .  
جميعها ناجمة كبيرة الشع . مكادها كروية كثار الرمان ،  
علوية القوطة ، تحبها بين الحجارة وعلى النباتات الغلة  
اغصانها الشائكة .

## ١١٤٧٢ - رَجِيعٌ ، خَلْف

Regain (F).  
Second crop, New lease (E).  
هو الكلاء الناتج عن الحشة الثانية . وهو الأوراق الناتجة  
عن القروع كما في التبع .

## ١١٤٧٣ - رَجِيلَةٌ ، رَجِيدٌ ، عُنَيْقٌ

Pédicelle (F).  
Pedicel (E).  
هو الزناد الصغير حامل الزمرة . وهو أيضاً الملاقق القرمي  
المركب كما في المتعدد .

## ١١٤٧٤ - رَجُومٌ

Rhaglum (S).  
Rhagie (F). Rhaglum (E).  
جنس حشرات من غمديات الاجنحة وفصيلة القرنيات .  
أنواعها المعروفة سن ١٦ أجناسها متوسطة القد ، أطوارها  
تترواح من ٦١ م . أطوارها مختلفة الألوان يلغفها  
خل دقيق نصير تكثر فيه الشبهة || تسرح في النهار .  
تظهر في أوائل الربيع وتبقى حتى أواسط الصيف . مرتما  
الأعداد الحرجية || يرقاتها صغيرة ، غليظة ، سمراء اللون ،  
تمشي على الجلود اليابسة إن قائمة أو مقطوعة وانصه  
جلود التنوب والثرين والسرور والسنديان والكستناء .

## ١١٤٧٥ - رَجُومٌ ثَنَائِي التَجْدِيع

Rhaglum bifasciatum (S). Rhagie bifascié (F).  
Rhaglum bifasciatum (E).

حشرة خاضعة من فصيلة الرتيلاوات ورتبة غمديات الاجنحة .  
تألف الاجراع والذنايات . غنافسها تتدعى من جميع اجزاء  
النبات . يرقاتها غاشية تركب جلود الأشجار اليابسة  
ويجودها وأغصانها || جسمها متوسط القد يطول من ١٧  
إلى ٢٠ م . ثوبها إلى السمرة الخفيفة تشبه سمرة في الرأس  
والكوكل وأعلى الظهران . غناها مجذتان بخطين من البقع  
الحمر . رأسها شبه مربع الجرم . حياها كيرتان .  
زبانها كيرتان ، منطقتان إلى الوراء . ظهرها مستدير  
المؤخر للاخت . غناها كيرتان الحمل القصير . أرسافها  
رباعية العقل الظاهرة || جبلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة  
المجملنة في أواسط الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف .  
تسرح في النهار . تساهم بعد ظهورها بثلاثة أسابيع . تمتع  
المكن في صدوع الجلود وشقوقها || البرقة عند بلوغها  
الادراك تمام تطول نحو ٣٢ م . جسمها حديي التركيب ،  
مستطال الجرم ، مدام الرؤايب ، حنطي اللون ، اشقر  
المواج ، اسمر الرأس ، مبهر الملب الدقيق || طور  
الأكمال الذي يستمر من ٤٥ إلى ٥٥ يوماً يتنقي في  
التربة ضمن مسلحة من المواد النباتية والعنصرية المجهزة  
بالريال .



رَحَة



رحاشة

Rhinanthus major (S). \* رُخَّاشٌ كَبِيرٌ  
Rhinanthe à grandes fleurs (F). Rattle (E). Grasse klapper (D). Corona di re (I).

نوع من الرخاش السريع النمو يكثر بين الزروع فيؤذيها ويقضيها النداء. أزهاره كبيرة القند صفراء اللون || أبادته واجبة ثم يستعمل أحد العواشب الحشرية .

Hippoglossus (S). \* رُخَّاشٌ ه  
Flétan (F). Halibut (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من المسالوات وفصيلة المفلطحات. أنواعه المعروفة عديدة أعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || جميعها كبيرة القند ، أهليجية الشكل ، دقيقة السهف الصغير . زعانفها الظهرية والبطنية قاطبة تمتد من العنق إلى الذنب . زعانفها الشرجية مقطوعة الأطراف || اعرف أنواعه وأشهرها الرخاشة المنبولة .

\* رُخَّاشَةٌ مَبْدُولَةٌ ه  
Hippoglossus vulgaris (S). Flétan commun, Flétan halibut (F). Common Halibut (E).

سمكة من الرخاش . طولها نحو ٢٠٠ سم. نوبها إلى السرة الخنثية يطولها موج أصفر تشويه بعض الخضره || أعطانها بحار البلاد الباردة والمنسرفة نحو المعتدلة . يوجد بها في البحر المتوسط محصور ببعض المناطق أعصها الممتدة من جبل طارق إلى بحار اليونان والبحر الاسود || لحمها لذيق العلم مرغوب فيه .

١١٥٠٠ - رُخَّامٌ ، مَرْمَرٌ (E). Marble (F). Marbre  
جسم حجري صلب تعريفه الكيافي مركب كربونات الكالسيوم التبلور الوانه عديدة يكثر فيها الأبيض الحليبي . وهو من الأحجار التي استخدمها الانسان في البناء والتحت منذ أقدم العصور .

١١٥٠١ - رُخَّامِيٌّ  
الرخامي والرخامة ضرب من الخلقة غبراء الخضرة لها زهرة بيضاء نقيه وطا عرق أبيض تحفره الحمر بمخارها والبيش كله يأكل ذلك المرق خللاته وطييه (ابن حنيفة) || وقيل ثبت تجلده السامة ، وهي بقلة غبراء تضرب إلى البيضاء وهي حلوة لما اصل أبيض كأنه المنقر ، اذا انترع حلب لبناً (السان) .

١١٥٠٢ - رُخَّامَةٌ ه  
في الاجازة ، أطلمها .

١١٥٠٣ - رُخَّامَةٌ نَقْلٌ ه  
جواز بنقل الكحول أو بعض المستنوعات والغلات .

١١٥٠٤ - رُخَيفٌ ه  
نمت وصفي . القلين خشب رشف لين .

١١٥٠٥ - رُخَيفٌ ه  
الرخف والرخفة : الزبد الرقيق .

١١٥٠٦ - رُخْلٌ ، رُخْلٌ ، رُخْلَةٌ ه  
الانثى من ولد الفان . ج. رخال . Ewe lamb (E).

١١٥٠٧ - رُخَّامٌ ه ، عَقَابٌ رُخَّامٌ ه ، أَخَوْقٌ ه  
Haliaetus leucocephalus (S). Pygargue leucocephale, Aigle à tête blanche (F). White headed eagle (E).  
طائر من النشاط ينتهي إلى عمارة العنقاب وفصيلة الصقريات .

اسود || تعيش في الاسماك حتى الفصح ثم تنفخ في الطي وتتمكن ان تعود المياه فتفسر المستنق || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١١٤٨٧ - رُخَّاشِيَّاتٌ ه  
Protopteridae, Lapidosenridae (S). Protoptéridés, Lapidosenridés (F). Protopteridae, Lepidosenridae (E).

فصيلة اسماك نهرية من مزدوجيات التنفس . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها من اسماك مناطق المناطق الاستوائية والحارة || اعرف اجناسها وأشهرها الرخاشة والذفافة .

١١٤٨٨ - رُخَّاشَةٌ ه  
Cabestan (F). Capstan (E).  
آلة لرفع الاثقال العظيمة .

١١٤٨٩ - رُخَّاشٌ ه  
Meule (F). Millstone (E).  
حجر الطمن . ج. أرخاء ورشي وأرخية . وهي من الوسائل البدائية للمستغلة لطنن الحبوب أو جرشها . تتربك من حجرين مستديرين يرفان بشي الرشي يثبت في وسط الحجر الاسفل منها وقد يدور حوله الحجر العلوي .  
١١٤٩٠ - رُخَّاشٌ ه  
في الاسبانج ، اطلمه .

١١٤٩١ - رُخَّاشِيَّاتٌ ه  
Elapidae (S).

Elapides (F). Elapidae (E).  
فصيلة حيات عييفة من امابيات الاخاديد . أنواعها المعروفة نحو ٧٠ تنفس في فصمة اجناس . أعطانها البلاد الاستوائية والحارة . اجسامها مستطيلة قرنية الشبه بالاختاش . رؤوسها صغيرة شبه بيضيه الشوزن . اقواسها ملونة يكثر فيها التطويق وبعضها يحمل من خطنين الى خمسة خطوط قاطبة || جميع انواعها سامة وبعضها شديد الاذى || اشهر اجناسها واسمها الرسة والبنغاز .

١١٤٩٢ - رُخَّاشٌ ه ، مَقْشَرُ الزَّهْرِ ه  
Nectar  
غصارة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غدد خاصة في الزهر فيجربها النحل .

١١٤٩٣ - رُخٌّ ه  
Aepyornis (S). Rock (F).  
طائر صليب عظيم القند كان في جزائر الهند وانقرض وقد عثر هل بعض رفته في مدغسكر . يقال ان طول الرفة يراوح من ٣٠ الى ٢٢ سم .

١١٤٩٤ - رُخَّامٌ ه  
Vent faible (F). Weak wind (E).  
الريح اللينة التي تدفغ الصاليج .

١١٤٩٥ - رُخَّاشٌ ه  
Rhinanthus (S). Rhinanthé (F).  
جنس نباتات عشبية برية هشة من فصيلة الخنازريات . انواعه قليلة . سوقها منصبة لينة . اوراقها كاملة حاشية متعاقبة . نصلها ستاني الصفحة ، سنن الحافة . أزهارها فردية ، أبليية الارزكاز ، صفراء اللون غالباً .

١١٤٩٦ - رُخَّاشٌ عَرَفُ الدِّيكِ ه  
Rhinanthus crista-galli (S). Rhinante crête-de-coq, Cocrête, Croquette (F). Cock's comb, Rattle grass, Yellow rattle (E). Klapper, Gelberklapperkraut (D). Cauterelle, Pidocchio dei prati (I).

نوع من الرخاش الوددي يكثر بين الزروع فيصيب من النباتات الغصاة لانه يسبق الزرع في ارتشاف العناصر الغذائية . يقضى عليه باستعمال اسد الموشايين .



رشي



رخاش عرف الديك



رخاش كبير



رُخَّامَةٌ مَبْدُولَةٌ



رُخَّامٌ

موطنه العالم بحسب جميع القارات، يكثر في أمريكا. طوله نحو ٨٠ سم. والآنق ٩٠ سم. ثوبه الى السرة السفاد. بطنه منسج بالابيض. رأسه وعنفه وذنبه بيض. منقاره وغالبه صفر || قوته الاسماك والطير والقواضم والاناام كالغيم والماعز وما اشبه.

١١٥٠٨ - رَحْمَة \* شَوْحَة  
Pernopterus (S). Pernoptère, Alimoche, Vautour d'Egypte, Poule des Pharaons (F). Egyptian vulture, Pharaoh's hen (E). طائر من الكولاس وحيد الجنس والنوع ينتمي الى فصيلة الترييات وهو اصغر النور جنة واسمها انتشاراً. طوله نحو ٦٠ سم. وبسطه ١٦٠. ثوبه اغبر ابيض. رأسه ازغب الريش الاصفر يبدو كالاسلم. عنقه اغفر اصفر. منسره اسمر. ريشه وردي اللون تعلو ماجة ريداء. قواديم منقطة سود، مناكبه رصاصية، اباهره طحل. عينه قزوينية || موطنه بلاد حوض البحر المتوسط والبحر الاحمر والمخلج الفارسي. نظامه الحيائي جماعي. اسرابه كثيرة المدن تعيش قرب المدن والساكن وتراقف القوافل. قوته الجيف والقائمة. يصيد القواضم والمصابير عندما يفضه الجوع || يدن عنده في صرور الصرور الناتية. اناته تبيض ٣ فئات تحضنها نحو ٣٠ بيضاً || اما كنية الرخفة فأم جيران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير.

#### ١١٥٠٩ - رَحْمَات، لَيْسَات

Malacozoaires, Mollusques (F). Malacozoa (E). شعبة حيوانات تشمل ذوات الصدفتين والمعدنيات والرأسيات.

#### ١١٥١٠ - رَحْمَاتَان \* شَارِكَة

Phaleris cristatella (S). Starique huppé (F). Parrakeet auklet (E). طائر وحيد الجنس والنوع من عائلة البسات رفضيلة البيريقيات. اعطاه المناطق القطبية الاسيوية والامريكية. يترج في الشتاء نحو الصين وكوريا وكندا. ملجته الحياتي جماعي. جماعته اسراب لا يحمي لها عدد. قوته الحشرات والحمام والنعاصيص والاسماك الصغيرة والقشريات || جسمه صغير القذ يطول نحو ٢٥ سم. منقاده صغير الجرم، احمر اللون، شبه مخروطي الشكل. حلقة عينه عسلية اللون. جناحاه قصيران، ذلفان، لاخفان. ذنبه مخروطي الشكل، شديد التقعر. رصافه ذيقان. ثوبه الملوي الى السرة الموصفة بالاسود تعلوها زركسة بيضاء. ثوبه السفلي الى الريدة الزرقاء المولج. زوره ابيض. رأسه متعرج بقترعة صغيرة من الريش الذيق الناعم. كلمة عينه بيضاء اللون تمتد حتى النكت. رصافه الى السرة الزرقاء || الآنق اميز قدماً من الذكر وتتجمل بنفس الثوب || موته كل نفرة على حضور الماحد او فيها. الآنق تحضن بمنابرة الذكر بيضة واحدة اصغر من بيضة الدجاج. التخم ينسج نحو اربعة اسابيع. الصغير يوم على سطح الميم بعد التفت باسبور.

#### ١١٥١١ - رَحْمَة \*

Ptilonorhynchus violaceus (S). Ptilonorhynchus satiné (F). Ptilonorhynchus violaceus (E).

طائر من فصيلة الرخميات. موطنه استرالية. يألف الادغال والاراجح الكثيفة الاشجار || جسمه متوسط القذ، يطول نحو ٣٠ سم. ثوب الذكر الى الزرقة السوداء المسطاه المولج. جناحاه وذنبه الى السواد الفخمى. حلقة عينه زرقاء. اما اطرافها فاخر. منقاده ازرق اللون، اصفر الملقط. رجلاه الى الحمرة. ظهره الاثنى اخضر اللون.

جناحاه وذنبه الى الصفرة العاقبة. بطنها الى الخضار الاصفر يعلوه قوشيم حلالي الشكل عند اطراف الريش || قوته الطار لا يرتد عنها ابناً كانت. واعصها التين والدرق والمشمش والموز والبرتقال ثم البزور وبيض الحشرات || يدن عنده في الانجار الداسية ويقف بالقرب منه، على بعد بضعة امتار، مسرماً يزينه بمختلف الاشياء الملونة تتوسطه سدة من القصبان المهيوبة تعلوها الاثنى كلما دعت الحاجة الطبيعية الى الكوم || اما الاشياء الملونة التي يزخرف بها المسرح فهي الرياش الجميلة والاصداق الملونة وبيض الحصى وكسر الزجاج ... || الآنق تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وتضع في كل مرة من بيضتين الى ثلاث بيضات ترعها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوماً.

#### ١١٥١٢ - رَحْمَة \* حُرَيْبَة البادية، اطلبه.

#### ١١٥١٣ - رَحْمَاتَان \* Ptilonorhynchidae (S).

Ptilonorhynchidae (F). Ptilonorhynchidae (E).

فصيلة طير من الجوارم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطاها بعض مناطق استرالية وفيهذه الجديدة اجسامها متوسطة القذ، جميلة الالوان المتداخلة. تتميز بالمسارح المزينة والمنزخرفة التي تقيها بالقرب من عشائها. اعرف انواعها واشهرها الرخم.

#### ١١٥١٤ - رَدَّ Rendement (F). Produce (E).

الرذ هو الانتاج أو الربيع. يقال شيمة كثيرة الرذ.

#### ١١٥١٥ - رَدَّ Récusation (F). Challenge (E).

حق ينص عنه القانون وبين اسبابه يمنع احد المتخاصمين اللجوء الى طلب رد القاضي ورد الحكم ورد الخير ورد الشهود.

#### ١١٥١٦ - رَدَّ Restitutio

اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ارتكاب السرقة.

#### ١١٥١٧ - رَدَّ Rédhibition (F).

Annulement of sale (E).

هو نسخ البيع الذي يميزه القانون في حالات خاصة معددة قوامها عين غير يجعل المبيع غير قابل للاستعمال او يحد من استعماله.

#### ١١٥١٨ - رَدَّ الكيش الرذاح، الضم الامالية. ج. ربح.

#### ١١٥١٩ - رَدَّاسَة \* Cynonycteris (S).

Cynonycteris (F).

جنس حيوانات من فصيلة الطوايغيات. انواعها ٩ ثلاثة منها اسبوية وستة افريقية. جميعها ثائرة، متوسطة القذ قصيرة الذنب، سوية اللون، تعيش جماعات صغيرة متفرقة راوح عددها من ١٠ الى ٦٠ || مسرحة بيبه المرعى قابله يطلع نحو ٥٠ كم. اقليمها فصح الارباء ينتمى من اسبى الى افريقية || اشهر انواعها ما ينتج.

#### ١١٥٢٠ - رَدَّاسَة حَنْطِيَّة \* Cynonycteris straminea (S). Cynonycteris palli (F).

رذاسة صغيرة القذ، طوله نحو ١٥ سم. وبسطه ٤٥. ثوبها حنطي اللون، بطنها زاهر الملوي، رأسها وعنقها وظهورها الى السرة. موطنها يمنة من صغار الى الحبيشة والغابون. تألف الاشجار الحرجية. قوتها الطار.



رخة



رخلان



رخم

المثانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . جميع انواعها تسره في المياه العذبة حيث تمكث نحو ١٥ اسبوعاً ثم تعود الى البحر || اشهر انواعها الردانة .

١١٥٢٧ - رَدَّج (F). To grind (E).  
الردج الصخرى بالاحتكاك المتبادل بين قطعتين .

١١٥٢٨ - رَدَّج  
الردج : ما يخرج من بطن المهر او السخلة قبل الأكل .  
مثل القي من الصبي .

١١٥٢٩ - رَدَّخِي  
Marchand ambulant de légumes  
هو البقال المتجول .

١١٥٣٠ - رَدَّغ  
Bourbe (F). Mud (E).  
وحل المناقع والاهوار .

١١٥٣١ - رَدَّف  
Tribu (F). Tribe (E).  
الردف في تصنيف الحيوان يأتي تحت الفصيلة وفوق العارة والجنس .

١١٥٣٢ - رَدَّف، كَفَل، قَطَن  
Croupe (F). Croup, Buttocks (E).  
عجز الدابة وتيرها .

١١٥٣٣ - رَدَّف، ذَكَب  
Deneb  
الردف او الذنب نجم نير من كوكبة الدجاجة . مركزه على الذنب . يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

١١٥٣٤ - رَدْفِيل أَزْرَق النَّعْس \*  
Rhodophyllus lividus (S).  
Rhodophyllus livide (F).  
فطر جحالي شديد الازى وقد يمت من فصيلة الفلاريقيات . يوجد في المراعي الجبلية . يعيش على الدبال . ساقه ضخمة معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون . تكلمه كبيرة القد . قلنسوة الشكل ، حذبة ، لونها الى الزرقاء الفاتحة الى السواد . قطرها نحو ١٢ سم . اطراسها ليلكية اللون .

١١٥٣٥ - رَدَّم  
Terrassement (F).  
Earth work, Embankement (E).  
ما يوضع في المنخفض من تراب وصخور لرفع مستواه .

١١٥٣٦ - رَدَّمِي \*  
Rudéral (F). Ruderal (E).  
نمت تعريفية يطلق على كل نبات يعيش بين الانقاض والردم .

١١٥٣٧ - رَدَّان ، وَدَّان  
Rayonne (F).  
Rayon, Artificial silk (E).  
سند نسيجي يشتق من السيلولوز ، يستعمل استهلاك الحرير ويصنع الحرير النتاني .

١١٥٣٨ - رَدَّان، حَلْ  
Dévidage (F).  
Winding, Reeling off (E).  
هو استخراج خيوط الشرائق أو المرادن وما اشبه .

١١٥٣٩ - رَدَّان  
Ridé (F). Wrinkled (E).  
نمت وصفي يطلق على كل ما هو مضفر ومخدّد من الجلود والتشور والعماء وما شاكلها .

## ١١٥٢١ - رَدَّاسَة صَحْرَاء

Cynonycteris amplexicauda (S). Cynonycteris fauve (F).  
رداسة متوسطة القد ، طولها نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الصخرة . موطنها يمتد من الخليج الفارسي الى الهند والهند الصينية والفلبين || تألف الكهوف القريبة من الشواطئ . مسرهما من الفسق الى القجر . قوتها الثآير والرخويات البحرية .

## ١١٥٢٢ - رَدَّاسَة مَصْرِيَّة

Cynonycteris aegyptiacus (S). Cynonycteris d'Egypte (F).  
رداسة صغيرة القد ، مستطيلة البسة . طولها نحو ١٦ سم وبسطها ١٠٠ ، ثوبها الى الوردية التبرء ، ظهرها اغم من بطنها . جوانبها صفراء المواجه || موطنها مصر وجولها من الحشبة الى سورية . تألف الاشجار والكهوف والبيوت الخربة || قوتها الثآير .

١١٥٢٣ - رَدَاغ \*  
Terrain bourbeux (F).  
Muddy ground (E).  
تربة كثرت فيها نسبة الروغ .

## ١١٥٢٤ - رَدَّالَة السِّنْدِيَّان

Mythimna acetosellae (S).  
Mythimna acetoselle (F). Mythimna acetosellae (E).  
حشرة من فصيلة النسيقات ورثية حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها غاشلة قوتها اوراق السنديان || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٨ م . بطنها نحو ٤٢ م . رأسها صغير الحجم . عيناها كبيرتان . زباناها غليظة . مرفقها مستطيل . جوشها اصفر اللون صتاني المواجه . بطنها الى الصخرة الخطية المواجه || روشناها الاماميان الى الصخرة الخطية يطولها ثلاث بقع عنابية لامتساوية الحجم . روشناها الخلفيان الى الخطي الاكعب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتد المكان على الصفحات السفلى من اتصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٤٠ م . جسمها اسطواني الشكل . مشدود القشار . ثوبها الى الطحلة الرداء يطولها رقعة بيضاء وغط ثبجي اسود وغطان جانبيين اسفرا . ملاتي سكبها الى البواد النحسي . رأسها ورواجها سود . منها الى الطحلة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة ضمن جلاب من التلين .

١١٥٢٥ - رَدَّالَة \*  
Osmerus eperlanus (S).  
Eperlan (F). Smelt, Sparling (E).

سمكة بحرية نهريّة من فصيلة الردانيات . اعطائها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة . تقترب من الشطوط في فصل الربيع وتقتل الاغوار والاثار حيث تسره ثم تعود الى البحر || جسمها شبه اعليجي الشكل يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مخروطي الشكل . فيها واسع الشدق الذي ينتهي خلف مؤخرة العين . زعنفتها الذيلية فاخرة . ظهرها الى الخفسار الامس البحري المواجه ايطلاها وبطنها الى الوردية الفضية || لحمها مأكول ، متوسط الصفت .

١١٥٢٦ - رَدَّالِيَّات \*  
Osmeridae (S).  
Osmeridés (F). Osmeridae (E).

فصيلة اسماك بحرية نهريّة من كلامات الطام مفتوحات



رَدَّالَة السنديان



رَدَّالَة



رَدْفِيل أَزْرَق النَّعْس

## ١١٤٠ - رَدْسَة \*

Rhodanthe (S).  
Rhodanthe (F).

فروعها منتصبه فناء ، أوراقها سنانية ، طولها نحو ٧ سم . وتعرض ٤ ، نصلها جلدي الصفحة ، ثلاثي المروق ، ذات الزام الاخير . ازهارها غمرار اللون . ثمارها الى السواد اللامع || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .



ردسة

١١٤٥ - رَدُولُ الصَّيْنِ (S).  
Coriaria terminalis (F).

جنية معمرة ، رفهة ، صغيرة القذ ، طولها نحو ٧٥ سم . ساقها فروعها فاقناها زيباء اللحاء . أوراقها بيضيه الشكل ، نصلها خاسي المروق ، جامد الشجج ، ذرب الزام الاخير ، مدبب المقصه ، خلي الصفحة السفلي . ازهارها ثنائية صفراء اللون . ثمارها الى الصفرة الزاوية . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١١٤٦ - رَدُولُ الهِنْدِ (S).  
Coriaria nepalensis (F).

جنية سربوتية معمرة ، طولها نحو ثلاثة أمتار . ساقها فروعها فناء . أوراقها بيضيه الشكل . نصلها جامد الصفحة . خاسي المروق ، مدبب المقصه || ازهارها وثمارها حنطية اللون . ازهارها يستمر طوال شهر ايار .



ردول آسي الورق

١١٤٧ - رَدُولُ اليابَانِ \* (S).  
Coriaria japonica (F).

جنية سربوتية معمرة طولها نحو ١٠٠ سم . ساقها فروعها أوراقها اطليجية مستطيلة ذرية . ازهارها وريدية اللون . ثمارها تمر مختلف مشح الاخر الى الازرق ، منه الاوداك ، بالحسرة السواء اللامع || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١١٤٨ - رَدُولِيَّات (S).  
Coriariaceae (F).

فصلية نباتية من ذوات الفلقتين تشمل جنساً واحداً لجميع بعض الانواع البرية والبريانية .

١١٤٩ - رَدِيد (S).  
Reprise (F).

حالة كل نبات بعد غرسه اي رده الى التربة لخاصية دورته الحياتية .



ردول اليابان

١١٥٠ - رَدِيدَة ، اَلثَرْتَرِيَّة (S).

جنس فلور مجهرية من عمار الزحاليات وفضيلة للطحيات . كائناته جلمودية الشكل ، هليية او مجعينة الطرف ، مكوتة من عدة بويوات مستديرة او مرقرة الجوانب ، غليظة الوسط ، مستدقة القطب || انواعها المؤذية عديدة اعرفها ما يتبع .

١١٥١ - رَدِيدَة البَاذَنْجَانِيَّات \* ، رَدِيدَة البَطَاطَا

Alternaria solani, Al. dauci, Macrosporium solani (S). Alternaria des solanées, Taches noires des feuilles de pomme de terre (F). Early blight of potato (E). Dürffleckenkrankheit der kartoffeln (D).

فطر مجهرية يتغلغل على اوراق بعض النباتات الباذنجانية اعصها البطاطا والبندورة || مظهره الخارجي ، على البطاطا ، يقع بكثرة سمراء اللون ، تركب نصل الارق . تبو صغيرة الحجم ثم تنسع فيبلغ قطرها نحو ١٠ سم . تسبب ذبول النصل ثم يياس || وهو على البندورة يقع لا تباينة الشكل والحجم ، سمراء اللون ، ربادية البقع ، عديدة المالحات المتتابعة الشفراء الخثار . قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تركب النصل فتدويه وقد تعيب الثمار عند



رديدة الباذنجانيات

عشة حولية برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات ساقها فروعها تعلق نحو ٣٠ سم . فروعها دقيقة . أوراقها حاشنة ، سنانية النصل ، مستديرة الاذنيات . ازهارها رويدية قطرها نحو ٤ سم . قمرها اصفر اللون ، ثنائياتها وريدية او جبراء || ثمرورها يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

## ١١٤١ - رَدُولَة مَقْصَعَة \*

Reduvius personatus (S). Réduve masqué (F).

حشرة قانصة من فصيلة الردوفيات . جسمها متوسط القذ ، مبشر الحلب ، يطول نحو ١٧ م . رأسها شبه بلوطي الشكل ، متكاثف الحلب . عظمها شديد النشط . عينها صغيرتان . زباناها مستطيلتان ، مهدبان . عتقا انبوي . كسولها معدب القسم الامامي ، مقعر الخلفي . حبيبتها مزوانية صغيرة . ظلوها لا تلت . قوائمها تحبب الانفاذ ، كثيفة الحلب || ثمرها الى البني يطوه مولج يراوح من الحنطى الى الاصمر || مسرهما دجوي . تمحص دم الحشرات واللذباب والحلم . يرقاتها قانصة ، قوتها قوت الحشرة الجملانة .

## ١١٤٢ - رَدُولِيَّات \*

Reduviidae (S).  
Réduviidae (F). Reduviidae, Assassin bugs (E).  
Kaubwanzen (D).

فصلية حشرات نافعة من رتبة مخطلات الاجنحة وطبقة تصفيات الخنق . اسباعها واجناسها واتواعها كثيرة العدد ، تتجاوز الالاف ، منتشرة في معظم اقطار العالم اعصها الاقاليم المنحرفة نحو الحارة || اجسامها صغيرة او متوسطة . رؤوسها صغيرة . اعانها وانسة . اسطها ناشطة مجرة بحما ذرية تهريق منها بعض السموم المفردة . عيونها جانبية ، صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، ثلاثية الفصل . قوائمها ناشطة ، والزوج الامامي عند بعض الاجناس مجهر ، كا في البرصقة ، للاختلاف || جميعها قانصة تقضي على الكثير من الحشرات الفسادة ومنها البعوض والسكيت واللذباب والبق .. مسرهما دجوي يمتد من غروب الشمس الى الفجر .

١١٤٣ - رَدُول ، عِشْبَة الدَّبَاغِيْن (S).  
Redoul (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الردوليات . انواعها ١٠ ساقها فروعها فناء . أوراقها منقطة ، متعاقبة ، سنانية الشكل نصلها جلدي الصفحة ، ثلاثي او خاسي المروق || ازهارها عتقودية التجميع . ازهارها صغيرة القذ عادمة التويج ، عشارية الفصل والاسدية ، خاسية البسات والكرايل المنبسطه النجمية الشكل || جميع اعضائه النباتية من فروع دقيقة واфан وحاء واوراق وازهار تحوي مادة قلوية حمالية تدعى كوريارين (Coriarine) . تستعمل في دغ الحلود الفاغرة الشبية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١١٤٤ - رَدُولُ آسِي الْوَرَق \* ، عِشْبَة الدَّبَاغِيْن الْاَسِيَّة الْوَرَق (S).  
Coriaria myrtifolia (S).

Redoul à feuilles de myrte Corroyère, Herbe aux tanneurs (F). Myrtle leaved tanner's tree, Myrtle leaved sumach (E). Myrtenblattriger gerberstrauch (D). Coriaria a foglie di mirto (I).

جنية سربوتية مبدولة معمرة غزيرة الموارد الدباغية تعلق من ٣٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها فروعها رباعية التضلع ،

في برادات يراوح معدل حرارتها من درجة إلى درجتين فوق الصفر.

Cladode

### ١١٥٥٧- رَدِيَّة

ورقة كاذبة أو شبه ورقة تكون في سوق بعض النباتات كما في السخنرج. ر. دائن.

Radiola (S).

### ١١٥٥٨- رَدِيَّة

Radiole (F). Radiola (E).

جنس نباتات عشبية حولية بريمة من فصيلة الكتكائية. أنواعها المعروفة قليلة العدد منها جبل حوض البحر الأبيض المتوسط || سورها فراء متشعبة. أوراقها متقابلة، شبه بيضية النصال. أزهارها علقي التجميع. أزهارها صفيرة يبيضه اللون || أشهر أنواعها الرديولة الكتكائية (R. linoides). تنويرها صيفي.

Pluie fine (F). Thin rain (E).

### ١١٥٥٩- رَدَاذ

هو المطر الضعيف. قال الاصمعي اغت المطر واضعفه اللط ثم الرذاذ.

Hygrométrie (F). Hygrometry (E).

### ١١٥٦٠- رَزَاكَة

علم يبحث في قياس الرطوبة الجوية.

Balancier (F).

### ١١٥٦١- رَزَان

Balancer, Poisers (E).

الرزان ويعدى رفاض التوازن، عضو دقيق صغير، شبه دبوبي الشكل، ينشب في الحرساء أي في الحلقة الصدرية الثالثة، عند الحشرات من ذوات الجناحين. وهما رزانا أمين وأيسر تستعملها الحشرة في توجيه طيرانها وتسيده.

Hypsométrie (F). Hypsometry (E).

### ١١٥٦٢- رَزَانَة

علم تحديد الارتفاعات.

Atelopodidae (S).

### ١١٥٦٣- رَزَائِيَّات

Atelopodidés (F). Atelopodidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قاذبة من لمة الخديعيات ومرتبة السونيات ورتبة البترارات أي عديمات الذنب || اجنتها وأنواعها عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية. جسمها صغيرة القذ تشبه عصفرة مساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز ثلاثيتها || أشهر اجنتها الرزان والرينودودة والندودوات والكلولة ...

١١٥٦٤- رَزَح، رَزَح، سَمَك، قَطَط

Echalassage, Pisselage (F). Propping (E).

غرز المرازح والسمايك بجانب النباتات لدم سورها أو فروعها.

Rangée d'arbres (F).

### ١١٥٦٥- رَزْدَق

Tidy of trees (E). الصف أو السطر من الأشجار المشرة.

Plantation en lignes (F).

### ١١٥٦٦- رَزْدَقَة

Planting in ranges (F).

هي الزراعة بالسطر ترتكز على الابعاد المتساوية والخطوط المتوازية.

ادراكها فخرح البشرة وتغور في اللب الذي ينحل ويغفن. يكافئ عنه ظهوره اما ينضج الثبات بورود الحمول ١٪ او بتغيره باكسيد الحامض المركز ٤٪.

### ١١٥٥٢- رَدِيَّةُ الْبُرْتَقَالِ \*

Alternaria citri (S). Black rot des oranges (F).

فطر مجهري يصيب البرتقال في مجاره المدركة فيغفن المروق والشرايين الداخلية التي تسبب الحرقاة ثم اميرها وتصلبها إلى أن يقضي عليها الففن من الداخل فتشقق او تمحل وتيس || اغراره زهيدة لا تستوجب العناية لانها لا تتجاوز ٣ او ٤٪.

### ١١٥٥٣- رَدِيَّةُ التَّبَع \*

Alternaria tenuis, Al. longipes (S). Maladie du plant de tabac (F).

فطر مجهري يتطفل على عدة نباتات اغصها التبغ عندما يكون في الشتل || مظهره الخارجي ذبلي يحل بالاوراق والسوق يعقبه ظهور اوحة خلية سمراء اللون تركب السوق والاوراق فتعفن وتتعطفا بمادة حطوية لزجة تقضي عليها وتبينها || يكافئ أولا يظهر البذار قبل استعماله في مواقع كانت موبوءة. والتطهير يكون اما بتنع الفيلور مدة ١٥ دقيقة في نيرات الحامض المحلول ١٪ او بتغيرها بالسلح الزئبق. وبهم من استعمل يكره نباتات القناس بمعدل غرام واحد لكل كيلو زر || ثانيا باقتلاع وحرق الشتلات الموصوبة وتغير او نفض الشتلات الباقية بأحد الترابيز المرتكزة على الحامض او على بعض المواد الكيماوية الدائمة الاستعمال حاليا.

### ١١٥٥٤- رَدِيَّةُ الشَّام \*

Alternaria nigrescens (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الشام فيقضي عليها. مظهره الخارجي يقع فسيحة لا قياسية الشكل تركب الاوراق فتدوب وتقضي على نحو التبت. وقد يصيب الثمار فيرشها يقع خلية رمادية اللون يملؤها موان زيتي تقرح القشور وتعطفا || ينشط كثيرا في المواقع الرطبة الحارة || يكافئ عنه ظهوره باستعمال المركب التالي:

ملفات الحامض	١٠٠٠ غرام
كلس	١٥٠٠ غرام
كلورور الامونيوم	٣٥٠ غرام
ماء	١٠٠٠ لتر

### ١١٥٥٥- رَدِيَّةُ الْقُرْنَفَل \*

Alternaria dianthi (S).

فطر مجهري يتطفل على القرنفل قرب زين ازهاره فيؤذيه. مظهره الخارجي يقع زيتية مستديرة او بيضية الشكل تركب الاوراق والسوق ثم تنتشر فيبلغ قفطها نحو ١٠ م وطولها نحو ١٥ م. تسبب بياس وانصدام البشرة وانفلاق الطبقة الادمية التي ينشأها القفط || يكافئ عنه ظهور الرصم بسائل أكسيكلورور الحامض المحلول ١٪.

### ١١٥٥٦- رَدِيَّةُ الْمَلْفُوف \*

Alternaria oleracea, Al. brassicae (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الملفوف وغيره من النباتات الزراعية كالفجل والملشور والحرقاة والقريل ... مظهره الخارجي يقع صفيرة مستديرة سوداء اللون، حطوية الحالة، سفراء اختار تركب الاوراق البالغة الخارجية فتصلبها ويستمر اذاها على الملفوف المحفوظ || يكافئ باستعمال سائل بورود الحمول ١٪ كما يحسن حفظ الملفوف



رَدِيَّةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدِيَّةُ التَّبَع



رَدِيَّةُ الشَّام



رَدِيَّةُ الْقُرْنَفَل (١)



رَدِيَّةُ الْقُرْنَفَل (٢)



رَدِيَّةُ الْمَلْفُوف



زرد

مدينة بعصها زربني والآخر بري وسبابي . سوقها متعصبة  
مربعة الفلوع . أوراقها متعاقبة قصيرة العنق ، نصلها  
أطليسي الشكل ، بارز المروق ، خلى البيرة . انزاعها  
مكوكلي او نوري التجميع ، هامى الاركنان . انزاعها  
خامسة البتلات ، ألوانها من الاصفر الى الاحمر .

Hydrophile (S). Hydrophil (E). **زَرْخ** ١١٥٧٧  
الزربع واللف للماء واحد . تمت تعريفي يطلق على النباتات  
الشرقة الى الماء وعلى الاشياء التي تمتص الماء .

Rasikal **زَرْيْكَال** ١١٥٧٨  
عاشوب ، يرتكز على كلورات الصودا ، يقضي على  
جميع النباتات الضارة بما فيها النجيليات || يستعمل  
محولاً ٢ ٪ بمعدل ليتر ونصف الليتر لآلتر المربع الواحد .

Digitaria sanguinalis (S). **زَرْيْن** ١١٥٧٩  
Digitaria sanguine (F).

نبات عشبي جنسوري بري معمر من التفليات النجيليات .  
يكثر في الارربة الرطبة والمروية . وهو مبدول في جميع  
البلاد الحارة والمعتدلة . يعتبر من النباتات الضارة الكثيرة  
الاذى .

Base **رَس** ١١٥٨٠  
ج رسس .

Minefal (F). Ore (E). **رَس** ١١٥٨١  
الرس هو المعدن . ج رساس .

**رَسَاحَة ثَنَائِيَة البَقْع** ١١٥٨٢

Rhizophagus bipustulatus (S).  
Rhizophage bipunctué, R. bipustulé (F).  
Rhizophagus bipustulatus (E).

حشرة واسعة رقائصة من فصيلة الرسايحات روية مفدمات  
الاجنحة . تألف الاحراج . غناصها تعيش على سحق  
الازهار وظلمها . يوقاتها تعيش في سراديب الحشرات  
الخامسة ساعية وادها لانتزاسها || جسمها صغير القد  
يعطون من ٣ الى ٤ م . فوها الى السواد الفضي يعطون في  
مؤخر كل عمدة بقعة صغيرة حمراء . رأسها مستطيل الجسم .  
عينها صغيرتان . زياناها صغيران ، صفيا الاطراف .  
ظفرها من مقطوع الطرف اللاصق . ارساغها خامسة العقول  
عند الاناث رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور ||  
ها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الاجنحة في اوائل  
الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف . تسرح في النهار .  
تساقط بعد ظهورها ياسوجين . تمتع المكان تحت القشور  
وبينها || البرقة بعد بلوغها الادراك تمام تطول نحو ٦ م .  
جسمها شبه مدري الشكل ، سداسي الراس ، اثير  
اللون ، اسير الفواصل والراس وطرف الشرع || طود  
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر  
نقق ويطه البرقة ضمن صلبة خاوية انقضاء المركب من  
التفايا الخشبية والمضوية المجوية بالريال .

Rhizophagidae (S). **رَسَائِحَات** ١١٥٨٣  
Rhizophagidae (F). Rhizophagidan (E).

فصيلة حشرات واسعة رقائصة من مفدمات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم  
مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تعيش على الازهار وتحت  
لحاء الاشجار . يوقاتها قانصة تسى وراء البطريشيات ||

١١٥٦٧ - **رَرْخ**

Hygrometricité, Hygroscopicité (F). Hygrometricity, Hygroscopicity (E).

قابلية الجسم الطبيعية لاقبال الرطوبة وهي أيضاً نسبة الرطوبة للغدور استيعابها .

Bottelage, Emballage (F). **رَرْم** ١١٥٦٨  
Tying up in bundles, Packing (E).

هو شد الشيء بعد جمعه وقمه . وهو تغليف الشيء بعد  
سفته بترتيب .

Botte (F). **رَرْمَة، حُمْمَة، وَرْم** ١١٥٦٩  
Bunch, Bundle (E).  
ما حزم من البقل .

**رَرْتَامَة زَرْاعِيَة** ١١٥٧٠  
هي التقويم الزراعي ، اطلبه .

**رَرْتَة** ١١٥٧١  
هي المستنقع الصغير مفيض الماء رقيقه . ج رزان .

Chloridium (S). **رَرْوَان** ١١٥٧٢  
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللطحيات .  
مشبه غزير المادة . جربه الكندية مشعبة . كئائه  
مستطيلة او كروية || انواعه عديدة معظمها روية تعيش  
على الاخشاب اليابسة ومنها طفيلية تركب الارواق . اعرفها  
رزان الموز .

Chloridium musae (S). **رَرْوَان المَوْز** ١١٥٧٣  
فطر مجهرى يركب اوراق الموز فيوش النصل في بادئ  
الامر يبيض البقع الصغيرة المستديرة السمراء اللون ثم  
تتكاثر وتنتشر فتح كامل النصل الذي يذبل وييس .  
يكتاف عن ظهوره باستعمال سائل بورديو المحلول ٨ ٪  
الى ١٠ ٪ .

Rhysodes (S). **رَرْوُد** ١١٥٧٤  
Rhysode (F). Rhysodes (E).

جنس حشرات من مفدمات الاجنحة وفصيلة الرزوديات .  
انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد  
الحارة من المالين القديم والجديد . تعيش في الغابات وفي  
البراري الدفلة . جميعها مقترنة || اجناسها مستطيلة  
الشكل ، عذبة الصفحات العليا ، تطول من ٨ الى ١٢ م .  
رؤوسها صغيرة . عيونها نازرة ، قربونها الاستشعارية  
قلادية مركبة من ١١ فصلة . قوائمها قصيرة . احمادها  
لاشفة ، مخددة ، مقطوعة الاطراف . اولها منبانية  
الالوان تكثر فيها السمرة الكستنية والسمرة الجلوية والسمرة  
الزيتونية .

Rhysodidae (S). **رَرْوُدِيَات** ١١٥٧٥  
Rhysodidae (F). Rhysodidae (E).

فصيلة حشرات من مفدمات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
المعروفة قليلة العدد اصطناعها معظم مناطق البلاد الحارة من  
المالين القديم والجديد || جميع اجناسها مقترنة ، صغيرة  
القد ، ضلعية التأثير ، قانمة الاطواب || اشهر اجناسها  
الرزد .

Rhexia (S). **رَرْخِيَة** ١١٥٧٦  
Rhexie, Quadrette (F). Rhexia, Meadow beauty (E).  
Rhexie, Ankerblume (D). Ressa (I).  
جنس نباتات عشبية وسبئية من فصيلة الميكانيات . انواعه



زرب



زربن



رَسَاحَة ثَنَائِيَة البَقْع

القوم. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة. سرسها اساطم الاغواط والمجاهد || اجسامها شبه اهليلجية الشكل، مبططة الجرم، تطول من ٤٠ الى ٧٠ سم. زعانفها الظهرية والبطنية منفصلة لا تتصل بالذيلية. اثنائها تخفف مع الانواع لكنها لا تخلو من الرقعة || لحومها جيدة الصنف، مستحبة العلم || اشهر انواعها واعرفها الثلاثة التالية :

#### ١١٥٨٩ - رَسَاسَة سَيَّانِيَّة ٥

*Platessa cynoglossus* (S). *Ple cynoglosse* (F).  
*Cynoglossus plaice* (E).

سمكة من الرساف. اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. سرسها اساطم الاغواط || جسمها سثاني الشكل، قريب الشبه بلسان الكلب، يطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الزبد الحطية تملوها رقعة منسوبة التوزيع تتخللها بقع قاتمة || لحمها فاخر الصنف.

#### ١١٥٩٠ - رَسَاسَة شَالِيَّة ٥

*Platessa vulgaris*, *Pleuronectes platessa* (S).  
*Ple franche*, *Carrelet* (F). *Common plaice* (E).

سمكة من الرساف. اعطائها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال. سرسها اساطم الاغواط واللتفاف || جسمها شبه اهليلجي الشكل، مبطط الجرم، يطول نحو ٧٠ سم. عيناها على الصفحة اليمنى. ثوبها في الصفحة اليمنى الى الخضار الحطلي المواج يعلاو بتجميع اسمر وتبيج يرتقالي. صفحاتها اليسرى الى السفلى تراوح من الزبد الفراء الى الحطلي الاخر المواج. وتتميز بصفت من الثوب الصغيرة يمتد من العينين الى الزعنفة الصدرية || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

#### ١١٥٩١ - رَسَاسَة صَغِيرَة الرَّاس ٥

*Platessa microcephala* (S). *Ple microcéphale* (F).  
*Microcephalus plaice* (E).

سمكة من الرساف. اعطائها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. سرسها اساطم الاغواط والمجاهد || جسمها شبه اهليلجي الشوزن، مبطط الجرم، يطول نحو ٤٠ سم. تتميز بصغر الرأس. ثوبها الى الخضار الحطلي الاسمر المواج تملو رقعة بيضاء لانسوية التوزيع || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

#### ١١٥٩٢ - رَسَاسَات ٥

*Attacidae*, *Saturnidae* (S). *Attacidae*, *Saturnidae* (E).  
*Attacidae*, *Saturnidae* (F). *Attacidae*, *Saturnidae* (E).  
فضيلة شحات من سرشفات الابيسنة. اجناسها المعروفة نحو ١٥٠ وانواعها نحو ١٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها كبيرة القد او متوسطة. اثنائها متباينة الالوان الجسدية. قربونها الاستعمارية مبططة مزبوجة عند الذكر، مسنة عند الاناث. ملابسها الفكية قصيرة وبراشفها كذلك. عيونها بسيطة. قوائمها الالمانية عادمة الغالب. ارساغ ذكورها وحيدة المغلة || يرقاتها غاسلة، جرداء القشار، زياء الحصائم المستطيلة الملب. رباط خادراتها شرطي السلك تتدل به.

#### ١١٥٩٣ - رَسَاسَة الْإِحْصَاص ٥

راجع ابر الوشي الليلى. *Grand paon de nuit* (F).

#### ١١٥٩٤ - رَسَاسَة ٥

*Croquis* (F). *First sketch* (E).

هي الرسم الاعادي.

اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل، مستعرضة الرؤوس. قربونها الاستعمارية صغية مركبة من ١١ فصلة. كولها واغدادها مستطيلة. جرامزها نشطة. ارساغها خاسية العقل عند الاناث، رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور || اشهر اجناسها الرساحة.

#### ١١٥٨٤ - رَسَاس ٥

*Rhizostoma* (S).  
*Rhizostome* (F). *Rhizostoma* (E).  
جنس حيوانات بحرية من قراصيات البحر الموسيات وفصيلة الراسيات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها كبيرة القد، قمية التركيب، قلنسوة المظلة الشمفية، عادمة الالوان الحارية. ملافلها الفمية رباعية الازواج، وتدية الشكل، محجمة الاطراف || توم على سطح الماء. اثنائها تراوح بين الابيض والساجي والازرق. اهداب شمفتها شائكة تلهب الجلد ان لاسه. ومنها انواع تغلف برشاش نافط يلدع كشر التار.

اشهر انواعه :

*Rhizostoma cuvieri* (S) رَسَاسَة الْاُطْلَس

*Rhizostoma pulmo* (S) رَسَاسَة الْمُتَوَسِّط

#### ١١٥٨٥ - رَسَاسِيَّات ٥

*Rhizostomidae* (S). *Rhizostomidae* (E).  
فصيلة مدوس من قراصيات البحر. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها الراس.

#### ١١٥٨٦ - رَسَاع ٥

*Heptanchus* (S). *Heptanche* (F). *Heptanchus* (E).  
جنس اسماك بحرية سرلودة مفترسة من فصيلة الجليديات وثية الاشراق || انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها كبيرة القد. قمية الشبه بالقروش. اجسامها وشمية. رؤوسها شبه مخروطية الشكل. افواهها سفلية الارتكاز، متاخرة عن المقاطع. اعكامها الخيشومية فلوچ سباعية الازواج || اشهر انواعها الرعاة السمراء.

#### ١١٥٨٧ - رَسَاعَة سَمَرَة ٥

*Heptanchus cinereus* (S).  
*Heptanche cendré*, *H. gris*, *Cendré*, *Mouge gris*, *Perlon* (F). *Grey Heptanchus* (E).

سمكة بحرية سرلود مفترسة من الرساع. اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تتميز ب١٥٠ اسماك البنية. سرسها الاغواط والباج. اغلافلها شرسة لكنها تبعد عن الانسان || جسمها رشي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم. مسكها متوسط الخشونة، قليل الثوب المبرمة. ثوبها الى الزبد تملو مابة زرقاء مع اقترابه من ثوب الظهور ويغير ويبيض عند البطن. رأسها مخروطي الشكل. لها سفلى الارتكاز. شذفا معدل الانفراج. اسناتها كبيرة، ذرية. عيناها مستديرتان. ناشرتان. شوارها الجنسي يحتل مركز الزعنفة الخشوية || تصاد من اجل مسكها وزيتها واسناتها. لحمها كامن الصنف.

#### ١١٥٨٨ - رَسَاف ٥

*Platessa* (S).  
*Ple* (F). *Plaice* (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من المسالوات وفصيلة جانبيات



رَسَاس



رَسَاعَة سَمَرَة



رَسَاعَة شَالِيَّة



وفصيلة الرسات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار العالم . معظم انواعها يعيش على الصريع والقسم الآخر على الخث الاخر || اصدافها صغيرة لاجسامية الشكل الذي يختلف مع النوع . معظما بعين القواعد ، خماسي الدورة الحلزونية اوسباجها .

#### ١١٦٠١ - رُسْتُمَة الغَاب ٥

*Prostemma guttula* (S). *Prostemma des bois* (F).  
حشرة خاضعة من فصيلة اليبدييات ودية مخلفات الاجنحة . جسمها شبه الالحليبي الشكل يطول نحو ١٢ م . || رأسها صغير ، أزرق اللون . غطها مستدل القد ، طليق . عينها صغيرتان ، ثائذتان . زباناتها دقيقتان ، مستطيلتان . كوسلها أزرق اللون ، خلي الحلب الدقيق . حنجرتها صغيرة ، سوداء . حنجرتها صغيرتان . ظهورها لينة ، أحر اللون تملو رقعة بيضاء وبجرا . يبلها الى اخر السراء المواجه . قوائمها حر ، كثيفة الحلب || تألف الغابات . مرتعها الاشعاب البرية .



رسان البرق

#### ١١٦٠٢ - رُسَيْل ٥

*Aristella* (S). *Aristelle* (F).  
نبات عشبي بري مرموي حولي من التيجليات يكثر بين الزروع وفي الارض الملساء .



رُسَيْل

#### ١١٦٠٣ - رُسْع ٥

*Paturon* (F). *Pastern* (E).  
جزء قائمة الفرس بين الحشوب والأطروء .

#### ١١٦٠٤ - رُسْع ٥

*Tarse* (F). *Tarsus* (E).  
جزء من رجل الطائر والحشرة يقع بين الساق والخاب .

#### ١١٦٠٥ - رُسْكَاس ٥

*Rascasse blanche* (F).  
سمكة بحرية تدعى كورب أحشن ، اطليا .

#### ١١٦٠٦ - رُسْكَاس احمر ٥

*Rascasse rouge* (F).  
سمكة بحرية تدعى جلاخ ردي ، اطليا .

#### ١١٦٠٧ - رُسْكَاس اسمر ٥

*Rascasse brune* (F).  
سمكة بحرية تدعى جلاخ عفري ، اطليا .

#### ١١٦٠٨ - رُسْسل ، هُرمُون ٥

*Hormones*  
مواد عضوية تفرزها بعض اعضاء الجسم الحيواني فتؤثر في سائر الاعضاء التي تنتقل اليها بواسطة الدم || وهي في النباتات مواد عضوية تؤثر في النمو الهولوي والشمري . والرسول هو الحليب ، اطليا .

#### ١١٦٠٩ - رُسْم ٥

*Lever d'un plan* (F).  
وضع غطط الشيء .

#### ١١٦١٠ - رُسْم ٥

*Droit* (F). *Right* (E).  
لفظة تجديدية تطلق بالمالي على الفرائث غير المباشرة او غير المقررة . وهي تستعمل في صيغ عديدة اخصها :

- Droit de licence* رسم الاجازة
- Droit de consommation* رسم الاستهلاك
- Droit de posta* رسم البريد
- Droit de transmission* رسم التحويل
- Droit de transcription* رسم التسجيل
- Droit d'enregistrement* رسم التقييد
- Droit de douane* رسم الجمر



رُسْم

#### ١١٥٩٥ - رُسْكَان ٥ ، اَفْطُور ٥

*Ophirus* (S). *Ophirus* (F). *Ophirus* (E).

جنس اسماك بحرية يوضه من مفتوحات المثانة وفصيلة الرساتيات . انواعها المعروفة خمسة ، اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة منها معظم اقارب البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جميعها انقليسية الشكل ، مستطيلة الجسم المبسط . جلودها عادمة السهف . رؤوسها اسطوانية . اعظامها ذلقة . اشدانها كبيرة . اسنانها كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ، ذرية || اعرف انواعها واشهرها رسان البرق .

#### ١١٥٩٦ - رُسْكَان البرق ٥ ، بَرَكِيل البَحَر ٥

*Ophirus serpens* (S). *Ophirus serpens* (E).

سمكة بحرية يوضه من الرسان . اعطائها البحر الابيض المتوسط . تعيش من اسماك الجاحد والتفاف البيدة الفور || جسمها خفيق مستطيل يبدو كانه ابوي الشكل . طولها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . جلدها ملس البشرة ، عادم السهف . ثوبا ثنائي اللون ، ظهرها وبجانها الى الصفرة المذبة يملوها موج حنطلي ، يبطها الى البياض الغني التني المواجه . رأسها اعرق غضاباً من ظهرها وينتقل بالاسود وهو اسفني الشكل ، ذلق الخطم القرن الحاد . زعنفتها الصدرية صغيرة ، شفافة ، مقدافية الشكل ، وهما زعنفتان يخي ويسري . الزعنفة الظهرية خط شديد السرة ، قليل العرض الذي لا يتجاوز ٥ م . يمتد من اوائل الظهر الى طرف الذنب . يقابله خط مماثل طولاً وعرضاً وغضاباً ، يدعى الزعنفة الشرجية ، يمتد من قاعدة المتق الى طرف الذنب . اما الزعنفتان الحوضية والذيلية فلا وجود لها || جلدها كاهن الصنف قل من يرغب فيه .

#### ١١٥٩٧ - رُسْكَانيات ٥

*Ophirusidae* (S). *Ophirusidae* (F). *Ophirusidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية يوضه من القطعاومات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة عشرة تنحس الى جنسين الرسان والشفيد || اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة . معظما من اسماك اللجاج . مسرهما التفاف البيدة الفور || اجسامها مستطيلة مضغوطة . جلودها مائلة ، عادمة السهف . رؤوسها اسطوانية . اعظامها ذلقة مستطيلة . زعانفها الظهرية والشرجية قليلة العرض تمتد حتى اطراف الذنب . زعانفها الحوضية والذيلية متصلة || لحومها متصلة الصنف او كاهنة قل من يرغب فيها .

#### ١١٥٩٨ - رُسْب ٥

*Sédiment* (F). *Sediment, Deposit* (E).

الرسب عكر السوائل واثقالها عندما تستقر في القاع .

#### ١١٥٩٩ - رُسْة ٥

*Arum arisarum*, *Arisarum vulgare* (S). *Gouet à capuchon* (F). *Friar's cowl* (E). *Kappenzehrwurz*, *Kohlzehrwurx* (D). *Arizazzo*, *Gilico* (I).

نبات عشبي ثريبي مغمر من سبط الرسويات وفصيلة القلقاسيات . يجذته صفولية يفيقه الشكل . اوراقه سنائية ، شرمانه ارسوي الطرف يطول من ٢٠ الى ٥٠ سم .

#### ١١٦٠٠ - رُسْة ٥

*Rissoia* (S). *Rissoire* (F). *Rissoia* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات مدييات الارجل

## ١١٦١٩ - رَسْمِيَّاتٌ ° Rissoiidae (S).

Rissoiidae (F). Rissoiidae (E).  
فصيلة دويبات بحرية من الرخويات مديات الرجل  
أمايات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد  
مبشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها صغيرة القد ، بطيئة ،  
تميش على الثبوت البحرية اغصها الخياشيم || اعرف  
اجناسها واشهرها الرسة .

١١٦٢٠ - رُسَيْسَةٌ ° Epigone (F). Epigone (E).  
الرسيصة سدادة الاجينة عند الطالبان والكليديات .

## ١١٦٢١ - رُسَيْعٌ ° Sipunculus (S). Siponcle (F).

جنس ديدان بحرية من فصيلة الرسيصات . انواعها المعروفة  
عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها شبه اسطوانية  
الشكل تطول من ٨ الى ٢٥ سم . وهي سرحة عادمة السكم  
والمناخس . افواهاها مستطيلة ، مخروطية ، جماحة ||  
اعرف انواعها واشهرها الرسيح الامعظ .

## ١١٦٢٢ - رُسَيْعٌ امْعَظٌ ° Sipunculus nudus (S). Siponcle nu (F).

نوع من الرسيح . يعيش في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة .  
يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . طوله نحو ١٦ سم .  
ثوبه الى الشقعة السوداء الموج .

## ١١٦٢٣ - رُسَيْعِيَّاتٌ ° Sipunculidae (S).

Sipunculidae (F). Sipunculidae (E).  
فصيلة ديدان بحرية من الجفريات . اجناسها وأنواعها  
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اشهر اجناسها الرسيح .

## ١١٦٢٤ - رُسَيْحٌ ° Métatarse (F). Metatarsus (E).

هو في الحشرات فصلة الرسيح الاول .

## ١١٦٢٥ - رُسَيْمَةٌ Esquisse (F).

Sketch, Rough (E).  
الرسيمة الرسم الاعدادي او التخطيط الاعدادي او المسودة .

## ١١٦٢٦ - رَشٌّ - رَشْحٌ Bassinage (F). Sprinkling (E).

هو الاسقاء بالرذاذ كما بالمرشة .

## ١١٦٢٧ - رَشَاءٌ - رَشَاءٌ Faon (F). Fawn (E).

ولد الظبية الذي قد تحرك وشي . ج ارشاء .

## ١١٦٢٨ - رَشَاءٌ Tige rampante des cucurbitacées (F). Creeping stem of cucurbitaceous (E).

حبل اي ساق نباتات الفصيلة القرعية . ج ارشبة . يقال  
ارشبة البطيخ والطين والحنظل .

## ١١٦٢٩ - رَشَاءٌ

الرشاء مجموعة كواكب كثيرة صفار من برج الحوت .  
وهي على صورة السمكة يقال لها بطن الحوت . وفي سرتها  
كوكب نير يدعى عقد الحيطان ينزل القمر آخر ليلة  
من الشهر .

## Droit de tonnage

## Droit de sortie

## Droit d'entrée

## Droit d'octroi

## Droit de timbre

## Droit de qual

## Droit de garantie

## Droit de navigation

## Dro' ad valorem

## Droit gradué

## Droit progressif

## Droit fixe

## Droit de passeport

## Droit au comptant

## Droit constaté

## Droit proportionnel

## Droit de circulation

## Droit de mutation

## رسم الحمولة

## رسم الخروج

## رسم الدخول

## رسم الدخولية

## رسم الدفعة

## رسم الرصيف

## رسم الضمان

## رسم الملاحة

## رسم بحسب السعر

## رسم تدريجي

## رسم تصاعدي

## رسم ثابت

## رسم جواز السفر

## رسم فوري

## رسم محقق

## رسم نسبي

## رسم نقل البضائع

## رسم نقل الملكية



رسمتور تدريجي

## ١١٦١١ - رَسْمُوتُ ° Erismatura (S).

## Erismatura (F). Erismatura (E).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الطيئات . انواعه  
المعروفة ستة . جميعها مستطيلة الجسم ، مخروطية الذنب  
المعتدل الحجم ، قصيرة العنق والمناقذ المستدير الطرف .  
شكلها بين الفاق والمغاس . اثوابها متباينة الالوان المزخرفة  
والبهججة || اعرف انواعها واشهرها الرسمتور التدريجي .

## ١١٦١٢ - رَسْمُوتُ ثَدْرَجِيٌّ ° Erismatura leucocephala (S).

## Erismatura leucocephala (F). Erismatura leucocephala (E).

## C. cuivré (F). Pintail duck (E).

نوع من الرسمتور . اصطناع تمتد من اواسط القارة الاسيوية  
الى اطراف اروية الجنوبية والشرقية يحوي بحيراتنا وانهارها  
كل سنة في ذهابه وايابه للمصيف والمشي || جسمه كبير  
القد . ثوبه الى الصهبة الصفراء المزعجة بالاسود والاشقر  
والاخير . راسه معتدل الحجم ، ابيض اللون تملوه بقعة  
سوداء . مناقده حنطلي اللون ، اسود القاعدة . ريشه الى  
الصفار الزيتي || الاثني تبيض من ٨ الى ١٠ ريشات  
تحضنها نحو اربعة اسابيع بينها الذكر يؤن لها الغذاء .

## ١١٦١٣ - رَسْمَلَةٌ ° هي التائيل ، راجعه .

## ١١٦١٤ - رَسُوٌ ° هو الأرطى ، راجعها .

## ١١٦١٥ - رَسُوِيٌّ °

## Sédimentaire (F). Sedimentary (E).

نمت تعريفي يطلق على ما هو مركب من رسوب .

## ١١٦١٦ - رَسُوِيَّةٌ ° Stoicisme (F). Stoicism (E).

الرسيونية او فلسفة زينون ، مذهب فلسفي يقول بشبث  
الجنان وبشدّة الخلق والعزم .

## ١١٦١٧ - رَسُوِلُ القَيْثِ ° هو الزرقاق ، اطلبه .

## ١١٦١٨ - رَسْمِيَّاتٌ Arées (F).

سيط من فصيلة القلقاسيات ، اشهر اجناسه الرسة .



رسيح امعظ

وَصَادَ

1١٦٦٢ - رَصِيفٌ، وَحَاف Banc (F).

ج ارضفة ووصف . Bench, Layer bed (E).

1١٦٦٣ - رَصِين

هو الحبار من القرد المقدسة ، اطلبه .

1١٦٦٤ - رَصِينَات Semnophthecidae (S).

Semnophthécidés (F). Semnophthecidae (E).

هي الحباريات فصيلة قرد من سفليات النخريين تشمل أربعة اجناس: الحبار والحوبر والزريك والقطروب .

1١٦٦٥ - رَصَنٌ، كَدَه Talure (F). Graze (E).

عوارض آلية تحل بالأبحار في هياكلها الخشبية تقسب عشب اللحاء وتسميه .

1١٦٦٦ - رَضَاء Consentement (F). Consent (E).

هو احزاب المرء عن قبوله الارتباط مع غيره بمقتد قانوني ملوماً واختياراً || وهو ايضاً احزاب المرء عن الموافقة على عمل الغير سواء كانت هذه الموافقة متطوعاً بها ام مسكوتاً عنها .

1١٦٦٧ - رُضَاب قلع الثلج والبرد .

1١٦٦٨ - رَضَاع، رُضَاع Allaitement (F).

Nursing, Suckling (E).  
التغذية بالحليب من الولادة الى الفطام .

1١٦٦٩ - رَضَاعَة Biberon (F). Bottle (E).

قنينة او جهاز خاص عديد الزلات وضع لارضاع اولاد الحيوانات عند تدر الرضاع الطبيعي .

1١٦٧٠ - رَضَاعَة البَقَر هي أم الحيات ، اطلبها .

1١٦٧١ - رُضَامٌ، مُنَارَةٌ، عِمَارَةٌ، فُتَاحٌ، زُرْبَعَة

Emblavement, Emblavure (F). Wheat-sowing (E).  
هو الحقل الذي كرب وسمد وبذر وأثير أي دفن بذره .

1١٦٧٢ - رُضَامَةٌ \* Acronychia (S).

Acronychie (F).

جنس شجيرات وجنيات برية وحرجية من فصيلة السذابيات. انواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها طلي . مهدها يمتد الى الهند الى ماليزية وأستراليا || سوقها فراء . اوراقها متناوبة ، معتقة ، شبه بيضبة الشكل ، جلدية النصال . ازهارها غرية ، قصيرة التويجات و رباعية التركيب . مبيضها رباعي الفصوص . ثمارها صغيرة ، جلدية السؤدق ، لا تفكك .

أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

1١٦٧٣ - رُضَامَةٌ رَائِشِيَّةٌ

Acronychia resinosa (S). Acronychie résineuse (F).

مهدها الهند حيث يستعملون جنودها دلوكاً في معالجة داء المفاصل .

1١٦٧٤ - رُضَامَةٌ عَطْرَةٌ

Acronychia odorata (S). Acronychie odorante (F).

مهدها الكوششين حيث يستعملون براعمها كإدام .

1١٦٥٢ - رُضَاصِيَّةٌ، حَمِيصِيَّةُ الأَسْنَان

Plumbago (S). Plombagine, Dentelaire (F). Leadwort (E).

جنس نباتات عشبية ليفية برية طيبة من فصيلة الرصاصيات. انواعها عديدة تألفت الشطوط البحرية . سوقها فراء . اوراقها متناوبة ملغمية صغيرة القد . ازهارها رصاصية اللون . تويجها وسيد القنالة والقلم الخيطي . يتلها خماسية اللق . اسديتها وحاتها ومصاديع كمارها خماسية التركيب . اشهر انواعها واعرفها ما يلي .

1١٦٥٣ - رُضَاصِيَّةٌ أُرُوبِيَّةٌ \*

Plumbago europaea (S). Dentelaire d'Europe, Malherbe (F). Toothwort, European leadwort (E). Europäische bleiwurz (D). Dentellaria, Lappoline (J).

بجلة معمرة ، تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . فرودها مفصلة ، اوراقها معتقة ، اذنية . نصلها جامد النسيج ، مسن الحافة ، عابق الخضار . ازهارها مستعرضة لونها الى البنفسجي . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

1١٦٥٤ - رُضَاصِيَّةُ الرَّاسِ

Plumbago capensis (S). Dentelaire du Cap (F).

بجلة معمرة تملو من المتر الى المترين . ساقها ليفية سريعة حشيشة اللحاء . فرودها منتصب . اوراقها ملغمية ، نصلها حشوي الصفحة السفلى . ازهارها صغيرة القد لونها الى الزرق الباهتة || ازهارها يستمر في الصيف والخريف .

1١٦٥٥ - رُضَاصِيَّةُ زَرْقَاء

Plumbago caerulea (S). Dentelaire bleue (F). Blue leadwort (E).

بجلة معمرة ، تملو نحو المتر . فرودها منتطفة . اوراقها ضيقة ، لثة . ازهارها غدية ، لثة ، كثيفة التجميع ، زرقاء اللون || ازهارها صيفي .

1١٦٥٦ - رُضَاصِيَّةٌ صَغِيرَةٌ الزَّهْر

Plumbago micrantha (S). Dentelaire à petites fleurs (F).

عشبة حولية تملو نحو ٦٠ سم . مهدها سيري . تزود لقرين . ازهارها ارجوانية صغيرة القد || ازهارها صيفي .

1١٦٥٧ - رُضَدٌ جَوِّيٌّ

Observations météorologiques (F). Meteorological observations (E).

الرصد الجوي هو ضبط العوامل الجوية المختلفة أهمها الحرارة ، والضغط ، ونسبة الرطوبة وريتها ، وقياس المطر ، واتجاه الرياح وسرعتها ، وندة الانحاس والسدوم الخ .

1١٦٥٨ - رُضَعٌ

Larves des abeilles (F).

Larva of bees (E).  
هو التحل في طوره البرقي الذي يمتد من نف المي الى نهاية الترق .

1١٦٥٩ - رُضَعٌ

الرضع هو سداد الطائر (عن كراع) ويقال راصع الطائر انتاء : ساندعا (التاج) || والرضع هو البق ، اطلبه .

1١٦٦٠ - رُضَنٌ نبات طلي يدعى الحلدرية ، راجمها .

1١٦٦١ - رُضِيدٌ

Solde (F).

Balance (between debit and credit) (E).  
هو ما بقي من دين بعد حسم المبالغ المدفوعة .



رصاصية اوروبية



رضامة

مستقلة الاطراف. ازهارها عثكولي التجميع بحجم الفروع.  
ازهارها حدية ، يبيض اللون ، قرمزية الاطراف ||  
تنويرها خريفي .

### ١١٦٨٢ - رُضَع

رضع التواة : كمرها . والرضيع هو النوى المروض .

### ١١٦٨٣ - رُضَع

الرضع شجر ثمره الايل . الواحدة رضة (السان) .

١١٦٨٤ - رُضَعَةٌ \* ، دَاغِصَةٌ  
Rotule (F).  
Patella (E).

العظم المدور المتحرك في رأس الركبة . ج. رصف ورضفات.

١١٦٨٥ - رُضَمٌ ، كَرْبٌ ، زَرْعٌ  
Emblaver (F).  
To sow with wheat etc. (E).

حراث التربة وسمدها وبذرها .

١١٦٨٦ - رُضَمَةٌ  
Pierre non taillée (F).  
Unparted stone (E).

هي الحجر المستخرج من القلح قبل تقطيعه . وهي الدبشة  
الصالحة للبناء . ج. رضم ورضم .

١١٦٨٧ - رُطَّاسٌ \*  
Aramus (S).  
Courlan, Courliri (F). Courlan (E).

جنس طير من طول الساق وفضيلة التفليات. انواعه  
المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها  
متوسطة القد ريشة القوم ضلعية المناقيد الجالسة المستطيلة .  
اوقها متراكبة اللون التي تراوح من الاصهب السناي  
الى الخنثي الاسمر يطولها تشريح زيتوني واسود . عينها  
حر الاحداق . مناقيد الى الصفار الاخضر المواج .  
اراسها جؤوية || قوتها الحشرات والمصاير الصغيرة  
ويبيضها وبزور النباتات النجيلية .

١١٦٨٨ - رُطَامٌ  
Constipation  
هو الإمساك عارض سببه اختلال في الجهاز الهضمي .

١١٦٨٩ - رُطَامَةٌ \* ، لُفَّةٌ سَوْدَاءُ \*  
Centropus niger (S). Centrophe nêgre (F).  
Centropus niger (E).

سمكة بحرية يبيض من الاستقراريات شائكات الزعانف .  
اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق  
البحر الاطلسي || جسمها وشي الشكل يطول من ٣٠ الى  
٦٠ سم . حراشها صغيرة معينة . ثوبها الى الخضار  
الالمن الزيتي المواج ، يعقب وتشتد سمته في الظهر وتقل  
في البطن . رأسها مستدل الجرم ، مستنقش الارتكاز ،  
قصير الخطم المستدير . عينها كبيرتان جاحظتان . زعنفتها  
الظهرية مستطيلة قاطبة محدبة . زعنفتها الشرجية مستطيلة  
قليلة العرض . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها مأكول يراوح  
بين الجيد والوسط .

١١٦٩٠ - رُطَبٌ  
Dattes mûres (F).  
Mature dates (E).

نضج البسر قبل ان يتمر . الواحدة رطبة . ج. أرطاب  
ورطاب .

### ١١٦٩١ - رُطَبَةٌ

هي القصة وهي نفل المروج . اطلها .



رضبة



رضفة



رُطَّاسٌ



رُطَامَةٌ

### ١١٦٩٥ - رُضَامَةٌ غَارِيَّةُ الْوَرَقِ \*

Acronychia laurifolia (S).  
Acronychie à feuilles de laurier (F).

مهدا جايا . لحاء جذوعها مرة المذاق ، حامزة ، تستعمل  
في معالجة الاسهال والجفاف .

١١٦٩٦ - رُضَعِبَةٌ \*  
Echeveria (S).  
Echeverie (F). Echeveria (E).

جنس نبات عشبية لحية معمرة من فصيلة الخلدات .  
اوراقها ضمية التجميع تتوسطها الشاريخ الزهرية . ازهارها  
خاسية البتلات النافذة الاكثاف || تزور الحشرات ضمن  
البوت وفي الخلف .  
انواعها المعروفة متوسطة العدد ، اشهرها التالية :

١١٦٩٧ - رُضَعِبَةٌ بَهِيَّةٌ \*  
Echeveria fulgens (S).  
Echeverie éclatante (F).

نوع من الرضبة . مهدا بعض اقاليم امريكا الوسطى  
والكسيك . شراخها يرتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها  
ضمية التجميع تطول نحو ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم .  
نصالها بحرية الخضار ، متواجبة الحمار . ازهارها عثكولي  
التجميع . ازهارها صفر القواعد وازرار الاول ، مرجانية  
لامعة في البقي || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى  
نيسان .

١١٦٩٨ - رُضَعِبَةٌ جَبَّارَةٌ \*  
Echeveria gigantea (S). Echeverie géante (F).

نوع من الرضبة . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع نحو  
٢٠٠ سم . اوراقها سنائية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم .  
وتعرض من ١٢ الى ١٥ سم . نصالها بحرية الخضار ،  
خلية البثرة . ازهارها عقودي التجميع . ازهارها عاجية  
اللون مرقوشة بالاحمر || تنويرها خريفي .

١١٦٩٩ - رُضَعِبَةٌ حَالِدَةٌ \*  
Echeveria secunda (S). Echeverie unilatérale (F).

نوع من الرضبة . مهدا امريكا الجنوبية . شراخها يرتفع  
نحو ٣٠ سم . اوراقها اسطوانية الشكل تطول نحو ٤ سم .  
وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها عقودي التجميع ، حائد  
الارتكاز ، مقوس الشكل . ازهارها مستدلة الحجم ، لونها  
الى الصفرة الحمراء المواج || تنويرها يستمر من نيسان  
الى ايار .

١١٦٩٠ - رُضَعِبَةٌ قَرْمِزِيَّةٌ \*  
Echeveria coccinea (S). Echeverie écarlate (F).

نوع من الرضبة . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع من  
٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها سواطية الشكل ، خلية النصل ،  
ضمية التجميع ، تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٣ سم .  
ازهارها عقودي . بتلات ازهارها قرمزية اللون من الخارج ،  
صفراء اللون من الداخل ، قطرها نحو ٢ سم . || تنويرها  
صيفي .

١١٦٩١ - رُضَعِبَةٌ مُحَدَّبَةٌ الْأَزْهَارِ \*  
Echeveria gibbiflora (S).  
Echeverie à fleurs gibbeuses (F).

نوع من الرضبة . مهدا بعض مناطق المكسيك . شراخها  
يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها تطول من ١٥ الى  
٢٥ سم . وتعرض من ٧ الى ١٥ سم . نصالها بحرية الخضار ،

الزاهي. ازهارها عتقوي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٢ - رَطِيَّةٌ مُبَجَّجَةٌ ٥

*Gasteria maculata* (S). *Gastérie tachetée* (F).  
نوع من الرطية. ساقها قصيرة ترتفع من ١٢ الى ١٧ سم. اوراقها لحمية، مشققة، منتصبية، تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. نصلها محووب الصفرة العليا، بنفسجي اللون يعلو تبيج ابيض. ازهارها عتقوي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها مرجانية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٣ - رَطِيَّةٌ مُشَاكِلَةٌ ٥

*Gasteria verrucosa* (S). *Gastérie verruqueuse* (F).  
نوع من الرطية. ساقها مقرة. اوراقها لحمية ثنائية الصف. تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٥ سم. نصلها مثالي البشرة على الصفحتين العليا والسفلى. لون الاوراق الى الخضار القاتم والتأليل الى البياض الغابر. ازهارها عتقوي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارها بيض الانتشاب والزمام الاول والثاني، وريدة الزمام الثالث، خضر الزمام الرابع. قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٤ - رَعَادٌ ٥ هو الجاربي الاروية، اطلبها.

**١١٧٠٥ - رَعَادَات**  
*Tropedidae* (S). *Torpédidés, Torpédinidés* (F). *Torpédidae* (E).  
فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق، اجناسها واطواعها عديدة اشهرها الرعادة.

**١١٧٠٦ - رَعَادَةٌ \***  
*Torpedo* (S). *Torpille* (F). *Torpedo* (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعادات، اواطواعها عديدة تكثر في بحار البلاد الحارة جميعها مكهرية. اذا مسها الانسان خذرت يده وعضده حتى يرتعد مدام السلك حياً.

#### ١١٧٠٧ - رَعَادَةُ التِيل ٥ هي فترة التيل، اطلبها.

**١١٧٠٨ - رَعَادَةٌ مَبْدُولَةٌ \***  
*Torpedo marmorata* (S). *Torpille commune, T. marbrée* (F). *Cramp-fish, Numb-fish* (E).  
سكة بحرية سرلود مقترنة من فصيلة الرعادات ورتبة الاشلاق. اصطلح البحر الابيض المتوسط وبعض اقاليم المحيط الاطلسي وبحر الشمال. تعتبر من اسماك الجبال.

مسرحتها اساطم الكثاف. تتميز بجهاز عضلي خاص يتألف من الرأس من الجانبين والوراء مركب من مئات الموترات المسددة الزوايا والاضلاع تعمل كنواجم كهربائية يحيط تقريفاً بياض المتر وفوقها نحو المئة في الثانية. اذا مسها الانسان تخدر وارتمد || جسمها قريب الشبه بالشبب بالشففتين، يطول نحو ١٠٠ سم. مسكها مائل للقتار. ثوبها الملوي الى الخشن الاسمر يعلو موج وردي عند الذكر وخشعة بفتح مستديرة زرقاء اللون، يبيض الطوق. بفتح الاثني بحرية اللون، غراء الطوق، فما سفل الاركان. قدتها متعلد الانفراج. اسنانها متتابعة الصفوف البنية. نيناها تقتران جانبيين. عيناها صغيرتان، سطحيان. زعانفها الظهرية اثنتان

**١١٦٩٢ - رَطَلٌ ٥**  
*Soupeser* (F). *To weigh in one's hand* (E).  
رفع الشيء بيده تقديراً لوزنه.

**١١٦٩٣ - رَطَلٌ ٥**  
وردة من الموزاين القديمة قدرها اثنتا عشرة اوقية. وهو بالنسبة الى الموزاين المثرية، المستصلحة حالياً في معظم البلاد العربية، يساوي ٢٥٠٠ غ.

**١١٦٩٤ - رُطُوبَةٌ ٥**  
*Humidité* (F). *Humidity* (E).  
حالة كل جسم او شيء رطب يحوي بعض الماء.

**١١٦٩٥ - رُطُوبَةٌ نِسْبِيَّةٌ ٥**  
*Humidité relative* (F). *Relative humidity* (E).

**١١٦٩٦ - رُطُوبَةٌ نَوْعِيَّةٌ ٥**  
*Humidité spécifique* (F). *Specific humidity* (E).

**١١٦٩٧ - رَطِيَّةٌ ٥**  
*Gasteria* (S). *Gastérie* (F). *Gasteria* (E).

جنس نباتات لحمية معمرة صغيرة القد من فصيلة الزنبقيات. منها بعض مناطق افريقية الجنوبية. سوقها صغيرة او جعدة او منتدبة. اوراقها لحمية، قرصية مشققة. ازهارها متباعدة الالوان || تزود لثزين ضمن البيوت وفي الحدائق التي لا تحصى البرد. تغرب في الارربة المتوسطة الانساج الوافرة النامسر الفذائية من عضوية ومعدنية. اواطواع كثيرة العدد اشهرها التالية :

**١١٦٩٨ - رَطِيَّةٌ أُنَيْقَةٌ ٥**  
*Gasteria pulchra* (S). *Gastérie gracieuse* (F).

نوع من الرطية. ساقها مورقة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها لحمية، ماسلة، مطلقة الزوايا، تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. لونها الى الخضار اللامس يعلو تبيج ابيض واجر. ازهارها عتقوي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها شتوي.

**١١٦٩٩ - رَطِيَّةٌ سَوْدَاةٌ ٥**  
*Gasteria nigricans* (S). *Gastérie noirâtre* (F).

نوع من الرطية. ساقها جعدة. اوراقها لحمية مشققة، شكلها مثل شكل اللسان تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الخضار اللامس السابق تملو رقة بيضاء. ازهارها عتقوي التجميع. زنادها يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها الى الحمرة الخفيفة السوداء الموج || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٠ - رَطِيَّةٌ كَطَرَةٌ ٥

*Gasteria carinata* (S). *Gastérie carénée* (F).  
نوع من الرطية. ساقها مقرة. اوراقها مشققة لبدة. نصلها لحمية، محرسة الشكل، مثلثة الاصلع الكظرة، تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتملو بعض التصلب الدقيقة. لونها الى الخضار اللامس المنقط بالابيض. ازهارها عتقوي متعلد الانسحاب، زناده يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حمراء اللون خرية الموج || تنويرها شتوي.

**١١٧٠١ - رَطِيَّةٌ لَامِعَةٌ ٥**  
*Gasteria nitida* (S). *Gastérie luisante* (F).

نوع من الرطية. ساقها مقرة. قدتها مشققة تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. صفحاتها العليا مقعرة ماسلة. صفحاتها السفلى مخددة. لونها الى الخضار



رَطِيَّةٌ كَطَرَةٌ



رَعَادَةٌ



رَعَادَةٌ مَبْدُولَةٌ

## ١١٧١٣ - رُعَاشَات

Odonata (S), Odonates (F), Rucashat (D).

رقة حشرات من الرعاشيات . اجسامها مستطيلة . رؤوسها كبيرة . عيونها مركبة بارزة . قرونها الاستنشاقية قصيرة ودقيقة . اجنحتها غشائية شبكية . جرابها دقيقة . فصائلها وابنائها وانواعها عديدة تقسم الى مرتين : الرعاشات الكبيرة والرعاشات الصغيرة .

## ١١٧١٤ - رُعَاشَات صَغِيرَة

Zygoptera (S), Zygoptères, Demoiselles (F), Zygoptera, Damselflies (E), Gleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرعاشات اجسامها نحيلة مستطيلة . حورياتها تتنفس بخياشيم دقيقة مركزها في مؤخر البطن || اشهر فصائلها التبعيات .

## ١١٧١٥ - رُعَاشَات كَبِيرَة

Anisoptera (S), Anisoptères, Libellules (F), Anisoptera, Dragonflies (E), Ungleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرعاشات تتميز باجسامها المستطيلة ورؤوسها الكبيرة المستعرضة . تتنفس بخياشيم دقيقة مركزها جدار المستقيم الداخلي || اشهر فصائلها البيسويات والسرمانيات .

## ١١٧١٦ - رُعَاشَة النِيل

في فترة النيل ، اطلبها .

## ١١٧١٧ - رُعَاف

Epistaxis, Saignement de nez (F), Epistaxis, Bleeding at the nose (E).

هو الأنف الاثني أي خروج الدم من الأنف . اسبابه عديدة اخصها التهاب المني وضربة الشمس .

## ١١٧١٨ - رُعَام، سَكَوَة، رُعَال

Morve (F), Snot, Glanders (E).

مرض مدم يصيب ذوات الحافر وقد ينتقل الى الانسان فيكون قتالاً له .

## ١١٧١٩ - رُعَامَة \*، رُعَامِي، شَجَرَة المسَافِر

Ravenala (S), Ravenal, Ravenala, Urania, Arbre du voyageur (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الموزيات . تشبه الموز والتخل مما . مهدا مدسكرو وما حولها من جزر المحيط الهادي . جلدها منتصب . اوراقها هالية ، مروحية الارتفاع ، تقطع من ٣ الى ٤ امتار وتعرض نحو المشرق . ازهارها عتقودي التجميع . ازهارها بيضاء . ثمارها كدابر مبيكة القشور تغلف عدة زور بيضية الشكل غنية بالمواد الشفوية المأكولة بعد طحنها ويطبخها . قشورها صناعية يستخرج منها دهن نباتي لا يابس به || اما سبب تسميتها بشجرة المسافر فيعود الى اذياتها اوراقها الخاصة التي تحفظ الماء زلالاً بارداً يروي عطش المسافرين .

## ١١٧٢٠ - رُعْبَال

Anémomètre (F), Anemometer (E).

جهاز قياس سرعة الريح وصفها .

## ١١٧٢١ - رُعْبَل

هو الزعفران ، اطلب .

## ١١٧٢٢ - رُعْبَلَة

الرعبلة : ريع لا تدرى مهيا لعدم استقرارها .

## ١١٧٢٣ - رُعْث

زهر الزمان البري . واحدة رعة .

زعتها الذيلية مجذافية الشكل . ثوارها الجني يتركز بين الزعتين الحوضيتين || مسكها جيد الصنف ، شائع الانتشار الصناعي . لحمها بين المتوسط والكائن ، قل من يربغ فيه .

## ١١٧٢٠ - رُعَاس

Stomias (S), Stomias (F), Stomias (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعاشيات . انواعه المعروفة حتى الآن خمسة ، اربعة منها مسرهما المحيط الاطلسي والهادي ونوع واحد يقطن في البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك التناف والبياج التي لا تقترب من سطح الماء ابداً || اجسامها مستطيلة الشكل مضغوطة كالانقليس . رؤوسها عظيمة . غاطمها فلسة . اشدائها كبيرة فافرة . اسنانها متباعدة ، مستطيلة ، حبيطة ، حادة . تحمل في فكوكها السفلى عذبة او علبات متفارة الاشكال . زعانفها الظهرية والشرجية طرية الارتفاع متعاقبة . زعانفها الاخرى متباعدة الاشكال والاسهام . حراشفها سداسية او خماسية الاضلع || اؤلها قائم يكثر فيها الكسني الجفوي الموج والرماسي الارزق الموج والاخضر الالامس الاسود الموج || تتميز بما تحمله من تحول مضطربة مبرمة على كامل سطح الجسم وفي اماكن مينة اغصها الصفحة السفلى من الفك واليلن والذنب || اعرف انواعه واشهرها الرعامة الالسية .

## ١١٧١٠ - رُعَاسَة أَصْلِيَة \*

Stomias boa (S), Stomias boa (F), Stomias boa (E).

نوع من الرعاس . سمكة بحرية بيوض . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك الجنية . مسرهما التفاف التي يراوح عمقها بين ٢٥ و ١٠٠ م . || جسمها قريب الشبه بالانقليس ، بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . ثوبها الى الرعاسي الارزق الموج تبقب زرقته عند ثبح الظهور وتفت وتتحول الى شبة في البطن . رأسها قلاب . مستطيل الشكل . فمها الضخم . فيها واسع الشفة الكبير . اسنانها متباعدة ، حبيطة ، ذرية . فكها السفلي يحمل عذبة سوطية الشكل . عيناها كيرتان ، علويتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، بيعة عن الرأس ، قريبة من الذنب . زعنفتها الذيلية مزوانية الشكل || جهازها الضوئي يتألف من بعض العول المبرجة على سطح الجسم ومن صف من الثمول الصغيرة المتسارية الابداء يطوق سطح السفلى من الجسم بحافة الفك || لحمها متوسط الصنف ، كثير المادة الزرقية .

## ١١٧١١ - رُعَاسِيَّات

Stomiidae (S), Stomiatidés (F), Stomiidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المائة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك الاغواط والبياج . اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتلة الحرارة || اجسامها قريبة الشبه باجسام الانقليس . رؤوسها قلاية ، عظيمة ، فلسة ، متباعدة الاشكال . اشدائها كبيرة . اسنانها متباعدة ، مقوسة ، حادة الاطراف . اؤلها تراوح من الردة الرعاسية الموج الى الردة الكسنية تتخللها اجزاء مضطربة مبرمة على كامل سطح الجسم .

## ١١٧١٢ - رُعَاش

Tremblade, Tremblante (F), Quivering, Trembling (E).

مرض عصبي او ميكروبي يصيب البقان .



رعاة أصليّة



رعاة

اريجوانية يقطعها خط ابيض . كانوا وما زالوا يستعملون جذاميرها في بعض المستحضرات الطبية .

١١٧٣٨ - رَعْنُوس \* Nosodendron (S).

Nosodendron (F). Nosodendron (E).

جنس حشرات من فصيلة الرعنوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٤ الى ٧ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشوز ، مستطيلة الاخطام . عيونها صغيرة . تأثيرها وملابسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها قصيرة وعريضة . اغماؤها لاحقة تملؤها حزم من الحلب الدقيق الاصفر نظامي الخطوط القاطلة . قوائمها شبيطة . اثوابها وسيدة اللون ابيض يكثر فيها الاسود والكستني || تألف الحراج الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة الصديدية التي تترشح من جروح السوق والاغصان . يرقاتها دامة .

١١٧٣٩ - رَعْنُوسِيَّات \* Nosodendridae (S).

Nosodendridae (F). Nosodendridae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٨ م . رؤوسها مستعرضة القعن ، قليلة البروز . عيونها صغيرة . تأثيرها وبلاستها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها قصيرة وعريضة . اغماؤها لاحقة تملؤها حزم من الحلب ، نظامية الصفوف ، صفراء اللون . قوائمها شبيطة . اسرارها خماسية المقل || تألف الغابات والحراج الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة النباتية التي تترشح من جروح الاغصان والسوق وعلى المواد المنحلة . يرقاتها دامة || اشهر اجناسها الرعنوس .

١١٧٤٠ - رَعْنُوف Pluies fines (F). Drizzle (E).

الامطار الخفاف .

١١٧٤١ - رَعْنِي ، رَعْنِي ، سَم ، سَم ، سَمَجَ Paire (F).

To graze, To feed, To tend (E).

اخرج الماشية وسرحها لتأكل .

١١٧٤٢ - رَعْنِي الإِبْنِي \* Echinops sphaerocephalus (S).

Echinops commune (F). Globe thistle (E). Riesen-

kugeldistel, Kugeldistel (D). Echinops commune,

Cardo pallirola (I).

ون اسمها مرعاويلا شائعة ، شكل الجبال الشائع ، ستاني .

نبات عشبي بري ممصر من فصيلة المركبات الانبوبية

الزهر . يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه واوراقه

غدية لزجة . اوراقه عريضة اللق قليلة الشوك . رؤوساته

الزهرية بكورة ، قطرها من ٤ الى ٨ سم . لونها الى الزرق

الباهتة .

١١٧٤٣ - رَعْنِي الحَمَام Verbena (S).

Vervaine (F). Vervain (E).

جنس نباتات برية ورزينية من فصيلة الساجيات . انواعها

كثيرة العدد . سوقها مضلمة ، عشبية او خشبية . اوراقها

مقابلة ، كاملة او مفترسة ، لاهلة ، حاسنة او عميقة واذينية .

ازهارها سنبل او نوري التجميع ، ازهارها صغيرة القد ،

عديدة الالوان ، عطرية العرف || اعرف واشهر انواعها

الترزينية ما يتبع .

١١٧٤٤ - رَعْنَة Caroncule (F). Caruncle (E).

زائدة لحية تكون على رأس او عتق او مقار بعض

الطيور كما في البليك الحيشي . ج رعاث .

١١٧٤٥ - رَعْنُون Barbillon (F).

Little barbel, Wattle (E).

زائدة لحية مسرفة تشبه الزنفة تكون تحت شدة البليك ،

وما رعننوتان .

١١٧٤٦ - رَعْرَاع Pulicaria (S). Pulicaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها

المعروفة نحو ٢٠ جميعها نباتات عشبية حولية وعولة ،

اوراقها لسنة ، حاسنة ، متعاقبة . ازهارها رؤوسية صفراء

اللؤل . اشهرها ريراع ايوب

١١٧٤٧ - رَعْرَاع أَيُوب \* Pulicaria dysenterica (S).

Pulicaire dysentérique, Herbe de St Roch, Inule des prés (F). Common fleabane (E).

Grosses flöhkraut (D). Pollicaria svedese,

Inula pratense (I).

نوع من الريراع البري مشهور بمقاومة البلية . يصلح

فساد المعدة ويقضي على الزحار .

١١٧٤٨ - رَعْرَاج \* Temed النبات النائي \* واعتني به .

١١٧٤٩ - رَعْرَاق Secouer (F). To shake (E).

رض الريرع الشجرة : حركها .

١١٧٥٠ - رَعْل Abeille mâle (F).

Masculine bee, Drone (E).

هو ذكر النحل ، ويدعى اليمخور .

١١٧٥١ - رَعْل Troupeau de solipèdes (F).

Sollped drove (E).

الرعل ج ارجال هو القطيع من الخيل والحمر الوحشية .

١١٧٥٢ - رَعْل Bourgeonner, Débourrer (F).

To bud (E).

رعل الشجر والكرم : خرجت رعلته اي براعه وزيماته .

١١٧٥٣ - رَعْلَة Broutille (F).

Sprigs, Small-wood (E).

الطرف الغض النامي من الكمية . ج رعل . والرعلة هي نخلة

القل وقيل التامة .

١١٧٥٤ - رَعْلُول \* هو الطرخون ، اطليه .

١١٧٥٥ - رَعْم Graisse (F). Grease (E).

الرم هو الشمع .

١١٧٥٦ - رَعْن ، رَعْنَة \* Insolation (F).

Insolation, Sun-stroke (E).

عارض يصيب الحيوان وهو ضرب من الاحتقان الدماغي

سببه تأثير الشمس في ججمة الحيوان .

١١٧٥٧ - رَعْنَة \* ، سَقَنْدَرٌ كَبِير Danaë laurus (S).

Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian

greet laurel (E). Echtes mänsteraubchen (D). Pugni-

topo a grappolo (I).

جنية برية ورزينية تطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . رقائقها

مستطيلة . ازهارها عقدونية التجميع خضراء اللون . ثمارها



ريراع ايوب



رعلته



رعنوس



رني الابل



## ١١٧٤٤ - رعي الحَمَام الأَرْبُوسِي

*Verbena erinoides* (S). *Vervaine-erinus* (F).  
عشبة حولية ، تملو نحو ١٥ سم . ساقها فراء . فروصها  
أفقية الانتشاب . نجيل . أوراقها ثلاثية التفريش ، نصلها  
خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها صغيرة اللقد لا حار  
مهدب لها . لوها إلى الزرقة الزاهية || أزهارها يستمر  
من تموز إلى آب .

## ١١٧٤٥ - رعي الحَمَام الأَمْرِيكي

*Verbena bonariensis* (S). *Vervaine de Buenos-Aires* (F).  
عشبة معمرة ، تملو من ٥٠ إلى ١٢٠ سم . ساقها منتصب  
زغبية . أوراقها لائفة . نصلها غشن الملمس على صفحتيه .  
أزهارها مستطيلة زياء التويج ، لوها إلى الزرقة الباهة .  
أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

## ١١٧٤٦ - رعي الحَمَام الطُّوقْرُونِي

*Verbena teuroides* (S). *Vervaine germandrée* (F).  
عشبة معمرة ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فراء . فروصها  
مفردة الانتشاب ، أفاقية . أوراقها قصيرة اللق اذنية .  
نصلها مستطيل الشكل ، ذلق البقصة ، مسن الحافة ،  
غشن المروق ، خلي الصفحة السفلى . أزهارها يفيش  
ثم تنصرف إلى البودي . عرفها ليلي || أزهارها صبي .

## ١١٧٤٧ - رعي الحَمَام الكَبِيرِي

*Verbena sulfurea* (S). *Vervaine jaune-soufre* (F).  
عشبة حولية ، تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فراء . فروصها  
ضيقة الانتشاب . أوراقها قدية التفريش خلية النصل ،  
ملطفة الاطراف . أزهارها خلية التويج ، كبريتية اللون .  
أزهارها صبي .

## ١١٧٤٨ - رعي الحَمَام الكَنْدِي

*Verbena canadensis* (S). *Vervaine du Canada* (F).  
عشبة حولية ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فراء . أوراقها  
مستعرضة مفرصة طول من ٣ إلى ٥ سم . أزهارها قصيرة  
مستعرضة ، قليلة البرق الليلي ، لوها يختلف مع فروصها  
فيها الأزرق والبنفسجي والأرجواني || أزهارها يستمر  
من تموز إلى آب .

١١٧٤٩ - رعي الحَمَام المخْزَنِي ، بَارِسْتَارُون ،  
حَشِيشَةُ الأَنْجَاع

*Verbena officinalis* (S). *Vervaine officinale*, *Herbe sacrée* (F). *Vervain*, *Holy-herb*, *Pigeon's-grass* (E).  
*Echtes elsenkraut* (D). *Verbena officinale*, *Colombaria* (I).

عشبة معمرة ، تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . ساقها فراء .  
فروصها منتصب . أوراقها اهلجية مفرصة . نصلها أظف  
الصفحة السفلى . أزهارها صغيرة اللقد ودية اللون يشوها  
مواج اخضر . وفي من الاعشاب الكثيرة المنافع المسحية .  
يستخرج منها بالتطهير مطور فائقة الصنف مزينة  
الاستعمال || كانت ولا تزال تستعمل لدو البول ولزيادة  
القوة الجنسية || أزهارها صبي .

## ١١٧٥٠ - رعي الحَمَام الحُطَطِي

*Verbena venosa* (S). *Vervaine veinée* (F).  
عشبة معمرة ، تملو نحو ٤٥ سم . ساقها منتصب زياء  
اللحاء . أوراقها لائفة نصف حاشية . نصلها غشن  
الصفحة العليا ، اللس السفلى خلي المروق . أزهارها  
فولحة العرف لوها إلى الليلي الأزرق || أزهارها يستمر  
من حزيران إلى آب .

## ١١٧٥١ - رعي

*Endophyllum*  
جنس فلور مجهرية من فصيلة العريشيات . انواعه قليلة  
تنتقل على بعض النباتات فتؤذيها || اشهر انواعه الثلاثة  
التالية .

## ١١٧٥٢ - رعي القَرِيْبُون

*Endophyllum euphorbiae-silvaticae* (S).  
نوع من الرعي يركب النواحي حيث تنتقل رافعة مشالعه وتمنع  
النبات عمن الاضرار . ينم عن وجوده رائحة عطرية ذكية  
وتقلص في خضار الورق . اما ذماتها فتركب الأوراق  
على صفحتها السفلى || يكالغ بحركات التحاس عند  
ظهور عوارض الوم .

## ١١٧٥٣ - رعي التَّادُون

*Endophyllum valerianae* (S).  
فطر قليل الانتشار يتطفل على السورق والاوراق ليؤذيها  
وعمن الاضرار || يكالغ باستعمال احد مركبات التحاس  
نفسها على الاوراق عند ظهور عوارض الوم .

## ١١٧٥٤ - رعي حَيِّ العَالَم

*Endophyllum semperivivi* (S).  
نوع من الرعي يركب لحاء الجلعن فيمنقلها بيثوره  
الكروية الصغيرة البرتقالية اللون ثم يقرصها ويصطبها  
وقد يسبب يباسها وموتها || يكالغ بقتلح النباتات  
المصابة ويتطهر التربة .

## ١١٧٥٥ - رعي

*Endophyllaceae* (S).  
*Endophyllacées* (F). *Endophyllaceae* (E).  
فصيلة فلور مجهرية من رتبة العنابيات تتميز بمشالها  
المضاضرة المتتامة فمن نصات بعضها السقلان . لاس  
بويافتها دعائي الشكل التيدي الانفصال || اجتسها  
الاقتصادية قليلة . اعرفها الرعي .

## ١١٧٥٦ - رعي

*Odonaptera* (S).  
*Odonapteres* (F). *Odonaptera* (E).  
ملقة ششرات قارضة مجنسة مستطيلة الاجسام . رؤوسها  
كبيرة اللقد ، عيونها بارزة . فروصها الاستعمارية شديدة  
القصر . رؤسها مستطيلة ، غشائية ، كثيرة المروق  
الشبكة . اثولها عديدة الالوان || فصائلها واجسامها  
وانواعها كثيرة المعدد تنضم إلى ريتين : البراشات والجلجلات  
ومن فصائلها المشهورة : النجيات واليسوسيات .

## ١١٧٥٧ - رعي

*Bleëment* (F). *Bleëting* (E).  
صوت ذوات الخف .

## ١١٧٥٨ - رعي

*Procellaria* (S).  
*Pétrel* (F). *Pétrel* (E).  
جنس طيور مائية من كفيات القدم وفصيلة الرفرافيات .  
انواعه المرفوقة حمة جميعها متوسطة اللقد نشطة تراقب  
البحار في سفراء عدة ايام لاتقاط بقايا الملوخ || اجسامها  
تطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم . اجتسها مستطيلة ذلقة  
الاطراف . اذنها قصيرة . مناديلها ضلعية ، متوسطة  
اللقد ، لمثولية الصفحة العليا ، مخددة السفلى ، محببة  
الناسر الدرية . غنايتها وحيدة اللون . اريافها كاهية .  
شثرة اصابعها كاملة تمتد حتى الخالب || قوتها القشرية  
ويشت الحيتان والاسماك . سرعها بجار البلاد الحارة والباردة .  
توم على الماء وتحوم فوقه ولا تقرب البر الا في زمن السفاد



رعي الحام الطوقريوني



رعي الحام الكندي



رعي الحام الخنزري



رغاة

**١١٧٦٦ - رَعَاةُ جُرْمِيَنَّا \***  
Epinephel  
Jurtina, Maniola jurtina (S). Epinéphèle  
Jurtine, Myrtill (F). Epinephel Jurtina (E).  
حشرة من فصيلة الهاميات ورقية حرشفيات الاجنحة .  
موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا . فراشها جارية  
قوتها مغر الاضرار . سرقتها خاضعة قوتها عصفت التجليات ||  
جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م . بسطها تراوح من  
٤ الى ٥٠ م . رأسها صغير الحجم . عينها كيرتبان .  
زباناها صوفيان . جوشها كسني اللون صناعي الموج عند  
الانثى ، اسمره عند الذكر . بطنها لبد الخمل القصير  
يتحمل بثوب الجوش عند الشقين . ورأسها كسنية ،  
سمره الموج عند الذكر ، حنطية عند الانثى ، الزوج  
الامامي عند الذكر مخضب بنقطة بيضاء المركز حنطية  
الجوانب || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في  
ايار . تسرح في النهار تماثل بعد ظهورها بشرة اسابع  
وتتمتع الممكن لطخا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق ||  
السرقة تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، مائل  
القشار . ثوبا الى الرعدة الصفراء الموج يملوها ثلاثة خطوط  
منها خط ثوبي وخطان جانبيان جميعا الى الخضار العابق .  
رأسها اسود . شرجها مجهز بزايدة صغيرة مفلوكة . مدنها  
ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو  
ثلاثة اسابيع ينتهي في التربة بين الجلالة ونحتها .

**١١٧٦٧ - رَعَام**  
Terre sablonneuse (F).  
Sandy soil (E).  
هو التراب الكثير الرمل .  
**١١٧٦٨ - رَعَامِي**  
Trachée-artère (F).  
Windpipe (E).  
هي قسبة الرئة .  
**١١٧٦٩ - رَعَانَة \***  
Prémontion (F).  
Premonition (E).  
الرغانة احساس يستيقظ العمل ويظهر به .

**١١٧٧٠ - رَعَالِب**  
Desiderata

**١١٧٧١ - رَعَالِيَّات**  
Procellariidae (S).  
Procellariidés (F). Procellariidae (E).  
فصيلة طيور مائية من كفيات القدم مستطيلات الاجنح .  
اجناسها وانواعها قليلة العدد ، اسطها معظم بجار العالم .  
لا تقترب من اليابسة الا في زمن الكوم والترقيم والفضاء ||  
اجسامها كبيرة ، شديدة القسط . تتميز بانجسها  
المستطيلة ، اللافحة ، الذرية . مناقبها ضليعة ، رافعة  
الاذكك العليا ، مخبئة المناسر . خناباتها انبوبية الشكل .  
اقدامها خالية من الاصابع الخلفية الا في بعض الاجناس  
المجهزة بزوائد قرنية شديدة الصغر || اجناسها خمسة :  
الرغاة والقطرس والجسم ويلم العالم والتدروم .

**١١٧٧٢ - رَعَاة**  
Artère mammaire (F).  
Mammary artery (E).  
عرق غليظ ينتهي في الفصع يدر اللبن .

**١١٧٧٣ - رَعُلْ**  
هو زمن لحام السنايل في الزرع . او عندما يجاوز سنبل  
الزرع الاحلام .

**١١٧٧٤ - رَعُلْ**  
Ansérine (F). Goose-foot (E).  
الرغل هو الاثنية ، نبات بري طيب . ج ا رغال .

والخضن . اناثها تحضن بيضة واحدة نحو خمسة اسابيع .  
الذكور تزين الغذاء .  
اعرف انواعه :

**١١٧٥٩ - رَعَاةُ الْحِكْلِيد ، فُلْنَار**  
Procellaria glacialis (S). Pétrel glaciel, Fulmar (F).

**١١٧٦٠ - رَعَاةُ الصُّطْب**  
Procellaria capensis (S).  
Pétrel du Cap (F).

**١١٧٦١ - رَعَاةُ الْهَنْد ، حَالِيَت**  
Procellaria hasitata (S). Pétrel haste (F).

**١١٧٦٢ - رَعَاب ، رَعَات**  
Perméable (F).  
Permeable (E).  
ارض رغب تأخذ الماء الكثير ولا تسيل الا من مطر كثير .

**١١٧٦٣ - رَعَابَة ، رَعْب**  
Perméabilité (F).  
Permeability (E).  
صفة الارض الرغب وهي قابلية نفوذ السوائل والغازات  
في التربة وفي غيرها من الاجسام .

**١١٧٦٤ - رَعَّاس \***  
Eretes (S).  
Erète (F). Eretes (E).

جنس حشرات مائية قانصة من عديدات الاجنح وفصيلة  
المكركليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع  
مناطق العالم واستثناء الاصاوغ الباردة . تعيش في البحيرات  
والمناقع والاهوار ويجاري الماء القليلة الانسياب . قوتها كل  
ما تيسر لها من مواد عضوية حية كانت او ميتة ||  
اجسامها متوسطة القد ، اهليجية الشكل ، متدلة  
الاجنح ، مجاذبة الجرازم الخلفية ، محجمة الامامية  
عند الذكور || يرقاتها مائية قانصة مؤذية .لا تمف عن  
سره السمك .

**١١٧٦٥ - رَعَاةُ تَيْثُون \***  
Epinephel tithonus, Maniola tithonus (S).  
Epinéphèle tithon, Tithon (F). Epinephel  
tithonus (E).

حشرة من فصيلة الهاميات ورقية حرشفيات الاجنحة .  
موطنها يمتد جميع المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط  
الى اوروبا . فراشها جارية قوتها مغر الاضرار . سرقتها  
خاضعة قوتها عصفت التجليات || جسمها متوسط القد  
يطول نحو ١٥ م . بسطها نحو ٤٠ م . رأسها صغير الحجم .  
عينها كيرتبان . زباناها صوفيان مستطيلان . مرشفها  
دقيق الحجم . جوشها كسني اللون عند الذكر ، حنطية  
عند الانثى . بطنها لبد الخمل يتحمل بثوب الجوش عند  
الشقين . ورأسها ، عند الشقين ، الى الشقرة يملوها  
تبقيح حنطي وتنتبط اسود وتبيض اسمر وتمشج اطحل ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في حزيران . تسرح  
في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو عشرة اسابيع وتمتع  
الممكن لطخا على الصفحات السفلى من نصال العصف ||  
السرقة عند بلوغها الكمال الجسودي تطول نحو ٣٠ م .  
جسمها اسطواني ، مائل القشار . ثوبا الى الكهبة  
الخضراء يملوها خمسة خطوط عناية منها خط ثوبي . رأسها  
جويي اللون . شرجها مجهز بزايدة مفلوكة الى ثلثين ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في  
التربة تحت الجلالة ضمن غلاف عضوي المادة .



رَعَاةُ تَيْثُون



رَعَاةُ جَرْتِنَا

## ١١٧٨١ - رُغَيْسَة \*

Rhyssa (S).

Rhyssa (F). Rhyssa (E).



رغل

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المخصصة للإشرابات الحشرات وفصيلة النسيات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع أقطار العالم . أجسامها دقيقة مستطيلة . أطوالها الكاملة ، من الرأس إلى طرف المرز ، تراوح من ٨ إلى ١٦ سم . ألوانها متباينة الألوان تكثر فيها الشبهة الخضبة بالأسفر . تتميز باستطاعة الأجسام والزباني والقوائم والممرزات . ممرزاتها شبيهة بفتح الفك والحنجب تعتبر من الحشرات المفيدة لأنها تمتص المكن في بطون يرقات الحشرات الخاشبة تقتضي عليها .

## ١١٧٨٢ - رُغَيْسَة ٤ ، ميزودرم

Mésoderme (F).

Mesoderm (E).

الرغيلة في علم النبات الغلات النشائي الذي يلحف الجباب وتلحفه القشرة . وهي في علم الحيوان (الزولوجية) الأنشاء الاوسط بين البشريتين الخارجية والداخلية .

## ١١٧٨٣ - رُقَاجَة سَمَرَاء \*

Apotomus latigena (S). Apotome brun (F).

Apotomus latigena (E).



رغيف أنثى

حشرة قاصنة من فصيلة الرقاجيات ورتبة غدييات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع الرغيلة التي لا تخلو من العشب . خنافسها تعيش على الحمول والحشرات الدنيا والديدان الفتية . يرقاتها تعيش في اول معبدا على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتراسه من الحشرات والحولام . جسمها صغير اللد يطول من ٥ الى ٦ سم . قوتها إلى السمرة الذهبية السفماء . رأسها صغير الجرم ، مستدق الخطم . زباناها دقيقان ، مستطيلان . عينها صغيرتان . ظهرانها ثنائي التخديف القندي القاطب . ارسافها خاسية النعل . الاثني اصفر قفداً من الذكر واهيت ثوباً من وقصر زبانا . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار وتبيت في الليل إلى البرقة عند ادراكها انام تطول نحو ١٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، تني اللون ، اسمر الحيد ، اغبر المذب ، اسود الرأس والشرح . طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط حزيران .



رغية

## ١١٧٨٤ - رُقَاجِيَّات \*

Apotomidae (S).

Apotomidae (F). Apotomidae (E).

فصيلة حشرات قاصنة نائفة من رتبة غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . جميعها صغيرة اللد قلما يتجاوز طول الواحد منها ١٠ سم . رؤوسها اسطوانية الجرم ، مستطيلة الزباني الشعارية . الفصّل . كواسلها كاسية الشكل . اجسامها خلية القشّار . الحامداها ثمانية الاغاديد القاطبة المتنازلة . تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسى بسرعة وشرقة وتطير بخفة . قوتها ما تيسر لها من الحولام والحشرات الدنيا والديدان . اشهر اجناسها الرقاجة .

## ١١٧٨٥ - رُقَادَة الرفافة هي غشب السقف .



رُقَاجَة سمراء

## ١١٧٨٦ - رُقَادَة

Comprese (F). Comprese (E).

هي الصمبية المظهرية البديدة الطروق التي تقسم بها الجرج .

## ١١٧٧٥ - رُغُل \* ، قِرْمُونِيَّة \*

Vernonia (S).

Vernonie (F). Vernonia (E).

جنس نباتات عشبية جذمورية طيبة معمرة من فصيلة المركبات معقودة التبريف على اسم اليوناني فزون . أنواعها المعروفة عديدة . اصطناعها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . سوتها فراء حليابية المعصرة تركز على جذابير غليظة . اوراقها متعاقبة صغيرة ضيقة التصل الجالدة . ازهارها فردية ، طرية الانكاز ، يعلب فيها اللون الاسوداني . يزورها خصر ، مزوانية الشكل ، غلدة ، سمراء . جلورها دافئة . للحس ، رقيقة ومراودة للبرد . اوراقها وزهارها تستعمل استعمال الشاي .

## ١١٧٧٦ - رُغْلَة

Agneau, Chevreau (F).

Lamb, Small goat (E).

صغير النجبة او العز لا يزال يرغل امه .

## ١١٧٧٧ - رُغْنَة \*

Erg (F). Erg (E).

الرغنة اسم يطلق على كل منطقة صحرارية تتشاه الكيان المتحركة . اما المناطق الصخرية المرتفعة النجاد فتسمى حادة .

## ١١٧٧٨ - رُغْنِيَّيق \* ، ضَحَامَة \*

Rhagonycha (S). Rhagonyque (F).

جنس حشرات من فصيلة الذراحيات ورتبة غدييات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصطناعها الشرق الاوسط واروبة . جميعها مستطيلة الشكل ، صغيرة اللد . أطوالها تراوح من ٧ الى ١٨ سم . ألوانها مختلفة الألوان يكثر فيها الاسفر والالتهب الخضر على الازرق او الالاسد . تسرح في النهار . يرقاتها في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . ممرزها الانزاع . يرقاتها تبارية مقترسة تقضي على معظم الاساريع وتتبعها بنشاط .

## ١١٧٧٩ - رُغْنِيَّيق أَشْفَح \*

Rhagonycha fulva (S). Rhagonyche roux,

Rhagonyche roux (F). Rhagonycha fulva (E).

حشرة واشعة غاضلة من فصيلة الذراحيات ورتبة غدييات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها الانزاع واغصها الانزاع البرية . خنافسها تعيش على بتلات الانزاع وريسيها . يرقاتها تعيش على المواد المضوية وعلى ما تقتصره من الحشرات الدنيا . جسمها صغير اللد يطول من ٧ الى ١٠ سم . ثوبا إلى النشقة الصفراء يقيم عند اطراف الظهران . رأسها صغير الجرم . زباناها خيطيان . عينها صغيرتان . ظهرانها لا يلبف كامل البطن . بطنها اسفر اللون ، مقطوم الطرف . ارسافها خاسية النعل . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواسط تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بيلة اسابيع . تمتع المكن تحت التلع والحجارة والجلاشة . البرقة عند بلوغها الاذلال انام تطول نحو ١٨ سم . جسمها مبطل الجرم ، اسمر اللون ، حنلي المراج ، سداسي الزواجب السمر ، مستغلط الرأس الجوزي ، ضليح التأثير ، مدبب الطرف . طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٤ يوماً ينتهي في التربة .

## ١١٧٨٠ - رُغْوَة السَّحَر

Magnésite (F). Magnesite (E).

هي سيليكات المغنيزيوم الطبيعي يستعمل في عدة صناعات دقيقة .

## ١١٧٨٨ - رَقْلَانِيَّات ° Melanconiales

مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويعات تتميز بكتلتهاا  
الناشئة في السرفولة . فيها مخضون الجوانب يكتنفه جول  
دقيق قصير || اجناسها عديدة تجمعها فصيلة واحدة  
تدعى الرقليات .

## ١١٧٨٩ - رَقْلَة °، مَلَنْكُونِيْس Melanconis

جنس فطور مجهرية من الرقليات يتميز ببوئه الشفاف  
الثنائي الخلية || له نوع واحد مهم الاقتصاد الزراعي  
يُدعى رَقْلَة الكسنة .

## ١١٨٠٠ - رَقْلَة الْكَسْنَة °، مَلَنْكُونِيْس مودوليا Melanconis modonia, M. pernicios, Fusilcoccum perniciosum, Coryneum monodum, C. perniciosum, C. kunzei castanae (S).

فطر مجهري يصيب اغصان الكسنة فيؤذيها ويسبب  
يأسها || مظهره الخارجي بقع منخفضة مسطحة مدببة  
الراس والعقب بارزة التركيب لحاء الاغصان ختمت  
الحلايا وتشل الاوعية وتعرقل سير النسج وتبدله ، وقد تقضي  
عليه عندما تطلق الفصن فتفشل الاوراق وتنتهي الاثمار  
والانثاد والفصن || يكافح بقطع وحرق الاغصان المصابة  
ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

## ١١٨٠١ - رَقْلِيَّات ° Melanconidiaceae (S).

Melanconidiaceae, Mélanconidiacées (F). Melanconidiaceae, Melanconidiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من الرقليات ورتبة الزويعات تتميز  
بوتية مجنحة جلوية تقوم عل جولها احسان غليظة طبقة .  
بوغها غروطي او اسطواني او عيطي الشكل ثنائي الخلية ،  
شعبي الوتيرة المتفرعة || اجناسها المؤدية ١٦ البستلوزيه ،  
البوليسبيوره ، الرقعة ، البستلوم ، البستوميكة ، السبجة ،  
السيليسبيوره ، السيلندروسبيوريوم ، الشنيمه ،  
الكريبتسبيوريوم ، الكورينيوم (الرَقْلَة) ، اللصوف ،  
الليترلا ، المرسونية ، الميكسوديوريوم والتيموسوره .

## ١١٨٠٢ - رَقْل Mammite (F).

Mammitis, Mastitis (E).  
نوع من الالتهاب وهو مرض يصيب الفرج فيؤذي .

## ١١٨٠٣ - رَقْلَاء Consorts

الشركاء في المصير ، اصحاب المصلحة الواحدة .

## ١١٨٠٤ - رَقْلَة Penne (F).

Feather of the tail or wing (E).  
كل ريشة غليظة طويلة من ريش ذنب الطائر وجناحه .  
ج رَقَال .

## ١١٨٠٥ - رَقْلِيَّات Rafflesiaceae (S).

Rafflesiaceae (F). Rafflesiaceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة ، عديمات القعاات ،  
منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها قليلة جميعها اشباب  
استوائية المئنت طفيلية ترتكز وتقوم عل مشرة ليفية  
تنشب في لحاء عوائلها .

## ١١٨٠٦ - رَقْلِيَّة Rafflesia (F). Rafflesia (E).

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة الرقليات . انواعها  
ثلاثة ، سوقها قصيرة مدادة . اوراقها حشوية . ازهارها  
لعينة كبيرة القد . قطرها نحو المتر . وزنها ٧ كيلو .  
بتلاتها رباعية بيضاء اللون ، قرمها احمر قرميدي تفوق  
منها رائحة كريهة لا يقربها شيء .

## ١١٧٨٧ - رَقَال ° Emasculation des fleurs (F).

Emasculation of flowers (E).  
اقتطاع متاك الزهر منأ لتاييره منها .

## ١١٧٨٨ - رَقْرَاف، صَبَاد السَمَك Céryle (F).

Ceryle, Kingfisher (E).

جنس طير من الرقليات ، انواعه ١٤ ، موطنها العالم .  
يكثر ويصودها في المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز بمناقتها  
القوية المستطيلة ، باجنحتها المتوسطة القد ، بأذنانها  
المرصفة المستدرة وباسافها القصيرة || اقواها متعددة  
الاوان لكنها دين القروى ورقفا وزهاا || اناثها تدس  
في صخور السخور . تبيض ٧ بويضات تحضنها وحدها  
من ١٤ الى ١٦ يوما || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

## ١١٧٨٩ - رَقْرَاف السَّال Ceryle alcyon (S).

Céryle-alcyon (F).

طائر من الرقراف ، طولُه يراوح من ٢٩ الى ٣٠ سم . ثوبه  
رمادي اللون ازرق المواج . صدره موشح بالازرق . يخطه  
ابيض عالى . جناحه مرشحات بالابيض . ذنبه ضيق  
الرقعة الماجية || قوته الاسماك والقشريات والضفادع  
والزورغ والجنادب والجراد .

## ١١٧٩٠ - رَقْرَاف شائع °، صَبَلَق Ceryle rudis (S).

Céryle-pie (F). Pied Kingfisher (E).

طائر من الرقراف ، طولُه نحو ٢٧ سم . رأسه قنبري  
الريش المسطح . ثوبه ابيض الظواهر ، ابيض البواطن  
والصدر والبطن . عنقه وصدره مطوقان بقلادتين تصفيتين  
لونيا الى السرة الفحمية || موطنه آسيا الغربية وافريقية  
الشرقية والشمالية . يأنف الشطوط البحرية وجرب الانهر  
ومجاري الماء . قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والضفادع  
والحشرات انحصا الجنادب والجراد .

## ١١٧٩١ - رَقَش Pelle (F). Shovel (E).

اداة يستعمل لجرف التراب ونحوه .

## ١١٧٩٢ - رَقْع ، إِزَالَة Mainlevée (F).

Replevin, With drawal (E).

هو رفع حجز او ابطال مفعول رهن عقاري او مقاومة  
نصم في قضية .

## ١١٧٩٣ - رَقْع ، تَشَل Détirage (F).

Disintering (E).

اخراج الشيء من التربة كالحراث في آخر التلم وارومة  
الشجرة والجذور المقطوعة الخ .

## ١١٧٩٤ - رَقْع الْأَخْتَام Levée de scellés (F).

Take of seals (E).

عمل يقوم به القاضي المختص فينتزع الاعتماد التي اصحتها  
بعد ان يتحقق من صلاحيتها .

## ١١٧٩٥ - رَقْع الصَّرَائِب Dégrèvement (F).

Reduction, Allowance (E).

هو ان رفع الضريبة او تخفض عن المكلف .

## ١١٧٩٦ - رَقْع الْيَد، كَفَّ الْيَد Dessaisissement (F).

Parting with (E).

هو الانتعاض او المنع عن ادارة مال او عين .

## ١١٧٩٧ - رَقْع ° هو تبين الذرة .



رقراف شائع



رقعة الكسنة

Non rustique (F). No rustic (E). ١١٨١٥- رَفَنَة  
نمت تمرينى يطلق على النباتات المطلوبة التي تستعنى  
التخصيص في التربة والعناية بالموقع.

١١٨١٦- رَفُونَج هو اصل كرب النحل .

١١٨١٧- رَفُول \* Parodie, Sifilet (F).

طائر من الجوارثم سنيات المناقير وفضيلة الفردوسيات . موطنه  
غنيته الجديدة . يألف الغابات فوق الحشرات والاساريع  
والديدان والجائر العنينة واليزور البرية || جسم صغير  
القد يطول من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوب الذكر الى السواد  
الحلي الاحمر اللامع . زوده وصدرة والقسم الاسفل من  
محسره الى الصغار النحاسي الاسفع . رأسه متوج بست  
رفال دقيقة مستطيلة تنتهي بست مقلات صغيرة نحاسية  
اللون . الاثني عادمة الرقاع وثوبها العلوي الى الشحنة  
السمر . زورها وصدرةا وبطنها الى الشبهة الصهباء .



رفناء الخدائق

١١٨١٨- رَفِيج Turgide (F).  
Turgid, Swollen (E).

نمت تمرينى يطلق على اعضاء الحيوان والنبات التي تتورم  
تلقائيا أو عرضا فتبدو وكأنها رافعة .

١١٨١٩- رَفِيد هو نصارية القرعيات ، اطلبها .

١١٨٢٠- رَفِيدَة Pleure (F). Pleure (E).

الرفيدة وتدعى الرباط الجنبي ، غشاء يجمع بين الترتبة  
والقوة اي الزوفين عند الحشرات .



رفول

١١٨٢١- رَفِيدِيَّات \* Raphididae (S).  
Raphididae (F). Raphididae (E).

فضيلة حشرات مفترسة من رتبة شبيكات الجناح . اجناسها  
المعروفة قليلة العدد ، اما انواعها فنحو ٨٥ منتشرة في  
معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها متوسطة  
القد ، شبه اهليجية الشكل ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم .  
بسطة اجنحتها تراوح من ١٢ الى ٣٠ سم . رؤوسها ناتئة .  
جهازها الفمي نظامي . ازهارها مستعرض . جفانها مستطيل .  
تأثيرها قليلة التلو ، مجهزة باسنان قوية . ملاسها رقيقة ،  
الفكية رباعية الاجزاء . الشفوية ثلاثية . قرونبا  
الاستشعارية قصيرة ونحيلة . عيونها جانبية . زانها صغيرة ،  
ثلاثية . كواسلها مستطيلة . اجنحتها شبه مثالثة . يطونها  
غشائية السم . مرزات اناثها مستطيلة . بسطة || تألف  
الحراج والغابات . جميعها رافجة ، لامة في دورها البرقي  
والحشري || اشهر اجناسها الرفيدة والبنشة والاثنولة والسنة .



رفلة

١١٨٢٢- رَفِيلَة \* Brenthos (S).

Brenthe, Brenthe (F).  
جنس حشرات سوسية غاشية من غفبات الاجنحة وفضيلة  
الرقليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق  
الحارة من المالن القديم والجديد || اجسامها غمرزية  
الشكل ، مستطيلة . رؤوسها صغيرة ، غطاطها غائرة  
اللون ، منقطة المقدم . قرونبا الاستشعارية عيطية ،  
محجة ، تنشب عند طرف الخطم ، قبل انتقائه || قوتبا  
المواد الخشبية . تألف الغابات وتعيش تحت لحاء الانجار  
القابلة والميتة .

١١٨٠٧- رَفَن عufs des rapaces (F).  
Eggs of rapacious birds (E).

الرفن : بيض كواسر الطير اخصها المعيان - الواحدة رَفَنَة .

١١٨٠٨- رَفَنَاء، اِرِنْتَنُوس Erianthus (S).  
Erianthe (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة التيجليات .  
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها واحد زراعي تربتي .

١١٨٠٩- رَفَنَاء الحَدائق \* Erianthus ravennae (S). Erianthe de Ravenna, Canne

de Ravenne (F). Plum-grass, Ravenna-grass (E). Woll-  
zucker, Ravenna seidengrass (D). Erba ravenna (I).  
نوع من الرفناء وهي عشبة ترينية معمرة ، تملو من المتر  
الى المترين . ساقها ليفية . اوراقها جامدة ، صلبة ،  
ذلقية ، بتفسجيه اللون . ازهارها عكوكلي التجميع هرمي  
الشكل يملو نحو ٦٠ سم . ازهارها تبدو بتفسجية ثم  
تنحرف الى الابيض || ترغب في الارربة الكلسية القليلة  
الطولية .

١١٨١٠- رَفَنِيَّي Ové (F). Ovale (E).

نمت وصفي يطلق على كل شيء شكله شكل الرنة اي  
البضبة .

١١٨١١- رَفَنِيَّي Rafnia (S). Rafnie (F).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم العلامة اليوناني  
الدخري « رَفَن » . انواعها ٢٢ جميعها معمرة ، معظمها  
بري وبعضها تربتي . مهدها افرقيه الجنوبية ، منها  
الجبينة والجبلة . وهي تنتمي الى فصيلة القرقيات الفراشية .  
اوراقها بسيطة كاملة . نصلها وسيد العرق . ازهارها  
لا قياسية التجميع والارتكاز . كوسها خماسية التخصيص  
الاستساوي ، توتيجاتها فراشية الشكل ، رايانها مستديرة ،  
يغلب فيها اللون الاصفر . ثمارها سفينة جالسة . زورها  
مستتقة مغلطمة || تتكاثر باليزد والمقل . ترغب في  
الارربة الدبالية القليلة الاندماج ، الوافرة النضوي  
الممثل || اشهر انواعها الرَفَنِيَّي الثلاثة التالية .

١١٨١٢- رَفَنِيَّي اِهْلِيلِجِيَّي Rafnia elliptica (S).

نوع من الرَفَنِيَّي وهي جبنة صغيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠  
سم . فرودها متراكبة مشعبة . اوراقها اهليجية الشكل  
تطول من ٥ الى ٨ سم . نصلها بحري اللون ذلق الزام  
الاخضر . ازهارها محورية الارتكاز ، فردية او ثنائية التجميع  
صفراء اللون || ازهارها يستمر من اواخر ايار الى  
اوائل تموز .

١١٨١٣- رَفَنِيَّي ثَلَاثِيَّي الازهار Rafnia triflora (S).

نوع من الرَفَنِيَّي وهي جبنة ثنائية الشكل تملو من ٦٠  
الى ١٢٠ سم . فرودها منشبة فائقة . اوراقها بيضبة  
الشكل مستديرة القاعدة ، مدينة الطرف . نصلها بحري  
اللون ، عابق الموالج يطول من ٥ الى ٨ سم . ازهارها صفراء  
اللون محورية الارتكاز ، فردية او ثلاثية التجميع || ازهارها  
يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز .

١١٨١٤- رَفَنِيَّي مَقَرَّكَة Rafnia angulata (S).

نوع من الرَفَنِيَّي وهي بجلة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .  
فرودها مقرة الزوايا ، غافة ، منشبة . اوراقها غمرطية  
الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . نصلها بحري اللون مدبب  
المقص . ازهارها الى الصغار الكبرى || ازهارها يستمر  
طوال شهر ايار .

١١٨٣١ - رَقَاقِي، مَضَحَل Haut-fond (F).  
Shoal, Shallow (E).  
ساحل قليل النور.

١١٨٣٢ - رَقَاصَةٌ \* Funaria (S).  
Funaire (F). Funaria (E).

جنس طحالب من فصيلة المرغيبات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتبها البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. جميعها من الطحالب الشطئية الحولية التي تعيش في التربة. سوقها دقيقة قصيرة تنتهي بأكياس البوغ الحولية الشكل. حراشفها متراكبة تملأ أسافل السوق. يكثر وجودها قرب مشاعر القمح.

١١٨٣٣ - رَقَاطَةٌ Cartographie (F).  
Chartography, Mapping (E).

الرقاطة فن رسم الخرائط الجغرافية.

١١٨٣٤ - رَقَاطَةٌ حَصَلِيَّةٌ \* Cartographie pédologique (F).  
Soil Mapping (E).  
فرع من الرقاطة يختص بوضع الخرائط الحصلية.

١١٨٣٥ - رَقَاطِي \* Cartographie (F).  
Chartographical (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالرقاطة.

١١٨٣٦ - رَقَاق Trichilla (S).  
Trichillie (F).  
جنس اشجار ومجترات برية وزراعية من فصيلة الازديخيات. أنواعه المعروفة زهاء ١١٢، أعطانها البلاد الحارة والاستوائية سوقها جالسة. اغصانها منفردة الانتشاج. اوراقها مركبة وتزيه يكثر فيها التثليث. ازهارها عشكولي التجميع محوري وطولها الارتكاز. ازهارها كبيرة القدد غمغلة الاوان لا قياسية الانتظام البتلي || اشهر انواعه ما يتبع .

١١٨٣٧ - رَقَاق أَزْهَب Trichilla hirta (S).  
Trichillie bois de fer (F).  
نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٤ أمتار، اوراقه مركبة خاسية، وريقاتها لا قياسية الشكل، فصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهاره عشكولية التجميع، خلية بشرة، عاجية اللون. غشبه شديدة الصلابة، اسمر اللون، قاعشر الصفص || ازهاره يستمر طوال شهر سزيان.

١١٨٣٨ - رَقَاق أَمْرَد Trichilla glabra (S).  
نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٦ أمتار. اوراقه مركبة ثلاثية. وريقاتها لائقة بيضية الشكل مقعوبة القاعدة مدببة الطرف. فصلها جامد الصفحة جميل الخضار اللامع. ازهاره عشكولية التجميع منتظمة الشكل، لونها الالباس العاجي. ازهاره يستمر طوال شهر سزيان.

١١٨٣٩ - رَقَاق أَمْرِيكِي Trichilla spondiodes (S).  
Trichillie tendre (F).  
نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٦ أمتار، غشها اخضر اللون، قليل الصلابة، سهل الانعطاف. اوراقه مركبة لا قياسية التجميع، وريقاتها تعد ٧ او ٩ او ١١ وهي اهليلجية الشكل مدببة الطرف. فصلها جامد الصفحة الملساء، جميل الخضار الزاهي || ازهاره صفراء اللون، تبوية الملاج، كثيفة التجميع، محورية وطرفية الارتكاز. ازهاره يستمر طوال شهر سزيان.

١١٨٣٣ - رَقِيلِيَّات \* Brenthidae (S).  
Brenthides (F). Brenthidae (E).

فصيلة حشرات سوسية الشكل من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها غاشب وبعضها يعيش برققة التل في جلوج الاشجار القديمة النثرة || اعطانها البلاد الحارة والاستوائية || اشهر اجناسها الرقطة.

١١٨٣٤ - رَقِيلِيَّوَز، رَقِيلِيَّوَز، مَلِيَّوَز Raffinose, Mélitose (F).  
Raffinose, Melitose (E).  
غريب من السكر، يوجد خاصة في ثفل الشؤنر وفي الجزر وقد يستخلص من بعض انواع الاروكاليبتوس. بلورات ابرية الشكل لا قياسية الرسم.

١١٨٣٥ - رَقِي \* Chelys (S).  
Chélyde (F). Chelys (E).  
جنس سلاحف من فصيلة الرقيات. انواعها عديدة، جميعها مقترسة، كبيرة القدد، طولها يراوح من المتر الى المترين. رؤوسها مفلطحة، اعانتها مسطيلة سفينة الجمل. ذيلها قليل الاحدياب، قتره هربي الشكل بين التخذيد || قوتها الاسماك والشرقيات والصفادع والبلير والوزغ والحيات وهي من السلاحف الدجوية التي ترحل في الليل. تعيش في المياه العذبة وعلى غشاق الانهر.

١١٨٣٦ - رَقَابَةٌ Contrôle (F).  
Control (E)

١١٨٣٧ - رَقَاق Crithagra (S).  
Crithagre (F).  
جنس طير من الجوارم غروطيات التأثير وفصيلة الشرشوريات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها معظم المناطق الحارة من البلاد الافريقية. ملجئها الحياتي جماعي. اسرارها مفردة العدد. تألف الغابات والبراري والحقول المزدرة. قوتها الحبوب والوزور والحشرات الصغيرة على اغصانها || اجسامها صلبة القدد قلبية الشبه بالوردي، تطول من ١٣ الى ١٦ سم. اشلها مزوقة وبيضة يكثر فيها الاصفر والاعضر والاشهب. مناقبها غروطة، قوية. اجنحتها كبيرة. اذنانها مقعرة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها رقاق الحبيشة.

١١٨٣٨ - رَقَاق الْحَبَشَة \* Crithagra abyssinica (S).  
Crithagre d'Abyssinie (F).  
طائر من الرقاق. موطنه بعض مناطق الحبيشة. يألف الغابات والبراري. ملجئها الحياتي جماعي. سره يد األف من ١٠٠ زوج. قوته الحشرات والحبوب والوزور || جسده صغير القدد يطول نحو ١٥ سم. رأسه الى الخضار الالفس. رداؤه وذنبه الى الشبهة السمر. صفداه وزوره الى الصفرة. جناحاه الى الشبهة يملوها تدبج اعضر. بطنه الى البردة الصائبة الملاج. ذنبه مقعر الطرف || الاثنى اصفر قعداً من الذكر واقل تزويجه ٢٤ || يدين في الاشجار ويركز شمه عند تصالب الاناد. الاثنى تحضن بتناوبة الذكر من ٢ الى ٥ بيضات على ثلاث او اربع مرات في الحولى.

١١٨٣٩ - رَقَاقَةٌ Commerce des céréales (F).  
Corn-trade (E).  
هي التجارة بالمحاصيل الزراعية.

١١٨٣٠ - رَقَادُ الشَّتَاءِ، بَيْتَات Hibernation  
فتور الحياة وانتكاشها بعض الوقت في النبات وفي بعض الحيوانات والوديات. || وهناك ايضاً الرقاد الصيفي المعروف بالشمود الصيفي، اطلبه.



رق



رَقَاق الحبيشة



رَقَاصَةٌ



رقاع قائل

صغيرة مخروطية. اغلامها غريبة، مستدلة انفراج الشدق. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة تمتد حتى الذيل. الصدريه مستعرضة. الحوضية محرمة. الذيلية نازقة. هلاكة الشكل. لحوبها مأكولة متوسطة الصنف.

#### ١١٨٤٦ - رَقَالِيَّات \* Malacanthidae (S).

Malacanthidae (F). Malacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها الممرقة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها مسطلة، مستطيلة، غشبية، تطول من ١٨ الى ٣٦ سم. تتميز بسفها الشديد الصغر المهذب، وبرؤوسها الصغيرة مخروطية الشكل. الذيلية نازقة الى العطلة السرام الفضية المولج || اشهر اجناسها الرقالة.

#### ١١٨٤٧ - رَقَان الرقان: الحناء والزعفران.



رقالة

#### ١١٨٤٨ - رَقْبَة Fascia (F). Fagget (E).

الرقبة والصناعة والكيش: اشخاب وانصاف واشخاب توضع في مجاري الماء لاعتراض المسيل الطبيعي وتحوليل بعض الماء الى مجرى آخر.

#### ١١٨٤٩ - رَقْشَة Maillure (F). Speckles (E).

رقشة مستديرة تحالف اللون السائد تكون على اجسنة الغدير.

#### ١١٨٥٠ - رَقْشَة \* كورنيوم، خردلة \* Coryneum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقبات. انواعه عديدة منها مؤذية وبعضها شديد الاتي || ويثبت كتيبة محصورة للثنا، حمية او عسية الشكل، كالثاء كروية او غشبية مسطلة، غشبية الاقسام، مؤقوفة. لونها الى الصبغة الخفيفة || اعرف واشهر انواعه ما يلي.

#### ١١٨٥١ - رَقْشَة الإجاص \*، كورنيوم الإجاص \* Coryneum follicolum (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الاجاص والتفاح وقد يصيب الثمار والانفاد || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تبدو سمراء اللون ثم فسية تنفج بالنسج المتناثرة التي تيسر وتتسرق || وهو على الثمار بثور مبررة ترشع السطح تركب البشرة وتنفور في اللب فتفتحه || يكافح كثير من الفطور المؤذية.

#### ١١٨٥٢ - رَقْشَة اللوزِيَّات \*، كورنيوم اللوزِيَّات \* Coryneum beijerinckii (S). Criblure des amygdalées (F). Blight of stone fruits (E). Dörrfleckenkrankheit des steinobstes (D).

فطر مجهرى يصيب اكثر اللوزيات منها اللوز والكركز والدارقن والشمش واللوح || مظهره الخارجي يقع صغيرة لونها الى الحمرة، اطرافها اسمر التهديب، تظفرها يراوح ال ٣ الى ٥ م. تركب نصل الاوراق فتدبل النسج المتناثرة وتسبب يباسها وانحائها ونفحها || وهو على الانفاد والانفاد بثور ثملوية قشرية، تركب الهاء فتضلعها وتنفور سير النسج في الاربعة || وهو على الثمار بثور صغيرة مستديرة مقروسة السطح، كثيفة التجميع، لونها الى الجلوة ثم تنحرف الى الاسمر. تركب البشرة فتدبلها وتنطب سطح اللب || اغزاره لا قياسية الوقع والتناجح لانها منطوية بعوامل شتى تعود الى التربة والموقع والمناخ والاقليم || يكافح باستعمال سائل بوردو او غيره من الفطاريات الحديثة.



رقشة اللوزيات (٢)

#### ١١٨٤٠ - رَقَاع عَظير Trichilia odorata (S).

نوع من الرقاق، شجرة تملو من ٥ الى ٨ امتار. اوراقه مركبة خاسية. ورقهاها اطيالية الشكل، نصلها جليل الخسار يطول من ٦ الى ١٥ سم. اغزاره طرفية الارتكاز، مستطيلة الذنبيات، صفراء اللون، عطرية العرف المستحب. اغزاره يستمر من اوائل حيزران الى اواسط تموز.

#### ١١٨٤١ - رَقَاع مُهْرَج، خَشَب المسك Trichilia emetica (S). Trichilia musquée (F). Roka tree of Arabia (E).

نوع من الرقاق، منته الجزيرة العربية، شجيرة تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقه مركبة ثلاثية. اغزاره ليكية اللون كثيفة التجميع، طرفية وبجورية الارتكاز. خشبه شديد الصلابة فاخر الصنف عطر الرائحة يدعى خشب المسك || اغزاره وثماره طيبة مقبلة.

#### ١١٨٤٢ - رَقَاع آخِر الراس \* Melanerpes erythrocephalus (S).

Melanerpe à tête rouge (F). طائر من فصيلة التفقارات. موطنه بعض مناطق امريكية الشمالية. جسمه يطول نحو ٢٥ سم. بسطه نحو ٣٨ سم. ثوبه رقع الالوان. رأسه وعنته الى الحمرة الشملة. ظفوه وجناحه وذنبه الى السواد العابق. اياهه وبطنه وزنكاه الى البياض الاخير. صدقة عينه كسنتية اللون. منقاده وساقاه الى الزرقعة السرام || اخلاقه رضية لكه كثير الحذر. قوته الحشرات واساريمها ولا ينف من الثمار البرية والثرامية كالشاهيل والمصير والكركز والفتح والابن ... يثخن عشه في تجاويف الاشجار النخرة. الاثنى تبيض من ٧ الى ١٠ بيضات تحضنها وجدها دون الذكر الذي يبين لها الغذاء.

#### ١١٨٤٣ - رَقَاع نَاصِل \* Melanerpes formicivorus (S).

Melanerpe fourmilier (F). نوع آخر من الرقاق. موطنه بعض المناطق الامريكية اغصنها المكسك وكروينية || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. بسطه نحو ٣٧ سم. ثوبه الى السواد اللامع يطو تفتيز ابيض في الجناحين والصدر والاطلين. رأسه الى الحمرة الشملة. عنته مطوقة بقلادة كبريتية الصفار. صدقة عينه صفراء. منقاده وساقاه الى السواد الاسمر || اخلاقه رضية، قليل الحذر، لا ينفى الاقتراب من الانسان. قوته الحشرات على اختلافها واغصنها النذل. يتميز بتسخرين البلوط في تجاويف الاشجار فيؤنن بذلك خذيرة فصل الشتاء وللشلع || يثخن عشه في نيسان في تجاويف الاشجار او بين اوراق البوكا. الاثنى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وسعدا دون الذكر الذي يبين لها الغذاء.

#### ١١٨٤٤ - رَقَاعَة \* Uranométrie (F).

Uranometry (E). الرقاعة تبيان نجوم الرقيق كليا او جزئيا مع تحديد محورها الصادية.

#### ١١٨٤٥ - رَقَالَة \* Malacanthus (S).

Malacanth (F). جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الرقاليات. انواعها الممرقة ثلاثة موطنها بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه رشيعة الشكل تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. رؤوسها

بضيئة الشوزن ، قاعدتها اي رباطها العنقي أضيق من سنبتها اي طرفها .

١١٨٦٧- رَقِيَّيْ هو البليخ ، اطليه .

١١٨٦٨- رَقِيَّات Chelydae (S).  
Chelydés (F). Chelydae (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف ، اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها قازية مقترمة دجوية المسرح . تألف اليه العذبة الرأكة . دقائقها ملحومة الذبل والزغب . ذبلها يضيئ الشكل ناتي\* القتر الارسوي القالب || اشهر اجناسها الرق .

١١٨٦٩- رَقِيْب

هو الناظر من الحيات الخيشية . ج رقب و رقبيات .

١١٨٧٠- رَقِيْب الشَّمْس راجع هليو روب .

١١٨٧١- رَقِيْب خَدَّاع

Tarbophis trompeur (F).  
حية من البوآغيات تدعى ناظر مأكو ، اطليه .

١١٨٧٢- رَقِيْدَة Marcotte (F). Layer (E).  
النصن الذي يمسك ويرقد .

١١٨٧٣- رَقِيْش \*، رَقِيْشَة Diagramma (S).  
Diagramme (F).

جنس اسماك بحرية من كاملات العظام شاكلات الزعانف وفصيلة القرشيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك تجار البلاد الحارة || اجسامها اهلالية الشكل ، معتدلة التعليط ، تغلق من ١٨ الى ٢٨ سم . اثوابها تراوح من الغيرة الى الرعدة واللحلة جميعها فضية الماوج مرقوشة بالاسمر من الرأس الى الذيل . كثافة رقصها تختلف مع الانواع تتميز بيمينها الكبيرة الجاسطة ، بظهورها المخسورة المنزهر وبزعانفها الظهرية المستطيلة الشائكة القسم الامامي || لحومها متوسطة الصنفت ، مأكولة .

١١٨٧٤- رَقِيْقات الصَدَف

Leptostracés, Phyllocarapides (F).  
رتبة من القشريات العليا . فصائلها و اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها صغيرة القد قريبة الشبه بالاربيان الصغير . عيونها مزنة . ارجلها الصدرية متساوية ثنائية المخادف || اشهر اجناسها التبتلاة .

١١٨٧٥- رَقِيْقات المتأففر Tenulirostra (S).  
Ténulirostres (F). Tenulirostra (E).

مرتبة من الطيور الجوارم عديدة الفصائل والاجناس والانواع . اشهر فصائلها المدهديات والتتولات .

١١٨٧٦- رَمَكَا هي الجربجر ، اطليه .

١١٨٧٧- رَكَّاحَةُ مُحَرَّزَة \*

Colydium crenatum (S). Colydie crénéée (F).  
Colydium crenatum (E).

حشرة دائمة قرصاية من فصيلة الركاكيات ورتبة مغفبات الاجنحة . تألف الاحراج والحدائق والجنائن . خنافسها ويرقاتها تمشي تحت لحاء الاشجار في سرايدب الحشرات

١١٨٥٣- رَقَشَة الْوَرْدِيَّات \*، كورينيوم الْوَرْدِيَّات  
Coryneum microstictum (S).

فطر مجهرى واسع الانتشار يركب بعض نباتات الفصيلة الوردية اعصها اللورد والعليق والزعرور والقشب || مظهره الخارجى بلطح مستطيلة بنفسجية او سمر اللون تركب السوق الفتيه والقضبان النامية قشيب جفاف وتضيق البشرة واللحاء التي لا تلتئ ان تغوى || يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموصومة وينضج النبات ، بهه تظهر جرحه ، باحد الفوطاير الفعالة القرية المتنازل .

١١٨٥٤- رَقْطَة Panachure (F). Streak (E).  
بقع بيض في خضرة النبات .

١١٨٥٥- رَقْع سمكة بحرية ونهرية من اللالاس .

١١٨٥٦- رَقْمَاء Fougerale (F).  
Fern-patch, Fernery (E).  
مكان يكثر فيه الخنشار والسرغس والديشار وما اشبه .

١١٨٥٧- رَقْمَاء حُمْراء Ple-rouge (F).  
نمت وصني يعبر عن شكل خاص من اثواب البقر . فالبقرة الرقماء الحُمْراء هي ذات الثوب الاحمر عليه بقع بيض .

١١٨٥٨- رَقْمَاء سَدَقَاء Pie-noire  
البقرة الرقماء السدقاء هي ذات الثوب الاسود عليه بقع بيض .

١١٨٥٩- رَقْمَة Grain, Texture  
رقمة الشيء اصله الحكمي الملموس . وتستعمل خاصة في التصوير عن صنفت الخشب . فتقول عن خشب الجوز صلب الرقمة الناعمة وعن الاودرست اصلف الرقمة .

١١٨٦٠- رَقْمَة  
الرقمة : شجرة عظيمة ، ساقها كالدبل ورقها كورق القرع وقمرها كالتين . ج رقع (اللسان) .

١١٨٦١- رَقْمَة Palmerier élevé (F).  
Raised palm-tree (E).  
الرقمة : النخلة الطويلة التي تقوت اليد . ج رقل و رقالم .

١١٨٦٢- رَقْمَة  
قال ابو حنيفة : الرقمة من احرار البقول . وقيل « انها من العشب العظيم تنبت مستطحة غصنة كبارا وهي من اول العشب غروبيا ، تنبت في السهل » (اللسان) ربما كان الخبازي .


١١٨٦٣- رَقْمَة Parterre (F). Flower-bed (E).  
جزء من حديقة خصص لزراعة الزهور .

١١٨٦٤- رَقْن Hachurer  
خطط الرسم ونحوه بخطوط متوازية الابعاد فارقة .

١١٨٦٥- رَقْن Œufs des vautours (F).  
Eggs of vultures (E).

هو بيض التسور على اختلاف اجناسها وانواعها .

١١٨٦٦- رَقْنِيَّه Obovale, Obové, \*  
Obovoide (F). Ob-ovoïde (E).  
نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل ورقة



رقشة الورديات .



رقيش



رَكَّاحَة عُرْزَة



١١٨٨٤ - رَكَاةة ° Fixisme (F). Fixism (E).  
الركانة نظرية بيولوجية تقول باستقرار الأنواع الحيوانية والنباتية الحية على حالتها .

١١٨٨٥ - رَكَبَ الجَسْمُ هي الاثنية البيضاء، اطلبها .

١١٨٨٦ - رَكِبَان رَكِبَان النبل: سوابقه التي تخرج من القنق في اوله .

١١٨٨٧ - رَكْبَة Genou (F). Knee (E).  
عضو الرجل الامامية بين الساق والوثيف .

١١٨٨٨ - رَكْبَة ذات الكَرْسِي Ruchbah  
ركبة ذات الكرسي، نجم نير من كوكبة ذات الكرسي .

١١٨٨٩ - رُكْن Flanc de montagne (F).  
Flank of mountain (E).  
ناحية الجبل . ج ركون ولركاع .

١١٨٩٠ - رُكْحَة Cour de ferme (F).  
Farm-yard (E)  
ساحة دار المزرعة . ج ركح .

١١٨٩١ - رُكُو Doser (F).  
To put the right quantity (E).  
حدد نسبة المادة الفعالة الى سائر اجزاء المركب . او  
حدد كمية المادة الفعالة الجائر لتقويها واستعملها في مث  
او الف جزء من الملاء .

١١٨٩٢ - رُكْزَة Rejet, Rejeton (F).  
Shoot, Sprout (E).  
الفصيلة النابتة على ارومة الشجرة او على جذعها .

١١٨٩٣ - رُكْسِيَة ° Rhexia (S). Rhexie (F).  
جنس نباتات حولية ومعمرة ، برية وتربيتية من فصيلة  
المستويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار  
العالم . تعيش تحت غطاء الاججار في سراديب الحشرات  
الخاضية . قوتها طراسم الحشرات وبرازها والمواد الالابائية  
المنحلة || اجسامها صفيرة القد ، مستطيلة الشكل ،  
مستعرضة الرؤوس ، متباينة الزباني المشاوية الفصص .  
كواسلها واخمادها تلتفت الانظار لما تحتل في من نقوش  
جرامزها مستعفة . ارساغها رباعية العقل || اشهر اجناسها  
الركاسة والديتوية .

١١٨٩٤ - رُكْش، رُكْش، رُكْش Binage (F). Ploughing (E).  
كري التربة لتفكيك تماسكها حول النبات . ولعن تبخير  
رطوبتها ولتنشيط انفعاالات الحمار وعمل الميكروبات  
المطوية .

١١٨٩٥ - رُكْل هو الكرات المعروف ، اطلبه .

١١٨٩٦ - رُكْلَة Botte de légumes (F).  
Bundle of greens (E).  
الخزينة من البقل .

١١٨٩٧ - رُكْلَة Artefact (F).  
Artefact, Artifact (E).  
الركلة البوئل الصناعي الذي يبدو في الحجيرة الحيوانية او  
الخلية النباتية بعد معالجتها بالثابت التي تقضي على الحياة  
وقد تشوه بعض الشيء المالم الاسييلة .

الخاضية قوتها طراسم الحشرات والمواد النباتية المنحلة ||  
جسمها صغير القند يطول من ٤ الى ٥ م . ثوبها الى السواد  
الفحبي باستثناء الغمدين فانها الى الجؤرة تغمزها عند  
منتصفها جده سوداء . رأسها كبير الجرم . عينها بارزتان .  
زباناها غليظتان ، صفيا الاطراف . فكهاا غليظتان .  
ظهرانها قليل الاحديداب مستدير المؤخر اللاحظ . غمداها  
متسايتا التحزير القاطب . ارساغها رباعية العقل || لها  
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل  
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتستكن  
في التبار || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٦  
الى ٧ م . جسمها سكي التركيب ، محدوب الظهر ،  
مبسط للبدن ، سداسي الرواجب ، خطفي اللون ، اسمر  
الفاصل والراس ، مهذب السكم من الجانبين || طور  
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في آخر  
نقف وبله البرقة ضمن سلسلة خاوية الفشاء .

١١٨٩٨ - رَكَايَات ° Colydiidae (S).  
Colydiidae (F). Colydiidae (E).  
فصيلة حشرات دامتة قرضاية من رتبة غمديات الاجنحة .

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار  
العالم . تعيش تحت غطاء الاججار في سراديب الحشرات  
الخاضية . قوتها طراسم الحشرات وبرازها والمواد الالابائية  
المنحلة || اجسامها صفيرة القد ، مستطيلة الشكل ،  
مستعرضة الرؤوس ، متباينة الزباني المشاوية الفصص .  
كواسلها واخمادها تلتفت الانظار لما تحتل في من نقوش  
جرامزها مستعفة . ارساغها رباعية العقل || اشهر اجناسها  
الركاسة والديتوية .

١١٨٩٩ - رُكَال °، وُعْنَة Latérite (F).  
Laterite (E).  
نوع من التراب الصلصالي الاحمر اللون يكثر وجوده في  
الناطق الاستوائية الرطبة . يتميز بوفرة ما يحويه من  
الاولوين واكاسيد الحديد . وهو عند جفافه ، او في المواقع  
المادة الرطوبة ، شديد الاندماج قليل الخير والاتاة .

١١٨٩٠ - رُكَالِي °، وُعْنِي Latérite (F).  
Laterite (E).  
صفة الرُكَال اي التراب الصلصالي الاحمر اللون الشديد  
الاندماج .

١١٨٩١ - رُكَام °، رُكْمِي، رُكْمِي Cumulo-nimbus  
غيوم تنذر بالمصفاء او بالطر القريب منظرها ككل  
ملبدة متراكبة سماء اللون منخفضة الارتفاع تنحل الى  
امطار غزيرة .

١١٨٩٢ - رُكَام، رُكْمِي، رُكْمِي Falun, Trez (F).  
Shell-marl (E).  
رواسب بحرية المنشأ صدفية المنصر الرئيسي تحوي نحو  
٦٠ ٪ من كربونات الكلس و ٢٠ ٪ من الرمل تستعمل  
كصالحات كلسية قعيد التربة والزراعة .

١١٨٩٣ - رُكَامَة Agglomérat (F).  
Agglomerate (E).  
الركامة الاختلاط الطبيعي لفلزات شئ .



ركام



ركسية

11910 - رَمَّانَة  
Sympodite (F).  
الرَمَّانَة القسم القاعدي من زوائده القشريات يتكون من فصليتين تتبها بمقدفين منفصلين .

11911 - رَمَّانَة  
Sympodique (F).  
Sympodial (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل عضو شكله الخارجي بمثل الرَمَّان .

11912 - رَمَّانَة  
Nesocia (S).  
Nésocie, Nesokia (F). Nesokia (E).  
جنس جردان كبيرة القد أنثاهما واديّة عابقة . أخطاها قصيرة مقطوعة . أذناها مستديرة . أظفارها مستطيلة حراشفها الجلد . أظفارها مستعرضة . أظفارها قوية . خفخفتها تشبه قباج الخيزير . أوكارها انفاق مستطيلة يتخللها دهاليز وسرجر جانبية || أنواعه سبعة موطنها الشرق . أعرفها ركين سرنديب وركين البنغال .

11913 - رَمَّانَة الْبَنْغَال \*  
Nesocia bengalensis (S).  
Nésocie du Bengale, Nesokia, Rat du Bengale, Kok (F). Indian nesokia, Kok (E).  
نوع من الركين موطنه البنغال وسوارها . طوله نحو ٥٠ سم . يعيش قرب الماء بميزن نحو ٢٠ كيلو من غلظت الجيوب يدغوها إلى الشتاء || أثناء تقصع من ٨ إلى ١٤ دورة .

11914 - رَمَّانَة سَرَّانْدَيْب \*  
Nesocia bandicota (S).  
Nésocie bandicot, Rat bandicot, Rat perchal (F).  
Nesokia bandicoet (E).  
نوع من الركين موطنه سرنديب وبلاد وجنوب الهند . طوله يراوح من ٧٠ إلى ٧٥ سم . ظهر أريد اللون . بطنه أشعث ، قوائمها سود ، أظفاره طويلة || أثناء تقصع من ٨ إلى ١٢ دورة .

11915 - رَمَّانَة  
Fixiste (F).  
نمت تعريفي يطلق على من يقرّ نظرية الركانة .

11916 - رَمَّانَة  
Rollulus (S). Rouloul (F).  
جنس طير من عمارة الحجلويات فضيلة الطيوريات قريب الشبه من الجبل لكنه أمشقت جسمًا وأطول ساقًا . ثوبه إلى الصبغة الورداء يطوله تأذير وتوتيم || أنواعه أربعة موطنها الهند وسوارها حتى ملقة .

11917 - رَمَّانَة  
Brouter (F). To browse (E).  
رم الحيوان النبات : تناوله بفمه فأكله . وفي الحديث : « البقر ترم من كل شجر » .

11918 - رَمَّانَات \*  
Brachynidae (S).  
Brachynidés (F). Brachynidae (E).  
فصيلة حشرات نافعة من ربطة عديدات الاجنحة . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تعيش تحت الحجارة وفي انفاق تحفرها في التربة الحمية لأنها تفضلها على غيرها . تحمل في مؤخر بطنها جرابين كبيرين يفتتحان على الترحل تقذف منها ببالل ينجر في الهواء لونه إلى الطلحة الفراء يضيء في الظلام لانه لا يحل من التفسفر .

11919 - رَمَّانَة \* ، قَدَّاف \*  
Brachynus (S).  
Brachyne, Bombardier (F). Brachynous, Bomber (E).  
جنس عناص وأجنحة ناهمة من فصيلة الرمانات . أنواعه

11898 - مُكَلَّوْزَة \*  
Recluzia (S).  
Recluzie (F). Recluzia (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل فضيلة الاجنصيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها يمية مقترسة . ملجئها الحلياني جامع . اسراها وأفرق العدد || أصدافها رقيقة ، صغيرة القد ، بطنية ، حلزونة الاعقاب ، بحرية اللون أو زرقاء .

11899 - رَمَّانَة ، رَمَّانَة  
هو السوس ، نبات صحي طبي ، املبه .

11900 - رَمَّانَة  
Agréat (F). Aggregate (E).  
مجموعة مواد مختلفة سبائك

11901 - رَمَّانَة ، أَمَّانَة  
Empoter (F). To pot (E).  
فرس في مركن او في اصيص .

11902 - رَمَّانَة \*  
Stolon  
رثه هوأي زحمت على الارض وتبرز له جذور عند المفصل تقنيه من أمه فإذا فصل أصبح نباتًا مستقلًا .

11903 - رَمَّانَة  
Stolonifère (F). Stoloniferous (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات له ركب او يتكاثر بركبه .

11904 - رَمَّانَة يَوْم \*  
Rhacodilum  
جنس فطور مجهرية من الرصيات . أنواعه قليلة جميعها رية فائقة تلتصق الحفصيص والاشخاب في المواقف الظليلة الرطبة || مظهرها الخارجي نواص خلي ، عتكوئي الشكل ، كثيف التجميع ، اسمر اللون ينش جوانب قمر الدندان والبراميل والمواقع الرطبة من الاقية .

11905 - رَمَّانَة  
Racumin 57  
مسحوق سام يرتكز على مادة الكوبرين يستعمل القضاء على الجرذان والفئران . واستعماله قد يكون اما ذرًا في المواقف المطروقة من هذه البوابات او طمعا يضاف على بعض المواد التي ترطب فيها هذه البوابات اخصها الخبز المنقوع والبطاطا المسلوقة وبقياء السمك واللحم .

11906 - رَمَّانَة \* ، صَمَّان \*  
Andropogon annulatus (E). Andropogon annulaire (F). Blue grass (E). Bartsgras, Blutgras (D). Barbone (I).  
نبات عشبي بري حولي مرعوي وعلقي من فصيلة النجيليات . اروعته قرصية ممراسة الاشطاء . اوراقه عصفية النصل منتصبه . سناوله كثيفة الزغب والخمل . يحسن اقتطاعه للعلف قبل الاسبال .

11907 - رَمَّانَة  
Puits (F). Well (E).  
في البئر ذات الماء .

11908 - رَمَّانَة \*  
Pilotis (F). Piles (E).  
مجموعة اوتاد تنزل في قمر الماء لتدعيم اسس بناء .

11909 - رَمَّانَة  
Sympode (F).  
Sympode, Sympodium (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل جذع او جذمور متراكب السكم المتلاصقة المتزايدة سنة بعد سنة .



رَمَّان



رَمَّان



رَمَّانَة



رَمَّان الْبَنْغَال



رَمَّان



رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّاس

والزرنخ والسليبيوم || اما نسب هذه العناصر فلا قياسية لانها تختلف من نبات الى آخر وبين سائر اعضاء النبات الواحد || اما من الناحية الزراعية الاقتصادية وبوجه عام فتتوسط ما يحوي الرماد من مختلف العناصر الغذائية الرئيسية يمكن تلخيصه كما يلي :

نوع الرماد	قشوري	بوتاس	كلس
اشخاب المحالوات	٣٥ %	١٠ %	٣٠ %
اشخاب الصنوبريات	٣٥ %	٦ %	٣٥ %
سوق التبنوخ	٣ %	١٥-٢٠ %	٢٠-٥٠ %

١١٩٢٦ - رَمَّالَة هـ هي فريون النجر ، اطليا .



رَمَّال

Rhinocryptus (S).  
Rhinocrypte (F).

طائر وسيد الجنس والنوع من الجواثم وفصيلة الطرويات . موطنه جزر الزايح . يألف الغابات وبقاها مجاري الماء . ملحه الحياطي جامعي . جماعته قليلة تتعدد . قوته الحول والحشرات والديدان والآثار النباتية والبرور || جسمه صغير القند يطول نحو ١٨ سم . رأسه متوج بفتحة لينة مرندة الى الوراء . جناحه ممتلأ الطول . ذنبه مقطوع الطرف . رأسه الى الشبهة الوردية المولج متقلع بالايض . رداؤه وجناحه وذنبه الى الخصار الاسفع . زوره وسدله الى الشبهة . يطه الى الفتحة || يدن عله في الاشجار الرقة . الاثني تحفن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١١٩٢٧ - رَمَّال هـ

نحو ١١٠ منتشرة في جميع العالم . تعيش تحت الانقاض والحجارة تفترس الحشرات الضارة وتقاوم عن نفسها بفساد فسفوري تقتله من غدي شرجها فينجر عن رائحة كريمة منتشرة .

١١٩٢٠ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّاس هـ ، قَدَّال آخِر

الرُّاس هـ  
Brachynus crepitans (S).  
Brachyne crépant (F). Cracking brachynous (E).  
حشرة ناعمة من الرمائات . تألف الاراضي الجنبية الجبلية . طولها نحو ٩ م . رأسها ومقدم جوشها الى الحرة . نمداهما وبطنها زرق . مولج ثوبها الى الخضرة المابقة . قوتها الارق وبعض حرشقات الاجنحة .

١١٩٢١ - رَمَّال هـ

Pteridophora (S).  
Pteridophore (F).  
جنس طير من الجواثم سنات الناطير وفصيلة القروسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها واعرفها رباح البرتي (P. Alberti) . قدره قدر السمعة ثوبه الى الصبهة يسمر . ويزرق في الرأس والظهر والجناح والذنب ويغير ويغير في الصدر والبطن والالانك . يتبين بريشتين لونها الى الزرقة الجميلة السعاه المولج تشبان عند صدغي الرأس طول الواحدة منها ضعف طول الجسم .

١١٩٢٢ - رَمَّال الجحر هـ

Poisson-pique (F).  
سمكة بحرية تدعى غداية ، اطليا .

١١٩٢٣ - رَمَّالَة هـ

Polyodon (S).  
Spatulaire (F). Polyodon (E).  
جنس اسماك نهرية من اللامعات وفصيلة الراسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها انهر وبجيرات المناطق الشمالية || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، شبه وشية الشكل ، تقول من ٣ الى ٦ امار . مسوكها مرقوة بشمل عظيمة التركيب ، نجمة الشكل . رؤوسها غليظة مجهزة بزوائد غضروفية تمتد كالرئح فوق الفم . افواهها كبيرة ، مستعرضة الاشداق || تصاد من اجل صمترها الجيد الصف اما لحوبا فيقتله قل من يرغب فيها .

١١٩٢٤ - رَمَّال حَيَات هـ

Polyodontidae.  
Spatularidae (S). Polyodontidae, Spatularitidae (F).  
F. Polyodontidae (E).  
فصيلة اسماك نهرية من اللامعات الجناقيات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها انهر وبجيرات المناطق الشمالية || اجسامها مستطيلة شبه وشية الشكل . مسوكها مشعلة . رؤوسها مجهزة بزوائد غضروفية تمتد كالرئح فوق الفم || اشهر اجناسها الرماحة .

١١٩٢٥ - رَمَّال نَبَاتِي هـ

Cendre végétale (F).  
Vegetable ashes (E).  
هو ما يبقى بعد حرق المواد النباتية . تركيبه العنصري يقسم الى فئتين : فئة العناصر الرئيسية التي تشمل البوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمغنيزيوم والحديد والفسفور والكبريت والسليسيوم والكلور . فئة العناصر الثانوية التي تشمل البور والمغنيزيوم والنياسم والزنك والكلوكب والنيكل والباريوم والسترونسيوم والزنك والالومنيوم والتيتان والرماسا والسيزيوم والراديوم والكروم والفاناديوم والباراديوم والتاليوم والفضة والليسيوم واليود والبروم

١١٩٢١ - رَمَّالَة هـ

Arène (F). Arena (E).  
الرمافة ميدان في وسط ملعب او نحو كان يستعمل . عند الاقدمين من يونان ورومان وغيرهم ، كتمرك المباراة والمجالة والمصارعة .

١١٩٢٢ - رَمَّال هـ

Arénicole (F).  
Arenicolous (E).  
نعت تعريفي يطلق عل كل حشرة تعيش في الرمال كالديدان وغيرها .



رَمَّالَة



رَمَّال

١١٩٢٣ - رَمَالَةُ الْمُتَوَسِّط \*<sup>٥</sup>

Ammodytes cicerellus (S).

Ammodyte cicerelle, Cicerelle, Equille de la Méditerranée (F). Sand-cel, Sand-lance (E).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات. أعطانها معظم شطوط البحر الأبيض المتوسط. تعيش متنمة في الرمال والأوحال || جسمها شبه وشي الشكل، مستند المقدم والمؤخر. طرفها يراوح من ١٥ إلى ١٨ سم. رأسها صغير الحجم. خطمها غزير يطي الشوزن. فكها السفلي يتقدم العلوي. زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل، لامتناهية العرض، تقطب الظهر والقصم الأكبر من الذئب || قوتها إلى الزرقعة الخضراء يعلوها في جانبها جده مستطيلة للأزقة اللون ويملو الشرج بقية نحاسية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



رَمَالَةُ الْمُتَوَسِّط

Ammodytidae (S).

Ammodytidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شاككات الزعانف. اجناسها وأزواعها المعروفة قليلة العدد. أعطانها معظم شطوط بحر العالم || جسمها أصغر، مستطيلة الشكل، تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. أعطانها ذلقة تتميز باستطالة الفك السفلي والزعانف الظهرية والشرجية ويعلوها من الزعانف الحوضية. حراشفها شديدة الصغر تكمن في المسك || تعيش معظم حياتها متنمة في الرمال والأوحال ولا تقترب من الشطوط إلا في فصل الصيف وأغزير أي في زمن التسرقة حيث تلتقي برمها في الرمال فيلتصق بجها || أشهر اجناسها الرمالاة والتشون.



رمان

## ١١٩٢٥ - رَمَامُ الرمان : البقل حين يبقل .

١١٩٣٦ - رَمَان \*<sup>٥</sup>

Punica granatum (S).

Grenadier cultivé (F). Pomegranate-tree Carthaginian apple (E). Echter granatbaum (D). Granato, Melagrano, Pomo punco (I)

شجرة مثمرة من الرمانيات . شروها عديدة معظمها مأكول الثمار ويضعها حازم العلم شديد الحموضة يستعمل استعمال الحامض . يقال ان مهدها كان بلاد فارس وقد عمت زراعتها حوض البحر المتوسط وهي منتشرة في امريكا من البريتين إلى الشيلي والمكسيك وأرزونه وكليفورنيا . وقد عرفها قدماء المصريين في عهد الفرعسة وموها «ارماني» ومن اشتق الاسم القبطي «من» والاسم العربي «رومي» || رمت الاسم العربي «رمان» || تملو من ٣ إلى ٥ امار . ساقها ملساء . اروعها عيافة الفسائل . فرعها منتصب . غصنها اصفر اللون لبد الزقة صلب المود . اوراقها متقابلة عابطة ، فصلها رعيي الشكل مالى البشرة . أزهارها غشوية ، كأسها صلب القلفة خاسي التفتيص . تويجها خاسي البتلات الازرقاوية . اسديها عديدة . مبيضها متعدد اللريقات . ثمارها كروية مخضة مكللة باستان الكأس، قدورها صلبة متينة تبدو خضره اللون ثم تنحرف إلى الحمرة مع اقترابها من الادراك، تطف زور صغيرة تدعى الفرند يحيط بها بل مائع خفاف تلحمه غشاة رقيقة ملونة . ينمو الرمان في معظم اقالم حوض البحر المتوسط . يرغب في الاراضي المتوسطة الانماج المعينة النور المسكن رها عند الانقضاء لانه يفضل الرطوبة على الجفاف || يتكاثر بالبذر والتعليق والتبريد والتصليم || ازهار جميلة الشكل والون تترف باسم جلتار، رعي طيبة ، قابضة ، طاردة للديدان اخصها البودة الوحيدة || ثماره المأكولة للذعة



رمان بري



رمانة



رنبوسة

العلم ويستخلص من ثماره الحامضة عصر يدهى شراب الرمان || تويجات ازهار صباغية خضها احر. قدور ثماره ولها ساق وقوف جلوره قابضة وتستعمل في البهانة .

Androsème (F).

Androsæum (E).

## ١١٩٣٧ - رَمَانُ الْأَنْهَارِ

نبات زهره متركب الصفرة والحمرة. حبه يشبه حب الباق يتادى به ينفع داء الفصائل ، اطلب هيفواريقون .

## ١١٩٣٨ - رَمَانُ السَّعَالِ

هو الخشخاش الأبيض ، اطلبه .

Balaustion (S).

Balaustier, Grenadier sauvage (F). Wild pomegranate tree (E). Balausto, Melagrano salvatico (I).

شجرة بريية مثمرة من فصيلة الرمانيات ، ساقها شاككة ، اروعها كثيرة الفسائل، فروعها منتصبه ، لذة، شاككة . اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية النصل ، عابطة . ازهارها مزدوجة التركيب مقرية تدعى الرعث . ثمارها كروية صغيرة قطرها نحو ٤ سم . زورها حازمة مرة لا تؤكل || ازهارها وثمارها صناعية تستعمل في الصباغة والدهانة .

١١٩٤٠ - رَمَانَة \*<sup>٥</sup> Grenade (F). Pomegranate (E).

ثمرة الرمان تختلف باختلاف الظروف . منها غزيرة العصاره ، طرية الفرند ومنها صلبة الفرند ، متوصلة أو قليلة العصاره . ويضعها للذبة العلم والكنهه أو حاضن أو حازم أو مز || عصاره الرمان تروي غليل الطما وتفيد الناقهين، تحليلها الكباري

مواد سكرية	٪ ١٦,١٤
مواد استخلاصية	٪ ١٧,٥٢
مواد دهنية	٪ ٠,٣٠
بروتينين	٪ ٠,٥٢
حواض	٪ ٠,١٧
رصاص	٪ ٠,٧٣

وقد جاء عن الاسام على قوله : « اذا اكثرت الرمانة فكثيرا بشحمها فانه دباغ للحمدة وما من حبة منها تقوم في جوف رجل الا اثارته قلبه واخرسته شيطان الربوسه » .

Punicaceae (S).

Punicaceae (E).

## ١١٩٤١ - رَمَالِيَّات

فصيلة نباتية قليلة الاجناس والانواع كانوا يعتبرونها في الماضي سبطا من الاسبات || أشهر اجناسها الرمان .

Rhombus maximus,

Scophthalmus maximus (S). Turbot (F). Breet (E).

١١٩٤٢ - رَمْبُوسَة \*<sup>٥</sup>

نوع من سمك الترس . سمكة يروض من فصيلة الحروسيات وربية المسالوات . أعطانها بعض اقالم البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اساطير التناف || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبط الجرم ، يطول من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ويعرض من ٦٠ إلى ٩٠ سم. تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن ما يجعل عينيها في الصفحة اليسرى من الرأس أي عكس ما تتحل به اسماك فصيلة المفلطحات . جلدها غثن القشار مبهر التعل . صفحتها البني يبيض اللون تملوها رقة سمراء . صفحتها اليسرى الى الصهبة يعلوها قوش اسود وريقة سمراء . وصفراء . زعانفها الى الصفرة تملوها رقة سمراء . رأسها مبسط الجرم ، واسع الشفق . فكها الاسفل يتقدم الاعل .

١١٩٥٢ - رَمَد (E). Ophthalmia (F). Ophthalmie (F). التهاب في عين الدواجن تسببه عوارض مختلفة يعود تشخيصها وتقرير معالجتها الى الطبيب البيطري .

١١٩٥٣ - رَمَد الكَرَم هو اربداد الكرمة ، اطلبه .

١١٩٥٤ - رَمَد مُعَاوِد

Fluxion périodique, Ophthalmie périodique (F). Periodic fluxion, Periodical ophthalmia (E):

عارض معاود يصيب الخليل في عينها فيؤذيها . يبالغ بالاستراحة وباستعمال بعض الادوية الخاصة التي يقررها الطبيب البيطري .



رعية

١١٩٥٥ - رَمَرَام \* ، رَمَرَم

Chenopodium murale (S). Ansérine des murs, Patte d'oie vrale (F). Wall goose-foot, Nettle leaved goose-foot (E). Gänsfußmelde, Mauergänsefuß (D). Chenopodio dei muri, Zampa d'oca (I).

نوع من الالبنة وهو نبات عشبي بري طهي معمر من فصيلة السرمقيات. اتفه واجوده غلواصاً ما ثبت في الاربة الكلية . وهو مفاد للتشنج . يدر اللث وتنبغ التخمه ويلهب بالديدان الموية .

١١٩٥٦ - رَمَر

Symbole (F). Symbol (E). رمز ج رموز. الرموز هي العلامات المختصرة المأللة على اسماء العناصر والمركبات الكيماوية || والرمز يدل على اسم العنصر وفي وزن القرة الواحدة منه أي الأتوم || وقد ذكرنا على الجدول التالي رموز اشهر العناصر مع اوزانها الأتومية . اسم الجدول رمزه وزنه الأتومي

Élément (F). Element (E).

Azote (F). ١٤,٠١ N ن أزوت (نيتروجين)

Nitrogène (E).

١٦,٠٠ O ا

أكسجين

Oxygène (F). Oxygen (E).

Aluminium ٢٦,٩٧ Al ل

ألومنيوم

١٢١,٧٦ Sb ت

أنتيموان ، إند

Antimoine (F). Antimony (E).

١,٠٠٨ H يد

هيدروجين

Hydrogène (F). Hydrogen (E).

Baryum ١٣٧,٣٦ Ba با

باريوم

Brome (F). ٧٩,٩٢ Br بر

بروم

Bromine (E).

Bismuth ٢٠٩,٠٠ Bi بت

بزموت

Platine (F). ١٩٥,٢٣ Pt بلا

بلاتين

Platinum (E).

Potassium ٣٩,١٠ K يو

بوتاسيوم

Bore (F). ١٠,٨٢ B ب

بور

Boron (E).

Fer (F). ٥٥,٨٤ Fe ح

حديد

Iron (E).

Zinc ٦٥,٣٨ Zn خ

خارصين (نذك)

Or (F). ١٩٧,٢٠ Au ذ

ذهب

Gold (E).

Radium ٢٢٦,٠٥ Ra يو

راديوم

Plomb (F). ٢٠٧,٢١ Pb ر

رصاص

Lead (E).

Arsenic ٧٤,٩١ As ز

زئبق

٢٠٠,٦١ Hg ه

Mercur (F). Mercury (E).

اسنانها صغيرة ، ذرية ، رباعية الصفوف . عيناها صغيرة ، ناشرتان . زعنفتها الظهرية تمتد حتى قاعدة الذيل . زعنفتها الذيلية مستديرة الشكل || لحها فاجر الصنف ، مغروب فيه .

١١٩٤٣ - رَمْبُوطَان

نبات يعرف باسم ليتشي اصفر ، اطلبه .

١١٩٤٤ - رَمَه Fourmi allée (F). Winged ant (E).

الرمه : النملة ذات الجناحين .

١١٩٤٥ - رَمَتْ Floctage du bois (F).

Floating of wood (E).

الرمث : خشب ينفص بعضه الى بعض ويركب في البحر وهو الطوف . وفي احدى الطرق المستعملة لنقل الاخشاب في الالجار .

١١٩٤٦ - رَمَث Caroxylon articulatum (S).

Caroxyle, Caroxylon (F). Saltwort (E). Salzkrant (D). Carosilon, Call (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات . ساقه وفروعه عقدية مدادة . اوراقه زباد الصل كانوا يستخرجون منه الصدا .

١١٩٤٧ - رَمَث نَتْن

Caroxylon faetidum, Salsola faetida (S). Caroxyle fétide, Salsola fétide (F). Stinking saltwort (E). Seinkende saltkraut (D). Erba kali pudente (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات ، ساقه وفروعه مدادة ، اوراقه لمساء الصل الامرط التّن الرائحة . كانوا يستخرجون منه الصدا .

١١٩٤٨ - رَمْعِي Hasté (F). Hastato (E).

نعت رمعي يطلق على نصال الاوراق الشبيه بالرمح .

١١٩٤٩ - رَمْعِيَة

Doryanthes (S). Doryanthe (F). Queensland spear lily (E). Speerblume (D). Dorianto (I).

جنس نبات ترابي من فصيلة السونيات . اوراقه قرصية التجميع يوكية الشكل تمتد نحو المته . شراخه الزهري غليظ القاعدة منتصب يملو من متر الى ستة امتار . ازعاوه كبيرة القند تشبه الزئبق وتمادل جرمه || له نوعان الرعيه السامية ورعيه بلسر .

١١٩٥٠ - رَمْعِيَة بَلْسَمِي Doryanthes palmeri (S).

Doryanthe de Palmer (F).

نوع من الرعيه . اوراقها تطول من ١٧٥ الى ٢٥٠ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . نصلها جميل الخضار المائق ينقي بقصده ذلقة حادة اسطوانية الحمة السوداء . طليها نحو ١٥ سم . || شراخه الزهري يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ازعاوها عنقودي هرمي تاجي . ازعاوها قنية الشكل مستطيلة لوها الى الحمة .

١١٩٥١ - رَمْعِيَة سَامِيَة Doryanthes excelsa (S).

Doryanthe élevée (F).

نوع من الرعيه اوراقها تطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . وتعرض نحو ١٠ سم . نصلها جميل الخضار ينقي بحمة سوداء طليها من ٥ الى ٨ سم . || شراخه الزهري يملو من ٦ الى ١٠ امتار ينقي بقصده كثيفة من الازهار الزنبقية الشكل الارجلوانية اللون .



درام

11962 - رَمَكَة Jument poulinière (F).  
Brood-mare (E).  
هي الفرس تتخذ للسل وليست من عتاق الخيل كالجحر.

11963 - رَمَل الرمل: القليل من المطر. والرمل: خطوط في قوائم البقرة الوحشية مخالطة لساثر لونها.

11964 - رَمَل Sabie (F). Sand (E).  
مادة معدنية دقيقة الجرم نتجت عن تفتت الصخور الكلسية والصوانية وسوت بعض المرو || والرمال أنواع، أشهرها رمل البحر والهر والململة ثم العقيق والخنث والصواني والاحمر ثم الرمل السفلي.

11965 - رَمَل المَنَاقَة، حَصَى المَنَاقَة Gravelle, Cystite calculeuse (F). Gravel, Calculous cystitis (E).  
شائبة مصدرها تكوين بلورات من بولاء الصودي في المانة. تصيب خاصة الفولانج المرحمة السمين.

11966 - رَمَل المتاعف هو المذاب، اطلبه.

11967 - رَمَل تخاري هو الركام، اطلبه.

11968 - رَمَلَة الرولاء من التناج السوداء القوام سائرها ابيض. وأما التناج البيضاء فهي الرماء.

11969 - رَمَلِيّ Sablonneux (F). Sandy (E).  
كثير الرمل.

11970 - رَمَلِيَّة هي الاناريا، اطلبها.

11971 - رَمَلِين \* Ramalina (S).  
Ramaline (F). Ramalina (E).

جنس حزاز ينتمي الى فصيلة الرمالينيات. انواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم اصقاع العالم. مشاهير غشورية، متشعبة، مشرشرة. لونها الى الحفصاء البحري الباهت. اما الانواع الثلاثة فهي:

11972 - رَمَلِين الأشنة \* Ramaline orseille (F).

ينمو ويتكاثر على الصخور في المواقع الظليلة. ويستعمل كدابة صباغية حمراء.

11973 - رَمَلِين الصُخُور \* Ramaline des rochers (F).

ينمو ويتكاثر على صخور التهام والحفصاء البحرية المرص.

11974 - رَمَلِين المُرَّان \* Ramaline du frêne (F).  
ينمو ويتكاثر على لحاء المران ومعظم الاشجار الحرجية والتزيينية والزراعية.

11975 - رَمَلِينِيَّات \* Ramalinaceae (S).  
Ramalinacées (F). Ramalinaceae (E).

فصيلة من الحزاز الذي يعيش ويتكاثر على لحاء الاشجار او على الصخور وليس في التربة. مشاهير غشورية، شبه جلدية، لينة، متعددة السكاك || اجناسها المعروفة قليلة العدد أشهرها الرملين الذي يعتبر قبس الفصيلة.

Silicium	٢٨,٠٦	Si	س	سيليوم
Sodium	٢٣,٠٠	Na	ص	صوديوم
	٣١,٠٢	P	ف	فسفور
Phosphore (F). Phosphorus (E).				
Argent (F)	١٠٧,٨٨	Ag	ف	فضة
Silver (E).				
Fluor	١٩,٠٠	F	فل	فلور
Etain (F).	١١٨,٧٠	Sn	ق	قصير
Tin (E).				
Soufre (F).	٣٢,٠٦	S	ك	كبريت
Sulphur (E).				
Cadmium	٢١٢,٤١	Cd	كد	كاسيوم
	١٢,٠١	C	ك	كربون
Carbone (F). Carbon (E).				
Chrome (F).	٥٢,٠١	Cr	كر	كروم
Chromium (E).				
Calcium	٤٠,٠٨	Ca	كا	كلسيوم
Chlore (F).	٣٥,٤٦	Cl	كل	كلور
Chlorine (E).				
Cobalt	٥٨,٩٤	Co	كا	كوبلت
Magnesium	٢٤,٣٢	Mg	م	منغيزيوم
	٥٤,٩٣	Mn	م	منغنيز
Manganèse (F). Manganese (E).				
Cuivre (F).	٦٣,٥٧	Cu	نح	نحاس
Copper (E).				
Nickel	٥٨,٦٩	Ni	ني	نيكل
Iode (F).	١٢٦,٩٢	I	ي	يود
Iodine (E).				

11957 - رَشَش Bouquet de fleurs (F).  
Bunch of flowers (E).  
الفاقة، أي الباقة من الزهر.

11958 - رَمَص Mise bas des carnassiers (F).  
Cub (E).  
وضع السباح.

11959 - رَمَضِيَّة الرضيفة: آخر المبر وذلك حين تحترق الارض لان اول المبر الربعية ثم الصيفية ثم الدائمة ثم الرضيفة (السان).

11960 - رَمَضُوسِيل \*، يَجِجَة Rhamphocèle, Tije (F).

جنس طير من فصيلة التنفريات. انواعه المعروفة ستة. موطنها المناطق الحارة من البرازيل والبلاد المجاورة. تألفت الادغال والحراج المبعثرة الاشجار. نظامها الحياتي جامعي. اسرابها متفاوتة العدد تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة القدة، متناظرة غشورية الشكل صغيرة. اجنسها متعددة الحجم. اذنانها متوسطة القدة، مقطوعة الاطراف. ارساغها دقيقة. اظفارها جميلة اللون يكثر فيها الاحمر القرمزي || جميع انواعها تعيش على البانور وبعض الثمار العنية || تدفن اعشاشها في الادغال على ارتفاع 4 او 5 اقدام عن سطح التربة. اناثها تضع من 4 الى 6 بيضات تحضنها بمناوبة للذكور نحو 14 يوما.

11961 - رَمَكَة

الرمكة، هي لون الرمد في الجبال. يقال في لونه رمكة. والارباك من الجبال ما كان لونه الرمكة، قال أبو حبيدة هو الذي اشتدت كته سحى دخلها سواد والاثنى رمكاه. ج رمل.



رمفوسيل



رملين



رمسوس ثنائي اللون

خلي القشار يطول من ٤ الى ٥ سم. ثوبها متضارب الالوان، اسود الرأس والكوسل، اصفر الظهران، اسمر السكة الشريعية والجرازم. رأسها معتدل الحجم، غرظي الخلف. شكلها قويان. عيناها صغيرتان. زباناها عظيمتان. قوسان. ظهرها سنانى الشكل لا يلفس كامل البطن || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في ايار وتميش حتى آب. تسرح في النهار. تساقط في تموز. جسم الكن لطفا مربعة الشكل تحت لحاء الاشجار اليابسة وتحت الجلالة || البرقة عتد بلونها الكال الجسوري تطول نحو ٨ سم. جسمها بردي الشكل، مبطن الجرم سداسي الارباج، حنطي اللون، اسمر الموج، يمتد في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما يتغنى طليقا من كل غلاف تحت اللحاء او تحت الجلالة.

١١٩٨٢ - رمسيرة  
Rozérie (F).  
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الخشخاشيات مشهورة باسم سلبج، اطها.

١١٩٨٣ - رمسيرة  
Aegithalus (S). Réziz (F).  
جنس طير من فصيلة القرقفيات. انواعه المعروفة ستة اصطناعا المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. مناقبها غرزية الشكل. اجنتها قصيرة، معتدلة الانفرج. اذنانها مستقيمة مقلوبة. ارسافها قوية حبيبية || قوتها الحشرات ويرقاتها ومكها وما استطاعت اليه سبيلا من البزور البرية خاصة في فصل الشتاء || اعرف انواعه واشهرها البريز المكمل.



رمسة مصفدة

١١٩٨٤ - رمسيرة مكسلة  
Aegithalus pendulinus (S). Réziz penduline (F).  
طائر من البريز. صغير القد، طوله نحو ١٣ سم. رأسه وعنته وصدره الى الصبهة الرادية. بطنه ابيضلا الى البياض الاخير. ظهره الى الصبهة الزبداء. قوامه واباهره سود الصفة، يبيض الخاشية الشناية الموج. كلمة عييه سوداء تجتد من قاعدة المتقاد الى الازن || اصطناعا تجتد من الشرق الاوسط الى اربوة. يأنف المتاع وضفاف مجاري الماء || قوته الحشرات والديدان وبزور النباتات البرية || يفش عشه في الاذغال والمائل والمقاصب. الاثنى نحو ٦ بيضات تحفها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوما.



رميز مكسلة

١١٩٨٦ - رمسيرة  
Prionurus (S). Prionure (F).  
جنس اسماك بحرية عاشبة من شاكات الزعانف. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها تجتد من بحار اليابان الى امريكا الجنوبية || اجسامها ايلينية الشكل، مبطة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها معتدلة القد، غصورة الاغصام الصغيرة الناشرة. عيناها صغيرة رقيقة الارتكاز. زعانفها الظهرية مستطيلة، قليلة العرض. زعانفها الخلفية تتألف من نخس حصاد رضة شمخ. الشريعية تقابل الظهرية والذيلية مقرة. الوالها تزواج من السمرة صفراء اللون او شقراء او سمراء || قوتها الاغصان البحرية. لحومها متوسطة الصنف، مأكولة.



رمسة

١١٩٨٧ - رمسيرة  
Macroscopic (F).  
هو ما يرى بالعين المجردة.

١١٩٧٦ - رمسوس  
Rhamnusium (S).  
Rhamnusium (F). Rhamnusium (E).  
جنس حشرات من غمديات الاجنحة وفصيلة القرقنيات. انواعه المعروفة قليلة العدد. اعطائها تجتد من اليابان الى اربوة || اجسامها متوسطة القد، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. الوالها ثنائية اللون. تسرح في النهار. تظهر اواخر ايار ويثي حتى اواسط ايلول || مرتها الازهار الحرجية. يرقاتها غاشية تركب الحور والردار والزيرون والقندلي.. فتفنر اللحاء وتسردب الشكر.

١١٩٧٧ - رمسوس ثنائي اللون  
Rhamnusium bicolor (S). Rhamnusium bicolor (F). Rhamnusium bicolor (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة القرقنيات وربة غمدات الاجنحة. تألف الخدائق والجانق والسيجات الحية وضفاف مجاري الماء. غنافسها غاشية تفتلي من جميع اجزاء النبات. يرقاتها غاشية تركب الجلود والاغصان فتخلدها حتى الشكر وقد تفتل الحور والصفصاف والذب على غيرها || جسمها متوسط القد احيث الشكل يطول من ١٦ الى ٢٢ سم. ثوبها ثنائي اللون، رأسها وكوسلها وبطنها ويرامزها الى احد القرقيدي، ظهرها الى الزقة يعلوها موج ينمضي عند الذكر. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان جاسفتان. زباناها كيران مقوسان. شكلها ضليخان. ظهرها مستدير الطور الاسف، متتابع التميزر القمدي المتعاطب. ارسافها رباعية المعقل الظاهرة الاثنى اكبر قدما من الذكر واقتصر زبانا منه واهت ثوبا || جبلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في ايار وتميش حتى آب. تسرح في النهار. تساقط بعد ظهورها باسبين. تزد الحول تحت قشور الجلود والاغصان || البرقة عتد عند الادراك تمام تطول نحو ٢٢ سم. جسمها اسطواني الشكل، عديم الارباج، اسمر اللون، اسود الرأس، مبش الحلب البدين || طور الاكمال الذي يستمر من ٥ الى ٥٠ يوما ينمضي في آخر نفق استفرته البرقة ضمن صلجة خاوية من المواد النباتية المعجونة بالريال.

١١٩٧٨ - رمسة، عيش القسط  
Bonduc (fruit)  
هو شجر البندق الهندي جسمه حجم البندق المعروف اما يقل عن استدارة. يتفلق عن لباب جامد حاجي اللون يحوي بعض الاعدان الثامنة. وهو يعتبر من المغذيات ويستعمل في الهند كدافع للحميات وضد نيش الاناعي.

١١٩٧٩ - رمسيرة  
Saprophyte  
جهاز نباتي اولي فكري او جزوي يعيش على الفضويات البالية.

١١٩٨٠ - رمسيرة  
Saprophytism (F).  
Saprophytism (E):  
حالة الاجسام الضاعية التي تعيش على المواد الضوية المتحللة.

١١٩٨١ - رمسيرة مصفدة  
Stenalia testacea (S). Stenalia testacea (F).  
Stenalia testacea (E).  
حشرة واثة غاشية دامت من فصيلة الرديليات وربة غمدات الاجنحة. تألف البراري والاحراج الغلة. غنافسها تعيش على ازهار واوراق الصيولانيات. يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة || جسمها صغير القد،

## ١١٩٨٨ - رنكارو

Oryzivore (F).

Oryzivorous (E).

نمت ترميفي يعلق على كل حيوان او طير قوته الارز.

## ١١٩٨٩ - رنكارو

Araponga a trois coroncules (F).

طائر يدعى اربنغا لثاني الخناس ، اطلبه .

## ١١٩٩٠ - رنكة

Rangifer (S).

Renne (F). Reindeer (E).

جنس حيوانات لينة مجرة من فصيلة الايليات . اخطاها البلاد الباردة . قوتها الاعشاب والاوراق وزينات الاشجار ونوايسها والحلابل والفوقس || تعيش جاعات ، اجلها يمد من ٢٠ الى ٥٠٠ نغر . تجوب معظم الاصقاع الشمالية في طلب القوت || اناها تفصع من يقفون في لهما نومان : الرنة الشائعة والرنة الامريكية .

## ١١٩٩١ - رنكة امريكية

Rangifer tarandus caribou (S). Renne américain, Caribou (F). American reindeer, Caribou (E).

نوع من الرنة ، موطنها امريكية الشمالية ، ضروبها اربعة اجسامها كبيرة القد تملو من ١٣٥ الى ١٤٠ سم . وزنها يراوح بين ١٧٥ و ٢٠٠ كيلو . اناها الى السمرة يملوا ملوح اسهب || تدجن بصموية . لا يمكن استئصالها كالرنة الشائعة .

## ١١٩٩٢ - رنكة شائعة \*

Rangifer tarandus (S).

Renne commun (F). Common reindeer (E).

نوع من الرنة ، موطنها البلاد الباردة المنتشرة من الترويج الى اقاصي سيريه . جسمها كبير القد يملو نحو ١٢٠ سم . راسها غليظ مستطيل . قوتها كبيرة متشعبة تطول نحو ١١٥ سم . عنقها قصير . اذاها معتدلتان . عنانها كبريتان . قوتها قوية . اناها صلبة فارشة تتكلم في السير على الثلج . ذنها قصير طوله نحو ١٤ سم . ثوبها الى السمرة يمدق مع اقترابه من ثيج الظهر ، يطحل ويبيض مع البطل وعند داخل القوائم || تدجن بسهولة وتستعمل استئصال البقر والاعل .

## ١١٩٩٣ - رنكة

Rangia (S).

Rangle (F). Rangia (E).

جنس حيوانات مجرة من الرخويات صفحيات الخياشيم وفضيلة الرنجات . انواعها المروفة قليلة العدد اعطانا اعمول وصمبات اهر امريكية الوسطى والجنوبية || اصداها شبه يضيئة اللون ، متصلة القد والاحديدات متساوية المصاير ، لامتناهية الاصلع . لونها من الخارج الى البياض المنشد والخطوط بالكسني والجلوي ، لونها من الداخل الى البياض القلوي اللامع || لونها مأكولة جيدة الصنف .

## ١١٩٩٤ - رنكوسيات \*

Protorthoptères (F).

Protorthoptera (E).

رنة حشرات منقرضة من طبقة مستفحات الجناح . اسافرها تعود الى الحقتين الكبرويتية والبرمية من الاياج الاول || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف مستفحات الجناح . تزئنها الروشي البسيط يدل على ذلك .

## ١١٩٩٥ - رنكيات \*

Rangilidae (S).

Rangilids (F). Rangilidae (E).

فصيلة حيوانات مجرة من الرخويات صفحيات الخياشيم .



رنة شائعة



رنجة الكشمش



رنجة الورد

اجناسها وانواعها الماصرة المروفة قليلة العدد . جميعها من علم بحار امريكية الجنوبية والوسطى || اجسامها معتدلة القد . اصداها لامة معتدلة البهاكة يكثر فيها الشكل الاحليلجي || تعيش لاصقة بالصخور المنقورة . ليفها قليل الغزارة || اعرف اجناسها واشهرها الرنجة .

## ١١٩٩٦ - رنكوس

Rhynchosis (S).

Rhynchosis (F).

جنس نباتات عشبية معمرة يرية من فصيلة القرنيات القرارية . انواعها المروفة نحو ٧٠ . جميعها من نبوت المناطق الحارة والاسوائية || سوقها مدادة او عارشة كثيرة الحوالق . اوراقها ريشية متعاقبة . انزعارها عنقودي التجميع ، ابطي وطرفي الارتكاز . انزعارها صفراء اللون او حمراء .

## ١١٩٩٧ - رنخية

Botryosphaeria

جنس فطور مجهرية من الرخويات يتميز بوليته الغائرة تحت البشرة في نسج اللحاء . اعصانه غليظة مختلفة الاشكال . يوشه بسط التركيب والتجميع ، يضي او احليلجي الشكل . اشهر انواعه المؤدية رنخية الكشمش ورنخية الورد .

## ١١٩٩٨ - رنخية الكشمش \*

Botryosphaeria ribis,

الكشمش

Macrophoma, Dithiorella mali (S). Black-rot du grosellier (F).

فطر مجهر يصبب الكشمش وبض النباتات الاخرى كالوز والفتح والاجاص والكرمة والجزر والبرتقال والحامض واليوسى || مظهره الخارجي في الكشمش يقع صمغية معتمة تسبب جفاف القشرة وذبول يمل بالتواهي ثم يمتد زولا الى اللند فالفصن فالجذع || وهو في الحفسيات وصم يسبب صرم الفروع والساق يمد ان يطبل اللز يبقعه المغنية التي تبدو مهمل اللين ثم يهرم . وهو على الفتح يقع قرحة لونها الى السمرة تركب الانداد والانفان فتعطب اقسام اللحاء المصابة وتسبب ايسها . يكافح يقطع وسرق الاعضاء المصابة فور ظهور الوص او الذبول ثم تطهر الجروح بمزوب سلفات الحديدي او سلفات النحاس .

## ١١٩٩٩ - رنخية الورد \*

Botryosphaeria dothidea (S).

فطر مجهر يصبب الورد في فروعه فيلونها || مظهره الخارجي قروح مجنية جامدة بارزة مبرقعة تملو سطح القشرة وتشوهه وتنور في الداخل فتعطب الشكير والاياف الخشية || يكافح بالقطع والحرق ثم التطهير بمزوب سلفات الحديدي .

١٢٠٠٠ - رنك هو النار ، واحده رنكة .

## ١٢٠٠١ - رندير

Renne (F). Reindeer (E).

حيوان لين مجر من فصيلة الايليات يدعى رنة ، اطلبه .

## ١٢٠٠٢ - رنزين

Rendzine

ارربة تميزت بيبود بعض البقايا الجصية الحجرية في مقاطعها الحميرية . اشكالها والواها عديدة يكثر فيها الاخر والاسفر والاحلل والايغر والاسود .

## ١٢٠٠٣ - رنكس

Calla (S). Calla, Choucalie, Calle (F).

Calla, Trumpet lily (E). Schweinewurz (D). Calla (I).

نبات عشبي بري جنسوري معمر من سبط الرنسات





رئس النّاقع



رنقوت أزرق



رنقوت الكريمة



رنقوت خري



رنقوت ملهف



رئس الملك



رنقوت

عيناها كبيرتان ناشزتان . زبانا دقيقان ، صقيان .  
ظهورها معتدل الاحدياب مقلوم الطول المنقش نحو  
الاسفل . غدها منتبها التحيز ، كيفها الحمل ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل  
الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تساقط بعد ظهورها  
باسبوعين وتضع المكن ميحادي في سوق الثآليل الفتية في  
قنوب تخليجها بتمكها || البرقة عند الادراك التام تطول  
نحو ١٢ سم . جسمها دقيق الجرم مقوس الشكل ، تبي  
اللون ، وردي المواجه ، اسود الرأس والشرج ، عادم  
الرواجب ، تملوه ثلاثة خطوط من الفظ السود || طور  
الاكامل الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتغني ضمن  
جراب من التراب والمواد العضوية المحيطة بالريال .

١٢٠١١ - رنقوت  
Poinciana (S).  
Poinciana, Poincillane, Poinciane, Poincie (F).  
Poinciana (E). Poinciana (D). Poinciana (I).

جلس شجيرات يرة ورئيتي من فصيلة الرنقوتيات ، انواعه  
قليلة بعضها شاكك . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها  
عقدوية التجميع جميلة الشكل صفراء اللون موشحة بالاحمر .  
اشهر انواعه الرئيتية الرنق الجليل ورنق الملك .

١٢٠١٢ - رنقوت الملك\* ، وهرة الجنبه  
Poinciana regia, Delonix regia (S). Poinciane super-  
perbe, Flamboyante, Fleur de paon (F). Royal poinciana,  
Peacock flower (E). Poinciana (D). Poinciana regia (I).

شجيرة زربيتية من الرنق تملو من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .  
ساقها وفروعها شاككة . اوراقها عابله . ازهارها هرمي  
الشكل . ازهارها كبيرة القد ، عيرها فواح مستحب ،  
لونها احمر برتقالي . اسديتها نارية اللون تطول نحو ٢٥ سم .

١٢٠١٣ - رنقوت جميل  
Poinciana elata (S).  
Poinciane élevée (F). Raised poinciana (E).

شجيرة زربيتية من الرنق تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .  
ازهارها جميلة الشكل كبيرة القد نارية اللون موشحة بالاحمر  
ترغب في الاربة الخفيفة والتوصلة الانساج . تحب الرطوبة  
المستحكمة .

١٢٠١٤ - رنقوت  
Poule couveuse (F).  
Brooding-hen (E).

هي الدجاجة الحاضنة المروقة عند العامة بالقرقة .

١٢٠١٥ - رنقوت\*  
Rhynchotus (S).  
Rhynchote, Tinamon (F).

طائر من فصيلة الرنقوتيات طوله نحو ٤٢ سم . رأسه  
صغير القد . منقاره مستطيل . منقه دقيق وطويل . ريش  
ظهوره وجناحه الى الصبهة تعلوها خطوط سود معتزلة .  
انفكيه متوسط القد يتلنس الارض . بطنه اشهل الريش .  
يدلو بسرعة فائقة . يألف الاجراع والغبابات والمروج .  
قوته الثآليل والحيوب والحشرات والاعشاب || الانثى تبيض  
من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها وسعها نحو ٤ اسابيع . يقال  
انها تحضن ثلاث مرات في السنة .

١٢٠١٦ - رنقوتيات\*  
Crypturidae, Tinamidae (S). Crypturidae, Tinamidae (F).  
Crypturidae, Tinamidae (E).

فصيلة طير من الرواكض ، اجناسه وانواعه عديدة .  
مهدا امريكة الجنوبية ، جسمها صغيرة القد مستطيلة  
قصيرة القوائم || قوتها الحبوب والثآليل والاعشاب والحشرات .

وفصيلة القلقاسيات . انواعه قليلة . اوراقه قرسية الانتشاب  
زنادية منتسبة . شرعانه الزهري خراشي القاعدة . ثماره  
عنية الشكل متراكبة لبدة .

١٢٠٠٤ - رنقوت النّاقع\*  
Calla palustris (S).  
Calle des marais, Choualle des marais (F).  
Aronstab, Echte schweinewurz (D). Dragontea, Piede di vitello palustre (I).

نوع من الرنق يعيش في المنقوع وعلى ضفاف البحيرات .  
جذموه مداد . اوراقه قليلة الشكل طويلة الزناد المنتصب .  
شرعانه يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . شرعانه ابيض الزهر  
يطول نحو ٧ سم . ثماره عنية متراكبة متراصة مرجانية  
اللون .

١٢٠٠٥ - رنقوتيات  
Callées (F). Calla (E).

سبط من فصيلة القلقاسيات .

١٢٠٠٦ - رنقوت\*  
Rhynchites (S). Rhynchite (F).  
جنس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة تعيش  
على الاشجار المثمرة والحرجية . انواها زاهية الالوان .  
اجسامها صغيرة القد ، يرقاتها ضارة تلثم الارواق وتمتص  
الصار . اشهرها ما يتبع .

١٢٠٠٧ - رنقوت أزرق\*  
Rhynchites caeruleus (S). Rhynchite bleu, R. coupe-  
bourgeois (F). Apple twig beetle (E). Zweig-  
stecher (D).

حشرة صغيرة القد من السويات ، طولها نحو ٣ سم . لونها  
ازرق لامع . مسطها وقوائمها سود . تركب الاشجار المثمرة  
اخضعها الاجاس والفلاح . تقتحم مع يرقاتها البرام  
الازيرية فتفقي عليها .

١٢٠٠٨ - رنقوت الكرمه\*  
Byctiscus betulae (S). Rhynchite de la Rebe, Cig-  
rier, Urbec (F). Pear leaf roller (E). Kastenstecher,  
Zigarrenmacher, Zigarrenwickler (D).

حشرة من السويات صغيرة القد طولها من ٦ الى ٨ سم .  
لونها اسفغ يملو مواج زرجدي . تمتص الانثى مكها على  
ورق الكرمه فيفتغ عن يرقات صغيرة دقيقة مستطيلة  
تقتل الارواق وتعيش في داخلها .

١٢٠٠٩ - رنقوت تحري\*  
Rhynchites bacchus (S). Rhynchite bacchus (F).  
Rhynchites bacchus (E). Purpurroter Apfelfrucht-  
stecher (D).

حشرة من السويات طولها براوح من ٥ الى ٦ سم . ثوبها  
قربزي اللون يملو مواج بنفسجي . تركب جميع الاشجار  
المثمرة . تنقب البرام الزهرية لامتصاص عصارتها ثم تمتص  
مكها الذي يفتغ من يرقات تدغل الثآليل وتعلها .

١٢٠١٠ - رنقوت ملهف\*  
Rhynchites auratus (S). Rhynchite doré (F).  
Rhynchites auratus (E).

حشرة غاشلة ثامرة من فصيلة السويات ودية مفدات  
الاجنسة . تألف الجائنات . خنافسها تلثم برام الخوخ  
والفلسش وتلتد الزعازع والنواصي الفتية . يرقاتها تعيش  
في الثآليل وداخل صيحتها || جسمها صغير القد يملو من  
٧ الى ٩ سم . ثوبها الى الخضار النعاسي يملو مواج ارجواني  
وزنق اشقر . رأسها كثيف الحمل ينتهي بتمك مستطيل .

**Melanospora (S).**

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات .  
اعصابها رخيصة ، بديئة ، بسيطة ، منفردة ، مستديرة ،  
عابقة اللون || تكاثرتا بدوسية الشكل لا تكاثر لها ،  
سرمية الانصداع || يوفها وحيد الخلية اسمر اللون .  
انواعها المؤذية ثلاثة وهي ما يتبع .

**١٢٠٢٦ - رُفْدَة الرُّطَاب \*  
Melanospora stysanophora, Stysanus stemonites, Dematophora glomerata (S).**

فطر مجهرى يركب جلور الكرنة والبطاطا ويثيرها من  
النباتات الثائوية || يعيش ويتكاثر في بيئة مشبعة  
الرطوبة || مظهره الخارجى يتبع حطبة خلية مهدبة لزيعة  
الملمس تركب الجلود فتعطبها || يكافح بتحفيض الرتبة .

**١٢٠٢٧ - رُفْدَة الزُّرْع \*  
Melanospora damnosa, Sphaeroderma damnosa (S).**

فطر مجهرى يصيب القمح والشعير والشرافان || يركب  
سلايات القصب واعمال الصنف فيرشها ببقع فضية  
خلية حطبة تعمق النمو وتؤذي الاسبال || اضرارها زعيدة  
محدودة الا اذا وافقها العوامل الطبيعية وانحصا جفاف  
التربة والجو .

**١٢٠٢٨ - رُفْدَة المِلِين \*  
Melanospora asparagi (S).**

فطر مجهرى يصيب المليون فيؤذي وقد يسبب يباس .  
يركب السوق في اي وقت كان فيشل اعمالها الحوية  
ويسبب انتفاخ رؤوسها وانحرافها نحو الارض ثم جفافها  
قبل اكمال دورتها الحياتية || يكاثم عند بدء ظهوره  
باستعمال احد الفواطير الفعالة غير المركزة على النحاس .

**١٢٠٢٩ - رُفْدَاب \*  
هو قردوح شتوت ، اطليه .**

**١٢٠٣٠ - رُفْدَام \*  
ما لا يصيد من الطير .**

**Impondérable (F).**

الرَجُل ما كان غير قابل الوزن .

**Impondérabilité (F).**

الرجلة عدم قابلية الوزن .

**Tilletia**

هو النخرية جنس فطور مجهرية .

**Tilletiaceae (F).**

هي التخريات فصيلة فطور مجهرية .

**Stratus**

هو السديم نوع من الغيوم ، اطليه .

**Rohdea (S).**

Rohdea (F). Rohdea (E).

نبات عشبي ، جلومودي ، سروتي ، معمر ، وحيد  
الجنس والنوع من فصيلة الزئبقيات . مهدد بمس مناطق  
اليابان || اوراقها جلدية الانتشاب ، اعطليجية الشكل ،  
تعطل من ٧ الى ٩ سم . تعالما عادمة الزغب ، مستطلة  
المروق . ازهارها سنبلية التجميع ، يرتفع نحو ٣ سم .

**١٢٠٣٦ - رُفْدَة \*  
Rohdea (S).**

تدثر في افصوص تحضره بين الادغال الكثيفة الشائكة .  
اشهر اجناسها الرنقوث .

**Rhynchichthys (S).**

Rhynchichthys (F).

سمكة بحرية يروض من شائكات الزعانف وفصيلة المتعديات.  
اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها متوسط  
القد ، يطول نحو ٢٤ سم . رأسها كبير الجرم . عظمها  
مدب الطرف . فكها الاعلى يتقدم الاسفل . شدتها رجب  
الانفراج . عيناها كبرتان ، جاحطتان ، زعنفتها الليلية  
فارقة . اسفاتها مسنة الحمار شائكة . ثوبها الى الركبة  
القضية المواجه يمتد في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير  
في البطن || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

**١٢٠٣٨ - رُنْكَة \*  
Clupea (S).**

Hareng (F). Herring (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السابوشيات ، انواعه نحو  
٦٠ ، موطنها بحار الماز اعخصها بحار المناطق الحارة .  
نظامها الحياتي جامي . سرها يمد نحو مليون سمكة . تجوب  
البحار في المياه الاقليمية حيث تكثر الشفريات التي تركز  
عليها قوتها . وقد تدخل مصبات الانهر || اعرف انواعه  
الرُنْكَة الشائعة ورُنْكَة البحر الاسود .

**١٢٠٣٩ - رُنْكَة البَحْرِ الْأَسْوَد \*  
Clupea pontica (S). Hareng de la mer Noire (F).**

Pontica herring (E).

نوع من الرُنْكَة ، موطنها البحر الاسود ، ظهرها الى  
الزرقعة الرصاصية . جانبها الى الزرقعة البحرية القضية  
المواجه تعلوها خطوط دقيقة مستطيلة عابقة . بطنها فضي  
اللون والمواجه . سرها نحو نصف مليون . تصاد وتؤكل .

**١٢٠٤٠ - رُنْكَة شَائِكَة \*  
Clupea harengus (S).**

Hareng commun (F). Common herring (E).

نوع من الرُنْكَة ، ظهرها الى الزرقعة ، جانبها وبطنها  
فضية المواجه . تكثر في المحيط الاطلسي . نادرة في المتوسط .  
سر بها من المليون الى المليونين . تصاد وتؤكل .

**١٢٠٤١ - رُنْكَة \*  
نبات دقيق (اللسان) .**

**Renanthera (S).**

Renanthere (F).

جنس نباتات امنية من فصيلة السحليات . انواعها  
المروقة خشنة . اعطانها تمتد من الهند الى ماليزية . يكثر  
وجودها في الغابات والارالح الظليلة الرطبة وقد انتشرت  
زراعتها التزيينية المركبة عند معظم الشعوب التي تمتد  
بالازدهار || اوراقها مزدوجة التصنيف ، جلدية الاتصال  
المستطيلة الضيقة . ازهارها كبيرة ، خاسية الثلاث  
المستطيلة ، شفوية التجميد الذي يبدو كالنقر . الوانها  
الى الحمرة منها الغريزي والاريجوني والاحمر الزاهي والاديس  
والوردي .

**١٢٠٤٣ - رُفُوح \*  
Echoudage (F). Lime-wash (E).**

لغج الحر يصيب الزرع من حنطة وشعير يمد ازهاره  
فيفسر حبه .

**١٢٠٤٤ - رُفْدَة \*  
Altitude**

رهد كل شي : ارتفاعه عن سطح البحر ومستواه . ومنها  
خطوط الرهد (Courbes de niveau) .



رُنْقِيث



رُنْكَة



رُنْقِيثَة



رهداء الرطاب



رهداء الزرع



رهداء الهليون



رهدَة

Rhyacophila (S).  
Glossosoma (S).  
Agapetus (S).

الرهكوليا  
الفلوسومة  
الايغيتوس  
ويقوم على شراخ غليظ يرتفع نحو ٤ سم. ازهارها صفيرة ،  
لبدة ، حراء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.  
تزرع التزيين ضمن البيوت وفي المصاري وفي الحدائق  
الدافئة .

Brouillard épals (F). Dense fog (E). رهسل  
صباح رقيق جرار رذاذ كالتى يغشى المناطق الجبلية .

Rhodeus amarus (S). \* رُهْدُس \*  
Bouvière (F).

١٢٠٤٦ - رُهْمَانِيَّة (F). Rehmannia (S).  
جس نبات مغرق التعريف على اسم العلامة الروسي جوزف  
رهمان (١٧٧٩-١٨٤١). انواعه عديدة جميعها عشبية  
معمره من فصيلة الخنازيريات . سوقها غنية للسماح زياء .  
اوراقها متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل ، سنن الحافة .  
ازهارها كبيرة اللد ، فردية التجميع ، ابيلة الايتكاز .  
اشهر انواعه الزينية ما يقع .

سمكة نهريه من مفتوحات المائنة وفصيلة الشبليات .  
اعطانها بعض انهر الشرق الادنى واروية || جسمها صغير  
القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها صغير الحجم ،  
قصير الخيط . لكنها الاحل يتقدم الاسفل . زعنفتها الظهرية  
وحيدة شبه هرمية الشكل . زعنفتها الذيلية عريضة ، مقعرة .  
ثوبها الى الشهية السمراء الفضية الموج ، تمبق في الظهر  
وبيض في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



رهس

١٢٠٤٧ - رُهْمَانِيَّة سَامِيَّة (S). Rehmannia elata (S).  
Rehmannie élève (F).  
عشبة معمرة مهدبا للثرق الاقصى تلون من ١٠٠ الى  
١٥٠ سم . اوراقها اهليلجية ذلقة الزلم الاخير . نصلها  
شعبي التسنين ، اسنانه مدببة حادة . ازهارها كبيرة اللد  
تطول نحو ٨ سم . وردية اللون يملها مزاج ارجواني  
يقيم مع اقاربها من قاعدة الزهرة || ازهارها صني .

١٢٠٣٨ - رُهْدُك (S). Macronyx

Macronyx, Alouette éperonnée, Sentinelle (F).  
جنس طير من فصيلة القربيات . انواعه قليلة اعطائها  
البلاد الافريقية . تتميز باستطالة ذوارها . اجسامها  
صغيرة اللد ، ألوانها الى الريدة ، ظهورها عابقة ، ريشها  
اغبر الاطراف . يطونها الى الصهبة . ازوارها ملوقة بالاسود  
حواسب بعضها برتقالية اللون || اناسها تدن في الادغال  
تبيض من ٣ الى ٤ بيضات ، لونها الى الزرقه يملوا بقيق  
جويي || قوتها الحشرات والبرور البرية .

١٢٠٤٨ - رُهْمَانِيَّة لَزَجَة (S). Rehmannia glutinosa (S).  
Rehmannie visqueuse (F).  
عشبة معمرة مهدبا الصين واليابان تلون من ٣٠ الى ٦٠ سم.  
ساقها غنية لزجة . اوراقها خلية النصل ، جزوية الصفحة  
السفل ، خضراء العليا . ازهارها صفراء اللون موشحة بالاحمر ،  
اطرافها وردية ، حناها ابيض || ازهارها يستمر من  
نيسان الى حزيران .

١٢٠٣٩ - رُهْدَن \* ، رُهْدُون (S). Pyrrhulanda (S).  
Pyrrhulande (F).

جنس طير رهدن في مشيت من فصيلة القربيات . انواعه  
قليلة تعيش معظم حياتها على الارض . اعطانها البلاد  
الافريقية جميعها صغيرة اللد . اجسامها تطول من ١٣  
الى ١٥ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . ورومها سود ،  
عاسرها يبيض ، ظهورها الى السمرة القزينة ، بطونها سود ،  
خوارقها الى الثيرة ، اجنسها الى السمرة الريداء . اذانها  
مبلقة || اناسها تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة .  
تدن في التربة بين الادغال . حفسنها ثلاث بيضات ، لونها  
الى الخفصة ، طولها رقتة سمراء . ج رهدن .

١٢٠٤٩ - رُهْمَانِيَّة مُصَلَّعة البُرُور (S). Rehmannia angulata (S).  
Rehmannie à graines anguleuses (F).

عشبة معمرة مهدبا الصين . تلون من ٦٠ الى ٩٠ سم .  
اوراقها السفل متقاربة . نصلها لا قياسى التفلين ، خلي  
البشرة . ازهارها تطول من ٦ الى ٧ سم . لونها الى الحمرة ،  
قاعها بتفنجية ، اطرافها ارجوانية موشحة بالابيض .  
يزورها حادة الزوايا مصلصة .

١٢٠٤١ - رُهْرَهْكة (S). Rhyacophila (S).

الهشبي اللثرق ، اطليه .

١٢٠٤١ - رُهْهَس (F). Hypothèque (F). Mortgage (E).  
حق عيني على عقار ثابتاً لدين .

١٢٠٤١ - رُهْهَس (F). Assise (F). Foundation, Basis (E).  
الثرق الاسفل من الحائط .

١٢٠٥١ - رُهْن إِيْصَافِي (F). Hypothèque conventionnelle (F).  
Conventional mortgage (E).

١٢٠٤٢ - رُهْهَس (F). Pressurage (F). Pressing (E).  
شدة العصر لاستخلاص المستطاع من المادة المقصودة .

هو الرهن العقاري الذي ينمق بتراضي الدائن والمدين .

١٢٠٤٣ - رُهْهَطِي (F). طائر يقال له غير السرة .

١٢٠٥٢ - رُهْن الْحَيَاة (F). Nantissement (F).  
Cover mortgage (E).

هو عقد ضمان عيني ينفق بمقتضا المدين او غيره عنه الى  
الدائن ضماناً لديه حيازة مال ثابت او منقول ويحول حقاً  
عينيلاً على هذا المال .

١٢٠٤٤ - رُهْهَكُولِيَّات (S). Rhyacophilidae (S).  
Rhyacophilidés (F). Rhyacophilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد  
المتلة الحرارة || اجسامها متوسطة اللد سمراء اللون .  
اجنسها الامامية مبقية او مزعقة ، اما الخلفية لشفاقة  
مهدبة الخنار الخلفي . قوائمها الامامية مجعزة بمنس  
ظنبوري الايتكاز || اساريمها توش في المياه الراكدة اما  
طليقة او ملسوقة بجلايب شبه انبوية الشكل .

١٢٠٥٣ - رُهْن حَيَاةَ الْفَكَارِ (F). Antichrèse (F).  
Mortgage de revenus (E).

عقد بيع وضع اليد على عقار المدين استيفاء لقوائد والمال  
المطلوب .

اشهر اجناسها :

١٢٠٦٦ - رَوَّاجِين في الدواجن .

١٢٠٦٧ - رَوَّاد \* ، رَهْوُ الْجَنَّةِ

Tetrapteryx paradisea (S).

Tétraptéryx, Grue de paradis (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة الكركيات . أعضائه تشمل البلاد الأفريقية وبعض المناطق الآسيوية بجوها في طلب المرتع والمصيف والمشتى . يذئن عشه ويغضن بيشه في افريقية الجنوبية || جسمه كبير القند ابيض القوام مستطيل الذنب غرزي المنقاد . ثوبه الى الزبد الصنابية الموالج باستثناء خط ابيض يمتد من قاعدة الفك الاسفل عبر الزور والعتق ، الى اعالي الجوشن || ريشه مهذل مرغوب فيه .

Pis de la brebis (F).

Dug of ewe (E).

١٢٠٦٨ - رَوَّاشِح

في ثمل الشاة خاصة .

١٢٠٦٩ - رَوَّالِد اشخاب السقف وسواد البحر .

Coureurs, Ratites (F). عَوَاد

Ratitae (E).

احد قسمي الطير يشمل اربع فصائل التاميات والشنبيات والرفقويات والكويوات . اما القسم الثاني فيشمل الجوزيات .

Bave des bestiaux (F).

Slaver of cattle (E).

١٢٠٧١ - رُوَال

لحاب الدواب ، وقيل لحاب الخيل خاصة .

Blennius pholis (S).

Pholis lisse (F). Shanny (E).

سمكة بحرية من فصيلة الجيتريات . أعضائها بعض بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٧ سم . رأسها مستطيل الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . عيناها صغيرتان ماصحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة تمتد من الرأس الى الذيل . الشرجية ضيقة مستطيلة . الصدريتان مروحيتان . الحوضيتان صغيرتان دقيقتان . الذيلية مقطوعة || ثوبها العلوي الى الطحلة السراء يعلوها موالج يراوح من الاخضر الى الفضي . يعلها الى البياض الاخير || لحمها مأكول ، جيد الصنف .

Oiseaux nocturnes (F).

Nightly birds (E).

١٢٠٧٣ - رَوَّاسِيس

في الطيور التي تسرح في الليل .

Argentine vulgaire (F).

١٢٠٧٤ - رُوْبَاصِيس

سمكة بحرية تدعى غيس فصي ، اطلمها .

Caillé (F). Curd (E).

١٢٠٧٥ - رُوْبِيَّة

خيرة تلقى في الحليب ليروب .

١٢٠٧٦ - رُوْبِيَّة في تلك ، اطلمها .

١٢٠٧٧ - رُوْبِيَّان هو الأريبان ، اطلمه .

Ruppie (S).

Ruppie, Rupelle (F).

١٢٠٧٨ - رُوْبِيَّة

جنس نباتات مائية من فصيلة عراش الماء . أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددا الماء الاجاج في مناطق البلاد الحارة والمتعددة الحرارة . اوراقها غدية الرباط كأوراق النجيليات .

Hypothèque judiciaire (F). Judicial mortgage (E).

هو الرهن القائم على حكم المحكمة أو المحكمين مديلا بالصيغة التنفيذية .

١٢٠٥٥ - رَهْو هو الكركي ، اطلمه .

Grue (F). the Crane, Grus (E).

الرهو كوكبة نجوم جنوبية الموقع . نجوها متصلة العدد ، كائنة المرتبة .

Grue de paradis (F).

١٢٠٥٧ - رَهْوُ الْجَنَّةِ طائر من طوال الساق يدعى رَوَّاد ، اطلمه .

Phaxaceae (S).

Phaxacées (F). Phaxaceae (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبتيات .

Mouton maigre (F). Lean sheep (E).

١٢٠٥٩ - رَهْوْم تعريف وصفي يطلق على الغنم المهزولة .

Amble

١٢٠٦٠ - رَهْوَنَة في الحملية ، ضرب من سير الدواب .

Alutacé (F).

١٢٠٦١ - رَهِيد هو التجميع الدقيق الحيك في كسول الحشرة وتمدها .

Merendera (S).

Mérendère (F).

نبات طبي دوفعي من فصيلة السورجانيات ، جبل الحتام قريب الشبه بالسورجان . دوفعتها شبه غرطوية الشكل . اوراقها من ٤ الى ٥ ، تصالها ثنائية تطويل من ١٠ الى ١٥ سم . تكون مستقيمة في اول عهدها ثم تلحف الترية . زهرتها كبيرة وحيدة بنفسجية اللون سداسية البتلات تقوم على سمرخ متصب يرتفع من ٧ الى ١٢ سم . تنويرها يستمر نحو ثلاثة اسابيع ابتداء من اواخر آب || غواصها الطلية ومنافها لا تختلف عن غواص السورجان ومنافه .

١٢٠٦٣ - رَهِيْطَة \* ، دُمَيْرَا ، رُوْهَو

Labeo rohita (S). Rohita (F). Rohita (E).

دبرا وروبو من اسمائها الهندية . نوع من اللبيس سمكة نهريه يمرض تنتمي الى فصيلة الشبوطيات . أعضائها اكثر انهر المند اصحها انهار الهند وبرمانية || جسمها كبير القند يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . رأسها مستدل الجرم ، مقطوم الخطم . فكها الاعلى يتقدم الاسفل . عيناها كبريتان ، مستديرتان ، ناضرتان . زعنفتها الظهرية واحدة شراعية الشكل . الصدريه سفلية الارتكاز . الذيلية فارقة . ثوبها الى الخضار الاسمر تشد سمرة مع الاقتراب من ثيج الظهر وتحت عند البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٢٠٦٤ - رَهِيْطِيَّات \* Caliciacées (F).

Caliciaceae (E).

عمارة فلور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها قليلة تنضلل على الطحالب والحزاز . ومنها جنس واحد ينضلل على النباتات العليا يدعى قفصاة .

١٢٠٦٥ - رَهِيْق هو الفراح .



رهيدة



رهيلة



رَوَّاد



رُوْبَة

مظهره الخارجي يقع زرقاء اللون حنطية اختار تملو الحب  
تتمثل في المسلك والاعراض كزنج للاحاك العالمة .  
جذوية سمراء المالح .



رويينية مستطيلة

#### ١٢٠٨٦ - رُوثُ الخريق\* ، كونيوليويوم الخريق\* Coniothyrium hellebori

فطر مجهري يصيب اوراق الخريق فيضيتها . مظهره  
الخارجي يقع مستديرة او بيضيه تركب حافة النصل ،  
تبدو حنطية ثم تنحرف الى السرة تنسب يباس وانحناات  
النسج المتحارة || يكافئ عند ظهوره ، باستمال احد  
السوائل النحاسية الخفيفة .



رُوث ابيض

#### ١٢٠٨٧ - رُوثُ الزنبق\* ، كونيوليويوم الزنبق\* Coniothyrium concentricum

فطر مجهري يصيب بعض الزنايق احصها الترس واليوكا  
والباهرة || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والجمع  
تركب نصل الارواق البالغة . تبدو طملا اللون جزوية  
الخمار الى ان تقضي على النسج المتحارة تنسب يباسها  
وانقصاها || يكافئ عند ظهوره باستمال السوائل النحاسية  
الخفيفة .



رُوث الخريق

#### ١٢٠٨٨ - رُوثُ الورْد\* ، كونيوليويوم الورْد\* Coniothyrium wernsdorffiae

فطر مجهري يمتري فروع وافناد الورد فيعطبها . مظهره  
الخارجي يقع قصرية مستطيلة تبدو حنطية اللون ، عريضة  
الخمار الاحمر ثم ترغف وتنسب كالاكلة || يركب  
الانواع الحساسة التي لا تتحمل قرد البرد || يكافئ باقتطاع  
الاعضاء الموصية وبتهجير الجروح .



رُوث الزنبق

#### ١٢٠٨٩ - رُوثيون\* Roténone (F). Rotenon (E).

مادة فائلة تستخرج من جذور بعض النباتات القرنية  
احصها الدريس والحوراء والبير || وهي مادة شديدة  
السمية يذفانها يقضي على جميع الحشرات وكل معظم الالحاك  
الصغيرة . انما لا يؤثر في الانسان والحيوان المامجن .  
ما جعل استعمالها في مكافحة الحشرات ينتشر بسرعة مذهلة .

#### ١٢٠٩٠ - رُوث\* Crottin (F). Dung of horses, mules, etc. (E).

سرجين الخيل وكل ذي سافر . امامة تسميه « فكة »  
وهو من الاسمدة المضوية الشائعة الاستعمال . يذغ بنوع  
خاص الاتربة المنسجة لانه يخفف من تماسك ذراتها  
ومعدها بالحارة المتأينة عن تخفيفه وبالمناصر الغذائية  
التي يحولها || راجع متوسط ما يحواه الرُوث من عناصر  
في مادة سباد .



رُوث الورد

#### ١٢٠٩١ - رُوثة\* Bec des rapaces (F). Bill of rapacious birds (E).

الرُوثة : منقار كواسر الطير . رُوثة الغاب : منقارها .

#### ١٢٠٩٢ - رُوثة\* Caesio (S). Caesio (F). Caesio (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزمانف وفصيلة القرغيات .  
انواعه المعروفة نحو عشرة . اصلاها بحار البلاد الحارة ||  
اجسامها صغيرة القند ، اهلبيكية الشكل ، معتدلة التبيط ،  
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . زانفانها الظهرية مستطيلة  
ريمية المقدم ، شائكة القسم الامامي . زانفانها الذيلية  
فاقة . الزوايا تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الزرق  
ومشتقاتها والركمة الفضية والطحلة الرصاصية || جميعها  
جيدة الصنف ، مأكولة .



رُوثد

نصالحها مخطط مستطيلة متتابعة ترتكز على اصلاح دعمة .  
تتمثل في المسلك والاعراض كزنج للاحاك العالمة .

#### ١٢٠٨٩ - رُوثِيَّة\* Robinia (S). Robinier (F). جنس اشجار وشجيرات حرجية ورزينية من فصيلة القرنيات القرنافية . انواعه عديدة سقها منتسبة شائكة ، اوراقها مركبة ريشية ورية التجميع . ازهارها عقودي الشكل ، ابلي الاركناز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

#### ١٢٠٨٠ - رُوثِيَّةٌ مستطيلة\* ، شجرة الجبراد\* سنتك كاذب\* Robinia pseudoacacia (S). Robinier faux-acacia, Faux-acacia (F). False acacia, Locust tree, Locust acacia (E). Gemeine schen- kzie, Gewöhnlichekzie (D). Robinia, Falsa acacia, Falsa gaggia (I).

اعرف واشهر انواع الرويينية . غروبها عديدة متباعدة  
الحجم والشكل والرائح . اشجارها تملو من ١٠ الى  
٢٥ م . وريقات اوراقها لا تقل عن ٧ ولا تفوق ١٩ .  
ازهارها عناقيد كبيرة تطلو نحو ٢٠ سم . ازهارها عريفة  
الرائحة عديدة الالوان يكثر فيها الالبيش .

#### ١٢٠٨١ - رُوثِيَّةٌ لِرْجَة\* Robinia viscosa (S). Robinier visqueux (F).

شجرة من الرويينية تملو من ١٠ الى ١٥ م . ساقها  
وفروعها قليلة الشوك . نوايبها غنية اللحاء اللزجة اهداها  
حر . اوراقها كبيرة القند . وريقاتها من ١٣ الى ٢١  
نصلها ازغب الصفصعة السفلى . عقودها الزهري منتصب  
الشكل يعمل من ١٠ الى ١٥ نزة ودية اللون يعلوها  
مواج بنسجي .

#### ١٢٠٨٢ - رُوثِيَّةٌ مُهْدَبَةٌ\* Robinia kelseyi (S). Robinier de Kelsey (F).

شجرة من الرويينية تملو من المترين الى الثلاثة امتار .  
ساقها وفروعها سرحة . نوايبها مهدبة اللحاء القدية للزجة .  
اوراقها مركبة من ٩ او ١١ ودية مستطيلة النصل المائل  
البشرة . عقودها الزهري يعمل من ٥ الى ٨ ازهار ، لونها  
الى الوردى المشوح بالاخر . قروبها مبعلطة مهدبة القشور .

#### ١٢٠٨٣ - رُوثِيَّةٌ وُرْدِيَّةٌ\* Robinia hispida (S). Robinier rose, Acacia rose (F).

شجرة تملو من المترين الى الثلاثة امتار . ساقها قليلة  
الشوك . فروعها كثيفة الغلب المشوك الاحمر اللون .  
وريقات اوراقها تمتد من ٧ الى ١١ ، نصلها مائل  
البشرة . ازهارها ودية اللون . عقودها الزهري يعمل من  
٧ الى ٩ ازهار عريفة الرائحة .

#### ١٢٠٨٤ - رُوثُ\* ، كونيوليويوم\* Coniothyrium

جنس فطور مجهري من فصيلة الفصليات . بكتيداتها  
كروية او مغلطة ، محبوسة للمشا ، سطحها الانتشار .  
جوطا لحمي او منسلب الانسجة . شفيراته متشابكة .  
يونفاته بيضية او اهلبيكية ، صغرة ، وحيدة الخلية ،  
سمراء اللون || انواعه عديدة منها حيودة لا تؤذي ومنها  
ضارة تركب الاقصان والارواق || اعرف انواعه المؤذية  
ما يتبع .

#### ١٢٠٨٥ - رُوثُ ابيض\* ، كونيوليويوم الكرتمه\* Coniothyrium dipodiella (S). Coltre, Maladie de la grêle (F). White rot, Livid rot (E).

فطر مجهري يركب حبوب العنب التي اصابها البرد .

## ١٢٠٩٣ - رَوْتَل

*Russula (S). Russule (F).*  
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقويات .  
أنواعه المعروفة كثيرة العدد أعطاهنا معظم أقاليم المناطق  
المعتدلة الحرارة . يعيش عسل المواد النباتية المتحللة  
في الغابات والحراج . أطراسه قرقة ، متساوية ، بيضاء  
اللون أو صفراء . يوفه أبيض اللون أو أصفر . بعض  
أنواعه لذية العلم مأكول والبعض الآخر كاعن الصف  
غير مرغوب فيه .



رَوْتَل أخضر أصفر

## ١٢٠٩٤ - رَوْتَل أخضر أصفر

*Russula cyanoxantha (S).  
Russule verte et jaune (F).*  
نوع من الروتل المأكول ، يكثر وجوده في الحراج الكثيفة  
الإشجار . أروسه شبه مقعرة الشكل ، رقيقة الأطراف ،  
لونها إلى الخضار الأصفر البفسجي المواج .



رَوْتَل شديد السُمرة

## ١٢٠٩٥ - رَوْتَل أغم

*Russula foetens (S).  
Russule fétide (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في الغابات . ساقه  
غلظية ، معتدلة الارتفاع . أروسه شبه قلنسوية الشكل ،  
مضلعة الحافة ، لزجة الملس ، كريهة الرائحة ، لونها  
إلى السمرة الصفراء المواج ، قطرها نحو ١٥ سم .



رَوْتَل مأكول

## ١٢٠٩٦ - رَوْتَل أصفر فاتح

*Russula claroflava (S). Russule jaune clair (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يكثر في المواعع الرطبة  
قرب ضفاف مجاري الماء . أروسه لزجة الملس ، صفراء  
اللون ، قطرها نحو ٨ سم . ساقه بيضاء . طعمه بمذاق  
البتدق .



رَوْتَل مُثَقَب

## ١٢٠٩٧ - رَوْتَل المتابع

*Russula paludosa (S). Russule des marais (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يكثر في المناطق . أروسه  
لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ١٣ سم . لوناً إلى الغبرة  
البفسجية المواج .



رَوْتَل مثقوب

## ١٢٠٩٨ - رَوْتَل زاهد

*Russula consobrina (S). Russule sobre (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في حراج السنوبر .  
أروسه لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ٨ سم . لونها إلى  
الرمادي الاسمر . رائحتها كريهة . مذاقها حامض .



رَوَحَاء

## ١٢٠٩٩ - رَوْتَل سمّجوني

*Russula azurea (S). Russule azurée (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في الغابات .  
أروسه مقعرة الوسط ، قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى الزرق  
السمنجونية . أطراسها بيضاء اللون ، ساقه إلى الطحلة  
البحرية .

## ١٢١٠٠ - رَوْتَل شديد السُمرة

*Russula nigricans (S). Russule noirissante (F).*  
نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في المواعع الحرجية  
الظليلة . أروسه كبيرة فارشة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها  
إلى السمرة اللثامة . ساقه قصيرة .

## ١٢١٠١ - رَوْتَل عقيقي

*Russula sardonica (S). Russule sardoine (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في حراج السنوبر .  
ساقه معتدلة الارتفاع . أروسه كبيرة ، قطرها نحو ١٠ سم .  
لونها يتغير مع العمر ، يبدو أصفر ثم ينحرف إلى الرمادي  
وينتهي بالبفسجي العتيقي المواج .

## ١٢١٠٢ - رَوْتَل مأكول

*Russula vesca (S).  
Russule comestible (F).*  
نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في الغابات الظليلة .  
ساقه قصيرة . أروسه قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم .  
لونها إلى الحمرة العنابية المواج .

## ١٢١٠٣ - رَوْتَل مدّمّي

*Russula sanguinea (S). Russule sanguine (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في حراج السنوبر .  
ساقه معتدلة الارتفاع ، وردية اللون . أروسه إلى الحمرة  
الدموية ، قطرها نحو ٧ سم .

## ١٢١٠٤ - رَوْتَل مذهب

*Russula aurata (S). Russule dorée (F).*  
نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في حراج السنديان  
والمحلل . ساقه معتدلة الارتفاع . أروسه فارشة ، مقعرة  
الوسط ، صفراء اللون ، ذغيب المواج .

## ١٢١٠٥ - رَوْتَل مُقَيّي

*Russula emetica (S). Russule émetique (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في الغابات .  
ساقه بيضاء اللون . أروسه فارشة ، برتقالية اللون ،  
قلوها نحو ٨ سم . طعمه حريف المذاق مقهي .

## ١٢١٠٦ - رَوْتَل مكلّوح

*Russula adusta (S).  
Russule brûlée (F).*  
نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في حراج السنديان .  
ساقه قصيرة . أروسه فارشة مقعرة الوسط ، سمراء اللون  
كأنها ملفقة ، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم .

## ١٢١٠٧ - رَوْتَل ثويّه

*Russula integra (S).  
Russule intégrè (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في حراج  
السنوبريات . ساقه قصيرة ، بيضاء اللون . أروسه  
مقعرة الوسط قطرها من ٥ إلى ٧ سم . لونها إلى الكسفي  
الاصفر المواج .

## ١٢١٠٨ - رَوْتَل هش

*Russula fragilis (S).  
Russule fragile (F).*  
نوع من الروتل الكاعن الصف . يوجد في الغابات .  
أروسه مقعرة ، هشة ، سريمة الطب ، قطرها من ٣  
إلى ٤ سم . لونها إلى الودي الاغبر المواج . طعمها حامض  
المذاق .

## ١٢١٠٩ - رَوَحَاء، روية، تشدّو، تَعَامَة أمريكية

*Rhea (S). Nandou (F). Nandu (t).*  
جنس طير من فصيلة النعاميات . أنواعه ثلاثة ، موطنها  
أمريكا الجنوبية . تتميز بدم قدمتها على الطيران . يبلغ  
متوسط ارتفاعها نحو ١٦٥ سم . الذكر أضخم وأرفع من  
الأنثى || ريشها مهذّل ناعم . عنقها مستطيل القدّ شال



رودن



رودليية البن



رودليية التفاح



رودليية الثوت



رودليية السنديان



رودليية الكاكاو



رودليية الكرمه



روديت مجسد

١٢١١٨ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ التُّفَّاحِ\*، قَسَخُ التُّفَّاحِ  
Rosellinia lardipeda (S). Pourridié du pommier (F).  
فطر مجهرى يصيب جلود التفاح فيؤذيها || مظهره الخارجي  
عفن أبيض ثم اصفر يركب جلود التفاح فيعطب جرادتها  
ويسبب انحلالها || اما اوراق التفاح المصابة فتبدو  
منكشدة النصل ، قامة اللون ، قليلة الحيوية || يكافح  
باستعمال التحفيزات والتطهير .

١٢١١٩ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ\*، قَسَخُ الثُّوتِ  
Rosellinia aquila, R. byssidea, Sphaeria aquila,  
Trichosporium fuscum, Sporotrichum fuscum (S).  
Pourridié du mûrier (F).

فطر مجهرى شديد الاذى يصيب جلود الثوت فيعطبها  
وقد يركب جلود بعض الانجبار الحرجية اليابسة اعصابها  
السنديان واليترو والصنصناف والعرود || مظهره الخارجي  
عفن ابيض يشاهد وشاح اسمر ، يركب جلود الثوت  
يقضي على جرادتها ويسبب انحلالها وموت الشجرة . يكافح  
في الازرة المتدخلة الوطية وينشط في زمن الاوراق .  
يكافح بتحفيز التربة واستئصال الانجبار الميتة وتطهير  
مواقعها بالكلس الحراق وسلفات الحديد .

١٢١٢٠ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ السَّنْدِيَّانِ\* ، قَسَخُ

السَّنْدِيَّانِ  
Rosellinia quercina (S).  
Pourridié du chêne (F).

فطر مجهرى محدود الانتشار يصيب جلود السنديان  
ويؤثره من الانجبار الحرجية كالقيقب والاسنستان والزائن  
والصنوبر والتوت || مظهره الخارجي عفن شفاف ثم  
احمر فاسر يفتحم مشائل الانجبار الحرجية المذكورة اعلاه  
يركب جلودها ويعطيها ويضع بها اشد الاذى . اما  
السنديان فانه يؤذيها حتى عمر عشر سنوات .

١٢١٢١ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَاكَاوِ\*، قَسَخُ الكَاكَاوِ  
Rosellinia pepo, Dematophora (S). Pourridié du  
cacao (F).

فطر مجهرى يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة يصيب  
الكاكاو ويركب جلود الحفصيات جرادتها اصفرار  
الاوراق وسقوطها ويؤثر نحو الباز ويجتذبا || مظهره  
الخارجي كتلة من العفن الاسود المهدب بالامهيب والاصفر  
يركب الجلود فيعطبها || يكافح بالاستئصال والتحفيز  
والتطهير .

١٢١٢٢ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَرْمَةِ\*، قَسَخُ الكَرْمَةِ  
رُوزَلِيَّةِيَّةُ الشَّجَرِ المَحْمُومَةِ\* ، قَسَخُ  
الشَّجَرِ المَحْمُومَةِ

Rosellinia necatrix, Graphium necatrix, Dematophora  
necatrix (S). Pourridié de la vigne, P. des  
arbres fruitiers, Blaque (F).

فطر مجهرى يركب بعض النباتات الزراعية فيؤذيها ،  
منها الكرمة والاجناس والموخ والذائق واللوز والحفصيات  
والشوندرو والبطاطا والفول واللوباء والاراضي شوكي || مظهره  
الخارجي عفونة يضاء تعمرى الجلود فتعطب جرادتها وتسبب  
انحلالها وموتها || يكثر في الازرة الطينية الرطبة || يكافح  
بتحفيز التربة لصفير المياه الزائدة ويثر الكلس وطرمه  
في المياقل والزراعات الموحية . وباستعمال مفلور الكبريت  
حقنًا في التربة بمعدل ٢٥٠ غ لتر المربع الواحد .

١٢١٢٣ - رُوزِيَّةٌ مُجَمَّدةٌ\*

Rozites caperata (S). Rozite ridé (F).  
فطر مأكول من فصيلة الفاريقيات . يوجد في غابات

من الریش . رأسها صغير مبسط ، منقارها مفلطح . تألف  
البراري الشاسعة الاطراف واخضاب القليلة الانجبار .  
قوتها الاغصاب والخشرات . تعيش جماعات قليلة العدد ،  
تألف من ٦ او ٧ اثاث يقودها ذكر واحد || الاثني  
يتبع نحو ٢٠ بيضة . انموذجها صاحي الشكل تنقله  
بالحيش الشام . الذكر وحده يحض البيض من الثروب  
الى الثروب .

Spiritualisme (S).

Spiritualism (E).

الروحانية مذهب القائلين بان النفس غير هوية .

١٢١١١ - رُوزُوعِيَّاتُ\*

Melogrammataceae (F).  
عارة فطور مجهرية من فصيلة الخشريات ورتبة الرقيات  
تتميز بيوتية وسادية تبدو غائرة في التسج ثم بارزة .  
انموذجها سطحية . يوتها يختلف التجميع || لها جنسان  
مؤذين هما الاندوسية والرتقية .

١٢١١٢ - رُودَجة\* Rodage (F). Grinding (E).

الرودجة القيام بعملية الرودج .

١٢١١٣ - رُودَكة\* Ontogénese, Ontogénie (F).

Ontogenese, Ontogeny (E).

الرودكة علم نشو الافراد وتطويعم .

١٢١١٤ - رُودَن\* Fusus (S).

Fuseau, Fusus (F). Fusus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممليات الازيل  
وفصيلة التينينيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٦٠  
منتشرة في جميع بجان البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما  
انواعها المنقرضة وعددها نحو ٥٠٠ فعظمها من متحجرات  
الحقبة الجورية || امداها شبه رشيعة الشكل ، بحيلة  
الالوان والزئرفة ، مخزنة ، مستطيلة الفوعة التي تبدو  
كالزئراب . الحلواها تراوح من ٥ الى ١٦ سم . || جميعها  
منقرضة وقد تشب اصداف غيرها من الرخويات .

١٢١١٥ - رُودُ هو السنديان المزند ، اطلبه .

١٢١١٦ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ\*، قَسَخُ Rosellinia

جنس فطور مجهرية من السخايات وفصيلة السخايات  
تتميز باصاها الفصخة السود التي تنشأ في وسط فيجة  
الفطر . يوتها وسيد الخلية اسر اللون تحمضت كتات مستطيلة  
تصعب التكات الدقيقة . مقها يرتكز في اعل التلول  
الخروطي الشكل || اشهر انواعه ستة تلي .

١٢١١٧ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الْبِنِ\*، قَسَخُ الْبِنِ\* Rosellinia bunodes (S). Pourridié du caelei (F).

فطر مجهرى يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة . يصيب  
البين والشاني والكانور والحفصيات || مظهره الخارجي  
كتلة من العفن الاسود المهدب بالاحمر . وهو يركب الجانور  
المغمورة في الآبار فيعطب اللحاء والشكير وقد يدخل  
حتى القلب فيخضبها بلون زيتي يحيل الى السرة . اما في  
الجلود فانه يعلب الجردة ويقضي عليها || يكافح  
باستئصال الانجبار اللوبوة ويتطهير التربة بالكلس  
الحراق وسلفات الحديد .

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه معتدلة الشفافة والارتفاع ، خيزران يملؤها مواج تبني ، طوقها جمد القزول . تكتمه صيرانية الشكل ، صفراء اللون ، ذهنية الملاج ، مجمدة الحافة ، قطرها نحو ١٠ سم . اطراسها الى الصفراء الباهت || لحيتها جيدة الصنف ، مأكولة .

Aile d'insecte (F).

١٢١٣٠ - رُوشَن \*

Wing of insect (E).

هو جناح الحشرة وقد اسند بالتخصيص الى حشرات رتيبة حشرقيات الانجسة . اشكاله عديدة تختلف باختلاف الفصائل والجناس والانواع .

Elytre (F).

١٢١٣١ - رُوشَن غِشْمِي \*

Elytron, Wing-shard (E).

هو الظهران الثلاث النعدي الذي يلفف الجناح في بعض الحشرات .

Parasitism (F).

١٢١٣٢ - رُوشَنَة ، ضَمَن

Parasitism (E).

حالة الكائن الحي الذي يعيش طفلياً على غيره من الكائنات الحية .

Parc (F). Park (E).

١٢١٣٣ - رُوشَة

حديقة واسعة فيها الشب والماء . فاذا كانت في اعالي البراق والقفاف فهي سلق وان كانت في البطانات فهي روضة وربة . ج روض .

Ancillaria (S).

١٢١٣٤ - رُوطَب \*

Ancillaire (F).

الواحدة وربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبدئات الاربل وفصيلة الطحريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش على رمال الشطوط العميقة || اصداقها مائسة ، شبه اهليجية ، ذلقة الاعتباط المخلطة . صفحتها قليلة التحيز الطولي النحيل الخطوط . الوانها زاهية . احاطها انبوية دقيقة مستطيلة .

Corne (F). Horn (E).

١٢١٣٥ - رُوق

الروق : القرن . « كالثور يحمي انفه برقه » . والاروق ذو الروق اي القرن .

١٢١٣٦ - رُوقش \* ، عُصْفُور مَاسِي \*

Pardalotes punctatus (S).

Pardalote punctué, Oiseau-diamant (F).

طائر من الجولام سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الصرديات . موطنه بعض مناطق استرالية . يألّف الغابات واحراج الاراكاليوس . ملجته الحياتي بجاعي . جماعات متوسطة العدد . قوته الحشرات والبرزور || جسمه صغير القد ، مكردم الشكل ، يطول نحو ٩ سم . قصير المنقاد والجناح والذنب . ثوبه الملوي الى الخضار الالامس تملوه رقة يضاء فضية الملاج تتلاخ كانها قطع من الماس . حاجباه وزرود وصفده وبعده الى البياض الماسي . متقاد شديد السمرة . رسفاه واصابعه الى السمرة الخفيفة || يثنّ اقصومه في الجانف الشديد الانحدار . اقصومه نفق يطول نحو ٦٠ سم . ينتهي بجيرة قطرها نحو ١٥ سم . يعلطها بالياف الاراكاليوس وبعض اخشائن الناعمة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو اسبوعين .

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه معتدلة الشفافة والارتفاع ، خيزران يملؤها مواج تبني ، طوقها جمد القزول . تكتمه صيرانية الشكل ، صفراء اللون ، ذهنية الملاج ، مجمدة الحافة ، قطرها نحو ١٠ سم . اطراسها الى الصفراء الباهت || لحيتها جيدة الصنف ، مأكولة .

Cachet (F). Seal (E).

١٢١٢٤ - رُوسَم

Rochea (S).

١٢١٢٥ - رُوشَة \*

Rochéa (F). Rochea (E).

جنس نباتات بجلية معمرة من فصيلة الخلدات . معقودة التبريف على اسم اليوناني « لاروش » || انواعها المعروفة خمسة مهددا افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها منتصبه تنتمي بقسمه من الازهار المستطيلة الخماسية البتلات . اوراقها متقابلة لحماية النصال الخروطية الشكل . ثمارها جرابية ، خالية الفلق ، عديدة البرور || اشهر انواعها التريينية القريزية واليابسية .

١٢١٢٦ - رُوشَة قَرْمِزِيَّة \*

Rochea coccinea (S). Rochéa écarlate (F).

نوع من الروشة التريينية الشائعة الزراعة . مجلته تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ضمتها ازهرية كبيرة القد ، عكوكية التجميع . ازهارها قمرزية اللون ، فواحة العرف الطري المسحب || تنويرها يستمر من اواسط حزيران الى اواخر تموز .

Rochea

١٢١٢٧ - رُوشَة يَاسْمِينِيَّة \*

jasminea (S). Rochéa à fleurs de jasmin (F).

نوع من الروشة التريينية المبجلة عند معظم الزعارين . مجلته تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ضمتها ازهرية عكوكية التجميع ، متوسطة الحجم . ازهارها الى الصفراء الاخضر الملاج ، شكلها قريب الشبه بالياسمين . عرفها طري مسحب || تنويرها يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار .

Levee des semis (F).

١٢١٢٨ - رُوشَم

Sprouted sowing (E).

اول ما يظهر من الزرع .

١٢١٢٩ - رُوشَك أَزْهَب \*

Cylindronotus lanipes (S). Cylindronote lanineux (F). Cylindronotus lanipes (E).

حشرة خاضلة دائمة من فصيلة النشيات ورتبة نمعدات الانجسة . تألف المواق المشجرة . خنافسها تعيش على اوراق النبات وعلى المواد النباتية المنحلة . يرقاتها غاشية تعيش تحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الالامس الاسفح الملاج . رأسها معتدل الحجم . عيناها صفيرتان بارزتان . زباناها مستطيلان دقيقان . ظهرها ثقل العلف ، يبلغ التحيز النعدي . ارسافها خاسية القفل في الزوسين الامامي والوسطي ، ورابعاتها في الزوج الخلفي . وهي مهدبة . مستطيلة الحذب في الزوج الامامي بما دما الى تسبيتها بالروشك الازغب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواسط الصيف . تسرح في النهار . تساف في حزيران وتبرق المسكن تحت لحاء الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها



روشة قمرزية



روشك أزغب



روشن



روشن نعدي



روطب



روفش



والرتان لا تشابهان تشابهاً كاملاً إذ إن الرنة البرية صغيرة وعريضة تتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون البيرة من فصين أو أكثر. وهي مملوءة بالشحم والشرارين والاوردة والايوية السفاوية والاعصاب.



رنة

١٢١٤٦ - رنة البحر \* Charybdeae (F). Jelly fish (E).  
نوع من المدون يكثر في البحر الاحمر والتميط، يألف جرف الشواطئ. قال في وصفه المشي: «سمكة كسورة القلنسوة شفاقة كشوف الزجاج شبهة بالبيضة يعني الحذوة وما اربعة اجرام في وسطها ترى في الليل سفينة كالقمر اذا حجبها السحاب الرقيق. وما ضوء يشرق على ما حوطا في البحر ولونها ازرق سماوي. واذا احست بالانسان يعمد سوطا او اراد مسكها خرج لها رشاخ لاذع يحرق الجسد مثل شرار النار من سميت. وهو يلقب البحر بساحله كثيراً».



رؤية ندسة

١٢١٤٧ - رؤند هو الركوب والمكيس، الماطلها.

١٢١٤٨ - رؤم \* Gazelle marica (S).  
Gazelle blanche (F). White gazelle (E).  
طلي ابيض الثوب اغبر الماخر عايق الظهر في حجم الطلي المعروف. وهو جميل الشكل، اعين القد، رقيق القوام، خفيف الحركة، مدعش السرب في عدوه. اصابته فسيحة الارباب تشمل جزيرة سوروية وافريقية الشالية حتى ليبيا. الاثني رؤمة.



رؤس

١٢١٤٩ - رتويات Pulmones (F).  
Pulmonate, Pulmobranchiate (E).  
طائفة من الرتويات مديات الاجرل بمقدور افرادها استنشاق الهواء الطلق ذلك لانها مجهزة بمجاز تنفسي هوائي قوامه شبكة وعائية نافذة الى الخارج || فضائلها واجناسها وانواعها كثيرة المدد، جميعها غشوية الثقب تحمل الاضواء الذكورية والانثوية في آن واحد || لذلك تارة ذكرها وتعمل فله في كوم الاثني وتارة اثني وتعمل فلهما تنفيس || تقسم هذه الطائفة الى رتيتين، رتبة الرتويات البرية ورتبة الرتويات البحرية. الفارق المميز بين الاليتين هو ان حيوانات الرتبة البرية مجهزة باربع لواس جاحة في حين ان حيوانات الرتبة البحرية مجهزة بلاستين فقط ولواسها جامدة لا تنفيس || جمع افراد هذه الطائفة تعيش على المواد النباتية ومنها الاعشاب البرية والبحرية.



رنة البحر

١٢١٥٠ - رتويات بحرية، رتويات مائية Basommatophores, Pulmones aquatiques (F).

رتبة من طائفة الرتويات. افرادها ثنائية اللواس الجامدة اللاصقة. عيينا ترتكز على قواعد اللواس || اصنافها متباينة المحرم والاشكال وبعضها عرياط خال من الصدق || جميع افرادها تقرب من سطح الماء وتعلمو تنفس || اشهر اجناسها الفتة والدوب والزيج واللام والانصبل.



رثم

١٢١٥١ - رتويات برئية Stylommatophores (F).  
رتبة من طائفة الرتويات. افرادها رباعية اللواس المنقضة الجاحة || اصنافها متباينة الاشكال وبعضها كامل الهيكل الصفدي كالخلزون والبيض الآخر يملو درع صغير يلف مقدم الظهر كالبراق || اشهر اجناسها الخلزون والبراق والعريوط والعريون.

Laitance, Laite (F).  
Milt, Soft roe (E).

هي المادة الحيوية التي تفرزها الانضاء التناسلية الذكرية في السمك فتلقى بها الذكور على سره الاناث لاصحابه.

١٢١٣٨ - رؤلة \* Roëlle (F).

جنس نباتات جنبية معمرة برية وتروثنية من فصيلة الجريسيات. انواعها المعروفة ١١ مهنها افريقية الانجوية وقد انتشرت زراعة بعض انواعها في البلاد الحارة وفي المراكن والمصارى || سوقها فراء. اوراقها غطية النصال، متعابلة، متناوبة. ازهارها كبيرة الجرم، خاسية البتلات. حيلة الالوان الزاهية المختلفة مع الالوان.

١٢١٣٩ - رؤم \* Lobe de l'oreille (F). Lobe of ear (E).  
هي شحمة الاذن.

١٢١٤٠ - رؤم Rhum (F). Rum (E).

شراب كحولي يستخرج من عصارة قصب السكر بعد تقطيرها وتقطيرها وتديريها وتمتيعها.

١٢١٤١ - رؤمية دسكة \* Rumia maculata, Opisthographis maculata (S).

Rumie maculée (F). Rumia maculata (E).  
حشرة من فصيلة الاريات ورتبة حرشفات الاجنحة.

موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقها خاضعة قوتها اوراق الزرور والبرقوق والذرياء والسنديان || جسمها صغير القد بطول نحو ١٢ م. وسطها نحو ٣٤ م. رأسها مستقيم الجرم. عيناها كبيرتان. زباناها مشطيان عند الذكر، غطيلان عند الاثني. جوشنها وبعثها كثيف الخمل الثام || رؤوشها، عند الشقين، الى الصفار الكبير يميل يملو دسك اشعث وزرقة شظية || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب. تسرح في الليل. تماطل بند ظهورها بستة اسابيع وتمتص الحنك على المسحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تقول من ٢٥ الى ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار تملو ثلاثة ازواج من التلوي الصغيرة. ثوبها الى الطحلة السمرات تملو غطوط متقطعة كستنية. رأسها وموطنها سيد || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحمكها السرعة بين الاوراق التي تجتمها وتجزها بخيوط حريرية.

١٢١٤٢ - رؤند هو الراوند، الماطلها.

١٢١٤٣ - رؤو رهو Rehita (F).

هي الوحيلة، سمكة نهريه، اطلها، والريو من اسمائها الهندية الثالثة.

١٢١٤٤ - رؤيس \* Capite (F). Capitulum (E).

شكل من نظام التنوير السليلي المستجمع يمتد فيه رأس الحور الاصلي حاملاً زيجرات لاسنة.

١٢١٤٥ - رؤة Poumon (F). Lung (E).

المفرد الرئوي في جهاز التنفس. وهي رتان موجودتان في تجويف الصدر يفصل بينهما القلب. وارتة غروطية الشكل قاعدتها مقعرة ترتكز على عضلة الحجاب الحاجز.

## ١٢١٦١ - رِبَاسَات

هو الراوند الرياسي نبات طبي مشهور ، اطبله .

## ١٢١٦٢ - رِبَاسَات \* شَجَر الصَّابُون (S). Sapindus

Savonnier, Artbre à savon, Rita (F). Soap-nut tree, Soap-berry tree (E). Seifenbaum, Seifenbeere (D). Saponaria, Sapotiglia, Noce saponaria (I).

جنس شجر من فصيلة الصابونيات . أنواعه المعروفة ١١ منها البلاد الحارة . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، عابلة . أزهارها عتودي . أزهارها رباعية أو خماسية البتلات ، ثنائية الالوية . ثمارها عتية ثلاثية التفصيص مأكولة في بعض الأنواع || أوراقها والياها وثمارها غنية بمادة الصابونين (Saponine) التي ترغو في الماء وتنظف كالصابون .

Vent (F). Wind (E).

## ١٢١٦٣ - رِبَاسَات

الرياح نسيم الهواء . ج. رياح واريح . وقد أطلق عليها أسماء مختلفة تعود إلى مصدر مهبها . لذلك فالرياح أربع منها الجنوب وهي القبيلة . والشال وهي الشمالية والحدواء . والصبيا وهي الشرقية . والدبور وهي الغربية . وبين الرياح الأربع أربع أخرى وهي الأريب بين الصبا والجوزب والصبابة بين الجنوب والدبور ، والجريباء بين الدبور والشال والحيف بين الشال والصبيا . وأزادوا تاسعة يقال لها الشكاه وهي التي تدور بالكانن فلا يتعين لها مهب . اطبل شصق الرياح || وتنقسم الرياح بالنسبة إلى سرعتها وضغطها وتأثيرها إلى تسع كما هو موضع في الجدول المقابل .

١٢١٦٤ - رِبَاسَات هو الأس المسكي ، اطبله .

١٢١٦٥ - رِبَاسَات أَبْيَض هو ذقن الشيخ ، راجمه .

## ١٢١٦٦ - رِبَاسَات الأَرْض

هو التيصوم وهو بقلة الغزال أيضاً ، اطبلها .

## ١٢١٦٧ - رِبَاسَات الكافور \* (S). Camphorosma

Camphorome, Camphrée (F). Stinking ground-pine (E). Kamferkraut (D). Canforata (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة السرمقيات مهددة الشرق الاوسط واروبة الجنوبية . خواصه ونواته الطبية عديدة . رائحته تشبه الكافور . يستخرج منه مادة زيتية فعالة مقوية تنشط الباه وقد تستعمل كمرقة وضبطة ومدررة للبول .

## ١٢١٦٨ - رِبَاسَات بَرِّي \* رِبَاسَات قَرْشَلِي ، قَرْشَمَشْكَ ، أصابع القنبات

Calamintha acinos (S). Calament acinos, Acinos, Basilic sauvage (F). Acinos, Basil thyme, Wild basil (E). Feldwürze, Wilde basilic (D). Timo campestre, T. salvatico (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الشفويات . يطو من ٢٠ إلى ٣٥ سم . ساقه قصيرة فراء . فروعها خشوية متهلة . أوراقها متعاقبة معتقة بيضوية الشكل . نصلها أقرب البشرة على صفحتها . أزهارها بيضاء يطولها موج وردية . أوراقها وأزهارها عطرية العرف المسحب || يدل على تركيب بعض العقاقير الصحية وهو مضاد للتشنج .

١٢١٦٩ - رِبَاسَات دَاوُود هو المردقوش ، اطبله .

١٢١٧٠ - رِبَاسَات سَلْبِيَتَان هو حب الرمان ، راجمه

## ١٢١٧١ - رِبَاسَات ٥ Phragmosporées (F).

Phragmosporae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات ، تتميز بيوغافها

## ١٢١٥٢ - رِبَاسَات ، مُقَدَّمَات Primates

رتبة من الثدييات تشمل ثلاث مراتب : البشرىات والقرديات والليموريات .

## ١٢١٥٣ - رِبَاسَات Irrigation

الري من الوجهة العلمية هو السياسة المالية التي تهدف إلى الانتفاع من المياه على أكل وجه ممكن . وهو من الوجهة العلمية وضع ودرس الاصول والوسائل اللازمة لتقاية الارض وأحياء بورها .

اسم الريح يقابلها بالفرنسي	تأثيرها	سرعتها في الثانية	ضغطها بالكيلو
نسيم، ريدة <i>Vent très faible</i>	تمزق الورق	٢	٠,٥٠٠
رياح <i>Vent frais</i>	تنشئ الصالحات	٤	١,٩٦٠
زفافة <i>Vent vif</i>	تنشئ الفروع	٦	٤,٤٠٠
ساعكة <i>Vent fort</i>	تحرك الشجر	٨	٧,٨٤٠
مجوم <i>Très fort</i>	تنسقط الورق	١٣	٢٠,٧٠٠
عاصفة <i>Tempête</i>	تقصم الاغصان والفرع	٢١	٥٤,٠٠٠
زعر <i>Forte tempête</i>	تكسر أو تنقل الشجر	٢٨	١٠٣,٠٠٠
زبعة <i>Ouragan</i>	تهدم بعض الابنية	٣٤	١٤١,٠٠٠
إعصار <i>Cyclone</i>	تخرّب كل شيء	٤٠	١٩٦,٠٠٠

## ١٢١٥٤ - رِبَاسَات Ecluse (F). Lock, Sluice (E).

حوض يحكم البناء يمتدح مجرى المياه اللانسيوية السطح ، له قداسان مدققي ومسيبي . رفع القداس المدققي يسحب بدشول المركب إلى الحوض ورفع المسيبي يسمح بخروجه من الحوض .

## ١٢١٥٥ - رِبَاسَات Plantes aromatiques (F).

Aromatic plants (E).

النباتات العطرية الفواحة العرف . الواعدة ريحانة .

## ١٢١٥٦ - رِبَاسَات Mathématiques (F).

Mathematics (E).

اصطلاح يطلق على مجموعة من العلوم الحاسبة والهندسية تشمل نة الرياضة البحتة التي تنم بالحساب والجبر والهندسة وحساب التكاليف والتفاضل ... وثقة الرياضة التطبيقية التي تنم بالآليات وعلوم الفلك والبصريات الخ ...

## ١٢١٥٧ - رِبَاسَات Abondance de récoltes (F).

Abundance of harvest (E).

هو غصب المحاصيل الزراعية .

## ١٢١٥٨ - رِبَاسَات Salive des insectes (F).

Saliva of insecta (E).

الريال والريفة هو لعاب الحشرات .

## ١٢١٥٩ - رِبَاسَات \* Euchlaena mexicana (S).

Reana, Téosinte (F). Teosinte (E). Teosinte (D).

نبات عشبي كلائي من فصيلة النجيليات مهددة المكسيك وقد تمت زراعته جميع مرابي البلاد المعتلة الحارة .

## ١٢١٦٠ - رِبَاسَات Protobe (F). Protobe (E).

الريب اسم يطلق على كل كائن حي متناهي الصغر والذقة لا يشاهد تحت عدسة المظهر المادي .





دريزوس

٣. م رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، بارزة .  
تأشيرها ضليعة . ملاسها الفكية كبيرة . قربنها الاستشعارية  
صوبانية الشكل . كواسلها مكورة . اغلامها قصيرة ؛  
تلحف نصف البطن . قوتها نسيطة . اثوابها وحيدة اللون  
الجوي أو الكسئي او الاسود || جميعها مقترنة او دامتة .  
تسرح في الليل .

Pennis (F). Pinnate (E).

نعت تمريني يطلق على الاعضاء الحيوانية والنباتية الشبيهة  
بالريش .

## ١٢١٨٢ - ريفيتات الأحثاك ، صمغيات



رسة ثلاثة الاصابع

١٢١٨٢ - ريفيتات الأحثاك ، صمغيات  
Mysticetes (F).  
مرتبة حيوانات بحرية ولودة لبنونة من رتبة الحويطات ،  
تشمل الحيتان المأمدة الانسان ، الرينية الصمغيات الحكيكة ||  
انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرين جميعها ثلاث فصائل :  
الباليات والغاليات والمركليات .

Rendement, Revenu (F).

Produce, Revenue (E).

الريع هو ما تفلح عينا او نقدا ساسة معلومة من الارض .

## ١٢١٨٣ - رينغ

١٢١٨٣ - رينغ هو برج الحام ، ج رباح وأرباع .



رشتاخ

Rhyphus (S).

Rhyphus (F). Rhyphus (E).

١٢١٨٥ - ريفس \*  
جنس حشرات من ذوات الجنان من غيليات القرون وضيفة  
القسميات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم  
اقطار الشرق الاوسط واروبية . تألف البراري والحدائق  
والمنازل || اجسامها صفراء اسطوانية الشكل . رؤوسها  
مكورة . عيونها بارزة . قربنها والاستشعارية غليظة .  
مرفقة التركيب . قوائمها مستطيلة . راسها مستطيلة  
شفافة . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها السمرة  
والشبهة والكهبة .

Rural, Agreste (F).

Rural, Rustic (E).

نعت وصفي يطلق على معظم الاشياء المختصة بالريف ،  
كقولك الاعمال والصناعات والمآكن الريفيه .

١٢١٨٧ - ريفينس \* Rivina (S). Rivine, Rivinie (F).  
Rought plant, Carpenter's herb, Blood-berry (E).  
Rivinie (D). Rivina, Erba da legnaioli (I).

جنس نباتات عشبية حولية برة من فصيلة الكليات .  
انواعها ثمانية ، اوراقها معتقة متعاقبة ، نصلها مالى  
البشرة ، متواج الصفحة ، عايق الخضار . ازهارها متعدي  
التجميع ، ابلي الانكاز . ازهارها صفراء اللون ، خماسية  
البتلات البيض . ثمارها نوية ، وحيدة السمة ، قمرية اللون .

Ricotia (S). Ricotia (F).

١٢١٨٨ - ريكونيا  
جنس نباتات عشبية حولية برة من فصيلة الصليبيات .  
انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الحارة  
في العالم القديم || سوقها غراء ، معدلة الارتفاع . اوراقها  
متعاقبة ، ثنائية او ثلاثية التفصيل الريفي . ازهارها  
صفيرة ، مفرصة البتلات ، وردية اللون او بيضاء دسنة .  
اشهر انواعها :

R. lunaria (S)

R. lunata (S)

ريكونيا قمرية

ريكونيا عوجاء

المزورة المديدة الحلايا . اجناسها المشهورة : الدنيسه ،  
الزغبارة ، الزحاط ، الرزة ، الزنينة ، السرتوة ، السنجة ،  
الشيفة ، الصوب ، الطرير ، الناصورة .

Vent très faible (F).

Very weak wind (E).

هو التسم يتبر به اوراق بشفة .

١٢١٨٣ - ريزوترونك هو الجبل الصيني ، اطليه .

١٢١٨٤ - ريزوتوتونك \* ، ريزوتوتونك

Rhizoctonia (S). Rhizoctone (F).

جنس فطور مجهرية من السنيات . ونياته ثولولية جميعها  
منجج كتيث يتكاثر على الاعضاء النباتية الدماسية .  
يهف قليل التشعب عديد الفواصل والفواصل الاسطوانية .  
انواعه قليلة العدد والاذخ .

١٢١٨٥ - ريزوم هو الجذور ، اطليه .

١٢١٨٦ - ريزوميس \* Rhizomys (S).

Rhizomys, Rat des bambous (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الخلدات . انواعه  
سنة اجسامها اسطوانية . طولها يراوح من ١٨ الى ٥٠ سم .  
اذنابها دقيقة متصلة القذ تطول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها  
غليظة ، شبه مستديرة . عيونها غريزية الشكل . آذانها  
جذعة ملساء القوقعة . اثوابها تراوح من الاصهب الى الكسئي  
الجوي . انابها تقصع من جرون الى اربعة .  
قوتها الجذور والجرب واللحاء تسرح في الليل لانتفاها .  
تألف الاتفاق التي تخلفها في التربة على اعماق مختلفة  
تراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم .

## ١٢١٨٧ - ريسة ثلاثية الاصابع \*

Rissa tridactyla (S). Risse tridactyle (F).

طائر من كتيبات القدم وضيفة التوسيات . يعتبر من  
القاطع لانه يمضي فصل الشتاء والبرد على شطوط البحر  
الابيض المتوسط ويمضي فصل الصيف في المناطق القطبية ||  
جسمه معتدل القذ يطول نحو ٣٧ سم . جناحه كبيران ،  
ذلفان ، لاسفان . ذنبه معتدل الحجم ، مقطوم الطرف .  
قدمه ثلاثية الاصابع . سظابه لا يكتنف كامل الاصابع .  
ثوبه متراكب البيض والشبهة الزرقاء المزاج . جناحه  
موشحان بالابيض والاسود .

Plumes (F). Feathers (E).

١٢١٨٨ - ريش  
انابيب ظفرية للمادد يملؤها الزغب والغبب والشعاع تثبت  
في معظم مناطق جلد الطائر . فانذها انها موصلة رديئة  
للحرارة توقي الطائر شر التقلبات الجوية وانها تخفف  
الثقل النعوي فتساعد على الانتقال في الجو . الواحدة ريشة  
والجمع ريش ورياش وارياش .

١٢١٨٩ - ريشن Sinécure (F). Sinecure (E).

مركز اجتماعي او لقب يدر على صاحبه المال الوفير ولا  
يوجبه المبادلة بأي عمل او وظيفة .

١٢١٩٠ - ريشنباخ \* Reichenbachia (S).

Reichenbachie (F).

جنس حشرات من فصيلة البسلانيات ورتبة عمديات  
الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مرج  
البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى



رينية

## ١٢١٩٢ - رِيَهْدِرْمَة ° Rhinoderma (S).

Rhinoderme (F). Rhinoderma (E).

جنس صفادع من فصيلة الرزانيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددا أمريكة الاستوائية والوسطى || اجسامها صغيرة القد، تطول من ٤ الى ٥ سم. عند الذكور، ومن ٥ الى ٧ سم. عند الاناث. رؤوسها محرمة تنتهي بقذبة لحمية في مقدم الخنطوم. فكوكها السفلى عادية الاسنان. اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بمخاطب ضعيف لا يتجاوز الزام الاول. جلودها ماعة مبعثرة الثوبل. اثنائها الى الخفسار الاسمر يعلوه موج اصفر ورقشة جؤوية لاقياسية الشكل والقد || ذكورها مجهزة بجيوب فية تحتل مركز البلغة الصوتية وتفتح حتى مستوى البطن، تؤدي مهمة التقيق وحسن الدخيل الذي لا يتجاوز عدده ١٥ دعبلة يأخذها الذكر بطرف لسانه عند التسرده ويدخلها في الجيب فتبقى الى ما بعد النفث حتى يتم التطوير البلعطي، تفسرج الصفار من افواه ابائها كاملة العدة تسرح حيث تشاء || تدبش من ١٥ الى ١٢ سنة. تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها الحشرات والديدان.

## ١٢١٩٣ - رِيَه °

هي الروحاء، طائر من النعاميات، اطلبها.

## ١٢١٩٤ - رِيَهَان ° هو الزعفران المزروع، اطلبه.

## Gazelle blanche (F).

White gazelle (E).

رابع ريم. ج آرام. قال الاسمي: الأرام الظباء البياض الخالصة البياض وهي تسكن الرمل. وهذا النوع من الظباء يقال انه ضالها لانه اكثر شمسا وحملا || اما البيري فيقول: الرم ولد الظبي والجميع آرام ويستشهد بقول الشاعر بها المير والأرام يحسن خلفه

والريم ايضا هو الجبل الصغير.

## ١٢١٩٥ - رِيَنَكْسُورِيُوم ° Rhynchosporium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات. مشيجه أدبي الانتشار. وبنته سطحية فارشة، كنانته صغيرة مركبة، لا قياسية الشكل والحجم || انواعه قليلة، اعرفسا رينكسوريوم الشيلم.

## ١٢١٩٦ - رِيَنَكْسُورِيُوم الشيلم °

Rhynchosporium secalis

فطر مجهري يصيب عصف بعض النجيليات اغصنها الشيلم || مظهره الخارجي يقع مستطيلة ميمرة او كهيئة التجميع، تبدو صغيرة ثم تنتشر فيبلغ طولها نحو ٢٠ م. تركب تصال واتحاد العصف، لوها آل الزرة يعلوها موج اغبر ثم ينحرف الى الاغبر الرصاصي وينتهي بالتني تحوفة حالات واطارات شاحية وفححية || يسبب بياس العصف وضعف الاسبال وتحول الحب.



رينكسوريوم الشيلم (١)



رينكسوريوم الشيلم (٢)



ز

Affermer (F). To farm (E).

١٢٢٠٤ - زَارَعَ  
زارع فلاناً : عامله على الارض يبعث انتاجها . اطلب  
مزارعة .

١٢٢٠٥ - زَارَعَ ، مُزَارِع ، مُزَارِع  
Agricuteur (F).  
Agriculteur (E).

« هو الذي يستغل ارضه مستخدماً عمالاً أو فلاحين »  
تعديد الامير مصطفى الشهابي .

Corvus corone (S).

Corneille, Corbeau-corneille (F). Carrion crow (E).  
Rabenkrähe (D).

طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم . توبه  
الى السواد الاسفع البفسجي المالح . موطنه الشرق الاوسط  
واروبه وافريقية الشمالية . يعتبر من الطيور الضارة  
لانه كثير الاذى . فوته اللديدان والحشرات والجرب  
والبيار الناقش والبار الخ . || يئش في الانهار  
الرفيفة . الاثنى تحضن وحدها من ٤ الى ٦ بيضات لزها  
الى الزقة المحفراء يملوا توشم اسمر .

١٢٢٠٧ - زَالَف

يقال زاف عليها فزافت له اي مكته من سفادها وعذا  
في الطيور الجوارح (الجاحظ) || وزاف الديك :  
نشر جناحيه وذنبه وجبها على الارض .

١٢٢٠٨ - زَالِي

هو ذكر الصدى ومنهم من قال الديك : ج زواقي .  
قال ثوبة بن الحمير صاحب ليل الاغيلة :

« ولو ان ليل الاغيلة سلت  
على ودوني سئل وصفاً  
سلمت تسليم البشاشة أو زفا  
اليسا صدى من جانب القبر صائح

Sulfate, Vitriol (F).

Sulphate, Vitriol (E).

اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض الاملاح اخصها  
سلفات الحديد والنحاس والرصاص الخ ...

Vitriol blanc (F).

White vitriol (E).

هو سلفات الزنك من الاملاح المزدوجة التابعة الى سلسلة  
الاملاح المنفزية .

Vitriol vert (F).

Green vitriol (E).

هو سلفات الحديد من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة  
الاملاح المنفزية او سلسلة الاملاح الشبية .

Vitriol bleu (F).

Blue vitriol (E).

هو سلفات النحاس من الاملاح المزدوجة التابعة  
لسلسلة الاملاح المنفزية .

Autrucherie (F).

Ostrich-farm (E).

المكان المخصص لتربية الترح اي النعام .

١٢٢٠٠ - زَاحَف

Procombant (F). Procumbent (E).

نمت تمرني يطلق على النبات الذي يزحف على الارض .

١٢٢٠١ - زَارَاة

Jonchère (F). Sprinkling (E).

الاجرة ذات الماء والخلفاء والقصب .

١٢٢٠٢ - زَارَاة ، زَاوَرَة

Gésier (F). Gizzard (E).

هي الحوصلة وقد صار تخصيصها بغير الماء والمناقع .

١٢٢٠٣ - زَارَاة

Hippobosque (F). Hippobosca (E).

هي الشمرا ذباب يقع على الابل والدواب والكلاب .

١٢١٩٥ - زَاج

١٢١٩٦ - زَاج أْبَيْض

١٢١٩٧ - زَاج أَخْضَر

١٢١٩٨ - زَاج أَرْزَق

١٢١٩٩ - زَاجُوجَة

زَاغ

من ٣٠ إلى ٤٠ م. أوراقها عابلة تطول من ٨ إلى ٢٠ سم. عرقها ثلاثية أو خاسية الأزواج. أغلفة زاناتها مستطيلة لاحقة || ترطب في جبال البلاد المعتدلة الحرارة. تكثر في المناطق الواقعة بين ارتفاع ١٢٠٠ و ١٨٠٠ م.

١٢٢١٧ - زَان يَابَانِي *Fagus japonica* (S).  
Hêtre japonais (F). Japanese beech (E).

نوع من الزان يعلو من ١٥ إلى ٢٠ م. أوراقها تطول من ٨ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٤ إلى ٨ سم. نصلها غمد الصفحة، مسن الحافة، كثير المروق التي يراوح عدد أزواجها من ١١ إلى ١٤ || أغلفة زانات قصيرة اللد سنانية الشكل، حشوية التركيب || يرغب في المواقع الجبلية الرطبة.

١٢٢١٨ - زَالِيَّة \* *Faine, Fêne* (F).  
Beechnut, Beechmast (E). ثمرة الزان ج زانات.

١٢٢١٩ - زَانفِيل ، زَنْطُوفِيل *Xanthophylle* (F).  
Xanthophyll, Xanthophyll (E). شقاع اصفر يوسد في اوراق التبان.

١٢٢٢٠ - زَاوِيَّة *Angle*  
هي الانفرج الحاصل من تلاقي خطين مستقيمين يبرقان بفضلي الزاوية. اما نقطة التلاقي فتدعى رأس الزاوية. وتقسّم الزوايا الى ثلاثة انواع. كل زاوية قائمة يبلغ مقدارها ٩٠° تدعى حادة وكل زاوية اصغر من الحادة تدعى حادة وكل زاوية اكبر من الحادة تدعى منفرجة.

### ١٢٢٢١ - زَاوِيَّة الْإِنْشِكَاكْ

*Angle de frottement, A. de friction* (F). Rubbing angle, Friction angle (E).

١٢٢٢٢ - زَاوِيَّة الْإِنْشِاب *Angle d'insertion* (F).  
Insertion angle (E).

١٢٢٢٣ - زَاوِيَّة الْإِنْحِرَاف *Angle d'inclinaison* (F).  
Inclination or slope or dip angle (E).

١٢٢٢٤ - زَاوِيَّة الْإِنْخِفَاض *Angle de dépression* (F).  
Depression angle (E).

١٢٢٢٥ - زَاوِيَّة الْإِنْكَسَار ، زَاوِيَّة السُّفُوط *Angle d'incidence* (F).  
Incidence angle (E).

١٢٢٢٦ - زَاوِيَّة الْقَدَف *Angle de projection* (F).  
Projection angle (E).

١٢٢٢٧ - زَاوِيَّة جَالِسَة ، زَاوِيَّة قَائِمَة *Angle droit* (F).  
Right angle (E).

١٢٢٢٨ - زَاوِيَّة حَادَة *Angle aigu* (F).  
Acute angle (E).

١٢٢٢٩ - زَاوِيَّة حَرَجَة *Angle limite* (F).  
Limit angle (E).

١٢٢٣٠ - زَاوِيَّة زَوْجِيَّة *Angle dièdre* (F).  
Dihedral angle (E).

١٢٢٣١ - زَاوِيَّة قَبْوِيَّة *Angle apsidal* (F).  
Apsidal angle (E).

١٢٢٠٩ - زَالِيَّة *Schizophyllum commune* \*

١٢٢١٠ - زَام *Quart* (F). *Quarter* (E).  
الزام : الربع من كل شيء.

١٢٢١١ - زَامِج \* *Schizophyllum commune*  
فطر من الفاريفوريتات يركب اغصان وجنوع بعض النباتات الحرجية والمثمرة منها الكرز والمشمش والخوخ وقد شوهد على سوق الثوت وعلى ثمار التفاح الناضجة الساقطة. يركب القشور الخشونة أو المغطوة من لفحة الشمس فيتركز عليها ويرى بمشبه حتى التكثير فيفسد التبادل النسفي بعد ان يبقى على الاوعية || مظهره الخارجى، نحيل ما يبدو في هذا الرسم، وهو كثيف التجميع، نحيل البنية الدقيقة السريعة العطب || يكالغ باستتصاله ويتطير المرح وظلي بالمستيك.

١٢٢١٢ - زَامُور *Naucrotus ductor* (S).  
*Naucrote* (F). Pilot fish (E). سمكة بحرية من الشيميات طوطا نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الزرقه انغمراء يعلوها موج فقي ومته خطوط سود قاطبة مستعرضة.

١٢٢١٣ - زَامِيَّة \* *Zamia* (S).  
*Zamie, Zamier* (F). *Jamaica sago tree* (E). *Zapfenpalmbarn* (D). *Zamia* (I).  
جنس نباتات غلغلة الجذع والأوراق من فصيلة السيكاسيات ينمو بالبلاد الامريكية الاستوائية || انواعها المعروفة ٣٠. جلوسها غليظة وقصيرة. سفلها كثيف التجميع، مستطيل الجريد، مخنن الزام الاخير || بعضها ربيبي وبعضها زراعي يستخرج من ثمارة مادة نشوية مأكولة تفر بالساغو (Sagou).

١٢٢١٤ - زَان *Fagus* (S). *Hêtre* (F). *Beech tree* (E).  
*Buche, Buchbaum* (D). *Faggio* (I).  
جنس اشجار وشجيرات برية حرجية من فصيلة الفقيديات انواعه نحو ١٥ نوعها متصبية جالسة. أوراقها معتقة متعاقبة. نصلها يضيي الشكل، مدبب المقص، يبرز المروق، غمد الصفحة، مسن الحافة. ازهاره الذكورية درؤسية التجميع. ثماره زور هربية الشكل حادة الزوايا تدعى « زانة ». اغصانها صلبة قوية مرنة صناعية شائعة الاستعمال. لحاء اشجارها دابة || بزوره علفية. اغلفة بزوره تحوي بعض المواد الجحالية الصارة تؤذي الحيل والحير وتسن الفم والمخارز والحنازير.

١٢٢١٥ - زَان آمْرِيكِي *Fagus ferruginea* (S).  
*Hêtre américain* (F). *American beech* (E).

نوع من الزان يعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. أوراقها تطول من ٦ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. نصلها غمد الصفحة، منشاري الحافة، كثير المروق التي يراوح عدد أزواجها من ١١ الى ١٧ || وهو من الاشجار السريعة النمو النسبي. يرغب في المواقع المعتدلة الرطاب.

١٢٢١٦ - زَان مَعْرُوف \* *Fagus sylvatica* (S). *Hêtre commun, Fau, Fauce, Fayard, Foyard, Fouteau* (F). *European beech, Common beech* (E). *Echte buche, Buche boom, Rot-buche* (D). *Faggio comune* (I).

اشهر انواع الزان واعما انتشاراً. ضروبه عديدة منها الايبواني والكبير الورق والمناج والمسنى والسندبادي المغربي... جميعها من الاشجار الكبيرة الحجم تملو



زَامِج



زَامِيَّة



زَان مَعْرُوف



زَانَة



زَايَةِ الْجُلُود



زَايَةِ الدُّرَّة



زَايَةِ حَفْلِي



زَايَةِ هَدَامَة



زَبِ الْبَحْرِ



زَايَةِ شَامَةِ



زَايَةِ قُرْنَة



زَايَةِ مُقَدَّسَة

## \* ١٢٢٤٨ - زَايَةِ هَدَامَة \*

Pseudomonas destructans (S).

طول البكتيرية نحو ٨ مي. تركب بعض النباتات أخصها  
الوقت فتسبب اصفرار الأوراق وذبولها. يعقبها ارتفاع  
الجنور ثم اسمرارها وكرامية وانحسارها.

١٢٢٤٩ - زَايَةِ هُو الصولي، أطبله.

Penis

١٢٢٥٠ - زُب، عَوْف، قَصِيب

ذكر الحيوان.

١٢٢٥١ - زُب الأرض هو الطرثوث، أطبله.

Aktinos (S).

\* ١٢٢٥٢ - زُب الْبَحْرِ \*

Actinie, Anémone de mer, Ortie de mer (F).

Actinia, Sea-anemone (E).

جنس حيوانات دنيا من البويضات السيات البحرية.  
انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاجسام فلب فيها الساق  
الانبوبية والطرف الاثلاث المذهب الخار. جميعها  
لحية نابضة سريعة الانقباض والانتشار، مشربة  
المسس، زاحية الاولان اللاصقة من الوردي الى القرمزي  
والاصفر والازرق البنفسجي. يوجد منها في المياه  
اللبانية. تعيش على الصخور المغشوة بلالة. قوتها ما وصل  
اليها من هوام وحشرات مائية. وهي مأكولة يقال انها  
مستحبة الطعم.

١٢٢٥٣ - زُب الْكُوم هو الفلوس، أطبله.

Sorex, Crocidura (S).

\* ١٢٢٥٤ - زَايَةِ

Musaraigne (F). Shrew (E). Woldspitzmaus (D).

جمع زباب. جنس حيوانات صغيرة القند من الزبابيات  
الخافضات. أنواعها نحو ٤٠ ومنها العالم. اجسامها  
رشيقة مستطيلة خلية الور. رؤوسها واعظها دقيقة.  
اذنانها سدترة. قوائمها قصيرة. اطرافها حادة. اذنانها  
دقيقة، مستطيلة، حلبة الشعر. من اطرافها انها تحمل  
في عوصها يسمى قوائمها الحلقية غدد مسكية فواحة  
الرائحة. اناتها تنفع من ٤ الى ٦ ادواس ترسمها  
من شهرين الى ٣ اشهر. اشهر انواعها ما يلي.

\* ١٢٢٥٥ - زَايَةِ شَالَمَة \*

Sorex araneus, S. vulgaris (S). Musaraigne commune, Musette (F). Common shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى الرمادي الاشول يقيم على  
اقترابه من ثوب الظهور ويبيض عند البطن. طولها الكمال  
من ١٢ الى ١٣ سم. علوها نحو ٣ سم. تألف الجبال  
والسهول والادوية والحقول. قوتها الحشرات والديدان  
والبراقر والحلزونات وفار الزرع.

\* ١٢٢٥٦ - زَايَةِ قُرْنَة \*

Sorex pygmaeus, S. minutus (S). Musaraigne pygmée, M. naine (F). Pygmy shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى السمرة الصهباء. بطنها اغبر  
الون. طولها من ٨ الى ٩ سم. تألف الاحراج  
والغابات الكثيفة. قوتها الوزغ والحشرات على اختلافها.

\* ١٢٢٥٧ - زَايَةِ مُقَدَّسَة \*

Sorex religiosus, Crocidura religiosa, Suncus sacer (S). Musaraigne sacrée (F). Sacred shrew (E).

نوع من الزباب، ثوبها الى السمرة الصهباء يقيم على  
الظهور ويغبر عند البطن. طولها يراوح من ١٥ الى

Equerra (F).

Square, Knee-piece (E).

## \* ١٢٢٢٢ - زَايَةِ مُثَلِّة

الزاوية المثلفة ومثلث المساح واحد.

Angle plan (F).

Plane angle (E).

## \* ١٢٢٢٣ - زَايَةِ مُسْتَوِيَةِ

## \* ١٢٢٢٤ - زَايَةِ مُنْحَنِيَةِ الْخَطِّينِ

Angle curviline (F). Curvilinear angle (E).

Angle obtus (F).

Obtuse angle (E).

## \* ١٢٢٢٥ - زَايَةِ مُتَقَرِّجَةِ

Radian

## \* ١٢٢٢٦ - زَايَةِ نَصْفِ الْقَطْرِ

Angles alternes (F). Zَاوِيَتَانِ مُتَبَدِّلَتَانِ

Alternate angles (E).

## \* ١٢٢٢٨ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَامَتَانِ

Angles complémentaires (F). Complementary angles (E).

Angles opposés (F). Zَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ

Opposite angles (E).

## \* ١٢٢٤٠ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَاطِرَتَانِ

Angles correspondants (F). Correspondent angles (E).

Angles adjacents (F). Zَاوِيَتَانِ مُتَوَالِيَتَانِ

Adjacent angles (E).

## \* ١٢٢٤٢ - زَالِد، قَائِض

Excédant (F).

Exceeding (E).

Appendice (F). Appendix (E).

كل عضو زائد في الجسم الحيواني والنباتي.

Pseudomonas (S).

## \* ١٢٢٤٤ - زَايَةِ

زائفة ج زائفت. جنس بكتريات من فصيلة القضيبيات.  
انواعه عديدة تتميز براكاتها الاسطوانية، بقطبيها للمهدين  
وباعداها للتحركة. انواعها المؤذية قليلة تنحصر منها.

## \* ١٢٢٤٥ - زَايَةِ الْجَدُّورِ \*

Pseudomonas radicolica (S).

طول البكتيرية نحو ٤ مي. اذناها غليظة سوية.  
تركب جلور الفطائيات قطعها. مظهرها الخارجي  
درينتان صغيرة مبراة اللون مبررة على الجلود والورثرو.  
تتكاثف بتعظيم البذار والتربة.

## \* ١٢٢٤٦ - زَايَةِ الدُّرَّة \*

Pseudomonas stewarti (S).

طول البكتيرية ٢ مي. اذناها نحيلة. تصيب الذرة في  
زمن ازدهارها وتركب الأوراق وذبلها وتقضي على النبات.  
تتكاثف بتعظيم البذار والتربة.

## \* ١٢٢٤٧ - زَايَةِ حَقَلِيَّة \*

Pseudomonas campestris (S).

طول البكتيرية نحو ٥ مي. تصيب الملفوف واللفت  
والخردل وغيرها من الصليبيات. تركب، اعصاب  
الاوراق فتسبب اصفرارها ثم اسودادها وتصيب الجلود  
فتفسد مأكلاها ثم تموتها. يحسن اجتناب تخفيض  
النبات لانه السبب الوحيد في انتقاله وبطشه. يكافح  
بتعظيم التربة.

١٢٢٦٤ - زَيَّادَة سَوْدَاء \*  
Arctitis (S).  
Arctitide, Binturong (F). Arctitis, Binturong (E).  
جنس حيوانات لبونة من الزباديات. موطنها الهند  
اجسامها مستطيلة. قوائمها قصيرة. رؤوسها مسترسفة  
اثوابها سوية اللون الاسود. يراوح طول اجسامها من  
٧٠ الى ٨٥ سم. واذنانها من ٩٥ الى ٧٠ سم. || تألف  
الاجراج الكثيفة. تنقلق الاجنار. تسرح في الليل.  
قوتها الحيوان والطيور والسلم والحشرات والثمار.

١٢٢٦٥ - زَيَّادَة مَلَقَّة \* وِس  
Viverricula malaccensis (S). Civette de Malacca.  
Petite civette de l'Inde, Rasse (F). Rasse civet cat (E).  
نوع من الزيادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٦٠ سم. وذنبها  
٤٠. ثوبها الى الصبغة اليرداء يملو تحطيط مترص  
اسود. فيج ظهرها اسود يكتنفه خطان عايجان. رأسها  
اسمر. صدرها ملوك بالايبض || موطنها يمتد من  
ملقة الى الهند. || تألف الاجراج والادغال. تنقلق  
الاشجار بسرعة || قوتها الحيوان والطيور والثمار وبعض  
الجذور. تأكل الموز بشهية.

١٢٢٦٦ - زَيَّادِيَّات  
Viverridae (S).  
Viverridés (F). Viverridae (E).  
فصيلة حيوانات لاحمة مفترسة اجنتها ١٦ اشهورا  
الزيادة والرباح والنسس. اما انواعها فكثيرة العدد.  
موطنها المناطق الحارة من العالم القديم. اجسامها مستطيلة  
دقيقة، قوائمها قصيرة، اذنانها طويلة، جلته، وائلة.  
اعتاقها نجيلة، ورووسها زائفة، اعظامها ذلقة، عيونها  
صغيرة، اذنانها متوسطة الحجم || تتميز بدهنها اللبنة  
التي تفرز دهن الزباد المسكي العرف في اجرة خاصة  
مركزها بين السرم وملفتي الفخزين || مسرحها في  
الليل. قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطيور  
والافاعي والوزغ والاسماك.

١٢٢٦٧ - زَيَّادَة، قَلَقَة  
Cotyliédon (F).  
Cotyledon (E).  
هي الخوصة حين تنجر من النواة.

١٢٢٦٨ - زَيَّارَة  
Taille de la vigne (F).  
Pruning of vine (E).  
هي تسريع الكريمة اي تسحيلها. يقال زبر او جزر  
الكريمة.

١٢٢٦٩ - زَيَّاطَة  
Cane (F). Female duck (E).  
هي البطة وتدعى زباطة لانها تكثر الزيت اي الصياح.

١٢٢٧٠ - زَيَّال  
ما تحمله النملة فيها.

١٢٢٧١ - زَيَّنَاتِي \*، زَيَّنَاتِي  
Antenne (F).  
Antenna (E).  
ما تزين به الحشرة وما زبانيان. اطلب قرن استشماري.  
اشكاله كثيرة العدد اعلمها ما جاء في الرسم.

١٢٢٧٢ - زَيَّنَاتَا، زَيَّنَاتِيَّ العَقْرَب  
الزبان او زبانيا المقرب منزل من منازل القمر البانئة.  
وما كوكبان نيران مقترقان في قرني " برج العقرب"،  
مترصان بين الشبال والجنوب بينها قيد رح ينزلما القمر  
في الليلة السابعة عشرة || يقب الزبانان يدعى البهين.

١٦ سم. موطنها البلاد الحارة. تألف السهول والحقول  
المزدودة قوتها النوبيات والحشرات.

١٢٢٥٨ - زَيَّنَاتِيَّات  
Soricidae (S). Soricidés (F).  
Soricidae, Shrews (E).  
فصيلة حيوانية من رتبة الحشرات. انواعها نحو ١٧٠  
موطنها العالم القديم. اجسامها صغيرة القد تشبه القار  
والجردان. اثوابها رمادية. اعظامها ذلقة. اذنانها  
مستديرة. قوائمها قصيرة. اعظافها حادة. اذنانها دقيقة.  
تألف الجبال والمساب والسهول والفياني. قوتها الحشرات  
على اعظافها والمصافير والاسماك.

١٢٢٥٩ - زَيَّاد، زَيَّادِي، سَحَاء  
Pallenis spinosa (S). Pallénis, Petit mugue (F). Star-  
wort (E). Dorniges goldauge (D). Pallenis (I).  
نبات عشبى بري طلي شاك من فصيلة المركبات.  
منته حوضي البحر المتوسط. ازهاره عطرية العرف مدثرة  
يجمرها النحل. فوائده الطيبة مبهمة يقال انه يقع الصدر  
ويقوى المعدة.

١٢٢٦٠ - زَيَّادَة، سَيَّور الزَيَّاد  
Viverra (S).  
Civette (F). Civet cat (E).  
جنس حيوانات من فصيلة الزباديات. انواعها خمسة  
تتميز باجسامها المستطيلة. اثوابها مختلفة الالوان  
يكثر فيها التشنير والتخطيط || اذنانها تضع من ثلاثة الى  
اربعة جراء ترضعها نحو ٨ اسابيع.

١٢٢٦١ - زَيَّادَة اَفْرِيقِيَّة \*  
Viverra civetta (S).  
Civette d'Afrique (F). African civet cat (E).  
نوع من الزيادة تملو نحو ٣٠ سم. طولها ٧٥ سم.  
وذنبها ٤٠ رأسها مكور الشكل، ذلقومها مدبب.  
اذعانها قصيرتان قوائمها متوسطة القد قوية. ثوبها الى  
الصبغة الاسمر يملوها تحطيط وتبيج اسود وشكل نحبي  
يقطب الشج من القفن الى طرف الذنب || موطنها افريقية  
الشرقية والشمالية. تألف الجبال والادغال والفياني.  
تسرح في الليل. قوتها ما تستطيع اقتناصه من الحيوان والطيور.

١٢٢٦٢ - زَيَّادَة النَحْل  
Paradoxurus (S).  
Paradoxure, Musang, Marte des palmiers (F).  
Palm civet cat (E).

جنس حيوانات لبونة من الزباديات. موطنها البنغال  
وسرنديب والهند الصينية. انواعها عديدة. اجسامها  
مستطيلة. طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٥ سم. اذنانها  
من ٤٠ الى ٥٠ سم. وطولها من ٢٥ الى ٣٥ سم. اثوابها  
مرقطة || تألف الاجراج وتنقلق الاجنار. قوتها الحيوان  
والطيور والثمار على اختلاف اجنتها وانواعها || اذنانها  
تضع اربعة جراء ترضعها نحو ٨ اسابيع || زباناها  
مبهجن الرائحة الكريهة.

١٢٢٦٣ - زَيَّادَة الهند \*  
Viverra zibetha (S).  
Civette de l'Inde, Zibeth (F). Indian civet cat,  
Zibeth (E).

نوع من الزيادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٨٠ وذنبها  
٤٥ سم. موطنها الهند والصين وبنورما. ثوبها الى  
الصبغة الصفراء يملو تشنير مجزوي. فيج ظهرها اسود  
اللون، سواده يمتد من القفن الى طرف الذنب || تألف  
الاجراج والادغال والسهول والحقول. تسرح في الليل.  
قوتها الحيوان والطيور والافاعي والضفادع والحشرات والبيض  
والثار.



زيادة افريقية



زيادة النحل



زيادة الهند



زيادة سوداء



زيادة ملقة



زبان



## ١٢٢٧٣ - زَبَانَة \* ، قَارَة الحَصَاد ، جُرْد قَرَم

Mus minutus (S). Souris naine, S. des moissons, Rat nain, R. des moissons (F). Dwarf mouse, Harvest mouse (E).

اصغر انواع الجرذان وارفعها، تسكن الاشجار والحدود وعموم في اللاه. موطنها الشرق الاوسط واروية. طولها نحو ٧ سم. وذنبها كذلك. اذناها مستديرتان صغيرتان. عيناها جاحظتان. نوها الى الصبهة الصفراء يقيم مع اقترابه من نبع الظهر وقة الرأس ويبيض عند الصدر والبطن. حراشف ذنبها تبلغ ١٥٠. اطباء الانثى ٨. تألف المراعي والمقفل المزدرة والمقاصب والبيادر قوتها جميع المواد النباتية والنسوية.

## ١٢٢٧٤ - زَبَانِي جَنُوبِي

الزبان الجنوبي نجم من كوكبة السرطان.

## ١٢٢٧٥ - زَبَانِيَّات \*

Antennates (F).

Antennates (E).

الزبانيات فئة من المفصليات، حيواناتها تحمل زبياً أو زوجان من الزبان وليس لها شياض. فالقسم الذي تنفسه غشوي ويحمل زوجان من الزبان يدعى صف القشريات. اما القسم الذي تنفسه قصبي ويحمل زوجاً واحداً من الزبان فيدعى ان كان من ذرات الثلاثة ازواج من الاورسل صف الحشرات. وان كان من كثيرات الارجل صف الديدغخايات.

Sécher (F). To dry (E).

جفف. يقال زبب النبت والتين : صيرهما زبياً.

## ١٢٢٧٧ - زَبْد ، زَبْدَة ، نَهْدَة ، نَهْد ، نَهْدَة ، تَخِيْسَة ، التُّوكَة

Beurre (F). Butter (E).

مادة تحصل من تجمع كريات الحليب السميكة بقرز الكتانة وضغطها.

## ١٢٢٧٨ - زَبْد التَّصْفِيَة (F). Froth of defecation (E).

ثقل ينتج عن صناعة السكر فيستعمل كساد.

## ١٢٢٧٩ - زَبْدَات

Butyrate (F). Butyrat (E).

ملح الحامض الزبدى.

## ١٢٢٨٠ - زَبْدِي ، سَمْنِي

Butyreux (F).

Butyraceous (E).

نعت تعربى يطلق عل ما هو زبدى التركيب.

## ١٢٢٨١ - زَبْدِين ، سَمْنِين

Butyrine

هي المادة الدعنية الموجودة في الزبدة.

## ١٢٢٨٢ - زَبْرَة ، زَبْرَة الْأَسَد

الزبرة منزل من منازل القمر الشامية. وهي زبرة الأسد اي كاهله. تتألف من كوكبين يبرين اسدهما انور من الآخر ينزلها القمر في الليلة الحادية عشرة || يقبب الزبرة يدعى سعد الاخبية.

## ١٢٢٨٣ - زُبْرَة

Crinière (F). Mane (E).

الشعر المجتعب للفحل والاسد وغيرها. يقال زبرة الاسد.

ذكر أبر وأثى زياره.

## ١٢٢٨٤ - زَبْرَج

Or (F). Gold (E).

هو الذهب وهو ايضاً السحاب الرقيق فيه حمرة ج زبارج .

## ١٢٢٨٥ - زَبْرَجَد

Béril, Béryl, Topaze,

Chrysolithe (F). Beryl, Topaz, Chrysolite (E).

نوع من الزمرد عديد الصروب اشهرها الاخضر والاصفر والوردي ، جميعها من الحجارة الكريمة المتوسطة القدر .

## ١٢٢٨٦ - زَبْرِيْنَة \*

Zebrina (S). Zébrine (F). Wandering Jew (E). Hängende zebraute (D). Zebrina (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوردانيات سوقها سلامية مادة تشرب عند كل عقدة. اوراقها بيضيه خضرة عادية اللدانة ، نصلها مشوح خطين فضين يغطيناه طولاً. ازهارها انبوبية مدغدة الفصل والبتلات اشهر انواعه ما يلي .

## ١٢٢٨٧ - زَبْرِيْنَة اُرْجَوَانِيَّة \*

Zebrina purpusi (S). Zébrine pourpre (F).

نوع من الزبرينه. سوقها مدادة، متدلية، قصيرة السلايات. اوراقها بيضيه مدنية المقصصة . نصلها ارجواني اللون يعلو ملج زيتوني وخلة فضية || ازهارها ثنائية قمرية اللون .

## ١٢٢٨٨ - زَبْرِيْنَة حَمَلِيَّة \*

Zebrina flocculosa (S). Zébrine floconneuse (F).

نوع من الزبرينه سوقها مدادة متدلية طويلة السلايات خلية البثرة . اوراقها بيضيه ذلقة الزام الاخضر . نصلها مخططة البثرة الزباء الخملية عل صفحتيه . ازهارها متوسطة اللد ، زرقاء اللون .

## ١٢٢٨٩ - زَبْرِيْنَة مُتَدَلِيَّة \*

Zebrina pendula, Tradescantia zebrina (S). Zébrine à suspension (F).

نوع من الزبرينة سوقها مدادة متدلية. اوراقها تطول نحو ٤ سم. نصلها ارجواني الصنعة العليا يغلبه خضان فضيان ، صفحت السفل خلية البثرة || ازهاره صغيرة اللد تكاد لا تظهر .

## ١٢٢٩٠ - زَبْرَبْ ، هو الفرير ، اطليه .

## ١٢٢٩١ - زَبَط ، زَبِط ، زَبِط

Cacarde, Cralle (F).

صياح البيط والوز .

## ١٢٢٩٢ - زَبَر ، هو الصمّر الانزب ، اطليه .

## ١٢٢٩٣ - زَبَرِي

Crocodile femelle (F).

Female crocodile (E).

هي انثى التساحل .

## ١٢٢٩٤ - زَبَل ، زَبَل ، سَرَجَن

Fumer (F).

To manure (E).

استعمل الزبل لتسميد .

## ١٢٢٩٥ - زَبَل ، سَرَجِين ، سَرَقِين ، سَبَاخ

Fumier (F). Manure, Dung (E).

الزبل خليط من رجيع الحيوان وبوله مع القش والتبن الذي يرقه عليه. والزبل بالنسبة الى حالته الحكمية وانفعالاته الخارجية في التربة يقسم الى ثلاث فئات :

السماري والماضي والبارد || فالسماري اي الحار هو سلج الحماق والدجاج وكرس التمر والمانز وروث الخيل . والماضي هو غشي البقر ودر الجال والارانب || اما البارد فهو رجيع الغزير والبيط والاوز .



زبانه

Colombophilie (F).  
Pigeon-faucying (E).

١٢٣٠٩ - زُجَالَة ٥

الزجالة فن تربية الحمام الزاجل وترويضه على العمل المنوط به .

١٢٣١٠ - زُجَر \* ، زُجَر (F). Latilus (S). Latle (F).  
جنس اسماك بحرية من شقائق المنارة وفصيلة البهاريات . انواعه المعروفة خمسة : اعطائها بحار المناطق الحارة من العالم القديم جميعها كبيرة القد طويلا براوح من ٧٠ الى ١٢٠ سم . ورواسها غليظة مستطوية الخط . عيونها كبيرة مستديرة جاحظة . زعانفها الظهرية مستطيلة . حراشفها صغيرة . اثوابها مختلفة الالوان فضية المراح .  
ج زجور .

Retournement des œufs (F).  
Returnment of eggs (E).

١٢٣١١ - زُجُل

هو تقليب البيض . زاجلت الدجاجة : قلبت البيض في أيام الحضانة لأنها لم تزال مدر البيض . وهو ما يجب الانتباه له في الحاضنات الآلية ليسلم البيض من المذبح .

١٢٣١٢ - زُجَم ، سُوْلُو الماء (S). Hydrochelidon  
Hirondelle d'eau, Guifette (F). Sea-swallow (E).

جنس طير من كفيات القدم . انواعه قليلة تقبى الخرشنة إلا أنها أطول جناحا ورعا . تألف بحيرات ومناقع المناطق المعتدلة . تكثر على شواطئ البحر المتوسط . قوتها الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة . تدثر في الانجار والنباتات المائية . أناتها تبغض وتحضن ثلاث بيضات نحو اسبوعين || أشهر انواعه الزيم الاسود .

١٢٣١٣ - زُجَم أسود \* (S). Hydrochelidon nigra  
Guifette noire (F). Black sea-swallow, Black tern (E).

نوع من الزيم . رأسه وعقته وصدوره الى السواد الغامق . ظهره احمر اللون . جناحه وذنبه الى الوردية الزرقاء المراح . بطنه وباطن جناحيه واغنيكه الى البياض الناصع . منقاره وساقاه حر .

Enterotoxemies

١٢٣١٤ - زُحَار

مرض معد خفيف يصيب الحيوان في امعائه فيؤذيه .

١٢٣١٥ - زُحَّافَات (F). Reptiles (F). Reptilia (E).

الزحافات توكلف الصف الثالث من قسم الفقاريات . مركزها المرتبي يأتي بين الطير والصفدييات . علمها يدعى زحفنة . اجسامها مغطاة اما بسقف متباينة الاشكال والباكة والمادة ، واما بصفائح قرنية ، متفاوتة الشغطة ، شديدة الصلابة . تنفسها رئوي . اجهزتها الدورية والعصبية والمخسية والتناسلية كاملة . قحفها يتصل بالعمود الفقري بواسطة لقمة قذالية ، اوسطية ، بسيطة . بعضها مجهز بأربع قوائم يستعين بها للانتقال وبعضها مرقال عديم القوائم . كانت فصائلها واجناسها في الايزنة الغابرة كثيرة العدد وقد بلغت اوجها في الاباج الثاني حيث وصل عدد زحما الى ١٩ . اما الآن ، فالانواع الماصرة تقدر بنحو ٩٧٥ ه تنقسم الى اربع رتب فقط . وهي مخطومات الرؤوس والسلاحف والسحاحيات والتهنقيات .

Rhynchocéphales (F).

١٥ مخطومات الرؤوس

رتبة من الزحافات يمدد ظهرها الى الاباج الثاني . وقد

١٢٢٩٦ - زُيْلِينَ \* ، سَمُور سَيِيرِيَّة

Mustela zibellina (S). Zibeline, Marte zibeline (F).  
Sable (E).

حيوان مفترس من السموريات . موطنه الاساقع الباردة يكثر في سيريية . طوله نحو ٤٥ سم . وذنبه ٢٢ ثوبه جل الور الناعم الطويل . ظهره الى السرة السوداء عتقه وايلاه الى الصبهة الناصية . خداه الى الوردية . خطمه اسود . اذناه الى السرة ، حناهما اريد . زوره وصدرة وبطنه الى الصبهة الصفراء المراح . فروته فاخرة . يألف الاحراج الكثيفة ويجاري الماء . يسرح في الليل . قوته الحيوان والطير والسلك والثار .

١٢٢٩٧ - زُيْد \* ، مَرْيُون ٥

Zapus, Meriones (S). Zapode, Mérione (F).  
جنس حيوانات لينة قاضمة من فصيلة البريوسيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القصد تطول من ٧ الى ١٠ سم . واذاها من ١٢ الى ١٥ سم . جرائزها الخلفية مستطيلة تمكها من التغز الطويل . اثوابها الى الصبهة السرا . اذاها اسود . اياطها صفر ، يطوها توشم اسود . بطونها بيض || تألف الاذغال اطراف الغابات والقباني والجباه والادوية والحقول والمراعي . تسرح في الليل . اجسامها انفاق ودعايز تحفرها على عمق ٥٠ سم . قوتها المواد النباتية على اختلافها من البذار الى الحب ومن الارراق والبراعم الى الثار ومن العشب والجبور الى لحاء الاشجار .

١٢٢٩٨ - زُيْب ، عَتَجَد (E). Raisin sec (F). Raisin (E).  
هو السنب الزيب له طريقة تجفيف خاصة تمكته من الاحتفاظ ببعض اللدانة .

١٢٢٩٩ - زُيْب بَرِّي هو المائق الجيلي ، اطلبه .

١٢٣٠٠ - زُيْبَة

Fourmillère (F).  
Ant-hill, Ant's nest (E).

هي المنلة اى قري التل || وهي الزاية لا يطوها ماء .

١٢٣٠١ - زُيْبَة ٥

هي الاذريون وهي القوقحان الخزني ، اطلبها .

١٢٣٠٢ - زُيْبَرِيَّة هي السمر الامرو ، اطلبه .

١٢٣٠٣ - زُيْبِل (F). Cuellolr (F). Fruit-basket (E).  
قوة ار وعاء ما توضع فيه الثار عند قطفها .

١٢٣٠٤ - زُج (F). Autruche (F). Ostrich (E).  
الزج هو النعام . الواحدة زجاء وأزج للذكر .

١٢٣٠٥ - زُجَاج (E). Verre (F). Glass (E).  
مادة صلبة شفافة سهلة الانكسار تصنع من الرمل والقل .

١٢٣٠٦ - زُجَاج هو حب القرنفل .

١٢٣٠٧ - زُجَاجِي ، شَقَاف (F). Hyaloide (F).  
صفة ما هو شفاف كالزجاج . Hyaloid (E).

١٢٣٠٨ - زُجَال (F). Colombophilie,

Péristeronique (F). Pigeon faucying (E).

الزجال من تعامل تربية الحمام الزاجل وترويضه .



زَيْلِينَ



زَيْد



زَجَر



زَجَم اسود

Solénoglyphes	أُنبُوبِيَّات الإِخَادِيد	انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمختبرية أو السفنودون الذي يعتبر أقدم الزحافات المعاصرة لأنه مثال الخنثى الأول.
Opisthoglyphes	خلفيات الإِخَادِيد	
Aglyphes	عدميات الإِخَادِيد	
Opotérodontes	مُتَرَاوِجَات الْإِنْسَان	٢٥ السلاحف
	اما فصائلها فهي :	رتبة من الزحافات . انواعها المعاصرة المعروفة ٢٣٥ تجمع الى ١٢ فصيلة . اجسامها مبطلة ملحوة . رؤوسها مكرونة صغيرة . اعناقها متوسطة الطول . فكوكها عديمة الاسنان لكنها مجهزة بنضال قرنية حادة الاطراف . قوائمها غليظة . ظهورها مدعرة بذبال . بطونها قرنية الكنف المعروف بالزغف . وزعنقها هذا سداسي الثفر يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الاربع    اما فصائلها فهي ، بالنسبة الى التصنيف الحديث ، ما يلي :
Typhlopidae	تفلوسيات	تروسيات
Leptotyphlopidae	دساسيات	جناثيات
Boidae	بواثيات	حجناثيات
Ilysiidae	حسبيات	حفاسيات
Uroplattidae	غفرييات	حميات
Xenopeltidae	خدائيات	غنداسيات
Colubridae	حنثيات	دلهيات
Amblycephalidae	مسطحات	دوريات
Viperidae	أفييات	رقيات
	ب - مرتبة المظائيات - انواعها المعروفة نحو ٣٠٠٠ تنضم الى ٢٠ فصيلة صار تصنيفها بالنسبة الى تركيب اللسان والطرحة التي تلتفه ، ثم الى شكل الترقوة وأخيراً الاوتار القوية سواء أكانت موصولة بكاملها ام ناقصة او لا اثر لها .	سلسقيات
	اما فصائلها فهي :	قبيقيات
Iguanidae	عيدشويات	بلثيات
Agamidae	حرذويات	
Chamaeleontidae	حرايويات	٢٥ التماسحات
Gekkonidae	زغقيات	رتبة من الزحافات تشمل فصيلة واحدة تضم ٢١ نوعاً تجمع الى ٦ اجناس . اكثريتها الساحقة من عظم المناطق الاستوائية والحارة . معظمها يعيش في مياه الانهر والبحيرات وبعضها يخوض مياه البحر كالتسلح البحري والتسلح الذلق الخيط . تتميز التماسح باجسامها المستطيلة الخشنة ، مجلودها الغنية الصلبة القاسية ، بقوة فكوكها الكبيرة المجهزة باسنان ذرية ، يصغر عيونها الجاحضة ، بارتفاع مناخرها الطرفية الارتكاز ، وبازدحامها الضخمة المستطيلة .
Pygopodidae	سليليات	اما اجناسها الستة فهي :
Xantidae	قنطوسيات	Crocodile du Nil
Lacertidae	سقاقيات ، ضبابيات	تمساح النيل
Tetidae	تيدييات	Crocodile marin
Scincidae	سقنوريات	تمساح ذلق الخيط
Anguillidae	حنجوييات	تمساح الهند ، أزوم
Anniellidae	فتاخيات	تمساح امريكي ، ألبغافور
Hélodermatidae	فاغرات	تمساح كيان ، كيان
Varanidae	ورليات	٥ السهقيات
Amphisbénidae	قهقراتيات	رتبة من الزحافات وقد قسموها الى مرتبتين او ريتين :
Gerrhosauridae	جمروديات	مرتبة الحيات ومرتبة المظائيات .
Lépidés	سعديات	أ - مرتبة الحيات - الحيات حيوانات زسافة مرقالة متفاوتة الاخلاق والجحوم والاثواب . انواعها المعروفة نحو ٢٧٠٠ تنتمي الى ٢٥٠ جنساً تجمعها تسع فصائل تنضم الى خمس فئات .
Zonuridae	غنثيات	الفئات الخمس هي :
Xenosauridae	دولسيات	أمانيات الإخاديد
Anélytropidae	محاكيات	
Dibamidae	نوقسيات	
Chilopodes	١٣٣١٦ - زحائيف	
	رتبة دويبات تعرف بلقوية الاربل .	
Dictyosporées (F).	١٣٣١٧ - زحامييات	
Dictyosporae (E).	عارة فطور بجمرية من فصيلة اللحيات . تتميز ببويدها الفرسادية الشكل . اجناسها خمسة : البارمجة ، الرديفة ، الزغبورة ، الكونونيتيوم والمكروسبوريوم .	
	Protéroglyphes	

غليلة، محبة الأطراف || لهاويها كاعنة الصفن قل من يرغب فيها .

١٣٣٢٦ - زُحْمُوك \*  
Loranthhe sauvage (F).  
Wild loranthus (E).

نوع من الخصال وفضيلة الشيمات . وهو نبات طفيف يركب اغصان الاشجار الحرجية فينبث فيها ويقتات من عصارتها . ج زحاميكا .

١٣٣٢٧ - زُحْمَتَة \*

Zoonomie (F). Zoonomy (E).  
مجموعة من الشرائع الطبيعية التي ترضى حياة الحيوان .

١٣٣٢٨ - زُحْمَتِي \*

Zoonomique (F). Zoonomic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل شريعة طبيعية تتحكم بحياة الحيوان .

١٣٣٢٩ - زُحْمَة  
Agneau (F). Lamb (E).  
الزينة : اولاد الفم لانها ترخ اي تساق وتضع من ورائها .

١٣٣٣٠ - زُحْمُوط  
Glaire (F). Glair (E).  
الخطاط السائل عند الدواجن من الايل والحيل والشاه والبطر .

١٣٣٣١ - زُحْمُوط \* ، زُحْمَتَان  
Gagea (S).  
Gagée (F). Gagea (E). Goldstern (D). Gagea (I).  
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ٢٠ معظمها بري وبعضها زراعي تربى ، لوراقها غليظة مستطيلة . ازهارها صفراء اللون طويلة المتق متعددة يحمها شراخ اجوف مستطيل .

١٣٣٣٢ - زُحْمُوف راجع ابنة يوم .

١٣٣٣٣ - زُحْمُوفِيَات  
Ephemeridae (S).  
Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة المرجسيات وطيقة البويات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها تحلج الاجسام المستطيلة ، دقيقة الايل والرياني .

١٣٣٣٤ - زُحْلُوبُ النَّمْصِ \*

Incurvaria muscallella (S). Mineuse des feuilles du chêne (F). Incurvaria muscallella (E).  
حشرة من فصيلة الزغوليات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاذن الى بعض مناطق اوروبية وافريقية الشالية . فرائشها عديمة تميش على مخزونها الاسمانى . مرتبها لانحة ثم غاصلة ، تلم اوراق القمص والسديان ثم تنجرها الى الاعشاب البرية || جسمها صغير قصيف بطول من ٤ الى ٥ م . بسلها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . واسها مستطيل الجرم خطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها صفيرة . مرتشها جدعة . جوشها الى الخيطي وبطنها كذلك || وراشها كبيرة . وراشها الاماميان الى النبي المابق تملو بقجتان تبتينا اللون . وراشها الخلفيان الى الخيطي الفاتح . اهدابها الى الخيطي الاصفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في القسم الثاني من الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || السرعة تثقب بشرة النصل وتلفه وتمتش على غلايا الرن

١٣٣٣٨ - زُحْف  
Reptation (F). Creeping (E).  
الزحف الانتقال على الارض ديبيا كما تقفل الزحافات من ثابين وعطاء وغيرها .

١٣٣٣٩ - زُحْفَن \*  
Erpétologiste (F).  
Herpetologist (E).  
الزفنف موليدي اختصاصه درس الزواحف .

١٣٣٤٠ - زُحْفَتَة \*  
Erpétologie.  
Herpétologie (F). Herpetology (E).  
الزحفنة او علم الزواحف جزء من علم التاريخ الطبيعي .

١٣٣٤١ - زُحْفَتِي \*  
Erpétologique (F).  
Herpetologic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالزحفنة .

١٣٣٤٢ - زُحْلُك  
Saturne (F). Saturn (E).

كوكب من مجموعة النظام الشمسي ، وهو من الخنس . سرعه دورته الانتقالية في الفضاء نحو ٣٤٧٠٤ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٩ سنة و١٦٧ يوما || والنجوم يدعونه شيخ النجوم ويسمونه النمس الاكبر لانه في النوصة فوق المريخ واضافوا اليه الخراب والملاك والملم والملم .

١٣٣٤٣ - زُحْلَة  
الزحلة : دابة تدخل في حيرها من قبل اسبا (اللسان) .

١٣٣٤٤ - زُحْلُوبَة مُبْجَعَة \*  
Tomoxia biguttata (S). Tomoxie à 2 taches (F).  
Tomoxia biguttata (E).

حشرة وائمة غاصلة دامت من فصيلة المردليات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الصبوية . غناصها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تميش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القه بطول من ٥ الى ٧ م . فصيلتها الى الكسفي القاتم تملو في اواسط الظهران بقجة بيضاء وزرقاء . واسها مستعرض الجرم . زباناها غيطيان . عيناها صغيرتان مساحتان . ظهرها غيب المخضر لا يلحف كامل البطن . بطنها مردني الشكل ينتهي بسم ذلق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى آب . تسرح في النهار . تسافد في تموز . تنجح للمكن تحت ماء الاشجار اليابسة والاعشاب المقطوعة || البرقة عند بلوغها الإدراك التام تطول نحو ١٢ م . جسمها شبه بشي الشكل ، سداسي الراجب ، مستفخم الرأس ، ضليع التأشير ، احمل اللون ، اسمر المراج يسود ويحمر في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينتهي طليقا في التربة .

١٣٣٤٥ - زُحْلُوبِي \*

Rhypticus (S). Savonnier (F).  
زحلوب و زحلوبة جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بحار البلاد الحارة والاسواق || اجسامها احليجية الشكل . مسكها عادم السهف ، نام المسس . عيونها كبيرة ، نائمة ، جاسقة ، ريمة الازكاراز . زعانفها الظهرية مستطيلة ، شائكة الشماخس الامامية . زعانفها الذيلية



زحلوب مبقعة



زحلوب



زحموك



زحمرط



زحلوب النمس

## ١٢٣٤٢ - زُرَّ الْبَرَجَاد Metépimère (F).

Metepimerium (E).

هو في الحشرات العضو النجيل العتيق الذي يوصل البرجد بالبرجد.

## ١٢٣٤٣ - زُرَّ الْجَوْشَن Epimère (F), Epimerium (E).

هو في الحشرات عضو صغير يعمل كصلة وصل بين غوش الجوشن وسائر اقسامه.

## ١٢٣٤٤ - زُرَّ الْوَرْد Incurvarilidae (S).

هو الحقيق، راجعه.

## ١٢٣٤٥ - زُرَّ حَشِيصِي Incurvarilidae (F), Incurvarilidae (E).

هو المخلدة، اطلبها.

## ١٢٣٤٦ - زُرَّ دَهْسِي Incurvarilidae (F), Incurvarilidae (E).

هو الحوذان الحريف، راجعه.

## ١٢٣٤٧ - زُرَّ كَرِيْق Elanions (F), Elanus (E).

جنس طير من عمارة الحدأ وفضيلة الصقريات. أنواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة. مناسرها غليظة شديدة الانعقاد. سواقلها طويلة، اذنانها قصيرة. غالبها قوية. اظفارها حادة. اريائها رعدة متتدة اللونان يفلج في ظهورها الازرق الاسمر وفي بطونها الازرق الغامق. جميعها يابسة المزاج، شديدة الجناح، سريعة الطيران لا تهاب شيئاً. انهزها الزرق والكهربي.

## ١٢٣٤٨ - زُرَّاع Planteur (F), Planter (E).

هو الذي يمارس زرع الارض.

## ١٢٣٤٩ - زُرَاعَة Agriculture

هي فن زراعة الارض وبتربيتها الشامل هي فن استئثار النباتات الزراعية والحيوانات الداجنة على اكل وجه اقتصادي.

## ١٢٣٥٠ - زُرَاعَة، زُرْع Culture (F).

Culture, Cultivation, Husbandry, Tillage (E).

هي العمل الزراعي المخصص.

## ١٢٣٥١ - زُرَاعَة الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَة Fructiculture (F), Orchard, Fruit-growing (E).

هي التي تعنى بانتاج ثمار الفواكه.

## ١٢٣٥٢ - زُرَاعَة الْبَرَايَة، زُرَاعَة يَذْكِرَة Culture de porte-graines (F).

ومنهم من قال زراعة التقاوي والهيئات والمزرات.

هي كل زراعة تهدف الى انتاج البذار راجع بهزرة.

## ١٢٣٥٣ - زُرَاعَة الْبَسَايِين، يَسْمَكَة Horticulture

تخصيص زراعي غايته استئثار النباتات البستنية دون سواها.

## ١٢٣٥٤ - زُرَاعَة التَّرَاوِيْق، سَرَكَة Mosaiculture

تخصيص زراعي يرتكز على ترتيب الحدائق وفقاً لاشكال هنتسية لمبغ يلب لبث النبات الدور الرئيسي.

## ١٢٣٥٥ - زُرَاعَة الْحَرَاَج، حَرَاَجَة Sylviculture (F), Forestry (E).

هي علم التبرجيج يبحث في استنبات وقرس واستئثار الانجار الحرجية.

## ١٢٣٥٦ - زُرَاعَة الْخَضَار، زُرَاعَة الْبُقُول Culture maraichère, C. potagère (F), Pot-herbs cultivation (E).

تخصيص زراعي غايته انتاج البقول.

نحو ثلاثة اسابيع ثم تخرج من النفق وتعدل بخيط حريري المادة حتى سطح التربة حيث تنوجه نحو الاشباب البرية. والسرقة عند بلوغها الادراك التام تقطف نحو ٨ م. جسمها مستطيل الشكل، مبطل الجرم، اسمر اللون، مبشر الحلب، اسود الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينتهي مليئاً ضمن جراب السرعة في الجلالة او بين الارواق التي تلاس التربة.

## ١٢٣٥٥ - زُخْلُوبِيَّات Incurvarilidae (S).

Incurvarilidae (F), Incurvarilidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حشرغيات الاجنحة. انواعها المروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. تسرح في التبار وتبيت في الليل، طراحتها متدل الرقصة والحوم || اجسامها صغيرة، مغزلية الشكل. رؤوسها مستطلة. عيونها كبيرة، ناشرة. فرونها الاستشعارية غليظة، شديدة الطول. ملابسها صغيرة، قصيرة، جالسة. مرافقها جداج. بطونها كثيفة الخمل القصير. حذانها لا يوجد لها. رؤوسها ذلقة الاطراف الخارجية. ظنايتها قولائم الخلفية رباعية المناسخ || اساريها مبطة، زباء التشار. لامة في اول عهدها ثم خاضلة تميش داخل جراب مبطل قأوى اليه ويخره عند الانتقال || خادوتها طليقة تتحور، في طور الاكمال، ضمن جراب السرعة || اشهر اجناسها الزعلوب والاديلة والنمفوده.

## ١٢٣٣٦ - زُدَاع Turnera (S), Turnère (F).

جنس نباتات طيبة عشبية غشوشية من فصيلة الزدياعات. انواعه نحو ٦٠ منبها المناطق الحارة والاستوائية. جميعها سريعة النمو. اوراقها متعاقبة، منمقة، اهليلجية، ذلقة. ازهارها ابيلة الارتكاز فروية التجميع || اوراقها طيبة تقيد القلب وتنشط الباه || اشهر انواعه الزداع الشابق.

## ١٢٣٣٧ - زُدَاع شَابِق \*، دَمِيَانَة Turnera aphrodisiaca (S), Turnère aphrodisiaca, Daminana (F).

جينة زراعية طيبة مهددا البلاد الحارة. ساقها فرما زغبية اللحاء مبهمة المسام الندية الشكل النعنية المادة. اوراقها منمقة، متعاقبة، اهليلجية الشكل. فصلها جامد اللون، كثير البروق؛ صفحته العليا كثيفة المسام الندية || يستخرج من اوراقه زفرهه زيوت طيارة وبيواد دنيية وراتنجية عتاسرها الفعالة شديدة الوقع على الاضضاء التناسلية. قليها شابق منمق. كثيرها مؤذ.

## ١٢٣٣٨ - زُدَاعِيَّات Turneraaceae (S).

Turneraaceae (F), Turneraaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين. اجناسها وانواعها عديدة جميعها غشوشية او عشبية. ازهارها خشوشية خاصة التركيب. ثمارها حقبة ثلاثية المصارع. بزورها دقيقة سماء اللون || اعرف انبيها وانبيها الزداع.

## ١٢٣٣٩ - زُدْب Part, Portion

هو التصيب والحصة. ج. ازداب.

## ١٢٣٤٠ - زُدَوَور هو الجبدوار العتيق. اطلبه.

## ١٢٣٤١ - زُرَّ Bouton floral (F), Floral bud (E).

هو كم الزهرة قبل انبلاجه.



زداع شابق

وثوب الفهد || موطنها فياني افريقية وإدغالها. قوتها المشب وورق بمغس أنواع الميموزا والسنتل والكيوية . تعيش جماعات محدودة صغيرة العدد اجملها تتألف من فصل وثلاث أو أربع اناث وثلاثة أو أربعة صغار .

### ١٣٣٠ - زرافة Caméopard, Girafe (F). Cameleopardus (E).

الزرافة كوكبة نجوم شمالية المقيع مركزها بين كوكبة حملك الاعنة وكوكبة الدب الاصفر || عدد نجومها ١٩ جميعها من المرتبة الخامسة والسادسة .

### ١٣٣١ - زرافيات Giraffidae, Camelopardalidae (S). Giraffidae, Camelopardalidae (F). Giraffidae, Camelopardalidae (E).

فصيلة حيوانات مبحرة من ذوات الظلف تشغل في الزمن الحاضر جنس الزرافة الوحيد النوع .

### ١٣٣٢ - زرافة \* Fistularia (S). Fistularia (F). Fistularia (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الزرافيات. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها ببحار البلاد الحارة من البحر الاحمر الى بحر الصين || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، لزجة ، عادمة الحراشف . رؤوسها صغيرة ، انبوية الاعظام الطويلة . زعانفها الذيلية خافتة تشغل في وسط كل منها عذبة مستطيلة دقيقة تشبه سوط الحويدي || لحومها كاعنة الصفت وبعضها جعالي المادة مؤخر .

### ١٣٣٣ - زرافيات \* Fistulariidae (S). Fistulariidae, Fistulariidae (F). Fistulariidae (E).

فصيلة اسماك بحرية يبرسمة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم ببحار البلاد الحارة || تتميز باجسامها الضيقة المستطيلة وباعظامها الانبوية . عيونها صغيرة ناشرة . زعانفها الظهرية غليظة الارتكاز قريبة من الذيل || اعرف اجناسها واشهرها الزرافة والصبيلة .

### ١٣٣٤ - زرافة \* Aristolochia (S). Aristolochia (S). Aristolochia (F). Worm-killer, Birthwort (E). Osterfuzel, Hohlwort (D). Aristolochia (I).

جنس نباتات عشبية ليفية عارضة معمرة من فصيلة الزرافديات . انواعها عديدة منها البرية والبرية والعلوية . اوراقها متناقبة قليلة الشكل ومنها ثنائية أو ثلاثية التخصيص انحدارها كبيرة القد ، غريبة الشكل ، مختلفة الاوان . جذور الانواع الطيبة كافورية الرائحة تشتمل كمرة وفي مدرة اللثمة ، تسهل الولادة ، تفيد من الربو ، تنفي القروح وتجلو الاسنان . ويستخرج منها جوهر جعالي فداي يدعى زرافونين قليله مقو جزيل النفع ، كثيره سم زعاف .

### ١٣٣٥ - زرافة أرغب Aristolochia tomentosa (S). Aristolochia tomentosa (S). Aristolochia (F).

نوع من الزرافات ساقه مادة عارضة زينة تطول من ٥ الى ١٠ امتار اوراقه قليلة ذلقة الزام الاخير . نصلها خلي البثرة . انحدارها كبيرة القد ، قليلة التحسين . صفحتها الخارجية صفراء اللون اما الداخلية بنفسجية .

### ١٣٣٥ - زرافة الزهور Floriculture

تخصيص يتناول زراعة وتعدد النباتات الزهرية والزربية .

### ١٣٣٥ - زرافة الشجر Arboriculture

تخصيص في الزراعة يتناول استئثار الاشجار دون سواها .

### ١٣٣٥ - زرافة الكرّم Viticulture (F).

تخصيص في الزراعة يتناول الكرمة .

### ١٣٣٥ - زرافة الكرّم Trufficulture (F).

تخصيص في الزراعة يبحث في استنبات واستئثار الكرّم .

### ١٣٣٦ - زرافة المستندات Culture en espalier (F). Espalier-culture (E).

تخصيص في الاساليب الزراعية التشكيلية المتبعة في قيادة وتعدد الانجار المثمرة المرتكزة على المستندات .

### ١٣٣٦ - زرافة با كورية Culture forcée (F).

كول زراعة تسبق اوانها المألوف ان بالوسيلة او بالطريقة .

### ١٣٣٦ - زرافة بعليّة Dry farming

كول زراعة لا يتبعها راي بل تقوم على اسقاء المطر .

### ١٣٣٦ - زرافة حديثة Néo-culture (F).

كول زراعة ترتكز على الاساليب التقنية الحديثة .

### ١٣٣٦ - زرافة كهربية Electroculture

هي الزراعة القائمة على الاستفادة من الكهرباء في سبل الانتاج الباكر وربما تحسين الانتاج .

### ١٣٣٦ - زرافة لاجبة Culture intensive (F). Intensive cultivation (E).

زراعة تقديمية تهدف الى الحصول على اكبر انتاج ممكن في بقعة معينة من الارض .

### ١٣٣٦ - زرافة ميكانيكية Culture mécanique (F). Mechanical cultivation (E).

هي الزراعة القائمة على استعمال الآليات .

### ١٣٣٦ - زرافة Agricole, Agronomie (F).

صفه كل ما يتنسب الى الزراعة او يتصل بها .


### ١٣٣٦ - زرافة Giraffa camelopardalis (S).

الزرافة حيوان لبون يجتر من ذوات الظلف وفصيلة الزرافيات الخالية من الجهاز الصوتي || والزرافة وسيدة الجنس والنوع جميعها سيم البير ، ارتفاعها الكامل من ظلفها حتى نقرة رأسها يفوق ستة امتار وارتفاعها المألوف من الظلف الى الحاروك لا يقل عن ٢٢٥ سم . وهي قصيرة الرجلين طويلة البدن والعنق ، منحدره الظهر ، لها قرنان عظيمان منفلخان صغيران يتوسطهما تنوء بارز . ثوبها الى الصفرة يملؤها بقع

قوي متتابع التنبيل لا يقياس الشكل والحجم . وقد قبل في وصفها لها رأس القريس وجسمه ، عنق الجمل وراسلانه ، آذان الثور ، ذنب الحمار ، قوائم الماهة



زرافة



زرافة



زرافة

leuse, Noctuelle colorée (F). *Brotolomia meticulosa* (E).

حشرة جميلة الألوان المتداخلة من فصيلة السقيات ورثة حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة. فرشاتها واضحة قوتها رقيق الازهار. سرقها غاشلة تركب الكثير من النباتات البرية والزراعية اغصانها الورود والبنفسج. جسمها مثل الجرم يطول من ١٣ الى ١٥ سم. يسطها فزواج من ٣٨ الى ٤٢ سم. رأسها مثل الحمار، كبير الخط، حنطي اللون، أسمر المواج. عينها كبيرتان، تافزتان. زباناها غطيان، مستطيلان. ملاحسا صغيرة. مرشها مستطيل. جوشها حنطي اللون ويطها أيضاً. رواشها مژونة وبقيعة وبغرة الخمار الخارجي للالتي اكبر قدام الذكر واغلاظ بعلأ منه. لها ثلاثة اجبال في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في اذار وفراشة الجبل الثاني في حزيران وفراشة الجبل الثالث في ايلول. تسرح من القروب الى قمعة الليل ومن الفجر العميق الى الشرق. تباشر الالتي متع المكان بعد الكوم يبيون وتلقيه لطحاً مستطيلة الشكل تغلفها مادة غروية لاصقة تلتصق على الصفحات السفلى من نصال الازراق. السرعة عند بلوغها الازدراك تطول نحو ٤ م. ثوبها يتأرجح بين الاخضر والاحمر يملو خط ثبجي زاهر تتوسطه نمول سود ويطولوا ايضاً غطان جانبيان قاطبان. رأسها الى الحنطي يملو موج اخضر. مدها ورواجها الى الحنطي الاسمر. الى طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتغشي في التربة ضمن جراب من الطين.



زربة ديقه

#### ١٣٣٦ - زُرُونْد \* شاي المكسيك

*Chenopodium ambrosioides* (S). *Chénopode fausse-ambrosie*, Ambrosie, Thé du Mexique, Thé de Silesia, Thé des Jéuites (F). Mexican tea, Wormseed, Mexican goose-foot (E). Mexikanisches tee-kraut, Teeginsess (D). Ambrosia, The del Messico (I).

نوع من الالتيه وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة السرمقيات. يملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل، نصلها ازغب البشرة تنمغ الصفحة المنددة. ازهاره صغيرة اللد تاجية الازدراك. اوراقه عطرية صعية تستعمل استمال الشاي.



زربج

١٣٣٧ - زُرُونْد Sarment (F). Vine-shoot (E).

هي السرح، قصب الكرم.

١٣٣٨ - زُرْد هو حار الزرد، اطله.

١٣٣٩ - زُرْدَان Vestibule الجزء الداخلي من القرح ينتدئ بعد حازر الكية ويتنهي عند عتق الرسم.

١٣٣٩ - زُرْدَكه هي فك زده، اطله.

١٣٣٩ - زُرْدِي، مَجَزَع Zébré (F). Striped (E). نمت وصني يبر عن الخطوط المعترسة الايقاسية الطول والعرض التي تملو اثواب الحيوان كما هو الحال في حار الزرد.

١٣٣٩ - زُرُونْد، زُرُونْد Sturnus (S). بلسان Etourneau (F). Starling (E).

جنس طير من فصيلة الزوروريات. انواعه ستة منها

#### ١٣٣٧ - زُرُونْد مُعْبَانِي، أوستولويحية مُعْبَانِيَّة، لُوف عَطْرِي

*Aristolochia serpentaria* (S). *Aristolochie serpentinaire* (F). *Virginia snake-root* (E).

نوع من الزراند الطبي. ساقه منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قلبية القاعده، اهليلجية الزام الثاني والثالث، ستانية الاخير، ثنائية التقويس، صغيرة اللد. جلودره طيبة عطرية غنية بالزراندين.

١٣٣٧ - زُرُونْد دَالِم الحُضْرَة، سُرُونِيَات *Aristolochia sempervirens* (S). *Aristolochie toujours verte* (F).

نوع من الزراند ساقه مدادة قليلة التحريش تطول نحو ١٥٠ سم. اوراقه عروة قلبية الشكل مستطيلة مدبة الزام الاخير. نصلها ماس البشرة، لامع الغصار الزاهي. ازهاره الى الصفرة المصلمة بالاحمر.

#### ١٣٣٨ - زُرُونْد سِيْفُو، مَسْهُوْرَة

*Aristolochia macrophylla* (S). *Aristolochie siphon* (F). نوع من الزراند ساقه مدادة عارشة تطول من ٥ الى ١٠ امتار. اوراقه قلبية الشكل يملوها بعض ازغب. ازهاره كبيرة مقوسة لزها الى الغصار الحنطي يملو تخليط ابيض.

#### ١٣٣٩ - زُرُونْد صِيْنِي

*Aristolochia moupinensis* (S). *Aristolochie de Moupin*, A. de Chine (F).

نوع من الزراند مهد الصين. ساقه مدادة عارشة تطول من ٨ الى ١٠ امتار. اوراقه متمجة النصل اعناقها هدية الزغب. ازهاره صغر يملوها من الداخل تقيج احمر.

#### ١٣٣٩ - زُرُونْد مَهْدَب

*Aristolochia fimbriata* (S). *Aristolochie frangée* (F). نوع من الزراند ساقه منتصبه تملو نحو مترين. اوراقه مستدرة شبه مقطوعة. ازهاره مهدبة الخمار صفحتها الخارجية فتتقبة اللون اما الباطنية حنطية.

#### ١٣٣٩ - زُرُونْدِي اَبِيض

هو الهناية الثنائية النصل. اطله.

١٣٣٩ - زُرُونْد بَات *Aristolochiaceae* (S). *Aristolochiacées* (F). *Aristolochiacées* (F).

فصيلة نباتات مدادة عارشة او منتصبه. اجناسها وانواعها كثيرة العدد مهدبة البلاد الحارة. فردية التجميع، متعاقبة معتقة. ازهارها ابليبة الازدراك، فردية التجميع، كبيرة اللد. ثمارها كمار سداسية القلق. منها انواع طيبة حمدة اللع.

#### ١٣٣٩ - زُرُونْدِين، أوستولويحين

*Aristolochine* (F). *Aristolochin* (E). جهور جمالي فمال مر العلم يستخرج من جلودر بعض انواع الزراند اغصانها:

*Aristolochia serpentaria* الزراند الثعباني  
*Aristolochia clematitis* الزراند الطياني

١٣٣٩ - زُرْب، زُرْب Parcage (F). Folding (E). قليلة اللع والماعز.

#### ١٣٣٩ - زُرْبِلَة دَقِيْقَة \*، عَسْمِيَّة مَلُونَة

*Brotolomia meticulosa* (S). *Brotolomie méticu-*

**Bernage (F).** ١٢٤٠٢ - زُرُوع الرَعَاوِيَة  
هو الزرع المكون من خليط من البذار يستعمل كملف اخضر .

**Drogail** ١٢٤٠٣ - زُرُوع العَصْرِ ، زُرُوع الصَّغِير  
هو زرع الحبوب قبل المطر . والعصر اول سقية يسقاها الزرع من المطر .

**Semences (F). Seeds (E).** ١٢٤٠٤ - زُرُوطَة  
هو الحب المهد للزرع . راجع بذار . يقال اعطي زرة ازرع بها ارضي || والزرة : فرخ القيقبة .

**Glèbe, Sol (F).** ١٢٤٠٥ - زُرُوعَة ، مَسَاوَة  
**Glebe, Soil (E).** الارض التي تزرع .

**Sole (F). Break, Field (E).** ١٢٤٠٦ - زُرُوعَة ، عَمْرَة  
كل زراعة من الزراعات التي تتعاقب في ذات المكان .

**Céréaline (F). Cerealin (E).** ١٢٤٠٧ - زُرُعِين  
هو عنصر الخمير الموجود في النخالة ويقال له سيجوين .

**Frisolée, Bouquet (F).** ١٢٤٠٨ - زُرُقْن \*  
**Leaf drop streak (E).** سماء المهندس عادل ابو النصر «مرض تجعد اوراق البطاطا» ومنهم من قال «مرض تجعيد اوراق البطاطا» || وهو ضرب من مرض البطاطا يولد الى يورس لا يصيب الفرة فيحور شكلها الطبيعي من الاستدارة الى الاستطالة

ومن البيضي الى المردني بعد ان يزيد عمق غور المويات . اما الثباتات الحاصبة فتبدو نخيلة الفروع المزدهة ، صغيرة الالوان المنكشة المنجبة بالاخضر الماتق والبيات والاصفر ثم يتجعد نصلها وتلتوي اطرافه وصله نحو الارض || اضراره متفاوتة التقدير لانها تعود الى طاقه اليورس ومدى انتشاره || يكافح بانتخاب البذار السليم وباختتاب الاربة الفقيرة لان فقر التربة مع شدة الحرارة تشغلها كثيراً .

**Sternite** ١٢٤٠٩ - زُرُقِين \*  
حلقة من حلقات بطن الحشرة الذي يتركب من عدة زرافين .

**Elanus melanopterus (S). Elanion mélanoptère (F).** ١٢٤١٠ - زُرُق الشَّرَق  
**Black-winged kite (E).**

طائر من الزرافين ينتمي الى عمارة الحدأ وفضيلة الصقريات . موطنه الشرق الاوسط وافريقية ، يكثر في مصر وسورية . رأسه وسنقه سود . ظهره وذنبه الى الرمادي الازرق . بطنه ابيض . منصر اسود . عيانه قزويني . يحالبه الى الصغار البرتقالي || يدفن عشه في الاشجار الرقيقة . قوته القواصم والجراد ويختلف الحشرات .

**Colombine (F).** ١٢٤١١ - زُرُق الحَمَام  
**Columbine (E).**

سماد عضوي غني بالازوت ويسائر العناصر الغذائية . يعتبر من الاسمدة المعارية .

١٢٤١٢ - زُرُق الطَّيْر هو البتينة ، اطلبا .

١٢٤١٣ - زُرُقَطَة هي الزبور الصغير ، اطلبا .

القواطع والاولاد . تميش جماعات . قوتها الحشرات ويبيض الطائر . تتميز بريشها الاسود اللامع المرط ، باستطالة اجنتها ويقصر اذنائها || تثن في الاشجار . اناتها تحض رسدا من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في السنة || اشهر انواعها ما يتبع .

**١٢٣٩٣ - زُرُورُ أَرْجَوَانِي**

**Sturnus purpuraceus (S). Etourneau pourpre (F).**  
طائر من الزرور موطنه ايران والافغان ، ريشه ارجواني منشش بالابيض . طوله نحو ٢٠ سم . سره قليل العدد . يألف المناطق والمقاصب ويجاري الماء .

**١٢٣٩٤ - زُرُورُ أُسُود**  
**Sturnus unicolor (S). Etourneau unicolore (F). Spotless starling (E).**

طائر من الزرور طوله نحو ٢٠ سم . ثوبه سوي اللون الاسود اللامع . يعيش اسراب كبيرة العدد تجوب البلاد من الهند الى جنوب اروبة .

**١٢٣٩٥ - زُرُورُ الْبَادِيَة ، سُودِيَّة**  
**Onychognatus (S). Onychognate, Etourneau noir (F). Grackle (E).**

طائر من الزرافير يألف البادية يكثر في شبه جزيرة سيناء ثوبه الى السواد اللامع يعلو موج ازرق . قوامه حر منقاره اسود . يألف الادغال واشجار السط .

**١٢٣٩٦ - زُرُورُ الْهِنْد \*  
Sturnus splendens (S). Etourneau splendide (F). Splendiferous starling (E).**

طائر من الزرور ثوبه متراكب الالوان الزاهية الجميلة المرطبة فيها الاسود والاحمر والجزوي والاصفر والابيض والحطبي . طوله نحو ٢٢ سم . يألف المراعي ويجاري الماء .

**١٢٣٩٧ - زُرُورُ مَالُوف \***  
**Sturnus vulgaris (S). Etourneau vulgaire, E. commun, Saisonnet (F). Common starling (E). Star (D).**

طائر من الزرافير القواطع يجوب الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية . طوله نحو ٢٣ سم . ثوبه الى السواد اللامع يعلو موج ازرق واخضر ورقشة يبيض . يختلف حجمه مشتها بين الظهر والصدر والبطن . منقاره حطلي . عيانه كستينيان || قوته الحشرات والديدان والحلزون والحبوب والثر العنينة .

**١٢٣٩٨ - زُرُورِيَّات**  
**Sturnidae (S). Sturnidés (F). Sturnidae (E).**

فصيلة طير من رتبة الجواثم اجناسها وانواعها عديدة . اجناسها ربة متوسطة القد . اجنتها مستطيلة . اذنائها قصيرة . اسرارها قوية . مناتيرها مخروطية الشكل دقيقة الطرف . اثنائها عديدة الالوان المختلفة || اشهر اجناسها الزرور والسرمر والمينيات والتفاف .

**١٢٣٩٩ - زُرُشَك** هو البر باريس ، اطلبا .

**١٢٤٠٠ - زُرُع**  
**Emblaver (F). To sow with wheat etc. (E).**

حرث الارض رسدا ويذرهما .

**١٢٤٠١ - زُرُع ، زُرُوع**  
**Céréales (F). Cereal, Corn crops, Grain (E).**

كلمة شاملة تطلق على الثباتات الزراعية الموسمية من فصيلة التجيليات التي تزرع لاستثمار حبوبها النشوية الغذائية .



زرور الهند



زرور مالوف



زرف



زرف



## ١٢٤١٤ - زُرْقُف \*

Perisoreus (S).

Mésangeal (F). Siberian Jay (E).

جنس طير من فصيلة الزرقايات ورتبة الجوارح سنيات  
المتاثير. له نوعان واحد اسوي والأخر كندي. يألف  
الاقانم الباردة والغابات وأحراج الصنوبر اعصها صنوبر  
سمبر || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٠ سم. ثوبه الى  
الغصنة الصفانية باستثناء الرأس فإنه اسود. منقاد غروطي  
الشكل ، شديد الصلابة . جناحه معتدل الطول . ذنبه  
ورثاجي الرقاف مستدير الطرف . حدة عينه ذهبية اللون .  
رسفاه الى السمره المخملية || قوته الحشرات واليدور ويعرزن  
بلور صنوبر سمبر في تجاويف الاشجار الشجرة كزنبرة  
لفصل الشتاء || يابن عشه في الاشجار القريبة من سطح  
الترية . الاثني تقع من ه الى ٧ بضات تحفصها وسدعا  
نحو ١٧ بيما بينا الذكر يقطن لها الغذاء .

## ١٢٤١٥ - زُرْقُوم ، جَرِيثُ البَحْر \*

Conger (S).

Congre (F). Congre (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من مفتوحات المائنة عادات  
الارسل وفصيلة الزرقويات . انواعه المعروفة اربعة جميعها  
من اسماك بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها  
مستطيلة ، عريضة ، عادمة السهف . طول من مترين  
الى اربعة امتار . اوثانها تختلف مع الانواع . رؤوسها  
شبه غروطية . اوقاها كبيرة الاشداد . شارفة الفكوك  
العليا . اسنانها فكية وحكيكة ، جميعها ذرية . مناسمها  
انثابب صغيرة تحمل مقدم الحلق . فيها كبيرة مستديرة  
معتدلة النشور . زعانفها الظهرية فردية مسطيلة ، قليلة  
المرض تمتد من اواخر الزام الاول الى طرف الذيل .  
تقابلها الشرجية التي تمتد ايضا من اواخر الزام الثاني الى  
طرف الذيل . زعانفها الحوضية والذيلية منعدمة || اشهر  
انواعه الزرقومة المدولة .

## ١٢٤١٦ - زُرْقُومَة مَبْدُولَة \* ، جَرِيثُ البَحْر

المَبْدُول ، ثُون بَحْرِي ، عَرْمُوط

Conger vulgaris (S). Congre commun, Anguille de mer (F). Congre-eel (E).

نوع من الزرقوم . سمكة بحرية مفترسة بيوض . اعطانها  
فصيلة تشمل سلطع اعشاج بحار المناطق الحارة والمعتدلة  
الحارة . تفضل مرتع المسخور حيث تكثر الاسماك  
الصغيرة ولا تمتع عن الجيف ابنا كانت إن عل الشطوط  
الربلية او بين المسخور || جسمها مستطيل الشكل ،  
يطول من ٣ الى ٤ امتار . قشارها عادم السهف ، غروي  
السطح المالى || ثوبها الى البردة الزرقاء يبق عند الظهر  
ويظهر عند البطن || تحلبها الجسورية لا تختلف من  
تحلبه الجنس الى الزرقوم || تسرح غالباً الى الليل . صيدها  
يستلزم عدة ضخامة اسحبها شخص مثلث الحرايب ويخبط  
مين لا يفعل في الاحسكاك بالمسخور || لحمها متوسط  
الصفت مأكول .

## ١٢٤١٧ - زُرْقُومِيَّات \*

Congridae (S).

Congridae (F). Congridae (E).

فصيلة اسماك بحرية مفترسة بيوضة من مفتوحات المائئات .  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من احابار  
الغنية الميسانية من الاباح الثالثي . اما المعاصر منها فقليل  
العدد ينتمي الى جنس واحد يدعى زرقوم || اعطانها بحار  
البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اجسامها مستطيلة ، عادمة

السهف . رؤوسها غروطية ، كبيرة الاشداد ، كبيرة  
الاسنان الفككية والحكيكة .

## ١٢٤١٨ - زُرْقُون

Zircon

حجر بلوري مركب من سيليكات الزرقونيوم . نقله  
التنوعي يراوح من ٥ الى ١٠ ، وصلاته نحو ٧٠  
لونه عادم الاستقرار يراوح من الاصفر البرتقالي الى  
الاحمر ، لمعانه بلوري المراج . وهو شائع الاستعمال في  
الصياغة يعتبر من الاحجار الكريمة التابعة الى المرتبة  
الرابعة او الخامسة .

## ١٢٤١٩ - زُرْقُونِيُوم

Zirconium

معادن رصاصي الانتم مركز بين الالونيوم والسيليوم .  
رمزه (زر - Zr) وزنه الانثوي ٨٩.٦ .

## ١٢٤٢٠ - زُرْمَبَايَة

Murrène (F). Moray (E).

هي الشق ، من الاسماك البحرية المفترسة ، اطبا .

## ١٢٤٢١ - زُرْقَب

هو القلقوس ، اطبا .

## ١٢٤٢٢ - زُرْقَبَة

Penil (F). Penile, Penial (E).

الجزء الخارجى العلوي من الفرج .

## ١٢٤٢٣ - زُرْمَبَا \* ، زُرْبَمَة

Zingiber zerumbet, Anomum zerumbet (S). Zerum-  
bet, Anomum sauvage (F). Wild ginger, Broad leaved  
ginger (E). Zerumbet, Wilder ingwer (D). Zenzero  
blanco, Z. salvatico (I).

نبات بري جنموري طبي من فصيلة الزنجبيليات منته  
البلاد الحارة . مضغه يعطر القم ويزيل روائح الخمر  
ويصل وماشي . وهو منه معوي يحلل الرياح ويقوي  
القلب . ساقه منتصبه حولية تملو من ١٠ الى ١٢٠ سم .  
اوراقها متعاقبة ، تفصلها سنانى الشكل جامد الصفحة .  
ازهارها هامة كبيرة القد ، كبريتية اللون .

## ١٢٤٢٤ - زَرْبُوك ، زَهْر التلج

Chionanthus (S). Chionanthe, Arbre de neige, A.  
à franges (F). Fringe tree, Snow-drop (E). Schneeflockenbaum (D). Chionanto, Fior di neve (I).

جنس اشجار وشجيرات ونباتات برية وزينة من فصيلة  
اليترونيات . جذوعها اسطوانية . فروعها افترافدا مسطحة .  
اوراقها عابلة متعاقبة بسيطة النصل الجلد . ازهارها  
معتدلة التنجسج ، ثلاثية التركيب ، بيضاء اللون || اشهر  
انواعه الزربية ما يلي .

## ١٢٤٢٥ - زَرْبُوكُ الشَّرْقِي \* ، زَرْبُوكُ صِينِي

Chionanthus retusa (S). Chionanthe de Chine (F).

شجرة سبروتية تملو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقها احليجية  
مقطوعة القاعدة ، مدببة المقص . تفصلها بطول من ٤ الى  
٧ سم . ويعرض من ٣ الى ٤ . عروقها بارزة خلية البشرة .  
عشكها الزهري منتصب الاوتكاز ، ازهاره عطرية العرف  
صغيرة القد تطلو نحو ٢ سم . || ازهارها يستمر من  
ايار الى حزيران .

## ١٢٤٢٦ - زَرْبُوكُ فيرجينية

Chionanthus virginica (S). Chionanthe de  
Virginie (F).

شجرة سبروتية تملو من ٣ الى ١٠ امتار . اوراقها  
سنانية النصل الجامد تطلو من ٨ الى ٢٥ سم . وتعرض  
من ٣ الى ٩ سم . || عشكها الزهري مثالي الاوتكاز .



زرقف



زرقومة مدولة



زرباد



زربوك الشرق

## ١٢٤٣٦ - زُرُونَجَة \* ، اُرُوَا كَوَكَبِي

Agrostis verticillata (S). Agrostide verticillée (F). Switch grass (E). Haargras (D). Pennacchini (I).

نبات عشبي بري حولي من النجيليات يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه سنانية ضمية التجميع. يكثر في الأتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة، ترعاء الماشية وتستحب.

## ١٢٤٣٧ - زُرُونَجَة \* ، زَعْفَرَان الجَيْلَس ، زَعْفَرَان

Bulbocodium vernum (S). المروج  
Bulbocodium printanier, Campanette (F). Meadow saffron (E). Lichtblume (D). Colchico di Spagna, Croco rosso (I).

نبات بسلي بري من فصيلة السورنجانيات يكثر في البلاد الجبلية والمروج الرطبة. شكله بين السورجانج والزعفران. يصلته سمره اللون. أوراقه ثلاثية العدد ضيقة التصل المستطيل المحجن. شراخه قرصي الانتشاب يعلو من ٥ إلى ٣٠ سم. زهرته وردية أو بنفسجية اللون، قيمة الشكل من أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران يقال إن أزهاره صبغية وصحيقها الجاف لا يخلو من القوائد الطيبة غير المقررة.

## ١٢٤٣٨ - زُرُونَجَة

Emblavure (F). Land sown with wheat etc. (E).

هو الحقل وكل مزروع سمه وكرب وبلد وأثير.

## ١٢٤٣٩ - زُرُونَجَة

هي رباح الفايون، اطلية.

## ١٢٤٤٠ - زُرُونَجَة

هي الدخلة السؤدية طائر من الدسل.

## ١٢٤٤١ - زُرُونَجَة ، شَلْبَة عَرَبِيَّة ، أم دَنْقِيس

Eutropius niloticus (S).

سمكة نهريه مأكولة من فصيلة السلوريات يكثر وجودها في النيل والنيجر.

## ١٢٤٤٢ - زُرُونَجَة \*

Zosterops (S). Zostérope (F). Zosterops (E).

طائر من فصيلة الزطروبيات. موطنه بعض الاقاليم الحارة من الشرق الاوسط وأفريقية الشرقية والشيالية || جسمه صغير القد اعين القوام بطول نحو ١٢ سم. ثوبه الى الخضار الزهني. رأسه وجناحاه وذنبه الى الخضار اللامس. عيناها مطوقتان بالابيض. صدقة عينه الى الخضار الزهني. متقارب رقيق ويحمل. رصفاه قيقان اسمران || قوته الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والحوام || يدثن في الاجمار الرقيقة. الاثني تقع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر نحو ١٣ يوما.

## ١٢٤٤٣ - زُرُونَجَات \*

Zosteropidae (S). Zosteropidae (F). Zosteropidae (E).

فصيلة طير من الجوارم رقيقات المناشير. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ موطنها معظم المناطق الحارة من العالم القديم. تألف الثنايات والاسرار والحدائق وتقترب من المساكن الريفية || اجسامها صغيرة القد، رشيقة القوام. اقربها متباينة التخفيض يكثر فيها الاخضر || قوتها الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والحوام وبعض البذور البرية.

## ١٢٤٤٤ - زَعَج ، زَعْبَج

هو الغيم الابيض الرقيق الخفيف البعيد.

أزهاره عطرية العرف طول من ٢ الى ٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

## ١٢٤٤٧ - زُرُونُف

Ruisseau (F). Rivulet (E).

هو الجدول الثانوي الذي يصب في النهر. ج زرايف.

## ١٢٤٤٨ - زُرُونِج

عنصر شبه معدني سنجابي اللون عديم الرائحة والطعم يوجد في الطبيعة متزجبا بغيره من العناصر بكميات ضئيلة متفرقة القدر كما انه يوجد في ماء البحر وفي جسم الانسان || رمزه (As-z) وزنه الذري ٧٤.٩١. ثقله النوعي اذا كان متبلورا ٧.٥ وان كان لا متبلورا ٧.٧ || يستمد باستخلاصه من مركباته الطبيعية وهو مع مركباته الصناعية من العناصر السامة الفعالة. مركباته الصناعية عديدة تستخدم في شتى الحقول اخصها مقايمة وابادة الحشرات الزراعية كما انها تستعمل في الطب لتفوية البلية وفي علاج بعض الامراض الجلدية.

## ١٢٤٤٩ - زُرُونِج أحمر

Réalgar (F). Realgar (E).

هو كبريتور الزرنيخ الطبيعي.

## ١٢٤٥٠ - زُرُونِجَات

Arsénates (F). Arseniates (E).

مركبات صناعية ترتكز على الزرنيخ تستعمل في مكافحة الحشرات النباتية. اهمها استمالا:

## زُرُونِجَات الرصاص

Arsénate de plomb (F). Lead arseniate (E).

## زُرُونِجَات النحاس

Arsénate de cuivre (F). Copper arseniate (E).

## زُرُونِجَات الصودا

Arsénate de soude (F). Salt-wort arseniate (E).

## ١٢٤٥١ - زُرُون \* ، زَهْر العَرَبِيز

Crossandra (S). Crossandre (F). Crossander tree (E). Franzenbeutel (D). Crossandra (I).

جنس شجيرات تزيينية معمرة من فصيلة الاقتنيات. انواعه خمسة منها الهند وأفريقية الشرقية. أوراقها اهليلجية متعاقبة. ازهارها نوري التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها عطرية مستندرة النباتات القارضة الجملية الشكل. الوانها تختلف مع انواعها منها الابيض والاسفر والاحمر والموش.

## ١٢٤٥٢ - زُرُونَج

Garrulus (S). Geal (F). Jay (E).

جنس طير من فصيلة الغرابيات وربة الجوارم. انواعه ١٢ جميعها بقدر الامة. رؤوسها كبيرة، مناقيرها جالبة قوية. اقربا ملونة جميلة التزاويق || وهو يقبض الاصوات كالغناء. قوته جميع انواع الحشرات الكبيرة والقار والظاء والمصاصين الصغيرة والبلوط والحبوب والبار || اشهر انواعه ابو زريق والقيق.

## ١٢٤٥٣ - زُرُونِجَة

Enclos (F). Enclosure, Paddock (E).

هي الحظيرة من خشب تحجز فيها المواشي.

## ١٢٤٥٤ - زُرُونِجَة اختنازير

Porcherie (F).

هي الخنزارة ماوى الخنازير.

## ١٢٤٥٥ - زُرُونِجَة الطيور

Pigsty, Piggery (E).

هي الحريسة، اطلها.



زُرُون



زُرِيَاب



زُرِينَة



زُرُونَة



زُرُونِج

اوراقه مذبذبة القاعدة، نصلها ادم التفصيص او قليله اخضر اللون على صفحته، ازغب الصفحة السفلى. نوره الزهرية كثيفة تمد من ١٠ الى ٢٠ زهرة، زياه الجسم، عشرية الاسدية. ثماره حراء اللون، صغيرة القد، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م.

#### ١٢٤٥٤ - زُغُرُور أَزْبَع

*Crataegus tomentosa* (S). *Aubépine tomenteuse*, *Epine tomenteuse* (F).

نوع من الزعرور يملو من ٥ الى ٦ أمتار. شوكة معتدل القد قليل الكثافة شديد الصلابة. اوراقه بيضيه معينية الشكل، زياه النصل على صفحته. نوره تمد من ٣ الى ٧ ازهار. زهرته عشرية الاسدية الحراء اللون. ثماره بيضيه او اجاصيه الشكل، برتقالية اللون.

#### ١٢٤٥٥ - زُغُرُور أُسُود، بُون

*Crataegus nigra* (S). *Aubépine noire*, *Epine noire* (F).

نوع من الزعرور يملو نحو ٣ أمتار. اوراقه عديدة الغصص. نصلها خلى البشرة على صفحته. نوره متوسطة القد تمد من ٥ الى ١٢ زهرة. زهرته كروية الاسدية، خاسية الملقات والبرقيات. ثماره كروية الشكل، لونها الى السواد، قطرها نحو ٢ م.



زعرورة

#### ١٢٤٥٦ - زُغُرُور أَصْفَر

*Crataegus flava* (S). *Aubépine jaune*, *Epine jaune* (F).

نوع من الزعرور يملو من ٢ الى ٧ أمتار. اوراقه مذبذبة القاعدة، نصلها غدا التفصيص او قليله، لونه الى الخضار البشري. تملو غدا مستطعة حراء اللون، نوره تمد من ٣ الى ٥ ازهار. زهرته كبيرة القد عشارية الاسدية الوردية اللون. ثماره صفراء اللون، برتقالية المالح، قطرها يراوح بين ١٢ و ٢٠ م.

#### ١٢٤٥٧ - زُغُرُور الْأُودِيَّة، زُغُرُور أَحَادِي

*Crataegus monogyna* (S). *Aubépine monogyne*, *Noble épine* (F). *Hawthorn* (E). *Spitsdorn* (D). *Blanco spino* (I).

نوع من الزعرور، هربي الشكل، يرغب في الاديبة. يملو من ٤ الى ٥ أمتار. اوراقه بالغة التفصيص. نصلها مسن الحافة ازغب الصلع والبروق على الصفحة السفلى. نوره تمد من ٧ الى ١٢ زهرة. زهرته احادية الملقة والبرقية. ثماره فردية الحجم، مخلفة الالوان، فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر جميعها صغيرة القد قطرها نحو ١٠ م.

#### ١٢٤٥٨ - زُغُرُور أَمْرِيكِيَّة

هو الاغراس الامريكي، امله.

#### ١٢٤٥٩ - زُغُرُور جِرْمَانِي

هو المشلة، امله.

#### ١٢٤٦٠ - زُغُرُور خَوْخِي الْوَرَق

*Crataegus prunifolia* (S). *Aubépine à feuilles de prunier*, *Epine à feuilles de prunier* (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى عشرة أمتار شوكة قصير القد. اوراقه خوخية الشكل نصلها خلى الصلع والبروق على صفحته السفلى. نوره تمد نحو ١٢ زهرة. زهرته خلية الجسم، عشارية الاسدية. ثماره صفية القد بيضيه الشكل حراء اللون ناشفة السيوق.

#### ١٢٤٦١ - زُغُرُور سِينَا، زُغُرُور مَوْسِي

منهم من قال عليق موسى. يعرف بشوك النار، امله.

١٢٤٤٥ - زُغَبَل *Cotonnier* (F). *Cotton-tree* (E). هو جنبه القطن في زمن حلها.

١٢٤٤٦ - زُغَبَلَة *Seau* (F). *Pail*, *Bucket* (E). دلو يستقى بها.

١٢٤٤٧ - زُغَبُوب *Microrrhize* (F). نعت تعريفية يطلق على كل نبات صغير الجذور دقيقها.

١٢٤٤٨ - زُغَبُوبَة \* *Nepticula* (S). *Nepticule* (F). *Nepticula* (E).

حشرة من فصيلة الزيربوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة. اصطناعا بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف الحراج التي تكثر فيها السوسليات || جسمها صغير القد، كثيف الخمل. يسطها نحو ٧ م. رأسها معتدل الحجم. خطمها صغير. ملسا قميان. عيناها صغيرتان، بارزتان. زباناها خيطيان. جناحاهما الخلفيان مستعرضا لاهداب. غلظتاها قاعجتاهما الخلفيتين رباعية المناسخ الحادة. ثوبا الى البني. اجنتها مجتمعة بالانحر || الانثى امين قدما من الذكر وابت ثوبا من || السرعة لاغمة، تعيش على وئ النصال. تركب جميع نباتات الفصيلة السوسلية.

١٢٤٤٩ - زُغَبُوبِيَّات \* *Nepticulidae*, *Nepticulidæ* (S). *Nepticulidés*, *Stigmellidés* (F). *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجنتها وانواعها المهرقة نحو ٢٢٠ منشرة في جميع اقطار العالم || اجنتها صغيرة، كثيفة الخمل. رؤوسها معتدلة الحجم. اصطناعها وملابسها مصورة. عيونها صغيرة، بارزة. قربها الاستشعارية خيطية، مسطيلة. اجنتها ضيقة، مسطيلة. اهداب اجنتها الخلفية رمية. غلظاها قوامها الخلفية رباعية المناسخ. يطنها مستفصنة. اوطاها مبيضة الالوان || اساريها لاغمة. اكمال عاداتها يتم على نصال الاوراق الملتصقة ضمن فيالج متحدة الحبال || اشهر اجنتها الزيربولة.

١٢٤٥٠ - زُغَعَر هُو سَعَر البر، امله.

١٢٤٥١ - زُغُرُور *Crataegus* (S). *Aubépine*, *Epine* (F). *Hawthorn*, *White thorn*, *May* (E).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات انواعه عديدة بعضها كثير الورد في جبال حوض البحر المتوسط. تتميز بشوكها وصلابة اغشائها. اوراقها جامدة النصل. ازهارها نورية التجميع صغيرة القد. ثمارها عنية الشكل مخلفة الالوان قل منها المأكول. اعرف واشهر انواعه ما يتبع.

١٢٤٥٢ - زُغُرُور أَحْمَر *Crataegus sanguinea* (S). *Aubépine rouge sang*, *Epine rouge sang* (F).

نوع من الزعرور يرغب في الاقاليم الباردة يملو من ٣ الى ٧ أمتار. اشواكه قليلة. فروعه حراء الماء. اوراقه بيضيه مقعصة. نوره قليلة الزهر. زهرته عشارية الاسدية. ثماره صغيرة القد قطرها نحو ١١ م. لونها الى الحمرة الدسوية.

١٢٤٥٣ - زُغُرُور أَخْضَر *Crataegus viridis* (S). *Aubépine verte*, *Epine verte* (F).

نوع من الزعرور يملو من مترين الى عشرة أمتار.

١٢٤٦٨ - زَعْفَرَان - كَنْف  
Plastron  
الحاف الجزء الامامي من كؤل الحشرة ولحاف الجزء السفلي من السلخانة .

١٢٤٦٩ - زَعْفَرَان ، جَادِي ، جَسَاد ،  
جِيَهْمَان ، ذَلَهْقَان ، رَادَن ،  
رَبَهْقَان ، صَقْرَان ، كُوكَبَس ، زَعْبِيل  
Crocus (S). Safran, Crocus (F). Saffron, Crocus (E).  
جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . انواعه  
وضرويه وهاله عديده منها البرية والزراعية معظمها  
صبغاني وبعضها طبي || تجارتها قصيرة القد . ازهارها  
اوراقها مستطيلة انابيا دقيقة الجسم بقية الطرف . اوراقها  
ضيقة النصل الخدد || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٢٤٧٠ - زَعْفَرَان أَيْضُ  
Crocus candidus (S).  
Safran blanc, Crocus blanc (F). White saffron (E).  
نوع من الزعفران شراعه يملو من ٨ الى ١٠ سم .  
زهرة بيضاء البتلات ، صفراء المتق الداخلي . سماتها  
كاملة مهدبة ، شرعافها عادي || اوراقها خيطية مستطيلة ،  
مالة النصل . ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٢٤٧١ - زَعْفَرَان الْجَيْل ، زَعْفَرَان المَرْج  
هو الزريرة نبات بصلي من السوزجانيات . اطبخ .

١٢٤٧٢ - زَعْفَرَان الرِّيْع  
Crocus vernus (S).  
Safran printanier, Crocus printanier (F).  
نوع من الزعفران . ضروبه كثيرة المدد . شراعه يملو  
من ٦ الى ٢٠ سم . زهرته بنفسجية اللون خلية المتق  
صفراء الانبوب . سماتها كاملة . شرعافها عادي || اوراقه  
مستعرضة ، عرض نصلها يراوح بين ٥ و ٨ سم .  
ازهاره يستمر من شباط الى اذار .

١٢٤٧٣ - زَعْفَرَان ثَسَالِي الزَهْر  
Crocus biflorus (S). Safran biflore, Crocus biflore (F).  
نوع من الزعفران ضروبه كثيرة العدد والالوان . شراعه  
يملو من ٨ الى ١٦ سم . زهرته صفراء الصفحة الخارجية  
بيضاء او زرقاء الداخلي . سماتها كاملة ، شرعافها  
عادي || اوراقه ضيقة النصل المتق المائل البشرة || ازهاره  
يستمر من كانون الى شباط .

١٢٤٧٤ - زَعْفَرَان ذَهَبِي  
Crocus chrysanthus (S). Safran jaune d'or, Crocus  
jaune d'or (F).  
نوع من الزعفران مهدب الشرق الاوسط والبلقان . شراعه  
يملو من ٥ الى ٨ سم . زهرته ذهبية اللون ، بتقالية المتق ،  
صفراء الانبوب . سماتها جزئية مهدبة . شرعافها عادي .  
اوراقه خيطية ، معتدلة النصل ، خشنة الملمس || ازهاره  
يستمر طوال شهر اذار .

١٢٤٧٥ - زَعْفَرَان سُورِي  
Crocus syriacus (S).  
Safran de Syrie, Crocus de Syrie (F).  
نوع من الزعفران يكثر بسويده في البلاد السورية .  
شراعه يملو من ٨ الى ١٢ سم . ازهاره صفراء اللون  
يملوها توشيح عايق . سماتها كاملة . شرعافها عادي .  
اوراقه ضيقة معتدلة الطول || ازهاره يستمر من كانون  
الى اذار .

١٢٤٧٦ - زَعْفَرَان شَائِك \* ، شَرَكَة حَادَة  
Crataegus oxyacantha (S). Aubépine commune,  
Epine blanche, Senelle (F). White thorn, May-bush,  
Quick (E). Gemeiner dorn, Hagedorn (D). Marruca  
blanca, Blancospino, Ceresella (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٥ اطار . شوكه معتدل  
القد ، كثيف التجميع . اوراقه مقصصة . نصلها مسن  
الحافة خلي الصفحة السفلي . نوره تمد من ٧ الى ١٢  
زفرة . زهرته ثنائية المنقة والفرغفة . ثماره ثنائية المنجة ،  
مختلفة الالوان فيها الاصفر والاحمر . جميعها متوسطة  
القد ، قطرها نحو ١٥ مم .

١٢٤٧٧ - زَعْفَرَان شَرْقِي  
Crataegus orientalis (S). Aubépine d'Orient, Epine  
d'Orient (F). Eastern thorn (E). Weissdorn (D).  
Lazzeruolo d'Oriente (I).

نوع من الزعرور يملو من ٥ الى ٦ اطار . اوراقه قليلة  
التفصيص ، نصلها كاند اللون خلي البشرة على صفحته .  
نوره كثيفة التجميع تمد من ٧ الى ١٥ زفرة . زهرته  
رباعية او خماسية المنقات والفرغفات . ثماره صغيرة  
القد جميعها حجم الكرز العادي .

١٢٤٧٨ - زَعْفَرَان صَيْصَعَة الدِيَك  
Crataegus crus-galli (S). Aubépine ergot de coq,  
Epine ergot de coq (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٠ اطار . شوكه  
مستطيل نحيل . اوراقه اعليجية الشكل ، مسنة الحافة  
عامدة التفصيص او قليلة . نصلها لامع البشرة على  
صفحة العليا . نوره الزهرية تمد من ١٥ الى ٢٠ .  
زهرة عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحمرة ،  
صغيرة القد ، نافضة السوق .

١٢٤٧٩ - زَعْفَرَان عَادِي \* ، نَلَك  
Crataegus azarolus (S). Aubépine azérolier, Azérol-  
lier, Argérolier (F). Azeroles tree, Neapolitan medlar  
(E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azarolo, Azza-  
ruolo (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٢ م . شوكه قليل  
الكثافة معتدل القد . اوراقه قليلة التفصيص نصلها  
لامع الصفحة العليا ، خلي السفلي . نوره تمد من ٥  
الى ٧ اطار . زهرته ثنائية او ثلاثية المنقات والفرغفات .  
ثماره لليلة العلم ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٢ سم .

١٢٤٨٠ - زَعْفَرَان قَرْمِزِي  
Crataegus coccinea (S). Aubépine écarlate, Epine  
écarlate (F).

نوع من الزعرور يملو من ٢ الى ٧ اطار . اوراقه  
قلية او مقنونة القاعد . نصلها دائم التفصيص لونه  
الى الخضار الباهت ، نوره الزهرية متوسطة الكثافة .  
زهرة خلية الجسم ، عشارية الاسدية . ثماره قمرزية اللون  
قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ مم .

١٢٤٨١ - زَعْفَرَان قَلْبِيِي الْوَرَق  
Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine  
à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٥ الى ٩ اطار . اوراقه  
قلبية الشكل ثلاثية التفصيص . نوره صغيرة القد تمد من  
٣ الى ٥ اطار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر  
اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .



زعرور شائك



زعرور عادي



زعفران طويل الزهرة

١٢٤٨١ - زَعْفُطَان \*  
Hesperophanes (S).

Hesperophane (F).  
جنس حشرات خاشية من فصيلة القرنبيات. أنواعه عديدة، جميعها متوسطة القد، مستطيلة الشكل. طولها يراوح بين ١٤ و ٢٢ سم. أجسامها زاهية، قربها الاشتدائية مستطيلة منقطة. اللون الوازي أبيض بين الخطي والبي. تسرح من الغروب إلى الفجر || يرقاتها تركيب وتنشر جميع أنواع الخشب اليابس بما فيها الاششاب المشغولة الخشبية.



زعفران لُبْنَانِي



زعفران غَرْزِي



زعفطان



زعفطان اربك



زعفطان التي

١٢٤٨٢ - زَعْفُطَان اُرْمَك \*  
Hesperophanes cinereus (S). Hespérôphane

cendré (F). Hesperophanes cinereus (E).  
حشرة غاشلة خاشية من فصيلة القرنبيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف اجراح السديان وغابات الحور والمساكن الارضية. غناصها غاشلة تميش على اوراق النبات. يرقاتها خاشية تركيب السديان والحور والاششاب المازلية المشغولة || جسمها متوسط القد بطول من ١٦ الى ٢٢ سم. ثوبها الى الشقة السمرار يعلوها مراح اربك يعود الى الخمل الكثيف الاطلل اللون. رأسها مستطيل الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها مستطيلان مهدبان. ظهرها فسق المؤخر الفارق للاحف. غذاءها نباتات التعزيز الخفيف القاطب، ككثبات الخمل. ارساغها رباعية العقول الظاهرة || الانثى اكبر قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقتصر زبانا || جيلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجملة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب. تسرح من الغروب الى الفجر || البرقة بطنية النشئ تترك الكال الجسوري بعد التلق بنحو ٣٢ شهراً. جسمها شبه مردني الشكل بطول نحو ٢٢ سم. ثوبها الى الخطي الاصفر المراح. رأسها اسمر || طور الاكمل الذي يحتاج نحو ٤٠ يوماً ينقضي ضمن صلجة مركبة من مواد نباتية معجونة بالريال.

١٢٤٨٣ - زَعْفُطَان اَكْهَب  
Hespérôphane gris (F).

حشرة مؤذية من القرنبيات تدعى زعفران التي، اكلها.

١٢٤٨٤ - زَعْفُطَان اليين \*  
Hesperophanes griseus (S). اَكْهَب

Hespérôphane gris, Longicorne du figuier (F). Hesperophanes griseus (E).  
حشرة غاشلة خاشية مؤذية من فصيلة القرنبيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف اثمار التي دون سواها. غناصها تميش على الاوراق واللحاء. يرقاتها تسربد الانداف والاعصان والجوف || جسمها متوسط القد بطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ثوبها الى الكهبة يعلوها خمل اربد ورتبة شهاده. رأسها مستطيل الجرم. عيناها كبيرتان ناشزتان. زباناها مستطيلان دقيقان. ظهرها مذهب الطرف للاحف. غذاءها ككثبات الخمل والربب || الانثى اكبر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه واقتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في اواخر حزيران. تسرح في الليل. تتلفد بعد ظهورها باسبوع واحد. تمتع المكن رؤياً تطلقها مادة غروية تشبه في مكنها || البرقة عند ادراكها الكال الجسوري تطول من ٢٢ الى ٢٥ سم. ثوبها الى البياض اللتي. جسمها مستطيل الرأس والصدر والقسم الاوسط من البطن وينتهي بطرف

١٢٤٨٦ - زَعْفَرَان طَوِيل الزَهْرَة \*  
Crocus longiflorus (S). Safran à longue fleur, Crocus

à longue fleur (F).  
نوع من الزعفران مهدد جزر البحر المتوسط. شراخه يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. زهرته صفراء الانبوب، برتقالية المتق، ليلكية البتلات، يعلوها توشج بنفسجي. اسديتها صفر. سمانها مقطوعة، برتقالية اللون. شرعافها مستطيلة || اوراقه ضيقة النصل المتدل الطول، الماسي البشرة || ازهاره يستمر من تشرين الاول الى الثاني.

١٢٤٨٧ - زَعْفَرَان عُرْبَان الزَهْر \*  
Crocus nudiflorus (S). Safran à fleurs nues, Crocus

à fleurs nues (F).  
نوع من الزعفران شراخه يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البتلات. سمانها منقطة، قدية الشكل برتقالية اللون. شرعافها اري || اوراقه ضيقة مستطيلة. بصله يرسل بعد ذبول الزهر نولمي دكرية مستطيلة || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الثاني.

١٢٤٨٨ - زَعْفَرَان لُبْنَانِي \*  
Crocus zonatus (S). Safran zoné, S. du Liban, Crocus zoné (F).

نوع من الزعفران مهدد جبال لبنان شراخه يعلو من ٦ الى ١٠ سم. زهرته ليلكية اللون بتلاتها مقطوعة، عتفا خلي البشرة، عايق الصفار. انبوبها حنطي اللون. سمانها كاملة صقية الشكل. شرعافها عادي || اوراقه خيطية ضمية مستطيلة || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٢٤٨٩ - زَعْفَرَان مَحْزُونِي \* ، زَعْفَرَان مَعْرُوف ، زَبْهَقَان  
Crocus officinalis, C. sativus (S). Safran officinal, S. d'automne, S. cultivé, Crocus officinal (F). Safran, Crocus (E). Echter safran (D). Zafferano, Croco fiorito, Croco domestico (I).

اعرف انواع الزعفران وايضاها منذ اقدم المهد || ضروب كثيرة العدد. شراخه يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. زهرته بنفسجية البتلات، ليلكية المتق، صفراء الانبوب. اسديتها بيض. سمانها عطرية الرائحة مستطيلة. شرعافها ثنائي الفلقة || اوراقه خيطية ضمية. ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الثاني || يستخرج من زهره وعصره بصله زيت طيار كثير النفع || يحرق زهره عطري العرف مر المذاق يستعمل في الطب و في الروائح العطرية وفي الصباغ. والجزء الواحد من مسحقه يصنع من ألف جزء من الماء. ابي ان غراماً واحداً من مسحوق الزعفران يصنع ١٠٠٠ ليتر من الماء || ومن الوجوه الطبية فازعفران يحل البصر ويقوي الاصاب وينشط القلب ويفرحه ويحب الباء ويدبر البول والطمث ويسهل الولادة اذا تسمرت. وهو مضاد للتشنج وينظم في الاذن فيسكن آلامها.

١٢٤٨٠ - زَعْفَرَان مَوْشَح \*  
Crocus versicolor (S). Safran versicolore, Crocus versicolore (F).

نوع من الزعفران شراخه يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. يعلفه عند قاعدته شرعاف قصير || زهرته عطرية الرائحة، يضاف اللون، موشحاً بالبنفسجي. سمانها كاملة || شرعافها مزدوج التركيب || اوراقه خيطية، مستطيلة، حلقة النصل || ازهاره يستمر من شباط الى اذار.

يرقاتها غبراء اللون، قصيرة القد، تركيب جلود الكرة فترقتها وتنتشرها.

١٢٤٩٠ - زَعْفَقُوقُ النَّخْلِ\*، مَكْرُوتُومُ النَّخْلِ\*  
Macrotoma palmata (S). Macrotonome du palmier (F).  
حشرة خاشية من القرنبيات طولها نحو ٤٥ م. لونها الى  
السمر الحطية. زباناها طويلة متعقبة. تسرح في الليل.  
تتجمع مكثا على جلود النخل فينتفخ عن رقات غبراء  
اللون، زباناها الجسم، سوداء الملب تنخر الجلود  
وتعطلها.

١٢٤٩١ - زَعْفَرُوقِيَّاتُ\*  
هي القرنبيات فصيلة حشرات من غديات الاجنحة،  
اطلها.

١٢٤٩٢ - زَعْفَقَفَةٌ  
Nageoire (F). Fin (E).  
الزعنفه هي عضو الحركة الانتيالية في الحيوانات المائية.  
ج زعانف. ولزعانف تقسم حسب موقعها في الجسم الى:  
سديدة وبعنينة وظهيرية وشرجية وذنبية.

١٢٤٩٣ - زَعْفَرُوقِيَّاتُ الْأَقْدَامِ  
Pinnipèdes (F). Pinnipedia (E).  
رتبة حيوانات لبونة ألفن حياة البسر والبر. انواعها  
المعاصرة المعروفة ٣٦ تنقسم الى ١٢ جنس ينجمها ثلاث  
فصائل كما هو مبين في الجدول التالي || اجسامها شبه  
وشمية الشكل، متفاوتة الطول والحجم. اطولها تراوح  
من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. رؤوسها مكورة. عيونها كبيرة  
جاذبة. اذانها ومناقشها ملحوة. اسنانها متباينة الاشكال  
والهجوم لكنها وحيدة الصيغة عند كل فصيلة. اعناقها  
قصيرة واذنانها كذلك. قوائمها خاسية الاضراس الكاملة  
الحطاب والمقلوبة بما يحملها كالزرافات || اصباع الاسماك  
والقتريرات والرخويات. ملجئها الحياتي يختلف مع اختلاف  
الانواع. معظمها غمرى جماعي وبعضها زويبي.

١٢٤٩٤ - زَعْبِ  
Croassement (F). Croak, Croaking (E).  
الزعب هو صوت الغراب كالنبيب والتنيق.

١٢٤٩٥ - زَعْفَرُوقِيَّاتُ\*  
هو الزغرط، اطلها.

١٢٤٩٦ - شُرْشُورُ جَيْلِي\*  
Fringilla montifringilla (S). Pinson de montagne, P.  
d'Ardennes (F). Mountain finch, Brambling (E).  
Bergfink (D).  
نوع من الشرشور طوله من ١٨ الى ١٩ سم. رأسه  
وطوره وذنبه الى السواد الازرق. جناحه مخطط بالابيض.  
يقطعه وسدره الى الصبغة البرتقالية. بطنه وزنكاه بيض.  
اعلاه مرشاهن بالاسود || يعيش اسراب كبيرة تجوب  
البلاد في طلب الحبيب والشئ. قوته الحشرات اغصها  
الذباب ثم يزور النباتات الزرقية اغصها البرية || يدن  
في الاجمار. انثاء تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها  
بتأوية الذكر نحو اسبوعين.

١٢٤٩٧ - زَعْفَانُ\*  
Cycloconium  
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة  
جبره الكتيديدة مهمة الشكل والترتيب. هيغه يجوب  
المناطق الحولية داخل السافات الادمية الى ان يتقرق

مدب || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى  
ثلاثة اسابيع ينقضي في النفق الذي احفرته البرقة.

١٢٤٩٥ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ\*، زَعْفَرَانُ  
مَلْتَمَمٌ  
Hesperophanes fascicu-

latus (S). Hespérophanes fasciculé, Longicorne du  
caroubier (F). Hesperophanes fasciculatus (E).  
حشرة خاشية مؤذية من فصيلة القرنبيات ورتبة  
معدنات الاجنحة. تألف الاجمار الزراعية والبرية اغصها  
الخرنوب واللين والتوت والبطم والفسق والذلق... خنافسها  
تميش على الاوراق. رقاتها تسردب الافئاد والاغصان  
والجلود الاخضر منها واليابس فتعطلها وتؤذيها || جسمها  
متوسط القد يطول من ٢ الى ٢٠ م. ثوبها الى الكلسة  
يلوحها زغب احمر ومثقة زبداء. رأسها معتدل الجرم.  
عينهاا كيرتان. زباناها دقيقان مستطيلان. ظهورها  
منبسطة السطح، مستدير المؤخر الاحسف. غذاءها كيتفا  
الحمل والتشبيث || الانثى اكبر قدماً من الذكر واكد ثوباً  
منه واقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول. تظهر  
الحشرة الجملانة في اواسط حزيران. تسرح في الليل. تسافه  
بعد ظهورها ياسبور واحد. تتجمع المكن تحت اللحاء وبين  
القشور || البرقة، عند بلوغها الادراك التام، تطول من  
٢٠ الى ٢٥ م. جسمها مردي الشكل، حنطلي اللون،  
اغبر المواجه، احمر الرأس والفكين والشرج، مبهر الحلب  
التصغير الدقيق.

١٢٤٩٦ - زَعْفِي  
Vireux (F). Virose, Noxious (E).  
نمت تعريفي يطلق على النباتات او المواد النباتية التي  
راحتها الكريهة وطعمها المفس ينان عن وجود عنصر فعال  
قد يكون جمالي الماد.

١٢٤٩٧ - زَعْفُوقُ الْأَعْمَدَةِ\*، هِيلُورُوبُ\*  
Hylotrampus bajulus, Callidium bajulus (S). Hylotrupe,  
Longicorne des charpentes, Capricorne domestique (F). House longhorned beetle (E).  
Hausbock, Balkenbock (D).  
حشرة خاشية من فصيلة القرنبيات طولها نحو ١٦ م.  
لونها الى السمر الحطية تعلوها زغبة غبراء || تركيب  
الصنوبر حيث تتجمع مكثا فينتفخ عن رقات تنخر  
الحطب وتعطله. تعمرى بنوع خاص اعمدة التلفون  
وما اشبه.

١٢٤٩٨ - زَعْفُوقُ الْحِنْطَةِ\*  
Calamobius filum (S). Algüillonner, Saperde  
grêle (F). Grain borer (E). Getreidebohrrer (D).  
حشرة خاشية من القرنبيات صغيرة القد طولها نحو ١٢ م.  
لونها الى السمر تعلوها زغبة ملحلاء. قرونها الاستشعارية  
دقيقة وطويلة || تظهر في اواخر ايار، تتجمع مكثا  
على قصب الحنطة تحت السنايل فينتفخ عن رقات  
صغيرة تنخر القصب وتقوضها فتسبب كسرها وسقوطها  
السنبلة على الارض.

١٢٤٩٩ - زَعْفُوقُ الْكَرْمَةِ\*  
Vesperus xatarti (S). Vespère des vignes (F).  
Grape vesperus (E). Vesperus xatarti (D).  
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٠ م. لونها الى الصفار  
الحنطي. زباناها مستطيلة. انثاء نصفية القد المنفرج.



زعفران الخرنوب



زعقوق الاعمدة



زعقوق الحنطة



زعقوق الكرة (ذكر وانثى)



زعقوق النخل



زغاري

## زغغيات الأندلس

الفصيلة	عدد الأجناس والأنواع	أشهر الأنواع
أُتَارِيَّات	جنس واحد ١١ نوعاً	أُتَارِيَّة عَرَفَاء. أَسَدُ الْبَحْرِ أُتَارِيَّة سِتِيلَر أُتَارِيَّة كَلْفُورِيَّة أُتَارِيَّة دِيَّة
فُتَيَّات	عشرة أجناس ٢٣ نوعاً	فُتَيَّة بَدُولَة فُتَيَّة غِرْلَنْدَة فُتَيَّة سِيَّيَّة شَيْخُ الْبَحْرِ فُتَيَّة سَوَّجَة مُتْرِيْس فَهْدُ الْبَحْرِ
فُتَيَّات	جنس واحد ونوعان	فُتَيَّة

الإدانة فيكون جرابه الكتيدي الذي تملوه سبعة من الكناثد المؤورة الكروية الشكل، السمره اللون. أنواعه قليلة أعرفها زغاغ الزيتون.

١٢٤٩٨ - زُغَاغ الزَيْتُون \*  
Cycloconium oleagineum(S).Gel de paon des feuilles d'olivier (F).

فطر مجهري ركب زوايتين حوض البحر المتوسط. مظهره الخارجي يقع قرحية تشبه عين الطاووس، حجمها راجح من ٦ إلى ١٠ م. تركب نصال الاوراق البالغة على صفحاتها. تظهر في اواسط الصيف وتقوم حتى اواخر الشتاء حيث تتقلص رويداً رويداً. تبدو سمره اللون سواء المحور والختار. تكثر على الصفحة العليا وتقل على السفلى وقد تصيب المالحيق والتواشي || يكافح باستعمال سائل بورردو على ثلاث مرات. الاولى خلال شهر آب والثانية في تشرين الاول والثالثة في شباط.

١٢٤٩٩ - زُغَاغ \*  
هو الاثنا السفية، اطلبه.

١٢٥٠٠ - زُغْب \*  
Figue-fleur (F). Fig-flower (E).  
ضرب من التين كبير القد سميك القشور حلو الطعم.

١٢٥٠١ - زُغْب \*  
Duvet (F). Down (E).  
اول ما يبدو من الريش والشعر وقيل صفارها وليها. وهو في بعض الاوراق والثمار غل (Bloom).

١٢٥٠٢ - زُغْبَارَة \*  
Stigma  
جنس فطور مجهرية من عمارة الريدانيات وفصيلة الطحنيات || جربه الكنديية قصيرة ديبوية، قشرية التجميع. كناثه فردية، مملوءة، بيضيه او مردنية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى أعرفها زغبارة الدلب وزغبارة المشمش.

١٢٥٠٣ - زُغْبَارَة الدُّلْب \*  
Stigma platani (S).  
فطر مجهري يمرى الدلب بالوراقه. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة قطرها نحو ٢ م. تركب النصل على

## ١٢٥٠٤ - زُغْبَارَة المِشْمَش \*

Stigma briosiana (S).  
فطر مجهري ركب ثمار المشمش في طور نمو الاخير. مظهره الخارجي يقع مستديرة مملوءة اللون، حراء الخمار تركب بشرة الثمرة فتقرحها وتقودها الى الانحلال بعد ان تغير طعمها الذي يكتبس بعض المرارة.

١٢٥٠٥ - زُغْبِيَّة \*  
Muscardinus (S).  
Muscardin (F). Small dormouse (E).

جنس حيوانات قاضمة من فصيلة القرقنيات. انواعه قليلة، موطنها الشرق الادنى واروبه || جسمها صغير القد طوله ٨ سم. وذنبها ٧. رأسها اسطيني الشكل. عيناها مستديرتان. اذناها بارزتان كبيرتان. وبرها لبد الرغب الناعم القصير. ذنبها اسطواني. رأسها وظهورها وذنبها الى الصهبة الصفانية يعلوها موج اوبى. عبقها ويطبخ الى البياض الاخير || تألف الثبايات والادغال القريبة من الحقول المزروعة. تتسلق الاشجار بنجفة. قوتها البندق والجوز والحطنة وتختلف الثمار النينية اعصها الصريرة. الانثى تضع ٤ ادراس تبصر وتكتفي بعد وضعها باسويين. يياتها الشتوي يديم نحو ستة شهور. جبرها وكن تدبره في صدع شجرة تفرشها بالحشيش الناعم والصوف.

١٢٥٠٦ - زُغْبِيَّج \*  
هو الزغنج، اطلبه.

١٢٥٠٧ - زُغْبَر \*  
هو ابن اوى، راجمه.

١٢٥٠٨ - زُغْبِر \*  
Amaraca (F).  
Amaracus (E).

ضرب من المرو رقيق الورق خلي النصل مستحب العرف.

١٢٥٠٩ - زُغْبُورَة \*  
Stigmella  
جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة الطحنيات. كناثه بيضيه قياسها نحو ٩×١٤ ميكرون.



زغاغ الزيتون



زغبارة المشمش



زغبة

الى الصفار الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

**Primula sinensis (S). - زُعْدَة الصَّيْن**  
**Primevère de Chine (F).**

عشبة معمرة ريفية تعيش في المزارك . اوراقها مقصصة رحلة ، نصلها خلي البشرة مبهر المسام الزرجة || شرابخا يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره ثلاثية الالراس المتراكبة . زهرته خفيفة البوق ، منتخفة القاعدة المستعرضة . لونها يختلف مع الصروب منها الياض والوردي والازرق والاحمر والبنفسجي || ازهارها يستمر طوال الشتاء .

**Primula glutinosa (S). - زُعْدَة دَيْقَة**  
**Primevère glutineuse (F).**

عشبة معمرة سبوتية اوراقها مستطيلة مغروية ، نصلها غدي البشرة الندية ، حثاره مشدري الصن | شرابخا يملو من ١٠ سم . ازهاره تد من ٣ الى ٧ لونها الى البنفسجي الزاهي ، عرفها فواح المطر . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

**Primula elatior (S). - زُعْدَة شَامِخَة \***  
**Primevère élevée, Coucou élevé (F).**

عشبة معمرة . اوراقها اهليجية ذلقة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى || شرابخا يملو نحو ٣٠ سم . ازهاره كثيرة البعد لونها الى الصفرة ، اقناعها الى الخضرة الباهتة البعد توضيح ابيض || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

**Primula verticillata (S). - زُعْدَة ضَمِيَّة \***  
**Primevère à fleurs verticillées (F).**

عشبة معمرة ترغب في الشطوط البحرية . اوراقها اهليجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . نصلها وسيد الفلج ، خلي البشرة ، قليل التسنين || شرابخا يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . ازهاره ثنائية الفصة . كبيرة القد ، فواحة العرف ، ذفينة اللون || ازهارها يستمر من ايلول الى ايار .

**Primula spectabilis (S). - زُعْدَة قَانَحَرَة \***  
**Primevère remarquable (F).**

عشبة معمرة ترغب في الاربة الكلسية . اوراقها سنانية ، نصلها خلي البشرة الندية ، مسن الحافة الضروفية المختار || شرابخا يملو من ١٦ الى ٣٠ سم . ازهارها سداسية او ثمانية التجميع لونها الى الابيض يملو ملج ودي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

**Primula luteola (S). - زُعْدَة كَبْرِيَّة**  
**Primevère soufrée (F).**

عشبة معمرة سبوتية . اوراقها اهليجية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شرابخا يملو نحو ٢٠ سم . ازهاره صغيرة القد كثيفة التجميع كبريتية اللون || ازهارها يستمر طوال الشتاء .

**١٢٥٢٢ - زُعْدَة كَثِيرَة الزَّهَر \***

**Primula floribunda (S). Primevère floribonde (F).**

عشبة معمرة ترغب في الشطوط البحرية . اوراقها بيضية ، مستطيلة ، مقطوعة الطرف . نصلها زغب البشرة مبهر المسام الغدية ، حثاره لاقياسي التسنين || شرابخا يملو من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره مستعرضة الشكل ، كثيرة العدد ، كبريتية اللون || ازهارها يستمر طوال الشتاء .

بويغاته كروية ، جوية التجميع ، عابقة اللون || انواحه قليلة البعد والاذى تتغلغل على اوراق بعض الاشجار الحرجية دون ان تؤذيها . مظهرها الخارجي بقع صغيرة مستديرة خلية ، شقراء اللون جوية الخنار ، تركب النصل على صفحته السفلى .

**١٢٥١٠ - زُغْبِيَّة**  
**Tomenteux (F). Tomentous (E).**  
نمت وسني يطلق على اجزاء النبات الغلظة زغب ليد نام يشبه نلف القطن .

**١٢٥١١ - زُغْبِيَّات**  
**Bombaceae (S). Bombacées (F). Bombaceae (E).**

قسم من فصيلة الخبازيات يشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع معظمها اشجار كثيرة دالحة منها البيلاد الاستوائية . ازهارها خشوية ، خاسية التلات ، كثيرة الاسدية . ثمارها حقة الشكل تلتف بزورا فردية او عديدة ينشأها زغب نام التلة قصيرها .

**١٢٥١٢ - زُغْبِيَّة \***  
**Bombax (S). Bombax, Bombace, Quatier, Fromager (F). Silk cotton tree (E). Seidenbaumwollbaum (D). Bombace, Bambagia (I).**

جنس اشجار كثيرة دالحة من الزفليات . انواعه عديدة مهدها المناطق الاستوائية .. جميعها سريعة النمو غليظة الجذع تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . اوراقها زنادية مركبة خاسية الورديات البيضية الشكل . ثمارها حقاك مستطيلة تلتف عدة بزور ينشأها زغب نام جدا قصير التلة لا يصلح لغزل || بزورها مأكولة بعد التخميص ويستخرج من اوراقها مادة دنيئة لها استعمالها في البلاد الحارة .

**١٢٥١٣ - زُعْدَة آب \***  
**Chiromèle (F). Chiromel (E).**  
جنس غفائش من عارة الحبار . موطنه ملقة والملايو . انواحه قليلة العدد تتميز بفراطيسها الاسطوانية المقطوعة ، بأذانها المنتسبة العالية وباعناقها السلمية البارزة . يعيش جماعات متوسطة البعد . يسرح في اوائل وأواخر الليل . قوته الحشرات . يألف تجاوبف الاشجار الحرجية والغاور والكهوف .

**١٢٥١٤ - زُعْدَة ، زَهْرَة الرَّيِّع**  
**Primula (S). Primula (E). Primel (D). Primavera (I).**  
جنس نباتات عشية من فصيلة الريبيات . انواعه كثيرة العدد منها المحلية والموحدة والمعمرة . معظمها بري وبعضها ترابي . جميعها نجمية ، اوراقها قرصية الانتصاب . ازهارها سبوتية التجميع يرتكز على شرايح دقيقة . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان كوسها خاسية التسنين ، توجعاتها خاسية التفصيص ، انابيها اسطوانية الشكل ، اسديها عشارية لا متدغة . حلقها خاسية المضارع || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

**١٢٥١٥ - زُعْدَة أَذْيَنِيَّة ، أَذَان الدُّبِّ الوَحْشِي ، أَذَان الضَّبِّع**  
**Primula auricula (S).**

**Primevère auriculée, Orelle d'ours sauvage (F). Auricula, Bear's ear (E). Aurikel primel, Aurikeln (D). Primavera auricula, Orecchio d'orso (I).**  
عشبة معمرة . اوراقها بيضية مسوية الشكل . نصلها بحري اللون ، خلي البشرة ، مسن الحافة الضروفية المختار || شرابخا يملو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها



زُفْيِيَّة



زُفْيَا شَامِخَة



زُفْيَا ضَمِيَّة



زُفْيَا كَثِيرَة الزَّهَر



٣٠ سم. ازهاره لاقباسة التجميع. عددها يراوح من ٢ الى ٢٠ لونها الوردى يملو ملج بنفسجي .  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٠ - زُغْدَة وَرْدِيَّة  
*Primula rosea* (S). *Primevère carminée* (F).

عشبة معمرة سبروتية. اوراقها اهلجية تطول نحو ١٥ سم. نصلها جيل الحصار الزاهي سنن الحافة. ثراخها يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره قليلة العدد كبيرة القد لونها ال حمرة الوردية الزاهية || ازهارها يستمر من ايار الى نيسان .

١٢٥٣١ - زُغْدَة يَابَانِيَّة  
*Primula japonica* (S). *Primevère du Japon* (F).

عشبة معمرة سبروتية. جلورها عامدة الارتفاع. اهلجية سوطية. نصلها منشاري الحافة يطول نحو ١٥ سم || ثراخها يملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متراكبة الالراس التي تعد من ٣ الى ٦. زهرته مستعرضة الشكل لونها ال البنفسجي المشع بالخضى || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٢ - زُغْرُغْ ٥  
*Aquifère* (F). *Aquiferous, Water-bearing* (E).

نمت تعريفي يطلق عل الطبقات الارضية التي تحوي بعض الماء او الكثير منه .

١٢٥٣٣ - زُغْرِبَة ٥  
*Aquiculture, Culture hydroponique* (F). *Aquiculture, Fish-breeding* (E).

الزفربة او الزراعة المزفربة هي الزراعة في الماء بدون ترربة. يصار اليها بتلوب العناصر الغذائية المعدنية في الماء فيمتصها النبات وينمو ويثمر كا لو كان مزروعاً في التربة .

١٢٥٣٤ - زُغْرُغْ ٥  
*Aquilgène* (F). *Aquigenous* (E).

نمت تعريفي يطلق عل كل كائن يخلق في الماء او يمشي فيه .

١٢٥٣٥ - زُغْرُغْ ، عَيْبَالُ الْبَادِيَةِ ، جَكِيل  
*Cursorius* (S). *Courvite* (F). *Courser* (E).

جنس طير من طول الساق وفضيلة الزرقايات. انواعه المعروفة عشرة اصنافها الصغرى الاسوية والافريقية || اجسامها صغيرة القد . اطولها تراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. اذنانها مناقبها مسطيلة ، دقيقة . اجنتها ذلقة . اذنانها قصيرة ، مستعرضة ، مقنطة الاطراف . سوقها وراسها نحولة . انواها مختلفة الالوان يكثر ليها الاغص والخضى || اعرف انواعه واشهرها الزغزغ الاغص .

١٢٥٣٦ - زُغْرُغْ أَغْبَسْ \* ، جَكِيل أَغْبَسْ ، عَيْبَالُ الْبَادِيَةِ الْاَغْبَسْ  
*Cursorius isabellinus*. *C. cursor* (S).

*Courvite*. *Isabelle*, *Courvite gaulois* (F). *Cream-coloured courser* (E).

طائر من الزغزغ . اعطاه تيمد من صغارى الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والىاليه لانه من الصوارب التي تجوب القباي في طلب الرزق || جسمه متوسط القد يطول نحو

١٢٥٣٣ - زُغْدَة لَرَجَة \*  
*Primula viscosa* (S). *Primevère visqueuse* (F).

عشبة معمرة ترغب في الارربة الرملية . اوراقها بيضية مستطيلة المنق ، نصلها كثيف المسام الندية القوية الرائحة، لونه الى الخضار الاصفر || ثراخها يملو من ١٥ الى ١٠ سم. ازهاره لبسدة التجميع الصبولى ، فواحة العرف ، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٤ - زُغْدَة مَارْدَة  
*Primula grandis* (S). *Primevère géante* (F).

عشبة محولة سبروتية . اوراقها معقنة كبيرة القد قليلة الشكل . نصلها كثير العروق ، قليل الزغب ، لاقبائي التنتين || ثراخها يملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهاره مستطيلة متدلية ، لونها الى الصغار الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٥٣٥ - زُغْدَة مَحْزُونِيَّة \*

*Primula officinalis* (S). *Primevère officinale, Coucou officinal* (F). *Cowslip, Paigle* (E). *Gartenprimel, Schlüsselprimel* (D). *Primavera, Primula odorosa* (I).

عشبة معمرة سبروتية يقال انها طيبة تنفع الصدر والامام . اوراقها مستطيلة ذلقة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، يحمر السفلى || ثراخها يملو من ١٠ الى ٣٠ سم. ازهاره جرسية الشكل اقحاه بيض ، ابواقها مذهبة ، اعصاتها خاسية الرقعة البرتقالية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٥٣٦ - زُغْدَة مَحْطَطَة  
*Primula vittata* (S). *Primevère rayée* (F).

عشبة معمرة . اوراقها ضيقة مستطيلة . نصلها لاس البشرة ، دقيق التنتين || ثراخها يملو نحو ١٥ سم. ازهاره كثيفة التجميع . حراء اللون ، كؤوسها جرسية الشكل تملوها حسة خطوط بيض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٥٣٧ - زُغْدَة مَرْبُورَة  
*Primula hirsuta* (S). *Primevère hérissée* (F).

عشبة معمرة ترغب في الارربة الرملية . اوراقها بيضية الشكل . نصلها مبهر المسام الندية الحمراء التي تملو عل صفحتيه || ثراخها الزهري يملون من ٣ الى ١٠ سم. ازهاره مستعرضة الشكل ، قليلة ، تعد من ١ الى ٣ . ثراخها ابيض ، سارها وردي او ليلي اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٢٥٣٨ - زُغْدَة مَتَقَعِيَّة  
*Primula helodoxa* (S). *Primevère gloire des marais* (F).

عشبة معمرة ترغب في الاراضي الرطبة . اوراقها سنانة النصل الملتف الاطراف || ثراخها يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم. ازهاره متراكبة الالراس التي يراوح عددها من ٦ الى ٨ . زهرته مقمرة القاعدة ، صفراء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٩ - زُغْدَة مَهْدِيَّة  
*Primula marginata* (S). *Primevère bordée* (F).

عشبة معمرة ترغب في الارربة الكلسية . اوراقها اهلجية الشكل . نصلها لحمي النسيج ، حثارها متقارب التنتين ، مهبذ الحافة || ثراخها يملو من ٥ الى



زغدة لرجة



زغدة يابانية



زغزغ اغبس

شفاقان . قوائمها مستطيلة ، قصبة . ثوبها الى الصهبة الغائبة المواج || تمتع الاثنى المكن في لواء الاشجار تينقف عن يرقات صغيرة ، غطيلة الشكل ، بنية اللون تردب السواء وتميش عليه حتى الاكمال .

Zaghounia

\* زَغُونَا ١٢٥٤٧

فطر مجهرى من فصيلة السحاميات ورتبة العنديات يركب بعض نباتات الفصيلة الزيتونية واغصانها الضخمة . مظهر الخارجى يقع صغيرة مستديرة لاقياضية التجميع تصيب الاوراق الجديدة النامية فتسبب فيها تقصم التسج الحلوية وتتمج وتبعثها رفعة في البشرة تبدو كالبثور الى ان تتشجر عن بويغات كالحباب لونها الى الجوزة || يكافح عند ظهوره باستهلاك سائل يورود الحلول ١ % .

Amadina (S), Amadine (F).

\* زَغِيم ١٢٥٤٨

جنس صافير صغيرة القد من الجوامث الخروطيات المناقير . انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة . جميعها بحجم الدوري . اثنائها متراكبة الالوان الجميلة . تألف الازدغال والغابات المبردة الاشجار . قوتها يزور وحسب التيجليات وبعض الحوام والديدان والحشرات الصغيرة || تتنق في الاشجار . اثنائها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . وذلك على ثلاث مرات في السنة || اشهر انواعه الزعيم الملوخ .

\* زَغِيم مُطَوَّق ، ذَبْعُ السَّي ١٢٥٤٩

Amadina fasciata (S), Amadine à collier, A. bandé, Cou coupé (F), Cut-throat (E).

نوع من الزعيم حجمه بحجم الدوري الصغير . ثوبه الى الكهية الصنائية يملوها زئيم ابيض واسود . عسراه وعنقه يبيض . زوره ملوَّق بخط ارجواني تمتد من مؤخر العين اليسى الى مؤخر اليسرى . جناحاه وذنبه سود . موطنه افريقية الشرقية والشمالية . سره يد من ٢٠ الى ٤٠ || يألف حياة الدجن ويتكاثر بسهولة لكنه لا ينجد .

Amadinidae (S).

\* زَغِيمِيَّات ١٢٥٥٠

Amadinidae (F), Amadinidae (E).

فصيلة طير من الجوامث خروطيات المناقير . اجناسها واثنائها عديدة منظفها من صافير المناطق الحارة || تتميز باجناسها الصغيرة وبمناقيرها الخروطية القصيرة وباذنابها المقطعية التي يغلب فيها التقعر . اجنسها متعددة الطول . اثنائها جملة الالوان الزاهية . ارشاعها دقيقة || جميعها تألف القفص ، بعضها مستحب الزرققة . قوتها يزور التيجليات || اعرف اجناسها واشهرها الزعيم والمطوَّر والبداس ...

Satinée (F), Satiny (E).

\* زَغ ١٢٥٥١

صغير الريش ونص بضمه به ريش النمام . قال المتنبي :  
« كان المرمر من زغ الرئال » .

\* زَقَالَة صُغِيرَة العُند ١٢٥٥٢

Rhiphophorus subdipertus (S), Rhiphophore à élytres réduits (F), Rhiphophorus subdipertus (E).  
حشرة واشمة ناعمة خاشرة من فصيلة الزرقاوية ورتبة عنديات الاجنحة . تألف الاسكان التي تكثر فيها التفويغات

٢٥ م . ثوبه اغبس اللون . رأسه اذرق المواج . عيناه مكحلتان بالاسود الذي يمتد كالخط حتى القفن . قوامه واباهره حطيلة الزرققة . كلاء صفر الاطراف ، حر الماجة . وقال ذنبه مرقوطة بالاسود والابيض . حدة عينه حطيلة اللون . ساقاه الى الزرققة البسرية . رسافه واصابعه بلون البرل || يذنب انصوموه بين الحجابات التي تكتنفها الاشباب المراكبة الكثيفة . اثنائها تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٥ يومين بيضاء اللون ذكرى لها الغذاء .

Zygote

\* زُغْطَة ١٢٥٣٧

نصل البيضة الخصبية . راجع جنس .

Brindilles (F), Sprigs (E).

الزغف : دقاق الحطب : اطراف الشجر الضعيفة واعالي الثوث والمرغج .

Pontederia (S), Pontédérée (F).

جنس نباتات شبيهة برية وزيتونية من فصيلة الزغفليات . انواعها ثمانية جميعها جنسورية متعينة وبالية . سوقها شراخية منصبة تتنقى بالسائل الزهرية . ازهارها جملة الشكل ، سداسية الانقسام ، زرقاء اللون || اوراقها معتقة كبيرة القد قليلة النصل . عنقها ملاق مستطيل يطوق بها على سطح الماء || تزرع للزيتون لكثافتها الخفى الصغير .

Pontederiaceae (S).

\* زَغْفِيلِيَّات ١٢٥٤٠

Pontederiacées (F), Pontederiaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة ستورات الزور . نباتاتها اعتابا جنسورية المنفوع . اوراقها قرصية الانتساب ، مستطيلة الزناد ، قليلة النصل . ازهارها سبيلية التجميع تقوم على شراخ يعلو الاوراق || منبها المناطق الحارة تعيش في المنافع والمياه العذبة الراكدة .

Pigeonneau (F).

\* زَغُولُون ١٢٥٤١

فرخ الحمام ما دام زق . يقال ازفل الماطر فرخه اذ زقه .

\* زَغُولِيل ١٢٥٤٢

هو الادونيس الصغير ، اطليه .

\* زَغُولِيلُ الفسق ١٢٥٤٣

هو الحوزان الثرير ، اطليه .

\* زَغُولِيلَة ١٢٥٤٤

هي لبن المروج ، اطليه .

\* زَغْطَبَج ، زَغْجَج ١٢٥٤٥

Olives sauvages (F).

ثمر العتم ( الزيتون البري ) وهو مثل البق الصغار يكون اغضر ثم يسود فيحلو في مرارة وصمته مثل صمعة البق . يؤكل ويطبخ ويصفى مائه حتى يكون ربا كرب العتب .

\* زُغْثُورَة طَالِشَة ١٢٥٤٦

Zygoneura frivola (S), Zygonevra frivole (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الشياريات . تألف جميع الموامث الطويلة والحذاق والسكان || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ م . رأسها مكور . عيناه متلاصقتان عند الذكر . مفترقات عند الاثنى . زباناها خيطيان . صدرها شبه يفيشي الشكل . ورشاهها كبيرا القد ، عادما الخضاب ،



زغفل



زغون



زغيم ملوَّق



زقالة صغيرة العند

Alaternbaum, Alaternkrenzodorn (D). Alaterno, Ilatro, Putine (I).

نوع من البتق بهذه شرق البحر المتوسط. يوجد في بعض المناطق الجبلية اللبنانية واليمنية والصورية || يملو من متر إلى خمسة أمتار. أغصانه وأغصانه مسنة، أوراقه عروية، كاملة، متعاقبة. نصلها مسنة الحافة يحمل من ٤ إلى ٦ أزواج من العروق المماثلة || ازدهار عذبة البتلات، خضراء الاسدية والنصل والذقة، شائبة أو ثلاثية البتات. ثماره كروية، حمضية القلح، ناعمة السطح تبدو حمر اللون ثم تسمر وتسد مع النضج || يقال إن تقع ثماره ولحافه ونشبه يسهل المعدة ويقوي الكبد والطحال ويذهب باليرقان.



زفرين لبنان

١٢٥٦٠ - زَفَرِين لِبْنَانِي \* ، عُوْدُ الْخَيْرِ

Rhamnus libanotis (S). Nerprun du Liban (F).

نوع من البتق ينمو في جرد لبنان. وهو جنبه صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها منتصبة خشبها حشلي اللون. أغصانها وأغصانها خالية اللحاء. أوراقها متعاقبة بيضية. نصلها جامد النسيج، كثير العروق التي يبلغ عددها من ١١ إلى ١٥ زوجاً || أزهارها خشوية خماسية التركيب. ثمارها كروية نوية حمضية القلح ناعمة السطح تبدو حمر اللون ثم تسمر مع النضج || يقال إن تقع ثماره يفيد الكبد والطحال ويذهب باليرقان.



زفرين لبناني

١٢٥٦١ - زَفَرَات \* ، Vent fort et soutenu (F).

High and sustained wind (E).

الزفارات والزفارة : الريح الشديدة المهبوب في دمام.

١٢٥٦٢ - زَفِين \* ، Tonnelle (F). Arbour (E).

خيمة من حديد أو خشب تملوها نباتات رائحة.

١٢٥٦٣ - زَفِير \* ، Expiration

خروج الهواء من الرئتين وهي حركة طبيعية تتبع الاستنشاق أي دخول الهواء الجري إلى الرئتين.

١٢٥٦٤ - زَفِير \* ، تَرْجِس نَسِيمِي

Zephyranthes (S). Zephyranthe (F). Zephyr lily, Swamp lily (E). Zephirblume, Flammenlilie (D). Zeffr (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة الأرجسيات. أنواعه نحو ٢٠ معظمها زراعي جميل الزهر الخلف الالوان. شمائيلها جوفاء. أزهارها فردية. أوراقها خضراء النصل، قليلة العدد، تنمو متأخرة قرب ابتلاج الزهر || اشهر انواعه البرازيلية ما يتبع.



زفير

١٢٥٦٥ - زَفِير أَبْيَاص \* ، Zephyranthes candida (S).

Zephyranthe blanc (F).

نوع من الزفير شمراخه يملو نحو ٢٠ سم. أوراقه اسطوانية محدبة تطلو نحو ٣٠ سم. زهرته بيضاء اللون لا عرف لها. أزهاره في أيلول.

١٢٥٦٦ - زَفِير أَصْفَر \* ، Zephyranthes citrina (S).

Zephyranthe citrin (F).

نوع من الزفير شمراخه يملو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه خضراء النصل البالغ التخذيد تطلو نحو ٣٠ سم. زهرته عذرية صفراء اللون طولها نحو ٥ سم. ساقها مقطوعة مفصصة || أزهاره في آب.

والصبرانيات. خنافسها تعيش على رقيق الأزهار ويتلها. يرقاتها تلثم دوى الزنايير واسارع القدان ويغيرها من الحشرات || جسمها صغير القلح يملو من ٥ إلى ٨ م. ثوبها إلى السرة المخططة الصنابية المواج. رأسها صغير الجسم. زباناتها مشطيان. عيناها صغيرتان ماصحتان. ظفرانها جدعتان صغيرتان. روثانها شفافان كبيران يلقها مستعرض الشكل. أرساغها رباعية المقل في الزوج الخلفي، خاشبها في الزوجين الامامي والوسطي || لها جبل واحد في الحول. تطلو الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتمتدح حتى اواسط ايلول. تسرح في النهار. تسافد في اواسط آب. تمتدح المكن قرب عشاوات الزنايير وفي المواقع القريبة من مجموعات الاسارع || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطلو نحو ١٣ م. جسمها مبسط الشكل، مستطيل المقدم والرأس، مستدق المؤخر، سداسي الرواجب، ضلع التأكير، غير اللون، وردي المواج، عتاي الرأس، اسمر الرواجب والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوماً ينقضي في التربة تحت الجملانة.

١٢٥٥٣ - زَفَالِيَات \* ، Rhizophoridæ (S).

Rhizophoridés (F). Rhizophoridæ (E).

فصيلة حشرات واسعة شافرة من رتبة غذيات الاجنحة || اجناسها واتواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد المتعددة الحرارة وبعضها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط. تألفت نباتات الخشبات والشفويات. يرقاتها شافرة تعيش على دوى الزنايير || اجسامها صغيرة القلح او متوسطة. رؤوسها مستديرة. زباناتها متباينة الاشكال منها الخشبية والمروحية والشمطية، تركب من ١٠ إلى ١١ فصلة. كواشها وأغصانها لاقامية الشكل والقلح. أرساغها الخلفية رباعية المقل اما الوسطي والامامية فخاشبها || اشهر اجناسها الزفالة والعيسم.

١٢٥٥٤ - زَفْت \* ، Asphalte (F). Asphalt (E).

نوع من الحجر كيف المادة السوداء اللامعة يستعمل مجيولاً مع كسر الحصى في تغطية رصف الطرقات لتثبيت تكديدها ووقايتها.

١٢٥٥٥ - زَفْت، قَبِير \* ، Empoisser (F). To pitch (E). Qabir.

طلو او لاط الشيء بالزفت.

١٢٥٥٦ - زَفْد \* ، Cire, Lorum (F). Cere (E).

الزفد غشاء يلف قاعلة المتقاد عند بعض فصائل الطير اغصانها الجوارح والجائم والبيفاويات || ومن الكائنات من استعمل كلمة « قير » للدلالة على الزفد في حين ان القير هو الطقشان.

١٢٥٥٧ - زَقَر \* ، Tuteur (F). Prop (E).

هو المسند الذي تدعم به الشجرة الفتية.

١٢٥٥٨ - زَفَرِيَّات \* ، Cléomées (F).

سبط من فصيلة الكبريات.

١٢٥٥٩ - زَفَرِين الْجَرْد \* ، نَبْت مُتَرَاكِف ،

أَمْلِس ، أَمْلِس ، عود القيقس

Rhamnus alaternus (S). Nerprun alatern, Alatern, Bourgeu-épine (F). Alaternus, Barren privet (E).

في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تتساقد بعد ظهورها بنمو ستة اسابيع وتتمتع المكن زرقاً تلقها في الجلالة وتحت الاشجار والحجارة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تظل نحو ١٥ م . جسمها مردي الشكل ، كثيف الحلب ، حنطي اللون ، احمر الرأس والرواجب والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع يتقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

#### ١٢٥٧٣ - زفيرييات ٥ Zuphiidae (S). Zuphiidae (F).

فضيلة حشرات لاحة وقائمة من رتبة مجنحات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المواق الرطبة وفضاف الابر والبيجرات || جميعها صغيرة القد قلاً يتجاوز طول الواحد منها ٢٠ م . اجسامها خلية القشار ، متباينة الالوان الزاهية . رؤوسها كروية ، عمودية الاصداغ ، ترتكز على اعناق دقيقة اسطوانية الشكل . عيونها قليلة التلو . كواسلها قليلة العرض ، شبه قلبية الشكل . اغداها مستطيلة ، مستديرة الاطراف || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسمى بسرعة وتطير بخفة . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تمتع من الضعيف من الحشرات الدنيا || اشهر اجناسها الزفيوم .

#### ١٢٥٧٤ - زق ٥ Abecquer, Embecquer (F). To feed (E).

زق الطائر: فرسه : اطمه بمقاره ، راجع أنغل .

#### ١٢٥٧٥ - زق ، تسمين Gavage (F). Cramming (E).

اطعام الطيور الداجنة قسراً طاماً خاصاً بية تسميناً .

#### ١٢٥٧٦ - زق ٥ Asque (F). Ascus (E).

خلية نباتية تتحول الى كيس صغير ينشأ فيه بوع الفطور الزقية . ج ارقاق .

#### ١٢٥٧٧ - زقاه ، ضبح Cri du hibou (F). Cry of the owl (E).

صوت البوم على اختلاف اجناسه .

#### ١٢٥٧٨ - زقح ، زقج Cri du singe (F). Cry of the ape (E).

الزقح والزقج : اسم صوت القرد خاصة والصعلك كذلك .

#### ١٢٥٧٩ - زقار ٥ Fusicoccum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات يتميز بويته البكنيدية التي تنشأ عضوية ثم ترق تصعد الامة والبشرة . وهي شفاقة ، ليفية التركيب ، حنطية الجول . تقسمها سديرة الخياء ، مستطيلة الخن . بوياتها بيضية شفاقة . انواعه قليلة لا ينتم منها اغراض تستحق التسمية .

#### ١٢٥٨٠ - زقار السدرال ٥ Fusicoccum cedrelae

فطر مجهرى يصيب سوق واغصان السدرال . مظهره الخارجى بلخ مستطيلة طويلاً من ٣٠ الى ٤٠ م . تركيب الحاء السوق والانصاف فتؤذي وقد تسبب جفافها || يكائن بالكتش والتطهير والاطي بالستيك .

#### ١٢٥٨١ - زقار اللوز ٥ Fusicoccum amygdali

فطر مجهرى يصيب اغصان اللوز واثفاده فيقول سير التسع

#### ١٢٥٧٧ - زفير حاصين ٥ Zephyranthes sessilis (S). Zephyranthes sessile (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو نحو ٢٠ سم . اوراقة نحيلة اسطوانية تظل من ٢٠ الى ٢٥ سم . زهرته عطرية حاصنة تظل من ٤ الى ٥ سم . لونها الى البياض الموشج بالاجر . سماها ثلاثية || ازهاره في نيسان .

#### ١٢٥٧٨ - زفير فيرجية ٥ Zephyranthes atamasco (S). Zephyranthe de Virginie (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو نحو ٣٠ سم . اوراقة ضيقة محدبة زاهية الخضار تظل من ٢٥ الى ٣٠ سم . زهرته عطرية ترتكز على زناد يملو الشراف المزدوج القلقة . طولها نحو ٨ سم . لونها يستقر على البياض الثلجي بعد ان تكون بلباتها موشجة بالوردي || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٢٥٧٩ - زفير موشج ٥ Zephyranthes versicolor (S). Zephyranthe versicolore (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقة ضيقة مدببة الزام الاخير تظل نحو ٣٠ سم . زهرته عطرية ترتكز على زناد قصير يملو الشراف . طولها نحو ٥ سم . لونها يستقر على الابيض الفلعل بالوردي يملو موج اخضر . ازهاره يدوم طويلاً فصل الشتاء .

#### ١٢٥٨٠ - زفير وردية ٥ Zephyranthes rosea (S). Zephyranthe rose (F).


نوع من الزفير شرخاه يملو نحو ١٥ سم . اوراقة ضيقة النصل المسطح تظل من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرته عطرية صغيرة القد ترتكز على زناد مستطيل يملو الشراف . طولها نحو ٣ سم . لونها وردي يملو موج ليكي || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

#### ١٢٥٨١ - زفيوس ٥ Ziphius (S). Ziphius (F).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من المحويات متاثلات الاسنان وفضيلة التبريات . انواعها المروفة قليلة العدد اعطائها، معظم بحار العالم || اجسامها كبيرة ، شبه رشيمة الشكل ، مأمدة الاعناق ، مخروطة الرؤوس الضخمة ، صغيرة الاعظام . انواها الى الخضار اللامس الازرق الموج ، بولتها الى البياض الماسي || ملهنا الحياتي جامي . افواجا متوسطة العدد الذي يراوح من ٥٥ الى ٢٥٠ زويماً .

#### ١٢٥٨٢ - زفيوم عطر ٥ Zuphium olens (S). Zuphium olens (F).


حشرة قائمة من فصيلة الزفيويات ورتبة نمعدات الاجنحة . تألف المواق الرطبة وفضاف مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر وما تستطع اقتناصه من الحشرات الدنيا . تتميز برائحتها العطرية المأمومة التي تم من وبيدها على بعد متر || جسمها صغير القد يظل من ٧ الى ٩ م . ثوبها الى التسمية السراة تملوها تزاويق سواء اللون . رأسها صغير الحجم ، اسود اللون . عيناها صغيرتان . زباناها غيبان مستطيلان . ظهرها مستعرض المخمض لا يلحظ كامل البطن . جرائمها نسيطة . ارسافها خاسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة



زفيوس



زفيوم عطر



زقار اللوز

ويظهر النمس في مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تركيب الحادة عند أبط البرام . تبدو غيرة اللون ثم حتملة ، تدمم من نيسان حتى أيلول حيث يختفي أثرها // اضراره زعيمة لا تستوجب المكافئة .

### ١٢٠٨٢- زَقَاتُ أَشْفَقِ الْبَطْنِ \*

Oxynotus rufiventer (S).  
Oxynote à ventre roux (F).

طائر من الجوارح مشربيات المنائر وفضيلة المترسيات . اعطاه مدغسقر وبعض جزر المحيط الهادي . يألف الثايات والحدائق والجنائن . قوته الحشرات والذباب والحوم // جسمه صغير اللق ، حجمه حجم الدوري . ثوب الذكر متداخل الاسود والازرق والاشهب الاغبر . بطنه الى الشقعة . ذنبه وتاجي الريش ، مزرق بالاسود . ثوب الانثى الى الشقعة الموحية بالاسمر القاتم // يدن عشه في الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخض يستمر نحو ١٣ يوماً .

### ١٢٠٨٣- زَقَاتِي \*

Eurystomus (S). Eurystome (F).  
جنس طير من الجوارح واهانت المنائر وفضيلة الشقاقيات . انواعه المعروفة ستة اعطاه بعض المناطق الاستوائية والحارة من العالم القديم // اجسامها قريبة الشبه بالشرقاري . مناقبها قصيرة مستعرضة الاشفاق . اجنتها كبيرة ، ذرية الاطراف . اذناها معتدلة الطول و ضيقة الطرف . المستدير . اولها الى الزقعة السقاء المواج ونها الى الزقعة الخضراء او الجذوية المواج // قوتها الحشرات والديدان .

١٢٠٨٤- زَقَبِ  
Crier (oiseau) (F).  
زقب العائر : صوت .  
To cry (bird) (E).

### ١٢٠٨٥- زَقَّة \*

Plotus (S).  
Anhinga (F). Anhinga, Darter, Snakebird (E).  
الزقعة ج زقق . جنس طيور مائية من كليات . القدم طوليات الريش . انواعه قليلة موطنها بعض انهار وبحيرات المناطق الحارة . من طولها انسا تمكث في مكانها حتى يكاد يقبض عليها فتفوس في الماء وتخرج بعيداً // اجسامها رشيقة مستطيلة ، طولها يراوح من ٨٥ الى ٩٥ سم . اعنتها اسطوانية . يالفة الطول . رؤوسها صغيرة مستطيلة . مناقبها اسفلية الشكل مفرسة المفاصل . اذناها طويلة . قوائمها قصيرة مستأخرة الارتكاز الميكلي . ارساغها قوية . اقدامها مستعرضة . اولها الى البواد الخمل يملوه مواج اخضر . رؤوسها الى الكهية السراء . ظهورها وجوانها منشدة . اياها ومناكبها وكلاهما مخططة بالابيض . اعنتها ومناقبها جثوية // قوتها الاسماك والقشريات والشفادع . تدن في الاشجار . اناتها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة ذكرها نحو ٤ اسابيع // اشهر انواعها الشامة والباله .

١٢٠٨٦- زَقَّةٌ بِاسِلَةٌ  
Plotus valliantii (S).  
Anhinga valliant (F).

نوع من الزقعة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية . تكثر على ضفاف النيل وبحيراته وفي العراق وتركه . وهي لا تفارق المياه العذبة الا لتعبر على الاشجار او صخور الجرف . طولها نحو ٩٥ سم . ثوبها ثوب جنسها يكثر فيه المواج الاخضر والازرق وتنقل فيه نسمة التنيش بالابيض .

١٢٠٨٧- زَقَّةٌ شَالَعَةٌ \*  
Plotus anhinga (S).  
Anhinga vulgaire (F). Common darter (E).

نوع من الزقعة . طولها نحو ٩٠ سم . ثوبها قريب من ثوب جنسها تكثر فيه الزقعة البيضاء . موطنها منابع وضايف انهار وبحيرات افريقية الوسطى وامريكا الجنوبية والوسطى . وهي لا تفارق المياه العذبة الا عند الاستراحة في ظاهرة النهار .



زَقَقُ أَشْفَقِ الْبَطْنِ



زَقَّة شَالَعَةٌ

١٢٠٨٨- زَقَرَقُ ، زَقُرُقُ ، دَمَشَقُ  
Charadrius (S). Pluvier (F). Plover (E).

جنس طير من فصيلة الزقراقيات . انواعه عديدة صغيرة ومتوسطة القد . جميعها من القواطع تجوب المنابع والقيعان والمراعي وكثبان الرمل // اجسامها رشيقة . مناقبها اقصر من رؤوسها . اجنتها ذلقة . ارساغها رشيقة ونحيلة . اولها بمزاية الالون . اذناها موحية بخطوط مستعرضة // قوتها الحشرات والديدان من اختلاف انواعها . تدن في افصوص تدره في منحدر ما معرضه الجنوب وتخلعه بشئ الحشائش الناعمة . اناتها تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

### ١٢٠٨٩- زَقَرَقُ النَحْسِ \*

Vanneau à caroncule (F).  
هو الكتاب ، طائر من الزقراقيات . اعطيه .

### ١٢٠٩٠- زَقَرَقُ الرَّمْلِ الْمُطَرَّقِ \*

Charadrius hiaticula (S). Grand pluvier à collier, Gravelot hiaticule (F). Ringed plover (E).  
نوع من الزقراق كبير الجثة يتميز بطقه المستعرض الاسود وبقائمتي الجذويتين // سره كبير المدد . يألف لكثبان الرملية ويصاب الهمر .



زَقَرَقُ نَحْسِي

١٢٠٩١- زَقَرَقُ شَامِي  
Vanneau (F).  
Peewit, Lapwing (E).

طائر يعرف باسم شهرته وهو ابو طيط ، اعطيه .

### ١٢٠٩٢- زَقَرَقُ فُصِي \*

Squatarola squatarola (S). Pluvier argenté (F). Grey plover, Swiss plover (E).  
نوع من الزقراق كبير الحجم ، البلق الثوب ، يلق في الرمادي القضي المواج // سره متوسط المدد . يألف المروج والمراعي وضايف الاغوار .

### ١٢٠٩٣- زَقَرَقُ مَذْهَبِ \*

Charadrius auratus (S). Pluvier doré (F). Golden plover (E).  
نوع من الزقراق يحوب بلاد حوض البحر المتوسط . ثوبه الشبزي يتخلل عن ثوبه الريبي . ظهوره اسود فحمي تعلوه نمشة سرخفية الشكل مذهبة . زوره وصدره الى السواد الامع يملوه توشع اصفر ويحوق اطار ابيض . بطنه وغوايته وزمكاه يبيض . عيانه ومقاروه وقائمتاه سود // ارسابه متوسطة المدد . يألف المروج والمراعي . قوته الحشرات والديدان .



زَقَرَقُ مَذْهَبِ

### ١٢٠٩٤- زَقَرَقُ مُسْلَحَ \*

Hoploptère (F).  
طائر من الزقراقيات يدعى تهبوج ، اعطيه .

## ١٢٦٠٢ - زَقْبُوتُ الْأَثَلِ \*

*Stearaspis squamosa* (S). Stéraspe des tamaris (F).  
حشرة من الناصعات طولها نحو ٣٠ م. ثوبها إلى الخضار  
الزبردي، حثار ظهرها إلى السمرة يعلوها مراحٍ آخر.  
يرقاتها تركب فروع وأغصان الأثل فتتنشر الخشب  
وتعطبها.

## ١٢٦٠٣ - زَقْبُوتُ الْخَوْخِ

*Bupreste du prunier* (F).  
حشرة مشهورة باسم ناصعة الخوخ، اعطياها.

## ١٢٦٠٤ - زَقْبُوتُ الدَّرَاقِينِ

*Bupreste noir du pècher* (F).  
حشرة تدعى ناصعة الدراقين السوداء، اعطياها.

١٢٦٠٥ - زَقْبُوتُ السَّنْدِيَّانِ \*، نَاصِعَةُ الْبَلَسَطِ  
*Coræbus bifasciatus* (S). *Bupreste du chêne*,  
*Corèbe bifascié* (F). *Oak burncow* (E). *Zwei-*  
*bindiger Prachtkäfer* (D).

حشرة من الناصعات طولها نحو ١٥ م. لونها إلى الخضار  
المذهب || يرقاتها تعيش على فروع وأغصان السنديان  
فتتنخرها وتؤذيها.

١٢٦٠٦ - زَقْبُوتُ الصُّنْبُورِ \*، نَاصِعَةُ الصُّنْبُورِ  
*Chalcophora mariana* (S). *Bupreste des pins* (F).

حشرة من فصيلة الناصعات طولها نحو ٢٨ م. لونها  
إلى الخيطي الاسفع المواجه ينحرف: إلى الاسود في آخر  
عهدا. طيراتها سريع زرق || يرقاتها تركب قلف  
الصنوبر فتتنخره وتعطب الشجر.

## ١٢٦٠٧ - زَقْبُوتُ الْوَرْدِ

*Bupreste du rosier* (F).  
حشرة تدعى ناصعة الورد، اعطياها.

## ١٢٦٠٨ - زَقْبُوتُ نُسَاعِيٍّ الْبَقِيع \*

*Buprestis novemmaculata* (S). *Bupreste à*  
*9 points* (F). *Buprestis novemmaculata* (E).

حشرة غاصلة عاشبة من فصيلة الزقبقويات ورتبة غديات  
الانجسة. موطنها يرم معظم اسواق حوض البحر الابيض  
المتوسط. تألف المواقع التي يكثر فيها الصنوبر واليريز  
والشربين والسرو. خنافسها تعيش على ما تقتضيه من نصل  
الاوراق. يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون ان تتعدى  
على الشجر || جسمها متوسط القد يعطو من ١٥ إلى  
٢٠ م. فورها إلى السواد الاسفع المواجه. غداها وكوسلها

مقبحة بالاصفر. رأسها صغير أجرم ينور تحت الكوسل.  
عينها كبيرتان بارزتان. زباناها خيطيان، منفرجان.  
فكهاا ضليمان. كوسلها قباني الشكل. ظهرها متعدل  
الاحديداد. غداها بليغتا التميز التوازي الخطوط

القائمة. ارباعها خاسية العقل || الانثى اكبر قدًا من  
الذكر واضمن بطنها ما كاد ثوبًا || جيلها ثانائي الحول.  
تظهر الحشرة الجملة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر  
الربيع. تسرح في التبار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة  
النمو تدرك الكمال الجسموري بعد الثغف بنحو ١٢  
شهرًا. جسمها مستطيل المقع، مستدق المؤخر، يعطو  
نحو ٤٠ م. ثوبها إلى البياض الاخير. رأسها اسمر اللون

## ١٢٥٩٥ - زَقْرَاقُ مَطْلُوقِ \*

*Charadrius dubius curonicus* (S). *Pluvier à collier*,  
*P. de rivage*, *Gravière*, *Alouette de mer*, *Gravelot*  
*naïf* (F). *Lesser ringed plover* (E).

نوع من الزقراق صغير القد، اسود المنقار المبسط،  
مستدير العين الكعلاء، مطوق الصدر، احمر القاعاء،  
والقدم || سر به متوسط العدد. يألف المناطق وصفات  
الانهار والشلوط.



زَقْرَاقُ مَطْلُوقِ

## ١٢٥٩٦ - زَقْرَاقُ نَاعِيسِ

*Hoploptère épineux* (F).  
طائر يدعى نيبوغ ناعيس، اعطيه.

١٢٥٩٧ - زَقْرَاقِيَّاتِ \*  
*Charadriidae*, *Charadriidae* (S). *Charadriidés*, *Charadriidés* (F).  
*Charadriidae*, *Charadriidae* (E).

فصيلة طير من رتبة طولان الساق. اجناسها وانواعها  
عديدة منتحلة الاشكال والالاخلاق والمادات. تتميز  
بسرعة دعوها على الارض وبنقايرها المركبة من جزئين جزء  
غضروفي يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقار وبسر، قرني  
يكون الثلث الاخير حيث الطرف والملمط.

١٢٥٩٨ - زَقْرَاقُ عَرْدِ  
*Gazouiller* (F).  
*To chirp*, *To warble* (E).

زقرق وفرد الطائر: رفع صوته وطرب به. والزقزقة شاملة  
لجميع العصافير اما التقريد فنخاص ببعضها.

## ١٢٥٩٩ - زَقْرُوقِ \*، نَمَلَةُ الْأُرْجَنْتَيْنِ \*

*Iridomyrmex humilis* (S). *Fourmi d'Argentine* (F).  
*Argentine ant* (E). *Argentinische Ameise* (D).

نملة صغيرة القد، دقيقة الجسم، تطول نحو ٣ م. ثوبها  
إلى السمرة الخيطية. صدرها وبرازها اقل سمرة من رأسها  
وطيها. النملة الكعلاء الشق، الجفنة، تطول نحو ٦ م. ||  
تقيم زبها في ابي سدع كان ان داخل المنازل ام خارجها.  
جراتها كبيرة. عدادها بعد ثلاث سنوات لا يقل عن  
٢٠ ألفا وقد يبلغ ٤٠ ألف بعد خمس سنوات || عاملاتها  
شديدة النشاط. سرعة الحركة، تسطو على معظم انواع  
النمل. صغر قعدا يسلمها من ولوج جميع الاماكن لذلك  
قنها لا حد له لانه يشمل جميع المواد الغذائية واخصها  
الحوم والمواد السكرية || يقال انها انتقلت من الاربعينتين  
إلى بعض اماكل اوروبية منذ ثلاثة اجيال. وانتقلت من  
أوروبا إلى اساطل الشرق الاسود بنفس الطريقة. وهي  
الآن من حشرات سواحل حوض البحر الابيض المتوسط.

١٢٦٠٠ - زَقْعِ  
*Chant du coq* (F).  
*Crowing of the cock* (E).

هو صياح الديك. زق الديك: صاح.

١٢٦٠١ - زَقْبُوتُ نَاصِعَةِ

*Bupreste* (F). *Buprestis*, *Golden beetle* (E).

جنس حشرات من فصيلة الناصعات انواعه عديدة جميعها  
حيلة الشكل والالوان الزاكية النحاسية المواجه. تعيش  
في المناطق المعتدلة الحارة. وهي ضوئية المسرح بسمية  
الطيران والحركة || يرقاتها غاصلة تعيش على مختلف  
الاشعاب وعلى جذور وسوق النباتات العشبية.



زَقْرُوقِ



زَقْبُوتُ الْأَثَلِ



زَقْبُوتُ السَّنْدِيَّانِ



زَقْبُوتُ الصُّنْبُورِ



زَقْبُوتُ نُسَاعِيٍّ الْبَقِيع

قليلة منها المناطق الاستوائية. جذورها غطية تنمو في الماء. سوقها درنات صغيرة. أوراقها قرصية الانتصاب، ضمية التجميع، بتلية الشكل، مضلمة النصل المحجن. الشارب الأطراف. أزهارها فردية محورية لاطشة. يقال إن أوراقها تذهب بالزحار وتقطع بول الدم.



زَقَبُوتُ فَحَام

#### ١٢٦١٨ - زَقَبُوتُ فَحَام \* Helicobasidium

فطر مجهرى من اللفرديات يتطفل على العديد من النباتات اغصها الثقل والزفران والجذور والشوئير والحليون والقمم والملفوف والحماض والقطن والقرنفل... || مركب الجذور عند انتشائها فينتطقها بعمادات وزماتحه الورية الحليلة الحمراء اللون الى ان يقضي عليها || يكافح باستمال مركبات الفينول ومنهم من استعمل الملح بمعدل ٣ كيلو في المتر المربع وذلك عند غلو التربة من النباتات.

١٢٦١٩ - زَلَّة هو فرخ القاختة.

١٢٦٢٠ - زَكَاة

الزكاة: ما اخبره الله من الثمر (التاج).

١٢٦٢١ - زُكَّام هو الخنا، اطليه.

#### ١٢٦٢٢ - زُكَّالَة Cytologie (F), Cytology (E).

هي السيولوجية أي علم الخلايا. وهي علم يبحث في ماهية الخلايا وتطوراتها الحياتية من جميع النواحي إن جمشورية او كيميائية او خلافا.

#### ١٢٦٢٣ - زُكَّالَة حَيَوَانِيَّة Cytozoologie (F), Cytology (E).

فرع من الزكالة يبحث في ماهية الخلايا الحيوانية.

#### ١٢٦٢٤ - زُكَّالَة نَبَاتِيَّة Cytobotanique (F), Cytobotany (E).

فرع من الزكالة يبحث في ماهية الخلايا النباتية.

#### ١٢٦٢٥ - زُكْبَة Sperme des insectes (F).

Sperm of insects (E). هو افراز اللدد التناسلية الذكورية عند الحشرات.

#### ١٢٦٢٦ - زُكْبَة Cytoblaste (F), Cytoblaste (E).

الزكبة جنبة الخلية النباتية.

#### ١٢٦٢٧ - زُكْبِي Cytologique (F).

Cytologic (E). كل ما هو مختص بالزكالة او عائد اليها.

#### ١٢٦٢٨ - زُكُون، زُكُون، زُكُوم Zaccon, Zacon

هو الحلج من البذايبات، اطليه.

#### ١٢٦٢٩ - زُكْبَة

هي الاغاثوسه، اطليا.

#### ١٢٦٣٠ - زُكْبَمَة، صَرْقَة Sore (F), Sorus (E).

مجموعة الاعضاء التناسلية في بعض الفطور.

#### ١٢٦٣١ - زَلَالِفُ الْمَلَكُوتِ

هي سرة السحر، اطليا.

#### ١٢٦٣٢ - زَلَّة Zilla (S).

Zille (F), Zilla (E), Stachlichter kohl (D), Zilla (I).

جنس نباتات عشبية برية محولة من فصيلة الصليبيات.

كالفكين وللألماس والشرج || طور الاكمال الذي يتم في آخر سرداب تحفره اليرقة يستمر نحو ٣٠ يوما وينتهي ضمن سلجة غاوية مركبة من نشارة الخشب المجمعة بالريال.

#### ١٢٦٣٩ - زَقَبُوتُ فَحَام \* Capnodis carbonaria (S), Capnode charbonnier (F), Capnodis carbonaria (E).

حشرة غاضلة ناعمة مؤذية من الزقنوتيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف المواقع التي تكثر فيها اشجار الورد والورد. غناتها تعيش على الارواق والبراعم. يرقاتها تتجمل الشكير والخشب وتعطب الجلود تحت سطح التربة || جسمها كبير القد بطول من ٣٥ الى ٤٠ م. ثوبها الى السواد الفحشي تملوه خلة ملحمة. رأسها مستعرض الجرم. عيناها كبريتان. زباناها خيطيان. ظهرها ذلق المؤخر، مستند الطرف الفراق الاوحد. غدها شديدا الصلابة. ارساها خاسية العقول || جيلها ثنائي الحول. الانثى اكبر قدما واقصر زبانا. تظهر من نيسان الى حزيران وتعيش نحو ٢٠ اسبوعا || اليرقة دقيقة مرعالة بطيئة النمو. تقوئ نحو ١٠٠ م. ثوبها الى البياض الاخير. رأسها اسود. فكاها غليمان.

#### ١٢٦١٠ - زَقَبُوتِيَّاتُ Buprestidae (S).

Buprestidés (F), Buprestidae (E). وتعرف بالناصات والناحات البقر. فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اطلب ناصات.

#### ١٢٦١١ - زَقُوم Eléage, Chalef (F).

Zakkoum-oil plant (E). هو الخلاف، اطليه. ورقه يلحم الجراح سريعا ويملو الكلف. وسائر اجزائه تنفع من وجع المفاصل والنسا والتقرس. ودعته اقل منه.

#### ١٢٦١٢ - زَقُوم بَلَدِي

هو الخلاف الضيق الورق، اطليه.

#### ١٢٦١٣ - زَقُوم فِصِي

هو الخلاف القفي، اطليه.

#### ١٢٦١٤ - زَقُوم هِنْدِي

هو فريوب الاقديمن، اطليه.

#### ١٢٦١٥ - زَقَبِيَّاتُ Ascomycètes, Eumycètes (F).

Ascomycetes, Eumycetes (E). رتبة الفطور الزقية من شعبة الفطريات. تتميز باختلاف مشرباتها وانفصال مشبيها وتشبهه وانسيائه الوحي. تكاثرها رتي. ارقاقها البوفية ورتبة التجميع || وهي تقسم الى مرتبتين: الفقيشيات والنفسقيات. أما فصائلها فست. الحثريات والمجذبات والوقيات والوقيات والمثويات والخشريات.

#### ١٢٦١٦ - زَقْبَة اللِّسَان Ascoglosse

مرتبة من الرغويات ألمدية.

#### ١٢٦١٧ - زَقَم \* سَحِي الْعَالَمِ الْمَائِي Pistia (S).

Pistia, Codapill flottant (F), Water lettuce, Tropical duck-weed (E), Wassersalat (D), Pistia (I).

جنس نباتات نجمية مائية من فصيلة القلقاسيات. انواعه



زَقَم



زَقْبَة

## ١٢٦٤٣ - زُحَابَة

Zelcova, Abelica (S).  
Zelcova, Késki, Orme de Sibérie (F).  
جنس اشجار حرجية من البقيصات وفصيلة الانجريات .  
انواعه قليلة . اشجاره كبيرة القند تعلق من ١٥ م ٣٠ م .  
افتادها ثنائية الانتشاب . اوراقها ثنائية الصنف ظاهرة  
المروق ، يضيئة الشكل ، مسننة الحافة ، قصيرة  
المعد . ثمارها باسمة بحجم الحمص .

## ١٢٦٤٤ - زُحْم

Dendrohyrax ١٢٦٤٥ - زُحْم \* ، وَبَر  
جنس حيوانات لبونة قاسمة من فصيلة الدناتيات .  
انواعه ٦ موطنها الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية .  
انواعها سوية اللون الازرق الاسكل . موطنها الى الصفار  
التي . برامها العليا مفلقة ، عيونها جاحشة . قوائمها  
قصيرة . اناتها ثنائية الاطباء || تألف الاجراس والغابات  
وتتسلق الاشجار بخلاف الدنان الذي لا يقوى على ذلك .  
قوتها اثنان ونواحي الاشجار وبعض الاعشاب . اناتها تنقع  
من ٣ الى ٤ ادراس ترصعها من ٦ الى ٧ اسابيع .

## ١٢٦٤٦ - زُحْمَاء ، صَقْرَة

Faucon femelle (F).  
Female hawk (E).  
الزواء والصقرة : انثى الصقر .

## ١٢٦٤٧ - زُحْمَة

Caroncule (F). Caruncle (E).  
قال الخليل : الزلة تكون للعض في سطوحها معلقة كالقروط  
ولها زنتان .

## ١٢٦٤٨ - زُحْمَة ، شَوْزُون

Gabarit, Gabari  
مخوخ او رسم او تخطيط شي . ما بشكله الحقيقي وكامل  
قياساته النسبية الواقعية .

## ١٢٦٤٩ - زُله

Flours de myrte (F).  
Flowers of myrtle (E).  
الزله : نور الريحان .

## ١٢٦٥٠ - زُؤُل ، زُؤُلُك ، زُؤُلُك

Glissement (F).  
Sliding, Slipping (E).  
حالة الشيء ، المزلق او حركة انزلاق الشيء .

## ١٢٦٥١ - زُؤُلُجَة

Oncidiella (S).  
Oncidiella (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل  
الرئوية وفصيلة الزليبيات . انواعها المعاصرة المعروفة  
عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة ||  
اصداؤها معتدلة الحجم ، ثنائية المصارع الانتساوية ،  
شبه اهليلجية الشكل ، قليلة الاحدياب الصاصي الاتحاد  
يلوهم من القمة الى الطرف الخلفي اخمدون ناشز غروطي  
الشكل يضيق مع اقترابه من القمة .

## ١٢٦٥٢ - زُؤُلُجِيَّات

Oncidiidae (S).  
Oncidiidae (F).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل  
الرئوية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع  
بحار العالم || اصداؤها ثنائية المصارع الانتساوية .  
تميش على الصخور والنبوت البحرية القريبة من الشطوط .  
مسرحها دجوي || اشهر اجناسها الزؤلجية .

## ١٢٦٥٣ - زُؤُلُجَة

اسم سمكة بحرية يطلق على الكيدمة المخفراء (Vieille)  
ويطلق على الزسوط (Savonnier) .

انواعها المعروفة اربعة منبتها الشرق . اوراقها حريفة .  
ازهارها ليلية . يقال انها لا تخلو من بعض المنافع  
الطبية .

## ١٢٦٥٣ - زُحَاب

Cronartium  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الزحابييات يتحلل بالمصنص  
الميزة التالية :  
١ - مثاقفه تبيض وتتكاثر تحت ادمة النبات المنحار .  
٢ - صفاته الاثيدية جرابية المسائل وجيوب عساقطها  
تتلف من بويئات لمولوية السطح .  
٣ - ذماتها وسادية متصبية رباعية الاضعية .  
انواعها عديدة تتطفل على اوراق واغصان النبات اشهرها  
واغصانها ما يلي .

## ١٢٦٥٤ - زُحَاب الصُّوْبَر

Cronartium ribicola, Peridermium strobili (S).  
Rouille des pins à 5 feuilles (F).  
فطر مجهرى يتطفل على اهداب الصنوبر فيعطلها ويسبب  
ذبولاً وسقوطها . ويصيب الحاء فيقرحها وينفضها  
ويسلب الاشجار وقد يقودها الى اليباس .

## ١٢٦٥٥ - زُحَاب الحَرَاكِيَة

Cronartium flaccidum, Peridermium coruni (S).  
Rouille de la pivoine (F).  
فطر يعيش طوره الاثيدي على لحاء الصنوبر وطوره  
الدعائي على الفوانيه . مثاقفه الخارجيه على الصنوبر  
حصف لا قياسي الشكل والحجم لونه يتراوح بين الاحمر  
والاصفر تركيب الاغصان والاثنان من اوسط ايار الى  
اوائل تموز فيقرح الحاء ويصطب الاعضاء المصابة .  
دور على الفوانيه يقع لقياسه الشكل والحجم والتجميع  
تركب فصل الاوراق على صفحتها السفلى تسبب ارتقاع  
البشرة وانفجارها ثم صلب التسج وذبوله .

## ١٢٦٥٦ - زُحَابِيَّات

Cronartiaceae (S).  
Cronartiaceae (F).  
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعابيات قليلة الاجناس  
والانواع . تتميز بدعاباتها الاثيدية الشكل والتجميع .  
اثيراتها جرابية تعلق سطوح الانسجة المنحارة . ذماتها  
وسادية او هدية الشكل . بويئاتها صغيرة كروية .  
اعرف واشهر اجناسها الزحلاب والكرزوميكسه .

## ١٢٦٥٧ - زُكْرَالِي

Sismique (F). Seismic (E).  
تحت تعريفه يطلق على كل ما له علاقة بالزلازل وبالزلات  
الارضية .

## ١٢٦٥٨ - زُؤُلُجَت

Gerçure (F). Chap (E).  
شقوق سطحية في اطباء فروع البقر والمعزى .

## ١٢٦٥٩ - زُؤُلْب


زؤلب وزؤلب ران الشام : وبر اي نبت عليه الور .

## ١٢٦٦١ - زُؤُف

Parc (F). Park (E).  
الروضة النظيفة الريانة جادت مياهها وكثر طيرها .

## ١٢٦٦٢ - زُؤُوم

Museau des canidés (F).  
Muzzle of canidae (E).  
هو غلظ الكليبات وامثالها .



زحلاب الصنوبر



زحلاب الفوانيه



زلم



زليجة



ظهور مشوح بالابيض والابيض الاسود .  
قوامه ومناكه والطراف زيكاه سود . بطنه وباطن مقفه  
وكسحه يبيض . رسفه الى الرمة الزرقاء || الذكر اصفر  
جثة من الاثني واثنى لونا واصلب شكمية || يحويج  
البلاد في طلب القوت والمصيف والمشي . يأنث الجبال  
والغابات والاحراج . يئن عشه بين فروع الاشجار  
الباسقة . انشاء تحفن من رقتين الى ثلاث رقتان  
نحو الشهر || يئلس قوته عنه الصباح الباكر .  
يرغب في الجيف المئنة يشرها مها كانت جلوهها  
قاسية .



زيلة

Sarcorhamphes

## ١٢٦٦٠ - زُمَاحِيَّات

فصيلة من النسور تنتمي الى رتبة الجوارح . اجناسها  
الحالية قليلة تشمل الزياح والكتنور .



زماح

Cri de l'autruche (F).

## ١٢٦٦١ - زُمَاح

Cry of the ostrich (E).

صوت النعامة وفي الصباح صوت النعام .

Barita (S).

## ١٢٦٦٢ - زَمَاحُ \*

Fiôteur (F). Morning-clock (E).

طائر من فصيلة الفرايات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها  
استرالية ونياسية . يأنث الير والاحراج البصرة الاجمار  
ويقترب من الاساكين الاكلة والنائز الى الريفة || جسمه  
كبير القد بطول نحو ٤٢ سم . قويه اسود ام . قتاله  
وظهوره الى البياض الاخير . لواحف جناحه وذنبه الى  
البياض الناصع . منقاده غمري في الشكل ازرق اللون .  
حققه عنه كسئية . جناحه كبير القد بلفظ الفلب .  
ذنبه شبه مقطوع الطرف . رسفه الى السمرة السوداء ||  
اخلافه هنية . من ميزاته انه يياشر ترديد الحانه منذ  
الصباح الباكر . بنات صوته قريبة الشبه بنجات المزمار  
ما دعي الى تسميته بالزماح || قوته الخشرات على اختلاف  
اجناسها وانواعها وانصها الكثرية ومنها الجراد || يئن  
عنه في الاجمار البازرة الظل المعتدلة الارتفاع . الاثني  
تحفن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حصفتها  
تزاوح من يفضتين الى ثلاث يفيضات تقوم بترغيها دون  
الذكر الذي يؤن لها الغذاء .



زماح ملكي

## ١٢٦٦٣ - زَمَاحُ الرَّمَلِ

طائر من القطيع ، اطلبه .

Syngnathidae (S).

## ١٢٦٦٤ - زَمَارَاتُ الْبَحْرِ

Syngnathids (F). Syngnathidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة عسليات الحياجم اجناسها  
وانواعها عديدة اشهرها زيارة البحر وحصان البحر .

Syngnathus (S).

## ١٢٦٦٥ - زَمَارَةُ الْبَحْرِ

Syngnathus (F). Syngnathus, Pipe fish (E).

جنس اسماك صغيرة مستطيلة . اجسامها غمري في الشكل  
دقيقة المؤخر المتصلف كاصفين . روسها مستطيلة  
كالمقلار الاطلس الطرف . تحمل زعنفة ظهرية واحدة  
تقابلها شبه زعنفة بطنية متناحية في الصفر . انواعه  
مدينة موطنها جميع بحار العالم . اعرفها واشهرها زيارة  
البحر الابرية .



زيارة البحر الابرية

## ١٢٦٦٦ - زَمَارَةُ الْبَحْرِ الْإِبْرِيَّة \* أَبُو زَمَارَة

Syngnathus acus (S). Syngnathus albigille, S. trompette, S. serpent de mer (F). Needle pipefish (E).

نوع من زيارة البحر طوله نحو ٥٠ سم . تكثر في  
البحر الابيض المتوسط وقرب شواطئ المحيط الاطلسي .

١٢٦٥٤ - زَيْلِقَة \* Brugnion (F). Nectarine (E).  
هي بالاساس ثمرة الدورات مها كان شكلها وقد صار  
استادها الى الثمار المرطاة البشرية . ج زليق .

## ١٢٦٥٥ - زَيْلُون

مادة سامة ترتكز على مشقات التالوم . عرضها التجاري  
المعروف يأتي على شكلين : الشكل الاول حبوب مسومة  
تستعمل للقصا . على الفيران والكمكار والتمانجس .  
والشكل الثاني مجوون وضع خصيصا للاستعمال في مختلف  
انواع العلوم وهو يقضي على الجرذان والراناب والكمكار  
واشباها . انما يجب على كل من يستعمل مستحضرات  
الزليون ان يكون حذرا فيبعدا عن تناول الطيور والحيوانات  
الهادجة لانها مؤذية وقد تكون مينة .

## ١٢٦٥٦ - زُمَاح \* ، زُمَجْ

Herpethotheres (S). Macagus (F).

جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات . انواعه  
قليلة جميعها من الجوارح الصغيرة القد طولا يراوح من  
٣٥ الى ٤٥ سم . اوطاها موشحة وبوشة تقلب فيها الجوة .  
ارياها شاسعة . رؤوسها غليظة . مناسرها قوية محدودة .  
سواقطها مستطيلة . اذناها مستدلة . ارسافها ثخينة .  
غالبا حادة . الواحدة زججة || ارسابها قليلة العدد  
تجويج بالبلاد في طلب المصيف والمشي . تألت مجاري  
الماء والطراف الغابات || قوتها الاناعي والعلفاه  
واللوبيات والخشرات وبعض الاسماك . يقال انه لم يأكل  
احد من لحمها الا مات . قال الشاعر :

« أهل المهدي أصبحت أم عرو  
ليت شمري أم غلاما الزياح »

## ١٢٦٥٧ - زُمَاح

جنس طير من كوامر النسور وفصيلة الزياحيات . انواعه  
قليلة جميعها كبيرة الحجم يلقاه الثوب . رؤوسها وانعافها  
غفيرة . سواقطها عطيفة . ارسافها سرسة غالبا غفيرة .  
قوتها الجيف المئنة ومنهم من قال ان الزياح يأخذ القفل  
من مهله || اعرف انواعه واشهرها الزياح الملكي وزياح  
امريكة .

## ١٢٦٥٨ - زُمَاحُ كَلِفُونِيَّة

Pseudogryphus californianus (S). Sarcorhamphes de California (F).

طائر من الزياح ملوه نحو ١٢٠ سم . وبسطة مقطيه  
٢٥٠ سم . ثوبه اسود . مقطه ابلق . رأسه اغفر الريش  
كثير المرف . اجند الاذن والزند . غليظ المنسر  
الاعتقت البره || يئن عشه على الحفصيص وبين تخاليف  
الصخور في الجبال الريفية . اثناء تحفن من رقتين الى  
ثلاث رقتان نحو الشهر || يئلس قوته طول النهار .  
يرغب في الجيف المئنة موطنه امريكة الشمالية انصها  
كليفونية .

## ١٢٦٥٩ - زُمَاحُ مَلَكِي \*

Sarcorhamphus gyparcus papa (S). Sarcorhamphes royal, S. papa (F).

طائر من الزياح يعرف باسم ملك النسور ملوه نحو  
٩٠ سم . وبسطة سطفيه ١٩٠ . رأسه اغفر الريش  
خري اللون . منسر غليظ الشكل اسود الانتشاب اخر  
الميكيل اصفر البهر المقطوية البغاف . عرفه برتغالي  
اللون . عشقه اغفر اصفر . جويئط مطوق بالازرق .

Plumes sus-caudales (F). **زُمَجِي** - ١٢٦٧٦  
Sus-caudals feathers (E).  
من ريش ذنب الطائر مركب بين الانفك والزنكي .  
ومنهم من قال اصل ذنب الطائر (Croupion) .

١٢٦٧٧ - **زُمَجِيل** ، **لَحْنَالِيَه** ، **زُنْبُقِ البَرِّ**  
Lachenalia (S). Lachenalia (F). Tiger lily (E).  
Lachenalia (D). Lachenalia, Giglio leopardo (I).  
جنس نباتات صليبية من فصيلة الزنبقيات . انواعه كثيرة  
العدد اوراقها عصفية الشكل . ازهارها سنبلية او  
عنقودية التجميع يحملها شراخ اجوف رفيع || اشهر  
انواعه البزينة ما يلي .

١٢٦٧٨ - **زُمَجِيل سَحَلِي**  
Lachenalia orchoides (S). Lachenalia-orchis (F).  
نوع من الزمجيل . اوراقه عصفية الشكل لحمية التسج  
شرقية الحمار اغرز || شراخه يعلو من ١٠ الى  
٢٥ سم . ازهاره سنبلية التجميع ، جرسية الشكل ،  
عارقة البتلات ، عطرية الرائحة ، يبيضه اللون يعلوها  
مواج ازرق او صفراء اللون يعلوها موج احمر || ازهاره  
يدوم طوال شهر ايار .

١٢٦٧٩ - **زُمَجِيل مُدَلَّتِي**  
Lachenalia pendula (S). Lachenalia pendante (F).  
نوع من الزمجيل . اوراقه عصفية الشكل لحمية التسج  
تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٥ الى ٣ شراخ  
يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل ،  
عنقودية التجميع . متدلية الارتكاز . تحمل صفان من  
البتلات الخارجية اقصر من الداخلية لوها الى الحفرة .  
اما الداخلية فتصلها بنفسجي اللون ومغصبتها شفافة .  
ضربوه عديدة تتميز بالونها || ازهاره يستمر طوال  
كانون الاول والثاني .

١٢٦٨٠ - **زُمَجِيل يَاقُوتِي** \*  
Lachenalia rubida (S). Lachenalia rubis (F).  
نوع من الزمجيل . اوراقه سنبلية الشكل تطول من ١٢  
الى ١٦ سم . وتعرض نحو ٣ || شراخه يعلو من ١٥ الى  
٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل عنقودية التجميع تعد  
من ٥ الى ١٥ زهرة لوها ياقوتي بلباتها الخارجية اقصر من  
الداخلية || ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .

١٢٦٨١ - **زُمَحَاط** \*  
Clasterosporium  
جنس فطور مجهرية من عماره الريدانيات وفصيلة  
الحماطيات . كنانته بيضيه ، مستطيلة ، ممتدة ،  
جانبية التجميع تركر حل حيث غليظ يقوم مقام  
الجرب || انواعه قليلة ، اعرفها زحاط البن وزحاط  
الشوكر .

١٢٦٨٢ - **زُمَحَاط البُن** \*  
Clasterosporium coffeanum  
فطر مجهرى يركب اوراق البن فيؤذيها || مظهره  
الحماطى يقع صغيرة ميمرة تملو النصل حل صفحته  
الغليا . تليد صفراء اللون ، سمره الحمار تسع وتضرب  
نحو السرة يعلوها حل قليل الكثافة اغبر اللون يقودها  
الى الذوبان واليباس .

١٢٦٨٣ - **زُمَحَاط الشَّوْكَر** \*  
Clasterosporium putrefaciens  
فطر مجهرى يركب اوراق الشوكر فيعطلها || مظهره

Hétérogénéité (F). **زَمَاع** ، **زَمَع** - ١٢٦٧٧  
Heterogeneity (E).  
هو عدم الانسجام الجسمي والشكل الذي يبدو بين  
مختلف افراد الضرب الواحد في الموقع الواحد .

١٢٦٦٨ - **زُمَاعَة** \*  
Pleurotoma (S).  
Pleurotoma (F). Pleurotoma (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممدبات الاربيل  
وفصيلة الكريزيات . انواعها المصاهرة المعروفة عديدة  
منتشرة في منازل بحار البلاد الحارة || اصداها مخروطية  
محزنة ، دقيقة الاعقاب ، مستطيلة الفوهات الميزابية  
الاسطر ، جليلة الالوان والتراويق والزخرفة . اسفاطها  
قوية المادة .

١٢٦٦٩ - **زُمَالَة** \*  
Bétaillère (F).  
Livestock trailer (E).  
الزئالة شاحنة معدة غصيصاً لنقل البهائم .

١٢٦٧٠ - **زُمَام**  
Herbes hautes (F).  
High herbs (E).  
هو العشب المرتفع .

١٢٦٧١ - **زُمَالَة**  
Invalidité, Incapacité de  
travail (F). Disability, Incapacity for work (E).  
صفة ما هو لاشري غير مستوفي الشروط ، والعبز  
والقصور وعدم الاهلية .

١٢٦٧٢ - **زُمَت** \* ، **اَبُو قَلَمُون** (S). Pyrrhocorax  
Chocard, Corbin chocard (F). Chough (E).  
طائر من الغربان ريع الجفة طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه  
اسود اللون اخضر المواج . منقاره اصفر ، عيانه عسلتان ،  
رساء وغالبه حر || موطنه حوض البحر المتوسط . يعيش  
اسراباً كبيرة العدد . قوته الليدان والحشرات والحبوب  
والتأثير اخصها العنبيبة || يدش عشه في صدوع الصخور  
والمقار . الاثنى تحضن وسداها من ٤ الى ٥ بيضات  
لوها الى البياض الاغبر يعلوه توشم اصفر .

١٢٦٧٣ - **زُمَت الجُرْدَة** \* ، **عَبَقِي** \*  
Pyrrhocorax alpinus (S). Chocard des Alpes (F).  
نوع من الزومت وهو طائر من الغربان ريع الجفة طوله نحو  
٤٢ سم . ثوبه الى السواد الاخضر المواج . منقاره الى  
الصفار المحللي . عيانه غرنوبيتان . رساء وغالبه الى  
الحمرة الجردية || موطنه حوض البحر الابيض المتوسط  
يجبرها الى الهضاب والوديان في فضل الشتاء ثم يعود اليها  
في اواسط الربيع || يألف الحياة الجماعية ، سر به لا يقل  
عن ثلاثة ازواج ولا ينفق المشرة || قوته الحشرات والديدان  
والقشريات والحبوب والتأثير ولا يمت عن جيفة انها  
شامدا || يدثن في صدوع الصخور وفي المداور والاطلال .  
انثاء تحضن وسداها من ٤ الى ٥ بيضات تبنيها اللون خنطية  
الرقشة اللامسوبة التوزيع .

١٢٦٧٤ - **زُمَج** هو الزجاج ، اطليه .

١٢٦٧٥ - **زُمَج الماء** \* ، **نُورَس** ، **نُورَس**  
Larus (S). Mouette, Golland (F). Gull (E).  
جنس طير من رتبة كليات القدم طوليات الريش  
الابيض . يطرن اسراباً فوق الماء فيختلن منه السكك .  
انواعه عديدة منها الجركة والحوري والدفية والدنكلة  
والنورس والزردى والسكي والسويدي والمجمة والنورس .



زُمَاعَة



زمت



زُمَت الجُرْدَة



زنج الماء



زمجيل ياقوتي



زحاط الشوكر

١٢٦٩٣ - **زُمَعَة** هي الزراع ، راجع .

١٢٦٩٤ - **زَمَكْ ، زِمِكِي ، قُظَن** Croupion (F).  
Parson's nose (E).  
منبت ذنب الطائر .

١٢٦٩٥ - **زِمِكِيَّات** Haloragae, Cercodianeae (S).  
Haloragées, Cercodianeés (F). Haloragae, Cercodianeae (E).




زمر ، زيمير

فصيلة نباتية من باديات اللباقع ، ذوات الفلقتين ، مستقلات القعالات ، ملتحات المص . اجناسها ثمانية اما انواعها فنحو ١٠٠ نباتاتها اشباب ونباتات بعضها مقني ومائي . ازهارها غشوية صغيرة القد مختلفة الالوان .

١٢٦٩٦ - **زَمَلَحَة** Dessalage, Dessalaison (F).  
Removal of salt (E).

الزملحة ازالة الملح من الماء .

١٢٦٩٧ - **زُمُلُول** Exobasidium  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الزمولويات يتطفل على بعض النباتات الزينية فيؤذيها بعد ان يجمد أوراقها ويلوي غصنها || اشهر انواعه واعرفها الزمول الياباني .



زمر مجري

١٢٦٩٨ - **زُمُلُول يَابَانِي \* ، زُمُلُول الْجِسَان** Exobasidium japonicum, E. azaleae (S). Fausse-croque de l'azalée, Gallies foliaires de l'azalée (F). Azalea galls (E). Ohrfläppchenkrankheit der azaleen (D).

فطر مجهرى يتطفل على الجسنان (ازالية) فيؤذيها ويجمته . منظره الخارجى يجمد الى الاوراق وتذوي به البراعم والنواصي التي يملؤها الفطر حيث تبدو كأنها مغطاة بارسوة خلية بيضاء اللون تكثفت بعض الوريقات فتدبب تقلص الخضيب وتحول فيها المواد النشوية الى سكرية . يكاثف بقطع الانفصان المصابة وينفخ النبات بسائل بوردو المركز ١٪ او بأحد الفوطاير الحجرية .



زملول ياباني (١)

١٢٦٩٩ - **زُمُلُولِيَّات** Exobasidiaceae (S).  
Exobasidiacées (F). Exobasidiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات . اجناسها وانواعها نحو ٦٠ منها فطور مرشقة الدعامات تتكون بين الخلايا النباتية هييفا خفيف البنية رزني التجميع ينشأ تحت الطبقة الدامية . ومنها فطور دبوسية الدعامات المتشعبة البسيطة المرافف المحيطية المنفصلة || اشهر اجناسها واعرفها زراعياً الزمول .

١٢٧٠٠ - **زَمَن** Période (F). Period (E).  
اسم شامل يدل على الوقت وهو عديد المقام . فالزمن المطلق وهو من اجات التسلف ، حالة استمرارية لا نهاية لها ولا علاقة لها بالمادة او الحركة || والزمن في العلوم الطبيعية كالفلك مقياس لامتداد وجودي لا علاقة له بالمكان || والزمن النسبي الذي يقاس بظاهرة طبيعية معينة كدوران الارض حول الشمس يدعى الزمن النسبي || والزمن الحسلي هو الحقبة التي مرت بها الارض في تكوينها .



زملول ياباني (٢)

١٢٧٠١ - **زَمَهَلَة** Fonte de la neige (F).  
Melting (E).  
الزمله سيلان الثلج بعد ذوبانه .

الخارجي يقع صغيرة مستديرة حنطية اللون سمراء الحمار يملوها خل فني تركيب الوراق فتسقطها وقد تصيب المشاتل فتضيقها .

١٢٦٩٤ - **زَمَر \* ، زَمِير ، أَبُو شُوكَة** Gasterosteus aculeatus (S). Epinoche commune (F).  
Stickleback (E).

سمكة نهرية من فصيلة الزمريات . صغيرة القد طولها من ٥ الى ٦ سم . جسمها عديم الفلوس . زعانفها ثلاثية . تتميز بأشواكها الناتئة المتفاوتة القد ، ثلاث منها ظهريه وواحدة بطني .

١٢٦٩٥ - **زَمَر يَحْرِي \* ، زَمِير يَحْرِي** Spinachia spinachia (S). Epinoche de mer (F).  
Pricle-back (E).

سمكة بحرية من فصيلة الزمريات . اطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . تألفت معائب المهاج والشتاف . الاثنى عند اقتراب زين الترسه ، من نيسان الى حزيران ، تسمل على الذكر عشاً من الخث تحبكه بين النباتات البحرية وتلتصقه بمادة غروية قعرزما الكلى . الذكر يحرس على السر ولا يغادر الش الا بعد التفج || جسمها صغير القد ، نحيل الجرم ، بطول من ١٣ الى ٢٠ سم . غطها معتدل الاستطالة . فها مسن الفكين . جسمها عديم السهف باستثناء الجانبين المجهزين بنحو ٤٠ حرقفة . زعنفتها الظهرية غليظة الارتركار يستيقها صف من المناسخ يد من ١٣ الى ١٥ . زعانفها المحوضية صغيرة مخشبة الشكل || لحمها متوسط الصنف غير مرغوب فيه .

١٢٦٩٦ - **زُمَرَة ، فِكَة** Groupe (F).  
Group, Clump (E).

مجموعة نباتية تنصف بذات الاشكال الخارجية او تتحل ببعض الصفات الجينية المقررة .

١٢٦٩٧ - **زَمُرْد** Emeraude (F). Emerald (E).  
نوع من الزميرد وهو حجر بلوري كريم لونه رايح من الاخضر الى الازرق . ضروريه عديدة افترها اقلها ازرقاً واشدما لمعة .

١٢٦٩٨ - **زَمَرْمُورَة** هي المرمورة ، اطلبها .

١٢٦٩٩ - **زَمَرِيَّات ، زَمِيرِيَّات**

Gasterosteidae (S). Gasterostéidés (F). Gasterosteidae (E).

فصيلة اسماك بحرية ونهرية من البطليات الشائكات الزعانف . اجناسها وانواعها ثلثة العدد جميعها دقيقة الاجسام الصغيرة . البحرية منها اكبر قدماً من النهرية .

١٢٦٩٠ - **زَمَرْمُورِيَّي** هو الاريجون ، اطلبه .

١٢٦٩١ - **زَمُع** Guêpe mâle (F). Male wasp (E).  
الزنبور لا ابرة له . وهو الذكر من الزناير .

١٢٦٩٢ - **زَمَعَة**  
هي البرعمة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او المنقود الزمري . وهي حنة زائدة وراء اللطف ، في كل قائمة زمستان . يقال فرس ولفاء الزرع . وهي ايضاً الشمرة الدلاء في مؤخر رجل الشاة .

١٢٧٠٨ - زَيْمَر هو الزمر، اطليه .

١٢٧٠٩ - زَيْمَر هو خرطال فوا، اطليه .

١٢٧١٠ - زَيْمَر تَبَوِي هو الخرطال البريان، اطليه .

١٢٧١١ - زَيْمَقَة Fabraea

جنس فطور مجهرية من السقديات وفصيلة الخشاريات يتميز بصداته الصغرة الحجم التي تتكون داخل الساق الأديمي ثم تنجس نحو الخارج حيث تنتقل . بوفها ثنائي الخلية . بوفها متصالية شفعية رباعية || أشهر أنواعه اللؤذية الثلاثة التالية .

١٢٧١٢ - زَيْمَقَة السَّرَجَل \* Fabraea maculata, Diplocarpon soraneri, Entomopeziza mespilii, Stigmata mespilii, Entomosporium maculatum (S).

نظر مجهري يركب أوراق السرجيل ويصيب الثآليل وقد يمتري أوراق الاجاس والاكيديا || مظهره الخارجي على أوراق السرجيل ، بقع صغيرة شبه مستديرة قطرها من ٢ الى ٣ مم . تبدو ميمونة على صفة النسل العليا ثم تتكاثر فتم كامل النسل . لوها وردي ثم مرجاني وينتهي الى الجؤفة المابقة || وهو عسل الاجاس يقع بذات اللون صغيرة القند مستديرة ميمونة على كامل النسل || اما في الاكيديا فقطر بقعه يراوح من ٣ الى ٤ مم . وهي مقرنة الزوايا ميمونة على كامل النسل ، تكثر قرب اطرافه || اضراره منوطة برطوبة التربة المرتبطة بالماء الجوية المواتية || يكافح باستعمال سائل بوردو المخلول ٠.٨٪ على مرتين، المرة الاولى بعد تمام الاوراق والثانية بعد الاولى بثلاثة أو أربعة اسابيع .

١٢٧١٣ - زَيْمَقَة التَسْرِين \* Fabraea earliana, Mollisia earliana, Diplocarpon earliana, Marssonina potentillae (S).

نظر مجهري يركب أوراق التسرين والشيلك فيعطلها . مظهره الخارجي يقع قرمزية لا قياسية الشكل ولحمي فها قفيها يراوح من ٣ الى ٦ مم . تركب الاوراق ثم تتجس فتم كامل النسل حيث تشل الحركة السفية . وقد يركب اهن الثآليل فيسبب سقوطها || يكافح بكافة النفيطة باستعمال سائل بوردو المخلول من ٠.٨ الى ١٪

١٢٧١٤ - زَيْمَقَة الورد \* Fabraea rosae, Diplocarpon rosae, Marssonina rosae, Actinonema rosae (S).

نظر مجهري يصيب أوراق الورد فيعطلها ويسبب سقوطها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ولحمي فها قفيها الاستدارة لوها الى الجؤفة المابقة تركب النسل على صفحته العليا فتنضب النسيج بعد الاخلايا وتسبب الاجاس الاكر ما يؤدي الى وقف النمو وعدم انتظام الدورة الحياتية الحولية || يكافح باستعمال سائل بوردو المخلول من ٠.٨ الى ١٪ يضاف اليه الصابون المخلول ٠.١٢٪ او باستعمال الكبريت الميكروني الممزوج زيتوناخ الرصاص بمعدل ٩٠٪ كبريت ١٠٪ . زيتوناخ تمقيرها على النبات من السبع الى الثمان مرات .

١٢٧١٥ - زَيْمَقَة ستايليدوم \* Stachylium

جنس فطور مجهرية من اللعنات وفصيلة الطحنيات . هيفه الكنديه منتصب ، منتصب ، عايق اللون ، يعمل في اطرافه ككائه بسيطة ، شفاقة ، بيضيه جشوية التجميع .

Cenangium

١٢٧٠٢ - زَيْمِج \* جنس فطور مجهرية من الزيمجيات وفصيلة الخشاريات .

صداته ملونة حاصنة الجوانب تتكون وتنمو داخل الامة فتسبب انفلاتها . تكائه ضخمة ، بوفها ثنائي التجميع ، اعليها الشكل ، بسيط التركيب ، وسيد الخلية ، شفاف اللون او حنطي || له نوعان مؤذيان زيج المحور وزيج الصنوبر .

١٢٧٠٣ - زَيْمِج الحَزْه \* Cenangium populeum, Dothichiza populea (S).

نظر مجهري يصيب المحور في لحائه فيعطله وقد يمتيه . مظهره الخارجي يشو حنطية اللون تنشي اللحاء فتخلعه يوشاح الى الصفرة فاليابس . يركب الاوراق في بادئ الامر ثم ينتقل منها بمشيج الى الاذنات والاغصان والسوق || يكافح بقطع الاغصان الموبوءة وبتهليل الجروح وينضج للمشال بسائل بوردو .

١٢٧٠٤ - زَيْمِج الصَّنَوْبَر \* Cenangium ferruginosum, C. abietis, Dothichiza ferruginosa (S).

نظر مجهري يركب الصنوبر فيؤذيه وقد يسبب موته . مظهره الخارجي احرار يصيب هدب الصنوبر ، على سد زامة الاول ، فيطوح به وينتقل بمشيج الى الاذنات والاغصان فيعطلها ويذبلها ثم يمت الشجرة بعد ان يغضب خشبها بالسورة وبعد ان يكسبه بعض الصلابة القاسية العالبة .

١٢٧٠٥ - زَيْمِجِيَّات \* Cenangiaceae (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بصداتها القرصية، الملونة، او الصلبة الجسم ، القائمة على ونية لينة . تكاتها متشابهة مع تكاتها المتشعبة . بوفها عديد الاشكال تختلف التركيب وبيها هو وحيد الخلية في الزيج اذ به شفعي الاخلايا عديدا في الدفر || له جنسان شيران هما الزيج والدفر .

١٢٧٠٦ - زَيْمِجَة Epicoccum

جنس فطور مجهرية من عمارة الطحنيات وفصيلة الكنثيات . ونيته شافة . جره الكنديه كرودية ، قصيرة، عايق اللون . ككائه طرفية كروية عاقبة السرة . انواعه قليلة العدد والاذى جميعها رمية تمش على لحاء الاغصان اليابسة وعلى المواد النباتية المنحلة .

١٢٧٠٧ - زَيْمَر، مَرْوس الدَبَش Erythrozopsis gitaginea (S).

مظهره الخارجي يشو حنطية اللون تنشي اللحاء فتخلعه يوشاح الى الصفرة فاليابس . يركب الاوراق في بادئ الامر ثم ينتقل منها بمشيج الى الاذنات والاغصان والسوق || يكافح بقطع الاغصان الموبوءة وبتهليل الجروح وينضج للمشال بسائل بوردو .



زيج المحور



زيمقة السرجل



زيمقة التسرين



زيمقة الورد

١٧٧٢٥ - **زُنْجَارِي ، حِرَامِي**  
Zoniforme (F). Belt-shaped (E).  
نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالزئار أو الحزام .

١٧٧٢٦ - **زَنْطَاط الصَّيْف \***  
Byturus aestivus (S). Byturus aestivus (E).  
حشرة وأشعة ثمانية من فصيلة الزنطاطيات ورتبة مشدات

الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المحذلة الحارة من الشرق الأدنى وأروبة . تألف البراري والاحراج البقلة والأودية الظليلة والمناطق الرطبة . غنسانها تعيش على مثل الأزهار وطلعا . يرقاتها تعيش على الثمار البرية وأخصها معص العوسج || جسمها صغير القد بطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمره الصهباء يطولها خل حنلي . رأسها مستدلل الجرم . عيناها صغيرتان بارزتان . زناها صولجانيان

دقيقان . ظهورها قليل الإحدياب مستدير المؤخر اللامع . غداها كثيفتا الخمل والزغب . أرساغها خاسية العقل ، محببة الخالب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة المجذلة في أوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . آثر في الثمار وتبيت في الليل || البرقة بطيئة النمو تطول عند الإدراك التام نحو ٦ م . جسمها مسطلل الجرم ، مستطلل المقدم والرأس ، مستطلل المؤخر ، سداسي المرواج ، حنلي اللون ، أصر الرأس || طور الإكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوما يتم في التربة وينتفضع ضمن صلبة سيكة الشفاء المركب من مواد عضوية وثراب .



زيمية الموز

١٧٧٢٧ - **زَنْطَاطِيَّات \***  
Byturidae, Trixagidae (S). Byturidae, Trixagidae (E).  
فصيلة حشرات وأشعة ثمانية من رتبة غديات الاجنحة || اجناسها وأنواعها قليلة العدد . مهدها يشمل معظم مناطق البلاد المحذلة الحارة والمنسحق نحو البادية . غنسانها تعيش على مثل الأزهار . يرقاتها تنخر الثمار وتنتقل داخلها || اجناسها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار ، مستمرة الرؤوس ، صولجاني الزباني المركبة من ١١ فصلة . اغادها مستطيلة لافعة . جرانها مستطعة . أرساغها خاسية العقل تتميز بصغر العقلة الأولى والرابعة || أشهر اجناسها الزنطاط .

١٧٧٢٨ - **زَنْطَاق ، مِحْرَاف**  
Biseau (F). Chamfered edge (E).  
أداة تستعمل للحفر في الخشب وغيره .

١٧٧٢٩ - **زَنْتَاقَة**  
Koeleira (S). Kozlerie (F).  
جنس نباتات عشبية ، برية ، مرموعة ، حولية أو معمرة من فصيلة النجيليات . أنواعها المعروفة عديدة منها يتعد من الشرق الأوسط الى بعض أصقاع أروبة || جميعها شلبية متوسطة الارتفاع . صعلها ضيق ، مستطيل . أزهارها عنقودي منتصب .

١٧٧٣٠ - **زَنْتَاقِيَّة \***  
Cercospora (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة البولجيات . ينتشر بحرية الكينية الدغلية القليلة الفروع . كائنات اضطرابية أو غمرزية الشكل ، عديدة الظواهر الممرضة || أنواعها كثيرة تركب أوراق النبات . أمرفها ما يتبع .

١٧٧٣١ - **زَنْتَاقِيَّة الدَّرَاقِين \***  
Cercospora persica (S).  
فطر مجهرية يركب أوراق الدراق . مظهره الخارجي



زَنْطَاط الصَّيْف

أنواعه قليلة تركب المواد الخشبية السائرة الى الاحتلال ومنها نوع يصيب الموز فيؤذنه .

١٧٧١٦ - **زَيْمِيَّة المَوْز \***  
Stachylidium musae, S. theobromae (S). Bout de cigare de la banane, Maladie du bout de cigare (F).  
فطر مجهرية يركب ثمار الموز في اعناقها وتثورها فيحطبا ويشوها ويؤذنها لبها بعد أن يقوده الى الاحتلال . وقد يمتري ثمار الكاكاو فيحطبا || يكاثف بظهور الحزاز وينضغ الموز المحفوظ بسائل شيرلان الحلو ٢ ٪ .  
١٧٧١٧ - **زَنْ**  
Dessèchement (F). Drying up (E).  
هو تجفيف المواد العضوية .

١٧٧١٨ - **زَنْ**  
Nervie (F). Nervie (E).  
الزن المنصب الدقيق الذي يجمع بين الانصباب الرئيسية في روش الحشرة . ويعد أيضا زنة . ج زنن وزنات وزنان .

١٧٧١٩ - **زَنْتَاقِيَّة**  
Aiguillon caudal (F). Caudal sting (E).  
زناية المقرب: إبرتها التي تلدغ بها .

١٧٧٢٠ - **زَنْتَاقِيَّات البَحْر \***  
Crinoides (F). Crinoides (E).  
صف حيوانات بحرية من قسم الشوكيات . رتبة وفضائل واجناسها وأنواعها كثيرة العدد . معظمها من متحجرات الاحلاب النارية . المعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم اخصها بحار الأقاليم الحارة والمحذلة الحارة || اجناسها مركبة من قاعدة وساق وتوزيع وطلاب . طليها مستدير الشكل يحمل في نقر الصفحة العليا الثغر والسر . توجعها خاسية اللواس المستطيلة ومنها خاسية جزلة || جميعها في أول عهدا ، مستقرة ثم تتحول بعد ذلك الى حيوانات ثابتة في موطنها أو منتقلة تسرح حيث تشاء || أشهر فصائلها المعاصرة القسطوليات والحمايسات .

١٧٧٢١ - **زَنْتَاقِيَّة مَشَقَرَّة \***  
Empicoris vagabunda (S). Empicoris vagabond (F).  
حشرة قانصة من فصيلة الدروبيات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الجرم ، قصير العنق ، أصفر اللون . خطمها مستدلل الطول . عيناها بارزتان . زناها مستطيلان ، ميلتان . كوسها أصفر اللون يعلو تحطيط طولي ومعرض أصر . حجبها صغيرة مزوانة سمره . بطها وظهورها الى الصفار اللبس . قانتها الامبايتان مجتزأت للفتنص إلا أن المور عادم المنض || تسرح في الثمار . تألف الغابات والساكن الريفية . يكثر ويؤذنها قرب المياه القدرة لانها تفتنص الحشرات التي تعيش في هذه البيئة .

١٧٧٢٢ - **زَنْتَاقِيَّات \***  
Didymospora (S). Didymospora (F).  
عارة فطور مجهرية من فصيلة الطحيات . تتميز بيوئانها الثنائية الخلية . اجناسها سبعة : الباقوع ، البسلورة ، البوليتريسيوم ، التمل ، الزغاف ، الكردانة والمبارة .

١٧٧٢٣ - **زَنْتَاق**  
Tige florale (F). Stem (E).  
عضو نباتي خشبي أو لني أو عشي منتصب الارتكاز مستطيل يحمل الزنار .

١٧٧٢٤ - **زَنْتَاقَة**  
ذبابة صغيرة تكون في الحشوش . ج زنابير (السان) .

## ١٢٧٣٩ - زَيْتُ أَحْمَر \* ، زَيْتُ مَرْتَاغُون

Lilium martagon (S). Lis martagon, Martagon (F). Martagon-lily, Turkish-cap lily (E). Martagonlilie, Turkenbundlilie (D). Giglio martagone, Martagone, Turbante (I).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ الى ١٣٠ سم. ساقه اسطوانية قوية مقببة بالاجر. اوراقه اسطوانية النصل ضمية التجميع، كثيرة المروق || ازهاره كريمة الرائحة كثيرة العدد تطول من ٣ الى ٨ سم، لونها ال الاحمر البنفسجية المابقة يملوها تنميش جوي. متاكها تبلغ ١٥ م. م. ملها اجر || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

## ١٢٧٤٠ - زَيْتُ إفريقية هو القمر ، اطليه .

## ١٢٧٤١ - زَيْتُ الْأُبْرَاجِ

هو البرجية ، من الزنابق ، اطليا .

## ١٢٧٤٢ - زَيْتُ الْأَسْتَاةِ ، زَيْتُ خَلْفَلِقُوْتَه

Lilium chalcedonicum (S). Lis de Constantinople (F). نوع من الزئبق يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقه زيا . اوراقه كثيرة العدد صغيرة القد ثلاثية وخامسة المروق. ازهاره عادمة المروق قليلة العدد ، من ٢ الى ٦ ، لونها ارجواني تطلو من الداخل رقطة خراء || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

## ١٢٧٤٣ - زَيْتُ الْأَنْدِ

Lilium andinum (S). Lis des Andes (F). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية دقيقة. اوراقه خلية تطول من ٣ الى ٦ سم. وتمرض من ٢ الى ٥ م. || ازهاره قليلة المروق والعدد تطول من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة. متاكها تبلغ ١٢ م. م. ملها جوي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

## ١٢٧٤٤ - زَيْتُ الْبَيْتَرِ هو الزيجيل من الزنابق ، اطليه .

## ١٢٧٤٥ - زَيْتُ الْفَيَرُوجِ \* ، ذَقْن الْحِيَةِ

الفَيَرُوجِي (S). Ophiopogon japonicus (S). Ophiopogon japonais, Muguet du Japon, Herbe aux turquoises (F). Japanese snake's beard (E). Japanische schlangentbart (D). Erba della turchine (I). نوع من ذقن الحية الزيجيل. اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصلها جميل الخضر تقطعه خطوط بيض وسفر. شرعاه الزهري يملو من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صغيرة القد ليلكية اللون تطول نحو ٧ م. || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران. تجار عنبة الشكل فيروزية اللون تقوم من تموز الى كانون.

## ١٢٧٤٦ - زَيْتُ الْتَهَارِ

الطلب نكه .

## ١٢٧٤٧ - زَيْتُ الْوَادِي

هي اللوزة من الزنابق ، اطليا .

## ١٢٧٤٨ - زَيْتُ الْيَابَانِ

Lilium japonicum (S). Lis du Japon (F). Japanese lily (E). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه نحيلة اسطوانية. اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتمرض نحو ٢ عروق ثلاثة او خمسة || ازهاره عطرية

يقع سمر تملو النصل على صفحته العليا بمقابلها على الصفحة السفلى يقع خلية رمادية اللون || ازهاره زهيدة قليلة الاذى لا تستوجب المكافحة .

## ١٢٧٣٢ - زَيَاةُ الْقُطْنِ \*

Cercospora gossypii (S).

فطر مجهري يركب اوراق القطن ، مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم توشم النصل على صفحته العليا || ازهاره زهيدة لا تستوجب العناية .

## ١٢٧٣٣ - زَيَاةُ شَاعِنَةِ \*

Cercospora herpotrichoides (S). Champignon X (F).

فطر مجهري يقال ان اتحاده مع الصوجان يقع اشد الاذى في بعض الزروع منها الحطلة والشعر || مظهره الخارجي يقع لا قياسية تكثر فيها الاسطالة تركب اغداد المصفت ثم مقد السلاحيات فتؤدي الارواق والسوق وقد تملب الزرع وتوليه || يكافح مكافحة الصوجان .

## ١٢٧٣٤ - زَيْتَانِ

هو الصيدن من الذباب الساع ، اطليه .

## ١٢٧٣٥ - زَيْتَانِ \*

جنس حيوان من فصيلة الحفشيات . انواعه قليلة العدد . رؤوسها مخروطية ، فراطيسها مقطوبة . آذانها متوسطة القد منفصلة . السنبا واجنبحتها مستطيلة . اجسامها ريشية طولا يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ م. م. بسطها من ٣٢٠ الى ٤٠٠ م. واذاها من ٥٠ الى ٦٠ م. لونها بين الكهية والسمرة || موطنها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية وافريقية الشرقية والشمالية || طيراتها خفيفة سريع يشبه طيران الخفاف . تميش ازواجاً او جماعات قليلة العدد . تألف المغاور والكهوف واوراق الصخور والبيوت الخربة . قوتها الحشرات والمولم .

## ١٢٧٣٦ - زَيْتَانِ

الزنابق : بقلة حارة حريقة مصدعة . عن ابي حنيفة .

## ١٢٧٣٧ - زَيْتُ

Lilium (S). Lis (F). Lily (E). Lilie (D). Giglio (I).

جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزئبقيات . سوقها وحيدة مستقيمة موزقة . اوراقها القرصية والسوقية رجمية النصل مستطيلة . ازهارها هامي الازنكار عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة الحجم ، جميلة الشكل ، فواحة المروق ، متعددة الالوان || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

## ١٢٧٣٨ - زَيْتُ ابْيَض \* ، أَرَاذِ

Lilium candidum (S). Lis candide, Lis blanc, Bâton de St Joseph (F). White lily, Bourbon-lily, Madonna-lily (E). Weisse lilie, Marienlilie (D). Giglio bianco, G. della madona (I).

ويعرف باسم زئبق مار يوسف. نوع من الزئبق يملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٩ سم. || ازهاره عديدة ، فواحة المروق ، تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الابيض يملو توشح اجر وورقة قرمزية . متاكها تبلغ ١٢ م. م. ملها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.



زَيَاةُ شَاعِنَةِ



زَيْتُ ابْيَض



زَيْتُ احمر



زَيْتُ الْفَيَرُوجِ

الشكل كثيرة طول من ٦ إلى ١٢ سم. وتعرض من ١٢ إلى ٢٥ سم. || ازهارها عطرية ، قليلة العدد ، مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والوردي والاراجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٢٧٥٧ - زَيْتِي زَنْجَبِيلِي

هو الفندوسولي نبات جميل الزهر ، اطليه .



زيتي انمر

١٢٧٥٨ - زَيْتِي صِينِي \*  
Lilium sinicum (S).  
Lis de Chine (F). Chinese lily (E).

نوع من الزئبق يعلو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساقه اسطوانية الشكل ، حراء اللون ، زيا . اوراقه كثيرة العدد تطول من ٥ إلى ١٠ سم. وتعرض من ٨ إلى ١٢ سم. || ازهاره عديمة البرف قليلة العدد لونها ال اصفار الكبريتي يعلو تنبش اسود . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلمها عايق الصغار || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٩ - زَيْتِي طَرَابُلسِي هو الزئبق ، اطليه .



زيتي بيري

١٢٧٦٠ - زَيْتِي طَوِيل الزَّهَر \*  
Lilium longiflorum (S). Lis à longues fleurs (F).  
White trumpet-lily (E). Königsstille (D). Giglio lungo (I).

نوع من الزئبق يعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه اسطوانية قوية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٨ إلى ١٥ سم. ازهاره عطرية العرف تطول من ١٢ إلى ١٨ سم. لونها ال ابيض الثلجي . متاكها تبلغ ٢ سم. طلمها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٢٧٦١ - زَيْتِي عَشَكِي

هي الخلزة من الرنجات ، اطليه .



زيتي صيني

١٢٧٦٢ - زَيْتِي خَيم  
Lilium speciosum (S).  
Lis brillant (F).

نوع من الزئبق يعلو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها ال ابيض المشع بالاحمر الخمر . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلمها اخر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٢٧٦٣ - زَيْتِي قَلْبِي الْوَرَق

Lilium cordifolium (S). Lis cordé, L. cordiforme (F).  
نوع من الزئبق ينشئ الازرة الكلسية . يعلو من ٩٠ إلى ١٥٠ سم. اوراقه معتقة مستعرضة قليلة الشكل نصلها جميل الخضار الزاوي تملو ماجة قرمزية || ازهاره بوقية الشكل ، عفوية التجميع تطول من ١٠ إلى ١٦ سم. لونها ال ابيض الاغبر تملو نمشة قرمزية من الداخل وخضراء من الخارج . متاكها تبلغ ٢ سم. طلمها اخر . ازهاره يدوم طولا شهر تموز .



زيتي طويل الزهر

### ١٢٧٦٤ - زَيْتِي كَرُولِيَّة

Lilium carolinianum (S). Lis de la Caroline (F).

نوع من الزئبق يرغب في الازرة الرملية . يعلو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. اوراقه اهليجية الشكل نصلها مالن البشرة عايق الخضار || عدد ازهاره يراوح من ١ إلى ٢٣ ، لونها ال اصفار البرتقالي || ازهاره صيفي .

العرف ، افقية الازنكار تطول من ١٠ إلى ١٨ سم. باطنها ابيض ، ظاهرها وردي . متاكها تطول نحو ٢ سم. طلمها اخر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

### ١٢٧٤٩ - زَيْتِي أَنْمَر \* ، زَيْتِي مَرْقَط

Lilium pardalinum (S). Lis panthère (F). Leopard-lily (E). Tigerlilie (D). Giglio pardo (I).

نوع من الزئبق يعلو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة تطول من ١٠ إلى ١٨ سم. وتعرض من ٢٥ إلى ٥٠ سم. || ازهاره كثيرة العدد عديمة البرف تطول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها ال البرتقالي الزاوي تملو رقطة قرمزية كرقطة النمر . اسديتها مستطيلة . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلمها جهوري || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٥٠ - زَيْتِي بَيْرِي \*

Lilium eigrinum (S).  
Lis tigré (F). Striped-lily (E).

نوع من الزئبق يعلو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه جهورية اللون زيا البهاء . اوراقه متعاقبة متباعدة ، خماسية او سباعية المروق . تطول من ٧ إلى ١٥ سم. وتعرض من ١٥ إلى ١٥ سم. || ازهاره عديمة الازمة كثيرة العدد تطول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها ال البرتقالي العايق يعلو تحطيط جهوري اسفح الموج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٥١ - زَيْتِي بَرَوْنِي

Lilium browni (S).  
Lis de Brown (F).

نوع من الزئبق يعلو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه متعاقبة تطول من ١٢ إلى ١٧ سم. نصلها عايق الخضار يعلو موج اخر || ازهاره عديدة متدلية تطول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها ال ابيض الثلجي تملو رقطة خطية الاطار بنفسجية المحور . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلمها جهوري || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٢ - زَيْتِي بُرْتَقَالِي

Lilium croceum (S).  
Lis orangé, Lis safrané (F).

نوع من الزئبق ينشئ الازرة الكلسية . يعلو من ٥٠ إلى ١٢٥ سم. ساقه خددة زيا . اوراقه متعاقبة مستطيلة . ازهاره عديمة البرف كثيرة العدد تطول من ٧ إلى ١٢ سم. لونها ال الصغار البرتقالي . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلمها اخر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٢٧٥٣ - زَيْتِي بَرُونِي

هو البرجية من الزنايق ، اطليه .

١٢٧٥٤ - زَيْتِي بَهِي \*  
Lilium superbum (S).  
Lis superbe (F).

نوع من الزئبق يرغب في المواق الرملية . يعلو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه سنائية النصل ، مدنية || ازهاره كثيرة العدد عديمة البرف لونها ال البرتقالي تملو نمشة جهورية || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٥ - زَيْتِي خَلْعَدُونُهُ هو زئبق الاسنانة ، اطليه .

١٢٧٥٦ - زَيْتِي رَشِيقي  
Lilium elegans (S).  
Lis élégant, L. de Thunberg (F).

نوع من الزئبق غرويه كثيرة العدد تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. سوقها مستدلة الشاة غددة . اوراقها اهليجية



زَيْبُور جَرْمَانِي



زَيْبُور شَائِع



زَيْبُور صَغِير



زَيْبُور كَهِير



زَيْبُور مَاعَاتَا

## ١٢٧٧٣ - زَيْبُونِيَات

Liliaceae (S).

Liliacées (F). Liliaceae (E).

فصيلة نباتية من وحدات الشلفة اجناسها وانواعها كثيرة العدد منها الزنبق والبصل والثوم والهليون الخ .

## ١٢٧٧٤ - زَيْبُونِيَّة

هي الدحداح ، اطبله .

## ١٢٧٧٥ - زَيْبُول ، زَيْبُول

Pénis des insectes (F). Penis of insecta (E).

الزنبول قضيب ذكور الحشرات على اختلاف فصائلها .

## ١٢٧٧٦ - زَيْبُول

هو الزنب ، اطبله .

## ١٢٧٧٧ - زَيْبُور

الزيبور : ه شجرة عظيمة في طول الدالية ولا عرض لها . ورقها مثل ورق الجوز في منظره وريحه . ولها نور مثل نور العشر ابيض مشرب ولها حل مثل الزيتون سواء . فاذا نضج اشدت سواده وحلا جدا يأكله الناس كالزبيب ولها عصمة كعصمة النيران وهي تصبغ الفم كما يصبغه الفرصاد . تدرس غرسا . واحداها زنبورة وزنبارة وزنبورة (السان) .

## ١٢٧٧٨ - زَيْبُور

جنس حشرات من فصيلة الزيبوريات . انواعها عديدة جميعها جارسا ، بادنة ومفترسة . اعرفها واشهرها ما يتبع .

## ١٢٧٧٩ - زَيْبُور جَرْمَانِي \*

*Vespa germanica* (S). *Guêpe germanique* (F). *German wasp* (E). *Deutsche waspe* (D).

نوع من الزيبور الواسع الانتشار . ذكره يطول من ١٣ الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ٩ الى ١٤ سم . يقم غشاه في التربة ، يبنيه بالمواد الخشبية المنحلة التي تبدو كالورق الى الصغار الذهبي يطول الى ١٠٠٠٠٠ سم . قوته البار والحووم وما يقتنصه من حشرات .

## ١٢٧٨٠ - زَيْبُور شَائِع \*

*Vespa vulgaris* (S). *Guêpe commune* (F). *Common wasp* (E). *Gemeine waspe* (D).

نوع من الزيبور البادن ، الجارس ، الصغير القد ، الميم الانتشار، ذكره يطول من ١٤ الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ١٠ الى ١٥ سم . يقم غشاه في التربة وعلى الاشجار والحيطان يبنيه بالمواد الخشبية المنحلة . ثوله يد اقل من مئة . لسته مؤلة .

## ١٢٧٨١ - زَيْبُور شَرَقِي

*Vespa orientalis* (S). *Guêpe orientale* (F).

ويدعى الزيبور الاجر . نوع من الزيبور الشائع في الشرق الاوسط . ذكره يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . انتاه من ٢٥ الى ٣٢ وعاملته من ١٦ الى ٢٠ . ثوله الى الحرة الصفراء . رأسه وبوشته اشد سمرة من بطة . اجسته نارية . يقم غشاه في اي مكان كان . وهو مفترس ، بادن وجارس ، يقتنص النحل ويقربس البار السكرية عند ادراكها اخضعها المنب والتين والبسر .

## ١٢٧٨٢ - زَيْبُور صَغِير \*

*Polistes gallicus* (S). *Poliste*, *Guêpe française* (F).

نوع من الزيبور الصغير القد . ذكره يطول من ١٣ الى

## ١٢٧٨٥ - زَيْبُونِي كَتْدَا

*Lilium canadense* (S). *Lis du Canada* (F). *Canadian lily* (E).

نوع من الزنبق يربغ في الاربة المتوسطة الانساج والرطوبة . يطول من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقه قوية . اوراقه قليلة العدد نصلها جامد التسنج ، خلي الصفحة السفلى ، خامي او سباعي العروق . يطول من ٧ الى ١٠ سم . ويعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . || ازهاره متدلية قليلة العروق . لونها ال الوردي تملوه نمشة قريزية . متناكها تطول نحو ١٠ سم . طلمها احمر . ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

## ١٢٧٦٦ - زَيْبُونِي مُدْهَب

*Lilium auratum* (S). *Lis doré du Japon* (F).

نوع من الزنبق يطول من ٦٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية جامدة . اوراقه متعاقبة متبادلة تطول من ١٥ الى ٢٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || ازهاره عطرية العروق كثيرة العدد تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . لونها الى البياض الماسي يطولها من الداخل تنمش ارجواني وخط شارط ذهبي اللون يقسم البتلة الى قسمين . متناكها تبلغ ٢ سم . طلمها احمر || شروبه وهماجه عديدة تختلف بالولها التي يكثر فيها او يقل الاصفر الذهبي . ازهاره يستمر طوال الصيف .

## ١٢٧٦٧ - زَيْبُونِي مَرْتَعُون

ويكتب مرتاغون . هو الزنبق الاحمر ، اطبله .

## ١٢٧٦٨ - زَيْبُونِي مَرْقَط

هو الزنبق الاغمر ، اطبله .

## ١٢٧٦٩ - زَيْبُونِي مَلَكِي

*Lilium regale* (S). *Lis royal* (F).

نوع من الزنبق يطول من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه خفيفة اللحاء ، عادمة الاوراق حتى الزايم الثاني || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطول نحو ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون يطول وتوشع وردى . باطنها الى الصغار الذهبي يطول موج اسع . متناكها تبلغ ١٥ سم . طلمها ذهبي اللون . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

## ١٢٧٧٠ - زَيْبُونِي هَنْتَرِي

*Lilium henryi* (S). *Lis de Henry* (F).

نوع من الزنبق يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه قوية زباه . اوراقه معقة تطول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٣ عروقها عديدة نصلها خلي الصفحة السفلى || ازهاره عديدة تطول من ٦ الى ٩ سم . لونها الى البنفسجي تملوه نمشة سوداء . متناكها تبلغ ٨ سم . طلمها اصفر || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

## ١٢٧٧١ - زَيْبُونِي وَاشَنْطُون

*Lilium washingtonianum* (S). *Lis de Washington* (F).

نوع من الزنبق يطول من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية جامدة . اوراقه السفلى غسية التسنج . سداسية العدد او اكثر . اما العليا فتعاقبة || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطول من ٤ الى ٨ سم . لونها الى البياض الموشع بالقرمزي . متناكها تبلغ ١٢ سم . طلمها اصفر . شروبه عديدة منها الوردي والابيض والقرمزي السابق . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

## ١٢٧٧٢ - زَيْبُونِي

نمت وصني يطلق على ما هو شبيه بالزنبق كفوك يياض زنبقي .






زَنَةُ الْبَن



زَنَةُ الثَّرِيْتُون



زَنَةُ الْفَوْدَر



زَنَةُ الصُّوْبَا



زَنَةُ الْفَوْدَل

مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل مبعثرة أو كثيفة التجميع ، قطرها براوح من ٦ إلى ١٠ م. لونها زيتوني ، محورها أبيض ، اطرافها اسمر ، تركب النصل فتؤذيها وتغطب النجار وتضيقها || يكافح باستعمال سائل يورود أو بعض الفوطير المرتكزة على المركبات الصبائية .

#### ١٢٧٩١ - زَنَةُ الْجَنْجُنَل \* *Cercospora cantuariensis* (S).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق الجنبجل || مظهره الخارجي يقع مستديرة رمادية اللون ، جوية الاطار تركب النصل على صفحته العليا يقابلها على السفلى يقع خلية، حنطية، زائجة المواج || اغزاره زعيدة لا تستوجب المكافحة .

#### ١٢٧٩٢ - زَنَةُ الثَّرِيْتُون \* *Cercospora cladosporioides* (S).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق الثريتون || مظهره الخارجي يقع فسيحة مهمة الحدود مملوءة اللون ، يضاء المواج تسبب ذبول الأوراق وإعياها .

#### ١٢٧٩٣ - زَنَةُ الْفَوْدَر \* *Cercospora beticola* (S). Cercosporiose de la betterave (F). Leaf spot of beet (E).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق الشندر في المواقع الرطبة . مظهره الخارجي يقع كثيرة العدد ، لا قياسية الشكل والحجم ، مبعثرة على صفحة النصل ، لونها الى السمرة يطوقها حنار اخر . تقضي على البشرة فتفجرها ثم تنمطها يشاح خلل التركيب ففي اللون يسير بها الى الذبول . اغزاره قد تكون باهتة لانه يؤثر على نسبة المواد السكرية . يكافح باستعمال اكيلكوريد النحاس عيار ٥٠٪ على الشكل الآتي :

١٣ جزوا اكيلكوريد النحاس .

١٢ جزوا دقيق .

٧٥ جزوا تلك .

يستعمل تغغيراً على النبات بمعدل ٤ كيلو دلم الواحد .

#### ١٢٧٩٤ - زَنَةُ الصُّوْبَا \* *Cercospora fabae*, C. personata (S).

فطر مجهرى يركب أوراق الصوبا فيطها ويؤذي النبات . مظهره الخارجي يقع صغرية كثيرة العدد لونها الى الجفوة تركب النصل فتفجر نحو ربع مساحته || يكافح بتطهير البذار وباستعمال أحد الفوطير الحديثة المرتكزة على المركبات الصبائية .

#### ١٢٧٩٥ - زَنَةُ الْفَوْدَل \* *Cercospora fabae*, C. personata (S).

فطر مجهرى يتطفل على سوق وأوراق الفول || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل قطرها براوح من ٢ الى ٧ م. تركب الأوراق والسوق . يتركب بمراء اللون تضيقها حالات متتابعة دقيقة الحنار لونها الى الصفرة . تقضي على الأوراق وتذبل النبات || يكافح بتطهير البذار بمحلول الفورولين وينضخ النباتات الموصومة بسائل يورود المحلول من ٦٪ الى ٨٪ .

#### ١٢٧٩٦ - زَنَةُ الْقَرْنِيَّات \* *Cercospora zebrina*

فطر مجهرى يتطفل على أوراق سيق بعض القرنيات يقع مستديرة أو بيضية الشكل ، لونها الى السمرة ملغوا حالات متتابعة صفر الحنار تلوح بالنسج المنحارة وتسي الى النبات ونمو .

١٦ م. انتاه من ١٥ الى ١٧ وعاملته من ١٠ الى ١٤ . ثوبه اسود اللون يملو تبيج اصفر . خشاء صغرى القد ، قرصي الشكل ، يقبسه على الجنبات والاخبار البقلة يركزه على دعامة وسيدة قصيرة . قوله لا يعد اكثر من ٥٠ قوة الال السكرية والديندان وبعض الحشرات والمم .

#### ١٢٧٩٣ - زُبُور كَبِير \* *Vespa crabro* (S). Frelon, Guepe frelon (F). Hornet (E).

نوع من الزبور ، كبير القد واسع الانتشار . ذكره يطول من ٢١ الى ٢٧ م. انتاه من ٢٦ الى ٥٥ وعاملته من ١٨ الى ٢٥ م. رأسه اصهب اللون . جوشته الى السواد الموشع بالسمرة . زبانا وارجله حر . خشاء لاصق قرصي يقبسه في اي مكان كان . قوله لا قياسي العدد لكنه لا يقل عن ٥٠٠ ولا يفوق ١٠٠٠ || وهو من التناير البقعة الفخرسة البائدة الجارسة يسلم الانسان ان ضايقه ولسعته مؤلمة مؤذية .

#### ١٢٧٩٤ - زُبُورِيَّات \* *Vespidae* (S). *Vespidés* (F). *Wespen*, *Faltenwespen*, *Papierwespen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها عديدة مظهرها من الحشرات الاشرائية النظام الجامعي المشوي . فيها الذكر والانثى والعائلة الخنثى . تبني اعشاشها من الارواق والالياف الخشبية المنسوجة فتقيها في التربة وعلى الحيطان وبين ثخايل الصخور وفي تجاريف الاشجار وطليا || جميعها مفترسة بأذنة وجارية .

#### ١٢٧٩٥ - زُبُورِيَّات \* *Premne*

جنس نباتات طبية معمرة من فصيلة الساجيات انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والمتسلقات منهاها المناطق الحارة والاسطوانية . اوراقها متعقة متقايلة قليلة أو رحيمة النصل . اغزارها علفية التجميع تاجية . جنوبها طيبة مقوية .

#### ١٢٧٩٧ - زَنَةُ \* صفة الزراعة المروية قليلاً .

#### ١٢٧٩٨ - زَنَةُ \* *Cercospora*

جنس فطور مجهرية من الريدياتيات وفصيلة الطحيات . جربه الكندية مستطيلة الشكل ، سمراء اللون ، ضمية الانتشاب ، قوسية الارتكاز . كئله مستطيلة قاعدية أو جانبية الانتشاب ، مؤفورة كثيرة الاقسام اللغمية العدد || انواعه عديدة ، اغرها واشهرها ما يتبع .

#### ١٢٧٩٩ - زَنَةُ الْبَطَاطَا \* *Cercospora concors* (S). *Cercosporiose de la pomme de terre* (F). *Leaf spot of potato* (E).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق البطاطا || مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٤ م. لونها الى السمرة تملؤها نقط سود تركب الأوراق على صفحتيها فتؤذيها وتوقع بالانتاج خسائر براوح قدرها من ٢ الى ٢٥ ٪ . يكافح باستعمال الفوطير المرتكزة على الكاربوت والنحاس .

#### ١٢٧٩٠ - زَنَةُ الْبَن \* *Cercospora coffeicola* (S). *Maladie des yeux bruns du caféier* (F).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق البن فيؤذيها ويشوه النجار .

تراكيب بعض التوابل والمستحضرات الصحية الشرقية . ويستخرج منها شرابات شائعة الاستعمال .

١٢٨٠٧ - زَنْجَبِيل مِيْمُونَا *Zingiber mioga* (S). *Gingembre mioga* (F).

نوع من الزنجبيل يُزرع لثزين . يعلو نحو ١٠٠ سم . أوراقه سنانية كبيرة القد . سبلته الزهرية كثيفة التجميع . أزهاره بيض شريفاتها صفر || هذه اليابان وهو من النباتات البرية التي تعيش ويتجدد في كل تربة وموقع ومكان .

١٢٨٠٨ - زَنْجَبِيلِيَّات *Zingiberaceae* (S). *Zingibéracées* (F). *Zingiberaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقة الواحدة || اجناسها وأنواعها عديدة جميعها جذمورية مهدها المناطق الاسيوية الحارة || اشهرها الزنجبيل والخلنجان والكرّم والحال والزرباد .

١٢٨٠٩ - زَنْجُفَر \* هو الزريقون ، اطليه .

١٢٨١٠ - زَنْجُجُور \* ، سَمَك الْكَرَاكِي *Esox* (S). *Esöce, Brochet* (F). *Pike* (E).

جنس اسماك نهريّة من فصيلة الزنجوريّات. انواعه هـ جميعها نهمة . مستطيلة الشكل ، واسعة الشدق ، دقيقة الخطم المفلطح ، حادة الاسنان القوية . طوله يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ سم . وزنها من ٥ الى ٢٥ كيلو . انثواها الى البردة الرصاصية تتفق مع اقترابها من تبج الظهر . جوانبها مجزعة بالايض . يطغونها الى الصهبة . لحما عادي او دون الوسط .

١٢٨١١ - زَنْجُجُورِيَّات *Esocidae* (S). *Esocidés* (F). *Esocidae* (E).

فصيلة اسماك نهريّة من فصيلة الحناتان . اجناسها وأنواعها عديدة معظمها من اسماك المناطق الباردة . جميعها نهمة مستطيلة الاجسام ، مفلطحة الرؤوس والانخام ، قوية الاسنان الحادة || اشهر اجناسها الزنجبور .

١٢٨١٢ - زَنْد

زندت البقرة والناقة زندأ : اخبرجت رحها عند الولادة .

١٢٨١٣ - زَنْد ، زَنْدَة *Rachis* (F). *Stalk* (E).

محور السبلة والحمرية والمثقو والارواق المركبة وغيرها .

١٢٨١٤ - زَنْد الْعَبْدَ هو الكارلين الشائع ، اطليه .

١٢٨١٥ - زَنْدَيْسَل ، زَنْدَقِيل *Elephant (grand)* (F). *Elephant (great)* (E).

الفيل الكبير الجنت .

١٢٨١٦ - زَنْدَل \* *Cistudo* (S). *Cistude* (F).

جنس حيوانات زحافة مفترسة من السلاحف وفصيلة الحسميات . تعيش في المياه العذبة . تألف البحيرات والانهر والمناقع || تتميز بان حافة ذيلها لا تحكم الطوق على الجسم . قوتها الحشرات والرخويات والاسماك الصغيرة والضفادع || لها نومان فقط الزندل الاربع والزندل الحمر .

١٢٨١٧ - زَنْدَل أَرْدَغ \* *Cistudo lutaria* (S). *Cistude boueuse* (F).

نوع من الزندل . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا . تألف المناقع وضفاف الانهر والبحيرات || جسمها يطول

١٢٧٩٧ - زَنْدَة الْكَرْمَةِ \* *Cercospora vitis* (S).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على اوراق الكرمة . مظهره الخارجي يقع مستديرة حنطية اللون قطرها يراوح من ٢ الى ١٠ م . تركب النصل على صفحتيه || اضراره لا تمتد الى الوراق ولا تستوجب المكافحة الخاصة .

١٢٧٩٨ - زَنْدَة الْكِشْمِش \* *Cercospora marginalis* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكشمش . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مقرنة الزوايا ، سمراء اللون ثم رادية تركب النصل دون ان تؤذي .

١٢٧٩٩ - زَنْدَة الْلُور \* *Cercospora circumsissa* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق اللوز والخوخ والدراقن . مظهره الخارجي يقع صفرة مستديرة سمراء اللون تطرح بالتسج المنحارة قشيب يساهم وانحطتها || اضراره قليلة . ينشط في المناطق الساحلية التي يشهها الضباب .

١٢٨٠٠ - زَنْدَة الْوَرْد \* *Cercospora rosicola* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الوردة . مظهره الخارجي يقع مستديرة طلاء اللون تركب النصل على احدى صفحتيه اضراره لا تمتد الى التشويه .

١٢٨٠١ - زَنْشَارِي *Dysenterie* (F). *Dysentery* (E).

مرض معد خبيث عوارضه قرط انغلاق البطن . سببه قضيقات او تفاخات .

١٢٨٠٢ - زَنْجَار ، زَنْجَار *Verdet* (F). *Verdigris* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف اسبنة النحاس الخضراء اللون . محاليله تستعمل في مداواة ومكافحة بعض الامراض الفطرية .

١٢٨٠٣ - زَنْجَبِيل *Zingiber* (S). *Gingembre* (F). *Ginger* (E).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنجيبليات . انواعه عديدة منها البرية والعلبية والزراعية . جذاميرها قرنية الشكل عتداء . سوقها موقرة تشبه سوق القنا . اوراقها حاضرة متعاقبة سنانية النصل . ازهارها سبلية التجميع حامية الارتكاز يحملها اشراخ لبي التركيب حشوي الوراق || اشهر انواعه ما يلي .

١٢٨٠٤ - زَنْجَبِيل الْكَلَاب هو لفل الماء ، اطليه .

١٢٨٠٥ - زَنْجَبِيل شَامِي هو الراسن ، اطليه .

١٢٨٠٦ - زَنْجَبِيل مَخْرُوتِي \*

*Zingiber officinale, Amomum zingiber* (S). *Gingembre officinal, Amome des Indes* (F). *Indian ginger, Common ginger* (E). *Gingiber, Ingwer* (D). *Zenzero, Zenzero, Pepe zenzero* (I).

نوع من الزنجبيل يُزرع لاستعماله الطبي والصناعي . يعلو نحو ١٥٠ سم . أوراقه سنانية متعاقبة النصل . سبلته الزهرية لينة . ازهاره صفر يتلونها وتتقالبه مشقة بالايض || جذاميره عطرية العرف ، لازمة الطعم ، تحوي زيت طيارة ومواد نشوية وغروية مختلفة . وهي مقوية للقلب ، مبرقة ، تنشط الباه وتذكى . تفيد من الارياح وعسر الهضم وتمنع المغص كما انها تدخل



زَنَّة الْكَرْمَةِ



زَنْجَبِيل غُرْفِي



زَنْجُور



زَنْدَل أَرْدَغ

الاشجار الحرجية واعصها الصنوبريات || اشهر انواع زنيخة اللاريس .

### \* زَنْيَخَةُ اللاريس \*

*Dasyscypha willkommii*, *Trichoscypha* wil. (S).  
Chancr du mûleze, C. du pin sylvestre (F). Cancer of larch (E). Lärchenkrebs (D).



زنيخة اللاريس

فطر مجهرى يركب افئاد واغصان اللاريس فيعطها ويلونها . مظهره الخارجى لطحه قرحية مردنية الشكل طويلا يراوح من ١٥ الى ٤٠ سم . تركب القشرة فتصلها وتشققتها وتؤدي القسم الذي يعلوها فتدبل اوراقه وتسقط . وهو يقبل ذات الشبه في الصنوبر البري || يكافح بتفريد الاشجار الكثيفة لان المناعة ترتكز على النمو الذي يحول دون انتشار هذا الرص .

١٢٨٢٩ - زَنْيَخَةُ هو الرجلة او السويق .

### ١٢٨٣٠ - زَنْيَخَةُ *Pucciniastrum*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يشتمل بدعائمه الجولية الوثيرة ، المستطيلة ، الخفيفة النشاء ، الشفعية الانقسام ، الثنائية او الرباعية الاخيش . انواعه قليلة واضرارها كذلك ، يتطفل على اعداب التنوب ويركب النصل على صفحته السفلى فيسي الى سير النمو الطبيعي دون ان يقود الى العطب .

### ١٢٨٣١ - زَنْيَخَةُ *Cercosporina*

جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الفصليات . جريه الكثيدية سمراء اللون ، اسطوانية الشكل ، قرصية لطيفة ، كئنه مستطيلة ، طرفية او جانبية الانقسام ، مؤنورة ، شفعية الانقسام . انواعه عديدة قليلة الاذى معظمها اريكية او صينية المله .

### ١٢٨٣٢ - زَهَاد *Permiable* (F). *Permeable* (E).

ارض زعاد : لا تليل الا من مطر كثير .

### ١٢٨٣٣ - زَهَار *Fleuriste* (F). *Florist* (E).

من تماثل بستنة الازهار او بينها .

### ١٢٨٣٤ - زَهْدَم \* *Falco eleonora* (S).

*Falcon éléonore* (F).  
مطار من الكونج وفصيلة الصقريات . صغير الجثة طوله نحو ٣٧ سم . ابر الصدر والبطن ابر الطور والسفلى غثيف الجناح والظل قوته الجناح والظلال على اختلاف انواعها . وهو من القوارع محبوب كامل بلاد حوض البحر المتوسط . يأنف بجاري الماء والشلوط البحرية .



زهدم

### ١٢٨٣٥ - زَهْر التَنَج *Zénobie* (F).

شجرة تريينية تدعى زنديك ، اطلبه .

### ١٢٨٣٦ - زَهْر العَرَبَر *Zénobie* (F).

هو الزرهون ، اطلبه .

### ١٢٨٣٧ - زَهْر العَضَاه *Zénobie* (F).

هو اليبسة ، اطلبه .

### ١٢٨٣٨ - زَهْر الكِيرِت *Flour de soufre* (F).

*Flowers of sulphur* (E).  
مسحوق الكيريت الناعم يستعمل في الزراعة لمكانة بعض الامراض الفطرية اعصها الازهداد .

نحو ٣٠ سم . ذيلها بيضي الشكل ، معتدل الاحدياب . ثوبها الى السمرة المنطقه والشجيرة بالاصفر . رأسها معتدل الجرم . ذنبها قليل الشفاعة ، دقيق الطرف ، يطول نحو ٥ سم . || لحماها كاعن الصف مأكول في بعض بلاد ادوية .

### ١٢٨١٨ - زَنْدَلُك مُعْرَم \* *Cistudo dentata* (S). *Cistude dentelée* (F).

نوع من الزندل . موطنها بعض مناطق الهند والبلاد المجاورة . تألف المناطق والاوراق والحبيرات || جسمها يطول نحو ٢٧ سم . ذيلها بيضي الشكل ، معتدل الاحدياب مخرم الحافة . ثوبها الى الخضار الاسمر يملوه تنقيط اثير واصفر . رأسها معتدل الجرم . ذنبها متوسط الشفاعة ، مستعرض الطرف يطول نحو ٤ سم . || لحماها كاعن الصف ، مأكول من بعض القبائل .

### ١٢٨١٩ - زَنْدِيَاَت العَيُون *Podophthalmes* (F). *Podophthalma* (E).

رتبة من القشريات ليات الصدف تشمل عدة فصائل جميعها ثلاث مراتب : مشقوقات الارجل ومزدوجات الارجل وعشاريات الارجل .

### ١٢٨٢٠ - زَنْزَلُخَت *Podophthalmes* (F).

هي الازدوغ ، اطلبه .

### ١٢٨٢١ - زَنْشِيل *Zannichellia* (S).

*Zannichellie* (F).  
جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة عرائس الماء . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تنبت في المناطق وفي اوضاع مجاري الماء || اوراقها شمعية ، ثلاثية ، نصالها غروطية الشكل . ازهارها محورية الانقسام ، وحيدة الشق || اعرف انواعه الزنشيل المناعي (*Z. palustris*).

### ١٢٨٢٢ - زَنْطِين ، زَنْطَرَجِين *Xanthéine*, *Xanthogène* (F).

مادة واثنين مبلولة في معظم الازهار ، لوها الى الصفار الاخضر ، لا تبلور ولا تزال مجهولة التركيب .

### ١٢٨٢٣ - زَنْك *Xanthéine*, *Xanthogène* (F).

هو الخاصمين ، اطلبه .

### ١٢٨٢٤ - زَنْكَمَة *Xanthéine*, *Xanthogène* (F).

هي الاذنة ، اطلبه .

### ١٢٨٢٥ - زَنْكَمَة *Xanthéine*, *Xanthogène* (F).

الشجرة لا ورق لها كاهنا رنة الشاة (السان) .

### ١٢٨٢٦ - زَنْكُوبَا ، زَنْكُوبِيَا *Zenobia* (S).

*Zénobie* (F).  
جنية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحليجات تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها عرونة متعاقبة بيضية الشكل تصلها جلدي السج عايق الخضار || ازهارها جليجية الشكل ، بيضاء اللون ، مقرنة المآبر الرباعية التركيب || ازهارها يشتمل من سزيران الى ايلول .

### ١٢٨٢٧ - زَنْيَخَةُ *Dasyscypha*

جنس فطور مجهرية من الزهفيات وفصيلة الحشاريات يتميز بصدائه الصغيرة القرصية المحلية . تكاته غروطية بوه ثنائي التركيب ، مدني الشكل ، شفاف ، يتري

- ١٢٨٥٩ - زَهْرَةُ السَّمَاءِ الْجَمِيلَةِ راجع جوليانه .
- ١٢٨٦٠ - زَهْرَةُ الشِّتَاءِ اطلب كيونتس .
- ١٢٨٦١ - زَهْرَةُ الشَّمْسِ في المداين ، اطلبه .
- ١٢٨٦٢ - زَهْرَةُ الْعَصَلِ في الصلية ، اطلبه .
- ١٢٨٦٣ - زَهْرَةُ الْعُطَاسِ في الأرنكة ، اطلبه .
- ١٢٨٦٤ - زَهْرَةُ الْعَيْنِ في الترانسيوم .
- ١٢٨٦٥ - زَهْرَةُ الْعَتَكَبُوتِ في القم ، اطلبه .
- ١٢٨٦٦ - زَهْرَةُ الْغَمْدِ في النجد ، اطلبه .
- ١٢٨٦٧ - زَهْرَةُ اللَّيْلِ في النيكمة من الترجيبات ، اطلبه .
- ١٢٨٦٨ - زَهْرَةُ الْمَرْجَانِ في الكندية ، اطلبه .
- ١٢٨٦٩ - زَهْرَةُ الْمُشْتَرَى في لخيس المشتري ، اطلبه .
- ١٢٨٧٠ - زَهْرَةُ شَعْرِيَّةِ في الغشاء الثربانية .
- ١٢٨٧١ - زَهْرَةُ مَائِيَرِ في الابيجة ، اطلبه .
- ١٢٨٧٢ - زَهْرَةُ مَحْبُوبَةِ في الفدر اطلبه .
- ١٢٨٧٣ - زَهْرِيَّ (Floriforme (F). Floriform (E).  
نمت وصي يطلق عل ما هو شكله كالزهر .
- ١٢٨٧٤ - زَهْرِيَّاتِ Helotiaceae (S).  
Helotiaceae (F). Helotiaceae (E).  
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الرقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز ببدانها الحمية القديمة او القرصية الشكل القائمة على ونية جلدية الرول .  
يوضعها مختلف الاشكال والترتيب يكثر فيه الانتظام الشفهي من الثنائي الى الثلاثي || لها جنسان مؤنثان الزنيعة والخن .
- ١٢٨٧٥ - زُهْمٌ ، زُهْمَةٌ ، سَنَحٌ ، قَتَمٌ ، قَمَةٌ ، نَمَسٌ Rance, Rancissement (F).  
Rancid, Rancidity (E).  
فساد المواد الدهنية عل اختلافها . سببه التأكسد وما يترافقه من فعل الجراثيم . فتتأخذ رائحة قوية مسبجة وطعم حريف كره .
- ١٢٨٧٦ - زُهْمٌ Animaux non ruminants (F).  
Nó ruminant animals (E).  
الزهم ما لا يجتر من الحيوان .
- ١٢٨٧٧ - زُهَيْرِ Polyanthe (F). Polyanthous (E).  
كثير الازهار .
- ١٢٨٧٨ - زُهَيْرَةٌ Fleuron (F). Floret (E).  
زهرة صغيرة ابتدائية يتألف منها قرص الرويس في ازهار فصيلة المركبات .
- ١٢٨٧٩ - زُهَيْرَةٌ Florule, Floscule (F).  
في الزهرة الصغيرة . وكل زهرة من ازهار السبلبة تدعى زهرة .

- ١٢٨٣٩ - زَهْرُ الْكَسَائِينِ  
هو النجيلات نبات عشبي زينة ، اطلبه .
- ١٢٨٤٠ - زَهْرُ الدُّوَلُوْهِ هو البليس ، اطلبه .
- ١٢٨٤١ - زَهْرُ الْمَسِيحِ هو السك ، اطلبه .
- ١٢٨٤٢ - زَهْرُ النَّسِيمِ ، زَهْرُ الْحَوَاِ  
هو الايرتس ، اطلبه .
- ١٢٨٤٣ - زَهْرُ مَرَمِمْ هو اقنطرم البنفسجي ، اطلبه .
- ١٢٨٤٤ - زَهْرَا  
الزهر : البقرة الوحشية . والثور الوحشي : أضر .
- ١٢٨٤٥ - زُهْرَةٌ ، زَهْرَا Venus (E). Vénus (F).  
كوكب سيار ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي . يعتبر ألمع الكواكب المعروفة . يبعد عن الشمس نحو ١٠٨ ملايين كيلومتر ، وهو بذلك يكون اقرب اليها من الارض .  
ظهوره من الشرق عند الفجر يعطيه لقب نجمة الصبح . وظهوره عند الغروب يعطيه لقب نجمة الليل ونجمة الرباعي .  
سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ١٢٤٩٢٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٢٥ يوماً || المنجمون يدعون الزهرة السعد الاصفر لانها في الساعدة دن المشتري واصافوا اليها الطرب والسرور والفر والالفة والشبق .
- ١٢٨٤٦ - زَهْرَةٌ Fleur (F). Flower (E).  
الزهرة هي البصير النباتي المختص بالتناسل لحفظ الكيان . تنشأ الزهرة من برعم وتتألف من تحت يحوق به سوار خارجي يعرف بالكأس وسوار داخلي يعرف بالتويج ينتهي بالبتلة ويحمل على انتشاب قاعدته الداخلية مجموعة الاوعية التي تولف الاعضاء الذكورية || اما تحت الذي يحسن الاعضاء الانثوية فيشمل المخر حيث المبيض تملوه اللدقة المكونة من قلم وبمس .
- ١٢٨٤٧ - زَهْرَةُ الْأَلَامِ في الآلام ، اطلبه .
- ١٢٨٤٨ - زَهْرَةُ التُّرْسِ في الاندروزاس ، اطلبه .
- ١٢٨٤٩ - زَهْرَةُ الْقَالُوثِ في بنفسج الثالوث ، اطلبه .
- ١٢٨٥٠ - زَهْرَةُ الْفَلَجِ  
في النيكمة من الترجيبات ، اطلبه .
- ١٢٨٥١ - زَهْرَةُ الْجَرَبِ في السكايبوزا ، اطلبه .
- ١٢٨٥٢ - زَهْرَةُ الْجَنَّةِ  
اطلب زنف الملوك شجرة تربيتية جميلة الازهار .
- ١٢٨٥٣ - زَهْرَةُ الْحَجَرِ في جوز جنهم ، راجعه .
- ١٢٨٥٤ - زَهْرَةُ الدَّمِ في الصقلاب المنسى ، اطلبه .
- ١٢٨٥٥ - زَهْرَةُ الرَّيِّحِ في الزفدة ، اطلبه .
- ١٢٨٥٦ - زَهْرَةُ الرِّمَالِ في الارنايه ، اطلبه .
- ١٢٨٥٧ - زَهْرَةُ السَّاعَةِ اطلب آلامية زرقاء .
- ١٢٨٥٨ - زَهْرَةُ السَّلْحَفَاةِ في الخليون نبات زينة .



زوان ايطالي



زوان معمر



زوحن



زودع زاهر

12894 - زَوْجَلَّة ٥ Zooglee (F). Zoogloea (E).  
ركام من البكتيريا تجمعها مادة غروية في اشكال مختلفة تبدو كالحطاط المتكاثف في السوائل وكجموعه من النقط والكتل في الجلود .

12895 - زَوْحَم ٥ Piézomètre (F).  
Piezometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس انضغاط السوائل .

12896 - زَوْحَمَة ٥ Piézométrie (F).  
Piezometry (E).  
علم يبحث في انضغاط السوائل .

12897 - زَوْحَمِيَّة ٥ Piézométrique (F).  
Piezometric (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالزوحمة .

12898 - زَوْحَن ٥ Clerus (S).  
Cléride (F). Clerus (E).

جنس حشرات غفسيه من فصيلة الزوسنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٥ منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الباردة . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اوتابها غشقة الالوان المبهجة والبضحة || مسرحها نهاري . قوتها رقيق ازهار الفصيلة الخبيثة || يرقاتها مقترنة تميش تحت لحاء الاشجار المقطوعة اليابسة || اشهر انواعه زوسن النحل المعروف ايضاً بوق النحل .

12899 - زَوْحَن النحل ٥ Cléride des abeilles (F).  
حشرة تدعى بوق النحل ، اطلبها .

12900 - زَوْحَنِيَّات ٥ Cleridae (S). Cléridés (F).  
Cleridae, Checkered beetles (E). Bunkäfer (D).  
فصيلة حشرات من لينات الفند ورتبة عديمات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٧٠٠ يجمعها ٣٢ جنساً || اجسامها مستطيلة ، نحيلة . لوانها زائفة جميلة . كواسلها صغيرة . قروتها الاستثنائية صولطانية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة || اعطائها تشمل معظم اصقاع العالم واخصها المنطاق الحارة والمشددة الحرارة || يرقاتها مقترنة تقف على معظم يرقات الحشرات الخائبة || اشهر اجناسها الزوسن والرقود والقلوس والماشوق والتكروبة .

12901 - زَوْدَع زَاهِر ٥ Anthicus floralis (S).  
Anthicus floralis (E).

حشرة وائمة غاشلة دامتة من فصيلة الزودعيات ورتبة مفصادات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد الممتدة الحرارة من الشرق الادنى واروپة . تألف البراري والمواقع الغلة . غنافسها تمش على رقيق الازهار وبتلاتها . يرقاتها تمش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السرة القاتمة باستثناء الكوتيل ويقدد الظهران فانها الى الصعبة يطولها مزاج صناعي في الذكر . رأسها شبه مستدير الجرم . زباناتها غشيطان . عيناها صغيرتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع . غداها قليلتا التنزير . ارسافها الانحرافية والوسطى خاسية الغفل . رسغاها الخلفيان رباعيا المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في النهار

12880 - زُهِيرِيَّة Flosculeuse (F).  
Floscular, Flosculus (E).  
هي الزهرة المركبة من عدة زعيرات .

12881 - زَوَائِين Oliviera, Olivette (F).  
Olive-plantation (E).  
هي بستان الزيتون او كرم الزيتون .

12882 - زَوَاحِف Reptiles  
هي الزسافات ، ارجعها .

12883 - زَوَّار الهِنْد هو الخطاف ، اطلبه .

12884 - زَوَّالِغِر Assises (F). Basis (E).  
حجارة المساق الاتي الاول من البناء .

12885 - زَوَّال Extinction  
هو انقضاء المدة القانونية .

12886 - زَوَّال الإلتِزَامَات Extinction des obligations (F). Extinction of obligations (E).

هو انقضاء الملة القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى احد الاسباب المتصوص عليها قانوناً وهي : التفتية والاراءة والقسامة والتقدم والفسخ والابدال واتحاد الملة .

12887 - زَوَّال اليَد ، زَوَّال الحَيَاكَة Dépossession (F). Dispossession (E).  
هو عدم التصرف بالعين الذي كان وضع اليد يميزه .

12888 - زَوَّان ، زَوَّان Lollum (S).  
Ivraie (F). Darnel (E).

جنس نباتات عشبية حولية وبحولة ومعمره من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها عسقية النصل . ازهارها سنبلية . منها البرية التي تلتب في المروج والحروث ومنها الزراعية المعروضة واليخضورية || اشهر انواعه ما يلي .

12889 - زَوَّان إِيْطَالِي \* Lollum italicum (S).  
Ray-grass d'Italie (F). Italian darnel, l. ray-grass (E).  
نبات عشبي يحول قابل الاحتشاش يزرع في المروج والمراعي والمخاضر .

12890 - زَوَّان حَقْلِي Lollum arvense (S).  
Ivraie des champs (F).  
نوع من الزوان البري يثبت في الحقول والحروث . كثرته مؤذية لانها تقصر بالزروع .

12891 - زَوَّان مُسْكِر اطلب دقة .

12892 - زَوَّان مُعَمَّر \* زَوَّان إِيْكَلِيزِي ، نَسِيلَة Lollum perenne (S). Ivraie vivace, Ray-grass anglais, Gazon anglais (F). Ray-grass, Ryegrass, Red darnel, Lawn-grass (E). Raygrass, Dauerhalm, Englisches raygrass (D). Lollo perenne, Lollo vivace, Lajessa (I).  
نبات عشبي معمر يعضوي يعضوي معمر قابل الاحتشاش زراعه منتشرة في معظم البلاد .

12893 - زَوَّابَع هو التدغ ، اطلبه .

بيضاض اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || ثوبورها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٠٦ - زُودَعَات \* Scaphopodes (F).

Scaphopoda (E). الزودقيات فئة من الرغويات وحيدة الفصيلة والجنس . أنواعها نحو ٣٥٠ أشهرها الناتئة .

١٢٩٠٧ - زُودَقِي الياسمين \* ، زُودَقِي كَمَيْلَه

Limenitis camilla (S). Sylvain azuré, Petit Sylvain (F). White admiral Butterfly (E).

حشرة متراكبة الألوان الجميلة من فصيلة الزودقيات ورثة حشرغيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاذن وأوروبية . فراشتها جارية قوتها رشيقة الازهار . سرقتها تعيش على الحانيات والياسمينات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ مم . بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم . رأسها مستد الجرم . عيناها كيرتات . زباناها موشطتان . جوشنها وبطنها الى النبي الاسود المواج || ورشها متراكبة الاسوان والزخارف والتزييق فيها الاسود والازرق والاطحل والاكلس والاشفق والابيض || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بستة اسابيع وتتحسب الممكن لطحاً مستطيلة على نصال اوراق النبات المائل || السرعة تطول نحو ٣٥ مم . ثوبها الى الخضار البصري يملو غداك جانباين وريداين . قشايها مبهر الحلب الدقيق . رأسها اسود . رواجبها الصدرية صفراء اللون اما البطنية خضراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متأسكة النسيج .

١٢٩٠٨ - زُودَم

خشبة عريضة يمر بها تراب الارض المرتفعة الى الارض المنخفضة .

١٢٩٠٩ - زُودَمِيَّة

Zozimia (S). Zozimie (F). Zozimia (E).

جنس اشعاب برية بحولة أو معمرة من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتبها بعض المناطق الحارة من الشرق الاذن || سوقها مستضخنة فراء ، منها الزغبية اللهاء ومنها الغائية . جذورها غليظة ، مغزلية الشكل . اوراقها متعاقبة ، ريشية ، لاقاسية التفريش . ازهارها صيرلي التجميع . ازهارها بياض اللون . أشهر أنواعها : زوديمية افسنتية الورق (Z. abcinthifolia) .

١٢٩١٠ - زُودَعَة

هي القملة من البليخ ونوعه . يقال زعت له زودة من البليخ . ج . زودع .

١٢٩١١ - زُودَعَات \*

Adelomycetates, Fungi Imperfecti (F). Adelomycetes (E).

رثة فطور مجهرية عديدة المراتب والفصائل والاجناس والانواع . معظمها من الفطور اللاقياسية التطور . تكاثرها عديد الاشكال ، نواتقها الفرونية التي كانت من صفاتها المميزة ، تسير الآن بركاب العلم الحديث الذي قضى على ما كان يكتنفها من غموض || مراتبها اربع وهي الرففانيات والصنبايات والمجفانيات والسينيات . اما فصائلها فتسع وهي الدلايات والرففانيات والصنبايات والكتنات والكحيبيات والطحيات والمناتيات واهلكيات والوطحيات .

وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسموري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل اذار حيث تدخل في طور الاكمال فتتحول الى حورية ونها الى خنفاء . جسمها عند تمام نموها يطول نحو ٧ مم . ثوبها الى البياض الاخير . رأسها الى السرة السوداء . وهي سداسية الرواجب ، مستطقة الطرف الدلق .

١٢٩٠٢ - زُودَع مَتر \*

Anthus quisquilius (S). Anthicus insignifant (F). Anthicus quisquilius (E).

حشرة مبذولة واثمة خاضعة دامت من فصيلة الزودقيات ورثة نمعدات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم . تألف البراري والمواقع الدفلة وضايف مجاري الماء . خنفسها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة والصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد ، خلي القشاق ، يطول من ٣ الى ٤ مم . ثوبها الى السرة الكستنية يطولها في ظهرها زناران صنباين . رأسها برصي الشكل يملو قرن قاذب يمتد حتى طرف الحلق . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيات . غدها متباعدة التحزيز ، كتيفا الحلق . ارسافها الامامية والوسطى خاسية العق . رسفاها الخلفيان رباعيا العق . غالبها صغيرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجبلانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسموري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل شهر اذار حيث تتحول الى حورية . جسمها عند تمام نموها يطول نحو ٧ مم . وهو اسطواني الشكل ، مستطال المقدم ، مستقد المؤخر ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصفرة الدنسة . رأسها كستني اللون || طور الاكمال الذي يتم عادة تحت الجفالة والذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طليقا من كل غلاف .



زودع متر

١٢٩٠٢ - زُودَعَات \*

Anthicidae (S). Anthicidae (F). Anthicidae (E).

فصيلة حشرات واثمة خاضعة دامت من رثة غديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف الاشعاب والنباتات الجنية والمواقع الرملية وضايف المجاري المائية والمناقع والاهوار || اجسامها صغيرة القد ، خنفسرة الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، مستطيلة الزباني الخيطية المركبة من ١١ فصلة . ارساغ جبرامها خاسية العق باستثناء الزوج الخلفي فانه رباعي العق || يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || أشهر اجناسها الزودع والنفسوس .

١٢٩٠٤ - زُودَر

Poitrail, Thorax (F).

Breast, Chest, Thorax (E).

هو وسط الصدر وقيل ما ارتفع منه الى الكتفين او ملتقى اطراف عظام الصدر حيث اجتمعت .

١٢٩٠٥ - زُودَرَاء \*

Plagianthus (S). Plagianthe (F). Plagianthus (E).

مجيرة برية وقزيبينة من فصيلة الجبابريات . ساقها فراء تملو من ٣ الى ٦ امتار . اناحها واثانها متعنبية . اوراقها عابلة متعاقبة ، منعقة ، تطول من ٥ الى ١٠ سم . نصالها مرطاة سننة الحمار ، حيلة الخضار الزاهي . ازهارها خضية التجميع ، محورية الازتكاز ، مستطيلة المالحق ، متدلية ،



زودق الياسمين

متوسطة العدد، منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها شبه صيوانية الشكل، متساوية المصاريع، ثلاثية الاسنان الرئيسية. اصداؤها مألوفة أو متتابعة التحيز، اللطيف، اطرافها مسننة الخمار. مثاعها ثنائية، طليقة، مهدبة الاطراف || تعيش منتعنة في الرمال المغمورة بالماء قرب الشواطئ ومصبات الانهر || لحوبها مأكولة، جيدة الصنف.

1٢٩١٢ - زَوْغُونِيَّة \* Zoogonie (F).

Zoogony (E). الزووغونية علم يبحث في تطور الحيوان. راجع مثانة.

1٢٩١٣ - زَوْغِيَّاتُ Pédipalpes (F). Pedipalp (E). رتبة من العنكبوتيات تتميز باستطالة الزوج الاول من ارجلها فيبدو كزبان الخمرات.

1٢٩٢١ - زَوْهَرِيَّاتُ Veneridae (S). Vénéridés (F). Venerida (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم معديات الارجل || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اصداؤها شبه قلنسوية الشكل، متساوية المصاريع، ثلاثية الاسنان الرئيسية. مثاعها ثنائية، انبوية، طليقة، معتدلة الطول، مهدبة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها الزوبر والشوب والتزعة.

1٢٩٢٢ - زَوْهَمِيَّاتُ Protohémiptères (F).

رتبة حشرات منقرضة من طبقة الغاكايت. احاطيها تعود الى الحقبة الخامسة والاخيرة من الاباج الاول، المعروفة ايضاً بالحقبة البرمية || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف تصنيفات الاجنحة وقد تبين فيما بعد ان الالتواء المقدّر ينقصه الكثير من الادلة الراجعة.

1٢٩٢٣ - زُوُلُوْجِي Zoologiste, Zoologue (F). Zoologist (E).

مخصص بعلم الحيوانات.

1٢٩٢٤ - زُوُلُوْجِيَّة Zoologie (F). Zoology (E). علم الحيوان وهو فرع من التاريخ الطبيعي يبحث في الحيوان.

1٢٩٢٥ - زُوُلُوْجِيَّة زَرْاعِيَّة Zoologie agricole (F). Agricultural zoology (E).

علم الحيوانات الناجبة اي الزراعية.

1٢٩٢٦ - زُوُولِيْتُ Zoolite (F). Zoolite (E).

الزويليت البقايا المغمورة المتحجرة من كل حيوان. راجع جميعه.

1٢٩٢٧ - زُوُولِيْتُ زَرْعِيَّ Mercure, Hydrargyre (F). Mercury (E).

الزئبق عنصر معدني سائل، وهو المعدن الوحيد السائل يوجد في الطبيعة منفرداً أو متحداً بعناصر اخرى مختلفة التركيب || يرمز (Hg - هـ) وزنه الذري ٢٠٠,٦١ ثقله الذري ١٣٢,٦ لونه فضي. يجمد في ٤٠° مع تحت الصفر، ويغلي في ٣٥٠° مع || مركباته عديدة تستخدم في مختلف الاغراض اخصها الصناعات والبلية.

1٢٩٢٨ - زُوُولِيْتُ مَصْعَدُ Sublimé de mercure

1٢٩٢٩ - زُوُولِيْتُ زَرْعِيَّ زَوْجِيَّة Rugissement (F). Roaring, Roar (E).

صوت الالاسد.

1٢٩٣٠ - زُوُولِيْتُ Ocell (F). Ocellus (E).

الزئبق عين الحشرة او بسيطة او مركبة.



زَوْغَا



زَوْغَا

1٢٩١٤ - زَوْقَا \* حسك، أشنان داود Hyssopus officinalis (S). Hysope officinale (F). Common hyssop (E). Echter ysoop (D). Issopo sacro (I). نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات. ساقه ليغية منتصبه فراءه تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه لاطنة، ساقه، متقابلة. نصلها سناني الشكل بحري الخفسار يطول من ١ الى ٣ سم. ويعرض نحو ٤ سم. صفته بسيطة كثيفة اللند الطرية || ازهاره ضئيلة بحورية زرقاء اللون. اوراقه وازهاره عطرية الرائحة || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول || ومن اسمائه ليسوف وهي لغة عبرانية اما كلمة زَوْغَا فاصلاها الميرغوفي زَوْف. منافعها الطبية عديدة. تنفع ازهاره منه وعاضه. اوراقه ولافاته تنقي من السعال وتقوي المعدة. زيت الطري المسخرج بالتقطير يستعمل في عدة مستحضرات طبية.

1٢٩١٥ - زَوْكُلُ Palpimanés (S). Palpimane (F). Palpimanés (E).

جنس عناكب مفترسة من فصيلة الزوقليات. انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها جميع اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد اسطوانية الشكل مغسورة تطول من ١٢ الى ١٥ م. اثارها الى الحرة الجلوية او القرزية. تتميز باستطالة الزوج الامامي من الجرامز الذي يستعمل لالتقاط الفصص ولا يستعمل للقبض.

1٢٩١٦ - زَوْكَلِيَّاتُ Palpimanidae (S). Palpimanidés (F). Palpimanidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الزوقليات. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ موطنها البلاد الحارة من العالم القديم || جميعها مفترسة، متوسطة القد او صغيرة. تتميز بتجو بطونها من الصفايح البنية التي تفصل المشائن عن بعضها البيض، وبغلاطة جرامزها الامامية التي ترتفعها دوماً ولا تستعملها السير || تخايشها اجار حمودية اللون تخلدتها تحت الحجارة والحزاز والطلمب || اشهر اجناسها الزوقل.

1٢٩١٧ - زَوْكُ Démarche du Corbeau (F).

الزوك: مشية الغرباب. وهو الخطو المتقارب في تحرك جسد الخائي.

1٢٩١٨ - زُوُولِيْتُ Zéolithe (F). Zeolithe (E).

مادة حجرية.

1٢٩١٩ - زُوُولِيْتُ Zonite immaculé (F).

حشرة من فصيلة المللويات تدعى صفورة، اطبا.

1٢٩٢٠ - زَوْوَقَرُ \* Venus (S). Vénus (F). Venus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم معديات الارجل وفصيلة الزوغيريات || انواعه المعروفة

## ١٢٩٣٩ - زَيْت زراعي، زَيْت اَبْنَص

Huile minérale, H. blanche (F). Mineral oil (E).  
يستعمل من تقطير القطران واللطف وهو ما كون فمال  
يستعمل في المكافئة الشتوية .

## ١٢٩٤٠ - زَيْتَه هي خنازيرية الصحراء . اطلبا .

١٢٩٤١ - زَيْتُون \* (F). Oliva europaea (S). Olivier (F).  
Olive tree (E). Echter ölbaum (D). Olivo, Ulivo (I).  
شجرة مثمرة من فصيلة الزيتونيات . أقليمها اقليم حوض  
البحر المتوسط يمتد من فلسطين الى اسبانية ومن مراکش  
الى تونس . ضروبها عديدة جميعها دائمة ، بطيئة النمو ،  
طويلة العمر ، سوقها ضخمة عجرا ، قشورها سنجابية  
مقلعة كاشية . اغصانها غليظة . افنانها مستدقة . اوراقها  
عرو ، صغيرة القد ، معنقة ، متقابلة ، سنانية النصل  
الكامل البسيط الجامد || اغصانها سبيل التجميع ، ابلي  
الارتكاز منبلته تدعى سبله . اغصانها خشوية ، صغيرة  
جلجلية الشكل || ثمارها لحية السود ، خضراء اللون ،  
بيضية او مستطيلة . عظامها خشبية صلبة . بزورها  
لوزية || تتكاثر بالبذر والمقل والغسل والفسلف .  
جميع ضروبها سبروتية تمشي وتثمر في مختلف الازمنة  
لا تخشى سوى المنافع وكثرة الرطوبة . وهي متناوبة الحمل  
زايدة غير انه يحسن تسليها لان التسميد يحول دون بعد  
التناوب بين الحمل والشح .

## ١٢٩٤٢ - زَيْتُون البَر هو اللغفة الزيتونية ، اطلبا .

## ١٢٩٤٣ - زَيْتُون بَرِي هو السّم ، اطلبه .

١٢٩٤٤ - زَيْتُونَة \* Olive  
ثمرة الزيتون تؤكل ويستخرج منها الزيت بالعصر .

١٢٩٤٥ - زَيْتُونِي اللون Olivacé, Olivâtre (F).  
Olivaceous (E).  
نمت وصي يطلق على ما كان لونه كازيتون .

١٢٩٤٦ - زَيْتُونِيَّات Oleaceae (S).  
Oléaceae (F). Oleaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها كثيرة  
العدد تنتمي الى ثلاثة اسباط : الزيتونيه والمرانيصة  
والياسمينية .

١٢٩٤٧ - زَيْتِي Oléifère (F). Oleiferous (E).  
نعت ترمي به يمر عن وجود المادة الزيتية ككوكاك الخروع  
نبات زيتي .

١٢٩٤٨ - زَيْتِي Huileux (F). Oily (E).  
ما كان شكله كازيت .

١٢٩٤٩ - زَيْتِين Oléine (F). Oleine (E).  
احد مركبات الزيوت الدهنية والشعوم الجامة .

١٢٩٥٠ - زَيْج Table astronomique (F).  
Astronomical table (E).

قاعدة حسابية فلكية ترتكز على نتائج دوران بعض  
الاجرام السماوية بموجب ترتيب مسائي خاص يدعى  
البورة . اما الاجرام التي تتألف منها البورة فهي بترتيبها  
المرجع والشمس والزهرة وعطارد والقمر وزحل والمشتري .

١٢٩٣١ - زِيَادَة Accroissement (F). Increase (E).  
هو حق زيادة حصة الارث ليا لو تحمل احد او بعض  
الورثة عن حصتهم .

١٢٩٣٢ - زِيَار Tord-nez, Mouchette (F).  
Twitch, Barnacles (E).  
لاقط خشبي تضغط به بجفلة الفرس فيدل .

١٢٩٣٣ - زِيَّاط هو السنطور قد من فصيلة السيوسيات .

١٢٩٣٤ - زِيَّان Décorateur (F). Decorator (E).  
من تعامل مهنة الزين .

١٢٩٣٥ - زِيَّان Chlamydera (S).  
Chlamydère (F).  
جنس طير من فصيلة الرخيميات . انواعه المعروفة سبعة  
موطنها بلاد استرالية . ملحيها الحيائي زوجي في الربيع  
والصيف ثم جاني . تألف الغابات والادغال . قوتها الثآير  
اغصها الدراق والشمش والتين والموز والبرتقال وبعض  
الزهور وجميع انواع الحشرات || اجسامها معتدلة القد ،  
تعطون من ٢٤ الى ٣٠ سم . اوتها مختلفة الالوان جميعها  
مبقعة ومتوتجة بفتاح قفنية الالتشاب . اناثها عادمة  
الفتاح ، باحة الالوان || من ميزاتها انها تقم بالقرب  
من اعشاشها سارحاً مسقوفة بالقش تزينها بمختلف  
الاشيا الملونة تتوسطها سد من القصبان المبركة تعلقها  
الاناث كلما اشتهت السفاد || اعرف انواعه واشهرها  
الزيان المبرقش .

١٢٩٣٦ - زِيَّان مَبْرَقَش \* Chlamydera maculata (S). Chlamydère tacheté (F).  
نوع من الزيان . موطنه بعض مناطق استرالية . يألف  
الغابات القريبة من الحدائق والعيروان . قوته الثآير والبزور  
والحشرات || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٢٧ سم .  
نوبه اسود الصفحة العليا المبرقة بالاخر والاصفر  
والبرتقالي . صدره وبعده وافيكة الى الفرة يعلوها مواج  
اصفر قفرتة برتقالية اللون . ثوب الاثي ابيض من ثوب  
الذكر واقل وقشة منه || يدشن عشه في الاشجار الرقيقة  
ويقم سرسه حيث يستطع . الاثي تحضن مرتان في  
الحول وتضع في كل مرة من بيضتين الى ثلاث بيضات  
تحرها بمناوبة الذكر .

١٢٩٣٧ - زِيَّانَة ، عَشْبَة هندية Hemidesmus indicus (S). Hémidesme indien,  
Salsepareille de l'Inde (F). Indian sarsaparilla (E).  
Halbadsen, Indische sarsaparilla (D). Salsaparilla  
d'India (I).

جنية عارشة معمرة من فصيلة الصقلابيات . اوراقها  
معنقة قلبية ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، عايق  
السفل . اغصانها عشكوية التجميع ، محورية الارتكاز  
ملوانة || يقال لها لا تحمل من المنافع الطبية . تستعمل  
للزوين .

١٢٩٣٨ - زَيْت Huile (F). Oil (E).  
سائل دهني نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور  
النباتات الزيتية ومن نوحوم الحيتان وغيرها || والزيتون  
تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وناقة . جميعها اقل كثافة  
من الماء ولا تنوب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة  
اغصها الطعام والاضادة وصناعات الصابون والشمع .



زيان مبرقش



زيتون



زيتونة





زيز



زيز البحر



زيز الصّوّير



زيز الغاب



زيز صّوّار



زيزانية



زوب

Cicadatra querula (S). \* زيز صّوّار ١٢٩٥٧

Cigale cirlarde (F). Peevish cicadatra (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات. جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. بسطة تراوح من ٥٥ الى ٦٤ سم. || ثوبها الى الكسني الاسمر تملو زخارف برفقالية في الرأس والكتول. وفي جانبي البطن الصفحة السفلى من بطنها سوداء. رأسها مستعرض ضخم. غطها معتدل الطول. عيناها كيرتان. زباناها صغيران. كولها شبه مربع. اجنتها غشائية شفافة مدبجة بالاسود. قوائمها نشطة مهدبة || تسرح في النهار. تتميز بكثرة صرصرتها. تألف الحراج والحدائق القديمة الانجار.

Lyrystes plebejus (S). \* زيز مبدول ١٢٩٥٨

Cigale commune (F). Common cicada (E).

حشرة صرارة مبدولة من فصيلة الزيزيات. جسمها كسني. مستضخم يطول من ٣١ الى ٣٧ سم. بسطة تراوح من ٨٥ الى ١٠٠ سم. || ثوبها كسني اللون اسفح الموج. الصفحة السفلى من بطنها الى الصهبة غطها حنار اسود يتقلب الى الاصفر عند مؤخر البطن || رأسها مستضخم الجرم يطولو تجتمع ابيض وتبي. غطها مخزفي الشكل. عيناها كيرتان. زباناها صغيران. قديان: كولها مخدوب، اجنتها كيرتان. زباناها صغيران. بطنها شبه مربعي الشكل. اجنتها غشائية شفافة، قليلة الروق، كثيرة الانصباب. قوائمها نشطة، مهدبة || تسرح في النهار. مبدولة في جميع الحراج اما يكثر ويوجد على الصنوبر.

Barbules \* زيزآه ١٢٩٥٩

هي اطراف الريش.

Zizania (S). \* زيزانية ١٢٩٦٠

Zizanie, Riz d'eau (F). Water oats (E). Wasser reis (O). Zizania (I).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة اورانها صفيرة النسل. انهارها متشكلة التجميع. ثمارها حبوب دقيقة مستطيلة مأكولة سكرية الطعم وأوراقها المواد النشوية || أشهر انواعها: الزيزانية العريضة الورق (Zizania latifolia) وهي عشبة مسمرة مأكولة المذاع منبهاً منافع الصين. والزيزانية الكندية (Zizania canadensis) وهي حولية تزود لها المأكول.

Perameles (S). \* زيزوب ١٢٩٦١

Péramèle, Bandicoot (F). Bandicoots (E).

جنس حيوانات جامة لاجه من فصيلة الزيزيات ورتبة الجرابيات || انواعه المروفة خمسة موطنها بلاد استراليا || اجسامها ربعية تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. بما فيه الذنب. رؤوسها اسفينة الشكل، مستقلة الخاطم الدافلة. اذنانها كاسية تطول من ١٠ الى ١٦ سم. || قوتها الديدان والحشرات المختلفة والساقط.

Peramelidae (S). \* زيزوبيات ١٢٩٦٢

Péramélidés (F). Peramelidae (E).

فصيلة حيوانات جامة لاجه من رتبة الجرابيات. اجسامها المروفة اربعة موطنها بلاد استراليا. مرتها الاجراع || اجسامها صغيرة القد، مستقلة الشكل، جسمها لا يتجاوز حجم الارنب. رؤوسها اسفينة مستقلة الخاطم. قوائمها الخلفية اطول من الامامية. نظام تركيب اصابعها

Minium

هو اكسيد الرصاص السليمي. لونه الى حرة القنجر. ثقله النوعي ٤,٦. صلابته من ٢ الى ٢ || يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع عنه الصدأ.

Cicada (S). \* زيز الحصاد ١٢٩٥٢

Cigale (F). Seventeen year locust (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيزيات انواعه عديدة طولها يراوح من ١٦ الى ٤٠ سم. وبسطة من ٤٥ الى ١٠٠ سم. ثوبها مخضلة الالوان يكثر فيها الاسود والاسفر والجلاوي. تميش على بعض الاجراع الحرجية والزراعية اغصنها الصنوبر تتميز باصولها الحادة المستقطعة المزجبة كاتها تقول فيها زيز.

Tibicen haematodes (S). \* زيز آحمر ١٢٩٥٢

Cigale rouge (F). Red cicada (E).

الاسم العلمي يمين « زمار ». حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات ورتبة تنجاسات الاجنحة. جسمها كبير القد، يطول من ٢٨ الى ٣٨ سم. بسطة تراوح من ٧٦ الى ٨٦ سم. || ثوبها الى الصنابي الاحمر الموج. رأسها مستضخم مستعرض يطولو تجتمع اغير واجر واصفر. غطها معتدل الطول. عيناها كيرتان جاسطتان. زباناها قديان، صغيران. كولها مربع الشكل، مجذع بالاغير والاخر والاصفر. حيد بطنها احر. اجنتها غشائية، ملاتظها ويروقها واصحابها عناية اللون. قوائمها صغيرة مهدبة || تسرح في النهار. تألف الحراج والغابات.

Scyllarus latus (S). \* زيز البحر ١٢٩٥٤

Scyllare, Cigale de mer (F). Shrimp (E).

حيوان من القشريات عشاريات الارجل. مبدول في مياه السواحل اللبنانية.

\* زيز الصّوّير ١٢٩٥٥

Cicada orni, Settigia orni (S).

Cigale panachée (F). Orni cicada (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات. جسمها مستضخم الجرم يطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. بسطة تراوح من ٦٨ الى ٧٨ سم. || ثوبها الى البني الاشفق يبق في الرأس والكتول والبطن. رأسها مستضخم تملو زخارف وتزويق. غطها مخزفي الشكل. عيناها كيرتان جاسطتان. زباناها ورشي الشكل عند الذكر، غبيلي عند الانثى. كولها مجي، يبقع بالجلاوي. بطنها اصفر الحيد. اجنتها غشائية تملوها، في الزوج الاسامي، بعض الكت السمر. تسرح في النهار. مرتها الحراج اغصنها الصنوبر.

\* زيز الغاب ١٢٩٥٦

Cicadetta sylvestris (S). Cigale sylvestre (F).

Wood cicadetta (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيزيات. جسمها شبه وشي الشكل، يطول من ١٨ الى ٢٢ سم. بسطة تراوح من ٤٦ الى ٥٤ سم. || ثوبها الى البني الاسمر يطولو تجتمع عتاني في الرأس والكتول. رأسها عريض. غطها معتدل الطول. عيناها كيرتان. زباناها صغيران. كولها شبه مربع. بطنها مخزفي الشكل، عتاني الحيد. اجنتها غشائية، متباينة الروق والاصعب. قوائمها صغيرة، مهدبة || تسرح في النهار. تألف الغابات وانجار ضفاف مجاري الماء.

## ١٢٩٦٨ - زَيْفُون صَغِير الْوَرَق

*Tilia cordata*, *T. parvifolia* (S). *Tilleul à petites feuilles* (F).

نوع من الزيفون التريبي. مهدد اوروبية. شجرته تملو من ٥ الى ٢٥ م. اوراقها قليلة الشكل، صغيرة القد. نصلها عايق الصفحة العليا، اذرق السفلى. ثماره صغيرة الحجم خالية من الانسلح || ازهاره يستمر من حزيران الى عوز.

## ١٢٩٦٩ - زَيْفُون فَصِي، جَيْسُون

*Tilia argentea* (S). *Tilleul argenté* (F).

نوع من الزيفون التريبي مهدد الصين. شجرته تملو من ٢ الى ٨ م. اوراقه صغيرة القد ثلاثية الفصوص نصلها بينة الفصوص. ثماره بيضية الشكل.

## ١٢٩٧٠ - زَيْفُون مَنُغُولِي

*Tilia mongolica* (S). *Tilleul de Mongolie*, *T. à feuilles de vigne* (F).

نوع من الزيفون التريبي مهدد الصين. شجرته تملو من ٢ الى ٨ م. اوراقه صغيرة القد ثلاثية الفصوص نصلها مسن الحافة، مائل البشرة. ثماره خالية من الاصلح. ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

## ١٢٩٧١ - زَيْفُون مَيْشُرُونِي

*Tilia michauxi*, *T. neglecta* (S). *Tilleul négligé* (F).

نوع من الزيفون التريبي. مهدد امريكة الشمالية. شجرته تملو من ٢ الى ٢٥ م. افئافها حر السحاء اوراقها تطلو من ١٠ الى ١٧ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى يصفر عند دخول الخريف || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

## ١٢٩٧٢ - زَيْفُون هُولَنْدِي

*Tilia platyphyllos*, *T. europaea* (S). *Tilleul de Hollande* (F).

نوع من الزيفون التريبي مهدد اوروبية. شجرته تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. افئافها زهاب السحاء. اوراقها تطلو من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اغضر الصفحة العليا، خلي السفل الموشة بالازرق. ثماره اجاسية الشكل، خاسية الفصوص البارزة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

## ١٢٩٧٣ - زَيْفُونِيَّات

*Tiliaceae* (S). *Tiliacées* (F). *Tiliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات. اجناسها وانواعها عديدة منها الاجاثار والشجيرات والجنابات والاعشاب. اوراقها متعاقبة. ازهارها فردية او عقدية والتبصيع وحوري او تاجي الارتكاز. ازهارها غشوية، صغيرة القد، عطرية الرائحة.

## ١٢٩٧٤ - زَيْفُون الْحَقْل

*Lycopsis arvensis* (S). *Lycopside des champs* (F).

نبات عشبي بري معروى من فصيلة الحمحميات. شكله قريب الشبه بالاشوة. يختلف عنها بازهاره المرفقية الانابيب || ساقه متصبية، قليلة الفروع، تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة، لسنة، مزقية النصال. ازهاره طرفي الارتكاز. ازهاره بنفسجية اللون في اول عهدها ثم زرقاء. تنويره يستمر من حزيران الى آب || يعتبر من النباتات المرصوة المسنة والمدررة.

لا يختلف عن القنقر. اجرة انثاء معتدلة الرحابة تلتف ثمانية اطباء وتفتتح من الوراء || اشهر اجناسها الزيزب والكريب.

## ١٢٩٦٣ - زَيْفُون عَنكَبُونِي، زَيْفُون شَقَرِي

*Sisyphus schaefferi* (S).

*Sisyphus acaeniforme* (E).

حشرة نائلة دامت من فصيلة الجعلليات ورؤية مفدمات الاجسمة. تألف الموامق التي يكثر فيها البراز. تمشي على بعر المازع والغنم وعلى السلق والمواد النباتية المنسلح || جسمها صغير القد تطلو من ٦ الى ١٠ م. ثوبها الى السواد الكامد. رأسها مستعرض الشكل. زبائنها دقيقتان. عيناها صغيرتان. ظهرانها ضيق الطرف المقطوم الذي لا يلتصق كامل البطن. ارسافها خاسية المعقل || الذكر اكبر قدماً من الانثى واعيق ثوباً منها واقتصر سريراً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجلانة في اوائل الربيع ويبقى حتى اواخر الصيف. تسمع في النهار. تساف في شهر آب. تنجح المكان في البعر وتطمره في التراب || البقرة عند بلوغها الكمال الجسموري تطلو من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها مستطيل الجسم، ضليع التأثير، قصير الرواجب، حطلي اللسبون، جتوري الرأس || طورو الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة.



زيفون عنكبوني

## ١٢٩٦٤ - زَيْفُون

*Tilia* (S). *Tilleul*, *Tillot* (F). *Linden*, *Lime tree*, *Lime-blossom* (E). *Lindenbaum*, *Linde* (D). *Tiglio* (I).

جنس اشجار حرجية وتريبتية من فصيلة الزيفونيات. انواعه عديدة اوراقها معتقة، متعاقبة، عابلة. ازهارها عطرية، نورية، محورية، خاسية الفصول والبيئات، عديدة الاسدية. اشكالها صناعية. قشورها ليفية تستعمل استعمال القنب. ازهارها واوراقها طيبة مرقة ومضادة للتشنج. تسكن السعال وتفيد الصدر. تهدئ الاعصاب كاللابرين وتفيد في النوم. ويستخرج من بزوها مادة دهنية شائعة الاستعمال الطبي || اشهر انواعه ما يتبع.

## ١٢٩٦٥ - زَيْفُون الشَّرَقِي

هو الخلاف الضيق الورق، اطلبه.

## ١٢٩٦٦ - زَيْفُون امْرِيكي

*Tilia americana*, *T. glabra*, *T. nigra* (S). *Tilleul d'Amérique* (F). *American lime-tree* (E).

نوع من الزيفون التريبي. مهدد امريكة الشمالية. شجرته تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقه تطلو من ٩ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة عايق الخضار، مسن الحافة، مستطيل المتق. ثماره كروية خالية من الانسلح || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زيفون شائع

## ١٢٩٦٧ - زَيْفُون شائع، زَيْفُون مَبْدُول

*Tilia vulgaris* (S). *Tilleul commun* (F). *Common lime-tree*, *C. linden* (E).

نوع من الزيفون التريبي. مهدد اوروبية. شجرته تملو من ١٥ الى ٢٥ م. اوراقه متوسطة الحجم. نصلها مسن الحافة، مدبب المقصة، باهت الخضار. ثماره مستطيلة، خاسية الفصوص البارزة || ازهارها يدوم طوال شهر تموز.



زيفون الحقل

## ١٢٩٧٥ - زَيْزِي \* (F). Zizi (F). Embertzia cirrus (S).

طائر من الجوارث وفصيلة الزرثوريات . موطنه معظم مناطق اروية يجوها في طلب الحشرات والمشي . قوته الحشرات والبرور || جسمه صغير القند يطول نحو ١٦ سم . ثوبه جميل الالوان المتداخلة تكثر فيه الشهية الزرقاء يملؤها تمسح اصفر واخضر ، وتمسح اسود في الرأس والجنح ، وايض والثفح في الصدر والبطن . زوره اسود . محسراه الى الشقة . عيناها مكلحتان بالاسود . منقاره صغير الحجم . ذنبه فارق الطرف .

## ١٢٩٧٦ - زَيْزِيَّات

Cicadidae (S). Cicadidés (F). Cicadidae (E).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تتميز باجنحتها الشفافة . بنواحيها الثلاثية الزئام وباصوات ذكورها الصرصرية . جميعها من حشرات المناطق الحارة والمنتحلة . حشرات الكاملة تعيش من ٦ الى ٨ اسابيع قوتها اللسغ الذي تخصص من افان مختلف الاشجار || انثاها تمتع نحو ٤٠ مكنة في لحم الاضغان والافناد اليابسة فتتغذى عن رقات تعيش في التربة نحو اربعة اعوام على جلور مختلف الانسحاب والنباتات .

## ١٢٩٧٧ - زَيْزِيَّات \* (F). Sisyridae (E). Sisyridés (F). Sisyridae (S).

فصيلة حشرات من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفوقة قليلة العدد ، نحو ٣٠ ، منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والمنتشرة نحو الباردة . تألف صفاف مجاري الماء . انثاها تمتع الممكن على النباتات المائية || اجسامها صغيرة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ الى ١٦ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها جاحظة . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . اجنحتها شبه متساوية بين الزوجين . كواسلها قصيرة . بطونها اهليلجية الشكل . انثاها قصيرة المراتز || يرقاتها مائية ، مفترسة || لشهر اجناسها الزيزيرة .

## ١٢٩٧٨ - زَيْزِفُورَا (F). Ziziphora (F). Ziziphora (S). Ziziphora (D). Zizifora (I).

جنس نباتات طيبة ، برية وحولية من فصيلة الشفويات التريجات . انواعها ٨ جميعها برية منها العشبية للمادة والتجسية والجنسية . اوراقها مقابلة ، كاملة ، سنانية زغبية . ازهارها محورية وتاجية .

## ١٢٩٧٩ - زَيْظَة (F). Ziziphora (S). Ziziphora (D). Zizifora (I).

جنس نباتات طيبة ، برية وحولية من فصيلة الشفويات التريجات . انواعها ٨ جميعها برية منها العشبية للمادة والتجسية والجنسية . اوراقها مقابلة ، كاملة ، سنانية زغبية . ازهارها محورية وتاجية .

## ١٢٩٨١ - زَيْظُوط \* (F). Ixia (S). Ixie (F). Corn illy (E). Klebschwertel (D). Issia (I).

جنس نباتات بسيلة من فصيلة السوسليات انواعه المعروفة ٢٥ جميعها تريضية وصناعية . اوراقها قرصية الالتفاف مستطيلة ، نصلها ضيق الصفحة الجامدة المنتصبة . شجارتها الزهرية تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها سليل او علقى التجميع . ازهارها جملة الشكل والالوان الزاهية . يستخرج من نصلها عصارة لزجة صناعية || اشهر انواعه التريضية ما يتبع .

## ١٢٩٨٢ - زَيْظُوطُ أَصْفَر (S). Ixia viridiflora (S).

نوع من الزيزوط شراخه يعلو نحو ٣٠ سم . سبلته قصيرة . ازهاره كبيرة القند لونها الى الاخضر تتوسطها بقعة سوداء . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٣ - زَيْظُوطُ أَصْفَر (S). Ixia lutea (S).

نوع من الزيزوط شراخه يعلو نحو ٣٠ سم . سبلته وحيدة . ازهاره كبيرة القند ، فواحة العرف المسحب ، صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٢٩٨٤ - زَيْظُوطُ بَيْهِي (S). Ixia speciosa (S).

نوع من الزيزوط شراخه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . سبلته تطول نحو ١٥ سم . تحمل من ٦ الى ٧ ازهار كبيرة القند حراء اللون || ازهاره من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٥ - زَيْظُوطُ عَدَاقِي (S). Ixia paniculata (S).

نوع من الزيزوط شراخه يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . ازهاره عذقية التجميع ، كبيرة القند ، مستطيلة الانبوب ، لونها الى الالبيض المشع بالاحمر . بقعها الوسطى سود . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

## ١٢٩٨٦ - زَيْظُوطُ مِسْبَال (S). Ixia polystachya (S).

نوع من الزيزوط شراخه يعلو ٢٠ سم . يحمل ٣ سبلات ازهارها كثيفة التجميع قطرها نحو ٢ سم . لونها الى الالبيض الناصع . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٧ - زَيْظُوطُ مُطْلَخ (S). Ixia maculata (S).

نوع من الزيزوط شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . سبلته قصيرة . ازهاره كثيفة التجميع لونها الى البرتقالي المشع بالالبيض والمطلخ بالاحمر . بقعها الوسطى زرقاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٨ - زَيْفَان (F). Deviation (E). Dénation (F).

الزيفان والزيف هو التغير الطارئ على الاتجاه الطبيعي مما كان سببه .

## ١٢٩٨٩ - زَيْفَم (F). Eau salée, saumâtre (F).

يقال للين المالحه عين زيفم ويقال للين العذبة عين زيفم .

## ١٢٩٩٠ - زَيْفَاء \* (F). Daphniphyllum (S).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة الفربيونيات . مهدها بعض اصقاع الشرق الاقصى . ساقها تنمو نحو ١٥ م . اوراقها سنانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٨ سم . وتعرض من ٥ الى ٧ سم . نصلها جلدية ، خضر الصفحات العليا ، طحل السفلى . ازهارها ثنائية المسكن ، صغيرة الحجم ، عتقودية التجميع ، محورية الارتكاز . الذكرية منها عديدة الفصول والاسدية . اما الانثوية فتلاية المياسم . ثمارها لحمية زيتونية الشكل والحجم تحوي عجة واحدة صغيرة .



زيزي



زيزوط

## ١٢٩٩٨ - زِينَتَابَة فِصْبَة \* Ablette (F).

Small bleak (E).  
سمكة نهريّة صغيرة القد فضية اللون تطول من ١٢ الى ١٥ سم. حراشفها لؤلؤية المادة، صناعية، تدعى عطر الشرق وروح الشرق. تستعمل في صناعة اللؤلؤ الكاذبة.

## ١٢٩٩٩ - زِينَتَب \* ، زَكْبَل ، مِسْك رُصِي ،

Polianthes tuberosa (S). زَنْبَق طرابلسي

Tubéreuse, T. des jardins (F). Garden tuberosa (E).

Echte tuberosa (D). Tuberosa (I).

الواحدة زينة. نبات عشبي بصلي حسبي معمر من فصيلة النرجسيات. أوراقه غيقة مستطيلة مخددة النصل. شراخه الأزهي سائي الشكل، موزق، يطول من ٧٠ الى ١٥٠ سم. ازهاره سنبل التجميع. ازهاره مستطيلة، جميلة، بيضاء اللون، فواحة العرف الذي يستخرج من ازهاره بالتقطيع عطر فائز تمين. ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين.

١٣٠٠٠ - زِينَة هي اصيليا كسوس، اطلبها.

## ١٣٠٠١ - زِينِيَة \* Zinnia (S).

Zinnia (F). Youth and oldage (E). Zinnien,

Schmuckzinnie (D). Zinnia, Fiori stellini (I).

جنس نباتات من فصيلة المركبات معقودة التبريف على اسم الطبيب البوتاني «زين» انواعها وفرونها كثيرة العدد جميعها عشبية حولية تزيينية مهدها المكسيك.

سوقها فراء تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها حاشنة

مقابلة جميلة الخضر. ازهارها رؤيضية، فردية، تاجية

الارتكاز، عديدة الالوان السوية او الموشحة.

وهي من النباتات السبروتية المبذلة في جميع الحدائق،

ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف.

## ١٢٩٩٩ - زِينَتَات ٥ Chromosporiées

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات. اجناسها ثلاثة : الأفيوكلاديموم ، الميسليوفتوز والميكروسترويه .

## ١٢٩٩٢ - زَيْلَع الزيلع : ضرب من الودع صغار .

## ١٢٩٩٣ - زَيْلُوز ، كَيْلُوز ، خَشْبُوز Xylose

مادة سكرية تستخرج من قصب الذرء الصغراء وقش الحنطة ونخشب الزان ونبات الطوفيل الخ .

## ١٢٩٩٤ - زَيْمَك Zymase

خيرة غيبيائية تحول غروب السكر الى كحول وغاز كربوني .

## ١٢٩٩٥ - زَيْمُولُوجِيَة ٥ Zymologie (F).

Zymology (E).

الزيمولوجية علم التخفير او الاختيار .

## ١٢٩٩٦ - زَيْنَاب Zinebe

فالمطور زراعي شديد الوق لا يؤذي النبات يرتكز على مادة كرميات الزنك يستعمل في مكافحة الامراض الفطرية اغصها الملبدير .

## ١٢٩٩٧ - زِينَتَابَة ، سَمَكَة بِيضَاء Salmo (S). Able, Poisson blanc (F). Bleak (E).

جنس اسماك نهريّة من فصيلة الشبوطيات . انواعه عديدة

موطنها بحيرات واهر الشرق الاذنى واروبة . جميعها

صغيرة القد دقيقة || اعرف انواعه واشهرها الزينة

الغصية .



زينة فضية



زنب



زينة

# س



ساج

١٣٠٠٨ - سَاكِرَة ، وَكَيْمَة Lamelle (F).

رأية صغيرة من الزجاجة متناهية في الدقة تستعمل لتغطية القطاعة المطلوب فحصها تحت المجهر .  
Lamella (E).

١٣٠٠٩ - سَاج \* ، دَلْب هِنْدِي Tectona (S).  
Teck, Tek' (F). Teak-tree, East Indian oak (E).  
Teakbaum, Indische eiche (D). Tek (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الساجيات . انواعه ثلاثة جميعها اشجار ضخمة دائمة وعظيمة . اوراقها منعقة ، متقابلة، رحيمة الشكل . نصلها خلي البشرة، بارز العروق والشرائين . ازهارها عنقودي التجميع ، منتصب الجلوس، تاجي الارزكاز . ازهارها خشوية عطرية ، بتلاتها بيض . ثمارها لينة كروية مأكولة . اغصانها شديدة الصلابة . رقتها كثيفة القذرات المرصاة التي تحول دون الانفصال بالموامل الخارجية . تستعمل خاصة في صناعة السفن .

١٣٠١٠ - سَاجُو Sajou

هو السوسن قرد من فصيلة السوسيات .

١٣٠١١ - سَاجُول ، سَوَجَل ، سَوَجَلَة Clisse (F). Wicker (E).

غلاف القارورة يحبك عادة بالقضبان الدقيقة او بقدد القصب .

١٣٠١٢ - سَاجُوم Mouillat (F). Wetting (E).

كل سائل شديد اللزوجة والاصفر يضاف الى الادوية الزراعية ليؤدي انتشارا والتصاقا .

١٣٠١٣ - سَاجِيَّات Verbenaceae (S).

Verbenacées (F). Verbenaceae (E).

وتعرف أيضاً برعي الحام . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة . اجناسها وانواعها كثيرة

١٣٠١٢ - سَايَمِي Septennal (F). Septennial (E).  
هو ما يدوم سبع سنوات او ما يعاد كل سبع سنوات .

١٣٠١٣ - سَايِق Gagnant (F). Winner (E).  
اول خيل الحلبة وهي عشرة عند العرب اولها السابق المعروف بالهلي ثم للفيل ثم المثل ثم التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الحظي ثم المؤمل ثم الطيم ثم السكيت .

١٣٠١٤ - سَايِنْدِيَّات ، سَيِنْدِيَّات ، صَايُونِيَّات Sapindaceae (S). Sapindacées (F). Sapindaceae (E).  
فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة القعالات . اجناسها ١١٨ تشمل زهاء ١٠٠٠ نوع . منها الاشجار والشجيرات والجنبات والفسلفات والاعشاب . ازهارها رباعية او خماسية التركيب . ثمارها كعبودية او نووية .

١٣٠١٥ - سَايُوت ، سَايُوط Carpe (F). Carp (E)  
هو الشبوط ، اطله .

١٣٠١٦ - سَايِيَا Sabia (S).

Sabie (F). Sabia (E).  
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الساييات . انواعها سبعة معظمها زراعي تزييني || ازهارها كبيرة ، حملة ، حمراء اللون ، كثيرة الاسدية الصفراء المخضبة || تزود في المراكز لانها تنضج البرد .

١٣٠١٧ - سَايِيَاَت Sabiaceae (S).

Sabiaceae (S). Sabiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات البهيس . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٢٠ جميعها جنات صغيرة واعشاب معمرة منها بعض مناطق افريقية الاستوائية والحارة || اشهر اجناسها الساييا .





سافراس

١٣٠٤٧ - ساق أرضية Tige souterraine (F).

Underground stem (E).

هي الساق التي تنمو في التراب كالجذور .

١٣٠٤٨ - ساق حور Ramier (mâle) (F).

Ring-dove (male) (E).

هو ذكر الورشان .

١٣٠٤٩ - ساق سوداء Jambe noire (F).

Black leg (E).

وصم بكثيري يركب البطاطا في سوقها ودرناها فيؤذيها  
اشد الاذى . سببه الكروية البنكورية اطليا .

٩٣٠٥٠ - ساق عارشة ، مُسَلَّكَة

Tige grimpante (F). Climbing plant (E).

هي التي ليس لها من القوة ما يكفيها للانصباب فتسلق  
غيرها وترتكز عليه .

١٣٠٥١ - ساق عُقُولِيَّة Tige tuberculeuse (F).

Tuberous stem (E).

هي الساق المكونة من الدرن والساقل .

١٣٠٥٢ - ساق مُسْتَلْقِيَّة ، زاحفة

Tige rampante (F). Prostrate, Runner (E).

هي التي لا تستطيع الانصباب في الهواء فتزحف على  
الارض .

١٣٠٥٣ - ساق مُتَلَفَّة ، عَصِيَّة ، عَقَفَة

Tige volubile (F). Twining plant (E).

ساق تلتف على دعائمها .

١٣٠٥٤ - ساق مُتَنَصِّبَة ، صَدْعَة

Tige dressée (F). Dress stem (E).

كل ساق تستطيع الانصباب بذاتها .

١٣٠٥٥ - ساكن Stator

نمت تعريني يلقط على القسم الثابت من المحركات  
الآلية .

١٣٠٥٦ - ساكي ، ساقبي Pithecia (S).

Saki (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السبويات . انواعه ٦  
موطنها شمال امريكا الجنوبية || جميعها كسلانة قليلة  
الحركة . اجسامها ربة . رؤوسها مستديرة شارة الجبهة .  
قوائمها متوسطة الطول . اذنانها طويلة جائلة لا اخاذة .  
اوتابها سوية الاوان يكثُر فيها الاسمر وشقائه . شعورها  
قليلة الكثافة متوسطة الطول . تألف الغابات الظليلة .  
تسرح في الليل . مرتعها الاشجار . جماعاتها قليلة العدد .  
قوتها الثار واللسل .

١٣٠٥٧ - سالح ، سَلْغ Serpent noir (F).

Black snake (E).

الاسم السوداء الثوب .

١٣٠٥٨ - سَالِفُ العُرُوس هو القطيفة الهايا .

١٣٠٥٩ - سائلو أسفغ Selatosomus latus (S). \*

Taupin bronzé (F).

حشرة من السالوليات طولها نحو ١٦ سم . قوتها الى حمرة  
السفاد يعلوها موج اخضر || تركب الزروع والبقول .  
رقبتها اسطوانية مسطيلة تؤذي جنور عدة نباتات .

١٣٠٥٥ - ساسفَراس \* ، ساسفَرا

Sassafras (S). Sassafras, Bois odorant (F). Sassafras  
tree, Ague tree (E). Sassafrasbaum, Fenchelholz  
(D). Sassafraso, Sassafrasso (I).

شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الفاريات . منبها  
كثلا وفلوريده . خشبها صناعي اصفر اللون ، خفيف  
الوزن عطري العرف . اوراقها تشتمل اسمال المقلبات  
والزوايل وذلك بعد تجفيفها وتحتمها .

١٣٠٣٦ - ساسَم هو الابنوس ، اطليه .

١٣٠٢٧ - ساسَمَة Ebénisterie (F).

Cabinet-making (E).

السامة نجارة الساسم اي الابنوس وغيره من الاشخاب  
الفاعرة المائلة .

١٣٠٢٨ - ساطور Fendoir (F). Cleaver (E).

آلة حادة يقطع بها اللحم والعظم .

١٣٠٢٩ - ساعَة l'Horloge (F). Horologium (E).

الساعة كوكبة نجوم موقعها الجنوب . مركزها فوق كوكبة  
النهر . عدد نجومها ٢٤ ألمها من المرتبة الخامسة .

١٣٠٤٠ - ساعُو Sagou (F). Sago (E).

دقيق نشوي منذ يستخرج من لب جنوع بعض  
التخليات والسيكاسيات التي تنبت في البلاد الحارة .

١٣٠٤١ - ساعُوِيَّة \* ، شَجَرَة الساعُو ، تَحْل

النَشَا Sagus rumphii, Metroxylon

sagu (S). Sagoutier (F). Sago-palm, Sago tree (E).  
Sagopalm (D). Sago, Sagu, Palma da stoffe (I).

جنس اشجار معمرة من فصيلة التخليات . مهدها البلاد  
الحارة يستخرج من لب جنوعها مادة نشوية مغذية تدعى  
سافر لها ثأنها عند قوم تلك البلاد .

١٣٠٤٢ - ساف Crin (F). Coarse hair (E).

شعر الذنب والهلج .

١٣٠٤٣ - سافَرَة Sparganium (S).

Sparganier (F). Reed-grass, Bur-reed (E). Igelkol-  
ben (D). Sparganio (I).

جنس نباتات جذمورية مائية معمرة من فصيلة البوليوات  
انواعها المرفوعة ثمانية . اوراقها متعاقبة لائفة مستطيلة .  
نصلها مرياني الصفحة الضيقة . ازهارها ابيلة الانكاز  
وهائية ، ضيقة التجميع ، متتابعة ، كروية الشكل .  
اشهر انواعها شريط الماء .

١٣٠٤٤ - ساق Jambe (F). Leg (E).

من اعضاء الحيوان وهي بين الفخذ والعرقوب .

١٣٠٤٥ - ساق Tibia

هي في الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ  
والرُسع .

١٣٠٤٦ - ساق ، جِذْع Tige, Tronc (F).

Trunk (E).

هي المحور الاصلي في النباتات الوائية . تقوم على  
الجذر وتتمو صعدا في معظم النباتات وتحمل الانصاف  
والورق والثار .



سافرية



سافرة



ساكي



سائلو أسفغ

## \* ١٣٠٦٥ - سَالُونِ خَمَلِي \*

*Agriotes niger*, *Elatér niger* (S). *Taupin velu*, *Agriote velu* (F).

نوع من السالون طولها نحو ١٢ م. ثوبها الى السواد الفسحي تملوه خلة غبراء. يكثر وجوده في اوائل الربيع. يركب مع يرقاته الجوزية اللون زروع الحطبة والشعير وسائر النجيليات الزراعية والبرية والشوئدر وفشايل التبع في الحقل.

١٣٠٦٦ - سَالُونِ مُشَيَّر \*  
*Taupin rayé* (F). هو سالون الحصيد، اطليه.

١٣٠٦٧ - سَالُونِ مُنْقَط \*، لَاتُونِ مُنْقَط \*  
*Lacon punctatus* (S). *Lacon punctué*, *Taupin punctué* (F). *Lacon punctatus* (E).

حشرة غاضلة معتدلة من فصيلة السالونيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف غابات الصنوبر وأحراجة. غناها تمش على بعض اوراق النباتات البرية وعلى ابر الصنوبر. يرقاتها تمش على المواد الخشبية المنحلة وعلى ما تقتنصه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد، يطول من ١٦ الى ٢٠ م. ثوبها اسود اللون تملوه حراشف فضية شديدة الصغر تبدو كالتقط. رأسها كبير الحجم. فشاها ضليمان. عيناها صغيرتان. زباناها خيطيان. ظهرها مستدير الطرف الاصح. ارسافها خاسية المقل || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبناً || جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواخر آب. تسرح في النهار. تساقد بعد ظهورها باسبوعين وترز في المكان في التربة تحت الجملانة || اليرقة سلكية الشكل، نينية اللون من تصفر مع تقدم العمر || طولها الاكمال الذي يستمر نحو سبعة اسابيع ينقضي في التربة على عمق يراوح من ١٠ الى ٢٠ م.

١٣٠٦٨ - سَالُونِيَّات \*  
*Elatéridae* (S). *Elatéridés* (F). *Elatéridae*, *Snapping beetles*, *Click beetles*, *Wireworms* (E). *Feldschnellkäfer*, *Schnellkäfer*, *Drachwürmer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة مفدمات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القد. زباناها مركبة من ١١ فاصلة وهي غشبية الشكل او منشارية او مشطية. ارسافها خاسية المقل. من ميزاتها انها اذا ولعت على ظهرها او وضعت كلكك تنط لامتداحة تولزها الطبيعي ونطها ترفعها بضع سنتيمترات تراقها قرقة خاصة. يرقاتها اسطوانية مستطيلة، اجسامها قوية جلدية، لونها الى الصفرة النعائية || تركيب جذوع وجذور وصافل عدة نباتات.

١٣٠٦٩ - سَالِينُوم \*، بَقْدُونِسْ جَسَكِي \*  
*Selinum* (S). *Sélin* (F). *Milk parsley* (E). *Kummel-silge* (D). *Appio di montagna* (I).

نبات عشبي يري معمر من فصيلة الخيميات. منته البلاد المعتدلة المناخ. يكثر في بعض اقالم حوض البحر المتوسط. يقال انه لا يجلو من المناطق الطبية المهمة التحديد.

١٣٠٧٠ - سَامَ \*  
*Paltre* (F). *To graze* (E). سام الماشية قادها الى المرعى ورعاها.

## \* ١٣٠٦٠ - سَالُونِ أَطْحَل \*

*Lacon murinus*, *Brachylacon murinus* (S). *Taupin gris* (F).

حشرة من السالونيات طولها نحو ١٦ م. ثوبها حنطي تملوه رقة لملح. تركيب بيلات الورد واوراق بعض النباتات فتقرضها في اليرقة صفراء اللون سلكية الشكل كثيرة القدر تركيب جذور الزروع والشوئدر والباطما ومشايل الانجار المشرة.

١٣٠٦١ - سَالُونِ التَّبَع \*  
*Agriotes ustulatus* (S). \*  
*Taupin noir*, *Agriote noir* (F).

حشرة من السالونيات طولها نحو ١٥ م. لونها اسود لامع. يكثر وجودها في اواسط الربيع، تعيش على مختلف النباتات البرية وتقتضم سوق شتول التبغ، عند جامها، يمستوى سطح التربة. يكافح باستمال احد الحواشير الفعالة تمفيرا على التربة عند آخر حراثة يعقبها التشثيل.

## \* ١٣٠٦٢ - سَالُونِ الْحَصِيد \*

*Agriotes obscurus*, *A. lineatus*, *Elatér segetis* (S). *Taupin des moissons*, *T. rayé*, *T. obscur*, *Agriotes des moissons*, *A. rayé*, *A. obscur* (F). *Striped elaterid beetle*, *Click beetle*, *Dark elaterid beetle* (E). *Saatschnellkäfer*, *Feld-Humusschnellkäfer*, *Düsterer-Humusschnellkäfer* (D).

اسم يطلق على عدة حشرات من السالونيات اجسامها متشابهة يصعب معها تمييزها. طولها يراوح من ٧ الى ١٠ م. ألوانها بنية اللون تملوها مشعة خلية. اتحادها جمجمة. يرقاتها اسطوانية الشكل، مستطيلة القد، جلدية البقرة، صلبة التركيب، بنية اللون. حيلة المسجج تتركب مع يرقاتها تختلف الزروع والبقول والتبوغ.

## \* ١٣٠٦٣ - سَالُونِ الرِّيَاض \*

*Selatosomus cruciatus* (S). *Taupin des futaies* (F). حشرة من السالونيات طولها نحو ١٢ م. لونها حنطي. تمعداها الى الصفرة الغبراء تملوها خطوط سود || تركيب الانجار الحرجية والزيينية اعصها السنديان والزرزفون.

## \* ١٣٠٦٤ - سَالُونِ بَصَاق \*

*Agriotes sputator* (S). *Agriote cracheur*, *Taupin cracheur* (F). *Agriotes sputator* (E).

حشرة مؤذية غاضلة ناعمة من السالونيات مفدمات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية وافريقية الشالية. تألف المروج والراعي والحقول والمياقل. غناها تعيش على اوراق النباتات المرموعة والبقولية وعلى بيلات الانجار اعصها اثمار الفصيلة الصروانية. يرقاتها تمش على جذور النجيليات والجزر والشوئدر || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ م. ثوبها الى السمرة السوداء الكستنية المالح. رأسها محجوب الشكل يطول في مقدم الجبهة شبه اثار يمتد بين الزبائين. زباناها خيطيان طويلان. عيناها صغيرتان. كوكسها معتدل الايدياب، كثيف التشثيل وانمل.

اوسافها خاسية المقل || الاثنى اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبناً واخصم نطاً || جيلها رباعي الحول. تظهر الفراشة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اوائل الصيف. تسرح في النهار || يرقها بطيئة النمو لا تدرك الكال الجمسوري الا بمرر ثلاث سنوات فيصبح طولها اذ ذاك نحو ١٨ م. ويستقر ثوبها على الصفرة النعائية السغام المالح || طولها الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة.



سالون اطحل



سالون التبغ



سالون الحصيد



سالون الرياض



سالون بصاق



سالون منقط



سالون خلي



ساليوم



Dominant

١٣٠٨٥ - سَائِل مُتَوَكِّف

صفة العامل البيولوجي المتغلب .

Palefrenier (F).

١٣٠٨٦ - سَائِلِس

Groom, Ostler (E).

عامل يسيرون الخيل فيقدم لها الطعام ويحميها ويسرحها .

Assimilable

١٣٠٨٧ - سَائِلِغ

هو من المواد الغذائية ما كان قابلاً للتشثيل .

١٣٠٨٨ - سَائِلِغ المِيزَان

سائق الميزان نجم يسير وراء نجوم برج الميزان فيبدو كأنه يسوقها .

Fluide (F). Fluid (E).

١٣٠٨٩ - سَائِلِ

صفة الأجسام اللامسكة الذرات، والوسائل تقسم الى قسمين الوسائل اللامسكة والوسائل التازية .

Bouillie (F). Wash (E). مَحْلُول

السائل حسب الاصطلاح الزراعي خليط مائع مركب من مواد مختلفة مذابة او معلقة في الماء، والوسائل الزراعية عديدة تستعمل في مكافحة الحشرات والاورام الفطرية .

١٣٠٩١ - سَائِل بوردو ، مَحْلُول بوردو

Bouillie bordelaise (F). Bordelaise wash (E).

سائل مركب من كبريتات النحاس مع الكلس في الماء بمعدل ١٪ سلفات النحاس وقدره ككلس حراق يقضاه اليها ١ ٪ كازين . وهو اقدم الفواظير واعمالها انتشاراً . خصائصه وميزاته عديدة منها ٥ انه يفيد النباتات دون ان يذوي الاوراق وسماها . يلتصق جيداً بجميع الاجزاء التي يلتصقها . لا حطر عليه من الوجهة الصحية ونفس ثمنه الذي يجعله بمثابة الجميع ٥ وهو ينحصر بمزج محلول الكلس الحراق (الحام) مع محلول سلفات النحاس بنسبة واحد الى واحد او ٢ الى ٣ او ٤ الى ٤ والوصف الفطري المقصود وزمن الاستعمال . ويجب ألا يعزب عن بال احد :

١ - ان النحاس هو المنتصر الفعال في هذا السائل .  
٢ - وجوب تخفيف هذا السائل في اوعية خشبية او فخارية .

٣ - مراعاة تماثل نسبة الكلس من سلفات النحاس لان زيادة الكلس تدفع بفائدة السائل كفاطور كما وان زيادة النحاس تذي فاعليته اقاصرة بالسام والبقرة .

٤ - ان محلول بوردو الجاهز الممرض في الاسواق لا يوازي السائل الممكن تخفيفه في الزمرة .  
٥ - ان افضل ما حضّر واستعمل يوبيا .

١٣٠٩٢ - سَائِل بُورغوني

Bouillie bourguignonne (F).

سائل مركب من سلفات النحاس وكبريتات الصودا مع الماء بمعدل ٢٪ سلفات النحاس مع ١٪ كبريتات الصودا . ولا يجوز استعمال هذا المحلول قبل التأكد من زوال حافضيته ويتم ذلك باستعمال ورق الفرنشول الاخر فان ازرققت الورقة عند تطبيقها بالمحلول كان السائل قلوياً وصح استعماله والا اضيف اليه مذوب الكبريتات حتى زوال اللون الاخر .

١٣٠٧١ - سَامّ

Venimeux (F). Venemous (E). تمت تعريفه يطلق على كل حيوان حوى بعض السم ؛ او باستطاعته القاح سمه لسماً او نهشاً الخ ....

١٣٠٧٢ - سَام اَبْرَص هو الوزفة ، اطلبها .

١٣٠٧٣ - سَامِك ٥

Ichtyophag, Piscivore (F). Ichtyophagous, Piscivorous (E). مغتذ بالسماك من مختلف الحيوان والمير .

١٣٠٧٤ - سَامِل ٥

Limivore (F). Limivorous (E). الذي يعيش في الاسمال والايصال ويقنات من محتوياتها العضوية .

١٣٠٧٥ - سَاوَر

Diamant brut (F). Rough diamond (E). هو الماس الخام كما يوجد في الطبيعة (رابع ماس) .

١٣٠٧٦ - سَائِد رَمْس

Citharexylum (S). Citharexylon, Côtelet, Bois fidèle (F). Fiddle-wood, Savannah wattle (E). Geigenholzbaum (D). Legno fidele (I).

جنس شجيرات برية من فصيلة الساجيات مهدها البلاد الاستوائية . انشعاباً عزلة ، ثمينة ، تستعمل في صناعة آلات الطرب .

١٣٠٧٧ - سَائِف ٥

Caprophage (F). Caprophagous (E). تمت تعريفه يطلق على كل حشرة تعيش على سلف القطنيات .

١٣٠٧٨ - سَائِه

Produire alternativement (F). To produce alternately (E). سانه الشجر : حل سة وتأنر اخرى . والشجرة السانه تدعى سناه .

١٣٠٧٩ - سَائِيَة هي للناغورة . ج سوان .

١٣٠٨٠ - سَاهِج ٥

Fumifuge (F). Smoke-preventing (E). تمت تعريفه يطلق على كل شيء او مادة تبعد الدخان .

١٣٠٨١ - سَاهِج

Vent violent (F). Strong wind (E). الريح الشديدة الوق .

١٣٠٨٢ - سَاهِر \* ، ذَيْلِ الْكُتَب

Cynosurus cristatus (S). Cynosure, Crételle des prés (F). Dog's tail-grass (E). Ecthas kammingas (D). Ventolans dei prati, Lentolans crestata (I).

نبات عشبي علني بري من فصيلة النجيليات وسط المعكرشيات . مهده حوض البحر المتوسط . يملو نحو ٦٠ سم . يتكوّن في الحفاب والجبال وفي المراعي الطبيعية . ثنه جيد الصنف مرغوب فيه .

١٣٠٨٣ - سَاهِكَة

Vent fort (F): High wind (E). هي لريح القوية اهلوب تحرك الشجر .

١٣٠٨٤ - سَاهُور

Halo الساهور كالمالة والظاوة يظف القمر بدارته .



ساهر

## Pterophoridae (S). سَبَّاقِيَّات ١٣١٠٦

Pterophoridés (F). Pterophoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٦٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم || تسرح من الغروب الى فحة الليل . طيراتها خفيفة الحركة ، معتدل المرقعة والاحمر || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، قضيصة . رؤوسها معتدل الحجم . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية . ملاسها نحيلة . مراشفاها مستطيلة . جذناتها مقعودة . بطونها سهيفة الحمل ، عادمة الزغب . رواشنها صغيرة ، مستطيلة الشكل . الامامية منها ثنائية الاصابع المنقطة الاطراف ، الخلفية ثلاثية الاصابع المستقيمة . جرائنها تامة النمو . ظنايبها الخلفية مستطيلة ، ثنائية المناسخ الطويلة || اساريها مستغلطة الاجسام ، زبابة . تميش داخل الثمار او داخل الافئدة التي تنقبها وتغذها || خادراتها تحمي طور الاكمال مؤرجحة معلقة بالحصيفة او مزورة بخيط حريري المادة .

## ١٣١٠٧ - سَبَّاق

هو البستان المهد لزراعة البقول ، راجع بستان خضر .

## ١٣١٠٨ - سَبَّاق

هو الزيل ، راجعه .

Limnémie (F).

Limnietry (E).

علم يبحث في التغيرات الدورية التي تطرأ على مستوى سطح المياه في مكان معين .

## ١٣١٠٩ - سَبَّاقَة

Sargus annularis (S). Sargue spirallion, Sarguet, Sparlin (F). Sar, Sargo sparus (E).

سمكة بحرية من السرغوس وفصيلة السرغيات . تكثر في المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل . ثوبها الى الكهبة القضيصة يملؤ تجذع باهت . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

## Bouldere (F). ١٣١١١ - سَبَّاطَة

الموضع المخصص لجمع النفايات من تراب واوراخ .

## ١٣١١٢ - سَبَّاق الطير

Oiseaux de proie, Rapaces (F). Rapacious birds, Birds of prey (E).

رتبة من الطير تدعى الجوارح .

## Heptandre (F). ١٣١١٣ - سَبَّاقِيَّي الأَسَدِيَّة

نعت وصني تعريفي يطلق على الازهار المسبعة الاضواء الذكورية .

## Heptagone (F). ١٣١١٤ - سَبَّاقِيَّي الأَصْلَاح

كل شكل هندسي مسبع الاضلاع .

## Heptagyne (F). ١٣١١٥ - سَبَّاقِيَّي الأَقْلَام

نعت وصني تعريفي يطلق على الازهار . التي يحمل وزجها سبعة اقلام .

## Bague (F). Ring (E). ١٣١١٦ - سَبَّاقِيَّ

السباق خاتم في رجل الطائر من جراح وغيره .

## ١٣٠٩٢ - سَائِل حَاشُورِي

Bouillie insecticide (F). Insecticide wash (E).

هو ما صنع خاصة للقضاء على الحشرات التي تترى النباتات الزراعية وقد يختلف باختلاف المادة الفعالة التي يتركز عليها ونسبة عنصرها الجاهلي .

## Bouillie arsenicale (F). سَائِل زَرْيَخِي ١٣٠٩٤

Arsenical wash (E).

كل سائل حاشوري يدخل في تركيبة الزرنيخ . ولما كان الزرنيخ من السموم الفتالة لذلك يجب استعماله بروتة على ان لا يتعدى استخدامه ابداً زمن الازهار والعقد .

## Bouillie au savon (F). سَائِل صَابُونِي ١٣٠٩٥

Soap-wash (E).

يتركب من كبريتاة النحاس والصابون في الماء وذلك بمعدل ٢٪ كبريتاة النحاس مع ٢٪ من الصابون . وقد يضاف مذوب الصابون حتى أزرقاق ورقة الطرنشول .

## Bouillie fongicide (F). سَائِل فَاطُورِي ١٣٠٩٦

Fungicide wash (E).

هو من السوائل ما جعل خاصة لمكافحة الفطور والقضاء عليها .

## Bouillie cuprique (F). سَائِل نُحَاسِي ١٣٠٩٧

Cupric wash (E).

هو كل سائل كانت احصى مواد النحاس من مركباته العنصرية الرئيسية .

## ١٣٠٩٨ - سَائِل نَوَوِي

Enchylème, Suc nucléaire (F). Enchylème, Nuclear succus (E).

هو السائل الخليوي الذي يحيط بالخلية .

## ١٣٠٩٩ - سَائِل هَضَام ، عَصَاة هَضَامَة

Suc digestif (F). Digestive succus (E).

عصارة حامضة طبيعية تفرزها المعدة تسهياً لحضم الطعام وتميله .

## Liste en tête (F). ١٣١٠٠ - سَائِلَة ، سَبَّاقَة

من شيات الخيل وهي الفرة التي تسيل على قصبه الاثف .

## Quadrupède herbivore (F). سَائِلَة ١٣١٠١

Herbivorous quadruped (E).

السائمة كل راعية من الدواب . ج سوائم .

## Aichiba ١٣١٠٢ - سَبَّاق

السبا نيم من كوكبة الغراب ويدعى ايضاً غباء ونقار الغراب .

## ١٣١٠٣ - سَبَّاق

السبا : الدود يحمله السبل من بلد الى بلد . ج سبايا .

## Vin (F). Wine (E). ١٣١٠٤ - سَبَّاق ، سَبَّاقَة

هو الخمر الجيدة . والسبا : بياح الخمر .

## Index (F). Fore finger (E). ١٣١٠٥ - سَبَّاقَة

السباة والسبة والسباحة والسبعة والمشيعة هي الاصبع التي تلي الإبهام .



سَبَّاق



سبال اذنسون



سبال نخلي



سبت



سبتلوم الشيك

## ١٣١٢٥ - سَبَّالٌ نَخْلِي \* Sabal palmetto (S).

Sabal glaucescens (F). ساقه قصيرة . أوراقه طويلة الزناد ، مستطيلة الخوص المتدخلة . مستتلة البزيم . كثيرة التفريغ . نصلها الى الخضار البحري يتحجر عند انصاف زامه الثالث . يرغب في الاثربة المتوسطة والارطوية . يزرع في المراكب والحدائق . يتكاثر بالبذر .

## ١٣١٢٦ - سَبَّالَتَجْ هو الاسبانج ، اطليه .

١٣١٢٧ - سَبَّابٌ ، اَعْتِيارَ Considerant (F). هو في العرف الحقوقي احد الاسباب التي يبنى عليها الحكم سواء اكان قضائياً ام ادارياً .

١٣١٢٨ - سَبَّاب Cause هو القصص الذي يلزم في سبيله شخص نحو شخص آخر . وقد يكون ناقماً وعاطفاً ورائفاً وعطوفاً وصورياً الخ .

١٣١٢٩ - سَبَّابُ الْاِبْطَال Rescisoire (F). هو السبب الاصل الذي بني عليه الابطال . Rescisoire (E).

١٣١٣٠ - سَبَّتْ \* Alcea ficifolia (S). Alcea rose, Passe-rose, Rose de mer (F). Andwerp hollyhock (E). Stockrose (D). Alteia rossa (I). نوع من الخبازي وهو نبات زراعي تزييني معمر يماز من ٥٥ الى ١٠٠ سم . ساقه فضاء . أوراقه متعاقبة . نصلها خماسي التفريغ مسنن الحافة . ازهاره كبيرة مكينة قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الحمرة الوردية . ازهاره يستمر من حزيران الى الجليل .

١٣١٣١ - سَبَّتْ Peau tannée (F). Tanned leather (E). جلد البقر وكل جلد مذبوح لا شعر عليه . وان كان عليه شعر ووبر وصوف فهو مصحب .

١٣١٣٢ - سَبَّتِلُومُ Septoizum جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفقيات . انواعه قليلة العدد والاذى تعيش على الافئاد والاوراق || كئانده فسية التجميع ، تنبئة اللون ، تنشأ في الامة . بوفاته مستطيلة الشكل ، مؤبورة ، وربة الانقسام الثلاثي او الخماسي || اشهر انواعه سبتلوم الشيك .

١٣١٣٣ - سَبَّتِلُومُ الشيك \* Septoizum fragariae (S). فطر مجهرية يركب اوراق الشيك البري والزراعي . مظهره الخارجي يقع سماء اللون ، قزينة الاطار ، مقربة الزوايا ، قطرها براوح من ٣ الى ٨ سم . تركيب نصل الاوراق فتتخذها || يتكاثر بتطهير الرواكب قبل غرسها بواسطة الحامض الكبريتي المخلول من ١:٥ الى ١:٧ % .

١٣١٣٤ - سَبَّتِلُومُ الشيك \* Septomyxa جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفقيات . انواعه عديدة معظمها رمية تركيب الاعشاب المقطوعة والمواد العضوية . تتميز بوثباتها المحصورة الناشئة في الطبقة الامة . كئاندها مستطيلة ، مؤبورة ، شفافة ، قياسها نحو ٣×١٥ ميكرون .

## ١٣١١٧ - سِيَّاقُ النَّخِيل Course de chevaux (F). Horse-race (E).

ركض الخيل لمعرفة اكثرها علواً وقوة وصلابة وشجاعة . وسباق الخيل من انواع الرياضة التي اشهر بها العرب . وكانت خيل السباق تعرف بالجلبة (راجع سابق) . وسباق الخيل يجري الآن في ميادين خاصة وفقاً لنظم مرمية الاجراء ويتتبع بها كل صاحب جواد .

## ١٣١١٨ - سِيَّاقُ Moustaches des animaux (F). Whiskers (E).

السبال عند الحيوان كالسودل او الشارب عند الانسان . وهي مجموعة من الهلب تملو الشفة العليا .

١٣١١٩ - سِيَّاق Sabal جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة النخلية . انواعه عديدة . معظمها جلعي وبعضها سنخي . اوراقها زنادية ، مروحية . ازهارها كافوري حريها كثير الفروع . جانبها نصفية . ازهارها خنثوية ، لاطئة الارتكاز . توضعها ثلاثة البتلات . ثمرها كروية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، ثلاثية البزور ، غير مأكولة . اشهر انواعها ما يلي .

١٣١٢٠ - سَبَّالٌ اَدَنْسُون \* Sabal adansonii (S). Sabal d'Adanson, S. glabre (F). ساقه مستقيمة . أوراقه مروحية ، عديمة التشرج ، قطرها نحو المتر ، لونها الى الخضار البحري ، زاندها متصب الارتكاز يملو نحو ٦٠ سم . || يشكو من مقدوره الاشطائي الذي يقوده الى كثرة الفسائل .

١٣١٢١ - سَبَّالٌ اَمِيرِي Sabal blackburniana (S). Sabal prince (F). بطي النمو ساقه تملو نحو عشرة امتار . قطرها براوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . اوراقه جلعة الخضار . البايق . قطرها نحو ١٥٠ سم . زاندها باحت اللون ، جانبي الارتكاز يطول نحو ٨٠ سم . || يرغب في المواقع الرطبة ويوجد في الحدائق المصونة .

١٣١٢٢ - سَبَّالٌ مَكْسِيكي Sabal mexicana (S). Sabal du Mexique, S. serrulata (F). بطيء النمو . جذعه يملو نحو ٦ امتار . اوراقه متفرقة قطرها لا يقل عن ١٣٠ سم . زاندها منشاري الحافة يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . || اقليمه الشولامي البحرية . يرغب في الاراضي الرطبة والمواقع الدافئة .

١٣١٢٣ - سَبَّالٌ مُؤْتَفٍ ، سَبَّالٌ مُظَلِّي Sabal umbraculifera (S). Sabal parasol (F). نوع من السبال . موطنه جزر الانثيل وبيتي وكوبا . جذعه منتصب اقل يرتفع من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقه كبيرة ، مروحية ، قطرها نحو ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار البحري . زاندها مؤتف شائك يطول نحو ١٠٠ سم . || يرغب في الاثربة المعتدلة الانساج والرطوية .

١٣١٢٤ - سَبَّالٌ تَجْسِي Sabal minima (S). Sabal acule (F). نوع من السبال العديم الجذع . اوراقه مستطيلة الزناد . نصلها كثير التدرج ، جميل الخضار الزاوي || يرغب في الاثربة الخفيفة المعتدلة الرطوية ، يخشى المواقع الباردة . تكثر زراعته في المراكب .

الرطبة وتقفى على نشاطه اشعة الشمس || يبدو على الاسطاف والاغاد يقع صغيرة عديدة مبعثرة أو كثيفة التجميع تشل الحركة التنفية وتقرن النوسو || في سبيل الوقاية يحسن حفظ البصل في اماكن موهية ثم تعريضه بعض الوقت لاشعة الشمس المباشرة .

#### ١٣١٤٢ - سُبْجَة الشَّهْبَانِ

*Colletotrichum cliviae*

فطر مجهري يركب اوراق الشهبان فيؤذيها || مظهره الخارجي نقط سود مبعثرة تملأ صفحة النصل فتعزل سير النسخ وتؤخر النمو وتسي الى الاضرار والالزاح || يكافح باستعمال السوائل النحاسية الحويذة بمعدل ١ %

#### ١٣١٤٣ - سُبْجَة الكَتَانِ

فطر مجهري يركب الكتان في مختلف ادواره وتكوين من حين انتاش البزرة في التربة حتى الازهار وتكوين البزور الجديدة || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة غيراء اللون سمراء المائلة تركب اوراق والارواق وتبتلات الزهرة والحباء || يكافح بتطهير البذار بواسطة الاملاح الزئبقية .

*Spigelia (S). Spigélie (F).*

جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة اللوغانيات . انواعه ٣٠ بعضها زينة ومنها البري الطبي . سوقها فراء . اوراقها متعاقبة لائمه لاقياسية الشكل . ازهارها انبوبية . ثمارها جراء كروية الشكل صغيرة القد . بزورها دقيقة . اشهر انواعه مايلى .

#### ١٣١٤٥ - سُبْجِيل طَبِي \* ، عَشْبَة الهِنْد

*Spigelia anthelmia (S). Spigélie anthelminthique (F). Indian pink, Worm grass (E). Indisches wurmkraut (D). Spigella, Erba da bachi (I).*

نبات عشبي طبي بري حولي يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اوراقه متعاقبة سنائية الشكل . ازهاره دقيقة لونها الوردى ، باطنها اصفر ، ثماره جراء كروية صغيرة القد || اوراقه وازهاره وسوقه طيبة معوية وطاردة للديدان .

#### ١٣١٤٦ - سُبْجِيل مَرِيْلَانْد

*Spigelia marylandica (S). Spigélie de Maryland (F).* عشبة سبوتية معمرة تملو من ٣ الى ٩٠ سم . اوراقها كاملة . نصلها بيضي الشكل ، ذلق الزايم الاخير ، خلى المروق . ازهارها مستطيلة خاسية التفصيص . صفراء اللون كمارها كروية مزدوجة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٣١٤٧ - سُبْجِيلَات

هي اللوغانيات فصيلة نباتية ، اطلمها .

#### ١٣١٤٨ - سُبْجِي ، قِلَادِي

*Moniliforme (F). Moniliform (E).* نمت تمريري يدل على شكل خاص من اشكال الزباني ونوعها قوامه فواصل حبيبة متتابعة تشبه السبجة أو القلادة .

#### ١٣١٤٩ - سُبْجِيَّة ، عَدِيَّة

*Streptococcus (F). Streptococcus (E).* ويقال لها مكورة سبجة ومكورة عدية . بكثيرية مستديرة الشكل شاملة توجد في كل مكان . تكثر بنوع خاص في المواد المغناة .

#### ١٣١٤٥ - سُبْج

فطر مجهري من فصيلة الوشيات وسيد الجنس النوع يتنيز بالبيات المخررة وبعلاماته الاسطوانية الشكل القصيرة القد والعلظة القاعدة || يتطفل على الثغراء فيركب الارازان على صفحاتها السفلى . مظهره الخارجي يقع فسحة لاقياسية الشكل والحجم لونها الى الصفرة ثم تحرف الى الختلي حيث ترفع البشرة وتقرسها || اضراره زديدة لا تستوجب المكافحة .

#### ١٣١٤٦ - سُبْجَة

جنس تطور مجهريه من فصيلة الرغيفات . يتميز بهلمه الملون القائم على القصبات الكنيديه || انواعه عديدة ومؤذية ، اعرفها ما يتبع .

#### ١٣١٤٧ - سُبْجَة الاسْبَانْج

*Colletotrichum spinaciae (S). Anthracnose of the épinard (F). Spinach anthracnose (E).*

فطر مجهري يركب اصول الاسبانج فيصيب يباس الاوراق مظهره الخارجي يقع بيض قطرها من ١ الى ٢ م . تركب نصل الاوراق على صفحته . قصباته سرفولية ، كتالده وشية مستقيمة او قليلة التجميع ، قياسها ٣×١٧ ميكرون || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية .

#### ١٣١٤٨ - سُبْجَة البَطَاطَا

*Colletotrichum atramentarium, C. solanicolum (S). Datarose de la pomme de terre, Enroulement flasque (F).*

فطر مجهري يصيب البطاطا فيعطب الشن ويقرح الدرن . مظهره على السور قبل الازهار وبسده سقم وتعمل واستاطلة ثم ذبول والتفاف في الاوراق يقع يباس النصل . وهو على الدورات والجذور والسور ، حتى ارتفاع ٢٠ سم . يقع صغيرة مقربة الزوايا ، غيراء او سمراء اللون باضة المواج . وعند قطع البزرة المصابة يلحظ ، على مقطعها ، وجود حلقة صفراء او سمراء اللون تملو المنطقة القنوية . يقال انه لا يعيش في المناطق التي تملو ٦٥٠ مترًا وانه يرغب في المواقع الظليلة || يكافح بتطهير البذار وباجتنب الاربة الموهية .

#### ١٣١٤٩ - سُبْجَة البَسْدَوْرَة \*

*Colletotrichum phomoides*

فطر مجهري يركب ثمار البسترة قرب ادراكها فيعطلها . مظهره الخارجي يقع مستديرة خالية اللون مبشرة ثم مراكية تشبه البشرة ثم الب || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية وبسم من يضيف الكبريت .

#### ١٣١٥٠ - سُبْجَة الخُصْفِيَّات \*

*Colletotrichum gloeosporioides (S). Anthracnose des citrus, A. des limes (F). Anthracnose of limes, A. spot, A. tear-stain (E).*

فطر مجهري يصيب بعض انواع الليمون منها الاراج والليمون الهندي والخامض والمحو والتانزنج والبرتقال . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب نصل الاوراق يقابلها جفاف في نواحي الاثنان فيصيب يباسها . يكافح باستعمال سائل بوردو المحلول ١٪ او غيره من الفولطير الحديثة .

#### ١٣١٤١ - سُبْجَة الزَيْتُون \*

*Colletotrichum circinans (S). Anthracnose des illiacées (F). Anthracnose of illiacese (E).*

فطر مجهري يركب بصل الزيتون وسوقه . ينشط في المواق



سبجة البندوة



سبجة الحفقيات



سبجة الزنق



سبجيل طبي

## ١٣١٦٢ - سَبْرُودَةُ الْمُتَوَسَّطِ

نوع من السبر يعرف بأبي اليسر، اطليه .



سبد شائع

١٣١٦٣ - سَبْرُودَةُ، فُلَيْفَلَكَة  
Spergula (S). Spargule, Spargule, Spargoule (F). Spurry (E). Spark, Spargel (D). Spargola (I).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من القزفليات .  
سوقها خضراء فرطاء . أوراقها لائقة متعاقبة خطية النسل .  
ازهارها فردية ، زنادية ، صغيرة القد ، ريمية || أشهر  
الأنواع السبرغولة الحقلية .



سبرالیه

## ١٣١٦٤ - سَبْرُودَةُ حَقْلِيَّةٌ \*

Spergula campestris (S). Spargule des champs, Spargoule (F). Sylvan spurry (E).

نوع من السبرغولة الزراعية المروحية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . تزرع في المراعي الاصطناعية لأنها تعتبر من الاعشاب المفضلة التي تقيد الايقار الحلوب وتحمي  
عل الدرد .



سبرغولة حقلية

١٣١٦٥ - سَبْرُودُ ، سَبْرُودِي  
Rustique (F). Rustic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات لا يتطلب تربة معينة  
وعناية خاصة ويبيته محدودة .

## ١٣١٦٦ - سَبْرُودُ ٥

Saperda (F). Saperda (E).  
جنس حشرات غاشية من فصيلة القزفليات || أنواعه  
عديدة . اجسامها مستطيلة القد وصغيرة . زياناها شوكية ،  
مستطيلة وقوية . يرقاتها تعيش على المواد الخشبية الحية  
واليابسة || اعراف أنواعه واعمرها ما يلي .



سبرود اثير

## ١٣١٦٧ - سَبْرُودُ أَغْبَرُ ٥ \*

Saperda carcharias (S). \*  
Saperda chagrinée, Grande saperda (F). Great  
popular borer (E). Grosse Pappelbock (D).

نوع من السبرود طوله يراوح من ٢٢ الى ٢٨ سم . نوبه  
الى الخيطي الاغبر تملو نقشه سواد . حله متوسط الكثافة  
اصهب اللون || يرقته غاشية تقترس جذوع الحور  
الكتيبة فتستلبها .



سبرود البندق

## ١٣١٦٨ - سَبْرُودُ الْبُنْدُقِ ٥ \*

Obera linearis (S). \*  
Saperda du noisetier (F). Obera linearis (E).  
Hazelbock (D).

نوع من السبرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه الى السواد  
الاسفع . زياناها وارجله صفر || يرقته تركب اثنان  
البندق تقترسها وتسبب يباسها .



سبرود الحور

## ١٣١٦٩ - سَبْرُودُ الْحَوْرِ ٥ \*

Saperda populnea (S). \*  
Saperda du peuplier (F). Popular borer (E). Kleiner  
Pappelbock (D).

نوع من السبرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه حنفي اللون يملو  
مراجل بني . حله كثيف التجميع اصفر اللون || يرقته  
تركب اثنان واثنان الحور تقترسها وتعلبها .



سبرود سلمى

## ١٣١٧٠ - سَبْرُودُ سَلْمِي ٥ \*

Saperda scalaris (S). \*  
Saperde échelle (F).

نوع من السبرود طوله نحو ١٦ سم . نوبه الى الخيطي  
الاطحل المواج يملو تجزيع وزراكن سود تشبه السلم .  
حله قليل التجميع اسمر اللون || يرقته غاشية غائبة  
تركب مختلف الاشجار والاشجار اصعبا السنينان  
والجوز والحور والتفاح والكرز تقترس لحاء وشكير الاشجار  
الحية والاعشاب اليابسة .

## ١٣١٥٠ - سَبَّحَة هي المنقح ، اطليه .

## ١٣١٥١ - سَبَّحَةٌ مَالِحَةٌ

Marais salant, Salin (F). Salt marsh (E).  
كل ارض تركبها المياه البحرية وترسب فيها الملح .

## ١٣١٥٢ - سَبَّحِيَّاتٌ

Bryinées (F).  
رتبه من السحاب اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنجم  
الى فصليتين الرهوكيات والصرعيات .

## ١٣١٥٣ - سَبْدٌ

سبد الفرخ يدار ريشه يشبه .  
Bourra (F). Kind of down (E).  
ما يطلع في رؤوس النبات وراعه قبل ان ينتشر . ج اسباد .  
والسبد ما تلب من الشعر او الور .

## ١٣١٥٤ - سَبْدٌ

Plumule (F).  
١٣١٥٥ - سَبْدٌ  
الجزء الناقش من البزرة او الحبة .

## ١٣١٥٦ - سَبْدٌ

Caprimulgus (S).  
Engoulevent (F). Goatsucker, Nightjar (E).  
جنس طير من فصيلة السبديات . انواعه ٧٥ منتشرة  
في جميع الاقطار . اجسامها مستطيلة . رؤوسها غليظة  
مقلطحة . منقورها صغيرة . اشدائها . واسعة . اعنتها  
قصيرة . اجنتها خفيفة مستطيلة . اسرارها قصيرة  
مسرولة || تقتر في الارض بين الاعشاب والادغال .  
اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها من ١٦ الى  
١٨ يوما || جميعها من الرواس القواطع . قوتها  
الحشرات على اختلاطها || أشهر أنواعه السبد الشائع  
والفصية .

## ١٣١٥٧ - سَبْدٌ شَائِعٌ \* ، أَبُو عُمَيْيَ

Caprimulgus vulgaris (S). Engoulevent commun (F).  
Common nightjar (E).  
نوع من السبد طوله ٢٨ سم . وبيسته ٥٨ سم . ريشه  
شديد النعومة متوسط اللون لونه الى الفدية والسواد يملو  
تديج وتديج وتوسيم || وهو من القواطع يحوي البلاد  
في طلب المصيف والمشي يقم في لبنان بعض الوقت .

## ١٣١٥٨ - سَبْدِيَّاتٌ

Caprimulgidae (S).  
Caprimulgids (F). Caprimulgidae (E).  
فصيلة السبدان من رتبة الجوارم المشقوقات المناثير .

## ١٣١٥٩ - سَبْرٌ ، اسْتَبْرَاجٌ ، ارْجَاسٌ

Sondage (F). \*  
Sounding (E).  
تجريح عمق الطبقات الارضية وعناصرها .

## ١٣١٦٠ - سَبْرٌ

Glaréoles (F). Glareola (E).  
جنس طير من السبريات الزرقاقيات . انواعه المروية  
١٥ جميعها من القواطع . اسرارها قليلة العدد . تألف  
السطوط الزليلة والمناقع السبخة . انواها رصاصية اللون .  
اعنتها ويطونها يفس . قوادها واطراف اذانها ، القارعة ،  
سود || أشهر أنواعه سبرة المتوسط .

## ١٣١٦١ - سَبْرِيَّةٌ \*

Sobralia (S). Sobralia (F).  
جنس نباتات تزيينية من السحليات . مهدا امريكة  
الوسطى . ازهارها خلية البشرة ، حبة الشكل ، مزركشة  
الالوان العلة الزاوية المواج || تزرع في المراكب  
والعاصري .

Sepsis (S).

١٣١٨٢ - سَيْسِيد ٥

Sepsis (F). Sepsis (E).

جنس حشرات من فصيلة السبسيديات ورتبة ذوات الجناحين. أنواعه المعروفة عديدة أعطانها مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجناسها صغيرة تطول من ٣ الى ٦ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة ، عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل. ملاسها ضامرة. إعطاطها صغيرة. كواسلها شبه اسطوانية، محززة. بطونها غبيقة القاعدة والمؤخر. وراشها قليلة الخضاب. قوائمها مستطيلة. أطواها كثيرة ، جميعها وحيدة اللون || الجملة تنعيش على رقيق الأزهار اخصصا الخيميات. البرقة نائلة او دامتة .

Sepsidae (S).

١٣١٨٣ - سَيْسِيدِيَّات ٥

Sepsidés (F). Sepsidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع أقطار العالم || أجناسها صغيرة تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة ، عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل. ملاسها صغيرة او ضامرة. بطونها غبيقة القاعدة والمؤخر. وراشها قليلة الخضاب. انفخاذ وفنابيب قوائمها الامامية والخلفية مجهزة بمناخس حادة || ذكور بعض أنواعها مجهز ببند تنضح إفرازات عرفها كمزوف المندقوق || الحشرة الجملة تنعيش على رقيق الازهار او على المواد النباتية او الحيوانية الجزئية الانحلال. البرقة قد تكون غائصة او دامتة او نائلة او للاجابة || أشهر أجناسها السبيد .

Tribu (F).

١٣١٨٤ - سَيْسُط ، قَيْسِيَّة ، رَدَف

Tribu (E).

مركزه في تصنيف الاحياء بين الفصيلة والجنس. لذلك فالفصيلة تشمل بعض الاسباط والسيط يشمل عدة اجناس .

١٣١٨٥ - سَيْسُط نبات كاللبن مرعى جيد (اللسان) .

Septupler (F).

١٣١٨٦ - سَبْع

To increase sevenfold (E). ضاعف الذي سبع مرات .

Bête féroce (F). سَبْع ، سَبْع ، سَبْع

Carnivorous animal (E).

هو الحيوان المفترس . ج سبع وسباع م وسبة . ومن الطير ما أكل اللحم غالسا . وأرض سبة اي كثيرة السباع .

١٣١٨٨ - سَبْع هو الجفيل ، اطلبه .

la Bête (F). the Beast (E). سَبْع

كوكبة نجوم مشهورة باسم الذئب ، اطلبها .

Baguer (F). To ring (E). ١٣١٩٠ - سَبَق ٥

سبق الطائر اذا جعل السباق في رجليه .

Epi (F). Ear of corn (E). ١٣١٩١ - سَبِيلَة

السبله والسبيلة : السنبلة من الحنطة ونحوها . وهي ايضا شكل من اشكال الازهار قوامه محور تتجمع حوله الازهار وتتعاقد || يقال اسبل الزرع : اذا غرست سبلته .

Glareolidae (S).

١٣١٧١ - سُبْرِيَّات

Glareolidés (F). Glareolidae (E).

فصيلة السبر من الرقائيات تنتمي الى رتبة طول الساق .

Cypris (S).

١٣١٧٢ - سُبْرِيَّس ٥

Cypris (F). Cypris (E).

جنس حيوانات مائية من القشريات الدنيا الصدفيات وفصيلة السبرسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات ومناقع العالم القديم || أجناسها شديدة الصغر ، عادمة التسكيم ، مستطيلة الزباني . ألحفها ملونة ، ملسة ، رقيقة ، ثنائية المصارع الصدفية المادة .

Cypridinidae (S).

١٣١٧٣ - سُبْرِيَّيَّات ٥

Cypridinés, Cypridinidés (F). Cypridinidae (E).

فصيلة حيوانات مائية ، بحرية ونهرية ، من القشريات الدنيا الصدفيات || أجناسها وأنواعها كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر نهري || تتميز بألحفها الثنائية المصارع الصدفية || أشهر أجناسها وأكثرها انتشاراً السبريس .

١٣١٧٤ - سُبْرِيَّك هو التفاف المعروف ، اطلبه .

Seps

١٣١٧٥ - سَبَس

عن معجم الحيوان للفريق الدكتور امين الملوغ . هو اللسان ، واجمها .

Gongyle ocellé (F).

١٣١٧٦ - سَبَسْ أَنْصَر

هو اللسانة النمرة ، اطلبها .

Seps chalcidé (F).

١٣١٧٧ - سَبَسْ مُحَقَّق

هو اللسانة المحقطة ، اطلبها .

Savane (F). Savanna (E).

١٣١٧٨ - سَبَسَب

هو المغازاة الشاسعة المترامية الاطراف كثر مروجها واعشابها الطويلة المومية .

Felis ruppelli (S).

١٣١٧٩ - سَبَسَب \*

Chat de Ruppell (F). Cat of Ruppell (E).

نوع من السنائير البرية قريب الشبه بالفا . موطنه الحبيشة والنزوة وصغر . جسمه يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وزنه من ١٦ الى ١٨ سم. ثوبه الى الصبغة الرمادية يعبق مع اقترابه من شمس الظهر ويعلو تجزيع معترض اسود يكتنفه من قاعدة العنق الى طرف الذنب .

١٣١٨٠ - سَبَسْتَان هو الذئب ، اطلبه .

Cybister (S).

١٣١٨١ - سَبَسْتَر ٥

Cybister (F). Cybister (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من غديات الاجنحة وفصيلة الكزوليات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها المناطق الحارة . اكثر انواعه يألف المياه العذبة وبعضها بحري . قوتها كل ما تيسر من حشرات وقشريات وبلاعيط واسماك صغيرة || أجناسها كبيرة القد ، اعلايحية الشكل ، مبطلة . تتميز بكبر قوائمها الخلفية المجدافية الشكل والاستعمال . أطواها سوية الالوان المابقة يكثر فيها الجوزي والكسني واليني والاشعر اللامس .



سبريس



سباسب



سَبْتِيْلس

Cebus (S). ١٣٢٠٢ - سَبْتِيْس \* و سَبْتِيْو \*  
Sajou (F). Sajou, Sapajou (E).  
جنس قرد امريكي من فصيلة السيميات . انواحه ١٩  
موطنها يمتد من البرازيل الى نيكاراغوا || اجسامها  
رشيقة . رؤوسها مستديرة . قوائمها متوسطة الطول . اذنانها  
كاسية معلقة لا اعادة . اذنانها قصيرة الشعر اللد  
التيان الاولان || تألف الفئات . مرتما الفئات  
تسريح في قمها || جماعتها قليلة العدد تتألف من  
ذكر وثلاث اناث ويض الجراء || قوتها التآر والبرام  
والخشرات ويض الطير .

Cebidae (S). ١٣٢٠٣ - سَبْتِيْسات \*  
Cebidés (F). Cebidae (E).

فصيلة قرد من الخمارات موطنها البلاد الامريكية .  
انواعها المعروفة ٦٦ تجسمها ١٠ اجناس . تتميز بجلوها من  
الاضواء والكتائب ، باستاطة اجسامها الرشيقة وباذنانها  
الأخاذة || تألف الفئات والاحراج الكثيفة الرملية .  
تميش عل الاشجار تنقل عليها بحفة مدعشة . جماعتها  
تد من ٢٠ الى ١٥٠ || قوتها التآر والبرام والخشرات .  
اناثها تضع من جرو الى جرون || اما اجناسها  
فهي التالية بالترتيب الابجدي : آتل ، اواركاري ،  
راكيتل ، دروكولي ، ساكي ، سيوس ، مستور ،  
كروزي وريكس ، كليترش ، لغوتريش .



سَبْتِيْة الترسط

١٣٢٠٤ - سَبْتِيْو ذهبي هو الدوع ، اطله .

١٣٢٠٥ - سَبْتِيْقه هي البيلسان الاسود ، اطله .



سَبْتِيْوس

١٣٢٠٦ - سَبْتِيْل \* و ثُوْم قَصِيبي \*  
Allium fistulosum (S). Ciboule (F). Welsh onion (E).  
نبات يصل معمر من فصيلة الزنبقيات . اوراقه قرمية  
الانتشاب منتصبه تطول نحو ٣٠ سم . يتوسطها شرخ  
اجوف يعلو نحو ٥٠ سم . تكلمه ضمة كثيفة ، سيوائية  
الشكل ، ازهارها بيض اللون غسر المراج || ضروره  
الرعاية عديدة في الاربة الدبالية الخفيفة .  
وفي تستعمل كمحولة وليس كمحرة .

١٣٢٠٧ - سَبْتِيْب \*  
Crin (F). Coarse hair (E).  
السبي من الفرس : شعر النامية والرف والذنب .  
فرس غفيف السبي . الواحدة سبيبة .

١٣٢٠٨ - سَبْتِيْدج هو الحيار ، اطله .

١٣٢٠٩ - سَبْتِيْرو ، كَحُول

Alcool, Esprit-de-vin (F). Alcohol (E).  
سائل يستخرج من تقطير النبيذ او صير العنب المختصر  
او غيرها من التآر والجيوب ويختلف المسواد النباتية  
المختصرة || وهو سائل شفاف . سريع التبخير ،  
حاد الطعم يكرى الحلق . يغلي في ٧٨ + مغ . ويجمد  
عند - ١٣٠ مغ .



سَبْتِيْو

١٣٢١٠ - سَبْتِيْسه هي الوك الابيض ، اطله .

١٣٢١١ - سَبْتِيْطَر

نوع بين مالك الحزين يدعى بلشون جبار . كنيته ايواليزار

١٣٢١٢ - سَبْتِيْقه هي ذنب الثعلب ، اطله .

١٣٢١٣ - سَبْتِيْقه هي الابل ، راجه .

Jaguarondi (F). ١٣١٩٢ - سَبْتِيْ امْرِيْكي  
حيوان لاح مقترس يدعى جنفوندي ، اطله .

١٣١٩٣ - سَبْتِيْيات  
هي السابنديات فصيلة نباتية ، اطله .

١٣١٩٤ - سَبْتِيْيلس \*  
Spondylus (S).  
Spondyle (F).  
بحار متوسط القد عديد الترمي الصنفية يكثر في بحار  
البلاد الحارة .

١٣١٩٥ - سَبْتِيْقه هي الاغراس الامريكي ، اطله .

١٣١٩٦ - سَبْتِيْيات

Sapotaceae (S).  
Sapotacées (F). Sapotaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، وحيدات القعا ،  
مرتفعات المبيض . اجناسها ٣١ مهدها المناطق الاستوائية  
والحارة . فيها الاشجار والشجيرات والجنبات . اوراقها  
متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل . ازهارها ابطية الارتكاز .  
ثمارها عينية الشكل . يستخرج من معظم اجناسها عصارة  
صمغية صناعية تدعى طبرخي || اشهر اجناسها الاغراس  
والبرام والابجان والكنيت .

١٣١٩٧ - سَبْتِيْج \*  
Sebastes (S).

Sébastien (F). Norway haddock, Rosefish (E).  
جنس اسماك بحرية من شاككات الزعانف وفصيلة الجلائخيات.  
انواعها المعروفة نحو ٣٥ . جميعها من اسماك بحار المناطق  
الباردة والمعتدلة الحرارة || اجناسها متوسطة القد وصغيرة .  
سهلها مبراشي الشكل ، شاكك المقصة . زعانفها الظهرية  
متسلطة تتميز بشامها الشاكك الاطراف . اذنانها زاهرة  
الاولان الزائفة || اعرف انواعها واشهرها سبوتية المتوسط .

١٣١٩٨ - سَبْتِيْة المُتَوَسَّط \*

Sebastes dactylopterus (S). Sébaste de la Méditerranée (F). Mediterranean Rosefish (E).  
سمكة من السبوج اعطائها البحر الابيض المتوسط . طولها  
نحو ٢٢ سم . ثوبا الى الريدة الفضية الموهجة بالاخضر  
الوردي . زعانفها مجلدة وبزركشة بالاخضر الرصاصي  
المراج . زعنفتها الشرجية مسلحة بمنخنس حاد || لحمها  
كائن الصفت مأكول .

١٣١٩٩ - سَبْتِيْو

Ardoise (F). Slate (E).  
حجر طري التركيب سهل التصفيح رصاصي اللون  
ازرق المراج او اسود . يستعمل استعمال الفريد في تغطية  
سقف البيوت .

١٣٢٠٠ - سَبْتِيْوِيْسمَة \*

Sporonema  
جنس فطور مجهرية من فصيلة البلاميات . انواعها قليلة  
عموده الاذي . بكينديتها تبدو مقلقة ثم تنمزق عند  
اطراف جولها . بونفاها بيضية او اسطوانية الشكل ،  
بسيطة شفاقة .

١٣٢٠١ - سَبْتِيْوي \*  
Ardoisé (F).

Salte-colour, Bluish-grey (E).  
نمت وصفي يطلق عل ما كان لونه لون السور .

S. nux vomica سترينكوس القيء، جوز القيء.

S. ignatii إينياس، فول إينياس

S. icaja إيكاجا

S. dewevrei دوفري

S. colubrina كوليرينا

S. ligustrina ليفستينا

من فئة النباتات الجحالية التي تسم الدم والتي كان استعمالها على الحراب شائعاً فيها مضى عند زواج أفريقية وامريكة نخص بالذكر :

S. toxifera سترينكوس توكسيفرا

S. rouhamon روهامون

S. curare كرار

S. castelnaei كستلي

لحاء اشجارها طيبة وبعضها يفيد الكلب والجذام .

١٣٢٢٢ - سترينكوس القراح ، نقد ، نقد

Strychnos potatorum (S). Strychnos des buveurs (F). Clearing nut tree (E). Bergkrähenaugenbaum (D). Noce potatora (I).

شجرة من السترينكوس هدية المنبت كبيرة القذ داتحة . ثمارها مأكولة لب ، بزورها عادمة الناصر السامة ، تروق الماء المكر وتنقيه .

١٣٢٢٣ - سترينكوس القيء \* ، جوز القيء

Strychnos nux-vomica (S). Strychnos vomiquier, Vomiquier (F). Nux vomica tree (E). Brechnussbaum (D). Noce vomica, Fungo di levant (I).

شجرة داتحة متوسطة القذ . ساقها كهياها الجاه . اغصانها سرسة . افنانها شائكة . اوراقها بيضية النصل ، خماسية المروق . ازهارها هامي الازيتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها كروية بحجم التفاح لونها الى الصفار البرتقالي . سيقانها لباني التركيب ، ابيض اللون مأكول . بزورها نحو ١٥ وفي لاقياسة الشكل والقذ . لونها الى الكهية الندياء يملوها زغب هليي الشكل اسمر اللون . وعده البزور تحوي :

١ من الى ١.٩٪ سترينكين

٥٧ الى ١.٥٪ بروسين

ويستدل من الهيدروليز ان تركيبها المضوي يشمل ١.٥٪ من المنوز و٨.٥٪ من الفلكتوز .

١٣٢٢٤ - سترينكوس النوبة

Strychnos innocua (S). Strychnos inoffensif (F).

شجرة من السترينكوس مهدا النوبة ثمارها مأكولة البلب اللذيذ الطعم . بزورها عادمة الناصر السامة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية المعوية .

١٣٢٢٥ - سترينكوس إينياس \* ، فول إينياس

Strychnos Ignatii (S). Strychnos Ignatier, Fèves de St Ignace, Vomiquier, amer (F). St Ignatus bean (E). Bittere Ignatie, Ignatienbaum (D). Fava di Sant' Ignazio (I).

جنية عارضة سريعة من السترينكوس . مهدا جزر الفيليين وزرع في الكوشنشين والمند الشرقية . اوراقها بيضية الشكل ذائقة . ازهارها بيش . ثمارها كروية بحجم البرتقال الصغير . قشورها ملس ، لونها الى الصفار

١٣٢٢٤ - ستر الحشن هي البلادون ، اطلبه .

١٣٢١٥ - ستر خديجكة هي وزال الشرق ، اطلبه .

١٣٢١٦ - سقالة Résidu (F). Residue (E).

هي الرذالة من المواد النباتية المصنوعة كفل ، لسان والشوندر والزيتون .

١٣٢١٧ - سترانج Stratege, Stratégiste (F). Strategus, Strategist (E).

من كان اختصاصه السترية .

١٣٢١٨ - سترانجي Stratéique (F).

Strategic (E).

ما هو نخص بالسترية على اختلاف اهدافها .

١٣٢١٩ - سترانج Stratéique (F). Strategy (E).

السترية فن تنظيم القوى الحربية والسياسية والاقتصادية والمهنية عندما تدعو الحاجة لان حالة الهجوم ام في حالة الدفاع او بالتوسيع تعتبر السترية السياسية فن ترتيب وتجهيز وتوجيه جميع الاعمال المترتبة في اطار مصلحة معينة .

١٣٢٢٠ - سترولسيوم Strontium

معدن اصفر اللون يوجد في الطبيعة مزوياً ببيض المادان والناصر اغصانها الرصاص وياء البحر || يرمز (ست-Str) وزنه الاتومي ٨٧.٥ وقلته النوعي ٢٤٥ || ناقلته الكهربائية ضعيفة . يفكك الماء بالحرارة الطبيعية وينتج مع الكور واليود والكبريت . اما اطلاقه الصناعية المختلفة فهي ما يتجم عن مزيج بمختلف الحوامض .

١٣٢٢١ - سترينكوس ، سترينكوس Strychnos

جنس نباتات برية وزراعية . من فصيلة اللوغانيات . انوعاه ٦٥ تقسم الى ثلاث فئات . فئة النباتات الصحية ، الطبية ، غير المؤذية . فئة النباتات السامة . وفئة النباتات الجحالية (الكراريز) . معظمها اشجار ونجيرات ونباتات عارضة وبعضها عشبي || مهدا البلاد الاستوائية . اوراقها منقطة متعاقبة كاملة . ازهارها علقية التجميع ، ابطية او تاجية الازيتكاز . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية اللحم ، لحمية لب ، ليفية القشرة . بزورها تحوي بعض الجواهر القمالة والمواد الطبية النافعة ، والقلوية السامة كالسترينكين والبروسين والكرار . لحاء اشجارها يستعمل في علاجات الاراض الجلفدية . اغصانها تنفع الاراض المصيبة || من فئة النباتات غير المؤذية والطبية نخص بالذكر :

سترينكوس ايبوغا S. iboga

« اينوكوا S. innocua

« بوتاتوروم S. potatorum

« سبنوزا S. spinosa

« فاكاكوا S. vacacoua

« كوكولويدس S. cocculoides

« ميلانوكاربا S. melanocarpa

من فئة النباتات السامة التي تقضي على الجهاز الهويي نخص بالذكر :



سترينكوس القيء



سترينكوس إينياس





مثل ناسك

١٣٢٢٣ - ستيرارين Stéarine (F). Stearine (E).  
مادة دهنية قوامها الكليسيرين وأحد الحموض الدهنية.  
تستخرج خاصة من شحم الحيوانات لا سيما شحم الالمام.

### ١٣٢٢٤ - ستيكينيّة

الستيكية طائر يشبه البهام (يحيط المحيط).

١٣٢٢٥ - ستيرير Stère (F). Stere (E).  
وسدة قياسية مؤلفة من جهاز خاص يستحب متراً كمكباً  
واحداً من الحطب.

١٣٢٢٧ - ستيريرس ساحير Satyre circé (F).  
هو الحيان الساسر، اطليه.



ستنتور، زيات

١٣٢٢٨ - ستيرانوس Styranus  
جنس فطور مجهرية من عارة الحيوانات فضيلة  
الكحييات. يتميز بكبرياته الفارشة الطرف الغرضي  
الشكل. كنانده هليية الازنكاز سبهية التصبع سمراء  
اللون || انواعه قليلة جميعها رمية تعيش عل المواد النباتية  
والغرضية المنحلة.

١٣٢٢٩ - ستيليسبوروس Stilibospora  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات. انواعه قليلة  
المدد والاذى تركب حماء بعض النباتات الحرجية.  
يتميز بويضته الكتيبية المخلقة التي تقلد بويضها من فتحة  
ضيقة توصدها بمد القلف || بيوغاتها اسطوانية -  
عروطية، موزرة، وباعية الانقسام، سمراء اللون.



ستيليسبوروس

١٣٢٤٠ - سترروب جيتار Scythrops novae-Hollandiae (S).  
Scythrops géant (F).

طائر من فصيلة القيقويات ورثة المتسلقات، موطنه  
يمتد من ماليزيا الى استراليا || جسمه كبير القند يطول  
نحو ٦٠ سم. يسلطه نحو ٩٠ سم. ثوبه الى الكهبة  
المرقوفة بالابيض والاسود. رداؤه الى انخضار الزئي المالح.  
متفاده كبير وضلع. حدة عينه غائبة اللون. عينه مطوقة  
بجدار اسمرط || اخلاقه هنية لكنه كثير البيل والحذر.  
يميش جماعات قليلة العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢.  
قوته الرغويات يحمل اصداقها متفاده الصلح ثم البزور  
والحشرات اخضايات الانجسة الجراد || طرانه  
طويل الشوط قليل التصديد والتبهبه || الاثني لا تمشش  
بل تقصع البيضي في اعشاش خريفا من الطير ولا تقصع  
في العش الواحد اكثر من بيضة.



سزوب جبار

١٣٢٤١ - سنج Scing (F). To coat (E).  
سج الحائط: سمحه بالطين الرقيق. والحسجة هي الشجة  
التي يطل بها البطين وفي المائلة والملاق والمسلط والمطاط.

١٣٢٤٢ - سنجاج Enduit (F). Coating (E).  
الطلاء الرقيق مها كان مصدره وبها كانت غايته.

١٣٢٤٣ - سنجاس Pleuronectes (S).  
Pleuronecte (F). Pleuronect (E).  
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة جانيات العمود ورثة  
المسلاوات || انواعه المعروفة عشرة. اصطلحها شلوط البسر

البرتقال. سؤتها لباني مر الطم. بزوردا من ١٠  
الى ١٢ لونها الى الكهبة الزرقاء المالح يطولها زغب هليبي  
الشكل.

وهذه البزور تحوي: ١٥٪ من الستريكتين  
١٥٪ من البروسين.

٠٣٪ من الوبانين وفيها ...  
ويستدل من الميديرانز ان تركيها الضوي يشمل  
٤٤٪ من المنوز و٥٦٪ من البلكتوز.

١٣٢٢٦ - سترينكوس الغابون Jboga (S).  
Strychnos du Gabon (F).

نبات صهي جزيل النفع يدعى ليروفا، اصلها.

١٣٢٢٧ - سترينكوس شاليك Strychnos spinosa (S). Strychnos épineux (F).

نوع من الستريكتوز مهدد مفسكر. وهو شجرة صغيرة  
القد شائكة، ثمارها برتقالية الشكل والحجم. لبها  
مأكول غزير المصارة السكرية المسحبة الطم. بزوردا  
قليلة المدد عادمة العناصر الجلبالية.

١٣٢٢٨ - سترينكوس فاكاكوا، سترينكوس

مده غسسكر Strychnos vacuous (S).  
Strychnos de Madagascar (F).

نوع من الستريكتوز يكثر في مفسكر. شجرته متوسطة  
القد سرسه. ثماره كروية قطرها نحو ٥ سم. لبها  
برتقالي اللون مأكول، مصارته غزيرة، لذيلة، مسحبة  
وذكية العرف. بزور ثماره قليلة المدد، غالية  
من العناصر الجلبالية غنية بمادة البكتنوكوزين القلوية  
لكنها لا تؤذي الجسم البشري.

١٣٢٢٩ - ستيكروزا في الصقلاب السوري، اطليه.

١٣٢٣٠ - ستكل Néophron (F). Neophron (E).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريرات.  
انواعه قليلة جميعها كبيرة الجفة تتميز برأس اصلع ومنق  
اغفر وسقط طويل وذنب قصير ومنسر احجن الهرة  
الشديدة الانعقاد || اشهر انواعه الستل التاسك.

١٣٢٣١ - ستكل ناسك Néophron pileatus (S).  
Néophron moine (F).

نوع من الستل طوله نحو ٧٢ سم. يسلطه ١٦٠ سم.  
قوبه الى السمرة الكسنتية. عنقه اغفر الريش اغفر اللون.  
رأسه اصلع احمر. منفره ازرق. رناده وغضاله رصاصية.  
موطنه البلاد الحارة والمعتدلة. يعيش جماعات. سره  
لاقياس المدد. يآلف ضواحي المدن والساكن || قوته  
الجيف وقامة المدن. انشاء بيض ثلاث بيضات تحضها  
بمنوبة الذكر نحو ٤ اسابيع.

١٣٢٣٢ - ستيكستور \*، زيات Mycetes (S).

Stentor, Hurlleur, Singe hurlleur (F). Howler,  
Howling monkey (E).

جنس قرود امريكية من فصيلة السوسيات. انواعه  
سنة موطنها غابات البرازيل والبراغواي والفواتيالا  
اجسامها ربة، وروسها غليظة. اسطفاها بأزرة  
على ذكوردا كثيفة الشعر الطويل. اذنانها مستطيلة  
اخاذه. الياها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر || قوتها  
البرام والازهار والاوراق والتار. اناتها تقصع جرواً  
واحداً.

## Combustible

١٣٢٥٤ - سَجُور ، سَجُور  
هي الوقود من اي نوع كانت .

## Dicline

١٣٢٥٥ - سَجِين  
نمت تمر في يطلع على كل نبات لاقلامي الانظام  
الزهرى .

## Marne calcaire (F).

Calcareous marl (E).

١٣٢٥٦ - سَجِيل  
تراب كثر فيه نسبة المواد الجصية من كربونات  
الكلس مع بعض الصلصال والقليل من الرمل والمواد  
العضوية .

## Engraissement (F).

Fattening (E).

١٣٢٥٧ - سَح ، سُوح  
هو تسمين الماشية . يقال سحت البقرة اذا سميت  
غاية السمن . فهي صالح وساحة ج صالح ويصح .

## Cachrys (S).

Cachryde (F). Cachrys (E).

١٣٢٥٨ - سَحَاء  
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة النيبات .  
انواعها المعروفة قليلة العدد منها في بعض مناطق الشرق الادنى  
واسيا الوسطى والشالية || سوقها منتصبه خلية السحاء ،  
وقبلتها الفروع او كثيرتها بالنسبة الى النوع . اوراقها  
ضيقة التصال المستطيلة ، كثيفة الحمل والزغب . ازهارها  
صويالي التجميع . ازهارها صفراء اللون . تنويرها ربيعي .

## Cachrys (S).

Cachryde (F). Cachrys (E).

١٣٢٥٩ - سَحَاء  
هو الزباد نباتات عشبية طرية مغري تجرس ازهارها النحل .

## Nuage (F). Cloud (E).

١٣٢٦٠ - سَحَاب  
هو الغيم كان فيه ماء او لم يكن فيه . راسع غيم .

## Synotus (S). Synote (F).

١٣٢٦١ - سَحَاءة \*  
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات له نوعان يتميزان  
بأذنانها المستترسة المتدغمة فوق الجبهة . مناعيرها  
جوفية تظهر عند قضم الفروضة . اذنانها مستطيلة .  
موطنها فصح الارباء يشل في بعض مناطق اسية واروبه  
وافريقية السحاة الكسول والقسم الاكبر من امريكه  
الشالية والجنوبية السحاة الامريكية . ج سحا .

١٣٢٦٢ - سَحَاءة كَسُول \*  
Synotus barbastellus (S). Synote barbastelle, Barbastelle (F).

نوع من السحاة موطنها فصح الارباء يمتد من الهند وبلاد  
فارس الى الشرق . الادنى واروبه وافريقية الشالية .  
قوسها الى الرتبة السمرام يبق مع اقترابه من شبح الظهور .  
وبرها اسود القاعدة اصعب الطرف . جسها روم قصير  
طوله نحو ٩ سم ، اما بسطه فنحو ٢٧ سم . والذنب ٥ سم .  
تميش منفردة . ذكورها لا تقرب انثاهما الى في زين  
الكوم . الانثى تقص جروين تحملها حتى القطام .  
طيرانها بطيء تألف جميع الاكابر لا تبيت اسيراً واحداً  
في محل واحد . وهي لا تغشى المطر والواضع . مسرعا  
يؤدم من الغروب الى فحة الليل وين القصر العميق الى  
البروز . قوتها الحوام والذباب والحشرات .

١٣٢٦٣ - سَحَاح ، سَكَاك  
Air, atmosphère (F).

Air, Atmosphère (E).

هو الهواء والجو . « حلق النسر في السكاك » .

الايض المتوسط والمحيط . الاطلسي والمهادي والهندي ||  
اجسامها بيضية او اهلجية الشكل ، مطلة الجرم .  
اطولها تراوح من ٣٠ الى ٩٠ سم . رؤسها صفيرة ،  
مستديرة الاضلاع . زعانفها الظهرية والشرجية لاحقة تتصل  
بالذيلية || لونها جيدة الصنف ، لذيلة العلم .

١٣٢٤٤ - سَجَاس مُؤذِر \* ، خَوَاتِم ، أُم

الزُورْد

Pleuronectes zebra, Solea  
zebra (S). Pleuronecte zèbre, Synapture zébré (F).  
Striped Pleuronect (E).

سمكة من السجاس . اعطائها بحار البلاد الحارة والبحر  
الايض المتوسط || جسها اهلجي الشكل بطول من ٣٠  
الى ٤٥ سم . خضاب ثوبها يختلف بين البين واليسار .  
الجانب الايمن اغبر اللون ، يعلوه تأذير شديد السمرة يمتد  
كالاطواق من الخطم الى طرف الذيل . الجانب الايسر الى  
الشفة الفراء || رأسها صغير الجرم ، مستدير الخطم .  
استناها صغيرة ، ذرية . عيناها صغيرتان ، لامتناهيتان ،  
يمينا الاركان . زعانفها الظهرية والشرجية متصلة  
بالذيلية || لحمها جيد الصنف ، مأكول .

١٣٢٤٥ - سَجَاف  
Diaphragme (F). Diaphragm (E).

حجاب حاجز يستعمل لتحديد فوطة النور في آلة التصوير  
واشباهها .

١٣٢٤٦ - سَجَّة اللبن الكثير الماء وهو ارق ما يكون .

١٣٢٤٧ - سَجَر سَجَر  
سجرت البقرة : حنت عند حلبها .

١٣٢٤٨ - سَجَرِيْق  
هو الاريجوان ، اطلبه .

١٣٢٤٩ - سَجَسَج  
Terre moyennement compacte (F). Fairly compact soil (E).

الارض ليست يصلبة ولا سله ، اي المتوسطة الاندماج .

١٣٢٥٠ - سَجَج  
Roucoulement (F). Cooling (E).

صوت القمري .

١٣٢٥١ - سَجَل  
Mamelle volumineuse (F).  
Voluminous udder (E).

السجل : الضرع العظيم . بقرة سحلاء : عظيمة الضرع .  
وضرع سحيل واحبل : متدل واسع .

١٣٢٥٢ - سَجَل عَقَارِي  
Registre foncier, Livre foncier (F). Register landed (E).

هو السجل الرسمي الصادر عن الدوائر العقارية بين  
المنطقة ورقم العقار وساحت واسم المالك وطريقة امتلاكه  
والحقوق العلية المنصبة على العقار . ومن خصائص  
هذا السجل ان قيوده منشئة للمحقوق التي تشير اليها .

١٣٢٥٣ - سَجَلَاط \*

Nyctanthes (S).  
Nyctanthe (F). Arabian jasmine (E). Nächstblume (D).  
Nictanto, Gelsomino d'Egitto (I).

جنس نباتات جنينية فناء من سبط الياصمينيات وفضيلة  
الروزيئات . منها في البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة ،  
بيضية او اهلجية الشكل ، ازهارها صويالي التجميع  
محورية وتاجية الاركان . جملة الشكل ، قشدية او قشبية  
اللون . تفتتح عند غروب الشمس من عرف ذكي اخاذ  
وتنطق مع انبلاج القمر .



سجاس مؤذر



سحلاء



سحاة



سحاة كسول

Lima (S).

\* سحابة - ١٣٢٧٤

Aérobiose (F).

١٣٢٦٤ - سحابة °

حياة الكائنات السحابة (الهوائية).

Lime (F). Lima (E).



سحار

جنس حيوانات بحرية من الرغويات فصليات الخياشيم عادات المتأهب وفضيلة السحاليات. أنواعها المعروفة نحو ٤٠٠ بعضها من متحجرات الأراضي الثانوية والبعض الآخر، المعاصر، منتشر في جميع بحار العالم || أصدافها شبه مخروطية الشكل، متساوية المصارعين، شائعة التخذيد، ملونة بكثرة فيها الأبيض المزرق بالاحمر. بعض أنواعها يطول نحو ٦ سم. || تعيش في الرمال وتنقل بسرعة مذهلة تجديداً بمصرها.

Varanidae (S).

\* سحالي - ١٣٢٧٥

Varanides (F). Varanidae (E).

اسم شامل يطلق على بعض اجناس الورل. تتميز باستتالة اجسامها وبالسنتها المشقوقة الزججة. أنواعها زائفة الاولان ثمان الوسط الذي تعيش فيه.

Limidae (S).

\* سحاليات - ١٣٢٧٦

Limides (F). Limidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات فصليات الخياشيم، عادات المتأهب. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد. معظمها من متحجرات الاباح الثاني. الانواع القليلة المعاصرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بأصدافها الشعاعية التخذيد، يكثر فيها الشكل القروطي || اعراف اجناسها وأشهرها السحالة.

Cerbera (S).

\* سحام - ١٣٢٧٧

Cerbère, Manguier laiteux (F). Indian mango tree (E). Ostindischer manghasbaum (D). Cerbera (I).

جنس أشجار دائمة خضرة كبيرة اللقد من فصيلة الفليات. انواعها قليلة أوراقها معتقة متناوبة العلجيلة لصلها جلدي السج عايق الخضر. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها بيضيه الشكل واللقد، وحيدة المجمة الكبيرة الصلبة. وهذه الاشجار بجميع اجزائها من الساق الى الورقة والثمرة غزيرة العصارة الجعالية المميتة.

Puccinia

\* سحام ° - ١٣٢٧٨

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات يتميز بدهاماته اللاقحسية الشكل التي تغلب فيها الاستدارة والصفانة. مشجحة الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا السج النباتية. فدانها ثملوية ميمرة او متقاربة مرصوفة التجميع. انواعها الممؤدة المعروفة عديدة اشهرها ما يتبع.

١٣٢٧٩ - سحام أسف °، سحام الحنطة °

Puccinia trititica (S).

Rouille brune du blé, R. b. du froment (F). Orange leaf rust (E). Braunrost des weizens (D).

فطر مجهرى شديد الالذى يصيب الزرع في جميع اقسامه فينفص الانتاج ويؤدي الصف اذ يفقده بعض المواد الغذائية. مظهره الخارجي بثور قرصية ميمرة، لانظامية، مستدرة الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ١٥ م. تركيب النصل على صفحتيه ولا تمتع من اللحم والساق وصفيات السنايل. ثيلو صلبة اللون، برتقالية الاطراف، ثم تنحرف الى الخمرقة فالسفرة. تنفجر عن غيرات بوقية شديدة النضوية لونها الى السفة تتطير كالحباب || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني او احد الفوطاير الزراعية المرتكزة على الكبريت وملاح النحاس.

١٣٢٧١ - سحابة ° - Dumping (F). Dumping (E).

السحابة على اقتصادي تمارسه بعض البلاد على حمل صادراتها او على انواع مينة منها فتعرضها في الاسواق الخارجية بغير ادق من السعر الخلي حق وادق من ثمن التكلفة.

١٣٢٧٢ - سحابة ° - Pécule (F). Peculium (E).

المقتر من السحل. وبا اكتسبه وقته لنفسه المرووس. وبا قتر لنفسه السجين او الاسير طيل مدة عقوبته او اسره.

Ecale (F). Shell (E).

١٣٢٧٣ - سحابة °

هي قشر ابر والشير ونحوه.



سحاف الزيتون



سحابة



سحام



سحام اسف

## ١٣٢٨٥ - سُحَامُ الزَّرْعِ \*، مَرَقَ الزَّرْعِ \*

*Puccinia graminis* (S). Rouille noire, Rouille linéaire des céréales (F). Stem rust of grain (E). Schwarzrost (D).

فطر مجهرى يصيب أكثر النباتات النجيلية وأخصها الزرع فيغيب العصف والسنايل ويلسق الفطر بالمحصول. مظهره الخارجي بثور قرحية تملو نصال العصف فتنبو صغيرة مستديرة ثم تكبر وتتسلسل حتى تبلغ ١٢ م. لوها يكون إلى الشفرة المائقة ثم ينحرف نحو السرة عند ارتفاع بثره النسيج التي يعقبها التفجير ويطوع الغبار البويي || وقد يركب الزيدات والسيليات فينطقها ببثوره وقرصه الخيطية التي تنتهي نهاية بثور العصف. اضراره قد تكون جسيمة فيا لو مكنته العوامل الجوية من سرعة الانتشار || مكافحته صعبة تستوجب الكثير من العناية. يكافح :

أولاً - باستعمال الفُروب المعروفة بقوة مانعها والتي صار اختيارها اقليمياً في هذا السيل أو الفُروب الباكورية كالفلورس اورور (Florence aurea) الذي صار اختياره في لبنان وهو يقاوم هذا الوصم لانه يدرك باكراً قبل انتشار السحام .

ثانياً - باجتنب الاكثار من عنصر الازوت لانه ينشط المواد اللبية والخضرية ويؤخر الادراك فيمرض الزرع إلى الإصابة .

ثالثاً - باستعمال الكبريت الميكروني تمغيراً على الزرع عند ظهور الوصم. وهناك فواطر اخرى عديدة يمكن استعمالها لكنها باهظة الثمن .

رابعاً - بالقضاء على جميع نباتات البربريس (الأثرارة) القريبية والبيدية من الحقل لانه الوجج الثابت والبؤرة الحقيقية التي يعيش فيها عليها السحام .

## ١٣٢٨٦ - سُحَامُ الزَّرْعِ الأصفر \*، مَرَقُ الأصفر \*

*Puccinia glumarum*, *P. rubigo-vera* (S). Rouille jaune des céréales (F). Yellow rust of wheat (E). Gelbrost (D).

فطر مجهرى شديد الاذى يصيب الزرع في جميع اصفائه وعلى اختلاف انواعه وضرره || مظهره الخارجي يتتابع على ثلاث مراحل . في الاولى بثور صفر صغيرة اللد متصلة متتابعة في شكل الخط تركب النصل في زامة الاخير بموازة عروته . وقد يبلغ امتدادها من ٢ إلى ٣ سم. وعند تحوطها المتوازية من الثلاثة إلى الستة. وفي المرحلة الثانية اصفرار على نصل العصف ينتهي في الزام الاخير على شكل قدد متقطعة متوازية تحمل في جوفها بوع السحام الاصفر الزاهي . وفي المرحلة الثالثة بثور عسبة الشكل رافعة تركب العصف بدون انتظام وتصيب السوق والاعقاد والسنايل . صفرتها فائقة ذعية الملاج || يكافح بالكبريت الميكروني تمغيراً على الزرع منذ المرحلة الاولى . كما يحسن تلف جميع النباتات الطرية وذلك باستعمال المبيدات الخاصة . ومن المستحسن ايضاً حرق الحقل أو أثر الحصاد .

## ١٣٢٨٧ - سُحَامُ السَّيْسَمِ \*

*Puccinia antirrhini* (S). Rouille du muflier (F). فطر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على السيم فيغيب الاوراق ويضعف النبات وقد يسبب موته || مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة حطية اللون شقراء الاطار فتגיע التجميع تملو نصال الاوراق على صفحاتها السفلى

## ١٣٢٨٠ - سُحَامُ التَّرْتَشُول \*

*Puccinia helianthi* (S). Rouille du tournesol (F). Sunflower rust (E).

فطر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على مختلف انواع وضروب الترتشول . يركب الاوراق فيؤذيها وقد يسبب جفافها ويوقها بالكر . مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة لاقامية التجميع والارتكاز لوها إلى الصهبة المائقة تركب النصل على صفحة السفلى فتغيب التسج وترقرل التسج وتصب الصفقة قلقة انتاج البذر || يكافح باستعمال الادوية الفطورية اخصها المركزة على عنصرى الكبريت والنحاس .

## ١٣٢٨١ - سُحَامُ الثَّرَغُولِ \*، مَرَقَ الثَّقْبِيَّانِ \*

*Puccinia bromina* (S). Rouille des bromes (F). Bromus rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على جميع انواع وضروب الثرغول وهو كثير الانتشار في اوروبه وافريقية الشمالية || مظهره الخارجي بثور قرحية ميمرة او متاخة تملو النصل على صفحة العليا فتنبو صهباء اللون وردية الاطار الضيق ثم تنحرف إلى الجؤوة ويثقي عليها حتى تفجيرها || يكافح عند الاقتضاء مكافحة غير من السحام .

## ١٣٢٨٢ - سُحَامُ الثُّومِ \*، مَرَقَ الثُّومِ \*

*Puccinia allii* (S). Rouille de l'ail (F). Garlic rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على بعض نباتات الفصيلة الزنبقية واعضا الثوم والكراث فتركب الاوراق دون ان يقع بها الاضرار. مظهره الخارجي بثور لوها إلى الصهبة، مصفرها ذماغن الفطر تملو نصل الاوراق بدون انتظام ولا قياس ثم تنحرف تدريجياً نحو الجؤوة البنفسجية وتستقر عليها حتى تفجيرها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

## ١٣٢٨٣ - سُحَامُ الخَبَازِيَّاتِ \*

*Puccinia malvacearum* (S). Rouille des malvacées (F). Hollyhock rust (E). Malvenrost (D).

فطر مجهرى يصيب أكثر الخبازيات في اوراقها وسوقها وزهارها فيغيبها ويذبلها || مظهره الخارجي بثور صغيرة تركب الاوراق على صفحاتها السفلى وتركب السوق وكؤوس الزهر . تبو برتقالية اللون يحيطها اطار بنفسجي ثم تنحرف إلى الجؤوة السمراء حيث ترغف كالعالمين دون ان تفجر البثرة. وبعد ذلك ياربعة أو خمسة اسابيع تظهر ذماغن الفطر على التنايل فتنبو حطية اللون ثم تحوّل إلى حلية فضية يعلوها مراح ايض . يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المحلول ١٪ عند ظهور الفطر وينبغي مرة ثانية موعدها بعد الاول باسبوعين || ومنهم من استعمل برمنثانات الليتاس وهي مفيدة اذا استعملت في هذه الامر ولكنها تصعب عذبة النفع عند ظهور الدمانع .

## ١٣٢٨٤ - سُحَامُ الدُّورَةِ \*، مَرَقَ الدُّورَةِ \*

*Puccinia maydis*, *Aecidium oxalidis* (S). Rouille du maïs (F). Maize rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على الدرة في جميع البلاد والاقاليم . ويؤذيها تميش على الحماض ومنها تنقل إلى الدرة . وهو على صف اللدة ذماغن ميمرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحة بموازة الفلج فتنبو فيبدو التسج النحار قليل الخصب اشقر البثور المتوجة بالاصفر ثم ينحرف لوها إلى الاصهب فالخضلي المايق || اضراره غالباً محدودة لا تستوجب العناية .



سحام الترتشول



سحام الثرغول



سحام الثوم



سحام الخبازيات



سحام اللدة



سحام الزرع



سحام الزرع الاصفر



سحام السيم

## سُحَامُ الشَّيْرِ - سُحَامُ قَصَبِ السَّكَّرِ



سحام الشعير



سحام الشفان



سحام الكرز



سحام الكرزاتين



سحام الحليون



سحام النعنع



سحام قصب السكر



سحام الهندباء

السفل فتسبب جفاف النسج والنصل || وهو على السوق بثور ميمرة قليلة المدد لأنها إلى الصبهة العافية الحطية المواج || يكافح بقلم الأوراق المصابة وينضخ النبات بسائل يورده الحليد الأول ٢٪

### ١٣٢٩٣ - سُحَامُ الْكُشْمِيَّةِ

*Puccinia ribis* (S). Rouille du groseillier (F).

فطر مجهرى يتطفل على الكشمش فيؤذيها وقد يميت . مظهره الخارجي يقع نسيمة تركب نصل الأوراق النامية فتطويها . تبدو شقرة اللون ثم تنحرف إلى السرة الزاهية وتنقش بيض السنج المنحرفة التي يبعثها يباس النصل وضعت الشجرة || يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكسيلية المحلولة ١٪ نصفاً على الكشمش قبل ازهاره .

### ١٣٢٩٤ - سُحَامُ النَّعْنَعِ

*Puccinia menthae* (S). Rouille des menthes (F).

فطر مجهرى يتطفل على بعض الشفويات اعصها النعنع . مظهره الخارجي بثور صغيرة مهباه اللون تركب الأوراق على صفحتها السفلى وتملأ الجاذبين والتواقي فتعزل سرة النسج وتسبب ذبول الأوراق وسقوطها بعد ان تجبن التواقي وتحول دون سيات نفاشها || يكافح بالتتابع وحرق النباتات المصابة قبل تقضي الرمم . وين المستحسن مد النعنع بالازوت النيتريكي الذي ينشط على مقاومة هذا الفطر .

### ١٣٢٩٥ - سُحَامُ الْحَلِيُونِ

*Puccinia asparagi* (S). Rouille de l'asperge (F). Asparagus rust (E). Spargelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على سوق الحليون فيطعنها ويؤذيها . مظهره الخارجي بثور قمية الشكل وردية اللون فوق السوق ميمرة بدون انتظام فتعزل سرة النسج وتقتصر النبات . يكافح باستعمال عدة وسائل اولها سائل يورده نصفاً على النبات . ثانياً الكبريت متعزراً على التربة والنبات . ثالثاً ديتير وكرازيلات الصودا . رابعها زرع الضروب المنيعة التي تقاوم هذا الفطر .

### ١٣٢٩٦ - سُحَامُ الْحَشْدَاتِيَّةِ

*Puccinia elchorti* (S). Rouille des chichorées (F).

فطر مجهرى يتطفل على اختلاف انواع وضروب الهندباء فيصيب الأوراق ويحطها || مظهره الخارجي بثور وافنة مستديرة لأنها إلى الصبهة تملأ النصل على صفحته السفلى فتطعي وتتعزل نحو النبات || يكافح باستعمال سائل يورده المحلول من ٥٠ إلى ١٪ حين ظهور العوارض .

### ١٣٢٩٧ - سُحَامُ قُرْمُزِيّ ، مَرَقِ قُرْمُزِيّ

*Puccinia purpurea* (S). Rouille du sorgho (F).

فطر مجهرى يتطفل على الذرة البيضاء فيؤذيها ويضعف انتاجها || مظهره الخارجي يقع نسيمة قرمزية اللون تملأ المصمت وأغماره فتطعنها وتسي إلى نحو النبات بعد ان تعزل سرة نسف || يكافح مكافحة غيره من السحام .

### ١٣٢٩٨ - سُحَامُ قَصَبِ السَّكَّرِ ، مَرَقِ الْمَصَانِ

*Puccinia kuehni*, *Uromyces kuehni* (S). Rouille de la canne à sucre (F).

فطر مجهرى يصيب قصب السكر دون ان يؤذيها . يسبب له عطياً يذكر || مظهره الخارجي يقع مستطيلة او مردنية الشكل ميمرة بدون انتظام قليلة المدد تركب

تسبب تقجير بشره النسج وصلب الأوراق الذي يبعثه سقم النبات وذبوله || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني متعزراً على النبات منذ ظهور الفطر على ان تعاد العملية من المرات إلى الثلاث مرات . ومنهم من ينصح باستعمال سلفور اليوتاسيوم المحلول ٠,٨ ٪

### ١٣٢٩٨ - سُحَامُ الشَّيْرِ ، مَرَقِ الشَّيْرِ

*Puccinia hordei*, *P. anomala* (S). Rouille naïne de l'orge (F). Barley rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على الشعير فيؤذيها ويضعف من مقدوره الانتاجي ومن صفاته المنشودة في صناعة البيرة . مظهره الخارجي بثرة ميمرة تملأ نصل المصبة عند خب الزرع وتكون بثرة واحدة على النصل الواحد . تبدو بياضاً اللون ثم تنحرف نحو البرتقالي وتنقش عند الفجاءها باللون الاصهب الا انهم || يكافح مكافحة غيره من السحام .

### ١٣٢٩٩ - سُحَامُ الشُّوْقَانِ ، مَرَقِ الشُّوْقَانِ

*Puccinia coronata*, *P. coronifera*, *P. lolii* (S). Rouille couronnée de l'avoine (F). Crown rust of oats (E). Kronen rost des hafers (D).

فطر مجهرى يتطفل على الشوفان وعلى بعض النجيليات البرية . أثيراته تعيش على البقيات والخلافات . تظهر خلال شهر سبيران فتبدو يقع ممراسة صفر او حر مستديرة صغيرة على صفحة النصل السفلى يقابلها على الصفحة العليا انتفاخات في النسج والبشرة لأنها إلى الجوزة || وهو على عصف الشوفان خالط ميمرة بدون انتظام تركب النصل ورغمة على صفحتها فتبدو يقع مستديرة ومستطيلة ميمرة وممراسة كالمائة لأنها إلى الصبهة الزاهية ثم تنحرف إلى الجوزة وتنقش باللون البنفسجي المايك || يكافح مكافحة غيره من السحام بعد القضاء على دوجه الطبيعي- البثق او الخلف .

### ١٣٢٩٠ - سُحَامُ الْقَصَبِ ، مَرَقِ الْقَصَبِ

*Puccinia vineae* (S). Rouille de la pervenche (F).

فطر مجهرى يركب مختلف انواع القصاب فيؤذيها وقد يقضي عليها || مظهره الخارجي بثور مستديرة كيفية التجعير تركب الأوراق على صفحتها السفلى وتصيب السوق والفروع . تبدو مهباه اللون ثم تنحرف نحو الحطية حيث تتفجر من بوع هبابي اسمر || اما الأوراق المصابة فتبقى ميمرة القند رافعة النصل الخشن الهديم الحوية || يكافح عند ظهور الرمم باستعمال سائل يورده المحلول ١٪

### ١٣٢٩١ - سُحَامُ الْكَرَزِ ، مَرَقِ الْكَرَزِ

*Puccinia cerasi*, *P. pruni-pinosae* (S). Rouille du cerisier, R. du pêcher (F). Rust (E). Zwetschenrost (D).

فطر مجهرى يصيب الكرز والدراتي والحوخ فيؤذيها بضم أوراقها دون ان يقع بها اضطراباً تذكر || مظهره الخارجي يقع صفر تركب النصل على صفحته السفلى يقابلها على الصفحة العليا مواج اخر او بنفسجي يدمو بعض الوقت ان تنفجر البثرة من بوع هبابي اصهب اللون .

### ١٣٢٩٢ - سُحَامُ الْكِرْيَازِيَّةِ

*Puccinia chrysanthemi* (S). Rouille du chrysanthème (F).

فطر مجهرى يصيب الكرزاتين في أوراقها وسوقها فيؤذيها . مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة ميمرة قليلة المدد لأنها إلى الصبهة الزاهية تركب الأوراق على صفحتها

تتركب من ١١ فصلة . اغادها لاحقة . جرامها نشطة .  
اراسها ثلاثية المقل || أشهر اجناسها السحلب والسهلقة .

Traffic Illicite (F).

١٣٣٠٤ - سَحْتٌ

Illicit traffic (E).

السحت والسحت الرقاعة المظورة او ما سقته من  
مكاسب محرمة .

Bourgeon à fleurs (F).

١٣٣٠٥ - سَحْتَنَة

Blossoms bud (E).

الاية القلطة في اللمن .

Abrasion (F).

١٣٣٠٦ - سَحْجٌ

Abrasion, Attrition (E).

السج الاستهلاك بالاحتكاك المستمر كسج الأسنان  
في اللم وكسج مياه البحر لصخور الجاحد .

Traumatisme (F).

١٣٣٠٧ - سَحْجٌ ، سَحْجَةٌ

Traumatism (E).

الآثر الذي يحدث من غش أو جرح . ج سجع وسجوج .

Broyage (F). Crushing (E).

١٣٣٠٨ - سَحْقٌ

دق الشيء اشد الدق .

Pécune (F).

١٣٣٠٩ - سَحْلٌ ، نقد

السحل النقد من الدراهم .

Chaetodon (S).

١٣٣١٠ - سَحْلٌ

Chétodon, Poisson papillon, Demoiselle, Bandoulière (F). Butterfly fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه عديدة  
جميعها صغيرة القد ، قصيرة ، مبططة ، عرضها يوازي  
ثلاثة ارباع طولها . ألوانها جميلة زائفة متراكبة يعلوها  
تجديع ممرس متقابل وزركشة بهية لامعة || موطنها  
بحار البلاد الحارة . انواعها الموجودة في المتوسط  
ثلاثة :

Chaetodon saxatilis (S).

سحل الصخور ، تقنوت

Chétodon saxatile (F).

Chaetodon argenteus (S).

سحل فضي

Chétodon argenté (F).

Chaetodon maculosus (S).

سحل ملطخ ، عروسة البحر

Chétodon maculé (F).

Salep

١٣٣١١ - سَحَلْبٌ

مادة نشوية تستخرج من بعض انواع السحلب الزراعي .

١٣٣١٢ - سَحَلْبٌ \* ، عَقَى الثَعْلَب ، خَمَى

الكتب ، قاتل أخيه ، سَطُورُون

Orchis (S). Orchis, Barbène, Satoryion, Salep (F).

Orchis, Lizard orchis (E). Bockersiemenzunge (D).

Orchide, Satirion, Testicolo di cane (I).

جنس اشباب عشقولة معمرة من فصيلة السحليات .

انواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبهشها زراعي

وتربي . يستخرج من ساقها بعض انواعه مادة نشوية

يستخدمها يبلخ كالحليب ويؤكل || اعرف انواعه

واشهرها :

Orchis maculée

سحل أبيض

Orchis d'Anatolie

سحل أناضولي

نصل المصف . تبو حطية ألون محملة بهالة ضيقة  
تبينة ثم تنحرف نحو السرة وتبقى على سبرتها حتى انفجارها .

١٣٢٩٩ - سُحَامٌ مَشَات \* ، مَرَقٌ الشَيْتَمُ

Puccinia dispersa (S). Rouille brune du seigle (F).

فطر مجهرى يتطفل على الشيلم فيؤذيه . مظهره الخارجي  
يتوارق حرقية مبعثرة بدون انتظام تركب النصل على  
صفحتيه وتصيب الاغداد والوق وعصيفات السنابل .  
تبو مستدرة صغيرة لونها ال صهوة ثم تكبر وتنفش  
فينصرف لونها الى الجؤرة وتفسر عن بوغ هبابي لونه  
الى الجؤرة السراء || يكاثف كثيره من السهام .

Pucciniaceae (S).

١٣٣٠٠ - سُحَامِيَّاتٌ

Pucciniacées (F). Pucciniaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة المعاميات تتميز بطيالتها  
اللاقية التركيب والانتظام || دعاماتها فردية او  
عديدة الاضية . بويضاتها فردية او شعبة الانقسام محملة  
على احيات (ركائز) شافهة غروية او ملونة جامدة  
وسرعة الطيب . ذنبينها حائصة تجمع الاهيمات كتيبا  
كانت || اجناسها عديدة . اشهرها زراعي واقتصاديا  
الثانية التالية : السهام ، الشول ، الصدقية ، الصنعة ،  
الضبهة ، الظفرة ، الكشولة والمهليلة .

Retrait d'agrément (F). سحب الموافقة

Right of consent (E).

عمل يجيزه القانون يقضي بالغاء الموافقة المتفق عليها .

١٣٣٠٢ - سَحِيلٌ قِرْمِزِيٌّ \*

Endomychus coccineus (S). Coccinelle écarlate (F).

Endomychus coccineus (E).

حشرة دامت من فصيلة السحليات ورتبة مفصليات الاجنحة.  
تألف الغابات والاحراج . خنافسها ويرقاتها تعيش على  
الفطور واشخاصها وعلى المواد النباتية المنحلة || جسمها  
صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الحمرة  
القرنزية يعلوها في وسط كرسها بقعة سوداء ويعلوها في  
ظهرها اربع بقع سود ، بقتان في كل غد . رأسها  
معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها مستطيلان ،  
صقيا الاطراف . ظهرها خفيف المؤثر المستدير اللامع  
غدها محززان ، كتيفتا الحمل . اراسها ثلاثية المقل ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلانة في اواخر  
ايار وتمتد حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتستنك  
في الليل || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو  
٨ م . جسمها سحكي التركيب ، قليل التقويس ، سداسي  
الرابعب ، اسر ألون ، جؤري الرأس ، كيف الزنب ، سداسي  
مبهر الخلب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة  
اسابيع يتقشر تحت قشور الانحجار المائلة ضمن صلجة  
متماكة الغشاء المركب من مواد نباتية معجونة بالريال .

Endomychidae (S).

١٣٣٠٣ - سَحِيلِيَّاتٌ

Endomychidés (F). Endomychidae (E).

فصيلة حشرات دامت من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد مبعدها البلاد المعتدلة الحرارة .  
تألف المواقع المنسوبة الرطوبة حيث تتكاثر الفطور التي  
تعيش عليها || جميعها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل  
تحتل المركز الوسطي بين القرنبيات والدمسوقيات . رؤوسها  
مستعرجة . زباناها معتدلة الطول ، صقية الاطراف .



سحام مشات



سحلب قرمزي



سحل



سحلب



سحلية

عينها صغرتان تلحفها اجفان شفاقة متحركة. اذاها خافتا الغشاء الصيواني الاثير الغلاف. عنقها متوصلة الطول والشفاة. جلدها متتابع التماثيل الدقيقة. ذنبها سريع يملؤها موج الحمل اغبر ينسجم مع الحيطان والحجارة التي تكثر من المكوث عليها. بيئاتها الشجري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعاً. تحسر قشارها بعد غروبها من بيئاتها باسبوع وتنفذ بعد ذلك باسبوع || الاثني ثقب من ٦ الى ١٢ شققة تطهرها في الربل او في المواقف الجنوبية المرض الدافئة || تسرح في التهار وتتسلق السطوح العمودية. قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحوام || تعتبر من الزحافات الناعمة.

### ١٣٢١٩ - سحلية خضراء \* ، سقاية خضراء ،

عظاية خضراء (S). Lacerta viridis (S).  
Lézard vert (F). Green lizard (E).



سحلية الحيطان

حيوان يروض من العطاء وفضيلة السقايات. موطن البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها يطول من ٢٢ الى ٣٦ سم. الاثني اكبر قدماً من الذكر. رأسها مخراي الثورن. عينها لوزيتان تلحفها اجفان شفاقة متحركة. اذاها خافتا الغشاء الصيواني الثني الغلاف. عنقها متوصلة الطول والشفاة. اصابعها دقيقة مجهزة بالظافر حادة. جلدها متتابع التماثيل الدقيقة. ذنبها سريع العطب. ثوبا اخضر اللون، اسف المواج، تملو قشرة عمرا زيتية تنتهي عند قاعدة الذنب. الذكر يتميز بزدها اللون ويلزق في النحر || بيئاتها الشجري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعاً. والاثنى ثقب من ٨ الى ١٦ شققة تطهرها في الجناة والديال || تألف المروج والاماكن الرملية. تسرح في التهار الاثني برفقة الذكر وتبيت معه في جسر واحد || قوتها الحشرات والديدان والذباب والحوام. تعتبر من الزحافات الناعمة.



سحلية خضراء

### ١٣٢٢٠ - سحلية رشيقة \* ، سقاية رشيقة ،

عظاية رشيقة (S). Lacerta agilis (S).  
Lézard agile, Lézard des souches (F). Agile lizard (E).

حيوان يروض من العطاء وفضيلة السقايات. موطن البلاد المعتدلة الحرارة. الاثني اكبر قدماً من الذكر. جسمها يطول من ١٨ الى ٢١ سم. رأسها مخراي الثورن. عينها صغرتان ملحوتان بابجان شفاقة متحركة. اذاها خافتا الغشاء الصيواني. عنقها متوصلة الطول والشفاة. جلدها متتابع التماثيل الدقيقة. ذنبها سريع العطب والانفصام || ثوبا الى الصبغة السمراء المنمشة بالاسود والاثير. بيئاتها الشجري يستمر نحو اربعة اشهر. الاثني تقص من ٦ الى ١٢ شققة تطهرها في الديال. تألف العمران والورع على السواء. تسرح في التهار. حبرها حيث ترتد في الليل تفق مستطيل تخلفه تحت جلوح الانجار المسطحة على التربة || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحوام || تعتبر من الزحافات الناعمة المفيدة.



سحلية رشيقة

### ١٣٢٢١ - سحلية وكور \* ، سقاية وكور ،

عظاية وكور (S). Lacerta vivipara (S).  
Lézard vivipare (F). Viviparous lizard (E).

حيوان سرود من العطاء وفضيلة السقايات. موطن البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها يطول من ١٥ الى ١٨ سم. الاثني اكبر قدماً من الذكر. رأسها مخراي الثورن. عينها



سحلية وكور

Orchis de Gallée	سحلب جليلي
Orchis mâle	سحلب ذكر
Orchis à larges feuilles	سحلب عريض الورق
Orchis papilionacée	سحلب فراشي
Orchis des marais	سحلب متقي

### ١٣٢١٢ - سحليات ، شحريات

Orchidaceae (S). Orchidacées, Orchidées (F).  
Orchidaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. منبتها الاعالي الحارة. انواعها المعروفة نحو ٢٥٠٠٠ تنتم الى ٩٥٠ جنساً تجمعها خمسة اسباط : البايوجيات والچوئيات والحاجبيات والسحاب والونيليات || جميعها ثنائية المساق، قرصية السوق، مستطيلة الازراق الكاملة. ازهارها مثنياين الاشكال. ازهارها جميلة الالوان الزاهية، بعضها عطري الترف القوواح وبعضها حديد لا عرف له او كرية الرائحة.

### ١٣٢١٤ - سحلية \* ، خراس \* ، خراس

Aceras (S). Acéras, Homme pendu (F).

جنس نباتات صقولية من فصيلة السحليات. انواعها المعروفة ٧ اعطتها تمتد من الهند الشرقية الى اوروبا الوسطى والجنوبية || اورثها غطية، مريضية، سمكية النصال، جميلة المنظر. شراخه الزهري قرصي الانتساب. ازهارها سنبلية التجميع، متدلية || معظها يرغب في الاتربة الرملية وبعضها يجود في الجصية || يستخرج من عساقها السحلب.

### ١٣٢١٥ - سحلية ، سحكة

Lapereau (F).

Young rabbit (E).

هي كل ازنب صغير ارتفع عن الحرق وقار امه .

### ١٣٢١٦ - سحليات

Chaetodontidae (S).

Chaetodontidae (F). Chaetodontidae (E).

فصيلة اسماك من العظيات الثائكات الزعانف موطنها بحار المناطق الحارة الاستوائية. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغرة القد اجسامها مبطلة بيضية او مستندرة الشكل. اثوابها متراكبة الالوان المزخرفة، الزاهية الجميلة || اشهر اجناسها :

Chelmo	التفح
Pomacanthus	الدسكور
Heniochus	الدفقود
Plotax	الرباني ، الرببي
Chaetodon	السحل
Zanclus	الشوش
Holocanthus	الطبق ، الكنف

### ١٣٢١٧ - سحلية ، هي العظاية ، الحلبا .

### ١٣٢١٨ - سحلية الحيطان \* ، سقاية الحيطان ،

عظاية الحيطان (S). Lacerta muralis (S).  
Lézard des murailles (F). Wall lizard (E).

حيوان يروض من العطاء وفضيلة السقايات. موطن البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها يطول من ١٩ الى ٢٢ سم. الاثني اكبر قدماً من الذكر. رأسها مخراي الثورن.

Melilerax musicus (S). \* السحون الغريد  
Melilerax chanteur, Autour chanteur (F).  
السحون المسنح  
Melilerax polygonus (S).  
Melilerax rayé (F).

وهما من الجوارح الثامنة لانهما يقضيان على جميع انواع الافاعي والظاظ والوزغ والحشرات .

13328 - سَحْمَاءُ  
Cryptostictis  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتميز  
ببكيتاته البيضاء المجزأة في قطبيها بأهداب منقطعة .  
انواعه قليلة العدد والاذى كركب بعض النباتات الحرجية .

13329 - سَحْمَاءُ مَحْمُومَةٌ \*  
Bembidion ustulatum (S). Bembidion brûlé (F).

حشرة قاضية ناعمة من عديدات الاجنحة وفصيلة الرتيليات . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا . تألف المواقع الرطبة اعصها ضفاف مجاري الماء ، حيث تكثر الديدان والحشرات الصغيرة || جسمها بطول من ٥ الى ٦ سم . رأسها وكوسلها الى الخضار الالوس . غدها الى السرة الكسئية الخضراء المواج . فكاهها ضلجان . زباناتها دقيقتان . عيناها صغيرتان ناشزتان . ظهورها قليل الاحديداب ، مستدير الطرف للاسف ، ثماني التحزيز القدي القاطب . اراسها خاسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجبلدة في الربيع ويتقي حتى الخريف . تسرح في التبار || البرقة عند تمام الادراك تطول نحو ١٠ سم . جسمها اسطواني الجرم ، قائم السرة . رأسها وشرجها ودرواجها الى السواد القمعي || طورا الاكمال يستمر نحو ٥٠ يوما ويتقي ضمن غلاف وامر || تفق قليل الاتحاد تحلده البرقة في الجبلدة او في الدبال .

13330 - سَحْمَاءُ \*  
Leptoconchus (S). Leptoconchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات عديدات الارجل وفصيلة الرغويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة من العالم القديم ، اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداؤها صغيرة رقيقة ملونة جرابية الشكل فسيمة الجيوب دقيقة الاعقاب الثنائية . تعيش لاصقة بمذائق الرجان او بصخور احشاف المعنوعة .

13331 - سَحْمَائِيَّاتُ \*  
Septobasidiaceae (S). Septobasidiaceae (F).  
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات وسيدة الجلوس . عديدة الانواع . فطورها تتطفل بالاشتراك مع القرزليات التي تسيطر عليها على عدة نباتات منها الحشفيات والاجاص والتفاح والسندنيان ... || كان مهدا امريكة الجنوبية وقد انتشرت الآن في معظم اقطار العالم .

13332 - سَحْمَاءُ  
Huile de radis (F).  
Radish oil (E).  
مادة زيتية طيبة تستخرج بالعصر من جذور الفجل . منافعها وفوائدها عديدة تستعمل في علاج الحفر والامراض العصبية وصعوبات المראה .

13333 - سَحِيلٌ \*  
Phelloderme (F).  
Phelloderm (E).

نسيج نباتي قليل السقف يفصل الطبقة الغليظة عن الخشب .

لوزيتان صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . اذناها غامقتا الشفاء السيلوياني الاخير الغلاف . عنفها قصيرة مسنطة . جلدها متناهي التفاصيل الدقيقة . ذنبها مستدق الطرف سريع المقلب || فوقها متراكب الالوان ، اسفح الموج ، يتكرر فيه الاخضر والجوذي والجوزي والخضبي وتتلوه خطوط من النقط متضاربة الالوان من الابيض الى الاسمر والامراء || بيئاتها اللبدي يستمر نحو اربعة اشهر . والاذنى تقص من ٦ الى ١٢ بحليلة طول الواحدة منها لا يتجاوز ٢٥ سم . || تألف المروج والحدائق وضفاف الانهار ومجاري الماء وبويع السكن الريفية . تسرح في التبار || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والهلوم || تعتبر من الزحافات الثامنة .

13334 - سَحْمَاءُ \*  
Sorosporium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهورييات . طلياسها وحيدة الخلية تجمعها حواشيد لاقية الحمة تنفكك عند بلوغها عن بوفيات فردية || انواعه قليلة اشهرها سحما الدخن وسحما الترفنليات .

13335 - سَحْمَاءُ الدخن \*  
Sorosporium panici-millicae, Sphacelotheca panici-millicae, Ustilago panici-millicae (S).

فطر مجهري يركب مبيض نورة الدخن فيسوله الى بؤرة بوغ وفصريات . وقد يصيب كامل الازهار فتبدو على مثالها كأنها اهداب فم تملوها التكايل وتلحفها الارراق اللزابة || يكافئ وقائيا وذلك بتعطيل البذر اما بمحلول الفرمول المركز ٠,٢ ٪ او بمحلول سلفات النحاس المركز ٠,٥ ٪ .

13336 - سَحْمَاءُ الترفنليات \*  
Sorosporium saponariae (S).

فطر مجهري يصيب بعض الترفنليات فيركب . قرص الزهرة عند انتشاح البتلات حيث يكون حقاؤه البويفية الحنطية اللون الى ان تبلغ كامل دورها الحياتي تنتقل عن غيرات حنطية السرة وريدة الموج || يكافئ بقطر وسرق الازهار الموصولة .

13337 - سَحْمَاءُ

«كلاه يشبه السحرة ابيض ينبت في التبار والاكمام ، وليست بمشب ولا يجر وهي اقرب الى الطريفة والسليان » . وقال ابو حنيفة السمرين نبت التصي والسليان والمكنك الا انه يطول نقيها في السماء ، وربما كان طول السحمة طول الرجل واعصم (اللسان) .

13338 - سَحْمَاءُ \* شَيْكَارُ  
Schéma (F).

Diagram, Drafte (E).  
مخطط تخطيطي يوضح نسبة الضلالت الدالة ومختلف علاقاتها في الموضوع المقصود .

13339 - سَحْمُونُ  
Meliefax  
جنس طير من البزاة وفصيلة السعريات . حديد الذهن ، قوي الشكبة ، ربح الجفنة طوله نحو ٥٥ سم . بسطه تراوح من ١١٨ الى ١٢٢ سم . موطنه افريقية الشرقية والوسطى . يألف مجاري المياه . قوته الاناعي والحشرات . يلدن في الانهار الريفية اناته تحفص ٤ وفنات نحو ٤ اسابيع || له نوعان فقط :



سحما الدخن



سحون غريد



سحمة مشعومة



سحمة



13344 - سَحْبَد. Eaux fœtales (F). Foetal water (E). ماء اصفر غليظ يخرج من المشيمة عند الوضع.

13345 - سَحْف. هو السلف، اطلبه.

13346 - سَحْلَة. Agneau et Agnelle (F). Lamb and Ewe lamb (E).

ولد الضأن أو الماعز ذكرًا كان أو أنثى ج تحل وتحل

13347 - سَكَة. Barrage

حاجز يقيم في وجه النهر إما لتخفيف سرعة اندفاع المياه ولما تخزنها ويمكن تصريفها عند الطلب أو الاستفادة من طاقتها المولدة.

13348 - سَكَا. هي الحلة الكبيرة، اطلبها.

13349 - سَكَاة. Diplostème (F).

نمت ترميفي يطلق على كل زهرة عدد أسديتها ضعف عدد البتلات أو القللات.

13350 - سَدَاب مَكْرَد. Cebrio gigas (S).

Cébrion géant (F). Cebrio gigas (E). حشرة غاصلة خاشية من فصيلة السدايات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف الاجراع والحادائق غناشها غاصلة قويتا ما تقضم من اوراق النبات. يرقاتها خاشية تعيش على جلود الاشجار وسوقها || الذكر بطول من ٢٠ الى ٢٤ م. ثوبه ثنائي اللون كسني الرأس والكليش، اشجع البطن والجراميز. رأسه كبير الجرم. عيناه كبيرتان. زبانه دقيقان. ظهره مستطيل الشكل، مستدير الطرف الاثف. بطنه ناشر المرك المثلث القرون || الانثى

تطول من ٢٤ الى ٢٨ م. جسمها عار عادم الجناح غداها جدحتان منفصلتان. زباناها قصيران مستطيلان. بطنها اهليجي الشكل، مستفخم الجرم ينتهي بمرق مدب الطرف || لها جليل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتعيش حتى اواسط تشرين الاول. تسرح في الليل ويبيت في النهار || البرقة مردنية الشكل تطول عند ادراكها التام من ٣٢ الى ٤٠ م. وهي سداسية الراوجب، صفراء اللون، غبراء المولج، كسنية الرأس.

13351 - سَدَاكَة. Planche (F).

Lath, Slat, Scrip of wood (E). لوح صتير من الخشب الرقيق.

13352 - سَدَايَات. Cebriionidae (S).

Cébrionidae (F). Cebriionidae (E). فصيلة حشرات غاصلة خاشية من رتبة غدييات الجناح || اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق المعتدلة الحارة. تألف الاجراع والحادائق والجناح. يرقاتها خاشية تعيش على جلود الاشجار || اجسامها متوسطة القد تتميز بالاعطاف الاصامي بين الذكور والاناث. ذكورها مجنحة، مستطيلة الاعماق والزباني المشاورية لتسعين. اناثها معار، عادمة الجناح، قصيرة الاعماق المنفلقة، صغيرة الزباني السمكية المنفلقة. جرامها نشيطة، ارسافها خاشية القمل || اشهر اجناسها السداية.

13353 - سَدَاة. Etamine (F). Stamen (E).

العضو الذكري في الزهرة. وفي مركبة من حامل يسمى

13333 - سَحْمَة. Melanopsis (S).

Mélanopside (F). Melanopsis (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مدييات الارجل وفضيلة السديقيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة. تعيش في المياه العذبة || اصداها شبه اهليجية الشكل، سوداء اللون، يبرجية الاعصاب، منفردة القواعد المستطيلة || اجسامها مستطيلة. رؤوسها مقنطرة ثنائية القواس الخروطية المستطيلة المعينة.

13335 - سَحَاة. بقلة. ج. سحاه (السان).

13336 - سَحَاة. Terre franche (F).

Thorough soil (E). السخاخ والسخاخ والسخواء. الارض اللينة الحرة، تصلح لمظم الزراعات.

13337 - سَحَاة \*، أبو مَيَّير. Gryllomorpha dalmatina (S).

Gryllomorphe (F). حشرة دجوبة عديمة الجناح من فصيلة الجديديات. ذكرها اصفر قدام انتائها يطول من ١٢ الى ١٤ م. والانثى تطول من ١٧ الى ١٩ م. ثوبا الى الصفار الحلي ملو رشفة سمره. ارجلها سداسية. زبانيها غيظية، مستفخة، فاقتة الطول. سرکہا كالمير يحاط بقرون غفروين || تعيش في الاماكن الرطبة المظلمة وفي الخازن والمطابخ. مسرکہا دجوي يمتد من الدغش الى الفجر. قوتها جميع المواد الغذائية باستثناء الحوم وقد تفضل المواد النباتية على غيرها.

13338 - سَحَاة. Symodial (F).

Sympodiale, Sympodique (F). Symodial (E). ما كان السخد من ميزاته الجسورية او العداية. كقولك انتاش سحادي او نحو سحادي كما هي الحال في بعض القفطور الدنيا.

13339 - سَحَام. Plumule (F). Plumule (E).

السغام الريش اللين تحت اجنحة الطير.

13340 - سَحَاة. Sphaeritaceae (S).

Sphaeritaceae (F). Sphaeritaceae (E). عمارة تطور مجهرية من فصيلة الحشويات ورتبة الزقيات اجناسها وانواعها الموزية عديدة || تتميز باصاها الصلبة المايقة الالوان التي تنطلق عن مسام مستديرة. اما ارتكاز اصاها فقد يكون فرديا أو ضميا يجمعه ونية واحدة || اعرف اجناسها التي اهم الاقتصاد الزراعي. الدامق، الدافعة، الروتائية، الصرمان، العوطب، التيرتيد، الكدرة، المصاع، النشيع، والتلفية.

13341 - سَحَاة. هو الانذر، اطلبه.

13342 - سَحَاة. هو ما يخرج من بطون ذوات الحافر أو ذوات الخلف قبل ان تأكل.

13343 - سَحَاة. Bifidité (F). Bifidity (E).

جَمَلَة. التصاق عضوان نباتيان ببعضهما البعض كورقتين أو صولجين.



سحمة



سحاح



سدايات



سداة

سرسحا دجوي . تدلو عل الارض بخفة وتلتصق الاشجار  
برفاقة || تدثن اعشاشها اما في تجاويف الاشجار القريبة  
من سطح الارض او بين الاعشاب المتناكفة المترتبة ||  
اشهر اجناسها السداف والبزبور .

Stratigraphie (F). ١٣٣٦٨ - سِدَاكَة ٥  
Stratigraphy (E).

جزء من الحصىلة يبحث في الصخور المتصدية .

Stratigraphique (F). ١٣٣٦٩ - سِدَاكِي ٥  
Stratigraphy (E).  
ما له علاقة بالسداكة كقولك درس التربة السداكي .

Bétoire, Bettolr, ١٣٣٧٠ - سِدَام ٥  
Bétoure (F). Swallet, Sink-hole (E).  
السدام حاجز صخري يتدفق عبره الماء .

Syma (S). ١٣٣٧١ - سِدَام ٥  
Symé, Halcyon-scle (F). Syma (E).  
جنس طير من الجوامع وأهانت المتأقبر وفصيلة القزليات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها أستراليا وجزر الزانج .  
تألف المناطق وصفات الانهر واغوارها . قوتها الاسماك  
الصغيرة والبلابيط والقشريات || اجسامها ريمية صغيرة .  
تتاقدها كبيرة مسنة الاناك كما يحملها تتكمن من الاسماك  
بسهولة . اثوابها الى الربة وملوها موج ازرق اخضر في  
الراس والرداء والجناحين والذنب . صدورها الى الربة  
الصناعية .

Acquit (F). Recapt (E). ١٣٣٧٢ - سِدَاد ٥  
راجع اسنوي .

١٣٣٧٣ - سِدَار \* ، نَبَقُ الْمَسِيح ، شَجَرَةُ النَّبَق  
Rhamnus spina Christi, Zizyphus spina Christi (S).  
Nabka, Nabquah, Epine du Christ, Jujubier d'O-  
rient (F). Christ's thorn, Nabk tree (E). Christdorn,  
Christdornbrustbeere (D). Spina di Cristo, Glug-  
giolo di Palestina (I).

شجرة برية شائكة من فصيلة النبقيات . مهدها فلسطين  
يقال ان اكليل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح  
كان منها . اشواكها شمية ، غزوية ، قوية ، جامدة ،  
ذرية لوها الى العنابي . غصنها شديدة الصلابة شائع  
الاستعمال الحرفي || يستعمل في السياجات الحية بفارس  
على ابعاد تراوح من متر الى مترين .

١٣٣٧٤ - سِدَارُ الْبَرِّ هو الفسال ، الحلبه .

١٣٣٧٥ - سِدْرَال ٥ ، تَوَكَّة ٥ ، شَرَبِين عَطِير ،  
شَرَبِين الاكاجو

Cedrela odorata, Toona odorata (S). Cédrel odor-  
ant, Toona odorant, Acajou femelle, Faux-acajou  
(F). West Indian cedar, False cedar (E). Bastard  
cedar, Barbadosceder (D). Cedro acajou, Cedrella  
odorosa (I).

قوته هو الاسم الهندي . شجرة حرجية وثلاثية من فصيلة  
الاذرنيتيات . تنمو من ١٥ الى ٢٥ م . اوراقها مركبة .  
وريقاتها وثرية براوح عددها من ١١ الى ٢٣ . نصلها  
مالس البشرة . سنن الحافة لونه الى اخضر الباهت .  
إزهارها حلقى التجميع . أزهارها غشوية ، جلجلية

الخطيب ينتهي طرفه العلوي بجزء متفتح يعرف بالثير  
او الشك ، يتكون عادة من فصين مستطيلين يفرزان  
ويحفضان جذرات الطلع . ج اسدية .

Staminal ١٣٣٥٤ - سِدَاكِي ٥  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالاسدية .

١٣٣٥٥ - سِدَاد ٥ هو التفتض ، راجعه .

Bouchon (F). Cork (E). ١٣٣٥٦ - سِدَاكَة ، فَلْبَنَكَة ٥  
هي الصمام الذي يسد به ثقب القارورة وما اشبه .

Sexiflore ١٣٣٥٧ - سِدَاكِي الْاَزْهَار ٥  
ما كانت ازهاره سداسية التجميع .

Héxandre (F). ١٣٣٥٨ - سِدَاكِي الْاَسَدِيَّة ٥  
Hexandrous (E). ما كانت اسديته سداسية التركيب .

Hexapodes (F). ١٣٣٥٩ - سِدَاكِيَّة الْاَرْجُل ٥  
Hexapod, Hexapodan (E).  
اسم شامل يطلق على جميع الحشرات السداسية الأرجل  
للمشاوية . اغصها فراشات حرشقيات الاجنحة .

Hexapétale (F). ١٣٣٦٠ - سِدَاكِيَّة الْبَتَلَات ٥  
Hexapetalous (E). صفة الازهار المركبة من ست بتلات .

Hexactinellidés (F). ١٣٣٦١ - سِدَاكِيَّة الْفُرُوع ٥  
Hexactinellides (E). رتبة من الاسنج السواني .

Fusidium ١٣٣٦٢ - سِدَاع ٥ ، فُوزِيدِيُوم ٥  
جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الفوطيات .  
انواعه قليلة العدد والاذى . جميعها ريمية تركب لحاء  
الافصان اليابسة .

Phytogénétique (F). ١٣٣٦٣ - سِدَاكَة ٥  
Plant-breeding (E).

السداعة علم يبحث في انتخاب اجود البذار .

Seringops (S). Stringops, ١٣٣٦٤ - سِدَاكِي ٥ \*  
Perroquet nocture, Kakapo (F). Kakapo (E).

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة السدافيات . موطنه  
زيلندة الجديدة . يألف الغابات والبراري الكثيرة المشب .  
ملجته الحياتي زويجي . سرسحه دجوي يستمر من الغروب  
الى الشجر . قوته الثأر اليابسة والصاقل والزواصي واغشرات  
واساريمها والغطاء || جسمه كبير القد . راسه قريب  
الشبه برأس القنطرة . ذنبه شبه غروطي الشكل ، معتدل  
الطول . ثوبه الى اخضر المتفاوت المائج ملوهم تجميع  
وتسجج اصفر في الرداء والجناح والصدر والبطن ، ورققة  
شديدة السمرة في الذنب .

Phrénite (F). ١٣٣٦٥ - سِدَاكَة ٥ ، سِدَاكَة ٥  
Phrenitis (E). التهاب الحجاب .

Phrénique (F). Phrenic (E). ١٣٣٦٦ - سِدَاكِي ٥

Stringopidae (S). ١٣٣٦٧ - سِدَاكِيَّات ٥  
Stringopidae (F). Stringopidae (E).

فصيلة طير من المتسلقات يبعثات الشكل . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلندة الجديدة  
واستراليا || تتميز برووسها الشبيهة برووس القداد .



سداف



سدام



سدر

Cardia (F). Cardia (E). **سِدَكَة** ١٣٣٨٠

السدة هي فوة المريء مركزها بالقرب من القلب .

Stratifier (F). To stratify (E). **سِدَكْل** ١٣٣٨١

سدك الترس . لقد بسضها فوق بعض فهي سدكة .

Inclinaison (F). Inclination (E). **سِدَكَل** ١٣٣٨٢

السدل والجليشة والميل واحد .

Boute-en-train (F). **سِدَكَم** ١٣٣٨٣

Stallion kept with mares (E).

الفحل الذي تعرض عليه الاناث للاستئناس من ودقائها فاذا ضيعت يذري عليها من الفحل المنتصب .

Scydmaenus (S). **سِدَمِين** ١٣٣٨٤

Scydmaene (F). Scydmaenus (E).

جنس حشرات من فصيلة السمينيات ورتبة غمديات الارجنة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هياض ، طولها نحو ٣ م . رؤوسها طليقة ، صغيرة ، شبه مكورة . عيونها بارزة . قاذبرها صغيرة . ملابسها الفكية مستطيلة . قرونها الاستشعارية صوطانية ، مهدبة الفصل . كواسلها محمودة . اغادها لاسعة ، عادمة التشنيد . قوائمها نشيطة ، مهدبة الافخاذ والظنايب والاراساغ . اوتابها رسيدة الون ، تكثر فيها الجؤرة فالشقة قاصصية || جميعها دامة تعيش في التيرب والجلاشة والدردي البتاني وتحت القشور والحاء .

Scydmaenidae (S). **سِدَمِينِيَّات** ١٣٣٨٥

Scydmenidae (F). Scydmaenidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الارجنة . اجسامها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، طولها من ٢ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مكورة . عيونها بارزة ، تأشيرها وفكوكها لانظامية ، ملابسها مستطيلة . قرونها الاستشعارية صوطانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها لاقصائية الشكل ، تكثر فيها الاستطالة . اغادها لاسعة ، عادمة التشنيد . قوائمها نشيطة . اراساغها خاسية العقل || جميعها دامة تعيش بين القشور والطحالب وفي الدردي البتاني وفي التيرب || اشهر اجناسها السمين والسفان .

Indusie (F). Indusium (E). **سِدَكَم** ١٣٣٨٦

في عباتي يوجد في اوراق السرخس يحضن الاكاثم او اكياس البوغ . وهو ايضا الفشاء الرقيق الذي يلف السرد ويمكن الحشرات .

Cydnus (S). Cydne (F). **سِدَكُونوس** ١٣٣٨٧

جنس حشرات صغيرة ومتوسطة القد من فصيلة القاصيات . انواعها نحو ٦٠ معظمها مركبات الالوان المابتقة كالاسود والاسمر يعيش على الاشجار البرية يتغذى منها . اشهر انواعها المؤنثة السدونون والابلق .

Cydnus bicolor (S). **سِدَكُونوس ابلق** ١٣٣٨٨

Cydne bicolor (F).

نوع من السدونون صغير القد يضيي الشكل مفلطح الجسم طول نحو ٨ م . ويعرض في اوقاف الون . رائحته كرمية يركب القيلول والكرية فيتغذى التسف ويؤذي البتات .

الشكل ، متدلية ، يبيضه الون ، عرقية الرائحة المتسحية . ثمارها زور جاللة مجنحة || خشبها جبل الون يشبه الاكاجو ويستعمل استعماله . رائحته رائتجية تقرب من رائحة الارز .

Cédron (F). **سِدَرُون** ١٣٣٧٦

شجرة تدعى سيبا ، اهلها .

**سِدَرِيَّات التَجِيلِيَّات** ١٣٣٧٧

Sideritis lithargyria (S). Siderite des graminées (F). Sideritis lithargyria (E).

حشرة مبلولة من فصيلة السقليات ورتبة حرشفيات الارجنة . موطنها يمنة من الشرق الاقصى الى اربوة وافريقية الشالية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تيش على عصف التجليات || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٣٧ م . رأسها صغير الحجم . عيناها كيرتان . زباناها عيطيان . مرشها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الخطي الاصفر المواج || روشناها الاماميان الى الخطي الصنابي المواج قملوه نقطة وعلى يبيضه . وتقرس حثاري اسمر . روشناها الخلفيان الى الصغرة تملوها مشعة سمراء || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعامل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنتج المكن لسطا مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الالراق || السرعة طول نحو ٤٠ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبا الى الصفار الدنس تملو سبعة خطوط قاطية سمراء الون وتسعة خطوط منقرضة جزوية الون . رأسها اسمر . مدنها الى السمرة القبراء . رواجها شديدة السمرة || طول الاكامل الذي يسمر نحو ١٥ يومًا ينتفضي في التربة حيث تنفخ السرة على عمق ٤ او ٥ سم .

**سِدَرِيَّات مَكُونَة** ١٣٣٧٨

Sideritis vicellina (S). Siderita vitellina (F). Sideritis vicellina (E).

حشرة من فصيلة السقليات ورتبة حرشفيات الارجنة . موطنها يمنة من الشرق الاوسط الى اربوة وافريقية الشالية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تيش على عصف التجليات وعلى اوراق البتات المروعة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٣٧ م . رأسها معتدل الحجم . عيناها كيرتان . زباناها عيطيان . مرشها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الخطي الاصفر المواج || روشناها الاماميان الى الصغرة تملوها مشعة صناعية وخطوط منقرضة سمراء الون وتقرس حثاري اسود . روشناها الخلفيان الى الصغرة تملوها مشعة سمراء . اهدابها الى البطحلة القصية || لها جبيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وراثة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعامل بد ظهورها بنحو خمسة ايام وتنتج المكن على الصفحات السفلى من نصال الالراق التي تلبس التربة || السرعة طول نحو ٤٢ م . جسمها ماس القشار . ثوبا الى الصفار الزيتي الاصفر المواج يملو تسعة خطوط قاطية سوداء الون وتسعة خطوط منقرضة صفراء . رأسها الى الحمرة الاريجوانية . مدنها الى الريمكة . رواجها الى السمرة القاطية || طول الاكامل الذي يسمر نحو ١٥ يومًا ينتفضي في التربة حيث تنفخ السرة ضمن جلباب من الطين .

Sextupler (F). To sextuple (E). **سِدَكَم** ١٣٣٧٩

جمل الشيء ستة اضعاف .



سدريت التجليات



سدريت مؤنثة



سدمن



سدنوس ابلق

والبحيرات والمناطق || اصداها متباينة الاشكال والاحجام  
يكثر فيها الشكل المزدقي المتساوي الحاذية حتى المقب ||  
اعرف اجناسها واشهرها السديفة والصحية .

Stratus - سِدَيمٌ ، رَهَجٌ  
نوع من الغيوم وهو غطوط من السحب الشفافة الرقيقة  
المستطيلة تملأ الافق وتنتد بجوازاته .

Nébuleuse (F). Nebula (E). - سِدَيمٌ  
سديم ج سِدُم . متطورات شمالية تبدو كشدة نجوم غافة  
الضوء المبهج عل هيئة حماية يضاء || اختلاف اشكالها  
ومعالمها وماهياتها المقدرة دعى الى ترتيبها في عدة فئات .  
اشهرها السدم اللولبية ثم المنتشرة فالخسفية فالغازية فالقائمة .

Archégon (F). - سِدَين ٥  
Archegonium (E).  
السدین قمصة تحضن المصفر التناثلي الانثوي عند الطحالب  
والكبديات ومستورات الزهر الوائحية . وفي السدين تويد  
الويضة القابلة للاخصاب .

Apothèque, Apothécie (F). - سِدَينَة  
Apothecium, Shield of lichen (E).  
هي تحت الحزاز واشباهه من النبات . قعم وتحتضن الجراثيم  
التناسلية .

Ruta (S). Rue (F). Rue (E). - سِدَابٌ ، قَيْجَنْجٌ  
جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة السذابيات.  
انواعه عديدة . اوراقه متعاقبة مركبة ازهاره عكوكلي  
التجميع ، هامي الارتكاز . ازهاره خضوية رباعية  
البتلات ، ثمانية الاسدية || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٤٠٤ - سِدَابُ الْبَرِّ\* ، ذَقْنَاءُ ، حَرَمَلُ الْجَبَلِ  
Ruta montana (S). Rue sauvage, R. de montagne (F).  
Mountain rue, Wild rue (E). Bergrante (D). Ruta  
montana, R. finocchina (I).  
نوع من السذاب وهو نبات عشبي طيب بري يملو من ٤٠  
الى ٨٠ سم. ساقه ليفية خلية اللحم . اوراقه ثلاثية  
التشريح والتفريرض الضيق || ازهاره الى الصفرة .  
منافعها الطبية دون منافع السذاب الحزني واقل فاعلية .

Rue de chèvre (F). - سِدَابُ الْمَاعِزِ  
Goat's-rue (E).  
هو المكائنة الحزنية ، اطلبها .

١٣٤٠٦ - سِدَابُ سُورِي\* ، قَيْجَنْجٌ حَكِيي  
Rue angustifolia (S). Rue d'Alep, R. à feuilles  
étroites (F). Syrian rue, Aleppo rue (E). Aleppo  
rue (S). Ruta frangiata (I).  
نوع من السذاب وهو نبات عشبي بري طيب يكثر في  
بعض المناطق السورية . يملو من ٣٠ الى ٧٠ سم.  
اوراقه جالسة سنائية . تشريحها ضيق التفريض، لانثاسي  
الشكل . ازهاره الى الصفرة . بتلاتها قارضة مشرشرة .  
منافعها الطبية تعادل منافع سداب البر .

Ruta suaveolens (S). - سِدَابٌ عَطِيرٌ  
Rue parfumée (F).  
نوع من السذاب وهو نبات عشبي زراعي تربتي معمر  
يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كاملة مستطيلة ملوقة  
الطرف تطول نحو ٢ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهاره

## ١٣٣٨٩ - سِدَانُوسٌ مُدْهَبٌ الرِّيَانِي ٥

Cydnus flavicornis (S).

Cydné à antennes dorées (F).

حشرة من السدونوف فصيلة القاسباتيات . جسمها صغير  
القد ، مفلطح ، شبه بيضي الشوزن ، يطول نحو ٤ سم .  
قوبها الى الجذوة يملوها مولج يراروح من الحطلي الى الاسود.  
رأسها شبه مكور ، اطرافها الداعلية مجهزة بطوق من الهلب  
التصغير الشائك . عظمها معتدل الطول . عينها صغيرتان  
ناشرتان . زباناها ذهبيا اللون . كوسلها بشير الجانبين  
ماس الوسط . يملها كثير الهلب المنسلح . قشرانها  
شفاف . قوائمها نشطة . ظنايبها الامامية سوية الاطراف  
الشائكة || مرتعها اعشاب الشطوط . يكثر وجودها عل  
الربل حيث تنتمن بسرعة مذهقة || راجعتها كريمة .



سديفة

١٣٣٩٠ - سِدَكِيَّاتُ الْجَنَاحِ  
Mecoptera, Petanoptera (S). Mécoptéroïdes, Péta-  
noptères (F). Mecopteroïdes, Petanoptera (E).  
طيفة حشرات مجنحة تشمل اربع رتب وهي  
الاجنحة وحشرغيات الاجنحة وذات الجناحين ومادانات  
الاجنحة .

Nébuleuse (F). Patch of haze (E). - سِدُومٌ  
هو الدخين ظل الغيم ومدى حجب اشمه الشمس .

Rosée de la nuit (F). - سِدَيٌ  
Night dew (E).  
السدى هو ندى الليل . ويقل السدى ما كان في اول الليل  
والندى ما كان في آخره .

Datte verte (F). Sour date (E). - سِدَيٌ  
السدى هو البلح الاخضر قبل ان يلو .



سداب البر

Planche à dessin (F). - سِدَينَة  
Drawing-board (E).  
السدينة لوح من الخشب لمجموع الاطراف مربع الشكل  
او مستطيله .

Schedir - سِدِيرٌ  
السدير نجم نير من كوكبة ذات الكروي . يميزون عنه  
في الجداول العام بالنجم ألفا من الكوكبة المذكورة .

Aréole (F). Areola (E). - سِدِيرَة  
ثؤلول قلنسوي الشكل ازغب البشرة او شائكة يكون  
في طاء بعض النباتات انحصها الصبار .



سداب سوري

Melania (S). - سِدِيرَة\*  
Mélania (F). Melania (E).  
جنس حيوانات مائية من الرخويات معليات الاربيل  
وفصيلة السدينيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة  
في جميع اصقاع العالم . تعيش في المياه العذبة الراكدة  
القليلة الغور || اصداها مدوية محاذزة سوداء اللون .  
اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقلوبة ثنائية الواس المعبوة.

Melanilidae (S). - سِدَينَاتُ ٥  
Mélaniidés (F). Melaniidés (E).  
فصيلة من الرخويات معليات الاربيل . اجناسها وانواعها  
عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . تعيش في الانهر

13418 - سَرَاحِيس - Fougères, Filicales (F).

Ferns (E). صف من شعبة مستورات الزهر الوعائية. يشمل السرخس والخنشار وكزبرة البئر وغيرها من مركبها في سلم الرقي النباتي يأتي بين الخوازيات وباديات الزهر. وهي من ذوات الجذور الحقيقية || فصائلها وأجناسها وأنواعها المنتشرة لا تحصى لأنها كانت أكثر النباتات انتشاراً وإبنتها حجماً. أما أجناسها المعاصرة فنحو ١٥٠ وأنواعها لا تقل عن ٦٠٠٠ || وما طبقات القدم الحجري سوى تقسيم وتجزير ما تراكم وتكس من السراخس وغيرها في الحقبة الكربونية التي دامت أكثر من ٣٠٠ مليون سنة.

13419 - سَرَادَقَة

البرادة والبراد من الثمر ما اضر به العطش فيبس وسقط قبل ينعه.

13420 - سَرَازَان - هو النظم، الملبه.

13421 - سَرَاسَة ٥ - Sénilité (F). Senility (E).

المراساة الوهن الجسموي الذي يحل بالرجل عنه الشيخوخة.

13422 - سَرَائِيلُ الطُّكُّلِكَة - هي الشجيرة، الملبه.

13423 - سِرَاكِيَة ، عَدْوَى Contagion, Infection - قابلية انتقال الامراض الميكروبية من فرد مريض الى آخر سليم.

13424 - سَرَب Cave (F). Case, Cellar (E). - دحلز تحفظ فيه بعض المحاصيل الزراعية الصناعية او غيرها كالخمر والجبن الخ.

13425 - سَرَب Collecteur (F). Collector (E). - مصروف كبير تنتهي اليه مياه المصارف فيسيلاها الى المشيرة.

13426 - سَرَب

Troupe, Troupeau, Banc de poissons (F). Troop, Flock, Herd, Drove, Shoal of fish (E). اسم شامل يطلق على القطيع الكبير من الطير والحيوان والسلك.

13427 - سَرَبَة ، سَرِيف Rangée de vigne (F). Range of vine-branch, Row of vine-branch (E). الصف من تصرب الكرمة.

13428 - سَرَس ٥ - Serapis (S). Sérapias (F). Serapias (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة السبليات. انواعها المعروفة خمسة منهاها حوض البحر الابيض المتوسط || سوفها شراعية منتصبة جيوه. اوراقها متناقصة حافسة، مستطيلة، متساكنة النصال الضيقة. ازهارها هامي شبه سنبل التجميع. ازهارها كبيرة ارجوانية اللون او جوية || جميع انواعها تزيينية تزروع في المراكب.

13429 - سَرَبُوعَة

Stromateus (S). Stromatée (F). Stromateus (E). جنس اسماك بحرية من شالكسات الزمانف وفضيلة الاسقمريات. اصنافها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

سفراء اللون ، عطرية العرف الزغدي || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

13438 - سَدَابٌ مَخْرُوجِي \* ، قَبِيحَن قَتِين Ruta graveolens, R. hortensis (S). Rue officinale, R. fédicé, R. des jardins (F). Common rue, Herb of grace (E). Rauté, Garten rauté (D). Ruta, Ruta dei giardini (I).

نبات عشبي طبي يري يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقه لفيية متصلبة. تصل اوراقه عميق التفريض. لونه الى الخضار الازرق. ازهاره فسقية اللون يتلأها مقعرة الشكل متجمعة الصفحة، مسنة الحافة || وهو نبات كرية الرائحة مر الطعم، لذاع، حريف. يستخرج منه بالتقطير دهن طيار له منامه الطبية. يستعمل منقعا للجلد ودرأا للطفث ومنهبا للعدمة وخافضاً للحرارة ومضاداً للتشنج ولطارداً للديدان.

13439 - سَدَابِيَّات Rutaceae (S). Rutacées (F). Rutaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين و مستقلات الفلوات، مرتفعات المبيض. انواعها كثيرة العدد تبلغ ٧٠٠ اجناسها ٨٠ مجموعها ٩ اسباط. جميعها من نباتات الاقاليم الحارة والمعتدلة. فيها الاشجار والشجيرات والاعشاب || اوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتعاقبة ومنها المتعاقبة ازهارها خشوية. ثمارها يزور بسيطة او جراء عديدة الاغصية.

13440 - سَرَة ، سِرَاكَة ، سَرَوَة - Frai (F). Spawn (E). بيضة السمكة وتسمى سمر. ج. سرء وسروء.

13441 - سَرَا - Frayer (F). To spawn (E). سراً السمك : باض.

13442 - سَرَاء - السراء : شجر تنخذ منه القسي الواحد مرارة. (اللسان).

13443 - سَرَائِيَة - هي الكورونة ، الملبه.

13444 - سِرَاكُ الْفُوَلَة - هو السورنجان ، اطلبه.

13445 - سِرَاكُ الْفَطْرُب - هو الخرم ، اطلبه.

13446 - سَرَاجَة - هي زئان الخيل ، راجمه.

13447 - سِرَاجِيَة \* ، سَرَمَج شَالَع ، قَصَب ذَهَبِي ، عَوَخُ الْمَاء

Lysimachia vulgaris (S). Lysimache commune, Chasse-bosse, Herbe aux cornelles (F). Common loosestrife, Yellow loosestrife (E). Goldfieberich, Gemeiner Weiderich (D). Lisimachia vulgare, Mazza d'oro, Cosaria (I).

نوع من السرمج وهو نبات عشبي معمر يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه متعاقبة غصية ثلاثية. نصلها سناني الشكل خلي البشرة. ازهاره هرية التجميع. تويجه ذهبي اللون. فصلها حر الخثار المهدب || ازهاره يستمر من حزيران الى آب. يرغب في الارربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.



سَدَابٌ مَخْرُوجِي



سَرَاجِيَة

## Cératode (F). ١٣٤٤٠ - سربوطة

هو ديبس الحوت، جنس اسماك كبيرة الـد قد تعيش في المياه العذبة.

## Ceratophorum ١٣٤٤١ - سربوطة

جنس ظهور بجمرية من الرنديانيات وفصيلة الطليحات. يتميز بكتائله المؤثرة الشفعية الانقسام العاقبة اللون التي تحمل في اطرافها بعض الحويط المحلية القريبة الشبه بالزبان || انواعه قليلة العدد والادى تركب الاوراق دون ان تغطها .

## Cerotoma (S). ١٣٤٤٢ - سربوطة

Cérotome (F). Cerotoma (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل خلفيات الحياشم وفصيلة الدورسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها عراطة مستطيلة عديدة الظهور الثلاثية التناويات . رؤوسها ثنائية اللواس . خياشيمها ضيقة التجميع ترتكز على حلقات انبوية قواعدا تلاصق قواعد التناويات الظهريه الاخرية . ارجلها وحيدة متدلة الطول ضيقة .

## Cérithinella (S). ١٣٤٤٣ - سربوطة

Cérithinelle (F). جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل وفصيلة السريقات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحيزرات الطيقة الجهورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصداها صغيرة ، مردنية الشكل ، متتابعة الحلزونة حتى الاعتقاب . فوفتها ضيقة ، ارفقتها متصبية . رأسها صغير ، لها مربع الشكل والعظم . لاستساها مستطيلتان .

## Ceratites (S). ١٣٤٤٤ - سربيت

Cératite (F). Ceratites (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الارجل رباعيات الحياشم وفصيلة السريقات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من المتحيزرات . احافرها تشتر من الحقبة البرية الى التراسية || اصداها اسطوانية الهيكل قرصية الشكل ، كثيرة المجبريات والفلور الناشزة المتفرعة .

## Nucella (F). ١٣٤٤٥ - سربيتة ، نسيكة

Nucellus (E). السربية او النسيكة مجموعة النسخ الوثنية التي تتألف منها الكتلة المركزية في بوفية النباتات بلدات الزهر .

## Ceratitidae (S). ١٣٤٤٦ - سربيتيات

Cératitidae (F). Ceratitidae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الارجل رباعيات الحياشم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحيزرات اواخر الاباج الاول واولى الاباج الثاني || اعرف اجناسها السربيت .

## Sérotine (F). ١٣٤٤٧ - سربتين

نوع من الخفافيش المغيدة يدعى غشاف الليل ، اطلبه .

انواعها المعروفة حسة تتميز باجسامها المحلية الشكل ، وزيانها الظهريه والشريية المتجلية المقعرة || رؤوسها صغيرة ، مغلطها مقعرة مستديرة ، ملاعها جعدة ككاد تكون منطسة || انوعها مختلفة الالوان تكثر فيها الريدة الفقية المواج || اعرف انواعها واشهرها سربوطة المتوسط .

## ١٣٤٤٠ - سربوطة المتوسط

Stromateus fiatola (S). Stromateus fiatola, S. de la Méditerranée (F). Stromateus fiatola (E).

نوع من السربوطة . سمكة بحرية يروض . اصطانها البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ، مبطط الجرم ، معيني الشكل ، بطول نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الريدة المرجانية الفضية المواج تعمق عند الظهر وتفر وتزهر عند البطن ويملأ تسليخ ذهبي في الشطر الاعل من الجانبين || رأسها صغير القد . عظمها شديد المقعر ، مستدير الطرف . زعانفها الظهريه والشريية مستطيلة ، مقعرة ، متجلية الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

## ١٣٤٣١ - سربيتة

هي السحام . اطلبه .

## ١٣٤٣٢ - سربة

هي الاثران نبات من المخدات ، اطلبه .

## ١٣٤٣٣ - سربة الأرض

هي الاثران السري ، اطلبه .

## ١٣٤٣٤ - سربة البحر

هي قصبة الماء ، اطلبها .

## ١٣٤٣٥ - سربة السحر

هي اثران السحر ، اطلبه .

## ١٣٤٣٦ - سربة الفرس

سرة الفرس نجم نير من كوكبة الفرس الاعظم مركزه على السرة .

## ١٣٤٣٧ - سربة التجفف

هي اذن يودا من الفلور للمأكولة ، اطلبه .

## ١٣٤٣٨ - سربستوم

Cyrtostoma (S). Cyrtostome (F). Cyrtostoma (E).

جنس طير من الجوام رقيقات المتاقير وفصيلة المغريات . انواعها المعروفة سبعة ، اصطانها القارة الاسترالية وجزر ماليزيا || اجسامها ربعة . مناقبها مستطيلة ، مغزوية الشكل ، قليلة التفويس . اذناها قصيرة . ارساغها دقيقة ، مستعدة الانقطاع . انوعها الى الخشرة الزينية المواج ، بطونها الى الصفار الكبريتي . اعناق ذكورها زبرجدية تحاسر المواج || قوتها الحوام وسيق الازهار .

## ١٣٤٣٩ - سربوكة

Cerithiopsis (S). Cerithiopsis (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل وفصيلة السريقات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من متحيزرات الطيقة الطليحية والبعض الآخر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اصداها مغروطة ، متتابعة الحلزونة حتى الاعتقاب . حلزونها قليلة الغور ، ضيقة التضخيد والتحيزز المتعرض || اعرف انواعها السربوكة المدرة (C. tuberculata).



سربوطة المتوسط



سربتين



سربوكة



سربوكة



سربيت

## ١٣٤٦٠ - سَرَحْسُ سَبَّعِ الْأَرْضِ \*

*Asplenium ruta-muraria* (S). *Asplénie des murailles*, *Rue de muraille*, *Sauve-vie* (F). *Wall spleenwort*, *Wall-rue*, *White maidenhair* (E). *Maner steinfarn*, *Steinrute* (D). *Asplenio ruta muraria*, *Solva vita* (I).



سرخس الجوار

نوع من السرخس يرغب في المواقف الكلسية الرطبة. يعلو من ٦ إلى ٢٠ سم. أوراقه كثيرة الخضراء والنفريش تشبه أوراق الفقيين. ضلعها عبارة عن الحصار، نصلها باحت اللون الأخضر. مرجمته مبرقة الزغب، حلامه المراج. أكياسه البوغية تحيط به مستطيلة، عريانة. يقال أنه من النباتات الطبية يفيد الكبد والطحال.

## ١٣٤٦١ - سَرَحْسُ قَاتِن

*Osmunda cinnamomea* (S). *Osmonde balsamique*, *Fougère fleurie* (F). *Osmund*, *Flowering fern* (E). *Rispenfarn* (D). *Osmunda cinnamomea*, *Felce florida* (I).



سرخس ذكر

نوع من السرخس يرغب في المواقف والنباتات الظليلة. جلموده صميم الشكل، غليظ اللد. يعلو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه الغنية النابسة حلزونية الشكل، زياها البشرة، زغبها أحر اللون. وريقاتها متساوية الحجم والأركان، ضيقة النصل الذروب المعقصة. مرجمته مبرقة الأكياس البوغية المتعدية تتصميم يعلوها نواص حنطلي اللون دقيق الحيط || زواطة البريئة شامة. ينمو في المراكز لكنه ينشئ الجفاف وكثرة التور.

## ١٣٤٦٢ - سَرَحْسُ لِحَاءِ الْعُودِ \*

*Asplenium trichomanes* (S). *Faux-capillaire* (F). *Bristle-fern*, *Common spleenwort* (E). *Brauner*, *Streifenfarn* (D). *Asplenio poltrico*, *Erba ruggimina* (I).



سرخس سبع الارض

نوع من السرخس يكثر في المواقف الظليلة الرطبة. يعلو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراقه مستطيلة متساوية العرض. ضلعها سوداء اللون. وريقاتها يضيء التصل الاخضر. مرجمته عبارة عن الحصار، مبرقة الزغب. أكياسه البوغية ضيقة، مستطيلة، عريانة || وهو من النباتات الطبية. يقال أنه يفيد تقصم الطحال.

## ١٣٤٦٣ - سَرَحْسُ مَحْرُزِي \*، سَرَحْسُ عَيْشِ

التَر، كَفَّ الْقَسْرِ



سرخس لحاء الفول

*Phyllitis scolopendrium*, *Scolopendrium vulgare* (S). *Scolopendre officinale*, *Langue de cerf* (F). *Bird's nest fern*, *Hart's tongue fern* (E). *Vogelnest*, *Echte hirschrzunge* (D). *Phyllitis*, *Lingua di cervo*, *Fillitide* (I).

نوع ميلول يكثر في المواقف الرطبة بين الصخور وعند مدخل المغاور. يعلو من ١٥ إلى ٢٥ سم. جذاميره ضمية، غليظة، منتصبه. أوراقه ضيقة النصل المستطيل. مرجمته حشفية البشرة يعلوها زغب دقيق. سادات أكياسه البوغية غليظة التركيب عديدة الاشكال المنزرفة || وهو من النباتات الطبية. تقع جلاميره يقضي على البدوة الوحيدة ويستخلص من جذاميره وأوراقه بعض الزيوت الطيارة والثابتة لها استعمالها الطبي.



سرخس مخزني

## ١٣٤٦٤ - سَرَحْسُ مُسْتَن، سَرَحْسُ شَوْكِي

*Dryopteris aculeata* (S). *Dryopteris aciculé* (F). *Wood fern*, *Prickly shield fern* (E). *Schildfarn*, *Punktfarn* (D). *Aspidio* (I).

نوع ميلول يعلو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. جلموده قليل النصل. أوراقه جامدة النصل والفصل، وريقاتها غليظة التسج تقطو من ١٠ إلى ١٥ سم. حصارها مستن

## ١٣٤٤٨ - سَرَج

*Selle* (F). *Saddle* (E). قريب من الرجال يوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الركاب.

## ١٣٤٤٩ - سَرَحْسُ جَزَعِ السَّرَجِينِ عَلَى التَّرْبَةِ.

## ١٣٤٥٠ - سَرَحْسُ جَزَعِ السَّرَجِينِ

*Compost* مزيج من المواد العضوية والنباتية المختلطة المنحلة في التراب والثنية بالنمصر الآزوتي.

## ١٣٤٥١ - سَرَحْسُ

*Inermis* (F). *Thornless* (E). كل شجر لا شوك فيه.

## ١٣٤٥٢ - سَرَحْسُ

*Cadaba* هو القفص نبات من الكبريات.

## ١٣٤٥٣ - سَرَحْسُ

*Eonycteris spelaea* (S). *Eonycteris des cavernes* (F).

جنس حيوان من فصيلة الطوطيات أنواعه المبرقة نحو ١٢ جميعها بظراء ضيقة القد، طولها يراوح من ٧ إلى ٩ سم. يسلمها من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أظفارها إلى الرينة المخنطية السمراء المختلفة المراج. رؤوسها قصيرة، فراطيمها مدبهة مقنونة. استنبت مستطيلة || موطنها الشرق. تألفت الكهوف والمغاور. مسرحها من النسق إلى الفجر. قوتها النار على اختلاف أنواعها.

## ١٣٤٥٤ - سَرَحْسُ

*Sirhan* هو الذئب، اطله.

## ١٣٤٥٥ - سَرَحْسُ

السرحة هي الآلة، اطله. ثمرها كالعنب يسمى الآل.

## ١٣٤٥٦ - سَرَحْسُ

*Sirhan* هو النحام، اطله.

## ١٣٤٥٧ - سَرَحْسُ الْبَلُوطِ \*

*Asplenium adianthum-nigrum* (S). *Doradille noire*, *Capillaire noire*, *Black maidenhair*, *Black spleenwort* (E). *Schwarzer streifenfarn* (D). *Asplenio nero* (I).

نوع من السرخس يكثر في ارجاء السنتيان وبين الصخور وعلى مجاري الماء. يعلو من ١٠ إلى ٤٥ سم. أوراقه كثيرة التدرج والنفريش. نصلها جميل الحصار اللامع، ضلعها سوداء. مرجمتها قليلة الزغب. أكياسها البوغية مبرمراء اللون، حنطية الشكل، معركشة عريانة. يقال أنه من النباتات الطبية يفيد المعدة والامعاء.

## ١٣٤٥٨ - سَرَحْسُ جَصَّاصِ

*Dryopteris robertiana* (S). *Dryopteris calcicole* (F).

نوع من السرخس يرغب في التربة الكلسية ولا ينشئ الصخور وعلى مجاري الماء. يعلو من ١٠ إلى ٤٥ سم. جلموده مداد أوراقه متباعدة الانتشاح. ضلعها حنطية اللون نصلها اصفر المسفة العليا، اخضر المبرجة، ازغب البشرة. زكائمه عريانة يوقها حار كيث ازغب اصفر اللون.

## ١٣٤٥٩ - سَرَحْسُ ذَكَرِ \*، شُرْدُ

*Dryopteris filix-mas* (S). *Fougère mâle* (F). *Male fern*, *Male polypody* (E). *Wurm-schildfarn*, *Mannlicher wurm* (D). *Felce maschia* (I).

نوع من السرخس الميلول يعلو من ٤٠ إلى ١٢٠ سم. جلموده قليل الانتداد. أوراقه غليظة الفلج كبيرة النصل الفتى اللون. مرجمته حشفية البشرة. سادات زكائمه كولية الشكل، مسنة الحافة || يحود في جميع المواقف الظليلة الرطبة.

Securigera (S).

Sécurigère (F). Securigera (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة القرنيات القرشانية. انواعها المعروفة قليلة المدد منها بمض تهايم حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتسبة قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة مركبة ، شفعية ، خاسية الازواج او سباعيتها. نصلها شبه اسطوانية مجذومة. ازهارها صفراء اللون ، خضية التجميع ، ٦ الى ٨ ، ترتكز على زناد مستطيل || تنموها ربيعي .

١٣٤٧٦ - سَرَطَان ، سَلَطَعَان ، سَلَطَعُون ،

Cancer (S). Crabe (F). Crab (E).

اسم شامل يطلق على عدة حيوانات مائية من القشريات العشاريات الارجل القصيرات الذليل . يعيش في الماء الملح والبلد على السواء وينسج على جانب واحد . ومن انواع تعيش على الشواطئ وبين الصخور ، تختبئ اذا غربتها المياه لان غياثيها قد تحولت الى ما يشبه الرئات . ومنه انواع تتعاون مع غيرها من الحيوانات البحرية . نخس منها بالذكر السرطان الناسك الذي يقم في قوقعة فارغة يعيش عليها اثنينو البحر الذي يشع نوراً فسفورياً يضيء طريق السرطان .

١٣٤٧٧ - سَرَطَانُ الْبَحْرِ \* ، عَقَرَبُ الْمَاء

Homarus vulgaris (S). Homard commun (F). Lobster (E).

دويبة بحرية من القشريات العشاريات الارجل . طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم. ثوبها الى الزرقه البنفسجية يعلو توضيح اسفر ونفحة خضراء .

١٣٤٧٨ - سَرَطَانُ الطَّرَفِ

سرطان الطرف نجم من كوكبة برج الاسد مركزه على الوجه . راجع برج الاسد .

١٣٤٧٩ - سَرَطَانُ التَّهْرِ \* ، سَلَطَعُونُ تَهْرِ

Astacus nobilis, A. fluviatilis (S). Ecrevisse de rivière (F). Crayfish, Crawfish (E).

دويبة من القشريات العشاريات الارجل الدالية. طولها يراوح من ٨ الى ١٦ سم. الانثى اكبر قدماً من الذكر . ثوبها الى السمرة الكستانية يعلو مواج متغايرة الزهرة . اجلها حر .

١٣٤٨٠ - سَرَطَانُ عَصِي

Neuro lymphomatosis gallinarum (S). Leucose (F). مرض ميكروبي يصيب الطيور في ادمغتها فيشل اعصابها ويقي عليها .

١٣٤٨١ - سَرَطَمُ

Œsophage (F). Œsophagus (E).

هو اليلوم عنه الحيوانات الهجرة .

١٣٤٨٢ - سَرَطَنَة \*

السرطنة من تربية السرطان والعنانية به ، راجع تربية السرطان .

١٣٤٨٣ - سَرَع ، سَرَع

Sarment (F).

Vine-shoot (E).

قصب الكرمه الحولي النفس ويطلق ايضاً على كل قصب مائل في النباتات الاخرى العارضة .

الحافة مهدب . صفحة النصل العليا شديدة الخضار . مرجته حشوية البثرة . سدائن زكائمه مستديرة الشكل ، عمودية الاذنكاز ، مسنة المختار || يجود في جميع المواقع الظليلة الرطبة .

١٣٤٦٥ - مَرْخَسٌ مَلَكِي \*

Osmunda regalis (S). Osmonde royale, Fougère royale (F). Royal fern, Royal osmund fern (E). Königsrümpfen (D). Osmunda regale (I).

نوع من المرخس يكثر في الغابات الظليلة الرطبة . يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. زناد نصله يعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. وريقاته ثنائية التثريم اهليجية النصل . مرجته كثيفة الاكياس اليوفية السنبلية الشكل الاكياسية الحجب . لوها الى الصبهة تملوها تحفة صناعية || زراعتة التزيينية شائعة . ينمو في المراكن لكنه يخشى الجفاف وكثرة الور .

١٣٤٦٦ - مَرْخَسَة \*

Ptéridographie (F).

Pteridography (E). البرخصة علم يبحث في تحلية الرخاس على اختلاف مجموعاتها .

١٣٤٦٧ - سَرْدَقَة

هي الجردة اي البيان السنوي المفصل بالدين وبجميع الموجودات وأعمالها .

١٣٤٦٨ - سَرْدَقَة

السردة سمكة بحرية تدعى بلميدة شائعة ، اطلها .

١٣٤٦٩ - سَرْدُوح \*

Péropère (F).

سردوح م. سردوحه، نعت تعريفي يطلق على كل سمكة عادمة الزعانف الشرجية .

١٣٤٧٠ - سَرْدِي ، شَبَكِي

Réticulé (F).

Reticulated (E). نعت تعريفي يدل على التشابك النظامي في التركيب .

١٣٤٧١ - سَرْدِين \*

Alosa sardina, Clupea sardina (S). Sardina, Sarda (F). Celan, Pilchard (E).

سمكة مشهورة تنتمي الى جنس الشابل وقصيلة الصابونيات. طولها يبلغ ٢٥ سم. سفيها شديد الرقة حولي البذل . ثوبها الى الخضار يعلو مواج فضي . ظهورها عاكب الزرقه . بطنها الى البياض القضي || قوتها في جميع البحار . تكثر في المتوسط . تألف النور البعيد . تعيش على اعناق تراوح بين ٥٠٠ و ٦٠٠ سم. اسراها كثيفة العدد لا تحصى . تقرب الشطوط في زين السرم والنقف الذي يلوم من اذار الى تشرين || صيدها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٤٧٢ - سَرُر

Bourgeois terminaux (F).

Terminal buds (E). سرر النبات . اطراف صالجه النامية . مفردة سرور .

١٣٤٧٣ - سَرَسَاد

هو الارثه جنبه طيبة معمرة .

١٣٤٧٤ - سَرَسْتُم

هو قوبة الدراقن ، اطلها .



سرخس ملكي



سردن



سرطان البحر



سرطان النهر



والاطوار . طول الذكر منها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم .  
والأنثى من ٥٥ الى ٧٥ سم . ثوبها اخضر اللون . وجناتها  
الامامية قوية مستطيلة . بطنها مبطط الشكل || تكن  
عل النبات بدون حراك . قوتها ما استطاعت اليه من  
الحشرات والمولم || من ميزاتها الخاصة ان انها تفرس  
ذكورها على اثر الكرم .



سرعوب شائع

١٣٤٩٢ - سِرْعَافَةُ الْبَحْرِ (F). Mante de mer

دودية بحرية من القشريات تدعى سكيلا ، اطلمها .

١٣٤٩٤ - سِرْعَافِيَّات (S). Mantidae

(F). Mantidae, Soothsayers (E).

فصيلة حشرات من مستقيبات الاجنحة . لونها الغالب  
الاخضر . اجنحتها الامامية معدة للقص . قوتها  
الاستثمارية دقيقة مستطيلة .

١٣٤٩٥ - سِرْعَافِيَّ ، زُرْجُونِي (F). Sarmiento

(F). Sarmiento

نمت تعريفي يطلق على كل نبات اغصانه مستطيلة  
لغية غشوشية يسهل التناولها كسروع الكرمة .

١٣٤٩٦ - سِرْعَاف (F). Engarde

هو قصب الكرم الذي يقلم طويلا عن قمم .

١٣٤٩٧ - سِرْعَافَاس \* (F). Sargasse

جنس نباتات بحرية من الالديات السمر وفصيلة الفربيقات .  
انواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار العالم  
اخضها بحسب المناطق الاستوائية والصحارة . وفي  
السناريات ، اكبر نباتات بحرية معروفة ، اطوالها تراوح  
من ١٠٠ الى ٩٠٠ متر .

١٣٤٩٨ - سِرْعَافِيَّات \* (F). Protelyptoptères

(F). Protelyptoptera

رتبة حشرات مقرشرة من طبقة جلياتيات الجناح . اضافيرها  
تعتمد الى الحقة البرمية اي الخامسة من الاباج الاول ||  
كانت تتميز بكبر القد وبامتدالة الاجنحة .

١٣٤٩٩ - سِرْعَاف \* ، بَيْضُ الْأَرْضِ ، عَحْفِيَّة

(S). Crépide, Crépide (F). Crepis, Hawk's  
beard (E). Grundfeste (D). Crepide (I).

جنس نباتات شبيهة حولية او معمرة من فصيلة المركبات .  
انواعها كثيرة العدد منها جميع الاقاليم الحارة والعتدلة  
والباردة . جلجولها عمودية غليظة . سرفها زيا السماء  
قليلة الفروع . اقراصها الزهرية متباعدة الاحجام والالوان .  
انواعها الزراعية قليلة العدد اعرفها على .

١٣٥٠٠ - سِرْعَافُ سِيبِيرِيَّة (S). Crepis sibirica

(F). Crépide de Sibérie

عشبة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ،  
حاشية ، سنائية ، ذلقة . نصلها يطول من ١٠ الى  
١٥ سم . لونه الى الخضار الباهت . ازهارها رديسية  
ثلاثية او خاسية للتجميع لونها الى الصفرة يعلوها زغب  
اسود || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٥٠١ - سِرْعَافُ وَرْدِيَّة (S). Crepis rubra

(F). Crépide rose

عشبة حولية تملو من ١٠ الى ٤٥ سم . جلجولها يفي  
الشكل . ساقها قليلة الفروع . اوراقها السفلى مفردة

١٣٤٩٤ - سِرْعَاف \* ، شَلَارَا (F). Chalara

جنس فطور مجهرية من الدغيات وفصيلة الفطريات .  
جره الكنديية حزمية التجميع ، يرقع الاطراف ، تملوها كتائد  
اسطوانية شفاطة سميكة الازتكاز . والترتيب || انواعه  
قليلة اعرفها سرعات السديان .

١٣٤٩٥ - سِرْعَافُ السِّدِّيَّان \* (F). Chalara quercina

(S). Chalara quercina

فطر مجهرى يركب الاوراق ليذللها ويقيض على الشجرة .  
مظهره الخلارجي يرقع قرصية خلية لائساية الشكل والحجم  
سواء اللون تركب الاوراق تنفوذها الى الذبول السريع  
الذي يعقبه يباس الشجرة .

١٣٤٩٦ - سِرْعَافَة (F). Vitesse

(E). Quickness

المسافة التي يقطعها جسم متحرك في وقت محدد .

١٣٤٩٧ - سِرْعَافِيَّ (F). Pampre

(E). Vine-branch

قصب الكرم الغض الرطب .

١٣٤٩٨ - سِرْعَافَة \* (F). Circumnutation

(E). Circumnutation

السرعة حركة مروحية تلاحظ في نمعة الساق وصولا الجذر  
عندما يكون النبات في طور النمو الطولي .

١٣٤٩٩ - سِرْعَافِيَّ (S). Ictis, Mustela

(F). Belette

سرعوب ج سرايب . جنس حيوانات مفترسة من فصيلة  
السرعوبيات . انواعه ٣٥ اجسامها مستطيلة ، جرانمها  
قصيرة . اذنها كثيفة الوريد تقيم مع اقترابها من ثوب  
الظهر وتثبت عند البطن || وهو من الحيوانات الشرسة  
الشجاعة يسرح في الليل والنهار . يبدو على الارض  
ويشلق الاجنار ويوم ويغنى في الماء . قوته القار  
والجرذان والنالند والطيور الداجنة والسماسير والوزغ  
والحشرات || جنسه سرب يحفر في التربة او دليج  
يحفر بين الصخور او كناس يدهر في شقوق الاجنار .  
اناه تقصم من ٤ الى ٥ جراء مرثين او ثلاث مرات في  
السن .

١٣٤٩٠ - سِرْعَافُ شَالَع \* (S). Ictis nivalis, Mustela vulgaris

(F). Belette commune (F). Common weasel (E).

نوع من السرعوب موطنه نسيج الاربعاء يمتد من الهند  
الى ااروبية . طولها نحو ١٨ سم . وذئله ٤ . الاثنى اصفر  
من الذكر . راسه غزوي الشكل . عظمه مقنوم . اذناه  
سفرتان مستديرتان . ثوبه كثيف الوريد القصير .  
لونه الى الصهبة الجذوية صدره وبطنه وبطنه جرانمه  
بيض || يالفت النباتات والاحراج وصفات الابهار  
وضواحي الاسكار .

١٣٤٩١ - سِرْعَافِيَّات (S). Mustelidae

هي فصيلة السوريات ، اطلمها .

١٣٤٩٢ - سِرْعَافَة \* ، قِرْسُ التَّيْسِي ، حَصَان

التَّيْسِي ، حَصَانُ اِيلْيَس ، اَبُو صِلَاح

(F). Mantis religiosa, Mante religieuse, Prie-Dieu

(F). Mantis, Soothsayer, Praying insect (E). Europäische

gottesanbeterin (D).

حشرة مفترسة من فصيلة السرمويات غريبة الشكل



سرعة

\* سَرْفُول بَرْي ١٣٠١٢

*Anthriscus sylvestris* (S). *Cerfeuil sauvage*, *Chérophylle* (F). *Wild chervil*, *Cow parsley* (E). *Wilder kälberkropf* (D). *Cerfoglio salvatico* (I).

نبات عشبي بري محلي. منبت المروج والمرعى الجبلية. جذوره مستطيلة فائقة يقال إنها لا تخلو من بعض العناصر الجحالية الضارة بالحيلون.

\* سَرْفُول بَقْلِي ١٣٠١٣

*Anthriscus cerefolium*, *Scandix cerefolium* (S). *Cerfeuil cultivé* (F). *Chervil* (E). *Kerbel*, *Kälberkropf* (D). *Cerfoglio coltivato* (I).

بقلة زراعية حولية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها مأكولة مستحبة الطعم، فواحة العرف المطر || تجود في جميع الأتربة المعتدلة الانساج.

\* سَرْفُول عَطِر ١٣٠١٤

*Myrrhis odorata* (S). *Myrrhis*, *Cerfeuil musqué* (F). *Myrrh*, *Sweet fern*, *S. cicely* (E). *Spanische süsdolde* (D). *Mirride*, *Finocchiella odorata* (I).

جنس نباتات عشبية حزنائية معمرة من فصيلة الشبقيات. أنواعه قليلة العدد منها البرية والزراعية. البرية صغيرة الجذور المستنقة. ساقها ترتفع نحو ٧٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة اللقد، خلية النصل الثلاثي التفليل. رائحتها ذكية العرف تشبه الأتيسون || أما الزراعية فجلورها حزنائية الشكل، غليظة اللحم. كانت ولا تزال من النباتات المحدودة الانتشار لأنها ترغب في المناطق البحرية الكثيرة الصباب.

\* سَرْفُول لَفْشِي ١٣٠١٥

*Chaerophyllum bulbosum* (S). *Cerfeuil bulbeux*, *C. tubéreux* (F). *Turnip rooted chervil*, *Parship chervil* (E). *Rubenkälberkropf* (D). *Cerfoglio bulboso* (I).

نبات عشقولي بقلي محلي. جذره لفي الشكل كبير اللقد. ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، خلية النصل ثنائية أو ثلاثية التفليل || جذره أبيض اللباب، سكري الطعم، يحوي من المواد الغذائية ما قدره نحو :

٣,٥ ٪ مواد ازوتية

٣,٤ ٪ مواد دهنية

٢٧,٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وهو من النباتات التي ترغب في الأتربة الحوارة الخصبة المنفسية العناصر الغذائية.

١٣٠١٦ - سَرْفُول أَسْوَدَ *Salamandre noire* (F).

رابع مستند أسود.

١٣٠١٧ - سَرْفُول مَبْدُول *Salamandre terrestre* (F).

هو المستند المبدول، اطلبه.

١٣٠١٨ - سَرْفُولِيَّات *Urodèles* (F). *Urodela* (E).

رتبة حيوانات من صف الضفادعيات. أجناسها وأواعها كثيرة المدد تجمعها أربع فصائل || معظمها مائي وبعضها قريب. تتميز برام جلودها وما تنفسمه من مواد أكالة سامة || أشهر فصائلها المستديلات.

١٣٠١٩ - سَرْفُولَة ٥ *Acervule*

السرفولة هي البكنيدة التي لا يمكن تمييز جولا عن القصة البولية.

كارواق الهندباء. أزهارها رؤسية مستطيلة، المالحق، لونها ال الوردي يتوسطها توشيح عابق || ضوع أوراقها وأزهارها عند الفك، يشبه الورد || أزهارها يستمر طوال الصيف والخريف.

١٣٥٠٢ - سَرْفُولَة هو بثور البربر، اطلبه.

*Sargus* (S).

*Sargus* (F). *Sargo*, *Sargue* (E).

جنس اسماك بحرية من الفريخيات الشائكات الزعانف. أنواعه عديدة جميعها يضيئ الشكل مفلطح. رؤوسها غليظة وقصيرة. زعانفها الذائبة فائقة. سنها حولي رقيق || ألوانها عديدة فيها الغني واللحمي والبرجاني والاسمر الزيتوني || أشهر أنواعه الاربية التالية : السرفوس المألوف والمستدير والسباس والحفارة.

١٣٥٠٤ - سَرْفُول حَدَّادِي *Sargus* (F).

هو السرفوس المستدير، اطلبه.

١٣٥٠٥ - سَرْفُول مَأْلُوف *Sargus vulgaris* (S).

*Sargus commun* (F). *Common Sargo* (E).

نوع من السرفوس مستدير الشكل، فني اللون، عابق الظهر، يكثر في البحر المتوسط || يعتبر من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

١٣٥٠٦ - سَرْفُول مُسْتَدِير *Sargus rondeleti* (S). *Sargue mouchon*, *Sargon* (F).

نوع من السرفوس مستدير الشكل، مستطيل الزعنفة الذائبة الفارقة. ثوبه اطحل اللون يملو موج فضي وتوشيح وردي. ظهرو عقيق من جانبيه وبطنه. يكثر في البحر المتوسط || يعتبر من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

١٣٥٠٧ - سَرْف *Apathique* (F). *Apathetic* (E).

نمت تعريفه يطلق على من كان عديم الشعور ويمتنع بالكسل والقصور.

١٣٥٠٨ - سَرْفَة *Chenille* (F). *Caterpillar* (E).

اسم تعريفي يطلق على يرقات الفراشات منذ نفقها حتى دخولها في طور الحادرة.

١٣٥٠٩ - سَرْفُول مُجْدَدَع \* *Syrphus corollae* (S). *Syrphe enguirlandé* (F).

حشرة نافمة من السرفديات. شكلها كالذبابية. طولها نحو ٨ مم. رأسها أصفر اللون. بطنها مجنح بالأسود. تمتع مكها على الالواق التي يركبها الارق فينتقب عن يرقات دويدية، علقية الشكل، غبراء اللون لتسحق الارق وتقتصره.

١٣٥١٠ - سَرْفُول مَوْزَق \* *Syrphus boateatus* (S). *Syrphe à ceinture* (F).

حشرة نافمة من السرفديات. شكلها كالذبابية طولها نحو ٩ مم. رأسها أصفر. بطنها مزرق خطوط وزراكن سود || رقاتها مفترسة تقتضي على الارق.

١٣٥١١ - سَرْفُول هو الاطريال، اطلبه.



سرفوس مألوف



سرفوس مستدير



سرفس مجنح



سرفوس مزرق



سرفول بري



سرفول بقلي



سرفول عطر



سرفول لفي

## ١٣٥٢٠ - سُرْفُون أَيْضُ الدَّرَقَةِ \* ، سُرْفُون

Anisoplia leucaspis (S).

الزَّرُوع \*  
Anisoplia arvicola (F). Pastoral chafer, Cereal chafer (E).

حشرة وأشة غاشلة مؤذية من فصيلة الجعلبيات ورثية منعدات الاجنحة. موطنها يشمل معظم المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى الى اوروبا وافريقيا الشمالية. تألف المزارع والحقول. غنصاها تعيش على ازهار النباتات المختلفة الانواع وعلى صمغ النجيليات. يرقاتها تعيش على جذور الزروع والنباتات المروعة || جسمها صغير القد ، يطول من ٧ الى ١٠ سم. نوبها الى الخضر الاملس تملو في الصناديق زركشة صفراء. رأسها صغير الحجم. يفرز بمغلفه تحت الكوسل. عيناها صغيرتان ، بارزتان. زباناها صغريتان ، صمغيان. كوسلها محبوس الشكل. جرابها معدلة الطويل ، مائلة الانحدار ، مسنة الظناطيب. ارساغها خماسية العقول ، مهدبة الحوافي || الافرث اميز قدماً من الذكر وانظف بطناً واطول سرماً واكد ثوباً || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة في اوائل ايار ويبقى حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة بطيئة النمو تدرك الكمال الجسوري بعد التفت بستة اشهر. جسمها مقوس يطول نحو ٢٢ سم. نوبها الى الخليل. رأسها والحلقبة الصدرية الاكبر الى السرة || طور الاكمال يستمر من ٤٠ الى ٥٠ يوماً.

Cerophytum (S).

١٣٥٢١ - سُرْفِيدَة \*  
Cérophyte (F). Cerophytum (E).

جنس حشرات من فصيلة السرفيديات ورثية غديات الاجنحة. انواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من المالين القدم والجديد || اجسامها مستطيلة الشكل ، هيافة ، تطول من ٥ الى ٩ سم. رؤوسها معدلة الجرم والثشور. عيونها صغيرة ، بارزة. تأثيرها وبلاستها نظامية. قرونها الاستشعارية شططية عند الذكور ، متشاربة عند الاناث. كواسلها معدودة مقطوعة القدم والمؤخر. اغادها لاحقة ، تحيلة التخديد القاطب ، قوائمها نشيطة. اثوابها ملونة || تألف الغابات التي تكثر فيها الاجشجار الورديفة كالفصافس والحوور والسنديان ، لانها تعيش مع يرقاتها في الجلوع النخرة.

Cerophytidae (S).

١٣٥٢٢ - سُرْفِيدِيَّات \*  
Cérophytidés (F). Cerophytidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجسامها وانواعها المروفة متوسطة البدن ، منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، معدلة التيطيط ، تطول من ٥ الى ٩ سم. رؤوسها معدلة الجرم. عيونها صغيرة ، بارزة. تأثيرها وبلاستها نظامية. قرونها الاستشعارية شططية عند الذكور ، متشاربة عند الاناث. مركبة من ١١ فصلة. كواسلها شبه مكورة. اغادها لاحقة. تتميز باستتالة مداور القترام الواسي والحلمية. ارساغها خماسية العقول. اثوابها ملونة || تألف الغابات التي تكثر فيها الاجشجار الورديفة حيث تعيش في جلوعها النخرة || اشهر اجناسها السرفيت.

Rhingia rostrata (S). سُرْفِيدَة اعظم \*

Rhingie à grand rostre (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة السرفيديات. جسمها متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١١ سم. رأسها كبير الحجم،

شبه يرمي الشكل ، اصفر اللون. خطها غروطي. مكها شديد النشط. عيناها كبيرتان بارزتان. زباناها دقيقتان صغيرتان. صدرها الى الزرقه السفاء. بطنها كالباطية ، اصفر اللون. صناعي المراج. قوائمها الى الصفرة الصنابية. ورشاشها خططي الخفاب || تظهر الحشرة الجملانة في ايار الى تشرين الاول. مسرحها البراري والغابات. قوتها رقيق الاضهار || الافرث اكبر قدماً من الذكر تمتع مكها في براز الحويان ينفتق عن يرقات نائلة تعيش على البراز حتى الاكمال.

١٣٥٢٤ - سُرْفِيدَة البَصَل \*

Eumerus strigatus (S). Mouches des bulbes, Eumère décharné (F). Lesser bulb fly (E). Kleine Narzissenfliege, Zwiebelmondfly (D).

حشرة صغيرة من السرفيديات طولها من ٧ الى ٨ سم. لونها الى الخضر الاسمر تملو لثة زركشة صفراء. رأسها صغير الحجم. يفرز بمغلفه تحت الكوسل. عيناها صغيرتان ، بارزتان. زباناها صغريتان ، صمغيان. كوسلها محبوس الشكل. جرابها معدلة الطويل ، مائلة الانحدار ، مسنة الظناطيب. ارساغها خماسية العقول ، مهدبة الحوافي || الافرث اميز قدماً من الذكر وانظف بطناً واطول سرماً واكد ثوباً || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة في اوائل ايار ويبقى حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة بطيئة النمو تدرك الكمال الجسوري بعد التفت بستة اشهر. جسمها مقوس يطول نحو ٢٢ سم. نوبها الى الخليل. رأسها والحلقبة الصدرية الاكبر الى السرة || طور الاكمال يستمر من ٤٠ الى ٥٠ يوماً.

١٣٥٢٥ - سُرْفِيدَة التَّجَرَس \* ، مَرْدُون \*

Merodon aequistris, M. clavipes (S). Méronon, Mouches des narcisses (F).

حشرة من السرفيديات طولها من ١٥ الى ١٧ سم. اجتم من النحلة ، زباه الجسم ، لونها الى السمرة || تظهر في ايار. تمتع مكها على اوراق التجرس وبعض الزنقيات ينفتق عن يرقات تتجه تورا نحو القرص البصلي فتقرض ولا تتركه الا عند آخر انسلخ قبل ان تتحول الى عذراء كزود.

١٣٥٢٦ - سُرْفِيدَة اَلْيَق \*

Orthoneura elegans (S). Orthonèvre élégante (F).

حشرة ناعمة من فصيلة السرفيديات. جسمها كثيف اخمل، صغير القد ، يطول من ٧ الى ٩ سم. رأسها محبب المنس اخضر. خطها وشكلها صغريان. عيناها كبيرتان بارزتان. زباناها دقيقان. صدرها الى الخضر المذهب. بطنها شديد السرة ، اخضر الختار. قوائمها الى السرة السوداء. ورشاشها قسطنطيني الخفاب || تظهر الحشرة الجملانة في الصيف. مرتها البراري والحقول والزرعة. الافرث اكبر قدماً من الذكر ، تمتع مكها على سوق النباتات التي يركبها الارق ينفتق عن يرقات شديدة الصغر تسمى وراه الارق فتقرضه.

١٣٥٢٧ - سُرْفِيدَات \*

Syrphidae (S).  
Syrphidae (F). Syrphidae, Hover flies, Flower flies (E). Schwebefliegen, Schwirrfiegen (D).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٧٠٠٠ جسمها صغيرة القد خضة. طولها يراوح من ٣ الى ٢٠ سم. رؤوسها بصفحة صاويرة. قرونها الاستشعارية ثلاثية القواصل. الالوان زاهية متعددة. نمط انواعها يعيش على شجر الازهار، وفيها الهواكة والثالثة || مكها دقيق الحجم لاقبسي الشكل والوضع والجمع. قد تمتع على اوراق النبات او تقذف به في الماء الراكد الآسن || يرز في الارق وفي بعض الظلور || يرقاتها خضة ، صغيرة ، شكلها شوكي العقول. لونها الى السرة وفيها الاخضر والاصفر والخلطي. وهي وانجة او هواكة او نائلة. مظهرها ارضي وبعضها مائي. والارضية منها تلم الاوراق التي تركبها وتقرض الاقراص البصلية والذرات.



سرفون ايض الدقة



سرفيت



سرفيد اعظم



سرفيد البصل



سرفيد التجرس

Sericostomatidae (S). **سيركوسوماتيات** ١٣٠٢٧  
Séricostomatidés (F). Sericostomatidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، سمراء اللون. اجنحتها متدلة الطول، كثيفة الخمل الذي يثقل الاعصاب والروق. الملامس الفكية عند الذكور مستطيلة المثلب المرموص الذي يبدو كالقناع امام الوجه. وتتميز ذكورها ايضا بقدر زنازلها المسننة الطرف || اسارعيها تعيش في المياه الجارية ملحوة بجلايبب متباينة الاشكال، يكثر فيها المحروطي.

اشهر اجناسها :

Sericostoma (S). **السرکوستوم**  
Goera (S). **الغوريو**  
Silo (S). **السيلو**  
Curnoeia (S). **الكورنوسيا**  
Lasiocephala (S). **اللاسيفسالا**

١٣٠٢٨ - **سيركوب ثماني البتج**

Cercopis quinque maculata (S).  
Cercepe quinque maculé (F).

حشرة من فصيلة السركويات. جسمها صغير القد يطول نحو ٩ م. ثوبها الى السواد الاسفع تملو خس بقع حر. رأسها مستعرض، قليل النتوء. خطمها متدل الطول. عينها صغيرتان. زنازلها قصيران، نحيلان. كوسلها محدوب. حشفتها صغيرة، عرجمة. ظهرها كامل الحنجبة، لائح. روشانها غشائيان، شفافان. بطنها اسود على صفحتيه. قوائمها ثخينة سداها اللون || يهاول في كل مكان. قوتها التسع تنصه من اوراق الاشباب.

١٣٠٢٩ - **سيركوب مدمني**

Cercopis sanguinea (S). Cercepe sanglante (F).

حشرة من فصيلة السركويات. جسمها صغير القد يطول نحو ١٢ م. ثوبها الى السواد الاسفع الملتصق بالآخر. رأسها مستعرض، قليل النتوء، اسود. خطمها متدل الطول. عينها صغيرتان. زنازلها قصيران، نحيلان. كوسلها محدوب. حشفتها مزوانية. ظهرها كامل الحنجبة، لائح، شديد الحمرة الاروانية، مبيج بالاسود. روشانها غشائيان، شفافان. بطنها اسود على صفحتيه، احمر الحيد. قوائمها الى السواد || يكثر وجودها حيث تكثر الاعشاب والنباتات الدغلية. قوتها التسع تنصه من الازراق.

١٣٠٤٠ - **سيركوبيات**  
Cercopidae (S).  
Cercopidés, Aphrophores (F). Spittle bugs,  
Froghoppers (E). Schaumzikaden (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطيفة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها المروفة عديدة، معظمها يألف البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة مبطة. رؤوسها مستعرجة. نواحيها ثائية الزلام. عرونها كبيرة. قرونها الاستشعارية صغيرة ونحيلة. تتميز بظنايبها الخلفية المادنة الاكثار، لكنها مجهزة بمناسخ حادة. وتتميز ايضا بالقصر يساعد على ذلك استطالة قوائمها الخلفية.

Fibrane (F). **سيرقي** ١٣٠٢٨  
Staple fibre (E).

نسيج اصطناعي اكثر لاذنة من اللون، مسده قصير التيلة يجمع بالمثل.

١٣٠٢٩ - **سرق**  
Acroclinium (S). Acroclinie (F).  
جلس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة تثبت برية في الاسقاع المعتدلة. منها نوع واحد زراعي تربي يفي السرق الوري.

١٣٠٣٠ - **سرق وردي**

Acroclinium roseum (S). Acroclinie rose, Immortelle rose (F). Everlasting, Immortelle flower (E). Schmaier sonnenfögel (D). Acroclinio (I).

نوع من السرق وهو نبات عشبي حولي تربي. يطو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة لاطة. نصلها سنائي الشكل، ضيق الصفحة. ازهاره رؤسية قطرها نحو ٤ م. لونها الى الوري، حثارها ابيض || ازهاره يستمر طول الصيف.

١٣٠٣١ - **سرقاط رباعي الاصابع**

Suricata tetractadactyla (S). Suricate tétractadactyle (F).

حيوان لبون لام وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات موطنه بعض مناطق افريقية الجنوبية || جسمه صغير القد، قريب الشبه بالنمس. طوله نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم. قوائمها قصيرة رباعية الاصابع، غليظة البرائن، اغصها الامامية. جلده كثيف الير. وبره احر القاعدة والقسم الاسفل، اطلس القسم الاعلى المشوب ببعض الصفار. اذناه وريانه صغيرتان مطوختان بالاسود. ذنبه الى الطلعة الصفراء باستثناء الطرف الاسود. ظهره مبيج بالاسود || ملجته الحياتي جماعي. يألف المواع الرملية حيث تنور له سهولة احتجاز الارباب. قوته الدويبات اغصها الاجزاء والفتران ثم يصل النباتات الدفصية.

١٣٠٣٢ - **سرق**

Vin acerbe (F). Sharp wine (E).  
هو النبيذ الحامض الطعم ولا يكون ذلك الا في الحمر الجديدة التي يتنصها بعض السكر.

١٣٠٣٣ - **سرقين**  
Compost  
هو السباد القوي المختبر الناجم عن غثت اوساخ وكتاسة واقدار المزرة يضاف اليه بعض الكلس بمعدل ١٠٪. تسهلا لتحويله واختباره ولسرعة تحيله فيا يهد.

١٣٠٣٤ - **سرقيني**  
Humigène (F). Humigen (E).  
نمت ترميني يطلق على كل مادة تنتج الدبال.

١٣٠٣٥ - **سرك**  
Cerque, Cornicule (F).  
Small horn-shaped cup (E).

زائدة قرنية مزدوجة لاقباسة الشكل تتحلل بما الحشرات المستقيمة الاجنحة مركزها تحت آخر رتبة فوق الحلقة الشرجية مثل سرك البليك الذي يشبه الجلم.

١٣٠٣٦ - **سركة**  
Perdrix (female) (F).  
Partridge (female) (E).  
انثى الحجل.



سرق وري



سرقاط رباعي الاصابع

الى السمرة الكستنية . فكاهها خيلمان . وهي سداسية  
الرواجب ، ثلاثية المحالب الطرفية ، مبيضة الحلب الجانبية .

١٣٥٤٨ - سرمكود  
Ovovivipare (F).  
Ovoviviparus (E).




سرمكة بنفسجية

نمت تمرني يطلق على الحشرات البويضة الوليدة كما في  
بعض القرمزيات والذباب التي يتم حفر مكنها ونقعه  
داخل الجسم عند طرف الانطوية .

١٣٥٤٩ - سرم  
Anus  
هو مخرج التلأل أي طرف المني المستقيم .

١٣٥٥٠ - سرمقاج \*  
Ephippiger ephippiger (S).  
Ephippigère, Porte-selle, Porte-hotte, Hottaux (F).  
Ephippiger (E). Sattelschrecke (D).

جندب من القرويات ثوبه الى الصفار الحلي . طوله  
٢٧ الى ٤٠ م . كوسه كبير القد مسروج ،  
يعملو تلهج متصالب اسمر اللون . زبانا دقيقتان  
مستطيلتان . مرز كالسيف شكله واستعانة . مجاديفه  
شدنية القصر . اجنته ريزية . افخاذ كبيرة . سيقانه  
دقيقة لا تمكنه من القفز المستمر . يتكرر وجوده في المراعي  
وبين الاشعاب وعلى الارض البور . قوة الورك الاغضر .  
وقد يركب الكروية فيقضي على غلبها ويؤذيها .



سرماج

١٣٥٥١ - سرمطيات \*  
Mégascoptères (F).  
Megascopétra (E).

رنية حشرات مقرقة من طبقة الفعاكات . احافورها  
تعود الى الحقبة الاخيرة من الياج الاول المرفوعة ايضا  
بالحقبة البرية || احافورها تدل على ان جمج حشراتا  
كانت كبيرة القد ، قضية الاجسام ، مقرقة كما هي  
الحال عند اليعاسيب المعاصرة .

١٣٥٥٢ - سرمكان \*  
Aeschna (S). Aeschna (F).

جلس حشرات مقرقة من السرميات . انواعه عديدة  
تعيش قرب الماء قربها اللباب والحوام وبعضها يفتس  
التحلل .



سرمان شائع

١٣٥٥٣ - سرممان شائع \*  
Gomphus vulgatissimus (S). Aeschna commun (F).

نوع من السرممان طوله نحو ٥٠ م . جوشه اغضر اللون  
يعملو تسنج اسود . يملكه مستطيل الشكل يمتدحه تلهج  
اصفر . ارجله سود || يفتس اللباب والحوام والتحلل .

١٣٥٥٤ - سرمالبيات \*  
Aeschnidae (S).

فصيلة حشرات من رنية الرعاشات . اجناسها وانواعها  
عديدة تتميز بقو طرائها وباسرعال اجنتها عند الراحة .  
اناثها تسرع في الماء الراكه تفضلت مكنها على سطحه .  
معظمها من الحشرات المفيدة لانها تقترس الحوام .



سرمج

١٣٥٥٥ - سرمسج \*  
Lysimachia (S).

جلس نباتات عشبية معمرة من فصيلة اليربيجات . انواعه  
نحو ٥٠ معظمها بري وبعضها ترابي . اوراقها متعاقبة  
ومنها قمية ثلاثية ار رباعية التسنج . افخاذها هامة  
الارتكاز . عقدوية منتصبه او سلبية || منبها  
البشرة الحارة والمعتلة . ترطب في المواقع الرطبة . اشهر  
انواعها ما يتبع .

١٣٥٤١ - سرمكود \*  
Sarcode (F). Sarcocoe (E).  
السرمكود مادة حيوانية عادمة الاغشية والشرابين .

١٣٥٤٢ - سرمكوفيل  
هي ذبابة اللحم ، اطليها .

١٣٥٤٣ - سرمكوكه \*  
Sarcocoe (S).  
Sarcocoeque (F). Sarcocoe (E).

جنس جنبات معمرة من فصيلة البقياس . موطنها الشرق  
الاقصى . سوقها فراء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م .  
اوراقها صغيرة لقياسية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن  
صفراء اللون . ثمارها نووية .  
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٣٥٤٤ - سرمكوكه سكندري الورك \*  
Sarcocoeque ruscifolia (S).

Sarcocoeque à feuilles de fragon (F).  
نوع من السرمكوكه . ساقه منتصبه تملو نحو ٢٠٠ م .

اوراقه لامعة متصل تطلو من ٣ الى ٥ م .  
ازهارها صغيرة  
الحجم ، صفراء اللون الباهت . ثماره كروية الشكل  
حراء اللون ، عنبية الحجم .

١٣٥٤٥ - سرمكوكه صفصافي الورك \*  
Sarcocoeque saligna (S).

Sarcocoeque à feuilles de saule (F).  
نوع من السرمكوكه . ساقه زياه الحلاء منتصبه تملو من

١٢٠ الى ١٥٠ م . اوراقه شبيهة باوراق الصلصاف ،  
تطلو من ١٠ الى ١٢ م . ازهارها الى الصفار الكبيرتي .  
ثماره بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٦ - سرمكوكه هوكر \*  
Sarcocoeque Houkeriana (S).

Sarcocoeque de Houker (F).  
نوع من السرمكوكه . ساقه تملو من ٩٠ الى ١٢٠ م .

اوراقه احليجية الشكل تطلو من ٥ الى ١٢ م . ازهارها  
الى الصفار الباق . ثماره نصف كروية الشكل سوداء  
اللون .

١٣٥٤٧ - سرمكوكه بنفسجية \*  
Cerooma violacea (S). Cérocôme violet (F).

Cerooma violacea (E).  
حشرة طيبة واثمة غاشلة وانجم من فصيلة المولديات ورنية  
معدنات الاجنته . موطنها معظم مناطق الياج المعتدلة  
الحارة من العالم القديم . تالفت البراري . خنافسها تعيش  
على ازهار فصيلة المركبات . يقاتها وانجم تعيش على ما  
تستطيع اقتراسه من الدب والمكن || جسمها متوسط القد  
يطول من ١٢ الى ١٤ م . ثوبها الى الزرقه البنفسجية  
يعملوها موج اخضر . رأسها مستدير الشكل . زباناها  
صنوطاين . عيناها صغيرتان . ظهورها مستدير الطرف  
اللاصف || من ميزاتها انها تقترن بعد لسها مادة صفراء  
اللون كروية الرائحة . وان جهازها التنوسي وضواها يحويان  
مادة نافثة تهيج الجلد وتثير الباء والايلاج . وهو ما يجعلها  
من الحشرات الطيبة . اما نسبة الدراجين الموجودة فيها  
فتراوح من ٩٠ الى ١٠٠٪ . الاثمت اميز قدما من الذكر  
واهبث ثوبا منه وادخر بطنها || لها جيل واحد في الحول .  
تظهر الحشرة الجميلة في اواسط ايار وتعيش حتى اواخر  
تموز . تحسر في النهار || البرقة تطلو نحو ٢٠ م .  
جسمها مبسط الشكل ، اسمر اللون ، اغبر الموج . رأسها

معتقة، متعاقبة، كبيرة القد، شارقة، قلبية الشكل. نصلها عديد العروق، كثير التجميع، لونه الى الخضار العايق || اوراقها تستعمل استعمال السبانخ. اما بزورها فطبية مسهلة ومقوية.

### ١٣٥٦٤ - سَمَرَج بَحْرِي \* ، قَطَف بَحْرِي ،

Atriplex halimus (S). **حلم**  
Arroche marin, Pourpier de mer, Halime (F).  
Sea-orache, Sea purslane (E). Meerportulak, Ständmelde (D). Porcellana marina, Disciplina fratrurn, Malochia (I).

جنية برية غشوشية تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ترغب في المواقع الساحلية المشرقة على البحر. اوراقها مأكلة وقد تخلل. يكثر استعمالها في بعض المناطق الاسبانية والانكليزية.

### ١٣٥٦٥ - سَمَرَج بَرِّي \* ، قَطَف بَرِّي

Atriplex hastata (S). Arroche des champs (F). Wild orache (E). Spiessmelde (D). Atriplice astata (I).  
عشبة برية حولية تكثر في الحقول المزروعة. اوراقها مستطيلة سنائية. ترعاها الماشية فيحسن حالها ويجود درها.

### ١٣٥٦٦ - سَمَرَجِيَّات

Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (S).  
Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicidae (F). Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها عديدة. اعطائها البلاد المنتدلة الحارة. جميعها اعشاب ونباتات بعضها يرغب في السبانخ المالحه.

### ١٣٥٦٧ - سَمَرَجِيَّات ٥

Dictyoptera (S). Dictyoptères (F).  
رتبة حشرات تنتمي الى طيقة الوردانيات، تشمل عدة فصائل اشهرها نبات وردان والسرغويات. اجناسها وانواعها زعماء ٤.٠٠٠ اكثرها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة.

### ١٣٥٦٨ - سَمَرَجِيَّات

Strombus gallus (S).  
نوع من الدلائع يكن منه اطفاغ الطيب.

### ١٣٥٦٩ - سَمَرَكَنَة \* ، مَلِكِيَنَة \* ، لَسَان الْعُصْفُور

Cerinth (S). Cérinthe, Mélinet (F). Honeywort (E).  
جنس نباتات عشبية مثاقيرة طرية برية حولية او معمرة من فصيلة المحسنيات. انواعها المعروفة نحو ١٢. جميعها اعشاب فراء. اوراقها متعاقبة حاشية بحرية اللون. ازهارها سنبلية التجميع، صغيرة القد، صفراء اللون اوانارية. تفرز رقيقاً عصلي المادة يحمره النمل || اوراقه طيبة تستعمل في علاجات العين. يزود تسكن للمصن وارباع الجنب والظهر. وفرقة منه مع الزعفران والمسل يمد الطهر تين على الحمل. وهو ينجع الباء || اشهر انواعها مايلي.

### ١٣٥٧٠ - سَمَرَكَنَة خَشَنَة ٥ ، مَلِكِيَنَة خَشَنَة ٥

Cerinth aspera (S). Cérinthe rugueuse, Mélinet rugueuse (F).  
نوع من السرنه المثقيرة البرية الحولية. عشبتها تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اهلجية الشكل. اذنياتها

### ١٣٥٦٩ - سَمَرَج رُبَاعِي الْوَرَق

Lysimachia quadrifolia (S). Lysimache à 4 feuilles (F).  
نبات معم هذه امريكة البالية. يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه زبده. اوراقه متعاقبة، لاطفة، ضمية، رباعية. نصلها اخضر اللون على صفحته. ازهاره كبيرة القد، فردية، ابطية الارتكاز، طويلة الزناد، متدلية. لونها الى البياض النقي || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

### ١٣٥٧١ - سَمَرَج شَالِم

مشهور باسم مرجية. اطليا.

### ١٣٥٨٠ - سَمَرَج عَقِيْقِي

Lysimachia atropurpurea (S). Lysimache pourpre noir (F).

نبات حولي او حول يملو نحو ٦٠ سم. ساقه سرسة. اوراقه متعاقبة اهلجية. نصلها مالس البشرة، اخضر الصفحة العليا، عايق السفلى. ازهاره متوسطة الكثافة متدلية. لونها الى الحمرة العقيقية || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

### ١٣٥٨٩ - سَمَرَج مِزْوَال

Lysimachia ephemerum (S). Lysimache éphémère (F).  
نبات معم يملو نحو ١٥٠ سم. ساقه سرسة. اوراقه لاطفة، متعاقبة، سنائية. نصلها بحري اللون. ازهاره عتقودي، منتصب، مستطيل. ازهاره صغيرة القد، بياض اللون || يزهر من تموز الى آب. يرغب في الارربة الكلسية.

### ١٣٥٩٠ - سَمَرَج مُسْبِل ، سَمَرَج مِثْنِي

Lysimachia barystachys (S). Lysimache à gros épis (F).

نبات سرويي معم هذه العين. يملو نحو ٦٠ سم. ساقه زبده. اوراقه متعاقبة اهلجية. نصلها خلي البشرة اخضر الصفحة العليا بحري السفلى. ازهاره سبي الشكل كثيف التجميع. ازهاره صغيرة القد بياض اللون || يزهر من حزيران الى تموز.

### ١٣٥٩١ - سَمَرَج مُوْثَم

Lysimachia punctata (S). Lysimache ponctué (F).

نبات معم يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقه زبده. اوراقه متعاقبة ضمية ثلاثية او رباعية التجميع. نصلها سنائي الشكل، خلي البشرة على صفحته. ازهاره صفراء اللون يعلوا تيشيح احمر ويهدب ودي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

### ١٣٥٩٢ - سَمَرَجِيَّات ، قَطَف

Atriplex (S). Arroche (F). Orache (E).  
جنس نباتات برية، عشبية حولية او غشوشية معمرة من فصيلة السرمقيات. انواعها عديدة منتدبة الاقاليم المعتدلة. سوقها غزيرة العصارة اللينة الزجة. اوراقها متعاقبة، ازهارها قياسية متباينة الالوان || اشهر انواعها مايلي.

### ١٣٥٩٣ - سَمَرَج اِبْيَض \* ، قَطَف اِبْيَض

Atriplex hortensis (S). Arroche des jardins, A. épinard, Belle-dame, Bonne-dame, Chou d'amour, Follette (F). Orache, Butter leaves, Mountain spinach (E). Gartenmelde, Grünkraut (D). Atriplex, Spinacione, Bella dama, Bietone (I).

بقلة زراعية حولية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها



سَمَرَج اِبْيَض



سَمَرَج بحري



سَمَرَج بري



سَمَرَكَنَة

سُرْتَجَة صَغِيرَة - سُرْتَجَة صَغِيرَة  
الْوَرَق

الاحجام قطرها من ١٠ الى ٥٠ مليمكرون. اشهرها واعما انتشاراً يورس Y ويورس A ويورس X ويورس S ويورس F ويورس M. كل منها يشكل غرباً منفرداً له ميزاته الخاصة. جميعها مؤذية تعطب الارواك والسوق والساق. وهي من الاصنام المستعصية التي عجز العلم حتى الآن من معالجتها والقضاء عليها. فاقاوة باجتناب البدار الملوث والارابة المويودة والزراعات المائلة القريبة هي غير حامية مستعانة الاّن .



سُرْتَج البطاطا

١٣٥٧٧ - سُرْتَج التَبَاق \* (F). Mosaïque du tabac (F).  
(E). Mosaic disease of tobacco (E).

نوع من السُرْتَج تسببه يورس مركبة قصيية الشكل تطول من ٢٠ الى ٧٠ مليمكرون تتنقل مع السُغ الى سائر اعضاء النبات اغصنها الاوراك والساق || مظهره الخارجي ، على الارواك الفتية ، بقع عابقة وباهتة لاقياسية الشكل والترتيب تملو صفحة النصل وتقومه الى مختلف الاشكال التشويحية القريبة اغصنها الاستمالة والتفريص والتجميد والانكماش . ولذا افرى الارواك بعد اكثال نموها يبقجها دون ان يشو شكلها .



سُرْتَج التينج

١٣٥٧٨ - سُرْتَجَة \* ، فِيلَا دِلْفُس

Philadelphus (S). Seringa (F). Syringa, Mock orange (E). Jasmingetenstrauch, Falscher Jasmin (D). Syringa, Fior d'angiolio, Pazzienza (I).

جنس شجيرات برية ورتيبية من فصيلة السُغريسات (القلبيات). انواعها نحو ١٥ منها فراء . فروصها متقابلة . اوراقها عابلة ، معققة ، متقابلة ، يضيئة النصل المسن الحافة || ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل ، مختلفة التجميع ، اقية البتلات المنبسطة ، كثيرة الاسدية ، يضاء اللون . بعضها فواح المشع المثل الفصار || اشهر انواعها الرتيبية ما يتبع .

١٣٥٧٩ - سُرْتَجَة زَبَاة \* (S). Philadelphus hirsutus (S).  
Seringa hérissé (F).

شجيرة سروية مهددا امريكة الشالية . تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم . نصلها منشاري الحافة ، خلي الصفحة السفلى || ازهارها عادمة العرف ، يضاء اللون قطرها نحو ٣ سم || تزهر في حزيران .

١٣٥٨٠ - سُرْتَجَة شَالَمَة \*

Philadelphus coronarius (S). Seringa commun (F). شجيرة سروية عديدة الضروب مهددا القوقاز واربية . تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصلها ساني الشكل ، مائل الصفحة العليا ، خلي السفلى ، مهدب الحافة || ازهارها فواحة العرف ، يضاء اللون ، خاسبة التجميع ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



سُرْتَجَة

١٣٥٨١ - سُرْتَجَة صَغِيرَة الْوَرَق

Philadelphus microphyllus (S). Seringa à petites feuilles (F).

جنية رقيقة مهددا امريكة الوسطى . تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقها سنائية تطول نحو ٣ سم . نصلها ازغب الصفحة السفلى . عادم التئين || ازهارها صغيرة القد ، عريفه الرائحة ، يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

مستطيلة . نصلها مهدب الحافة المسنة ، مدرن البثرة على صفحته . ازهارها متدلية ، تويجها ارجوانية اللون ، صفر الاطراف || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٣٥٧١ - سُرْتَجَة صَغِيرَة \* ، هَلِينَة صَغِيرَة \* ، حَشِيشَة الْبَرَص (لَسَان الْعَصْفُور الصَّغِير)

Cerinth minor (S). Céranthe petite, Mélinet minor, Petit mélinet (F). Small honey-wort, Waxflower (E). Gelbe wachsbume (D). Erba valola (I).

نوع من السُرْتَجَة المثرية البرية وهي عشية محولة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها مستديرة الاذنيات ، يضيئة الشكل . نصلها مدرن الصفحة العليا . ازهارها الى الصفار الكبيرتي يملوها عند قواعدا تبقج خاسي المدد ابيض اللون او احمر . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٥٧٢ - سُرْتَجَة هَالَسَة \* ، هَلِينَة هَالَسَة \*

Cerinth glabra (S). Céranthe glabre, Mélinet glabre (F).

نوع من السُرْتَجَة المثرية المعمرة . يجلتها تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها يضيئة الشكل ، دقيقة الاذنيات . نصلها مائل البثرة على صفحته . ازهارها ذهبية اللون محبة التفصوص . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

١٣٥٧٣ - سُرْتَجَة مَقَابِرَة \* ، هَلِينَة مَقَابِرَة \* ، (لَسَان الْعَصْفُور الْجَبَلِي)

Cerinth retorta (S). Céranthe retournée, Mélinet retourné, M. de montagne (F). Honey-wort (E). Wachsbume (D). Cerinta (I).

نوع من السُرْتَجَة المثرية البرية وهي عشية سولية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مستديرة الاذنيات ، اهليلجية الشكل . نصلها مدرن البثرة على صفحته . ازهارها صفر التريجات ، بنفسجية التفصوص || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٥٧٤ - سُرْتَجَة مَلَطَخَة \* ، هَلِينَة مَلَطَخَة \*

Cerinth maculata (S). Céranthe maculée, Mélinet maculé (F).

نوع من السُرْتَجَة المثرية المعمرة . يجلتها تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم . اوراقها اهليلجية مستطيلة ، اذنياتها مستديرة . نصلها مدرن الصفحة العليا . ازهارها نارية اللون يملوها عند قواعد تفصوصها تبقج ازرق || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٣٥٧٥ - سُرْتَج \* ، فُسَيْتَقَسَاء \* (F). Mosaïque (F).

جنس اصنام يورسية فتاكة عديدة الانواع تصيب النبات فتؤذيهم وقد تقضي عليه . يورسها ذرية القند لا تشاهد بانهاجر العادية لان طولها يراوح من ١٠ الى ٦٠ مليمكرون . وهي تعيش داخل السُغ النباتية وتتغفل اليها مع السُغ بواسطة الجروح والاغاديش والحشرات القاضية والماساة || اشهر انواعها واغرها سُرْتَج البطاطا والتينج والبندورة والشيك .

١٣٥٧٦ - سُرْتَج الْبَطَاطَا \*

Mosaïque de la pomme de terre (F). Mosaic of potato (E).

نوع من السُرْتَج تسببه يورس اسطوانية الشكل مختلفة

## ١٣٥٨٨ - سُرِهَيْت ٥ Cirrithes (S).

Cirrhithe, Cirrhithe (F). Cirrithes (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة السرهيتيات. انواعها المعروفة ستة ، اعطائها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. جميعها فردية الزعانف الظهرية المستطيلة الكثيرة المناخس. زعانفها الشرجية ثلاثية المناخس الحادة. اقواسها متباعدة الالوان منها الاصفر والاشهب والاخضر البحري والاحمر والاريد الرصاصي ، جميعها مزودة بالظهور والجوانب || اعرف انواعها واشهرها السرهيت الجذع .

## ١٣٥٨٩ - سُرِهَيْت مُجَدِّع \* Cirrithes maculatus (S). Cirrhithe maculé (F).

نوع من السرهيت . اعطائها البحر الاحمر . تعيش قرب الجاذب . لجنها الحيالي جماعي . اجسادها متوسطة العدد || جسمها اهليلجي الشكل ، متثلل التلطيط ، يطول نحو ٣٥ سم . رأسها خافت الجبهة ، امفر اللون يطولو تنقيط اصفر . عظمها قصير . شفقها دون الوسط . عينها كيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، قاطبة ، القسم الامامي منها تساعي المناخس الخلفية الطوك ، المرفوعة بالجفوي . زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة . زعنفتها الشرجية ثلاثية المناخس المنمقة الحادة . زعنفتها الذيلية مقنطرة الطرف || نوبا الى الشهية ، يعلوها في ظهرها وجانبها قيج قيج وتجعل امر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

## ١٣٥٩٠ - سُرِهَيْتِيَّات ٥ Cirrhitidae (S). Cirrhitidae (F). Cirrhitidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || اسماكها معتدلة القد ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . سفنها صغير الحجم مستدير الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية تحمل مناخس حادة || اعرف اجناسها واشهرها السرهيت .

## ١٣٥٩١ - سُرُو Cupressus (S). Cyprés (F).

Cupress tree (E). Echte zypress (D). Cipresso (I).  
جنس اشجار حرجية وزيينية من سبط السرويات وفصيلة السنوبريات . انواعها نحو ١٥ تحملها المناخس العامة ترتكز على الميزات التالية : بانثاقها مرفوعة ، براعمها مغطاة بالاوراق . اوراقها عروية ، فلسية ، متقابلة ، مقلقة ، مرسوسة على اربعة صفوف وهي ساعدة القاعدة ، والزام الاول || ازهارها طرية وحيدة الشق والمسكن ، والدكرية منها كثيرة الاسدية وحبوب اللقاح || ثمارها اكرار كروية الشكل تتألف من جراثيم مصفحة ، ليفية ، جامدة براوح عددها من ٦ الى ١٤ || يزورها صغرة مجنسة لا قياسية الشكل والحجم || اشهر انواعها ما يتبع .

## ١٣٥٩٢ - سُرُو أُرِيُونُو Cupressus arizonica (S). سُرُو أُرِيُونُو (F).

Cyprés de l'Arizona (F).  
شجرة سبروتية سريعة النمو مهدا اريزون من امال امريكا . تطول من ٢٥ الى ٣٥ م . بانثاقها دقيقة ، لاقياسية الانتظام . اوراقها راتحة ، فلسية ، شديدة الصغر ، لوها الى الخضر الازرق . رصها رائحي ابيض اللون . ازهارها الذكرية كبريتية اللون الا لانتوية

## ١٣٥٨٩ - سُرُنْجَة عَادِمَة العُرْف Philadelphus (S). Deutzia corymbosa (F).

شجرة سبروتية مهدا امريكا الشمالية . تطول من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضية مديبة المقصدة ، تطول من ٦ الى ١١ سم . تصلها منس الحافة ، خلي العروق || ازهارها عادمة العرف ، وثرية التجميع ، فردية او ثلاثية ، قطرها نحو ٤ سم . لوها الى اليباض المالح || ازهارها يستمر من ٤ الى ٥ اسابيع ابتداء من اوائل ايار .

## ١٣٥٨٣ - سُرُنْجَة كَبِيرَة الزَهْر Philadelphus grandiflorus (S). Seringa à grandes fleurs (F).

شجرة روفية مهدا امريكا الشمالية . تطول من ٤ الى ٦ امار . اوراقها بيضية تطول من ٨ الى ١٤ سم . تصلها ماس الشيرة ، منشاري الحافة || ازهارها قليلة العرف ، يبيض اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . عناقيدها الزهرية مستطيلة قليلة الكثافة || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٣٥٨٤ - سُرُنْجَة مَكْسِيكِيَة Philadelphus mexicanus (S). Seringa mexicana (F).

شجرة سبروتية مهدا المكسيك تطول نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عروية صغرة القد تطول نحو ٥ سم . تصلها جلدة الصفعة منس الحافة || ازهارها عروية الرائحة ، يبيض اللون يعلوها ، عند انتشاب بتلاتها ، من الداخل ، تمشش اربواني || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



سُرُونُف صِيَاد

## ١٣٥٨٥ - سُرُنْجِيَّات ٥ Paleoptera (S). Paléoptères (F). Paleoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المنحنيات اصلًا . تشمل حاليا طيقتين واربع رتب تعريفها ما يلي :  
١ طبقة الليبيات التي تشمل رتبة الألويفيات ورتبة الزعنفيات .  
٢ طبقة الرعييات التي تشمل رتبة الجحليات ورتبة الرعاشات .

## ١٣٥٨٦ - سُرُونُف Balbuzard (F). Bald buzzard (E).

السرونوف ج سرائيف . جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات . انواعها عديدة جميعها من القاطم : اجنسها مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية ، شديدة الانحناف || عجنة البرة الذرية || يالغ الاخر والحيبرات والشطوط البحرية . قوته الاسماك . يلدن عشه في الاشجار الرقيقة او على الصغور النابتة قرب مجاري الماء . اناته تحضن وجدا من ٣ الى ٤ رفقات نحو الشهر || اشهر انواعها واحرفها السرونوف الصياد .



سُرِهَيْت جَمْع

## ١٣٥٨٧ - سُرُونُف صِيَاد \* ، سُرُونُف بَحْرِي ، عَقَاب صَيَاغَة Pandion halliaetus (S).

Balbuzard pêcheur, B. fluviatile (F). Aspray (E).  
نوع من السرونوف ربع الجثة طوله براوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . ويستطه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم . رأسه معتقه وبعنه يبيض . صدره مديج ومنش . ظهره الى السمرة ذبه مجاع بستة خطوط متفرعة متساوية . عيناه الى الصفرة الباقية . منسره وضالته سود || يالغ الشطوط البحرية ومجاري الماء . قوته الاسماك .



## ١٣٥٩٨ - سُرُو مَكْنَاب

*Cupressus macnabiana* (S). *Cyprés de Mac Nab* (F). شجرة جادحة بطيئة النمو مهدها كليفورية. تملو من ٣ الى ١٠ أمتار. بناتها قصيرة جامدة لاقياصة الاوتكانز. اوراقها فلسية، مستعرضة، راحته. صنفها راتنجي ابيض اللون. اكرازها سداسية الجرامات || ترطب في الاقاليم المعتدلة والارابة العميقة الغور المتوسطة الاندماج والرطوبة.



سرو شائع

## ١٣٥٩٩ - سُرُو تَحِيْس، سُرُو الْفَكَاير

*Cupressus funebris* (S). *Cyprés pleureur*, *C. funebre* (F). شجرة سبروتية سريعة النمو. مهدها الصين. تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. بناتها نظامية، مبططة، جيلة الخضار الباهت. اوراقها مدهية، شديدة الخضار الزاهي. اكرازها صغيرة قطرها نحو ١٢ سم. جراماتها من ٦ الى ٨ لونها الى الزبداء السوداء || تجود وتنمو في جميع الارابة.

١٣٦٠٠ - سُرُو *Ovipare* (F). *Oviparus* (E). هو كل حيوان يتكاثر بالسرور او البيض. راجع بيوض.

١٣٦٠١ - سُرُو *Cupressinées* (F). سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل السرو والرعرع والتويا والسندرك والسندروس.

١٣٦٠٢ - سُرِيَّات *Chitridinae* (S). *Chitridinées* (F). *Chitridinae* (E). مرتبة من رتبة الفطور البيضية تشتمل على فصليتين الصمغريات والمولقيات.



سرو كليفورني

١٣٦٠٣ - سُرِيَّة *Oolithe* (F). *Oolite* (E). اترية كلسية منسوبة الى الجودية ذاتها كسر السلك. اشهرها.

سُرِيَّة بِيضَاء *Oolithe blanche* (F). *White oolite* (E). سُرِيَّة حديدية *Oolithe ferrugineuse* (F). *Ferruginous oolite* (E).

سُرِيَّة دَحْنِيَّة *Oolithe miliare* (F). *Miliary oolite* (E). سُرِيَّة كَبِيرَة *Oolithe grande* (F). *Big oolite* (E).

١٣٦٠٤ - سُرِيَّة، لَيْبَاز *Lapiaz*, *Lapiez* ديار طبيعي لاقياص السق والاسانج يحدّد سطح التَشَوُّز الجمعي. ج. اسرية.

١٣٦٠٥ - سُرِيَّاق *Criquet* (F). *Locust* (E). هو الجراد من أي جنس او نوع كان.

١٣٦٠٦ - سُرِيَّة *Cerithium* (S). *Cérithie* (F). *Cerithium* (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاريل وفصيلة السريريات. انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاساقب الاول وبعضها معاصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصداها متباينة الاجسام، جميعها غروطية حلزونة ويفرغها التنديد القوي. الوانها سوية تغلب فيها الخضاضات الفاتحة.



سُرِيَّة

١٣٦٠٧ - سُرِيَّة *Rigole* (F). *Trench* (E). جري ماء الساقية او الري.

فالخضار البحري || اكرازها صغيرة القد قطرها نحو ٢٥ م. لونها الى الجوزة ويلونها حل صنتاني. جراماتها من ٨ الى ١٠ م. وهي جيلة الشكل شائعة الاستعمال التزيني. تجود في جميع الارابة ولا تحصى الكلسية.

## ١٣٥٩٣ - سُرُو بَحْرِيّ الْوَن

*Cupressus glauca*, *C. lusitanica*, *C. coulteri* (S). *Cyprés glauque*, *Cèdre de Goa* (F). شجرة سبروتية في الاقاليم الحارة، جادحة في المعتدلة. مهدها المكسيك. تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. بناتها نظامية، رباحية الاصلع، بحرية اللون. اوراقها مدهية عادمة الرشح الراتنجي بحرية الخضار. ازهارها الذكورية صفراء اللون يملوها موالج ارجواني اما الانثوية فال الزبداء المزهجة بالبفسجي || اكرازها صغيرة بيضية الشكل لونها الى الجوزة الفاتحة || تجود في جميع موائل ساحل البحر المتوسط وفي كل تربة.

١٣٥٩٤ - سُرُو تَحْلَايَا *Cupressus torulosa* (S). *Cyprés toruleux* (F).

شجرة سبروتية في الاقاليم الباردة والمعتدلة، جادحة في الاقاليم الحارة. مهدها حلايا. تملو من ٢٥ الى ٤٠ م. بناتها نظامية، قياصة، دقيقة القد، فسفتية اللون. افتادها وخراحيها متبدلية. اوراقها شديدة الصفر عابقة الخضار. ازهارها الذكورية صفراء اللون اما الانثوية فال الزرة البنفسجية. خشبها احمر اللون ناعم الرقعة. اكرازها صغيرة. جراماتها مقربة || لها غمران مهوران. *Cupressus torulosa coreyana*, *C. tor. majestica* (S).

## ١٣٥٩٥ - سُرُو شَائِع

*Cupressus sempervirens* (S). *Cyprés commun* (F). شجرة سبروتية سريعة النمو مهدها حوض البحر المتوسط فروجها عديدة تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. بناتها دقيقة، غبراء اللون، لاقياصة الاوتكانز. اوراقها فلسية، شديدة الصفر، عابقة الخضار، راتنجية الرائحة. قطر كرزها يراوح من ٣ الى ٤ سم. وعدد جراماته من ٨ الى ١٤ || اقلها المناطق الحارة والمعتدلة. لا تستعمل كثرة الصنغ واستمراره. تجود في جميع الارابة. تفصل الري. تستعمل لصد الرياح || فروجها المشهورة خشنة، امحورها الحلبية ما يلي:

*Cupressus sempervirens contorta*, *C. s. fastigiata*, *C. s. horizontalis*, *C. s. thuyaeifolia*, *C. s. variegata* (S)

## ١٣٥٩٦ - سُرُو كَشْمِير

*Cupressus cashmiriana* (S). *Cyprés du Cachemire* (F). شجرة رفيعة بطيئة النمو مهدها الهند والتبت. تملو من ١٠ الى ١٥ م. بناتها نظامية نخيلة دقيقة. اوراقها بحرية الخضار. افتادها وخراحيها متبدلية الاطراف. اكرازها كروية قطرها يبلغ ١٥ سم. جراماتها من ٨ الى ١٢ لونها الى الحنطلي الباهت || تعتبر من اجل الانواع التزينية لكنها قليلة الانتشار نظراً لطلباتها القوية والوقمية.

## ١٣٥٩٧ - سُرُو كَلِفُورِيَّة

*Cupressus goveniana* (S). *Cyprés de Californie* (F). شجرة جادحة بطيئة النمو مهدها كليفورية. تملو من ١٠ الى ١٥ م. بناتها نخيلة، قصيرة، جالسة الانتصاب. اوراقها عابقة الخضار. اكرازها كروية قطرها نحو ٢ سم. جراماتها سمرار اللون يملوها موالج بنفسجي لاصع.



سريع

الايض المتوسط . مسرحها يمي ولا تقترب من القفاز والمجادح إلا في الربيع والخريف || جسمها اهليلجي الشكل بطول من ٨٠ إلى ٩٠ سم . ثوبها الى الزبدية القفصية تزرق وتشتد زرقتها عند الظهور وتزهر وتبيض عند البطن . رأسها معتدل الجرم ، قصير الحلق . عيناها كبيرتان . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها كثيرة العدد . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لا امتساوين . الجزء الامامي يمشي الشكل ناشز المناسخ الحادة اغصها الاول المنطقت اقنبا نحو الرأس . الجزء الثاني نظلي الشكل ، عادم المناسخ . زعنفتها الذيلية فارقة || لحما متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٦١٥ - سَرَيَّة ٥ (F). Hard-raed (F). Euvé  
كل سمكة اثني لا يزال جرابها الشلخي مئز بالسرة تمت بالسريرة .

١٣٦١٦ - سُسُيُولُوجِيَّة (F). Sociologie (F).  
السيولوجية علم يبحث في الجماعات البشرية وفي الناشع الاجتماعية .

١٣٦١٧ - سَطَاحَة  
« حجرة تنبت في الديار في اعطان المياه ترعاها الماشية وينسل بورقها الرووس » (السان) .

١٣٦١٨ - سَطَاقِسْ ٥ هو السطاس ، اطلبه .

١٣٦١٩ - سَطَاع (F). Pillar (F). Pillar (E).  
كل عمود فالت ترتكز عليه السلطان واهب .

١٣٦٢٠ - سَطَاقِسْ ، سَطَاقِسْ (F). Stachys (S). Epiaire (F).  
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الشفويات . انواعه زعاه ٢٠٠ معظمها عشبي وبعضها جنبي سوقها فراء . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، منقطة . ازهارها سفلية التجميع تاجية الارتكاز اكثرها عطرة || اشهر انواعه يتبع .

١٣٦٢١ - سَطَاقِسْ الناقع ٥ (F). Stachys palustris (S). Epiaire des marais, Ortie des marais, Ortie morte (F). Marsh betony, Clown's all-heal, Marsh wound-wort (E). Sumpfziest (D). Scabiosa palustre, Spigo fiorito (I).  
نوع من السطاس وهو عشبة برية متقيمة نحو نوع ١٠٠ سم . ساقها فراء . اوراقها مقطوعة . ازهارها ارجوانية اللون . تستعمل في تطليب بعض الملل الجبلية .

١٣٦٢٢ - سَطَاقِسْ جِرْمَانِي \* ، قَارَه ، وَرْطُورَه (F). Stachys germanica (S). Epiaire de Germanie, Saugé molle, Stachyde, Epi fleuri (F). German stachys, Downy wound-wort (E). Deutscher ziest, Ziest (D). Stachide germanica, Spica fiorita, Madre salvia (I).  
نوع من السطاس وهو عشبة برية وتربينية معمرة . ثملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها مفلمة زياه اللحاء . اوراقها قلبية القامة . نصلها خلي البشرة ، مسن الحافة . ازهارها ودية اللون ، فضية السبله الزباء || ازهارها يستمر من سزيان الى ايلول .

١٣٦٢٣ - سَرَيَاتِيَّات ٥ (S). Cerithiidae (F). Cerithiidae (E).  
فصيلة من الرغويات مغديات الارجل مشطيات الخياشم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الاول والبعض الآخر ماعاصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصداها غروطة عازلة ، قريبة القوابل الغائرة ، مفرغة الاخاديد ، شبه مستديرة القوطة المنثبة بنتو بحمي الرأس || اعرف اجناسها واشهرها السريت والسرتونه والسرتوية والبستوية والبست .

١٣٦٢٤ - سَرَيَّة ٥ (F). Didelphus (S). Sarigue (F).  
جنس حيوانات راسمة من الجرابيات . انواعه المعروفة ٤٠ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طولا يراوح من ١١ الى ٥٦ سم . وذناها من ٧ الى ٣٨ سم . رؤوسها اسفلية . اذانها كبيرة مستديرة . اعناقها غليظة . جازمها قصيرة . اظفارها حادة . اذنانها اخاذة ، مستطيلة ، كاسية الزام الاول حرشفية الثاني والثالث والرايع || اجرة اناها كبيرة القند مطالة . أطباؤها ورية الترتيب يراوح عددها من ٧ الى ٢٥ . مجبل الاثني يدم ٢٥ يوما تقص على اثره من ٤ الى ١٦ درصا . وهي من الحيوانات الشاجرة تسرح في الليل . قوتها الحشرات عسل اختلاف انواعها والزخافات مع الافاعي والصدافين ويضها والثار السكرية عند الحاجة .

١٣٦٢٥ - سَرَيَّة هو الصف من الكرم . راجع سربة .

١٣٦٢٦ - سَرِيكَة ٥ (S). Serica (F). Sérèque (F). Serica (E).  
جنس حشرات خافضة من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون ونصفه الجليط . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطمة ، شبه اهليلجية الشكل ، محدبة الرأس والكوسل والقند ، تطول من ١٤ الى ١٨ سم . رؤوسها مستعرضة . متاكها قاضمة . عينها بارزة . قرونها الاستشعارية مرفقية ، صفيحية الاطراف . اعماها محدة لاحفة . قوائمها نشيطة ، متوسطة الشغالة . اناها وحيدة اللون السوي يكثر فيها الكسئي ثم الاصعبر والاسود والاسمر ، جميعها سماء المواج || تعيش على المواد النباتية المختلفة .

١٣٦٢٧ - سَرِيُولَة ٥ (F). Seriola (S). Sérôle (F). Seriola (E).  
جنس اسماك بحرية من الاسمريات شاكات الزعانف .

انواعها المعروفة نحو عشرة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة القند ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . ثوبها الى الزبدية القفصية المواج تعيق وتشتد ممرتها مع الاقتراب من ثبح الظهر وتزهر وتبيض عند البطن . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لا امتساوين ، الجزء الخلفي نظاسي مستطيل . الجزء الامامي صغير القند ، ناشز المناسخ اغصها المنخس الامامي الموازي لخط الرأس . زعنفتها الذيلية فارقة || اشهر انواعها واعرفها سرولية المتوسط .

١٣٦٢٨ - سَرِيُولَة المتوسط ٥ (F). Seriola dumerilii (S). Sérôle de la Méditerranée, S. argentée (F). Silver seriola (E).  
نوع من السرية . سمكة بحرية بيوض . اعطائها البحر



سرية المتوسط



سطاس المنافع



سطاس جرماني

بامتلائة سوقها وهي عصفية الشكل ثلاثية الحروف الحادة القاضية . أزهارها وحيدة الشئ سبيلية التجميع . جذاميرها ملية معرقة || اشهر انواعها ما يتبع .



سَطَائِصٌ سَبْيَلِيَّةٌ

### ١٣٦٣٦ - سَعَادَى الرَّمْلِ \* Carex hirta (S).

Carex hérissée, Laitche des sables (F).

نوع من السادى يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مستطيلة البصل الضيق القائس الحرف. سبيله غفية اللون. يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لتثبيتها كائسب .

### ١٣٦٣٧ - سَعَادَى بَلْدَنَسِيَس \* Carex baldensis (S).

Carex baldensis (S). Laitche du Mont Baldo (F).

نوع من السادى يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مستطيلة ضيقة . سبيله الزهرية قصيرة مستعرضة تكتنفها ثلاث اوراق صغيرة شاذكة || يرغب في المواقع الجبلية والارابة الكلسية .



سَطَام

### ١٣٦٣٨ - سَعَادَى شُرَاخِي \* Carex scaposa (S).

Carex scaposa (S). Laitche à hampe (F).

نوع من السادى . قصبه ساقه شُرَاخِيَة الشكل تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ضيقة مستطيلة اقصر من نصبة الساق . عذكو الزهرى بطول ٨ الى ٢٠ سم. وهو عديد السبيل المنسجة بالاشهب والاخضر || يرغب في المواقع الظليلة والارابة الرطبة .



سَعْر

### ١٣٦٣٩ - سَعَادَى عُنُقُودِي \* Carex baccans (S).

Carex baccans (S). Laitche à grappes (F).

نوع من السادى يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه تطوي من ٧٠ الى ١٨٠ سم. فصلها جلدي السنج ، ارجواني المختار . ازهاره عذكو التجميع ، سبيله كبيرة التقد لنوا الى الحمرة || يعيش في المراكن والمنازل .

### ١٣٦٤٠ - سَعَادَى مَدَاك \* Carex baccans (S).

Carex baccans (S). Laitche à grappes (F).

نوع من السادى يعرف بالحب ، اعطيه .



### ١٣٦٤١ - سَعَار \* Carex baccans (S).

Carex baccans (S). Laitche à grappes (F).

نوع من السادى يعرف بالحب ، اعطيه .

### ١٣٦٤٢ - سَعَاظ \* Carex baccans (S).

Carex baccans (S). Laitche à grappes (F).

الريح الطيبة من كل شيء والزهر والخمر والتأثر وغيرها .

### ١٣٦٤٣ - سَعَب \* Carex baccans (S).

Carex baccans (S). Laitche à grappes (F).

سبب الشيء مظهره وتسمب الشيء تملط .

### ١٣٦٤٤ - سَعَا \* Carex baccans (S).

Carex baccans (S). Laitche à grappes (F).

هي القلور الاستباي .



سَعَادَى الرَّمْلِ سَعَادَى شُرَاخِي

### ١٣٦٤٥ - سَعْتَر ، صَعْتَر \* Thymus (S).

Thym (F). Thyme (E).

جنس نباتات عشبية خشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة جميعها من الافاوية . مهدا البلاد المعتدلة . اوراقها صغيرة ، كاملة ، متقابلة ، فصلها غدي الصلصة ، ازغب البشرة ، غده متصالية الاوتكاد ذرية الحجم غنية بطمر التيمول || ازهارها صغيرة التقد ، حطرية العرف ، وديسة اللون الى الالكية . اشهر انواعه يتبع .

### ١٣٦٣٧ - سَطَائِصٌ سَبْيَلِيَّةٌ \* ، إِرَاقِلِيَّة ، سَبْيَلِيَّة

Stachys recta, S. procumbens (S). Epiaire droite, Crapaudine (F). Upright hedge nettle (E). Bergzzest (D). Erba giudaica (I).

نبات عشبي طيبى يري معمر من السطائس . يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقه قليلة الفروع زياء السماء . اوراقه سنانية . فصلها خلى البشرة يبدو كانه فصي . ازهاره مستطيلة الشكل كثيفة لائكية || كان شائع الاستعمال الطبي وقد اهل لكراهية راجحه .

### ١٣٦٣٨ - سَطَام \* Origine (F). Origin (E).

Origine (F). Origin (E).

هو الاصل ج سلم .

### ١٣٦٣٩ - سَطَام \* ، أُو مِلَقَط \* Anastomus (S). Anastome (F). Anastomus (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة القائى . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاه بعض مناطق افريقية الوسطى والشرقية والهند وجزر الزايج . ملجتها الحيائي جامعي . يكثر ويوجد قرب الشطوط ويجاري الماء . قوتها الاسماك والصفادع والتمارين والورز || تتميز بصفحاتها متناقدها المستطيلة المشطوفة الحدود الداخلية كالمشاش . اعناقها وقوائمها مستطيلة . اذنانها قصيرة . اجنتها لاحفة . اظفارها الى البيضاء الاغبر باستثناء الاذناب واطراف الاجنحة السود .

### ١٣٦٤٠ - سَطَالَة \* Surface

Surface

هي سطح مقف البيت من اي طابق كان .

### ١٣٦٤١ - سَطَح \* Plan

Plan

سطح ثنائى .

### ١٣٦٤٢ - سَطَح ثَنَّائِي \* Quadrigue (F). Quadric (E).

Quadrigue (F). Quadric (E).

سطح ثنائى .

### ١٣٦٤٣ - سَطَح مُسْتَوٍ \* Surface plane (F).

Surface plane (F).

سطح مستوي .

### ١٣٦٤٤ - سَطَوَال \* Level surface (E).

Level surface (E).

هو الجدار المقيد ، اعطيه .

### ١٣٦٤٥ - سَطُور \* Suthora Nipalensis (S).

Suthora du Népal (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم غروطيات المناقير وفصيلة الترققيات . موطنه يتعد الى الهند الى الصين ، يكثر ويوجد في غابات التيبال . ملجتها الحيائي جامعي . افواجه قليلة العدد . قوته الحشرات ومكثها ويرقاتها والتأثر واليزور البرية || جسمه شبيه بالقرقف الكبير . طوله نحو ١٥ سم . يتميز بقنبرته القصيرة وبذنبه المروحي الشكل عند الانقباض . ثوبه الى الخضار البنفسجي الماجة . بطه الى البركة الصفراء اللواج .

### ١٣٦٤٦ - سَطُورِيُون \* Suthora du Népal (F).

Suthora du Népal (F).

هو السلب ، اعطيه .

### ١٣٦٤٧ - سَطُور \* Insolation (F). Sun-stroke (E).

Insolation (F). Sun-stroke (E).

هو الضيق ، اعطيه .

### ١٣٦٤٨ - سَعَادَى \* Carex (S).

Carex, Sedge (E). Segge (D). Carice, Lisca (I).

جنس نباتات جنسورية معمرة من فصيلة السدييات . انواعه المعروفة زهاء ٥٠٠ سوقها ثلاثية الاصلع . اوراقها



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْدٌ شَرْقِي

١٣٦٦٦ - سَعْتَرُ الْبَرِّ \* ، سَعْتَرُ بَرِّي ، زَعْتَر  
Thymus serpyllum (S). Thym serpolet, T. sauvage,  
Serpolet (F). Creeping thyme (E). Feldquendel,  
Thimian (D). Timo serpillio, T. salvatico, T. cedrato,  
Serpillio (I).

نوع من السعتر يملو نحو ٢٥ سم. ساقه فراء، فروعهما  
السفل أفقية الانتشاب ثم ترتفع. أوراقه احليجية. نصلها  
مهذب الفلج، بارز العروق، خلي البشرة. ازهاره  
وردية اللون. يستخرج من اوراقه وازهاره التيمول.

١٣٦٤٧ - سَعْتَرُ الْبَرِّ \* ، سَعْتَرُ قَرَايِي ، حَاشَا  
Thymus capitatus (S). Thym de Crète (F). Heided  
thyme (E). Kretischer thymian, Kopfstureil (D).  
Timo di Creta (I).

نوع من السعتر يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه فراء.  
اوراقه بيضية الشكل، العلوية منها اعرض نصلها من  
السفل واقل زغباً وطلا. ازهاره وريدية اللون. اوراقه  
واذهاره بلسية العرف والاطم يستخرج منها عطر السعتر.

١٣٦٤٨ - سَعْتَرُ امْرُط \* ، سَيْسْتَر ، نَمَام ،  
نَمَامُ الْمَلِكِ ، زَيْبَرِيَّة

Thymus glaber (S). Thym glabre (F). Wild thyme,  
Mother of thyme (E). Wilde thymian (D). Sermo-  
lino, Timo glabre (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقه نحيلة  
كثيفة الفروع المنتصبة. اوراقه خفيفة، مستطيلة،  
نصلها غائر الفلج، مائل البشرة، شديد الخضار.  
ازهاره وريدية اللون يملوها موج ابرواني || يرغب في  
المواقع الرطبة.

١٣٦٤٩ - سَعْتَرُ شَالَع \* ، سَعْتَرُ شَالَع

Thymus vulgaris (S). Thym commun, Farigoule (F).  
Garden thyme, Pot-herb thyme (E). Thymian-  
quendel, Gartenquendel (D). Timo comune, T. col-  
tivato; Erbuccia, Popolina (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقه كثيفة  
الفروع الخشوشية المنتصبة. اوراقه سنائية خفيفة.  
ازهاره ليلية اللون. يعيش في جميع الارضة. يفضل  
الكثبية ويخشي الرطبة || يستخرج من اوراقه وازهاره  
عطر السعتر ودهنه.

١٣٦٥٠ - سَعْدٌ

Cyperus (S).  
Souchet (F). Sedge (E).  
جنس نباتات عشقوية، عشبية، معمرة من فصيلة  
السدييات. انواعه عديدة جميعها متقنة من نباتات المناطق  
الحارة. اوراقها سنائية مستطيلة. سوقها شراخية يملوها  
ازهار سنبل التجميع تكثفه غصه ورقية مؤلفة من ثلاث  
او اربع ورقات || اشهر انواعه ما يتبع.

١٣٦٥١ - سَعْدُ الْأَخْيَبِيَّة

ويسمى سعد الحمايا، منزل من منازل القمر البانية ينزلها  
القمر في الليلة الخامسة والعشرين. وهو اربعة كواكب  
متقاربة واحد منها، في وسطها، انور الجميع. وقيل انما  
سمي سعد الاخيبية لأن عند طلوعه تخرج الحشرات الخفية  
من الارض || رقيب سعد الاخيبية يدعى الزبرة.

١٣٦٥٢ - سَعْدُ الْبَارِع

سعد البارع نجمان متقاربان من كوكبة القوس الاعظم  
مركزهما في الصدر.

١٣٦٥٣ - سَعْدُ الْبِهَام

سعد البهائم نجمان من كوكبة القوس الاعظم مركزهما  
على رأس القوس.

١٣٦٥٤ - سَعْدُ الْخَصْرِ ، سَمَارْ حُلُو ، عَكُوب ،

Cyperus alopecuroides (S).  
Korsh  
Souchet à nattes (F). Foxtail sedge, Mat sedge (E).  
Zypergras (D). Giunco cannellino, Testa di riccio (I).  
نوع من السعد الجلموري المداد. شراخه يملو نحو المتر.  
اوراقه قرصية غصية تطلو من ٧٠ الى ٩٠ سم. وتعرض  
من ٨ الى ٢٠ م. نورة الزهرية فاشة || يعيش في  
المنابع والاراضي الرطبة. اوراقه تستعمل في صناعة  
الحصر.

١٣٦٥٥ - سَعْدُ الدَاكِب

منزل من منازل القمر البانية. وما كوكبان نيران بينهما  
قيد ذراع، في نحر احدهما نجم صغير كأنه يدبجه لقربه  
منه || قال بعض علماء الفلك ان السعد الدايح كوكبان  
مترضان على التوالي منها كوكب صغير يكاد يلمس به  
يسمى الدايح ولذلك سمى العرب السعد الدايح لرؤسهم ان  
الدايح شاة وقد ذبحها.

١٣٦٥٦ - سَعْدُ السُّعُود

Sadalsuud  
منزل من منازل القمر البانية. وهو ثلاثة كواكب احدها  
نير والآخران دونه. والعرب تسمين به || رقيب سعد  
السعود يدعى الجبهة.

١٣٦٥٧ - سَعْدُ الْمَطَر

سعد المطر نجمان من كوكبة القوس الاعظم مركزهما على  
الركمة اليمنى.

١٣٦٥٨ - سَعْدُ النَّاتِل

Cyperus natalensis (S).  
Souchet du Natal (F).  
نوع من السعد الجلموري المداد. شراخه يملو من ٦٠  
الى ١٠٠ سم. اوراقه مستطيلة خفيفة النصل. سنابله  
متوسطة الكثافة تكثفه غصه ثلاثية الوراق القصيرة.  
يرغب في الارضة المتوسطة الاندماج والرطوبة. يعيش  
في المراكب.

١٣٦٥٩ - سَعْدُ الْهَامِ

Hemam, Homam  
سعد الهام نجمان من كوكبة القوس الاعظم مركزهما على  
العتق.

١٣٦٦٠ - سَعْدُ بَلَع

سعد بلع منزل من منازل القمر البانية. وما نجمان متقاربان  
في الجمرى لمتساويان في القدر والوضو. ويسمى الاكبر  
بالأما كأنه بلع الآخر واحد ضوءه. وهو من كوكبة الدلو،  
طلوعه الليلة تسمى من كائون الثاني وسقوطه ليلة تمضي من  
آب || رقيب سعد بلع يدعى الطرف.

١٣٦٦١ - سَعْدُ شَرْقِي \* ، سَعْدُ مُسْتَدِير ،

سَعْدُ الْحَمِير ، وَزَيْن ، صَبَاحُ الْخَيْر  
Cyperus rotundus (S). Souchet rond (F). Nut-grass  
(E). Runde zyperwurz (D). Cipero orientale,  
Stancia rotunda (I).

نوع من السعد العادم الجلمور. عقالقه عديدة، بيضية  
الشكل، كاثورية الرائحة. اوراقه مستطيلة. شراخه

تتلون من ١٠ الى ٣٠ سم. سنبله فائضة صويانية || يكثر في الاربية الرملية . يعتبر من النباتات الصارة .

Cours de change (F).

سر القطع

Cours légal (F).

سر قانوني

Cours moyen (F).

سر متوسط



سعد عطير

١٣٦١٤ - سَعْدُ عَطِير \* Cyperus longus (S).

Souchet odorant, S. long (F), Gallinule, English galangale (E), Galgentwurz, Langes zypergras (D), Ciperio lungo, C. odoroso, Cunzia (I).

نوع من السعد . جذموه مداد عطير لا عسائل له . شراخه تلون من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه شديدة الطول || سنبله مروحية الارتكاز تكتنفها غصبة ثلاثية

الاوراق || يعيش في المناطق وعلى ضفاف الماء .

Taux de l'escompte (F). Rate of discount (E).

هو السر الذي تحسب به كل عمليات الخصم والصرف في يوم معين وسوق معينة .

١٣٦١٦ - سَعْدُ مَرْوَحِي Cyperus flabelliformis (S), Souchet en éventail (F).

نوع من السعد الجذموه الركوني . شراخه اسفنجي الجوف ، غليظ القاعدة يطلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه جامدة التصل تطلو من ١٥ الى ٤٠ سم . وتبرص من ١٥ الى ١٥ سم . سنبله الزهرية مروحية تتجمع جملة الشكل . يزرع في المراكن . يرغب في الرطوبة المستمرة .

Taux d'intérêt (F). Rate of interest (E).

سر الفائدة يكون اما قانانياً وهو ما يقره القانون او اتفاقياً وهو ما يحدده الاتفاق .

١٣٦١٧ - سَعْرَان Cyperus alternifolius (S).

Souchet à feuilles alternes, Petit papyrus, Ombrelle (F).

نوع من السعد الجذموه البامد المسائل . اوراقه القرصية صفيحة اللد ، قليلة العدد . شراخه يرتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم . تملو سنبال زهرية مظلية الشكل تكتنفها غصبة ورقية يراوح عدد اوراقها من ٦ الى ٢٥ || تكثر زراعتها في المراكن لانه سدوني وجبل الخصار .

١٣٦١٨ - سَعْرَانِيَّات Anabasis (F), Anabasis (E).

سبط من فصيلة السرمقيات .

١٣٦١٩ - سَعْرَة ، حُريرة Calorie

هي الوحدة الحرارية او الوحدة في قياس الحرارة .

١٣٦٢٠ - سَعْرَة Palme (F), Palm (E).

هي قضيب النخل وهي مركبة من جريدة تحمل الحوص اي الوريقات .

١٣٦٢١ - سَعْدَان Singe (F), Ape (E).

اسم شامل يطلق على جميع انواع القرد ج سعادين .

١٣٦٢٢ - سَعْدَانَة ، رَقَمَة Châtaigne (F).

زائدة قرنية للمادة تملو قائمة الفرس .

١٣٦٢٣ - سَعْدَانَة ، رَقَمَة Chestnut (E).

سدانة اللذي : ما اطاف به كالفلكة . وهي ايضا مدخل الجردان من طلبة الفرس .

١٣٦٢٤ - سَعْدَانَة Cyperaceae (S).

فصيلة نباتية من وصيحات الفلقة تشمل السعد والسعادي وسب الزلم .

١٣٦٢٥ - سَعْدَانَة Cyperaceae (F).

فصيلة نباتية من وصيحات الفلقة تشمل السعد والسعادي وسب الزلم .

١٣٦٢٦ - سَعْر \* ، شَهَام Simia satyrus, Pithecius satyrus (S), Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F), Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعداء والسعداء ج سمال . ونهم من سماعا الانسان الوشي . حيوان ثديي من فصيلة اشباه الانسان ويمرقة القرديات . قاتنه تجاور ١٤٠ سم . يده تطول نحو ١٠٥ سم . جسمه كثيف الشعر الغليظ المستطيل || يعيش ذكراً واثي يتبعها من الصغيرين الى الثلاثة . الاثني تقص ولداً واحداً ترضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الزانج . قوته البار على اختلاف انواعها وقصب السكر والدره وبعض البقول . وهو يألف الثابتات الكثيفة والنباض البعيدة عن كل غمران .

١٣٦٢٧ - سَعْر \* هو الكلب مرض غييث ، اطله .

١٣٦٢٨ - سَعْر ، عَيْثِي Taux (F), Price, Rate (E).

تريفة القوائد السنوية التي ينتجها مبلغ قدره مئة .

١٣٦٢٩ - سَعْر \* Cours (F), Market, Price, Rate (E).

هو ما يقدم عليه من البضاعة يماً وشراء على ان تكون الصفقات متتالية كالمنقودة في المصق ، وسر السوق . . .

وطا السر قد يكون : Cours forcé (F).

سر الزامي



سيلة

## ١٣٦٩٨ - سَقَّاجَة \*

Mycetophagus (S).

Mycétophage (F). Mycetophagus (E).

جنس حشرات من فصيلة السقاجيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض غابات وحراج البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، معتدلة الاحدياب ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م. رؤوسها معتدلة الجرم ، وخرطومية الشكل. عيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. كواسلها معتدلة الجرم. اغمادها لاحقة وملوها لتحديد قاطب. قوائمها نشيطة. اثنائها ثنائية اللون || تألف الغابات والحراج تعيش على بعض انواع الفطور من الفاروقيات والسميات .

## ١٣٦٩٩ - سَقَّاجِيَّات \*

Mycetophagidae (S).

Mycétophagidés (F). Mycetophagidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم غابات وحراج البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. مركبة من ١١ فصلة. كواسلها كبيرة. اغمادها لاحقة. قوائمها نشيطة. ارساها رباعية العقل. اثنائها ملونة || تألف الغابات والحراج. تعيش على بعض انواع الفطور اخصها المنتية الى الفاروقيات والسميات || اشهر اجناسها السقاجة .

## ١٣٧٠٠ - سَقَّاد ، كَوِّم \*

Copulation, Sallie (F).

Copulation, Covering (E).

نزو ذكر الحيوان على الانثى. اذا غرّب الجلود الحجير قيل قما وزأ.

## ١٣٧٠١ - سَقَّاط ، سَقَط \*

Opereule (F).

Gill-cover (E).

السقاط والسقط ج اسقاط. هو الفشاء الغضروفي المادة الذي يلصق التجويف الخيشومي عند الاسماك. وما سقاطان او سقاطان ايمن وايسر.

## ١٣٧٠٢ - سَقَّاطَة طَاعِيَة \*

Callimorpha domnula (S).

Callimorphe tyran (F). Callimorpha dominula (E).

حشرة من فصيلة السقاطيات ورتبة خرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اربوة الجنوبية والغربية. قراشها عجيبة تعيش على ذخيرتها المعوية. سرقتها خاضعة قوتها اوراق النبات واغصانها الخس والهندباء والقراس والعويج ولسان الحمل ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ م. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبريتان. زباناها خيطيان. مرشها جعدة. جوشتها كثيف الحمل ، كسني اللون. بطنها احمر يملو موج وردي وضط ثبجي قاطب شديد السرة || روشناها الاناميان الى الخضار الانلاس تملو بقع مستديرة صفراء وبقتتان برتقائيتان. روشناها الخلفيان الى الحمرة يملو موج صناعي ويطوقها حطار كسني اسود وبقتان بقعة طرية تحبل كامل الزام الاخير. تنضيب رواشن الاثنى لا يختلف الا بالبرقالي الذي يتحول الى حطلي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها باسبوع

## ١٣٦٩٧ - سُمَّة

ما تملك من لشفر الاعلى من البير ونحوه .

## ١٣٦٩٨ - سَعُود النُجُوم

سعود النجوم عشرة وهي سعد بلع وسعد الاغصية وسعد اللانيع وسعد السمود وهذه الاربعة من منازل القمر . ثم سعد ناشرة وسعد الملك وسعد البهائم وسعد البارح وسعد سطر وهذه الستة ليست من المنازل . كل منها كوكبان.

## ١٣٦٩٩ - سَعُوط

هو الاغصيا ، اطلبه .

## ١٣٦٩٠ - سَعُوط ، عَطُوس

Tabac à priser (F).

Snuff (E).

مسحوق التبغ يستعمل شماً لكثير . يستحصل عليه من اوراق التبغ المسحوقة بعد تحنيرها ومزجها ببعض المواد العطرية او الحرفية || وقد تختلف قيمة السعوط باختلاف صفته وبنواده الاولى اذا كان مصدرها نصال اوراق او خلوصها .

## ١٣٦٩١ - سَعِير

هو الماكاك الميمون ، اطلبه .

## ١٣٦٩٢ - سَعَب

Besoin d'eau (F).

Want water (E).

عطر الزرع والنبات .

## ١٣٦٩٣ - سَفْ\* ، نَسَاب

Coluber lineatus, C. jaculus, C. atratus (S).

Dard, "Serpent volant" (F). Coluber lineatus, C. jaculus (E).

حية يبيض من البواغيات وفصيلة الحفشيات خلفيات الاحاديد . جسمها قليل النخاعة يطول نحو ١٠٠ م. ثوبها الى الكهبة الريداء يملو غط اسود يمتد من الخلم الى طرف الذنب ويختلط احمران عابقان ضيقان ايمن وايسر يمتدان من الشقين الى الذنب . رأسها لوزي الشكل . زاوية شقها ضيقة الملاقى . عيناها صغيرتان ، حادتان . عدد اسنانه ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و٢٤ في الاعلى من اصلها اربعة عناق مكددة ثابتة خلفية الارزكاز تهريق السم في كل عضو تصببه عندما يرق حتى يستواها الداعلي || تألف الاحراج والمضارب ، تتسلق الاشجار وتقبض كالهم من شجرة الى اخرى ومن كل مكان مرتفع الى آخر متخفص || بيئاتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والوزغ والمظا والفئران والجرب . تقضي على فريستها الكبيرة الحجم بالتقليص ثم يتلتهلها بعد ذلك || اغلاقها شرسة . فحيمها صغير حاد . قيلج كامل نموها بمر ١٥ سة وتعيش نحو ١٢٠ سة || الاثنى تسادف بمر خمس سنوات وتضع من ٢٤ بيضة مجموعة في سجين تطهرها في موقع ذاتي جنوبي المعرض || تتميز من الصائين المؤذية .

## ١٣٦٩٤ - سَيْف الإِجَاص

هو علة الاجاص ، اطلبه .

## ١٣٦٩٥ - سَيْف الزَّرْع

هو علة الزرع ، اطلبه .

## ١٣٦٩٦ - سَكَا

Plante épineuse (F).

Thorny plant (E).

كل شجر له شوك .

## ١٣٦٩٧ - سَكَا ، شَعَاع ، مَرْقُ

Barbe du blé (F).

Beard of corn (E).

هي حسك شليلة المنة والشهير .



سف



سَقَّاجَة



سَقَّاطَة طَاعِيَة

وتفتح الممكن لطحاً على نصال الأزراق || السرة تطول نحو ٤٢ م. جسمها اسطواني الشكل ، مثلث السك ، أسود اللون تملو ثلاثة خطوط من النقط الصفراء وخطان الى الزرقاة الرصاصية . ثملوها متوجة بالهلب الاسود || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً ويتقضي ضمن صلبة متينة الطبلح تستجيبا السرة تحت ثقلور الانجبار وفي صدوره الحما .

### ١٣٧٠٣ - سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ \*

*Callimorpha dulcitis* (S). *Callimorpha agreeable* (F). *Callimorpha dulcitis* (E).

حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنسة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها وحسب الازهار وظلها . سرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات العشبية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطها تراوح من ٥٠ الى ٥٥ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها كيرتان . زياناها غسبان . مرشها مستطيل . جوشها بني اللون كثيف الخمل . بطنها احمر اللون يملو خط نجبي قلب اسمر || روشاها الانبساطية يملوها تجميع يوضع كسني || لها جيل واحد واصفر وزويان من النقط البيض والصفراء : رواشن الاثني عادمة التنطيط . روشاها الخلفيان الى الحمرة البرتقالية يملوها تجميع ويتبع كسني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . ترح في الجبل . تعاطل يمد ظهورها نحو اربعة اسابيع وتفتح الممكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو

٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، اسود اللون ، اصفر التبييض ، مثلث السك تملو في كل ثلثة غسة من الهلب الاثني . رأسها اسود . مذها الى الطحلة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ٢٤ يوماً ويتقضي ضمن صلبة تستجيبا السرة بين فروع النبات وقصبها .

### ١٣٧٠٤ - سَفَاطِيَّاتٌ \* Hymenophyllées (F).

السفاطيات فئة من السراخس مستورات الزهر الوعالية .

### ١٣٧٠٥ - سَفَاطِيَّاتٌ \* Callimorphidae (S).

*Callimorphidae* (F). *Callimorphidae* (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنسة غطفت القرن . اجناسها واناها المعروفة نحو ١٢٠ مملها من حشرات البلاد الحارة المنحرفة نحو الاسترالية || جسمها معتدلة القد . اجسامها شبه اسطوانية الشكل . رؤسها صغيرة . عيناها زكية . قربها الاستشعارية غسبية . بسطة . ملابسها صغيرة . جالسة . مراشها كبيرة ، مستطيلة . رواشنها الانبساطية اكبر من الخلفية واقل استدارة منها واكثر تبيجياً ووزركة . سذاتها جانبية الازنكاز . مستطيلة الجرم . ارجلها ثامة السنو رباعية المناسخ || مكها مكور الشكل . اساريمها مثلبة القشار ، ضمية الهلب . غادرتها لتتبع بصلجة متينة معتدلة الجلك || اشر اجناسها السفاطة .

### ١٣٧٠٦ - سَفَاطِيَّاتٌ \* Cochlearius cochlearius (S).

*Savacou huppé*, *Bec-en-cuiller* (F).

طائر من طول الساق وفصيلة البشريات . اصنامها المناطق الاستوائية امريكية . يأت غشاف الابنير والناقع . سره دموي يستمر طوال الجبل . قوته الاسماك والسمابين والورغ والصفادح والرعويات ... || جسمه مكمل معور .

يتميز بقصر الساق والذق بما يجعله من شولة فصيلة . رأسه كبير الجرم تملو كفة منطقة الى الوراء تنتهي بريشتين مستطيلتين . متقادة ضخم غليظ عجب الاالك الاصل ينتهي بظفر اعقت حاد . افكه السفلي منبسطة . الصلعة . جناحاه كيرتان ، لافخان . ذنبه قصير ، مقطوم الطرف . ثوبه متراكب الاالوان . رأسه وعنته مشدود الى الياض الاخر . كسثه وردوا وجناحاه وذنبه الى الركبة السراء . بطنه وغوافيه ولفظها الى السرة السوداء || يذلل عشه في السنط . الاثني تحفن بمنواة الذكر من ٣ الى ٤ يبيضات . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .

### ١٣٧٠٧ - سَفَاطَانٌ \*

*Cephennum* (S).

*Cephennum* (F).

جنس حشرات من فصيلة المدينيات ورتبة غمديات الاجنسة . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في جميع انطار العالم || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٣ م. رؤسها صغيرة شبه مكورة . عيناها قليلة البروز . قربها تأشيرها وتكونها صغيرة . ملابسها كبيرة . قربها الاستشعارية صوبانية . كراسها محدودة ، شبه مريضة الشكل ، احمادها لافحة ، عادمة التنطيط . قواشها نشيطة . انواها وسيدة اللون ، يكر فيها المجوري الاسف فالاوسد فالاسف فالاوصب فالاسمر || تأتف الحراج والفايات حيث تكثر الطحالب التي تعيش عليها .

### ١٣٧٠٨ - سَفَاطَانَاتٌ \*

*Sphagninées* (F).

*Sphagninae* (E).

رتبة من الطحالب تشل نصليتي السفاينات والقرنشيات .

### ١٣٧٠٩ - سَفَاطَانَةٌ \*

*Hypophopus seven* (S).

*Séphen* (F).

حيوان بحري من السفقيات الاثلاق وفصيلة الطرقينيات . اصنامها متحد من الخليج العربي الى الصين || جسمها فيه الكذب يطول نحو ١٨٠ سم. ثوبه العلوي الى السرة الحسنية الموج . ثوبه السفلي الى الثيرة التنبية . منخسه الذليل نحو ١٥ سم. || لحمه متوسط الصنف ، مأكول . اما جلده فقاهر الصنف مرغوب فيه .

### ١٣٧١٠ - سَفَاطَانِيَّاتٌ \*

*Sphagnacées* (F).

*Sphagnaceae* (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السفاينات اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الطحلب .

### ١٣٧١١ - سَفَاطِيَّةٌ \* هي الاصطراف ، اطليه .

### ١٣٧١٢ - سَفْجُورُ الرِيح \* Direction du vent (F).

وجهة هبوب الريح . Direction of wind (E).

### ١٣٧١٣ - سَفْجُورُ أَزْرَقُ \*

*Drypta caerulea* (S). *Drypte bleue* (F).

*Drypta caerulea* (E).

حشرة قانصة ناتجة من فصيلة السفجوريات ورتبة غمدات الاجنسة . تأتف المروج والمراعي وصفان مجاري الماء . قوتها المواد الضوية وما تستطيع اقتناصه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد يطول من ٩ الى ١٠ م. ثوبها الى الزرقاة يملوها خلي صفاني ومواج اسف . رأسها مخروطي صغير . فكها ذربان . عيناها كيرتان . جاشحطان . زياناها غسبان دقيقان . ظهورها لا يلفف السكة



سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ



سَفَاقُ



سَفَاقُ



سَفَاقُ



سَفْجُورُ أَزْرَقُ

المروعة الرياح المروج . يرغب في الاربة العميقة الغور المتوسطة الاندماج والرطوبة الموزونة التركيب الحكسي . ثماره تحسن صفات في الاربة الجسية || يتكاثر بالبذر والتعليق والتزويد والتعليم || ينمو على ابعاد تراوح من ٤ الى ٦ أمتار || وهو من الانشجار التي يفسدها التقليم لانه يجد من نشاطها ومن مقاديرها الانماجي . اشهر غروبها الزراعية ما يتبع .

١٣٧١٨ - سقرسجل البرتغالي C. du Portugal  
غرب سبروني يملو نحو ٦ م . ثماره كبيرة القد متوسطة الوسط . مزينة الرأس والعقب . لهاها غزير المصاراة متوسط المفوصة || يوجد في جميع الاربة المختلطة التركيب العميقة الغور || ينشئ الجفاف وكثرة الكلس والربل .

١٣٧١٩ - سقرسجل الصين  
هو الشنول الصيني ، اطلبه .

١٣٧٢٠ - سقرسجل اليابان  
هو الشنول الياباني ، اطلبه .

١٣٧٢١ - سقرسجل انجيه C. d'Angers  
ضرب جاذب يتطلب مواقع خاصة لانه ينشئ الصقيع . يملو نحو ٤ م . ثماره كبيرة القد . غزيرة المصاراة ، عطرية العرف ، ذكية العلم ، قليلة المفوصة || يوجد في جميع الاربة العميقة الغور ما عدا الكلسية والرملية .

١٣٧٢٢ - سقرسجل شمسين C. champlion  
ضرب امريكي واسع الشهرة . ثمرته شديدة النشاط غاذقة تملو نحو ٧ م . ثمارها كبيرة القد ، ذكية العلم والعرف ، غزيرة المصاراة ، قليلة المفوصة || يوجد في جميع الاربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

١٣٧٢٣ - سقرسجل عادي C. commun  
ضرب سبروني عديم الانتشار يعيش في معظم الاربة والمواقع . يملو من ٢ الى ٥ م . ثماره كروية متوسطة القد . لهاها متوسط المصاراة ذكي العلم والعرف .

١٣٧٢٤ - سقرسجل هندي  
هو الدوسينية عجيبة شمرة ، اطلبه .

١٣٧٢٥ - سقرسجل \* Coing (F). Quince (E).  
ثمرة السقرجل . لهاها جامد المكسر حامض العلم ، متوسط المفوصة ، يستعمل في المربيات . بزورها الزيتة شائعة الاستعمال الطبي .

١٣٧٢٦ - سقرس Saxifraga (S). Saxifrage (F).  
Saxifraga, Rockfoel (D). Saxifrage (I).  
جنس نباتات شبيهة من فصيلة السقرسيات . انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها عشبية خشبية . اكثرها معمرة ومنها حولية وعشبية . معظمها بري وبعضها زراعي قزمي . اوراقها متعاقبة ، صغيرة القد ، لحمية اللنج ، خضراء البسطة والمفرسة والمسننة . نصلها خلي البشرة منتج الصلصة . ازهارها خامة التركيب . بزورها صغيرة الحجم تكثر فيها الاستدارة || اشهر انواعه التريزينية ما يلي .

الشرية . غضاها تساميتا التحزير المتساوي الخطوط . ارسافها خامة المقل || لها جيل واحد في الحق . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتميش حتى اواخر ايار . تسرح في النهار . تساف في اوائل الربيع وتنتع المكان تحت الحشائش والنباتات الصلبة والتلع والحجاة وفي شقوق الاعشاب الناعمة || والبرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر الثوب ، كثيف الحلب . اسود الرأس والرواجب والشرج المهبط سبركين دقيقين || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي في التربة .

١٣٧١٤ - سقرسجريات \* Dryptidae (S).  
Dryptidae (F). Dryptidae (E).  
فصيلة حشرات لامة من رتبة خمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المراعي والنباتات والمواقع الرملية || جميعها صغيرة القد ، جميلة الالوان الزاهية الجامة . رؤوسها مستديرة ، مستطيلة الاعظام والزياني . عيونها جاحطة . كواسلها متضخمة مستطيلة . اجسامها مقنونة الاطراف ، تساميتا الخلود . المتوازية || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسى برسة وتطير بشفة || قوتها المواد العضوية المختلفة المصدر . || اشهر اجناسها السقرجور .

١٣٧١٥ - سقرسجل \* Cebadilla (S). Cevadilla, Cebadilla (F). Cevadilla, Cebadilla (E).  
نبات عشبي دوفسي طيب معمر من فصيلة السورجانيات . اوراقه قرصية الانتشاج ، عصلية الشكل ، مستطيلة القد ، ازهاره سنبل التجميع يرتكز على شراخ دقيق مسط . ازهار صغيرة القد ، ارجوانية اللون سود المواج . ثماره جرابية الشكل ، بزورها دقيقة ، مفصلة ، قسمة النون || يستخرج من بزورها عدة مواد قلوية اشهرها السقرسجلين والخبرسجلين والخاص الحربي مسحوق بزوره شديد الفاعلية كان ولا يزال يستعمل في القضاء على القمل .

١٣٧١٦ - سقرسجلين \* Cevadilline, Sabadilline (F). Cevadillin (E).  
مادة شبه قلوية لا تتبلور تستخرج من بزور السقرسجل ويثيرة .

١٣٧١٧ - سقرسجل \* Pyrus cydonia, Cydonia oblonga, C. vulgaris (S).  
Cognassier, Colgnassier (F). Quince tree (E). Echte quitte, Biruquitte (D). Cotogno, Pomo cotogno (I).  
السقرسجل . سفارج وسفارج . ثمرة شمرة من فصيلة الورديات وحيدة الجنس والنوع عديدة القسور . ثمارها مأكولة وترتب . بزورها طيبة . وهي تملو من مرتين الى ثمانية امتار . ساقها قصيرة سمره حمراء اللون . اغصانها فارقة متباعدة . اوراقها عابلة ، بسطة ، كاملة ، متعاقبة || يفضي الشكل ، قليلة القناعة . نصلها بارز المروق ، خلي الصفحة السفلى . ازهارها خامة التركيب لونها الى البياض الودي . ثمارها كروية الشكل او شبه كروية مستطيلة ، كبيرة القد ، حلوة البشرة ، مسحة العرف ، جامدة الياق . غياؤها تألف من ٥ غرغيات تحضن الكثير من البذور || يعيش السقرسجل في الاقاليم الحارة والمتلدة . ينشئ المواقع الطليقة



سقرسجل



سقرسجل



سقرسجل



## ١٣٧٢٧ - سُقَرَسُ الحَصَى \*

*Saxifraga granulata* (S). Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها عروية شكلوية. نصلها مفصص الحثار. ازهارها كبيرة اللقد، يضاء اللون، عطرية العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران || يقال انها طيبة، اروعها ناعمة تزيل الدل والحصى.

## ١٣٧٢٨ - سُقَرَسُ الظِّل \*

*Saxifraga des ombrages*, Mignonnette, Désespoir du peintre (F).

بجلة جادة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها اهليجية رفيعة، عتقها كثيف الزغب. نصلها مقر الصفحة. مشفاري. الحافة || ازهارها مستترفة يضاء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. رغب في الموائع اللطيلة للتوصلة الرطوية.

## ١٣٧٢٩ - سُقَرَسُ خَشِين \*

*Saxifraga aspera* (S). Saxifrage rugueuse (F).

بجلة سبروتية معمرة ترطب في الاثرية الرطبة. تملو نحو ٢٠ سم. اروعها غائقة الرواكيب. اوراقها صغيرة. نصلها مهدب الحثار، يطول نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٣ || ازهارها يضاء اللون يشوبها مواج اصفر. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## ١٣٧٣٠ - سُقَرَسُ سَرْمَي \*

*Saxifraga sarmentosa* (S). Saxifrage sarmenteuse (F).

بجلة جادة معمرة تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مستنبة بالايض والاخر. حثار نصلها ارجواني. ازهارها هري الشكل، ازهارها يبيض تملوها مشنة صفراء || زهر من ايار الى تموز.

## ١٣٧٣١ - سُقَرَسُ سَرْمَجِي \*

*Saxifraga crustata* (S). Saxifrage incrustée (F).

بجلة معمرة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها كلوية الشكل نصلها محدب الصفحة، سرجيمي التجزيع، اصفر الحثار || ازهارها عشكوية التجميع هامة الارتكاز لونها الى البياض الموشح بالابرجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. رغب في الاثرية الكلسية.

## ١٣٧٣٢ - سُقَرَسُ صُرْجِي \*

*Saxifraga cymbalaria* (S). Saxifrage cymbalaire (F).

بجلة حولية جادة تملو نحو ١٥ سم. اوراقها صغيرة اللقد، مستنبة الشكل، خاسية او سباعية التفتيص الكولي، نصلها مسطح بالامر || ازهارها صفر. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

## ١٣٧٣٣ - سُقَرَسُ طَحْنِي \*

*Saxifraga hypnoides* (S). Saxifrage mousse, Gazon d'Angleterre, G. turc, G. mousse (F).

عشبة سبروتية معمرة. اروعها مستطيلة الرواكيب الخضفورية. ساقها موقفة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها قوية التدرج. مستطيلة الاثاق الزغبية الاسطوانية || ازهارها يبيض. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || ترطب في الاثرية الرطبة والمواقع الجبلية.

## ١٣٧٣٤ - سُقَرَسُ كُسْطُولِي \*

*Saxifraga cuscuteformis* (S). Saxifrage-cuscuté (F).

بجلة رفة معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها مستنبة،

مأبوجة، نصلها خلي البشرة، سنن الحافة. ازهارها هري، قليل الكثافة. ازهارها يبيض يملوها مواج اصفر. تعيش في المراكب. زهر من حزيران الى تموز.

## ١٣٧٣٥ - سُقَرَسُ مَخْرُوفِي \*

*Saxifraga cuneifolia* (S). Saxifrage cunéiforme (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ١٥ سم. اوراقها قرصية التجميع. نصلها مخروطي الشكل، اخضر الصفحة العليا، جذوي السفل. ساقها عادمة الورق. ازهارها صغيرة اللقد يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب. تختش الموائع الحارة.

## ١٣٧٣٦ - سُقَرَسُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَق \*

*Saxifraga rotundifolia* (S). Saxifrage à feuilles rondes (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها موقفة. اوراقها كائقة الشكل. نصلها غدي بالتسج، خلي البشرة. سنن الحافة. ازهارها منشة بالاصفر والاخر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١٣٧٣٧ - سُقَرَسُ مُسْتَطِيلِ الْوَرَق \*

*Saxifraga longifolia* (S). Saxifrage à longues feuilles (F).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مستطيلة. نصلها مقر الصفحة. ازهارها كثيرة العدد، يضاء اللون، يملوها توضيح اصفر ومشة حراء || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## ١٣٧٣٨ - سُقَرَسُ مِفْيَاك \*

*Saxifraga mutata* (S). Saxifrage changée (F).

عشبة جادة عولة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها متناقة اهليجية. نصلها جامد الصفحة، مهدب الحثار سنن الزام الاخير || ازهارها هري الشكل. ازهارها مدنية البتلات لونها الى الصفرة يملوها مواج يرتقلي. زهر من حزيران الى آب. رغب في الاثرية الكلسية.

## ١٣٧٣٩ - سُقَرَسُ مُنْتَصَب \*

*Saxifraga ascendens* (S). Saxifrage dressée (F).

عشبة سبروتية عولة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها مخروطية الشكل، ثلاثية التفتيص. نصلها غدي لرج. ازهارها تدو ودية وتلتهن بالايض || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١٣٧٤٠ - سُقَرَسِيَّاتٌ، سُقَرَسِيَّاتٌ

*Saxifragaceae* (S). Saxifragacées (F). Saxifragaceae (E).

السقريسيات او القليبات كما سماها بعضهم فصيلة نباتية من ذوات الفلتين عديدة القمالات. اساقها واجننها وانواعها كثيرة العدد. معظمها نباتات عشية. جميعها عشوية الازهار، قليلة البزور.

## ١٣٧٤١ - سُقَرَنَة \*، سُقَرَنَاكِيَة

*Sphyræna spec* (S). Sphyrène, Brochet de mer, Espe (F). Ses-pike (E).

سمكة بحرية من شاكيات الزعانف وسيدة الجنس والنوع موطنها مياه البحر المتوسط. تتميز بانساقها. راسها ذلق الخمل. لونها الى الرابدة الغنية يبق من اقترابه من ثيج الظاهر || وفي من احماك الشواطئ اللبنانية، بجدة الصنف، مستحبة العلم.



سُقَرَسُ الحَصَى



سُقَرَسُ سَرْمَي



سُقَرَسُ خَشِين



سُقَرَسُ صُرْجِي



سُقَرَسُ مِرْجِي



سُقَرَسُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَق



سُقَرَسُ طَحْنِي



سُقَرَنَة

## Spongipellis

١٣٧٥٣ - سَفَنَدِيَّات

فطر من السيات يركب اشباح يقض الراتنجيات اعصابه التنوب والانسوفة فيسبب العفن المكسبي الذي يشقق الخشب ويفصله ، بالطول والعرض ، الى مكعبات متراكبة متتابة عديدة الصلابة تحيطها من جميع جوانبها اغشية المشيج الحليمية الحطلية اللون || اما الفطر فبقعته كlobية الشكل قطرها نحو ٤ سم ، اطرافها فارشة متتالية مركبة من طبقتين العليا اسفنجية الحيلكل سماكتها نحو ٣ م. والسفل ليفية حشوية سماكتها من ١ الى ٥ م. غضابيه قليل الالوان يغلب فيها الحطلي والبيضي . لبابه ابيض . بويضاته اهليلية الشكل طولها من ٣ الى ٥ ميكرون .

Ruscus (S). Fragon (F).

١٣٧٥٤ - سَفَنَدَر

جنس نباتات سرخسية عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه عديدة . سوقها مضلعة . رءاتها جلدية ، سنانية الشكل . ازهارها نصليّة الانتصاب . ثمارها عينية حرام اللون . بزورها سود || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٧٥٥ - سَفَنَدَر ذُلَبي ، حَبّ النَّار

Ruscus hypophyllum (S). Fragon hypophylle, Laurier alexandrin (F). Alexandrian laurel (E). Alexandrinischer Iorbeer (D). Rusco a foglie nude, Lauro alessandrino (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رءاتها تحمل من ٥ الى ٦ اذعار . ازهارها بتنية اللون . ثمارها الى الحمرة المائلة .

١٣٧٥٦ - سَفَنَدَر كَبِير هو الرعد ، اطليه .

١٣٧٥٧ - سَفَنَدَر لاسع \*

Ruscus aculeatus (S). Fragon piquant, Petit-houx, Houx-frelon, Buis piquant, Myrte épineux (F). Butcher's broom, Knee holly, Box-holly (E). Echter müsedorn (D). Ruscopungente, Brusco (I).

جنية ذغلية برية وزينية ترغب في الاربة الكلسية . تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. رءاتها صغيرة ذلقة مديدة لاسعة . ازهارها فردية او ثنائية التجميع ، غضارها اللون . جذاميرها طيبة تدخل في بعض المستحضرات البانعة وهي مدرة للبول تلبه الحفم وتقتطع الدم .

١٣٧٥٨ - سَفَنَدَر لَسَن \* ، لِسَان الْفَرَس

Ruscus hypoglossum (S). Fragon hypoglosse, Langue de cheval (F). Horse tongue, Double tongue (E). Zungenmäusedorn (D). Rusco lingua-pagana, Bislingua (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رءاتها لسة سنانية طولها من ٦ الى ١٢ سم. ازهارها عقدوية ثلاثية او خماسية التجميع .

١٣٧٥٩ - سَفَنَدَر لَيْثُون هو المرقالية النافعة ، اطليا .

١٣٧٦٠ - سَفَنَدُون

حيوان بيوض من غطليات الرؤوس يدعى ايضاً هتيره ، اطليا .

١٣٧٦١ - سَفَنَدِيَّات

Sphindidae (S). Sphindidae (F).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها الممرقة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة

Grain de poussière (F).

١٣٧٦٢ - سَفَنَاف

Grain of dust (E).

اصغر ما يكون من ذرات الدقيق والتراب وهي التي ترتفع كالغبار .

Sophisme (F). Sophism (E).

١٣٧٦٣ - سَفَنَكَة

الفلسفة برهنة إستدلالية مغالطة .

Ecal'le d'oignon (F).

١٣٧٦٤ - سَفَط

Scale of onion (E).

سَفَط ج أسفاط . كل طبقة من طبقات البصلة تدعى سَفَطاً .

Grain de coloquinte (F).

١٣٧٦٥ - سَفَعَة

Seed of colocynth (E). سَفَع .

١٣٧٦٦ - سَفَنَدِيَّات الْمُنْخَرِين

Catarrhiniens (F).

Catarrhines (E).

هي مجموعة قرود العالم القديم لهن أنف مخترأة متقاربتان وتقاربا تحت الانث || انواعها واجناسها كثيرة العدد تنجمها ثلاث فصائل : اشباه الانسان والمجاريات والمجربيات .

Macrocystis (S).

١٣٧٦٧ - سَفَلِيح \*

Macrocyste (F). Macrocystis (E).

نبات بحري من الشجيات السمر . اطائه معطر بحار المناطق المعتدلة الحرارة || كلاليله نشيطة قوية . ساقه وحيدة السرع المبط ، طولها من ١٠٠ الى ٥٠٠ م .

١٣٧٦٨ - سَفَن - Scaly skin (E).

هو كل جلد اخشن كجلد التسلس .

Raja sephen (S).

١٣٧٦٩ - سَفَن ، سَفَن

سمكة من السفنين كبيرة القد طولها نحو ٨٠ سم. مرتها قاع البحر .

١٣٧٧٠ - سَفَنَاج \*

Cacospongia (S).

Cacospongile (F). Cacospongia (E).

ويدعى الاسفنج الجامدة . جنس حيوانات بحرية ركنية من اللاشعويات وفصيلة الاسفنجيات . انواعه الممرقة قليلة العدد اطائلها معطر بمجادح البحر الابيض المتوسط || تتميز بأاليانها القرنية التركيب الجامدة التي لا تصلح للاتصال .

١٣٧٧١ - سَفَنَة \*

Siphneus (S). Siphné (F).

جنس حيوانات لبروة قاضية جاسمة من المكبريات وفصيلة القارريات . انواعه خمسة جميعها صغيرة لقد موطنها البلاد الاسيوية من الصين حتى بحر قزوين || اجسامها ريمية طولها نحو ٢٥ سم. اذناها ٣ سم. رؤوسها شبه كروية . جينها صغيرة . اذانها لاقوقية . جرابها قصيرة خماسية الاصابع . اطافرها مستطيلة مقعوسة حادة جاسمة تمسكها من سرعة الحفر في التربة || اذانها الى الكهبة الفمراء تبقي عند الظهور وتبيض عند البطن || قوتها الاعشاب والجذور وسائر المواد النباتية .

١٣٧٧٢ - سَفَنَاج ، سَفَنَاج

طائر كثير الاستئان (الديري ) .



سَفَنَاج



سَفَنَة



سَفَنَدَر لاسع



سَفَنَدَر لَسَن

**١٣٧٧٣ - سِقَابَات** Buses, Butéoniens (F).  
عمارة طير من فصيلة السقريات تشمل خمسة اجناس :  
البقارة ، الصرارة ، الحوام ، التعبول والفرقاق . جميعها  
وربة الجففة . رؤوسها خضراء . مناسرها قصيرة عجيبة  
البهرة الذرية . سواطعها واذا نها مستطيلة . ارساغها  
قصيرة . غالبها قوية . اطرافها شديدة الانحناء || مهدا  
المام . قوتها القوازم والزحافات والخبرات لذلك فهي  
من الطيور النافعة || تدس اوكائها في الاشجار الباسقة  
الرفيعة . انائها تقص من رفقة الى اربع رفقات تحضنها  
بمنواله الذكر نحو اربعة اسابيع .



سقاوة البهءاء

**١٣٧٧٤ - سِقَابَاة** Buteo (S), Buse (F).  
جنس طير من عمارة السقاوات . انواعه زهاء ١٧٥ جميعها  
وربة الجففة . رؤوسها خضراء . مناسرها قوية . ارساغها  
غليظة وقصيرة . غالبها غفية . اطرافها حادة . سواطعها  
متوسطة الطول || تلحف الاذنان || قوتها القوازم  
على اختلاف انواعها والحيات والبطا والفتادق واشعرات .  
لذلك تعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها || اشهر  
انواعها ما يتبع .

### ١٣٧٧٥ - سِقَابَاة البَيْدَاء \*

**Buteo desertorum (S), Buse des déserts (F).**  
نوع من السقاوة موطنها الصحاري والقبلي طولا نحو  
٦٠ سم . ثوبها يختلط مع فصول السنة والسن تلب فيه  
الكهبة الخنطية . ذنبها عريض التجزيع . عيناها الى  
الحمرة . منسرها حنطلي القاعدة ، اسود البهرة . رسغاها  
ومخالبها الى الصفرة القائمة .



سقاوة شائلة

**١٣٧٧٦ - سِقَابَاة الشَمَال** Buteo borealis (S).  
**Buse à queue rouge (F).**  
نوع من السقاوة موطنها الولايات المتحدة الامريكية  
طولا نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الكهبة الصنائية . رأسها  
وطورها وسقطها ابيض من صدرها وبلها واثنيها . ذنبها  
اخر اللون يعلو تجزيع اسمر .

### ١٣٧٧٧ - سِقَابَاة شَالِمْة \* ، صَقْر حَوَام

**Buteo vulgaris (S), Buse commune, B. vulgaire (F).**  
**Common buzzard (E).**  
نوع من السقاوة موطنها فصح الارباب يمتد من اقاصي  
الشرق الى اطراف اوروبية وافريقية . طولا نحو ٧٠ سم .  
ثوبها عديد الالوان يختلط مع فصول السنة وتقدم الاسمر .  
تقلب فيه السرة . ذنبها مستعرض التجزيع . عيناها  
جذريتان منسرها ازرق القاعدة اسود البهرة . رسغاها  
ومخالبها صفر .

### ١٣٧٧٨ - سِقَابَاة صَقْرِيَّة هـي الفرقاق ، اطليه .

**١٣٧٧٩ - سِقَابَاة مُرْشَحَة \*** Buteo lineatus (S).  
**Buse à épaules rouges (F).**  
نوع من السقاوة موطنها شرق الولايات المتحدة الامريكية  
طولا نحو ٧٠ سم . تتميز بمخنيها الشائعين الحمرة .  
منسرها ازرق القاعدة اغبر البهرة . غالبها حر . اطرافها  
سود . تألف ارجاع البتولا والقيظ والمران .



سقاوة مرشحة

**١٣٧٨٠ - سِقَابَات ، هِبَابِيَّات** Lacertidae (S).  
**Lacertidae (F), Lacertidae (E).**  
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة الهطليات المشقوقات  
الاسنة . اجناسها ١٨ وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها  
رقيقة مستطيلة . اطواها زاهية الالوان مغلف المواج .

والمحرفة نحو الباردة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه  
اسطوانية الشكل ، تعلو من ٢ الى ٣ م . رؤوسها صغيرة .  
عينها بارزة . تأثيروها وملابسها نظامية . قرونها  
الاستشعارية دبوسية الاطراف ، عشارية الفصل . كواسلها  
مستطيلة الشكل . اتحادها لاحقة . ارساغها خماسية المقل .  
اطواها ملونة || تعيش على المواد النباتية وخاصة الفطور  
التي تنمو على جذوع الاشجار || اشهر اجناسها  
السفندوس (S) Spindus . طوله نحو ٢ م . ثوبه  
الى السواد الفحمي يعلو خل نام . تألف الحراج حيث  
تكثر الفطور التي يعيش عليها .

**١٣٧٦٢ - سِقَاد** Réformé (F), Reformed (E).  
السفيد من الخيل التي قطع عنها السفاد .

**١٣٧٦٣ - سِقَاد ، كَرْعَان** Echinus esculentus (S), Oursin comestible (F).  
**Edible sea-urchin (E).**  
نوع من الاغنيوس المأكول وهو كروي الشكل ،  
مقلوم القاعدة ، كثير الشوك . يكثر في البحر الاحمر  
ويوجد في المتوسط .

**١٣٧٦٤ - سِقَاد** هو الرقيب ، اطليه .

**١٣٧٦٥ - سَقِير** Saphir (F), Sapphire (E).  
هو الياقوت الازرق ويعد أيضاً لازورد .

**١٣٧٦٦ - سَقِير** Fane (F), Haulm, Dead leaf (E).  
هو الشفن يشغل ما سقط من اوراق الاشجار ويشمل  
ايضاً سوق اوراق النباتات البقلية غير المأكولة من  
الانسان كسوق واوراق البطاطا .

**١٣٧٦٧ - سَقِير وَرَيْشِيَّة هـ** Sphaeronomia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة السفيقيات . بكتيتها  
مخضبة او مسطحة الارتكاز ، يفضية او كروية الشكل ،  
صفراء او عنابية الجول . قصباتها مستطيلة الشب لتتني  
بكتائد يفضية || انواعه عديدة معظمها دمي ركب  
الغلب والجماد دون ان يعلب النبات او يؤذي كثيراً .

**١٣٧٦٨ - سَقِينَة** Argo, Carène, Charles de mer, Vaisseau des argonautes (F).  
**Argo, Argo novis, Velá argo, Pyxis (E).**  
السفينة كوكبية نجوم جنوبية الموق مركزها تحت الكلب  
الاكبر || عدد نجومها ٦٤ اميزها واشهرها النير الذي  
على الهذيل الجنوبي وهو من المرتبة الاولى وتسميه العرب  
« سهيل » ولسهيل أسطورة راجعها في الشعرى الثانية ||  
ومن النجوم البارزة المائلة الى هذه الكوكبة « التريس »  
وهو مركب الفرس .

**١٣٧٦٩ - سَقِينَة جَوِيَّة** Aéronef (F).  
**Aircraft (E).**

السفينة الجوية كل مركب تحته طائفة الذائبة ، اي  
طائفة محركاته ، من الارتفاع عن الارض والسير في الجو .

**١٣٧٧٠ - سِقَاة** الحلب نحي وشكة .

**١٣٧٧١ - سِقَاة** هو البجع ، اطليه .

**١٣٧٧٢ - سِقَاة ، شَاوَرِي** Aigaudier (F).  
هو الذي ينظر ماء السقاوة ويوزعها على مستحميها .

## \* ١٣٧٩٢ - سِقْرُوسٌ مُخَطَّمٌ \*

Cychrus rostratus (S). Cychre rostré (F).  
Cychrus rostratus (E).

حشرة مفترسة ناعمة من فصيلة السكوتيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألفت الاجراحي. قوتها الحزرون والبراق وديدان الحشرات || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٨ سم. ثوبها الى السواد الفحشي الكاند. رأسها مخروطي ينتهي بظفر مستدق وفكين خليئين. عينها صفيرتان. زربانها دقيقان مستطيلان. ظهرها اهلبيجي الشكل، مديب الطرف للاتح. ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في الخريف وتعيش حتى الربيع. تسرح في النهار. تسافد في نيسان وتجمع المكن مباحدا على سطح التربة بين العبل والاوراق اليابسة || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ٢٣ الى ٢٧ سم. جسمها مردي الشكل، مبطل الجرم، سداسي الارباج. ثوبها الى الطحلة السمر الغامقة. رأسها وفكها وشريحها الى السمرة الكستنية || طول الاكمال الذي يستمر ٣٥ الى ٤٠ يوما يتقضي في البش المودي الغور الذي تحفره البرقة للاختباء فيه وللإيقاع بقنصها.

١٣٧٩٣ - سِقْرِيط \*  
Scarite (F). Scarites (E).  
جنس حشرات ناعمة من فصيلة السقريطيات. انواعه عديدة جميعها مفترسة. اثنائها سوية اللون يغلب فيها الاسود اللامع. تأثيرها قوية. ارجلها الامامية كبيرة القد جامة || تألف الشطوط البحرية والبحرية غناها رية، مخروطية الشكل، عمودية الاركانز الفوري. اشهر انواعه ما يتبع.

\* ١٣٧٩٤ - سِقْرِيط اَمْلَس \*  
Scarites laevigatus (S). Scarite lisse (F).

حشرة غيبائية تسرح من الشروق الى الغروب. طولها رايح من ١٦ الى ٢٠ سم. ثوبها الى السواد اللامع. غمداها قاطبة الخطوط المائلة المبهمة. موطنها شواطئ البحر المتوسط. قوتها كل ما استطاعت اليه سبيلا من الحشرات والديدان || مسرحها يدوم طول الربيع والصيف.

١٣٧٩٥ - سِقْرِيط مَارِد \*  
Scarites buparius (S). Scarite géant (F).

حشرة دجوية تسرح من الغروب الى الشروق. طولها رايح من ٢٥ الى ٣٥ سم. ثوبها الى السواد اللامع. موطنها شطوط البحر المتوسط. قوتها كل ما استطاعت اقتناصه من الحشرات || مسرحها يستمر من اوائل الربيع الى اوائل الخريف.

١٣٧٩٦ - سِقْرِيطِيَّات \*

Scaritidae (S). Scaritidés (F).  
فصيلة حشرات ناعمة مفترسة من غمدات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اجسامها متباينة القد. اثنائها مختلفة تغلب فيها الالوان الاسود اخضها الاسود اللامع. تأثيرها قوية. قوتها الاستشارية تركز على تجاوب مقرها مركزها تحت المويئات || تألف الشواطئ البحرية والبحرية. تقترب الحشرات والديدان والحمام.

١٣٧٩٧ - سِقْسَقِيَّات \*  
هو الزرقاق. اطلبه.

١٣٧٩٨ - سِقَط \*  
Aile (F). Wing (E).  
هو جناح الطائر. يقال رفع الطائر سقطة.

١٣٧٩١ - سِقَايَة هي العناية، اطلبها.

## \* ١٣٧٩٢ - سِقَايَة الْحِطْلَان \*

Lézard des murailles (F).  
عظاية تدعى بحليلة الحيطان، اطلبها.

١٣٧٩٣ - سِقَايَة خَضْرَاء \*  
Lézard vert (F).

عظاية تدعى بحليلة خضراء، اطلبها.

١٣٧٩٤ - سِقَايَة رَشِيقَة \*  
Lézard agile (F).

عظاية تدعى بحليلة رشيقه، اطلبها.

١٣٧٩٥ - سِقَايَة وَكُود \*  
Lézard vivipare (F).

عظاية تدعى بحليلة وود، اطلبها.

١٣٧٩٦ - سِقَب \*

Branche mère (F).  
Mother branch (E).  
النصن الريان الغليظ الطويل الذي يتوسط الشجرة ويكون امتدادا لسانها. يقال له في لبنان الملك.

## \* ١٣٧٩٧ - سِقَب \*

ولد الناقة الذكر. قال الاصمعي. واذا وضعت الناقة ولدا فولدنا ساحة تقسمه سليل قبل ان يعلم اذكر هو ام انثى فإذا علم فان كان ذكرا فهو سقب واما سقب ويقال لانثى سائل.

١٣٧٩٨ - سِقْدَة \*، سِقْدَة \*

Entrainer (F).  
To train (E).  
سقد وسقده الفرس: قسره. خرج في السرح يسقده ويسقده الخيل || والسقده هو الفرس المضر.

## \* ١٣٧٩٩ - سِقْدَة \*، سِقْدَة \*

Estrela minima (S). Sénégalain nain (F).  
عصفور من الجوارح المخروطيات المناقر. موطنه افريقية الاستوائية. طولها نحو ١٠ سم. ثوبه احمر اللون تغلبه حمرة يشبه. منقاره وبيلاه الى الصفرة || يألف الحدائق والحقول وجوار العمران. قوته البزور والثمار والحشرات والحمام || يرجع ويعيش في المطيرة كالحسون لكنه لا يفرد.

١٣٧٩٠ - سِقْدِيَّات \*

Mollisiaceae (S).  
Mollisiacées (F). Mollisiaceae (E).  
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الفشاريات ورتبة الفريات. اجسامها وانواعها عديدة تتميز بسدائها الطليقة السطحية الاركانز. تكاثرها تخضع بوفيات شائعة بسيطة او عديدة الخلايا. تكاثرها غيبية تتابع التكاثر || لها جنسان مؤنثان: الذليل والريقة.

١٣٧٩١ - سِقْرَاب \*

Scarabus (S).  
Scarabe (F). Scarabus (E).  
جنس دويبات بحرية من الرضويات مديبات الاريل. انواعه المعروفة عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة والمتنقلة الحرارة || جميعها مفترسة. حلازنها يرعية الشكل، مستعرضة القوية الرية، تطول من ٣ الى ٧ سم. || اثنائها عديدة، جميعها مزرقعة ومنقطة بالجوزوي الياقوتي او الكستني او العنابي.



سقده



سقرب



سقروس غنم



سقريط املس



سقريط مارِد

## ١٣٧٩٩ - سَقَطَر \*، سَقَار \*

من الزعانف الشرجية ويكبر زعانفها الصدرية والحوضية ويصغر زعانفها الظهرية الخلفية الارتكاز || أشهر اسمائها وأمرها السقلين .

Sparus striatus (S). Spare strid, Scathare (F). Scathar (E).



سَقَطَر

١٣٨٠٤ - سَقَع  
التاحية المنبسطة الريلية من الشط .

١٣٨٠٥ - سَقَعِيَّات الخيشوم  
رتبة حيوانات من الرخويات المظدية خليفات الخياشيم .

١٣٨٠٦ - سَقَعِيَّات الرُّؤُوس \*  
Stégocéphales (F). Stegocephalous (E).

رتبة من الصفصيات المتحجرة يعود عهدها الى الإليج الاول وقد انقرض معظمها في اوائل الإليج الثاني . بعض حيواناتها كانت تشبه التأسع والبعض الآخر يشبه السطاه . جميعها كانت مصفحة الرؤوس المسوفة .



سَقَع

١٣٨٠٧ - سَقَلَّاط \*  
Porcellana (S). Porcellane (F). Porcellana (E).

جنس منع من فصيلة السقلطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل . ظهورها معتدلة الابدان ، صلبة الدروع الجمادة . ارجلها كبيرة ، مدمية الاظافر باستثناء الزوج الخلفي الصغير الجرم والفرع الارتكاز . ملاصقتها غليظة ، مبطنة شديدة التشنج . زنها غليظة مستديرة . الزوايا الى الخضر اللامس او الجوزي تملؤها رقة سفراء يختلف انتشارها بالنسبة الى الانواع .



سَقَلَّاط

١٣٨٠٨ - سَقَلَّاطِيَّات \*  
Porcellanidés (F). Porcellanidae (E).

فصيلة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذليل تتميز بقدة الزوج الخلفي من ارجلها الثانية في المحيط الظهري بدلاً من المحيط البطني . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم .

## ١٣٨٠٩ - سَقَمُونِيَّات \*، مَقَمُونَة

Convolvulus scammonia, C. syriacus (S). Scammonée, S. d'Alep (F). Scammony plant (E). Purgierwinde, Scyrische winde (D). Scammonio, Scammonia d'Alep (I).

نبات طبي عشبي ليني عاشر من فصيلة البلياتيات اوراقه متعاقبة رعيمة مثلثة الزوايا . ازهاره ابطية الارتكاز طويلة الزناد ، بيضة الشكل ، صفراء اللون مشربة البياض . يستخرج من جلوده عصارة وراتنجية صنية كثيرة الاستعمال الطبي .

١٣٨١٠ - سَقَمُونِيَّات في البلياتيات فصيلة نباتية .

## ١٣٨١١ - سَقَطَر مُشِير \*

Centropomus lineatus (S). Centropome rayé (F). Centropomus lineatus (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الفرغيات شاكيات الزعانف . اعطائها مظهر اقزام البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها احليجي الشكل ، يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . ثوبها الى الشبهة القصية . ظهرها بنفسجي اللون ويملوها في جانبيتها تشيزين قاطب اصفر نغسي رأسها مخروطي الشكل ، ذاق الحشم ، كبير الشدق . لكنها



سَقَطَر مُشِير

١٣٨٠٠ - سَقَطَم في الفارة الآرية ، اعطيا .

١٣٨٠١ - سَقَطَر \*  
Cynopterus (S). Cynoptère, Mègère sans queue (F).

جنس حيوان من فصيلة الوطاطيات . انواعه المعروفة قليلة يقال انها ثلاثة . جميعها اسبوية شرقية ، صغيرة القد ، براء ، غليظة اُراس ، قصيرة القروسة . طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم . وبسطها من ٥٠ الى ٥٥ سم . تعيش جماعات قليلة العدد . تألف التخل والانهجار الحربية . قوتها التار عل اختلاف انوعها اعصمها المثنة والذوافة .

## ١٣٨٠٢ - سَقَطِين \*، مَلَكَة الْبَحْرِ \*

Squatina squatina (S). Squatine, Ange de mer (F). Angel-fish, Angel-shark, the Monk (E).

سمكة بحرية ولبد مقترنة من فصيلة السقطينيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . سرسها لبي قلمًا تقترب من المهادق والشلوط . قوتها الاسماك البسطة والرخويات والقشريات || جسمها معتدل التنبيط ، شبه صني الشوزن ، يطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . رأسها غليظ عريض مبط الجرم ، مقنوم الحظم الاطلسي . فها طري الارتكاز واسع الشدق . اسنانها صغيرة مدمية اطراف الحادة المنقطة . عينها كيرتان . منسهاها ونسهاها صغيران . زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة الحجم فائدة كالجناح . زعنفتها الظهرية صغيرة القد ، خليفات الارتكاز الذي يتألف قاعدة الذنب ، الزعنفة الشرجية طامسة لا اثر لها اما الذيلية فعدلة الحجم فائدة || لحمها متوسط الصنف ، مسكها جيد يستعمل في صناعة الاغذية الشنية .

## ١٣٨٠٣ - سَقَطِينِيَّات \*

Squatina (S). Squatinidae (F). Squatinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السقطينيات ورتبة الاشلق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها جميع مناطق البحر الابيض المتوسط والناطق الغربي من التناث في المحيط الاطلسي || سرسها لبي ولا تقترب من المهادق الا نادراً جداً . قوتها الاسماك البسطة والرخويات والقشريات || اجسامها معتدلة التنبيط ، غروية الشوزن ، تعلو نحو ٢٠٠ سم . رؤوسها مبسطة مقنومة الاعظام . تشيز يخلوها

الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الخضار الاكهب تملوه نَمشة سمره وسط نجسي اسود وعطشان جانبها الى الجؤرة . ويعطونها في كل سَكَمَة من سَكَمَها البستنية اربع نقط سود متوتجة بالهلب . رأسها الى الجؤرة القائمة . مدبها الى الرتبة السمره . وواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلاباب من الطين .

### ١٣٨١٩ - سَقِيط ، عَشَشَة ، قَبُوت

Fressure (F). Pluck, Harslet (E).

هو كل ما له قيمة ثانوية في القضاة كآرثة والقلب والكروش والقوائم الخ .

### ١٣٨٢٠ - سَقِيقَة . Hangar (F). Outhouse, Shed (E).

السقفة والصفت بناء زراعي مكشوف الجوانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية ويستعمل أيضاً لإيواء المحاصيل .

### ١٣٨٢١ - سَكَّ Araneus (S). Epeire (F).

جنس عنكب كبيرة القد . أنواعه نحو ٨٠٠ موطنها العالم .

### ١٣٨٢٢ - سَكَّ Gîte du scorpion (F).

هو جسر العقرب . Lodging of scorpion (E).

### ١٣٨٢٣ - سَكَّ مُتَوَجَّ \* Araneus diadematus (S). Epeire à diadème (F).

Garden spider (E). Kreuzspinne (D).

نوع من العناكب المغترمة المبلولة ، ثنائيات الروايا سداسيات المشاتين ، من فصيلة الجربيبات || جسمه معتدل القد بطول نحو ٩ م . عند العنكب ونحو ١٥ م . عند العنكة . صدره رمي الشكل ، صغير القد ، حنطي اللون . عيناه زيمتاني . شيشاه صغيران ، ذريان . فكاه معتدل الطول . بطنه اهليلجي الشكل ، حنطي اللون تملوه نقط نظامية تبدو كالدور المرصوف . جزماته مستطيلة ، كثيفة الحب القصير || يألف البراري والحدائق . شه كبير القد . يتنجه بين الاجار والادغال . قوته الحشرات والذباب والهولم || يعتبر من العناكب النافعة اللاذخية .

### ١٣٨٢٤ - سَكَايُوزَة ، جَرَبِيَّة ، زَهْرَة الْحَرَب Scabiosa (S). Scabieuse (F). Scabious (E). Skabiose (D). Scabiosa (I).

جنس نباتات برية وتربيلية من فصيلة الدبسيات أنواعه نحو ٥٠ منها الجنبات والاشباح الحولية والحولمة والمعمرة . اوراقها متجابلة مركبة وبفرصة . ازهارها وريسية طويلة الزناد . بحيلة الشكل والالوان . كانوا يمزون اليها في الماضي القريب عدة خواص طبية منها الشفاء من الجرب والفلس وغيرها من الامراض الجلدية . اشهر انواعها ما يلي .

### ١٣٨٢٥ - سَكَايُوزَة الْقَوَاز Scabiosa caucasica (S). Scabieuse du Caucase (F).

شبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ م . اوراقها مسنة الحافة ، بحيلة الخضار الزاهي || ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٦ م . لونها الى الزرق السباوية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ١٣٨٢٦ - سَكَايُوزَة بَسْتَانِيَّة \* Scabiosa atropurpurea (S). Scabieuse des jardins, Fleur des vœux (F).

شبة حولية عديدة القرب تملو من ٤٠ الى ٩٠ م .

الاسفل يتقدم الامل . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متراصة . عينها كيرتان ، ناشزتان ، رفيتا الارنكاز . زعانفها الظهريه اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها فاقص الصفات ، مرغوب فيه .

### ١٣٨١٢ - سَقَنقُور Scincus (S).

Scinque (F). Skink (E).

جنس حيوانات من العظاء القصرات الالسة . انواعه ثمانية منهاها خفافات النهار والصبارى الاسوية والافريقية . جميعها اكبر من السحالي واطمن . قوائمها خاسية الاصابع . اذنانها قصيرة . اكلانها بجمجة ، ظهورها مدببة بسفرة وصاد . بطونها الى البياض الاخير . كان ولا يزال يستعمل ، بعد تحضيره وتجفيفه بالمخ ، لتبيج الباه والامناظ . وهو شائع الاستعمال في مصر والسودان ويوهرا من البلاد الافريقية . ومنهم من قال انه يلهب بالذالج والقوة والقرص والبرج والمفاصل .

### ١٣٨١٣ - سَقَنقُورِيَّات Scincidae (S).

Scincidés (F). Scincidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظاء قصرات الالسة منها السقنقور واليدقة ورضاعة البقر والحكامة || انواعه نحو ٤٠٠ معظمها من زحافات المناطق الحارة .

### ١٣٨١٤ - سَقُوطُ الْأَجَل (F). Déchéance du terme (F).

« يسقط حق المدين في الاجل الموتى تقادياً عندما لا يدفع قسطاً مستحقاً بعد انذاره رسمياً يسقط حق في الاجال الباقية فيصبح الدين اذا ذلك واجب الاداء . هذا وقد يسقط الحق في الاجل الموتى ، قانونياً ، في حالي : اشارة اقلان المدين او اذا قام المدين باعمال تحط من قيمة الضمانات المرسوة » .

### ١٣٨١٥ - سَقُوطُ الدَّعْوَى Péréemption d'instance (F).

هو اعاء آثار كل اجراء في الدعوى يتنزع به المدعى عليه بعد انقضاء مدة معلومة .

### ١٣٨١٦ - سَقُولِيْمُس هو الشوكة الصفراء ، اطبله .

### ١٣٨١٧ - سَقِي ، تَرْوِيَة Abreuvage (F).

Watering (E). هو اسقاء او ارواء الحيوان والنبات .

### ١٣٨١٨ - سَقِيقَة أَنْثِيَّة \* Scotogramma elegans (S). Scotogramma élégant (F). Scotogramma elegans (E).

حشرة من فصيلة النسيجات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اربوة . فراشتها جارسه قتيها حشر الازهار . سرقتها تميش على اوراق السرفقيات البرية والزراعية || جسمها صغير القد بطول نحو ١١ م . يسقطها نحو ٣١ م . رأسها صغير الحجم . عينها كيرتان . زباناها عريضان . مرشفا معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الرتبة || ورشها الاماميان الى الرتبة الخطية تملوها زوونة وزرذكة عنابية يتخللها بعض البياض . ورشها الخلفيان الى الرتبة الغبراء تسمر مع اقترابها من الطرف الخارجي || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو سمة ايام وتحت الحكن لطحاً مستطيلة على الصفحات السفلى من تصال اوراق السرفقيات || السرعة تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني



سَقَنقُور



سَقِيقَة أَنْثِيَّة



سَقُولِيْمُس



سَكَايُوزَة بَسْتَانِيَّة

الزناد. غنيبة التركيب ، خامسة الفصل || اشهر انواعه سكب الغرب .

#### ١٣٨٣٤ - سَكَبُ الْغَرْبِ \*

*Sanicula europaea* (S). Sanicle d'Europe, Sanicle mûle (F). Common sanicle, Wood march (c). Echte heilknacke, Sanikel (D). Sanicola, S. maschia (I).

نوع من السكب هو نبات عشبي، جذموري، طلي، بري، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهاره ودية اللون. يستعمل في الطب البيطري. اوله تقيد الايقار عند الاضرار وبعد الوضع لانه يستعمل الخلاس اي خروج المشية.

١٣٨٣٥ - سَكَبِيَّة  
Scape هي في الحشرة اول فصله من الزبان .

١٣٨٣٦ - سَكَبِيَّة  
Planche basse (F). Shallow bed (E). مستطيل او مربع من التراب حفن وسجل منخفضاً عن سطح التربة لاقتبال واستيعاب ماء السقاية .

١٣٨٣٧ - سَكَبِيَّاتُ  
Saniculées (F). Sanicles (E). سبط من الخبيئات عديد الاجناس والانواع اشهرها السكب .

١٣٨٣٨ - سَكَبِيَّيْنَجْ هو انجذاب العم ، اطلبه .

١٣٨٣٩ - سَكَبِيَّةٌ ، حَسْبَةُ ، هَمْدَكَةٌ ، هَرَبِيَّةٌ ذَمْ  
Apoplexie, Coup de sang (F). Apoplexia, Apoplexy (E). استقنان شديد مع زُف أو رشع أو انسكاب دموي في انسجة المخ أو غيره .

١٣٨٤٠ - سَكْرُ  
Batardeau, Vanne (F). Cofferdam, Water-gate (E).

حاجز يتحرك من فوق الى تحت يترسّ طريق الماء فيسمح بمروره او يمنعه . وهو ايضاً سد يسمح بتحويل الماء من مجرى الى آخر .

١٣٨٤١ - سَكْرُ  
Sucre (F). Sugar (E). مادة حلوة اللماق متبلورة سهلة الذوبان في الماء . كثيرة الانتشار في المملكة النباتية توجد في جلور النبات وسوقه واوراقه ونمارة || وهو من الوجهة الكيماوية يقسم الى مادة بسيطة تدعى غلوكوز كا في السب وموطن التار. ومادة ثنائية تدعى سكروز كا في مصير قصب السكر والشونيز ... || اما السكر من الوجهة الحياتية فهو مصدر الحرارة الحيوانية التي يرتكز عليها كل نشاط .

١٣٨٤٢ - سَكْرُ  
Saccharifier (F). To saccharify (E). حوّل الى سكر .

١٣٨٤٣ - سَكْرُ الْعَيْبِ  
Glucose هو الفلوكوز ، اطلبه .

١٣٨٤٤ - سَكْرُ مُنْعَكِسْ  
Sucre inverti (F). Inverted sugar (E). هو السكر الذي صار قابلاً للاختار اي السكروز الذي تحوّل الى غلوكوز ولفيلوز .

١٣٨٤٥ - سَكْرَاتُ  
Saccharate كل مركب من السكر مع اكسيد معدني .



سكايوزة حقلية



سكايوزة ورد الحام



سكب الغرب

اوراقها ملتحة ، ربابية . خلية النصل || ازهارها كبيرة اللد لونها يختلف باختلاف الضرب فيها البنفسجي والازرق والبيكي والودي والابيض والاصفر والوشج . جميعها لائحة العرف المسكي || ثمارها خلية البشرة ، ثمانية التخديد القطبي || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٣٨٣٧ - سَكَبِيُوزَةُ حَقْلِيَّةٌ \* ، كَعْبُ الْغَرْالِ  
Scabiosa arvensis (S). Scabieuse des champs, Langue de vache (F). Scabious, Pin-cushion flower (E). Ackergindkraut (D). Scabiosa del camp, Ambretta (I). عشية طيبة برية معمرة تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ملتحة مشروية مستطيلة الفص الوسطي . تصلها زغبية البشرة ، احمل اللون || ازهارها صفيرة اللد قطرها راوح من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الزرققة البليكية . عيرها مسكي العرف || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٣٨ - سَكَبِيُوزَةُ عَطْرَةٍ  
Scabiosa canescens (S). Scabieuse odorante (F). عشية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة اللد مشروية ، تشرعها قدي الشكل || ازهارها كبيرة الحجم ، زرقاء اللون ، عطرية العرف . ثمارها خلية البشرة ثمانية التخديد القطبي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٨٣٩ - سَكَبِيُوزَةُ كَبْرِيَّةٌ  
Scabiosa sulphurea (S). Scabieuse jaune soufre (F). عشية معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم. اوراقها كاملة مستطيلة مدنية . تصلها ازغب بالصفحة ، احمل اللون . ازهارها خلية البشرة ، كبيرة اللد ، كبريية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٨٤٠ - سَكَبِيُوزَةُ تَحْمِيَّةٌ  
Scabiosa stellata (S). Scabieuse étoilée (F). عشية حولية تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها ملتحة ، ربابية ، سفنة . تصلها خلي البشرة احمل اللون || ازهارها مستطيلة الزناد ، متوسطة الكبر ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى البياض اليلكي ، حنارها اصفر || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٤١ - سَكَبِيُوزَةُ وَرْدِ الْحَصَامِ \*  
Scabiosa columbaria (S). Scabieuse colombarie, Colombar (F). Small scabious, Lilac flowered scabious (E). Taubenskabiose (D). Scabiosa columbaria (I). عشية معمرة عديدة الضروب تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مفصصة وسفنة الحافة . تصلها خلي البشرة مجري اللون || ازهارها كبيرة اللد لونها يختلف باختلاف الضرب . فيها الاحمر والازرق والابيض والاصفر . ثمارها خلية البشرة ثمانية التخديد القطبي || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٨٣٢ - سَكَاكَةٌ  
Aérologie (F). Aerology (E). السكاكة علم يبحث في اسوال الجو الريح وفي مختلف مساحجه الصاعدة والمنحدرة .

١٣٨٣٣ - سَكَبِيَّةُ  
Sanicula (S). Sanicle (F). جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبيئات . انواعه ثلاثة اوراقها طويلة الريجات كفية مفصصة . ازهارها عكولية التجميع ، هامية الارتكاز ، طويلة

## \* ١٣٨٥٨ - سَكْسِيد ، سِينِيكْسِيَس \*

Clinxys (S). Clinxyde (F). Clinxys (E).  
جنس حيوانات زساقية برية وبائية من فصيلة السلحفايات .  
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق افريقية اخضها  
غينية والبلاد المجاورة || اجسامها متوسطة القد . اذنانها  
لاحقة ، محززة بالظلال والعرض ، مفصلي الاطراف  
الخلفية ، تلتفت كامل الجسم || جميعها غاصلة قوتها  
الاعصاب البرية والمائية .

## \* ١٣٨٥٩ - سَكْسِيك \*

Saxicava (S).  
Saxicave (F). Saxicava (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم ،  
وفصيلة الصلصويات . انواعها المعاصرة قليلة اصطناعها بعض  
مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اصداؤها  
شبه هرية الشكل ، متساقطة ، غمدية ، متوسطة القد . تعيش  
مشاهبا مستظلة . مصاريها عادمة التستين . تعيش  
لاصقة بالصخور الكلسية . ليفتها غزير المادة كيميها .

## \* ١٣٨٦٠ - سَكَّع ، بَخُور مَرْمَر ، زَهْرُ الْمَسِيح ،

عَرَنْتِيْنِيَا ، وَلَف ، حَبِيْزُ الْمَشَايِخ ،  
بَغْلَامَس ، رِكْمَة ، يَرْبَع ، سِيكَلَامِن  
Cyclamen (S). Cyclamen, Cyclame, Pain de pour-  
ceau, Arthanite, Artanite (F). Cyclamen, Bleeding-  
nun, Sow-bread (E). Cyclamenvellichen (D). Cicla-  
mino, Tubero florito, Pan porcino (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الربيديات  
انواعه نحو ١٢ حصاصه مستديرة مبطنه لونها الى الجوزة  
القاتمة . اوراقها وزاوارها قرصية الانتساب مستطيلة الزباد  
ازهارها خماسية التركيب ، فردية التجميع ، متعككة  
الارتكاز . ثماره كبار صغيرة ، كروية ، عديدة  
البذور || كان ولا يزال من النباتات المقاقرة  
التي تدخل في تركيب غذاء مستحضرات . وهو غذاء  
الاستهلاك في الطب البيطري عصاره حصاصه غنية بالسكسين  
وهي مادة قلبية غمدية ومنهم من استعمالها في صيد الاسماك .  
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

## \* ١٣٨٦١ - سَكَّع اُرُوبِي \*

Cyclamen europæum (S). Cyclamen d'Europe (F).  
حصيته متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم . قلاتها الجذرية  
هشبة التركيب تم كامل الصفحة السفلى . اوراقه  
قلبية . مستديرة الزوايا ، نصلها جامد النسيج ، اخضر  
الصفحة العليا المنسجة بالابيض ، اخر السفلى || ازهاره  
عريقة الرائحة ، وردية اللون ، يملؤها مزاج قزمي . مبالغها  
تطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهاره يستمر من تموز  
الى تشرين .

## \* ١٣٨٦٢ - سَكَّع البُنْدُاقِيَّة \*

Cyclamen  
neapolitanum (S). Cyclamen napolitain (F).  
حصيته كبيرة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٢٠ سم .  
قلاطها الجذرية حنارية حوقية || اوراقه قلبية الشكل ،  
مبمة الزوايا ، نصلها جامد التركيب ، ابيض التليج  
والخافت . ازهاره بياض اللون او وردية يملؤها عند اعناقها  
توضيح اخر . مبالغها تطول نحو ٢٠ سم . || ازهاره  
يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

## \* ١٣٨٦٣ - سَكَّع الْقَصْ \*

Cyclamen coum (S).  
Cyclamen de Cos (F).  
حصيته صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم . اوراقه بيضيه

Sucrase (F). Invert sugar (E). سَكَّرَان  
في خيرة السكر التي تحول السكروز الى غلوكوز ولفيلوز  
قابلين للاختبار .

## \* ١٣٨٦٧ - سَكَّرَان هو البنج الاسود ، الحلب .

## \* ١٣٨٦٨ - سَكَّرَان \*

Scopolia (S). Scopolie (F).  
Scopolia (E). Tollkraut (D). Scopolia (I).  
جنس نباتات عشوية جلمورية معمرة من فصيلة  
الباذنجانيات . انواعه قليلة جميعها زراعية تزيينية .  
سوقها فاقرة . اوراقها منتقة بسيطة متناحية . ازهارها  
فردية ، ابطية ، كوية ، مملقية ، متدلية || اعرف  
انواعها ما يتبع .

## \* ١٣٨٦٩ - سَكَّرَان اصْفَر \*

Scopolia lurida (S).  
Scopolie jaunâtre (F).  
عشبة تزيينية مهددا الهند . تملو نحو ١٥٠ سم . ازهارها  
خاسية التفصيص صغيرة القد تبدو خضراء اللون ثم  
تتحول الى الاصفر وتنتهي بالابيضواني || ازهارها  
يستمر ٥ اشايخ ابتداء من اواخر آب .

## \* ١٣٨٧٠ - سَكَّرَان الغَرْب \*

Scopolia carnolica (S).  
Scopolie de carniole (F).  
عشبة معمرة مهددا غربي اوروبية . تملو من ٣٠ الى  
٦٠ سم . ازهارها جزوية اللون متوسطة القد || ازهارها  
يستمر من نيسان الى ايار .

## \* ١٣٨٧١ - سَكَّرَة هي الزوان ، الحلب .

## \* ١٣٨٧٢ - سَكَّرَجَا \*

Soldanella (S).  
Soldanella (F). Sea bind-weed (E). Straudwinde,  
Bärwinde (D). Soldanella (I).  
جنس نباتات عشوية برية جبلية معمرة من فصيلة  
الربيديات . انواعها خمسة . سوقها خراخشة تملو من ٥ الى  
٣٠ سم . اوراقها جذرية مملوارة مستديرة . ازهارها فردية ،  
هامية ككل الشراخ . لونها وحجمها يختلفان مع نوعها .  
فيها الاحمر والبنفسجي والازرق والبيكلي .

## \* ١٣٨٧٣ - سَكَّر تَبَات \*

هو الابلوج والقندم ، الحلبها .

## \* ١٣٨٧٤ - سَكَّرُوز \*

Saccharose (F).  
Saccharose, Cane-sugar (E).  
هو المادة الحلوة الموجودة في صمير قصب السكر والشوندر  
والقند والاسفندان . وهو منشوري التبلور ثقله النوعي  
١,٦٠٦ غلوه المائي متيسار .

## \* ١٣٨٧٥ - سَكَّرِي \*

Saccharaux (F). Saccharous (E).  
يحتوي على سكر .

## \* ١٣٨٧٦ - سَكَّرِين \*

Saccharine,  
Sucre de houille (F). Saccharin, Glusidum (E).  
هو سكر القند المجري ، مسحوق ابيض شديد الحلاوة  
تزيد حلوته ٣٠٠ مرة عن السكر المعروف . يستخرج  
من قوران القند المجري . يمتزجه مفرأ بالصم  
ولا يميزون استعماله الا في الصيدة .

## \* ١٣٨٧٧ - سَكْسَاك \*

Talapoin (F).  
هو هجرس سكار . الحلبه .



سَكَّرَان



سَكَّرَان



سَكِيد



سَكِيد



سَكَّع اُرُوبِي



سَكَّع البُنْدُقِيَّة



غشقة المؤخر المدبب . اغامدا لا تلحف كامل البطن .  
قوائمها نشيطة ، معتدلة الجرم . أطولها متباينة التنعيب  
منها برصيدة اللون ومنها مبقية وبرزقة || جميعها دامة  
تميش تحت القشور والباه وني الاغشاب النخرة .



سنگ ریمانی

#### ۱۳۸۷۰ - سیکلیات ۵ Scaphididae (S). Scaphididae (F).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
المعروفة متوسطة البدن ، منتشرة في معظم غابات المناطق  
المعتدلة الحارة والحارة || اجناسها صغيرة طول من ۵  
الى ۹ م . رؤوسها مستعرضة ، ملحوفة . عيونها صغيرة ،  
بارزة . تأثيرها وفكرها قياسية . قرونها الاستشارية  
لانظامية ، منها الصولحانية ومنها الخيطية ، جميعها مركبة  
من ۱۱ فصلة . كواسلها محدبة ، شارقة ، تلحف القسم  
الاكبر من الرأس . اغامدا مائلة لا تلحف كامل البطن .  
بطونها مدببة المؤخر || جميعها دامة تميش تحت الهاء وفي  
الاغشاب النخرة وفي تكاع القشور الدابة || اشهر  
اجناسها السكفيد .

#### ۱۳۸۷۱ - سیکل Synodontis (S). Schal (F).

السیکل ج أسکال . جنس اسماك نهريه من فصيلة  
السورديات تكثر في مياه الانهر الافريقية . تتميز  
بضخامة شكلها واسوداد لونها وصغر رؤوسها وتهديب  
عذباتها الست .



سکبد

#### ۱۳۸۷۲ - سیکل ۵ Ascalaphus (S).

Ascalaphus (F).  
جنس حشرات لامؤنية من فصيلة السکليات ورتبة  
شارفات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها يألف  
الاقاليم المعتدلة واليبس الآخر يعيش في المناطق الحارة  
او المنحرفة نحو الباردة || اجناسها متوسطة القد وكبيرة .  
يسطحها تراوح من ۳۵ الى ۸۰ م . رؤوسها شبه مخروطية  
الشکل ، كثيفة الحلب الدقيق . اجنحتها مستطيلة ، بعضها  
شفاف والبعض الآخر مغطى . جميعها ملحوفة . غشائها  
الرئيسي اصفر او عاجي تملو ينج وزخارف يراوح لونها  
من الاسمر الى الاسود . قرونها الاستشارية مستطيلة  
تنتهي بطور من الحلب الناعم صفة الشکل او مطية .  
صورتها معتدلة الشحنة ، كثيفة الحلب الدقيق . بطونها  
اسطوانية او مردنية الشكل ، سواء الين ، ملحوفة بالاسفر  
او الاخير او العاجي || يرقاقها شبه يبيضة الشوزن ،  
معتدلة التيطيط ، بارزة الحمار السکبي الذي يبدو كاستان  
المنشار . رؤوسها مرمية ، ناثرة . ملاسها الفكية  
كلآية الشكل ، مسنة من الداخل . جميعها مفترسة  
تميش بين الاغشاب وتحت الحجارة .



سکلاف

#### ۱۳۸۷۳ - سیکليات ۵ Ascalaphidae (S).

Ascalaphidae (F). Ascalaphidae (F).  
فصيلة حشرات من عصيات الجناح ورتبة شارفات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار  
البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم || اجناسها متوسطة  
القد وكبيرة . يسطحها تراوح من ۳۴ الى ۱۱۰ م .  
رؤوسها شبه مخروطية ، كثيفة الزغب والحلب الدقيق .  
عيونها كبيرة ، جاحطة . قرونها الاستشارية غشبية ،  
مسطحة ، تنتهي بمجموعات من الحلب والزغب يكثر فيها  
الشکل المثلث ثم الصفي . صورتها ، من التکسل الى  
البرجاد ، زباه . بطونها شبه مردنية الشكل . اجنحتها

الشکل نصلها مناجج التسج لونه الى الخضار الباق .  
ازهاره عادمة اللون ، شديدة الحمرة ، صغيرة القد ،  
ممايقها طول نحو ۸ سم || ازهاره يستمر من شباط  
الى اذار .

#### ۱۳۸۷۴ - سیکل ریميني Cyclamen vernum (S).

Cyclamen printanier (F).  
حصيته صغيرة القد قطرها نحو ۲ سم . قلائها الجدرية  
محورية قرصية . جذورها غشبة الانتشاب || اوراقه  
قلبية ، ظاهرة الزوايا . نصلها جامد التسج اخضر  
الصفحة العليا ، بايق السفلى || ازهاره وردية اللون ،  
قلية القد . متوسطة القد . ممايقها طول من ۱۰  
الى ۲۵ م . || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

#### ۱۳۸۷۵ - سیکل فارسى Cyclamen persicum (S).

Cyclamen de Perse (F).  
نبات رفه يتطلب بعض العناية الخاصة . فروبه عديدة  
تختلف بالوان ازهارها وبكثال بتلانها || حصيته متوسطة  
القد قطرها يراوح من ۴ الى ۶ سم . اوراقه يبيضة ، نصلها  
مترابك التسج والتبيج ، مسن الحافة ، شديدة الخضار  
الباق || ازهاره كبيرة القد ، عديدة الالوان فيها  
الکسبة والمآوية والمهدة . ممايقها طول من ۲۰ الى  
۳۰ سم || ازهاره يستمر من تشرين الثاني الى اذار .

#### ۱۳۸۷۶ - سیکل کلبية Cyclamen cilicium (S).

Cyclamen de Cilicie (F).  
حصيته صغيرة القد قطرها نحو ۳ سم . قلائها الجدرية  
محورية قرصية . جذورها غشبة الانتشاب || اوراقه  
قلبية مستطيلة . نصلها مناجج التسج اخضر الصفحة  
العليا احمر السفلى || ازهاره وردية اللون تملوا نمشة  
ارجوانية ترين قاعدة البتلات . عرفها متوسط الارجح .  
ممايقها طول نحو ۱۲ سم || ازهاره يستمر من ايلول  
الى تشرين .

#### ۱۳۸۷۷ - سیکل لبستاني Cyclamen libanoticum (S).

Cyclamen libanais (F).  
حصيته متوسطة القد قطرها نحو ۵ سم . لونها الى الجؤرة .  
قلائها الجدرية محورية قرصية || اوراقه قلبية مسنة  
الحافة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، جؤري السفلى .  
ازهاره متوسطة الحجم ، عريفة الرائحة ، وردية اللون ،  
بتلاتها مسنحة القاعدة . ممايقها طول من ۱۲ الى  
۲۵ سم . || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

#### ۱۳۸۷۸ - سیکلين ، سیکلامين Cyclamine (F). Cyclamin (E).

مادة قلوية سامة تستخرج من عصارة السک تستعمل  
في مكافحة الحشرات ولي بعض المتحضرات الطبية  
البيطرية .

#### ۱۳۸۷۹ - سیکليد ۵ Scaphidium (S).

Scaphidium (F). Scaphidium (E).  
جنس حشرات من فصيلة السکفديات ورتبة غمديات  
الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة البدن اعطائها بعض غابات  
وصراع الاقاليم المعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة القد ،  
الميلحية الشكل ، طول نحو ۶ م . رؤوسها مستعرضة ،  
ملحوفة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشارية  
تأثيرها وفكرها مملوحة نظامية . كواسلها  
كبيرة ، محدبة ، شارقة ، تلحف معظم الرأس . بطونها

١٣٨٧٩ - سكوري توماس هو توبال الحديد، اطلبه .

١٣٨٨٠ - سكوليت

جنس حشرات ضارة يعرف بالكراشة ، اطلبها .

١٣٨٨١ - سكوليت التين (F). Scolyte du figuier

حشرة مؤذية تدعى كين التين ، اطلبها .

١٣٨٨٢ - سكوليتات

هي الكراشيات فصيلة حشرات ، اطلبها .

١٣٨٨٢ - سكون (F). Dormance (E). Dormancy

السكون حالة طبيعية تمر بها معظم الحشرات في بعض اطوارها الانتقالية حيث تتخذ الى السكون التامة ريثما ترقطها العوامل البيئية .

١٣٨٨٤ - سكتيات (F). Tyroglyphidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة التراديات . اجسامها وانواعها المؤذية قليلة العدد جميعها مجهرية لا ترى بالعين المجردة . اجسامها مستطيلة بيضاء اللون ارجلها حنطية || تركب جميع انواع الحبوب الخزونة والبار الحنطية والبسكوت والاجبان .

١٣٨٨٥ - سكتيت

هو القرص نوع من الحوام اللاص الساكت .

١٣٨٨٦ - سكتية الجبن \* ، قمل الجبن

Tyroglyphus siro (S). Tyroglyphus, Mite du fromage (F). Tyroglyphus, Cheese mite (E).

حشرة من السكتيات طولها نحو نصف ملليمتر . لونها الى البياض الاخير . غطتها غروبي الشكل ، ثابت ، رصاص . ارجلها ثمانية . جسمها مغطى بالحب الدقيق المستطيل . تركب قشور الاجبان الجافة وتصبب جميع المواد النباتية والحويانية الخنصرة المنحلة .

١٣٨٨٧ - سكتية الدقيق \*

Aleurobius farinae, Tyroglyphus farinae (S). Tyroglyphus de la farine, Mite de la farine (F). Flour mite, Meal mite (E).

حشرة من السكتيات طولها يراوح من عشريين الى اربعة اعشار المليمتر . جسمها مطبق الشكل ، مغطى بالحب المستطيل الدقيق . ثوبها الى البياض الاخير . رواجها حنطية اللون تنتهي بمحاجم دقيقة . غطها بلوطي الشكل ثابت قاصم || تركب الاجبان والقشود ومغطى المواد الغذائية الخزونة والدقيق والحنطة والشعير والشوفان والنخالة... وعندما تصيب البر والدقيق فإنها تؤذيها اشد الاذى || وقد تسي الى الطيور الداجنة التي تأكلها مع الحبوب المنقورة وتسبب ايضاً بعض الامراض الجلدية للانسان الذين يضطرون نقل وتقليب اكياس الحنطة المصابة او الدقيق المطلوب .

١٣٨٨٨ - سكتيات

Psychodidae (S). Psychodidae (F). Psychodidae (E).

فصيلة حشرات كثيرة الاجناس والانواع ، منتشرة في جميع انحاء العالم . اطلب قرقيسات .

غشائية ، عصبية ، كبيرة ، ملونة وبرقشة || تألف البراري والخراج المبعثرة الانجار . يرقاتها مفترسة تعيش نحو حولين يكثر وجودها بين الاعشاب التي تلامس التربة وتحت الهبارة || اشهر اجناسها السكلاف .

١٣٨٧٤ - سكتة

هو الدج الازرق طائر من الشحوريات .

١٣٨٧٥ - سكتة ، شدقة Segment

السكة هي جزء من وحدة ج سكم .

١٣٨٧٦ - سكتو \*

Sequoia, Wellingtonia, Washingtonia, Giantables (S). Sequoia, Wellingtonia (F). Sequoia (E). Echter mammutbaum (D). Sequoia (I).

جنس اشجار حرجية من الطقوسيات وفصيلة الصنوبريات . له ثوبان وعدة فروع مهدا غرب الولايات المتحدة الامريكية . اشجارها عظيمة جسيمة تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ م . اوراقها عروية ، متعاقبة ، فلية الشكل ، جميلة الخضار . اثمارها وحيدة الشق والمسكن . اكرازها يضيئ لونها الى الخفي الباق . جراحاتها مبارية . بزورها غنية الجناح مرباية التسلخ .

١٣٨٧٧ - سكتو جيتارة Sequoia gigantea (S). Sequoia géant, Arbre mammoth (F). Big tree, Mammoth tree (E).

شجرة سرية سريعة النمو تملو نحو ١٢٠ م . ساقها منتصبة مستقيمة . نجها شديد الخشانة جوي اللون . شكيرها ابيض غشها الى السرة الصنانية وهو قليل الصلابة والقوة متوسط الصنف قليل الاستعمال الصناعي . اثمارها وخراصها متدلية . بناتها غنية مرتفعة . اوراقها فلية مستطيلة جميلة الخضار الباق . اكرازها يضيئ الشكل تملو من ٥ الى ٨ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ترطب في الاقاليم الرطبة وفي الارتفاع السميكة الغور . غروبها عديدة اشهرها ما يلي .

S. g. glauca سكتو جيتارة بحرية اللون  
S. g. pendula سكتو جيتارة زهرية  
S. g. argentea سكتو جيتارة فضية  
S. g. aurea سكتو جيتارة ملحية  
S. g. pyramidalis سكتو جيتارة هرمية

١٣٨٧٨ - سكتو خضرارة


Sequoia sempervirens (S). Sequoia toujours vert (F). Red wood (E).

شجرة سرية سريعة النمو تملو زهاء ١٠٠ م . ساقها منتصبة مستقيمة . نجها شديد الخشانة جوي اللون . شكيرها صلب قليل الساكة . غشها الى الجوزة الزاهية جامد الرقة ، خفيف الوزن النسي ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال الصناعي || اثمارها وخراصها مفصلة ، متدلية . بناتها غنية . اوراقها خضيرة ثنائية التصنيف تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . وتعرض نحو ٢ م . اكرازها يضيئ تملو نحو ٣ م . لونها الى الجوزة السمر || ترطب في الارتفاع السميكة الغور المنسوبة الرطبة والانماج اشهر غروبها :

S. s. albo-spica سكتو خضرارة البوسيبكا  
S. s. taxifolia سكتو خضرارة تكسيغوليا  
S. s. filifera سكتو خضرارة خيطية



سكو



سكية الجبن



سكتية الدقيق



سِكَّة

لا تؤكل. يتكاثر بالبلر أما يفضل غرس الثمرة كما هي وذلك بعد انتاش بذرتها الذي يحصل عنه وضعها في مكان رطب || وهو يرغب في الأتربة الخفيفة العميقة النور ويتطلب الى مساند أو عوائل نباتية يستلحقها .

١٣٨٩٥ - سَلَّ ، حَوْش  
Châtrier (F).  
To castrate, To geld (E).  
انزع الخصيتين في الاحصنة والثيران والتكباش واليوس وغيرها .

١٣٨٩٦ - سَلَّ  
Manne (F). Hamper (E).  
جوة كبيرة من القصب تستعمل في نقل بعض الثمار والخضار .

١٣٨٩٧ - سِلَّ ، قَدْرَنْ ، سَحَاف  
Tuberculosis (F). Tuberculosis (E).  
مرض معد خطر يدعى السل والسلال والتدرن في الحيوان ، والسحاف في النبات .



سَكِيم

١٣٨٩٨ - سَلَّ وَتَوِي ، قَدْرَنْ رَتَوِي  
Tuberculose pulmonaire, Phtisie pulmonaire (F).  
Phthisis, Consumption (E).  
مرض معد يصيب الرئة فيطبخها . كشفه العالم الالمانى كوخ عام ١٨٨٢ وهو من الامراض غير الوراثية اما يعيش في الهواء والبصاق وافرازات الجسم والملابس والاعلمة وفي حلب الماشية المصابة || تحصل عدواه اما باستنشاق الهواء الملوث عن طريق الجهاز التنفسي الى الرئتين او عن طريق الجهاز الهضمي بواسطة الاغذية الملوثة .



سَلَّ

١٣٨٩٩ - سَلَّه \*  
Sarciphorus (S). Sarciphore (F).  
جنس طير من فصيلة الزرقائيات اطلق الثوب طويل الرجلين هذه الثيابي الافريقية .

١٣٩٠٠ - سَلَّه \* ، دُودَة خَيْطَلَة  
Trichocephalus (S). Trichocéphale (F). Trichocephalus, Thread worm (E).  
نوع من الديدان السلكية الدقيقة المستطيلة . رؤوسها شعرة اطرافها مدببة . تعيش طفيلية في الامعاء اخصها المهي الفيلط .



سَلَّه

١٣٩٠١ - سَلَاح \*  
Thecopsora  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الثعصبيات ، يتميز بدعاماته الخطية الغشاء ، الجولية الثورية المستطيلة ، الشفعية الانقسام والثانية او الرابعة الاضية || انماه قليلة تعيش طورها الاثدي على الصنوبريات ، اشهرها واعرفها سلاج البرقوق .

١٣٩٠٢ - سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ \*  
Thecopsora padi, T. areolata (S). Rouille des pruniers (F).  
فطر من السلاج يقضي طوره الاثدي على الصنوبر . ويتطفل في طوره الاحادي على البرقوق والنوخ والكرز . مظهره الحادبي يقع حر فمثلة الزوايا تركب الاوراق على صفحاتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بثور قرحية لاقامية الشكل والحجم لنها الى الجودة فالسرة تمطب التسج وتنب ذبول الاوراق ومقرطها || يكاثف بالابضاد على الصنوبر الموبوء وباستعمال الفواطير الحديثة الحالية من المواد النحاسية .



سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ

١٣٨٨٩ - سُرْعُوقَة الْبَحْر \*  
Squilla (S). Squille, Mante de mer (F).

جنس دوبيات بحرية من القشريات فيات الاربيل . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة . خلفها رقيقة مدبجة بالسك المدببة الارباع الاول . اما السك الارباع التالية طفيلية . يطونها كبيرة مستطيلة . الزوج الامامي من قوائمها بالغ الضخامة والكثير مجهز للخلط كما هي الحال عند السرعوق || طومها مرغوب فيها ما كولة .

١٣٨٩٠ - سِكِين  
Coutre (F).  
Plough-share, Coulter (E).  
جزء من المحراث حاد الطرف يقطع كتل التراب عمودياً .

١٣٨٩١ - سِكِينِي الْسِن \*  
Cultridenté (F).  
Cultridentale (E).  
من الحيوان ما كانت اسنانه حادة الاطراف ، سكينية الشكل .

١٣٨٩٢ - سِكِينِي الْمِنْقَاد \*  
Cultriostre (F).  
Cultriostreal (E).  
من العيرين ما كان منقاده صلب الطرف ، حاد كالسكين يخص بالذكر القلق والبشون .

١٣٨٩٣ - سِكِينِي الْوَرَق \*  
Cultrifolié (F).  
Cultrifoliolate (E).  
من النبات ما كانت اوراقه سكينية الشكل .

١٣٨٩٤ - سَكِيم \* ، شَبُوط \* ، كُوتِي  
إفريقي ، خيثار الإفريقي  
Sesum edule (S). Chayote, Chocho, Chuchu (F).

نبات زراعي معمر ويسعد الجنس والنوع من فصيلة التريعات . جهده بلاد المكسيك ومنها انتشر في سائر اقطار العالم . جذوره دنية كبيرة القد . ساقه ليفية متسلقة تطول بضعة امتار . حولتها ثلاثية او خماسية التركيب . اوراقه متعقبة كفية خماسية المقصوص والبروق ، تطول وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره ابطية الانتساب صفراء اللون ، ذكرية وانثوية . الذكرية متفويضة التجميع والانثوية فردية . ثماره تؤكل مطبوخة وهي كبيرة القد بضيبة الشكل ، مقطوبة القعب ، مضلمة القشرة المحدودة ، المتصمجة ، البجرة الطوك . لبها جامد المادة البيضاء اللون يحضن عجة كسنتية الشكل ، كبيرة القد ، هشة القشار ، المثة جزء من لباب الثمرة تحوي الناصر التالية

ماء	% ٩١,٠٠
مواد دهنية	% ٠,٢٢
مواد سكرية	% ٣,٢٨
مواد ازوتية	% ٢,١٦
مواد غير ازوتية	% ٣,٣٤

دزئات جذوره تستعمل استنبال الباطحا وهي تزن من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام . وتحوي ما قدره ١٥٠٠٪ من النشا ٢٥٠٪ من المواد الازوتية

عدد دزئات البتة يراوح من ٣ الى ٧ يقطع منها الثلث اي من الدرة الواحدة الى الدرتين ويجب ان تكون الدرة حولية او محولة لما اذا زاد عمرها عن السنتين فتصبح ليفية

Blépharite (F). Blépharitis (E). **سُلَاقِي** ١٣٩١١ -  
هو ريد الجفن أو التهاب الجفن .

Anthropologie (F). **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٢ -  
Anthropology (E). السلاقة علم بطابع الانسان .

Lévrier (F). **سُلَاقِي \* سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٣ -  
Greyhound (E). سلالة كلاب عذامة تصيد الفزلان والأرانب والثعالب وبنات آوى تتميز باستطالة اجسامها وقوائمها .

Monoblepharidae (S). **سُلَاقِيَّات** ١٣٩١٤ -  
Monoblepharidées (S). Monoblepharidae (E). فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التسنيتات ورئيسة البيشيات .

Race (F). **سُلَاقِيَّة ، عِرْقِي** ١٣٩١٥ -  
Race, Breed (E). جراح افراد متشابهة من نوع واحد تنتقل صفاتها بالوراثة . ومن المستحسن استعمال سلالة في النبات وورق في الحيوان .

Racial **سُلَاقِي ، عُنْصُرِي** ١٣٩١٦ -  
ما هو منوط بالسلافة أو العنصر .

Phalange (F). Phalanx (E). **سُلَامِي** ١٣٩١٧ -  
السلاميات عظايا في الاصابع .

Phalangides, Faucheurs (F). Phalangides, Mowers, Harvestermen, Daddy longlegs (E). Weberknechte (D). **سُلَامِيَّات ، حَشَائِث** ١٣٩١٨ -  
رتبة من العنكبوتيات رقبلاواتها طوال الارجل مدقاتها يمشين كالخسادين .

Entre-noeud, Méritaille (F). **سُلَامِيَّة** ١٣٩١٩ -  
Internode (E). جزء الساق بين عقدتين .

Age de la charrue (F). Plough-beam (E). **سَلْب ، هَيْس ، وَنِج** ١٣٩٢٠ -  
نصاب الحراث أو قومه . وهو الجزء الجامع لاسر اجزاء الحراث .

**سَلْب** ١٣٩٢١ -  
السلب من القصة : قشرا . والسلب : لحاء شجر في الين يعمل منه الخبال وهو اجفئ من ليف القل واصلب .

**سَلْبَج** ١٣٩٢٢ -  
السلبج والسلبجة ضرب من الدلب ج سلابج .

**سَلْبُوت ، سَلْبِيَّة ، كَبُوسِيْن** ١٣٩٢٣ -  
**جُو كَلَانَة** Tropaeolum (S).

Capucine (F). Nasturtium (E). جنس نباتات عشبية ليفية مدادة من فصيلة السلبوتيات . انواعه ٣٥ معظمها امريكي المنت . سوقها عادمة الحواقي . اوراقها متعاقبة مجنبة ، ساليقها لولبية . ازهارها محورية الارتكاز ، كورسها ثنائية التركيب ، مهبازية الناعدة . ثوبجياتها خماسية البتلات المغطوة . اوراقها . وازهارها مأكولة قريبة الشبه من الرشاد || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

Haematopus (S). **سَلَجَج** ١٣٩٠٣ -  
Hultrier (F). Oyster-catcher (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة السلاجيات . انواعه المعروفة عشرة منتشرة في معظم اقطار العالم . ملجنتها الحيواني جامي . اسرارها تمتد ببعض المئات . جميعها من القواطع الجرجا . قوتها الرغويات والقشريات والديدان ... || اجسامها ربة متوسطة القد . مناقبها مستطيلة جالسة . اجتماعها شارة تلحف الاذنان . ارساغها دقيقة معدلة الطول . اصابعها ثلاث مستطيلة الجرم ، مستعززة الاطراف . القصيرة || تدشن في الكشبان والماصب . افاجيصها تفر سطحية يحيطها اطوار من حطام الصدف والفرع . انائها تقص من يبيضتن الى ثلاث يبيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها سلاج كندش .

**سَلَجَج كَنْدُش \*** ١٣٩٠٤ -

Haematopus ostralegus (S). Hultrier-pla, Bécasse de mer, Pie de mer (F). **سَلَجَج** ١٣٩٠٤ -  
طائر من السلاج . موطنه يشمل معظم اقطار العالم القديم . مشناه البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مصيفه البلاد الباردة . يألف الشطوط البحرية وصفات الانهر والمستنقعات . شربه يمد بعض المئات || جسمه متوسط القد يطول نحو ٤٤ سم . بصلته نحو ٨٦ سم . ثوبه ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهر والعتق ، ابيض الجرشن والبطن والساق والانيق . جناحاه سود الصفعة العليا ، يبيض الاياهر والصفعة السفلى . ذنبه ابيض القسم الاول ، اسود الطرف . حلقة عينه قرنزية اللون . جوفه برتقالية . متقاده احمر القاعدة والجسم ، اسمر الملقط . رجلاه الى الحمرة || انشاء لا تحفن اكثر من يبيضتن .

Haematopodidae (S). **سَلَجَجِيَّات** ١٣٩٠٥ -  
Hématopodidés (F). Haematopodidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من القواطع الجرجلة . ملجنتها الحيواني جامي . اسرارها وافر العدد . قوتها القشريات والرغويات والديدان والاسماك الصغيرة || اجسامها متوسطة القد ، اذوابها ملونة || اشهر اجناسها السلاج وكبرة الماء .

**سَلَحِيف** ١٣٩٠٦ -  
Chelonia (S). Chéloniens (F). Chelonia (E).

رتبة من الزسافات البيوضة تشمل خمس فصائل تتميز باجسامها البليطة الهدية الظهر . رؤوسها صغيرة . اعناقها متوسطة الطول . فكركها عادمة الانسان . قوائمها غليظة وقصيرة . بطونها قرنية الكنف . ظهورها مدقة بذيال . اما فصائلها فهي : الحسيات والترسيات والزريقات والسلمقيات والحيثيات .

**سَلَسَكَة** ١٣٩٠٧ -  
Plasticité (F). Plasticity (E).

في الانطباع ، اطلبه . **سِلَامُوس** ١٣٩٠٨ -  
راجع حراوية .

**سِلَاكَة** ١٣٩٠٩ -  
Hirudiniculture (F). Leech-breeding (E). هي فن تربية الملق وتكثيره .

**سِلَاقَة** ١٣٩١٠ -  
Vin de goutte هو ما يسيل من العنب قبل عصره .



سلاج كندش



سلافي

١٣٩٢هـ - سَلْبُوتُ خَمَلِي، سَلْبِيَّةُ خَمَلِيَّة،  
كَيُوسِينُ خَمَلِيَّة

*Tropaeolum peltophorum* (S.). Capucine de Lobb,  
C. velue (F). Lobb nasturtium (E).

عشبة ليفية مدادة زباء تطول من ٣ الى ٥ أمتار. أوراقها مجنحة، ضلعها يستطيل كالחסكة. أزهارها برتقالية اللون. بتلاتها السفلى مسننة الحتار او مهدبة || أزهارها يستمر نحو ٥ أسابيع ابتداء من أواخر تشرين.

١٣٩٢٥ - سَلْبُوت رَشِيْق ، سَلْبِيَّة رَشِيْقَة ،  
كَبُوسِيْن رَشِيْقَة

*Tropaeolum speciosum* (S). *Capucine gracieuse* (F).  
محببة ليفة مدادة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها  
خياصة التخصيص وقد تكون سداسية. نصلها خلي البشرة  
عل صفحته السفلى. ازهارها ارجوانية اللون. مستطيلة  
المهاميز، قلبية البتلات || ازهارها يستمر طوال  
الشتيف والحر يف.

١٣٩٢٦ - سَلْبُوتٌ صَغِيرٌ ، سَلْبِيَّةٌ صَغِيرَةٌ ،  
كَبُوسِينَ صَغِيرَةٌ

*Tropaeolum minus* (S). Capucine mineure, Petite capucine, C. naine (F).  
عشبة ليغية متسلقة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستديرة ، اضلاعها مستطيطة . ازهارها صفراء اللون يعلوها توشيح وتجزع احمر || ازهارها يستمر من حزيران الى اكتوبر

١٣٩٢٧ - سَلَبُوتُ عُسْقُولِي، سَلَبِيَّةٌ عُسْقُولِيَّةٌ  
كَبَرَسِيْنٌ عُسْقُولِيَّةٌ

**Tropaeolum tuberosum (S). Capucine tubéreuse (F).**  
عشبة ليغية مدادة وعارضة تطول نحو ١٠٠ سم. جنورها  
عسقلية غروطية أو اهليلجية الشكل. أوراقها خاسية  
التفصيص. نصلها ملس البشرة. أزهارها صغيرة البتلات  
المستعرضة، لونها الى الصفرة. عساقلها مأكولة تستعمل  
استعمال الطماط.

١٣٩٢٨ - سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ \* ، سَلْبِيَّةٌ كَبِيرَةٌ ، كَبُوسَيْنِ  
كَبْنَةٍ ، أَلْبُخَنَجَةٍ ، طَطَطُهُ ، أَلْأَشَا

*Tropaeolum majus* (S). Capucine majeure, Grande capucine, Cresson d'Inde (F). Tall nasturtium, Tall indian cress, Canary creeper (E). Kapuziner-Indianische kresse (D). Astuzzia maggiore, Nasturzio maggiore (I).

عشبه ليفية مادة عارضة تطول نحو ٣٠٠ سم. ساهتا ليفية خضبة مائلة للأحمر. جلودها غليظة ليفية كثيرة الانقسام. وارثها غنية الشكل، نعلها ناعم البشيرة اللامعة، بجري الخضار. حبات التجميع، بحرية الإرتكاز، مقعولة البلات، عديدة الألوان فيها الأحمر والأزرقاني والقرنزي والبرتقالي والاسفر . وفي حويلها في المناطق المنخفضة، سمرة في المناطق الحارة. ابقارها يستمر طولها السنة " ذرع أربعين وكبات حتى اذهارها حريقة العلم المسحب. ثمارها الفتية تستعمل لاختلاف من الكبر في الحلات. يقال ان اذهاره وارثها لا تلحق من التفتينات القوية

Tropaeolaceae (S).      سَلْبُورِيَّات - ١٣٩٢٩  
Tropeolacées (F). Tropaeolaceae (E).

فصلية نباتية من مذودحات للفلقة مستغلات القعالات .

أجناسها وأنواعها عديدة جميعها عشبية أو ليفية مدادة وعارضة عادمة الحوائق .

Zorotypus ١٣٩٣ - سَلْبُوج \*٥

جنس حشرات طاسلة ، وانجبة ، صغيرة القد ، تعيش في التربة . انواعها قليلة . ذكورها عادمة الجناح . انثاها مجنحة . قرونها الاستشعارية فلابية الشكل . ارسافها ثنائية العقل . اما جهازها التناسلي فخفي .

Zoraptera (S).      ١٣٩٣١ - سُلْبُوجِيَّات ٥

**Zorapteres (F. Zoraptera (E)).**  
رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الوردانيات ، انواعها عديدة  
جميعها من الحشرات الطالسة ، الالوانية ، الصغيرة القد .  
اقليمها البلاد الحارة . تعيش في التراب . انثاهما مجنحة  
قائصة العين البسيطة . ذكورها داخلة العين عادة ،  
الجناس . قرونها الاستشعارية قلابية . ارساها ثنائية  
المفاصل .

Sceloporus (S). \*0 - سلو - ۱۳۹۳۲

جنس حيوانات زحافة من الطاء وفصيلة البشنيات .  
انواعه المروفة نحو ٢٥ جميعها من طاء امريكة الوسطى  
والشالية || اجسامها صغيرة القد، قصيرة الزروس القلبي،  
غليظة البطن، ربة القوائم النشيطة . اواطها خنلفة  
الوان يكثر لها الاصفر والاسفر وتختلط تالاب اسود  
او جويي || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب  
والهمام .

١٣٩٣٣ - سَلْبِيَّةٌ هي السليوت ، اطلبه .

Salpingus (S). \* ١٣٩٣٤ - سَلْبِين

**Salpinge** (F). **Salpingus** (E).

جنس حشرات من فصيلة المشرطية ورتبة غمديات الإحثة. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ مشرطاً في جميع أقطار العالم || أجسامها صغيرة، هيفاء، تقوّل من ٤ إلى ٧ م. رؤوسها بها خرطوية الشكل. صوبتها بارزة. تكاثرها وملاصها شاذية. قرونها الاستيعابية صنيطانية. لها زوجان من غلافية القدم، شعبة الخيزر الضصور. أجنحتها أضعافاً لاثقة. قوائمها نشطة. وأظفارها اللون باكرت بها. الأرواح السائدة البردي والناضج والابيض والاحمر والصفاني اللامع || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الأبقار. جميعها واثمة أو دامت.

Salpingidae (S).      ٥ سَلْبِينِيَّات - ١٣٩٣٥

**Salpingidae (F. Salpingidae (E)).**  
 فصيلة حشرات من غديات الاجنحة و انتاجها المعروفة متوسطة العدد مختصة في منظر اقطار العالم || اجسامها مضيئة || الهليجية الشكل ، معتدلة البنية ، تطول من ١٠ م. - ١٠ م. ذروها مخروطية الشكل . حشريها بارزة . اكثروها و ملاسها نطائية . قربها اسيديا قلابية او صوفانية ، مركبة من ١١ فصلة . كراسلها لاقائية الشكل والحجم . الحادها لافحة . قوتها نشطة . ارضها خالية السطح باستثناء الزحف الخلفي الرباعي العلل . اولها ملونة || جميعها واثمة او دامة تعيش على الاضراس و على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجسامها الهندية والمكسيكي .



سلیوٹ کپڑ



میلیو ج



ملفوظ



سليبي

الازرق تحوي من ٣٢ الى ٣٥٪ من الزيت الاصفر الصنابي الشائع الاستعمال الصناعي. كسبه على نحو ٥٪ من الاوزن || وهو من النباتات السبروتية المعلقة التي لا تتأثر كثيراً بالاقليم بشرط ان لا تخف فيه الرطوبة. يوجد في جميع التربة العميقة الغور غير انه يخشى المأسكة المندجبة.

### ١٣٩٤٨ - سَلْتَم حَقْلِي \*

Brassica napus sylvestris (S). Navette, Chou-colza (F). Nape, Naphew, Winter rape (E). Stackrube, Kohlrube (D). Navone, Cavallo navone (I).

نبات عشبي دهني على بري وزراعي من فصيلة الصليبيات قريب الشبه من السلق الا انه اصفر قدماً واشد مناعة. يزهر اما لاستخراج دهن بزوره التي تحوي نحو ٣٣٪ من الزيت واما كملت للماشية يفيد الفسرع وينشط الدرع.

### ١٣٩٤٩ - سَلْتَم

Pardreau (F). Young partridge (E). السلك والسلف والسلك : فرخ الحجل . ج سلمان .

### ١٣٩٥٠ - سَلْتَم

Poulaite هو هيس الدجاج من الاسمدة العضوية النشطة الفنية بنصر الاوزن. متوسط تركيبة الكباري :  
ازوت ١,٣٪  
حامض فسفوري ٦,٢٪  
عناصر مختلفة ١,٣٪

### ١٣٩٥١ - سَلْتَم

السلح : بهاء الماء في الغدران وحيثما كان . يقال ماء المد وماء السلح وماء الكرع .

١٣٩٥٢ - سَلْحَفَة Tortue (F). Tortoise (E). السلحفاة كوكبة نجوم شمالية المقع مشهورة باسم قيشارة ، اطلها .

### ١٣٩٥٣ - سَلْحَفَة

Testudo (S). Tortue (F). Tortoise (E). جنس سلاحف من فصيلة السلحفيات . انواعه ١٤ منتشرة في جميع البلاد الحارة . جميعها ارضية المسرح خاضلة طويلاً يراوح من ٢٠ الى ١٠٠ سم . ذيلها متوسط الاسدياب اسير اللون تملو قتر قرنية مربعة الشكل او مستطيلة ، لوها الى السرة الزرقوتية || تألف المرامي والسهول . تقضي نباتها الشتوي الذي يدوم نحو ٤ اشهر في جحر قليل الغور تحفره في التربة .

### ١٣٩٥٤ - سَلْحَفَة الْبَرّ

Tortue terrestre rude (F). نوع من السلاحف مشهور باسم سلحفاة خشنة ، اطلها .

١٣٩٥٥ - سَلْحَفَة خَشِينَة \* ، سَلْحَفَة الْبَرّ Testudo scabra (S). Tortue raboteuse, T. terrestre rude (F). Rough tortoise (E).

سلحفاة برية خاضلة من فصيلة السلحفيات . طولها عند كمال نموها لا يتجاوز ٢٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٤ سم . الاثنى اعرض من الفيلم واقصر منه . فارق الطول والبرص نحو ٢ سم . || ذيلها بيضي الشكل تملو قتر قرنية المادة . ثوبها الى السرة الزرقوتية . رأسها اسطواني الشكل ، افطس الخلف . تقمها أطع عادم الانسان . لسانها متوسط الطول مطاط . عتقها قليلة التجاعيد عند الانكماش .

١٣٩٦٦ - سَلْت هو الشليم ، اطله .

### ١٣٩٦٧ - سَلْتَة

Panier, Corbeille (F). Pannier, Basket, Hamper (E). سل صغير من القصب او القصبان الدقيقة يستعمل في نقل الباز وبض الخضار وما اشبه .

### ١٣٩٦٨ - سَلْتَة

هي الابدسارون الاسباني عشبة علفية مخففة تسمن عليها الايتار والافنام . ازهارها مغرية تجرهما النحل .

### ١٣٩٦٩ - سَلْتَة زَرَاْعِيَة

هي العرن ، اطله .

١٣٩٤٠ - سَلْتَة عَرَف الْدِيك هي عرن الغنم ، اطله .

### ١٣٩٤١ - سَلْت \* ، نَعْنَعَة (F). Celsia (S).

سلج ج سلايلج . جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الخنازريات . مقفوة التعريف على اسم البوالي السويدي اولاف سلايوس (Olaf Celsius) || اوراقها مقفوة . ازهارها صفودي التجميع . ازهارها صغيرة القد مختلفة الالوان المابقة || عرف انواعها الزراعية يتبع .

### ١٣٩٤٢ - سَلْتَم اِكْرِيَنِي (F). Celsia cretica (S).

Celsie de Crète, Queue d'ours de Crète (F). عشبة سبروتية محولة مهدا جزيرة اكريت . ساقها تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقها متعاقبة لاطلة || ازهارها وردية اللون كبيرة القد . ساقها واوراقها لزجة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ١٣٩٤٣ - سَلْتَم عَرُصَنِي الْوَرَق

Celsia bugulifolia (S). Celsie à feuilles de bugle (F). عشبة سبروتية معمرة مهدا تراقية والساحل اليوناني . ساقها تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها السفل ضمية التجميع ، بيضية الشكل ، مقفوة ، فصلها مالمس البشرة عابق الخضر || ازهارها الى الصفرة السمراء يطولها تسليج ازرق وولج اسفع .

### ١٣٩٤٤ - سَلْتَم قَبْرُصِيّ (F). Celsia glandulosa (S).

Celsie de Chypre (F). عشبة سبروتية محولة مهدا قبرص وسواحل الاناذية . ساقها تملو من ٤ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة خلية وغدية التصل || ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

### ١٣٩٤٥ - سَلْتَمَان هو الملقوم .

### ١٣٩٤٦ - سَلْتَجَة Huitre (F). Oyster (E).

صفقة بحرية ثها شيء ، يؤكل . ج سلج . اطلب محار .

### ١٣٩٤٧ - سَلْتَمَج \* Brassica campestris (S).

Colza (F). Colza, Rape, Carcel-oil plant (E). Oiraps, Kolza (D). Colza, Napo oleifera (I).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الصليبيات . جذره وتدني . ساقه فضاء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متعاقبة مقفوة ملتفة ، فصلها خلي الحروق مسن الحافة ، بحري الخضار . ازهاره صفودي التجميع . ازهاره صفيرة ، رباعية البتلات ، يضاء اللون او صفراء . ثماره غردلية مستطيلة . بزوره صغيرة دقيقة مستديرة لوها الى السواد



سلج



سلج



سلج حقل



سلحفاة خشنة

قوامها تصبيرة وغلظية. اصابعها كبيرة الاظفار المحدببة ||  
تسرح في النهار وفي الليل. قوتها الاعشاب والمواد النباتية  
والدوريات والخراطين || تعيش نحو ٨٠ سنة وتحفظ  
بطاقتها التناسلية اكثر من ٧٠ سنة.

١٣٩٥٦ - سَلَحُوتِيَّاتٌ (S). Chersidae, Testudinidae  
Chersides, Testudinids (F). Chersidae, Testu-  
nidae (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف. مهددا  
البلاد الحارة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها خاضعة  
أرضية المسرح، غظية الدقة للمحوية. ذيلها محدد  
الشكل تملو قتر قرنية لاقياسة الشكل والحجم. زعنفا  
سداسي التفرع يخرج منها الراس والذنب والقوائم الاربع  
التي تنكشف وتختفي، عند الاستراحة او الخوف، داخل  
الذقبة || اشهر اجناسها السلحفاة والفرسين.

١٣٩٥٧ - سَلَحِيَّةٌ  
جنس فطور مجهرية من عسارة الطحائيات وفضلية  
الكتنيات. يتميز بمشجبه الخفي التجمع ويكتائله الحلبية  
الاطراف || انواعه قليلة المدد والاذى. اعرفها سلحية  
الباز.

١٣٩٥٨ - سَلَحِيَّةُ الثَمَارِ (S). Volutella fructi (S).  
فطر مجهرى يركب الثمار الناضجة المحدثه اغصانها التفاح  
والاجاص والدراق والسفرجل والخوخ والشمش || مظهره  
الخارجي ندف خلى اسود اللون يملو البشرة المطبوعة  
فيها ويغفن الب وبنور فيه.

١٣٩٥٩ - سَلَخٌ سلخ النبات، عاد بعد الميج واغضر.

١٣٩٦٠ - سَلَخَةٌ Mue (F). Moulting (E).  
سلخة الحية: جلدها التي تسلف عنها. يقال « هذا ارق  
من سلخة الحية ».

١٣٩٦١ - سَلَسٌ عدم استسكك البول او العائط.

١٣٩٦٢ - سَلَسِيْلٌ Tragopogon (S).  
Salsifis (F). Salsify (E).  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات.  
اوراقها عصفية الشكل. قناياتها رسيده الصف. يزورها  
مقارعة دقيقة يملوها حرك ريشي || اشهر انواعه ما يلي.

١٣٩٦٣ - سَلَسِيْلٌ اَبْيَضٌ  
هو السلفيل الثري، اطليه

١٣٩٦٤ - سَلَسِيْلٌ اَسْوَدٌ Salsifis noir (F).  
Scorzonera (E).  
هو الدبع الزراعي، بقلة مأكولة الاوراق والجذور.

١٣٩٦٥ - سَلَسِيْلٌ المَرْجُ \*، لَحِيَّةُ الثَّيْسِ  
Tragopogon pratensis (S). Salsifis des prés, Barbe  
de bouc (F). Shepherd's clock, Yellow goat's-beard  
(E). Bocksart, Weisenbocksart (D). Salsifica dei  
prati, Barba di becco (I).

نوع من السلفيل البري مهدد الشرق الاوسط. عشبة  
معمره تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سباعية المروق  
خلية النصال. ازهارها كبيرة القد، صفراء اللون.  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران

١٣٩٦٦ - سَلَسِيْلٌ اَمْرَطٌ

Tragopogon geropogon (S). Salsifis glabre (F).  
نوع من السلفيل الربي. مهدد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة حولية تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مرطاه  
النصل. قناياها ثنائي اللسنيات. ازهارها حرارة اللون.  
ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

١٣٩٦٧ - سَلَسِيْلٌ بَرِّي \*، قُوْمِي

Tragopogon crocifolius (S). Salsifis sauvage (F).  
Wild salsify, Goat's beard (E). Wilder bocksbart  
(D). Salsifica salvatica (I).

نوع من السلفيل البري. مهدد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها بحرية  
الخضار الباهت. ازهارها صفراء القرمز، بنفسجية  
اللسنيات. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٩٦٨ - سَلَسِيْلٌ شَرْقِي \*، سَلَسِيْلٌ اَبْيَضُ

Tragopogon orientalis (S). Salsifis blanc, S. à feuilles  
de poireau (F). White salsify, Salsify, Oyster plant  
(E). Haferwurz, Wurzelbocksart (D). Salsifica,  
Scorzobianca (I).

نوع من السلفيل البقي الزراعي. غروبها عديدة منها  
الحولية والحولة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه ركليه  
الشكل بقلية. جذوره حنزيية مستطيلة يفساه اللون  
مأكولة. ازهاره الى الصفرة الذهبية || يرغب في الازرة  
الجيدة التركيب، المتوسطة الاندماج والغنية بالسود  
العنوية.

١٣٩٦٩ - سَلَسِيْلٌ مَبْدُولٌ

Tragopogon porrifolius (S). Salsifis commun (F).  
Common salsify (E).

نوع من السلفيل البري. مهدد مناطق حوض البحر  
المتوسط. عشبة حولية او محولة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم.  
اوراقها خلية النصل، بحرية الخضار. ازهارها كبيرة القد  
لونها الى البنفسجي المايق. اوراقها وجذورها مأكولة.  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٣٩٧٠ - سَلَسِيْلٌ وَرْدِي

Tragopogon ruber (S). Salsifis rose (F).  
نوع من السلفيل الربي مهدد المناطق الباردة. عشبة  
معمره تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها  
وردية اللون يملوها موج ارجواني || ازهارها يزوم  
اسابيع ابتداء من اوائل ايار.

١٣٩٧١ - سَلْسَلَةُ الثَّقَارِ، عَمُودٌ قَقْرِي،

Colonne vertébrale,  
Rachis (F). Vertebral column, Spinal column (E).  
مجموعة الخرزات الممتدة من قاعدة الراس الى صعب  
المصعص.

١٣٩٧٢ - سُلْطَانٌ هو التلوكسينيه، اطلبها.

١٣٩٧٣ - سُلْطَانٌ اِبْرَاهِمُ

هو البطرستوج من الاسماك المشهورة، اطليه.

١٣٩٧٤ - سُلْطَانٌ اِبْرَاهِمُ الصَخْرِي

هو البطرستوج الصخري من أخطر الاسماك وألندا.

١٣٩٧٥ - سُلْطَانُ الْجَبَلِ

هو صرعة الجدي، اطلبها.



سلفيل المرج



سلفيل بري



سلفيل شرقي

## ١٣٩٨٧ - سلطة المصان \* Marasmius sacchari (S).

نوع من السلعة يركب عيدان المصان فيقضي على نموها بعد ان يعلق السلايمات السفلى، عند انتشاب ليابطها، عشيقه البلب الاصفر الذي يسبب احمرار وجفاف العقد، ثم اصفرار الصف وذبوله || مظهره الخارجي فطر ابيض اللون، يحيل الجسم، ارسوت جرسية الشكل قطرها نحو ١٠ م. يعيش على العيدان المقطوعة. نمته كثيفة الفطور تقسم من ال ٢٠ الى ٢٠٠ || يكافح بانتزاع الاقدام والظواريع الموبوءة وبالا تكثر من الاسمدة الازوتية التي تنشط النمو البني والغصري.

## ١٣٩٨٨ - سلطة الموز \* Marasmius seminis (S).

نوع من السلعة يركب ارملة الموز ويظهر فيعطها ويقضي على الاوراق || مظهره الخارجي فطر صغير القد، ساقه اسطوانية تحمله بيضاء اللون. ارسوت صاجية، قطرها نحو ١٠ م. ثوبها متراكم الاوان، ظاهر البياض والصفرة والحمرة || يكافح في اول عهده بانتزاع الاقدام الموبوءة وينفخ الازوية باحد المركبات النحاسية المحلولة ٣٪ يضاف اليها ١,٥٪ من الكلس || وبما ان هذا الفطر لا يقرب الا التباينات الضعيفة في المواقع الرطبة. لذلك يحسن اجتناب الاماكن الرطبة واستعمال الاسمدة للمعدنية انحصار الازوتية التي تنشط الالياف والمواد الخضرية.

## ١٣٩٨٩ - سلطة حبيكة \* Marasmius perniciosis (S). Balai de sorcière du cacaoyer (F).

نوع من السلعة واسع الانتشار يكثر في البلاد الحارة. يركب بعض النباتات انحصار الكاكاو فيجيش الانسان والنواحي، وقد يصيب البئر فيطهرها || مظهره الخارجي فطر صغير القد. ساقه اسطوانية تحمله جوفاء طولها نحو ١٠ م. لونها الى الصفرة الزاهية. ارسوت قلنسوية قطرها من ٢٠ الى ٢٥ م. لونها الى الجوة || يكافح باقتلاع وحرق الاجزاء الموبوءة وينفخ الاجبار باسفل بورود بد طلي الجروح بالمستيلك الوائي.

## ١٣٩٩٠ - سلعة

سلف البقرة والشاة : خرج ناباها وهي سالخ. والسلوغ في ذوات الاطلاق بمنزلة البزول في ذوات الانصاف لانها اقصى استنابها. فوله البقرة اول سنة عجل ثم تبع ثم جلع ثم نفي ثم رباب ثم عديس ثم سالخ سنة وسالغ سنتين الى ما زاد. والشاة اول سنة حل ثم جلع ثم نفي ثم رباب ثم عديس ثم سالخ. ج. س. ع.

## ١٣٩٩١ - سلعة Alexan (F). Chestnut (E).

من ثواب او ألوان الخيل وهو الذي غلخت شقته.

## ١٣٩٩٢ - سلعة Pardreu (F).

السلف صغير الحجل ان كان ذكرًا اما الانثى قلقة.

## ١٣٩٩٣ - سلعة، ستغف، كرتب، كراب Scarifage

حرت سطحي بالسلفه تتبهر به ذرات التراب ولا تغلب.

## ١٣٩٩٤ - سلطات، كبريتات Sulfate (F).

اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

## ١٣٩٩٦ - سلطة التقدير Pouvoir discrétionnaire (F). Discretionary power (E).

هي السلطة التي لم يمين مسلكها بقاعدة قانونية تسيير عليها.

## ١٣٩٩٧ - سلطة القضاء Autorité de justice, Judicature (F). Authority of justice, Judicature (E).

هي السلطة المنوطة لقضاء بان يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال.

## ١٣٩٩٨ - سلطة قضائية Pouvoir judiciaire (F).

هي التي اسندت اليها ولاية القضاء.

## ١٣٩٩٩ - سلطعون \* Crabe (F).

السلطعون والسلعون والسرطان والخمسة اسماء شاملة تطلق على عدة حيوانات مائية او قازية من القشريات المشاريات الارجل.

## ١٣٩٩٩ - سلطعون \* Crabe (F).

سلطعون الصخر Poupart (F).

حيوان من القشريات يدعى بوبار، اطله.

## ١٣٩٩٩ - سلطعون نهري هورطان الهر، اطله.

سلع \* حلق Cissus (S).

Cisse (F). Sorrel-vine, Wild grape (E). Cissus-pflanze (D). Cisso (I).

جنس نباتات معمرة عروية عارشة من فصيلة الكرمايات. انواعه عديدة منها غليظة الساق كبيرة الحجم تمتد نحو سبعة امتار. ومنها متوسطة وصغيرة كسائر المعمرات. يستخرج من جنوبها عند حرها عصارة مشروبة نافعة تروى الغليل || اورلتها بيضيه او قلبية الشكل. نصلها قليل الزغب جيل الخضر الشاحب، منن الحافة. حوالقها حليلة الزغب مخمجة الاطراف. ازهارها صغيرة خضراء اللون. ثمارها عنبية صغيرة القد || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cissus quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cisse quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cisse quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cisse quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cisse quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cisse quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.

## ١٣٩٩٩ - سلعة Cisse quadrangularis (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stemmed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلع المداد العارلش الصمغ. مهد البلاد الحارة. يطول من ال ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراقه معتقة مرباعية الشكل، نصلها خلي البشرة ازغب الزناد والصلع والبروق || تسنها غرير المادة مر العلم يروي النطش.



سلطعون



سلع



سلعة المصان



بالخامض الكبريتي . تركيزه التجاري الموصوف يحوي ٤٠ أو ٥٠ ٪ من النيتروجين الصرف || يستعمل في مكافحة الحشرات علولاً بالامه بمعدل يراوح من ٥٠ الى ٢ ٪

١٤٠٠٢ - سُلْفَات Emprunt (F). Borrowing (E). السلفة والاستلاف هو القرض .

١٤٠٠٣ - سُلْفَات Sulfatage (F). Sulphating (E). هي المعالجة بالسلفات .

١٤٠٠٤ - سُلْفَات Sulfatage (F). معالجة الخمر بالسلفيت اي بالخامض الكبريتي .

١٤٠٠٥ - سُلْفَات Sulfurage (F). هي المعالجة بالسلفور وقد تحقن الآزوتية الزراعية بسلفور الكبريتون لقتله على الاوصام الجربوية والحشرات .

١٤٠٠٦ - سُلْفُور الكَرْبُون، كَبْرِيْطُور الكَرْبُون Sulfure de carbone (F). Sulphid of carbon (E). سائل طيار حريف لا لون له بخاره قتال للجراثيم والحشرات .

١٤٠٠٧ - سُلْفُوسِيَانُور Sulfocyanure (F). Sulphocyanate, Sulphocyanide (E). مادة جرسامية قوية في حريف الامونياك تقضي على الاعشاب والحشرات .

١٤٠٠٨ - سُلْفُورِيْتَات الامُونِيَاك Sulfonitrate d'ammoniaque

سماد كياوي ازوتي يحوي ٢٦ ٪ من الازوت منها ١٩,٥ ٪ ازوت امونياكي بلي الاخلال و ٦,٥ ٪ ازوت نيتريكي سريع الانفعال والتشليل .

١٤٠٠٩ - سُلْفِيْت Sulfite (F). Sulphite (E). ملح مركب من حمض الكبريت ومادة اخرى .

١٤٠١٠ - سُلْفِيْدِيَات Silphidés (F). راجع دقيقات .

١٤٠١١ - سُلْفُ \* Beta vulgaris (S). Poirée, Bette, Biette (F). Swiss-chard beet (E). Beisskohl, Beet, Gartenmangold (D). Bietta, Bietola, Costa (I).

نبات عشبي بقلي زراعي من فصيلة السرمقيات . قريب الشبه من الشونندر . جلوه وقته لبني و اوراقه قرصية الشجع ، كبيرة القده مستطيلة ، نضجها غليظ الفلج ، مائل البشرة ، شديد الخضار || يتكاثر بالبذر . انتاش يزوره يتم بشرة ايام وقابلية الانتاش تنمو نحو ٦ سنوات || يحصد في جميع المواعيد ويرغب في الآزوتية الدبالية اللتية بالنمصر الازوتي .

١٤٠١٢ - سُلْفُ الماء هو جار الهز ، اطليه .

١٤٠١٣ - سُلْفُ بَرِّي هو حمض المناع ، اطليه .

الناتجة عن تآلفه مع بعض المادان اخصها الحديد والنحاس والكلسيوم واليوتاسيوم والصوديوم اللع .

### ١٣٩٩٥ - سُلْفَات الامُونِيَاك

Sulfate d'ammoniac (F). Sulphate of ammoniac (E). سماد كياوي ازوتي ابيض اللون ، دقيق البرفلة ، يحوي نحو ٢٠,٥ ٪ من الازوت الامونياكي البلي الاخلال بسبب ترچبه وما يتخللها من تحاويل وانفعالات موضعية تسيرها ظروف التربة وخالها وسالها الحكمة || وهو من اشهر الامعدة الازوتية واقدما استعمالاً . يصلع ، ميدنياً ، لكافة النباتات وجميع الآزوتية التي لا تقتصر السابطة والثامنة (راجع دالغ) || يحسن استعماله باكراً قبل حاجة النبات اليه بخمسة او ستة اسابيع وذلك ليتسكن من اجتياز شئ التحاويل والاختبارات اللازمة لترچبه وقاھب تمثيله || ويجدد ايضاً طوره في التربة بعد ذره لتلا تسريه الاطمار او تجرفه مياه الري .

١٣٩٩٦ - سُلْفَات البُوتَاس Sulfate de potasse (F). Sulphate of potash (E).

سماد كياوي يتخلسن من كلورير البوتاس بعد معالجته بالخامض الكبريتي || وهو مسحوق ناعم اصفر اللون او ابيض يحوي من ٤٦ الى ٥٢ ٪ من البوتاس الصرف مع ٢,٥ ٪ من كلورير البوتاس || وهو سريع اللويان بالامه وسريع الانفعال والتشليل يصلح لجميع الآزوتية اخصها الفقيرة بالكلس (راجع بوتاس) .

١٣٩٩٧ - سُلْفَات الْحَدِيد ، كَبْرِيْتَات الْحَدِيد ، رَاجِ اخْضَر

Sulfate de fer, S. ferreux, Vitriol vert, Couperose verte (F). Sulphate of Iron, Green vitriol (E).

ملح متبلور اخضر اللون قعص العلم يلذوب في الماء الساخن . يستعمل في التطهير وفي مكانة بعض الامراض الفطرية اخصها الذنار والقصور واليرقان || ويستعمل ايضاً كمشاوي يقضي على اللسان والهيضان والشاء .

١٣٩٩٨ - سُلْفَات الصُودَا ، كَبْرِيْتَات الصُودِيُوم Sulfate de sodium, S. de soude (F). Sulphate of sodium, S. of soda (E).

ملح ابيض اللون متبلور مر المذاق شائع الاستعمال البيطري يسهل المدة جرحته تختلف باختلاف الحيوان .

١٣٩٩٩ - سُلْفَات الْكَلْسِيُوم ، كَبْرِيْتَات الْكَلْسِيُوم هو الجبس ، اطليه .

١٤٠٠٠ - سُلْفَات النُحَاس ، كَبْرِيْتَات النُحَاس ، رَاجِ اَزْرَق

Sulfate de cuivre, Vitriol bleu, Couperose bleue (F). Copper sulphate, Blue vitriol (E).

ملح متبلور ازرق اللون ، حريف العلم القعص ، يلذوب في الماء . تقاعله حاسفي يجرش ورقة الطرشل الزرقاء . يستعمل في مكانة معظم الامراض الفطرية وفي وقاية الامعدة والمساند والمسايمك من عثب الحشرات وقرضها .

١٤٠٠١ - سُلْفَات النِيكُوتِيْن

Sulfate de nicotine (F). Sulphate of nicotin (E).

سائل قلوي سام يستخرج من تن التبغ بعد معالته



سلق

\* ١٤٠٢٣ - سَلَكُوتٌ أَرْجَوَانِي \*  
Carabus violaceus (S). Carabe pourpre (F).

حشرة من السلكوت طويلة راوحي من ٢٥ إلى ٣٥ سم. ثوبها إلى السواد اللامع. ظهورها أسفع المراج. جانبها إلى الأخضر الأرجواني. تألف الجنائن والحدائق والأحراج. مسرحها الموسمي يستمر من أواخر الصيف إلى أواسط الشتاء. تفتقر جميع أنواع البرقات الخضراء والحزرون والبراق.

\* ١٤٠٢٤ - سَلَكُوتٌ بَهِي \*  
Carabus splendens (S). Carabe resplendissant (F).

حشرة من السلكوت طويلة راوحي من ٢٥ إلى ٣٥ سم. ثوبها إلى الصفرة الذهبية يعلوها موج أخضر. مسرحها يستمر طوال الصيف وأخريف. تألف الجنائن والأحراج تكثر في الأقاليم الجبلية. تفتقر الحزرون والبراق وتختلف الحشرات الدجوية.

\* ١٤٠٢٥ - سَلَكُوتٌ حَقْلِي \*  
Carabus arvensis (S). Carabe des champs (F).

حشرة من السلكوت طويلة راوحي من ١٢ إلى ١٨ سم. ثوبها إلى الزرق العابقة يعلوها موج أسفع. مسرحها الموسمي يستمر طوال الخريف والشتاء. تألف الحقول. تفتقر مختلف أنواع البرقات.

\* ١٤٠٢٦ - سَلَكُوتٌ مَذْهَب \*  
Carabus auratus (S). Carabe doré, Jardinier, Sergeant, Vinaigrier (F).

حشرة من السلكوت طويلة راوحي من ٢٠ إلى ٢٥ سم. ثوبها إلى الأخضر المذهب يعلوها موج زبرجدي سامع. زبائنها وأرجلها صناعية اللون. تألف الحقول والحدائق والبساتين. مسرحها يستمر من أوائل الربيع إلى أواسط الخريف. تفتقر الحزرون والبراق ويعظم احشرات الدجوية والجلمل.

\* ١٤٠٢٧ - سَلَكُوتِيَّات \*  
Carabidae (S).

Carabidés (F). Carabidae, Ground beetles (E). Laufkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الإيخنة. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد. معظمها كبير القد. اثابها سوية الألوان العابقة الالامعة. تأثيرها قوية. قرونها الاستثنائية خيطية. أرجلها طويلة. ارساغها خاصة العقل || تسرح في الليل وتبيل في النهار تحت الاجساد والاعشاب. جميعها من الحشرات النافعة، تفتقر الغضارة اعينها الحزرون والبراق والفسقيات.

\* ١٤٠٢٨ - سَلَكِيَّات \*  
Nematoda (S).

Nématodes (F). Nematodes (E). طبقة الديدان السلكية من شعبة الحيطيات تشمل العديد من الفصائل والانجناس والانواع منها الصفر والمذاب وغيرهما.

## \* ١٤٠٢٩ - سَلَمٌ

السلم مجموعة كواكب متتابعة أسفل من العانة عن يمينها.

\* ١٤٠٣٠ - سَلَمٌ \* نَبَاح \*  
Scalaria (S).

Scalare (F). Scalaria (E). جنس حيوانات بحرية من الرضويات مدليات الاربيل وفصيلة السلييات. انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في

\* ١٤٠١٤ - سَلَقٌ مُصَلَّقٌ \*، سَلَقِيَّةٌ، لَبْدَان \*  
Beta cicla, B. vulgaris foliosa (S). Bette à cardes, Bette-épinard (F). Leaf-beet, Egyptian chard beet (E). Ägyptischer beete, Ag. gartenmangold (D). Bietola foglia (I).

حرب من السلق البقل الزراعي يتميز بكبر اوراقه وغلاظه خلوصها وسماكته نصلها المالح البشرة الشديدة. الحفصرة || يحود في جميع الارربة البدائية المختلة الاندماج الفنية بالعصر الآزواني.

\* ١٤٠١٥ - سَلَقَان \*  
Loup (F). Wolf (E).

هو الذئب والأني سلقه. ج سلق.

\* ١٤٠١٦ - سَلَقِيَّة \*  
Perdreau (F). Young partridge (E). سُلَك

فرخ الجبل الذكر، والأني سلكه.

\* ١٤٠١٨ - سَلَكٌ حَدِيدِي \*  
Fil de fer (F).

Iron wire (E). الاسلاك الحديدية انواع منها لمساء تستعمل في تسديد الشبر وغيرها ونها شالكة تستعمل في اقامة الحواجز منعاً من الصدي.

\* ١٤٠١٩ - سَلَكَانٌ، دَجَاجَةُ الْحَرَاكِ \*  
Bonasa (S). Gélinoite (F). Hazelhen, Hazelgrouse (E). Hazelwild (D).

جنس طير من عارة الضرسيات. وفصيلة الطيوريات موطنه يمتد من شمال البلاد الاسيوية الى اوروبا وشمال افريقية الشالية. يتميز بقزقته الصغيرة وبصر منقاره. ثوبه إلى الخوخة لعمود رقعة سهياه وبياض وعلامة وسداه. طوله راوحي من ٣٥ إلى ٤٠ سم. الاثني اصفر قدماً من الذكر. قوته البرام والحبوب والنار. على اختلاف انواعها. يعيش ذكراً وأنثى. يدين في الارض يرتب افصوص بين الادغال البدة او بين الخفاش وفي ضاليل الصخور. اثناء تفحص من ٨ إلى ١٢ بيضة تحضنها وحدها || له نوعان السلكان الشائع وسلكان الشرق.

\* ١٤٠٢٠ - سَلَكَانٌ الشَّرْقِي \*  
Bonasa severtzowi (S).

Gélinotte d'Orient, G. des steppes (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والرقعة، موطنه شمال البلاد الاسيوية. يألف الاحراج والادغال.

\* ١٤٠٢١ - سَلَكَانٌ شَالِع \*  
Bonasa sylvestris, B. betulina (S). Gélinoite des bois, Poule des bois, P. des couardiers (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه متراكب الألوان والرقعة موطنه يشمل نصف الاقطار الاربوية وجبال افريقية الشالية. يألف الاحراج الكثيفة الظليلة.

\* ١٤٠٢٢ - سَلَكُوت \*  
Carabus (S). Carabe (F).

Carabus, Carabid (E). جنس حشرات دجوية مقترمة نافعة من فصيلة السلكوتيات. انواعه عديدة منتشرة في جميع الاقاليم الحارة والمختلة. اجسامها كبيرة القد. اثابها عابقة الألوان السوية. من ميزاتها اعاضة انها اذا ذعرت من شيء قلقت من شربها بسائل لاهب يكثر فيه الحامض السي || يرقاها مقترمة. اجسامها مبطلة تستدق عند اطرافها || اشهر انواعها ما يلي.



سَلَق مُصَلَّق



سَلَكَان شَالِع



سَلَكُوتِ اَرْجَوَانِي



سَلَكُوتِ بَهِي



سَلَكُوتِ حَقْلِي



سَلَكُوتِ مَذْهَب



سلم

١٤٠٣٧ - سلمون كليفورنيه ، سلمون كينات  
Salmo quinnat (S). Saumon de Californie, Quinнат (F).  
نوع من السلمون الرجل الجيد السنن رفب في مياه  
المناطق الدافئة . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم .  
ثوبه متراكب الالوان تنقل في ظهور الزرقه وتختف في  
بطنه الحمراء .

١٤٠٣٨ - سلمونيات  
Salmonidae (S). Salmonides (F). Salmonides (E).  
فصيلة اسماك من رتبة مفتوحات المثانات فيها السلمون  
والذرة والخلنج .

١٤٠٣٩ - سلمى  
Stellaria (S). Stellaire (F).  
جنس نباتات عشبية برية حولية وبحولة ومعمره من فصيلة  
القرنفليات . انواعها المعروفة عديدة اصطلحها معظم اقاليم  
البلاد المعتدلة الحارة || سوقها خلية الحاد ، فراءه .  
اوراقها لانسانية الازتكاز ، منها المتعاقبة والمتعاقبة ، ومنها  
المعتقة واللائحة والقلبية النصال والسانية والرعية . ازهارها  
قردية او عكوكية التجميع .  
اشهر انواعها :

سلمى وسطى ، حشيفة القراز  
S. Media (S).  
سلمى زيبا ، حشيفة القراز المرشبة  
S. pubescens (S).

١٤٠٤٠ - سلميات  
Scalariidae (S). Scalaridés (F). Scalaridés (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل  
اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد  
منتشرة في جميع بحار العالم . جميعها مفترسة . ملجئها  
الحياطي جماعي ، جماعاتها قليلة العدد || اصداؤها متباينة  
الاجسام ، محلزنة ، يكثر فيها الشكل المردئي || اعرف  
اجناسها السلم .

١٤٠٤١ - سلنوغرافية  
Sélénographie (F). Selenography (E).  
وصف القمر ورمحه

١٤٠٤٢ - سلنوب  
Longilligne (F). Longiline (E).  
نعت تعريفي يوصف به الطول في الحيوانات الداجنة .

١٤٠٤٣ - سلوت  
Scelotus (S). Scélotus (F). Scelotus (E).  
جنس حيوانات زساقنة من الطهاه وفصيلة الستقوريات .  
انواعها المعروفة عديدة . اصطلحها فسيحة تمتد من افريقية  
الاستوائية الى الشرقية وجزيرة مدغشكر || اجسامها  
صغيرة ، دقيقة ، عادمة الاعتاق . رؤوسها قصيرة .  
قوائمها شديدة الصغر ومن الانواع من لا قوائم له . انوارها  
سوية الالوان يكثر فيها الكتفي الاسمر الاسف || قوتها  
الذباب والحوام والديدان .

١٤٠٤٤ - سلور \*  
Clarias (F). Silurus, Sheatfish (E).  
جنس اسماك نهريه من فصيلة السلوريات . انواعه نحو  
١٢ معظمها من اسماك مياه البلاد الحارة . جميعها مغلظحة  
الرأس ، مستطيلة الشكل ، عادمة الحراشف || اشهر  
انواعه سلور العامسي والبربور والابز والبياسف والشلبة  
والقرموط .



سلور

جميع بحار العالم . جميعها مفترسة قوتها الرخويات والدويبات  
الصغيرة || اجسامها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر .  
اصداؤها سلبية ، لامعة ، مردنية ، محلزنة ومعددة . تحفدها  
ينلو كالمرق المستعبر .

١٤٠٣١ - سلم ، سلمام  
Acacia flava (S). Mimosa blond, Acacia blond (F).  
نوع من السنط وهو شجرة من الغشاء بميزة الشوك الاخاد .  
تكثر في البادية . ورقها ينسج القزط يصلح للداغة .  
الواحدة سلمه .

١٤٠٣٢ - سلم التخرجة ، عكس التخرجة  
Dénitrification  
تحول يحصل في الارية الرطبة بتأثير ميكروبات خاصة  
تحول النيترات الى نيتريت فامونياك فازوت . وهو بذلك  
يكون عكس التخرجة وفيه ضرر كبير لان النيترات  
اسهل واقرّب تحميلا وانتصافا من النيتريت .

١٤٠٣٣ - سلمون ، صمون ، سمك سلمتان  
Salmo (S). Saumon (F). Salmon (E).  
جنس اسماك بحرية - نهريه مفترسة لاحة من فصيلة  
السلمونيات . انواعه نحو ٥٠ . جميعها كبيرة القند قليل  
كامل نموها بمرر ست سنوات حيث يراوح طولها ، بالنسبة  
الى انواعها ، من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || والسلمون من  
الاسماك التي تعيش وتتكاثر في المياه العذبة وقد تعيش في  
المياه المالحة دون ان تتكاثر لانها لا تسر في البحر .  
اما الابداء في المياه العذبة فتكون صغيرة القند متوسطة الجودة .  
وهي يجالها الطبيعة ترسل الى المياه العذبة في التشارين  
وتسرا في الكواكين ثم تعود الى البحر بعد نفق سرتها  
وذلك في اواخر شباط . اما صغريها فيقيم في الماء العذب  
ردينا يبلغ الحولين فيرسل اذ ذاك الى البحر ويعيش  
عيشة جنسه وعاداته الفطرية في التجوال والتسرعة || اشهر  
انواعها ما يتبع .

١٤٠٣٤ - سلمون البحيرات  
Salmo lacustris (S). Saumon des lacs (F).  
نوع من السلمون الآبد المتوسط الصنف والقد . يعيش  
في المياه العذبة . يبلغ كامل نموه بمرر ٥ سنوات . طوله  
يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم .

١٤٠٣٥ - سلمون البنايع  
Salmo fontinalis (S). Saumon de fontaine (F).  
نوع من السلمون الآبد المتوسط الصنف والقد . يعيش  
في مياه البنايع العذبة الباردة . طوله يراوح من ٥٠ الى ٨٠  
سم . يبلغ كامل نموه بمرر خمس سنوات .

١٤٠٣٦ - سلمون سلار \*  
سلمون معروف  
Salmo salar (S). Saumon commun (F). Common salmon (E).  
نوع من السلمون الرجل الكبير القند طوله ، عند اكبال  
نموه ، يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبه متراكب  
الالوان . ظهوره اودوازي يملو موج ازرق . جانباه  
الى الرتبة الفضية . بطنه الى الحمرة || اثناء تسرا  
بظرف ثمانية ايام من ٢٠ الى ٢٦ ألف سرات تنفق بعد  
اربعة اسابيع ثم تتحور وتسلخ وتبلغ كامل نموها النوي  
بمرر ست سنوات .

السرة تنطفل على مكن الحرشيات ويدبائها اغصها دودة ورق القطن والدودة القارضة .

#### ١٤٠٥٥ - سِلُورَةُ الطِيَارِيَّات \*

Inostemma bosci (S).

حشرة صغيرة من السلويات دقيقة الجسم ، مستطيلة الأفراس . طولها يراوح من ١ الى ٢ م. تنطفل على مكن الطيارات وتقتضي عليه .

#### ١٤٠٥٦ - سِلُورَةُ الْقَاسِيَاء \*

Microphanurus semistriatus (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجثة القصيرة طولها يراوح من ١ الى ٢ م. تنطفل على مكن جميع انواع القاسياء .

#### ١٤٠٥٧ - سِلُورِيَّات \*

Scallionidae (S). Scellionidae (E).

فصيلة حشرات ناعمة من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، غليظة الرأس والبطن ، الزوايا الى السرة العادة المواج || تنطفل هي ورقاتها على مكن العناكب وحشريات الاجنحة وعلى بعض الديدان والبرقات .

#### ١٤٠٥٨ - سِلُورِيَّات \* هي الصفر نوع من التلق ، اطليا .

Amnios, Poche d'eau (F).

Amnion, Bag of water (E).

السل الكيس الذي يكون فيه الولد حين يخرج من الرحم ، وهو الغشاء القلبي الداخلي الذي يلفئ الجهر اي الجنين .

Lyre (F). Lyra (E).

#### ١٤٠٦٠ - سِيلِيَّات

السيلاق كوكبية نجوم شمالية الموضع مشهورة باسم قيشارة ، اطليا .

Gymnanthe (F).

#### ١٤٠٦١ - سَكِيْب \*

نمت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته تتكون من الاعضاء التناسلية دون سواها ، اي دون فصل وبيلات ...

Romeria (S).

#### ١٤٠٦٢ - سَكِيْب ، رَمِيْرَة

Razmeria (F). Razmeria (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة اخشاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلاطها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سقها قراء ترتفع من ٢٥ الى ٤٥ م. اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية التفرع . ازهارها طرفية ، فردية ، متعددة الحجم او كثيرة ، قرزية اللون او بنفسجية . اشهرها :

R. orientalis (S).

#### السلح الشرقي

R. hydrida (S).

#### السلح النقلي

#### ١٤٠٦٣ - سَكِيْبَة هي القرفة الصينية . اطليا .

Huile de noix de muscade (F).

Oil of nutmeg tree (E).

دهن جوز الطيب .

Scyllidae (S).

#### ١٤٠٦٥ - سِيلِيدِيَّات \*

Scyllidae (F). Scyllidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفنقيات القرشيات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم

Clarias orontis (S).

#### ١٤٠٤٥ - سِلُورُ العَامِي

Clarias de l'Oronte (F).

ويسمى السك الاسود . نوع من السلور يكثر في الباصي . يطول نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السرة الخضراء . لحمه عادي الصنف ، يذلل المذاق .

Silure commun (F).

Common silurus (E).

#### ١٤٠٤٦ - سِلُورُ الفرات

هو الجري ، اطليا .

Clarias du Nil

#### ١٤٠٤٧ - سِلُورُ النيل

هو القرموط نوع من السلور يكثر في النيل .

#### ١٤٠٤٨ - سِلُورُ جَنْجِيْس \*

Silondie du Gange (F).

سمكة نهرية من مفتوحات الخانة وفصيلة السلوريات . اصلاطها نهر الجنسي اي الفنج || جسمها اهليجي الشكل ، كبير القد ، متدل التبطيع ، يطول نحو ٢٠٠ سم . رأسها صغير الجرم ، مخرومي الشكل . غطتها كبير التفلق . عينها كبيرتان ، ماحتان . زعنفتها الظهرية الاولى متدلة الجسم اما الثانية فتشديدة الصغر . زعنفتها الذيلية فارقة . ثوبها الى الريدة السمره اللفضية المواج || لحمها كامن الصنف ، مأكول .

Siluridae (S).

#### ١٤٠٤٩ - سِلُورِيَّات

Siluridae (F). Siluridae, Catfishes (E).

فصيلة الجري والسلور وهي من الاسماك المدية الحراشف .

#### ١٤٠٥٠ - سِلُورُس \* ، نَابِطُ ، نَبْطَسْ

Nepenthes (S). Népenthe, Népenthes (F). Nepenthes, Pitcher plant (E). Kannenstrach (D). Nepente Pianta da brocche (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السلويات . انواعه نحو ٣٠ مهدا البلاد الحارة . جميعها عارشة برية وردينية . اوراقها متعاقبة سانية التصل المستطيل الذي ينتهي بحائق يطول قدره ثم يتطور ويتشور عند طرفة فيصبح كالجراب الجالس يطلو غطاء يلفق ويفتح عند الانقضاء مجتمع فيه رحيق سكري حامز لزج تفرزه غددة خاصة لا تجذب الحشرات فاذا ما دخلت الحشرة لا تضاف الرحيق الزنقت في السائل وانطبق عليها النطاء فتفرق وتحتل وتتصل على غذاء يمتصه النبات || ازهارها سنبل او عكوكلي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، ثنائية المسكن || يقال ان منافعها الطبية عديدة .

Nepenthaceae (S).

Nepenthaceae (F). Nepenthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللفلقتين تشمل جنس السلوس دون سواه .

Le Lévrier, Chiens de chasse (F). Canes Venatici (E).

السلبيان كوكبية نجوم شمالية الموضع . مركزها بالقرب من الذب الاكبر . نجومها عديدة اميزها من المرتبة الثالثة . وهي تشتمل على سديين لولبيين قريبا الشبه بكلي سيد .

١٤٠٥٣ - سِلُورُ

هو سيليولات الفينيل يستعمل مطهراً للأدماء .

#### ١٤٠٥٤ - سِلُورَةُ الْحَرْشِيَّات \*

Telenomus bombycis (S).

حشرة صغيرة من السلويات طولها مليمترو واحد لونها الى



سِلُورُ جَنْجِيْس



سلوس



سلوة الحرشيات



سلوة الطيارات



سلوة القاسياء

أغصانها بجار البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها ورشمة الشكل . تتميز بأوراقها السفلية الإبركاز وباستطالة زعانفها اللدلية || أشهر أنواعها الدقولة .



سليوتوس

١٤٠٦٦ - سليوتوس \* ، حشيشة القتلىويل  
Scleranthus annuus (S). Scléranthus, Gravelle (F).  
Annual knawel (E). Sommarknävel, Wilder knävelle (D). Scleranto, Centigrani (I).

عشبة برية حولية من فصيلة الترنفليات . ساقها ليفية منتصبة . أزهارها لائفة متقابلة غطية خمرزية . أزهارها خشوية ، صغرية القدة ، عادة التوجع . أزهارها صغرية ، التجميع أبلي وامي الإبركاز .

١٤٠٦٧ - سليوسيوم \*  
Sclerotium

جنس فطور مجهرية من الفينيات . يركب الأعضاء النباتية الدعامية البايمة وقد يصيب الأوراق في ظروف خاصة . يتميز بشعيرة الاسود اللون ، الكموري الشكل ، المتأصل الأطراف والتجميع || أنواعه قليلة أعرفها الثلاثة التالية .

١٤٠٦٨ - سليوسيوم الزرع \*  
Sclerotium costantini (S).

فطر مجهرية يركب الحنطة والشعير فينبه إلى نموها . مظهره الخارجي يقع صغرية مستطيلة لاقامية الشكل والتجميع ، سواد اللون ، تركيب المصنف والامحاد فتفرح البشرة والنسيج || أفراده زعيدة لا تستوجب المكافحة .

١٤٠٦٩ - سليوسيوم الزئبقيات \*  
Sclerotium cepivorum

فطر مجهرية يركب بعض النباتات الزينية أغصانها يصل والثوم || مظهره الخارجي نواس غلي أبيض اللون تعلو بثور سود مستديرة صغرية . يركب القرص وقشور الاسفاط الخارجية دون أن يؤذيها .

١٤٠٧٠ - سليوسيوم التجليات \*  
Sclerotium rhizodes

فطر مجهرية يركب بعض التجليات الكلالية فيؤذيها . مظهره الخارجي بثور مستديرة سواد اللون . طعمها نحو ٢ م . تركب السوق والأوراق فتبدو كأنها عاقلة بها . أضرارها زعيدة وقد تصعب جسيمة فيا لو سم المرابي لانه يطلع بالانتاج الخصري || يكالغ بحش الكلا ويتغير أو تفصح المرابي ياحد الفواظير القلعة المرتكرة على الكبريت والنحاس .

١٤٠٧١ - سليط  
Hulle (F). Oil (E).

هو الزيت وقيل هو كل دهن عصر من حب .

١٤٠٧٢ - سليطية \*  
Thielaviopsis

جنس فطور مجهرية من الدغيات وفصيلة الملميات . أصانها سطحية ، تكانه يفضية تحضن ثمان بوغات مستطيلة وسيدة الخلية ، شفافة || أنواعه المؤذية قليلة أعرفها سليطية بازيكولا .

١٤٠٧٣ - سليطية بازيكولا \*  
Thielaviopsis basicola (S).

فطر مجهرية يصيب عدة نباتات أعصانها البتغ والقطن والسليم والبيغونية وبخور مريم والمحاض والخمض والفاصوليا والبنفسج || يتطفل على النباتات النحيلة والضعيفة في

١٤٠٧٤ - سليق  
Blitum (S).

Bliton, Euxole (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية أو معمرة من فصيلة السرمقيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || ساقها قرعاء ، خشوية عند الأنواع المعمرة . أوراقها متعاقبة ، شبه قلبية النصال ، عاقبة الخفسار . أزهارها صغرية ، يضاء اللون أو وردية أو أرجوانية || تنموها ربيعي .

١٤٠٧٥ - سليق شالك  
Emex spinosus (S).

Emex épineux (F).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة السرمقيات . ينبت طوعياً في بعض فضاء وبجبال المقلب البحري من لبنان .

١٤٠٧٦ - سليقية  
Caractère intrinsèque (F).

Intrinsic character (E).

هي الصفة الطبيعية الميزة . ج سلاق .

١٤٠٧٧ - سليقة \*  
Pygope

جنس عظام من فصيلة السليليات . أنواعه قليلة العدد . أجسامها دقيقة مستطيلة . أوثابا إلى السرة البتراء تعلوها رقة سوداء نظامية تكثفها من القطن إلى طرف الذنب . رؤوسها مغاطسة غليظة الحوافش || موطنها البلاد الحارة تعيش بين الحجارة وتحتمها . قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها . تفيد الزراعة .

١٤٠٧٨ - سليلوز ، سليوس  
Cellulose

هو القسم الخشبي الصلب في النبات . وهو من المركبات اللالائية .

١٤٠٧٩ - سليليات \*  
Pygopodidae (S).

Pygopodidés (F). Pygopodidae (E).

فصيلة حيوانات زعنفة من رتبة البطليات . أجسامها وأنواعها عديدة . أجسامها دقيقة مستطيلة . حوافها فلسية متراكبة . أرجلها ثنائية ، زعنافية الشكل ، صغرية القدة . رؤوسها غليظة مغاطسة . أذنانها نحلة . قوتها الحشرات والحوام . أشهر أجناسها السليلية .

١٤٠٨٠ - سليمتاني  
Sublimé corrosif (F).

Corrosive sublimatée (E).

زئبق مصعد أكال يعرف أيضاً بكلورودور الزئبق .

١٤٠٨١ - سليوتوس  
زئبق مصعد أكال يعرف أيضاً بكلورودور الزئبق .

١٤٠٨٢ - سليونيم ، سليوم  
Sélium (F).

Selenium (E).

معنيد جاد رقه الانسي ٣٤ ، ثقله النسبي ٨٤ ، ينصهر في ٢١٧° س . وهو يمثال الكبريت وإصاليته الكهر بائية تزداد مع الضوء الذي يكتسبه .

١٤٠٨٣ - سم ، سم  
Venin, Poison (F).

Venom, Poison (E).

هو السائل القوي الذي تفرزه بعض الزواحف كالقاضي . وهو كل مادة سامة منها كان مصدرها .



سليوسيوم الزرع



سليطية بازيكولا



سليط

Coque du Levant (F). ١٤٠٨٨ - سم السمك

Indian berry (E).

ثمرة السندبل بنقية الشكل صغيرة القد جنبها يحوي مادة قلووية ، حريفة ، مرة وبقية تدعى منيسبرمين (Ménispermine) ولها يحوي مادة جمالية سامة تدعى بيكروتوكسين (Picrotoxin) القليل منها يسمم اعصاب السمك ويقتضي على بعض الحشرات اخمصها القراد وللسمك وما اشبه .

Cotation (F). Quotation (E). ١٤٠٨٩ - سمينة

السمينة بيان سعر المعاملات والاسهم ، راجع تسمين .

Stomate, Pore (F). Stoma, Pore (E). ١٤٠٨٤ - سم

ج سام . والسمام هي المنافذ الطبيعية اي الثغوب الدقيقة الموجودة بين الخلايا الادمة في ورق النبات وصوته .

Micropyle ١٤٠٨٥ - سم

ثقب البيضة النباتية . ج سم

١٤٠٨٦ - سم الحمار هو الدفل ، اطليا .

١٤٠٨٧ - سم الحوت هو ثمرة القمرية .

١. في الاسكية للمدة للزراعة					٤. في الاسكية الخضراء					٦. في الاسكية الازرقية الطرية				
ماحية للمادة	أزوت	فسفوري	برتاس	كلس	ماحية للمادة	أزوت	فسفوري	برتاس	كلس	ماحية للمادة	أزوت	فسفوري	برتاس	كلس
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
كيب السمسم	٦,٦٠	٢,٥٠	١,١٠	-	خضير الراعي	٥,٥٣	٠,١٨	-	-	سبحوق الدم	١٢,٠٠	١,٠٠	-	-
كيب القطن	٤,٢٠	١,٧٠	-	-	ياقنة	٥,٩٠	٠,١٢	٠,٦٢	-	سبحوق القرن	١٣,٥٠	-	-	-
السوداني	٥,٠٠	٠,٦٠	-	-	فول	٥,٤٤	٠,٠٦	٠,٤٢	-	سبحوق اللحم	٩,٠٠	-	-	-
كيب القطن	٤,٢٠	١,٧٠	-	-	سليم	٥,٤٥	٠,١٣	٠,٣٨	-	سبحوق الخلد	٧,٥٠	-	-	-
كيب القطن	٥,٤٠	١,٨٠	-	-	شليم	٥,٥٢	٠,١٣	٠,١٥	-	بقايا السمك	٨,٠٠	٤,٠٠	-	-
كيب القطن	٤,٦٠	١,٤٠	-	-	زوس	٥,٥٠	٠,١١	٠,١٥	-	زوس الصفوف	١٢,٠٠	-	-	-
كيب القطن	٥,٦٠	٢,٠٠	-	-	نصج	٥,٤٠	٠,٠٨	٠,٣٨	-	الجراد	٤,٣٥	٠,٦٥	٠,٧٠	-
كيب القطن	٥,٦٠	٢,٠٠	-	-	ورق القطن	٥,٥٠	٠,٠٩	٠,٢٥	-	قلل القطن	٥,١٤	٠,١٥	٠,٠٦	-
كيب القطن	٤,٣٠	١,٦٠	١,٤٠	-	ورق صوف البطاطا	٥,٥٥	٠,٠٢	٠,٠٤	-	نجر العنب	١,٠٠	٠,٢٧	٠,٦٨	-

٢. في الاسكية الطرية					٥. في الاسكية العظيمة الجادة					٧. في بعض المواد النباتية الممكن استعمالها للتسميد				
ماحية للمادة	براد	جافة	أزوت	فسفوري	ماحية للمادة	أزوت	فسفوري	برتاس	كلس	ماحية للمادة	أزوت	فسفوري	برتاس	كلس
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
روث الخيل	٢٦,٢	٠,٥٩	٠,٣٨	٠,٤٢	كيب السمسم	٥,٥٠	٢,٦٠	١,٠٠	-	قش الحنطة	٥,٤٨	٠,٢٢	٠,٦٣	٠,٢٧
بول الخيل	١٠,٣	١,٥٠	-	١,١٢	كيب جزر الخلد	٣,٢٠	١,٢٠	٢,٣٠	-	قش الخرفال	٥,٥٦	٠,٢٣	٠,٦٣	٠,٤٣
خني البقر	١٦,٥	٠,٣٢	٠,٢١	٠,١٥	كيب السليم	٥,٠٠	٢,٨٠	١,٣٠	-	قش الشعير	٥,٦٤	٠,١٩	١,٠٧	٠,٣٣
بول البقر	٥,٢	١,٠٠	٠,٠٥	١,٦٠	كيب الكتان	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	قش الشليم	٥,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٦	٠,٣١
بر الغنم	٣٤,٠	٠,٧٠	٠,٨٦	٠,٣٣	كيب القطن	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	عصاة الحنطة	٥,٢٢	٠,٤٠	٠,٨٤	٠,١٧
بول الغنم	١٢,٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦	كيب القطن	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	عصاة الخرفال	٥,٦٤	٠,٢٢	٠,٤٥	٠,١٧
بر الماعز	٣٥,٠	٠,٩٥	١,٣٢	٠,٣٥	السوداني	٦,٥٠	١,٥٠	١,٣٠	-	عصاة الشعير	٥,٤٨	٠,٢٤	٠,٩٣	١,٢٥
بول الماعز	١٢,٥	١,٧٠	٠,٢٥	١,٨٧	كيب الخشخاش	٦,١٠	٣,٥٠	١,٠٠	-	عصاة الشليم	٥,٥٨	٠,٥٦	٠,٥٢	٠,٣٥
ذوق الحام	-	٣,٠٠	١,١٠	-	كيب الخشخاش	٦,١٠	٣,٥٠	١,٠٠	-	قش القطن	١,٣٠	٠,٦١	٢,٤٢	٠,٩٥
سلع الكداج	-	١,٣٠	١,٠٠	-	كيب القطن	٤,٥٠	١,٨٠	١,٠٠	-	قش السليم	٥,٥٦	٠,٢٦	١,١٣	١,١٧
ذوق البق	-	٠,٧٠	١,٥٠	-	كيب القطن	٤,٥٠	١,٨٠	١,٠٠	-	شمن اليابنة	١,٢٠	٠,٢٧	٠,٦٣	١,٥٦
ذوق الاوز	-	٠,٥٠	١,٠٠	-	كيب القطن	٤,٥٠	١,٨٠	١,٠٠	-	شمن الزوس	٠,٩٤	٠,٢٥	١,٧٧	٠,٩٧
براز الانسان	-	١,٦٠	٢,٦٠	٠,٧٠	لكنكشوط	٧,٦٠	٣,٣٠	١,٠٠	-	شمن القزل	١,٦٠	٠,٢٩	١,٩٤	١,٢٠
غواتو البيرد	١٢,٥٠	١٢,٥٠	١٢,٥٠	٢,٠٠	-	-	-	-	-	سرسس	٢,٤٠	٠,٤٥	٢,٤٢	٠,٥٦
غواتو النسل	٧,٠٠	١٨,٠٠	-	-	-	-	-	-	-	وزلا	٢,٥٠	٠,٢١	٢,٥٠	٠,٢٢

٣. في الاسكية الصفائية				
ماحية للمادة	حافض فسفوري	حافض فسفوري	حافض فسفوري	حافض فسفوري
%	%	%	%	%
مور غشقات عادي	من ١٤ الى ١٨ %	من ١٤ الى ١٨ %	من ١٤ الى ١٨ %	من ١٤ الى ١٨ %
مزوج	من ٤٠ الى ٥٠ %	من ٤٠ الى ٥٠ %	من ٤٠ الى ٥٠ %	من ٤٠ الى ٥٠ %
العظام	من ١٢ الى ١٨ %	من ١٢ الى ١٨ %	من ١٢ الى ١٨ %	من ١٢ الى ١٨ %
غشقات مرطب	من ٥٢ %	من ٥٢ %	من ٥٢ %	من ٥٢ %
غشقات الامونياك	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %
بازغشقات	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %
سكوري توماس	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %	من ٢٢ الى ٢٣ %

٨. في الاسمدة الأزوتية الطبيعية					٩. في الاسمدة البوتاسية				
ماهة المادة	بسموع	أزوت	أزوت	أزوت	ماهة المادة	برناس	حافض	فسفوري	كلس
%	%	%	اميتاكي	أزوت	%	%	%	%	%
إزنيكال	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	-	٣ % مغنيزيم	-	من ٤٩ إلى ٥٢	-	١٢ % كبريت (سلفات)
مونيترات	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	-	كلوريد البرناس	-	من ٤٩ إلى ٥٥	-	-
أوريل، بولة	٤٦,٠٠	-	٤٦,٠٠	-	سيلفيت	-	من ١٨ إلى ٢٢	-	٥٠ % املاح
برونات	١٢,٠٠	-	١٢,٠٠	-	كربونات البرناس	-	من ٥٢ إلى ٦٣	-	-
حريف الامونيكا	١٢-٢	-	١٢-٢	-	رصاد السرخس	٢٨,٠٠	-	-	٨,٧٥
سلفات الامونيكا	٢١,٠٠	-	٢١,٠٠	-	رصاد الخلع	١٦,٥٠	-	-	١٠,٢٨
فسفونترات	-	-	-	-	رصاد الزوال	٣١,٣٥	-	-	١٣,٤٠
الامونيكا	٢٦,١١	٦,٥٠	١٩,٥٠	٣ % كبريت (سلفات)	رصاد القطن والقران	٣٠,٠٠	-	-	١٢,٠٠
سليباته الكلس	٢٠	-	-	١٠,٠٠ % كلس	من ٨ إلى ١٦	١٦	-	-	٧,٠٠
كلوريد الامونيكا	٢٣,٠٠	-	٢٣,٠٠	-	رصاد الحور	١٥	-	-	٣٠
نيترات الامونيكا	٣٥,٠٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	-	رصاد الصوري	١٥	-	-	٣,٥٠
نيترات البرناس	١٣,٠٠	-	١٣,٠٠	-	من ٨ إلى ١٢	١٢	-	-	٦,٠٠
نيترات الجير	١٥,٥٠	-	١٥,٥٠	-					
نيترات الشيل	١٥,٥٠	-	١٥,٥٠	-					
نيترات الصودا	١٦,٠٠	-	١٦,٠٠	-					
نيترات بروناس	١٦,٥٠	٨,٢٥	٨,٢٥	٢٥ % بروناس					

١٤٠٩٥ - سيخاخ ، صيخاخ Canal de l'ouïe (F). سماد فسفوري مسحوق أسمر اللون ينتج عن ترسيب وتجفيف

Hearing duct (E).

١٤٠٩١ - سماعة Epigénie (F). سماد فسفوري مسحوق أسمر اللون ينتج عن ترسيب وتجفيف

Pseudomorphism (E).

١٤٠٩٦ - سماد بوتاسي Engrais (F). Fertilizer (E). سماد بوتاسي مسحوق أسمر اللون ينتج عن ترسيب وتجفيف

١٤٠٩٧ - سماد Engrais (F). Fertilizer (E). سماد بوتاسي مسحوق أسمر اللون ينتج عن ترسيب وتجفيف

١٤٠٩٧ - سماد Engrais vert. سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤٠٩٨ - سماد Engrais organique (F). Organic fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤٠٩٩ - سماد Engrais phosphaté. سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٠ - سماد Engrais phosphorique. سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠١ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٢ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٣ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٤ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٥ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٦ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

١٤١٠٧ - سماد Engrais chimique (F). Chemical fertilizer (E). سماد البهاد الفسفوري المتأني من إختار وتحليل النبات في

المسكن || اوراقه وتوابعه وعصاره سقوة تستعمل في عدة صناعات كالدهابقة والصبغة والطلاء || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

### ١٤١١٢ - سَمَاقُ الدَّبَاغِين \* ، تَمْتَم

Rhus coriaria (S). Sumac des corroyeurs, Roure des corroyeurs, Corroyère, Vinaigrier (F). Sumach, Tanner's sumach (E). Essigbaum, Gerbersumach (D). Sommaco, Scotano romano (I).

هو الساق المعروف المينول في البلاد اللبنانية السورية . شجيرة عابلة تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . فروعه زيا . اوراقها مركبة تمد من ٩ الى ١٥ ورقة نصفاها باحت الحفار خلي الصفة السفلى . ازهارها عثكولي كيف التجميع يطول من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهارها خضراء اللون . ثمارها بلسنية الشكل ، جزوية اللون ، خلية البشرة . زورها شديدة الصلابة معقولة || اوراقها داغية . سقوة ثماره من التوابل الحامضة المافضة المشهورة .

### ١٤١١٣ - سَمَاقُ الصَّبَاغِين ، عَرَبَر

Rhus cotinus (S). Sumac des teinturiers, Fustet, Arbres à perruque (F). Smoke tree, Wig tree, Venetian sumache (E). Echter perückenstrauch, Perückenstrauch (D). Sommacco à parrucca, Scutano, Rubione (I) .

شجيرة عابلة تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة . ورقها سنانية ذقنة . نصفاها عابك الحفار ، خلي الصفة السفلى . ازهارها تاجي الارتكاز هربي الشكل . اوراقها داغية وصباغية ، غضبا اصفر اللون .

### ١٤١١٤ - سَمَاقُ الطَّلَاء \* ، عَرَبَر

Rhus vernix (S). Sumac vernis, Bois chandelle (F). Lac sumach (E). Lackbaum, Firnisumach (D). Sommaco d'India (I).

شجيرة عابلة تملو نحو ٦ امتار . ساقها ملسة الساء . اوراقها مركبة تمد من ٥ الى ٢١ ورقة نصفاها سنن الزام الاخير ينو عابك الحفار اللامع ثم ينحرف الى الجذوة وينتهي في اولل الحريف بالحمرة البرتقالية || ازهارها ابطي . ازهارها صفراء اللون ، خلية البشرة . ثمارها بلسنية تملو نحو ٤ سم . زورها ملسة . ثمارها واوراقها وعصارها قلوية المادة جعالم اروني || عصارها غزيرة ، تستخرج بالخر ، يصنع منها اللك الصيني الفاخر الصنت .

### ١٤١١٥ - سَمَاقُ اللِّك \* ، رُحُسُ الصَّنِيفُوسَا

Rhus verniciflua (S). Sumac à laque (F).

شجيرة عابلة تملو نحو ١٠ امتار . ساقها ملسة الساء . اوراقها مركبة تمد من ٧ الى ١٣ ورقة نصفاها يطول نحو ١٦ سم . ازهارها هربي الشكل عثكولي التجميع . ازهارها الى الصفار الباهت || يستخرج من ساقها بالخر عصارة صمغية لزجة يصنع منها اللك الياباني الفاخر الصنت .

### ١٤١١٦ - سَمَاقُ جُحَالِي

Rhus toxicodendron (S). Sumac vénéneux, Arbre du poison (F).

جنية عارضة عابلة تطول نحو ٥ امتار . اوراقها مركبة ثلاثية . نصفاها قلبي الشكل ، ذرب المعص ، اذنب الصفة السفلى . ازهارها عثكولي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها مجسم وشكل المحص ، ملساء البشرة ، صفراء اللون || ثمارها جعالية تحوي بعض المواد القلوية الفعالة .

والانتاج الوافر الاثام || لذلك فالاصمة الكجارية عديدة لانها وضعت ، ولا تزال توضع وترقى مع العلم والتقنية ، سدا لحاجة النبات وظروف التربة والاعلبي || تقسم الاصمة الكجارية الى ثلاثة عناصر رئيسية : الازوت وحامض السلفور والبوتاس . ثم تلبها العناصر الثانوية كالكلس والمغنيزيوم والكبريت واليورق ، الخ .

### ١٤١٠٢ - سَمَادُ مُرَكَّب (F). Engrais composé (E).

هو كل سماد سوي كامل او بعض العناصر الرئيسية وقد شاع استعمال الاصمة المصنوعة المركبة نظرا لما تحققة من اقتصاد ملموس ومن نتائج طيبة .

### ١٤١٠٣ - سَمَادُ مُعَدَّنِي (F). Engrais minéral (E).

هو كل سماد مصدره مبادئ الارض يستخرج ويستخلص في سبيل التربة والنبات .

### ١٤١٠٤ - سَمَادُ وَسِيط (F). Engrais catalytique (E).

هو السداد الكجاري المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطس فعايلة الحمية نباتاتها المزروعة دون ان تغتلى منه || الاصمة الوسيطة عديدة جبعها من العناصر الثانوية والثالية . اشهرها الكبريت والمغنيزيا واليورق المنيزا .

### ١٤١٠٥ - سَمَكَار (F). Catalytic fertilizer (E).

هو السداد الكجاري المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطس فعايلة الحمية نباتاتها المزروعة دون ان تغتلى منه || الاصمة الوسيطة عديدة جبعها من العناصر الثانوية والثالية . اشهرها الكبريت والمغنيزيا واليورق المنيزا .

### ١٤١٠٦ - سَمَكَارُ الحُفَر (F). Sismyrium (S).

هو السداد الكجاري المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطس فعايلة الحمية نباتاتها المزروعة دون ان تغتلى منه || الاصمة الوسيطة عديدة جبعها من العناصر الثانوية والثالية . اشهرها الكبريت والمغنيزيا واليورق المنيزا .

### ١٤١٠٧ - سَمَكَارُ شَالِك (F). Sismyrium (S).

هو السداد الكجاري المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطس فعايلة الحمية نباتاتها المزروعة دون ان تغتلى منه || الاصمة الوسيطة عديدة جبعها من العناصر الثانوية والثالية . اشهرها الكبريت والمغنيزيا واليورق المنيزا .

### ١٤١٠٨ - سَمَكَارَةُ \* ، تَوَدْرِيح ، فِجَلُ الجِمَالِ قُسْطُ بَرِّي ، سِيسْمَبْرِيُون

Sisymbrium (S). Sisymbrium (S). Hedge mustard (E). Wegerauke (D). Sesembrio, Rapino (I).

جنس نباتات عشبية برية سوية او معمرة من فصيلة الصليبيات . اوراقها متعاقبة مفرصة . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || انواعها عديدة اشهرها الباردة الحزنية اوراقها وازهارها طيبة نقيها فيه بحة الصوت .

### ١٤١٠٩ - سَمَكَارِي \* ، Chauliastmus strepera (S).

Canard chipeau, Chauliastmus, Chipeau bryuant, Ridenne (F). Gadwall (E).

طائر مائي وحيد الجنس والنوع من فصيلة البليات . طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه ابيض اللون . منقاره اسود . ساقه الى الحمرة البرتقالية . الانثى اصفر من الذكر . صدرها الى الصبغة المنشفة بالاسود || وهو من القواطع يحوي الشرق وادوية . يألف البيريات والناقع . قوته الاشعاب المتقنية والخرشار والدبدان والاسماك || يش عشه في المناطق بين الامل . اثناء تصع من ٨ الى ٩ بيضات تحضنها وحدها .

### ١٤١١٠ - سَمَاقُ جَوْفِي \* ، Nappe phréatique (F).

Water ground (E).

هو جملة المياه الجوفية الخزونة في الارض .

### ١٤١١١ - سَمَاقُ (F). Rhus (S).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الراتنجيات . انواعه عديدة . اوراقها معتقة ، كاملة النصل او مركبة ، ورية ، ثلاثية الوريقات او ريشية . ازهارها خاسية التركيب ، وسعية المبيض منها الحشوية والضرية وثنائية



سمارة



سماري



سماق الدباغين



سماق الطلاء



سماق اللك



## ١٤١١٧ - سَمَّاقٌ عَرَبِيٌّ ، عُرْبُ

Rhus pentaphylla, R. albidia (E). Sumac à 5 folioles (F). Hawthorn like sumach (E). Spitzdorn (D). Scotano albidia (I).

شجرة عروة تملون من ٤ الى ٧ اثمار. ساقها وفروعها شائكة. اوراقها مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات. نصلها مالمس البشرة، مستطيل الشكل، ثلاثي التستين. ثمارها حلوة الطعم مأكولة || اوراقها دوائية وصيافية لكنها متوسطة الصنف.

## ١٤١١٨ - سَمَّاقٌ عَطْرِى

Rhus aromatica (S). Sumac aromatique (F). شجيرة عابلة تملون من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. نصلها مسن الحافة عطري الرائحة عند الفك. ازهارها عثكولى مستطيل يسبق الازهار. ازهارها صفراء اللون || تزرع للترتين ترعر من اذار الى نيسان.

## ١٤١١٩ - سَمَّاقٌ كَاذِبٌ ، عَرَبِيٌّ

Rhus succedanea (S). Sumac succédané, S. bâdar (F). Tallow sumach, Japanese wax tree (E). Japanischer sumach, Wachsbäum (D). Sommacco da sego (I).

يكثر في الشرق الاقصى شجيرة تملون نحو ٦ اثمار. يستخرج من ساقها بالخر عصارة صمغية لزجة يصنع منها اللك الصيني المادي الذي يعتبر من الاصناف الوسطى.

## ١٤١٢٠ - سَمَّاقِي

Granit, Porphyre (F). Granit, Porphyry (E). حجر السباق وهو حجر صواني قاس اسود اللون او احمر او اخضر او موشج بالاحمر والاصفر والجذوي.

## ١٤١٢١ - سِمَاكٌ

السماك منزل من منازل القمر الشامية، ويدي السماك الاعرل لان ليس امامه نجم في حين ان السماك الرابع الذي لا يزنله القمر، يقيم كوكب يقال له راية السماك. وبعض العرب يحمل من السماكين ساقا الاسد || رقيب السماك يدعى بطن الحوت.

## ١٤١٢٢ - سِمَاكٌ اَعْرَلٌ ، سُبُلَةٌ

Epi, Spica (F). Spica (E). السماك الاعرل او السنبلة نجم نير من برج العذراء. مركزه بالقرب من اليه اذنا السماك الرابع. يبعد عن الارض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية.

## ١٤١٢٣ - سِمَاكٌ رَامِحٌ

Arcture, Arcturus (F). Arcturus (E). السماك الرابع نجم نير احمر من كوكبة العواء. مركزه بين فغدني البقار اي العواء. ويدي حارس السماء لانه لا يغيب حتى تحت اشمع الشمس. يبعد عن الارض نحو ٤٠ سنة ضوئية.

## ١٤١٢٤ - سَمَّالٌ

دود في الماء الناعم.

## ١٤١٢٥ - سَمَّالَةٌ \*

Psammobius (S). Psammobile (F). جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة السباليات. انواعها المعروفة تناهز المئة. بعضها من متحجرات الاراضي التافئة والبيض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم || اصداها شبه مظلة الشكل،

صغيرة القد. اجسامها صغيرة، ثنائية المتاعب الطليقة المستطيلة || تعيش في الاسماك والريال القليلة النور.

## ١٤١٢٦ - سَمَّالِيَّاتٌ

Psammobidae (S). Psammobidae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي التافئة || اجسامها صغيرة القد او متوسطه. جملة مستطيلة المتاعب. اصداها شبه مظلة الشكل، جملة الالوان المتراكبة الزاهية || اعرف اجناسها واشهرها السبالة والدماة.

## ١٤١٢٧ - سَمَّامٌ

Fourmi rousse (F). Reddish ant (E). السمام وتسمى الساسم هي النملة المفراة.

## ١٤١٢٨ - سَمَّامَةٌ ، خُطْفٌ ، حِفْصٌ

Cypselus (S). Martinet (F). Swift (E). جنس طير من فصيلة السباليات. انواعه المعروفة ٢٠ اجناسها جميعها من القواطع ذات المنيف والمشي. اجسامها مستطيلة. اجنتها خارقة الطول. اذنانها فارقة. ارجلها قصيرة مسرولة. مناتورها صغيرة. اشدانها واسمة || وهي من الطيور النافعة التي تقضي على الذباب والحمام واليهوض وبعض الحشرات الاخرى. تتميز بجريتها الشديدة الكائنة تحت السنبا. طيراتها فائق السرعة. تبنى اوكارها في اوقاب الصخور وتحت سطوح البيوت. اناتها تحضن وسدعا من يبيضن في ثلاث بويضات زهاء اسبوعين. اشهر انواعها ما يتبع.

## ١٤١٢٩ - سَمَّامَةُ الصُّرُودُ ، عُرْلٌ

Cypselus melba, Micropus melba (S). Martinet alpin, M. à ventre blanc (F). Alpine martin (E). من اكبر انواع السمامة. تأنف البلاد الجبلية، يكثر وجودها في الشرق الاذني وفلسطين. طولها نحو ٢٢ سم. ثوبها الى السواد الفحمي. بطنها ابيض، صدرها موشج بخط اسمر.

## ١٤١٣٠ - سَمَّامَةُ رَيْدَاءُ \* ، خُطْفٌ اَسْمَرٌ

Cypselus murinus, Micropus murinus (S). Martinet murin (F). Little grey (E). سمامة متوسطة القد طولها نحو ١٧ سم. ثوبها الى الريدة السمر. عنقها ابيض موطنها سواحل البحر المتوسط وافريقيا الشرقية والجزيرة.

## ١٤١٣١ - سَمَّامَةُ صَوْدَاكٌ \* ، عَوْقٌ

Cypselus apus, Micropus apus (S). Martinet noir, M. de murailles (F). Black martin (E). سمامة كبيرة القد طولها نحو ٢٢ سم. ثوبها الى السواد الاسفنج يطلو موج اخضر. زورها ابيض اطحل. تأنف جميع بلاد سواحل البحر المتوسط وقد تتوغل في الداخل.

## ١٤١٣٢ - سَمَّامِيَّاتٌ

Cypselidae (S). Cypselidés (F). Cypselidae (E). فصيلة الطيور السمام من الجوائم اللثرويات المناقير اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور المجاعة النظام، الصغيرة القد، المستطيلة الجناح، البريمة الحركة والحييفة الطيران || معظمها من القواطع. قوتها الحشرات والحمام.

## ١٤١٣٣ - سَمَّانٌ

Pomacentre symman (F). سمكة بحرية تدعى حائل سمان، اطلسا.



سَمَّالَةٌ



سَمَامَةُ الصُّرُودِ



سَمَامَةُ رَيْدَاءُ



سَمَامَةُ صَوْدَاكُ

١٤١٤٧ - **سَمْحَاق** (F). Periosteum (E).  
جلدية رقيقة لينة المادة تنشي العظام .

١٤١٤٨ - **سَمْحَاق ، عَارِض** Cirro-stratus  
نوع من الغيوم المتصلة البعد مظهرها طبقات متتامة  
أفقية الارتكاز وشاحية الشكل مستطيلة يتخللها بعض  
الكتل المائقة .

١٤١٤٩ - **سَمَخ** Germination (début) (F).  
هو بدء الانشاش . راجع انشاش .

١٤١٥٠ - **سَمَخَة ، صِرْم** Sous-variété (F).  
Sub-variety (E).  
السمة ج صمخ . هي أفراد من ضرب واحد تتميز بصفات  
خاصة جعلتها يتبند بعض الشيء عن الضرب المتحددة منه .

١٤١٥١ - **سَمَخِيَّة** Epigénèse (F). Epigenesis (E).  
السمية هي الطريقة المثبتة في تفسير تكوين الاجسام  
المركبة عند اضافة ما كان ينقصها أو ما كانت تفتقر  
اليه جرؤتها .

١٤١٥٢ - **سَمَد** Engraisser (F). To manure (E).  
استعمل السماد للتربة .

١٤١٥٣ - **سَمَر** Clair-obscur de la lune (F).  
السمر اسم ظل القمر .

١٤١٥٤ - **سَمَر**  
هو السند اللوبي اطلبه . وجاء عن ابي حنيفة : « شجر  
من المشاء وليس في المشاء اجود خشياً منه ينقل الى  
القرى تنفسي به البيوت » الواحدة سمرة . ويقال ان  
الشجرة التي يبيع تحبها رسول الله كانت سمرة .

١٤١٥٥ - **سَمَرَمَر \* ، سَمَرَمَد**  
Pastor roseus (S). Martin roseline, Etourneau  
rose (F). Rose-coloured starling (E).

ومن اسمائه ياذنجان وسلכות وسفرمادي . طائر قنبراني  
وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزراوير طوله نحو ٢٣  
سم . رأسه وطرقه وضعه وبناسه وزمكاه الى السواد  
الازرق المواج . سائر ريشه احمر وردي . متفاديه  
وبرجله الى الصفرة || موطنه البلاد الحارة يجمها في  
طلب الحبيب والمشي قوته الجراد والجنادب والقيايط .

١٤١٥٦ - **سَمَرُونِيَّة \* ، قَصَب مر**  
Simaruba (S). Simaruba (F). Simarouba (E). Simarubum  
(D). Simaruba (I).

جنس اشجار حرجية طيبة من فصيلة السمرويات . انواعه  
٦ منها امريكا الوسطى ، سوقها لماء الحام تملو  
من ه الى ٢٠ م . اوراقها متعاقبة بسيطة او مركبة .  
ازهارها عذكري التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها خشوية  
خامسة البتلات || اخشابها صلبة صفراء اللون فاشرة  
الصف . لحاء سوقها واغصانها مرة الطعم طيبة . نقيها  
يستعمل في مكافحة الحشرات . يحرق اوراقها ونقيها  
مضاد لسم الاقاعي وقد يستعمل في معالجة السلس وبعض  
الامراض الجلدية .

١٤١٥٧ - **سَمْرُويَات** Simarubaceae (S).  
Simarubacées (F). Simarubaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القلمات .

١٤١٣٤ - **سَمَانَاة** Caille (F). Quail (E).  
واحدة السمان طائر من التدرجيات . يقال سمانى الواحد  
ولجمع والواحدة سماناة جمعها سمانيات .

١٤١٣٥ - **سَمَانِي \* ، فِرِي ، قَتِيل الرعد ،**  
Coturnix (S).  
**مِرِينِي** Caille (F). Quail (E).

جنس طير من عسارة الحجلليات وفصيلة التدرجيات  
واحدته سماناة وفراية ، جمعها سمانيات وفري . انواعه نحو  
١٥ جميعها من القواطع مظهرها صثير . القد . طولها  
يرايح من ١٥ الى ٢٠ سم . اثوابها الى الصبهة الخطية  
يطوها تجذيع وتاذير وتوشيح وتوشج || تألف في تجولها  
الحقول المزروعة والمراعي والكروم قوتها الاعشاب والحبوب  
والفواطم || الانثى اصغر قدماً من الذكر واهي لوناً .  
تدثر انصومها في الادغال وبين الاعشاب الكثيفة  
ورصمها بالخشيش الناعم . تقنع من ٨ الى ١٥ بيضة  
تحضنها وحدها زهاء ثلاثة اسابيع .

١٤١٣٦ - **سَمْبَلُفُورَة مُعْتَمِدَة**  
Cymbalophore pudique (F).

هي الطنومة المحتشمة ، اطلها .

١٤١٣٧ - **سَمْت** Azimut (F). Azimuth (E).  
اصطلاح علمي فلكي يدل على نقطة وهمية واقعة فوق رأس  
الراصد تدعى سمت الرأس يقابلها نقطة اخرى تقع تحت  
قدم ذات الراصد تدعى سمت القدم او التنظير . وممتا الرأس  
والقدم هما قطبا دائرة الافق .

١٤١٣٨ - **سَمْت الرأس** Zénith (F). Zenith (E).  
فد التنظير اي سمت القدم .

١٤١٣٩ - **سَمْت القدم ، نَظِير ، نَظِير السَمْت**  
Nadir

١٤١٤٠ - **سَمَة** Stigmate (F). Stigma (E).  
الجزء الاقل من مدقة الزهرة وهو الذي يتقبل الوليع .  
وهي في الحشرات المفصلي قوية تنفسي سطحية مباشرة  
الاتصال بالانبوب التنفسي .

١٤١٤١ - **سَمَة** Nacte (F). Matting (E).  
سفرة من خوص تبسط تحت النخل وغيرها من الاشجار  
المترعة ليقط عليها ما تاتر منها . ج سم .

١٤١٤٢ - **سَمَة ، عِلَامَة ، وَتَم**  
Etiquette, Marque (F). Ticket, Mark (E).

١٤١٤٣ - **سِمَة الشَجَر** Martelage (sylv.) (F).  
Marking of trees (E).  
علامة يضعها مأمور الاجراع على بعض الاشجار الحرجية  
الجار قطعها .

١٤١٤٤ - **سَمْتِي** Zénithal (F). Zenithal (E).  
غضن بسمت الرأس .

١٤١٤٥ - **سَمَح** السمح : المود لا عقدة فيه .

١٤١٤٦ - **سَمَحَاج**  
السحاج والسَمَج : الفرس الطويل الظهر .



سماني



سمرور



سمرويه

اجناسها ٢٥ اما انواعها فكثيرة المد جميعها اشجار وشجيرات طيبة مهددا بالذلل الامزيكية الحارة .

١٤١٥٨ - سَمْتَمَرَة (F). Brokerage (E). Courtage (F). هي الاجرة التي يقبضها الوسيط لقاء صفقة سى بها وعملها .

١٤١٥٩ - سَمْتَسَقْ ، سَمْتَسَقْ هو السمسم ، اطلبه .

١٤١٦٠ - سَمْسَقِيَّات (F). Pédaliées, Pédaliées (F). Pedaliae (E).

سبط من الجسئريات تميز نباتاته بتكوينها المشبي وبثقل وزورها من الامين .

١٤١٦١ - سَمْسَم \* ، سَمْتَسَقْ ، جَمَجَان ، جَمَجَان Sesamum oleiferum (S).

Sésame, Jugeoline (F). Sesame, Gingelly, Gingili (E). Sesam, Ollinge (D). Sesamo, Giuggiolena (I).

نبات مشبي حولي زراعي دعي من السمسقيات . يزرع لزورده الزيتية التي يمتزج منها ، بالمعصر ، السبرج . للمائة كيلو من حب السمس نحو ٤٠ كيلو من السبرج المأكول و ١٢ كيلو من الزيت الصناعي و ٨٠ كيلو من الكعب || يملو السمسم من ٧٠ الى ١٥٠ سم .

جلوره وندية ، سوقه اسطوانية ، مخددة ، منتصبه ، فراء . اوراقه منقطة متقايلة اهليلجية . نصلها متنج الصفعة غائر العروق || ازهارها ابعية الارتكاز فردية . ثماره جراء مستطيلة ، رباعية المصاريع تحوي نحو ٢٠٠ زرة . والبرور صغيرة اللد ، مفلطحة ، اهليلجية ، لونها يختلف مع الفرب فيها الايض والثني والاسفر والاحمر والاسود || يبرد في جميع الارربة المتوسطة الاندماج والرطوبة . تذكر زراعتها في بلاد الشرق العربي والهند .

١٤١٦٢ - سَمْسَمَة ، سَمْسَمَة Formica rufa (S). Fourmi rouge (F). Red ant (E). Rota waldamiae (D).

السمسم هو النمل الاحمر الصغير .

١٤١٦٣ - سَمْسَمِيَّكَا هي الماطس السليل ، اطلبه .

١٤١٦٤ - سَمْع \* Lycion pictus (S).

Lycion, Loup peint, Cynhyène, Chien hyénoïde (F). Painted lycion, Cape hunting dog, Cynhyæna (E). حيوان مفترس سيد الجش والروع من فصيلة الكليات . قريب الشبه من الكلب واللثب والفع . موطنه البلاد الافريقية . جسمة مستطيلة تبلغ نحو ٩٠ سم . وذنبه ٣٨ سم . قوائمها رفيعة . اذناه كبيرتان جالستان . فوه ابيض اللون مجزوع ومبنيج بالاسود والايض والاسفر . اخلاقه شرسة . يعيش جماعات يروح عدد افرادها من ١٢ الى ٦٠ .

١٤١٦٥ - سَمْفُورِين \* ، جَمَبَة الدُرّ

Symphoricarpus (S). Symphorine, Arbre aux perles (F). Snowberry, Waxberry (E). Schne beere, Peterstrauch (D). Sinforicarpo (I).

جس من جنبات فناء برية ويزيد من فصيلة الهانجات اوراقها منقطة كاملة متقايلة عابطة بيضية الشكل . ازهارها سليل التجميع ، ابلي الارتكاز . ازهارها صغيرة اللد بيضاء اللون او وردية . ثمارها لحمية ، شبه كروية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١٤١٦٦ - سَمْفُورِين الصين

Symphoricarpus sinensis (S). Symphorine de la Chine (F).

جنية سريرية تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها صغيرة اللد . ازهارها تاجي . ازهارها مستطيلة المالحق ، جرسية الشكل ، بيضاء اللون || ثمارها الى الزرة يعلموا موج اسمر وخلة صهباء .

١٤١٦٧ - سَمْفُورِين المكسيك

Symphoricarpus microphyllus (S). Symphorine du Mexique (F).

جنية جادحة تملو نحو ٩٠ سم . اوراقها فضية دلفة الزام الاخير . نصلها جميل الخضار الزاهي ، مهدب المالحق ، ازغب الصفعة السفلى || ازهارها تاجي . ازهارها مستطيلة وردية . ثمارها الى الحصرة الباحة .

١٤١٦٨ - سَمْفُورِين شالكة Symphoricarpus albus (S). Symphorine commune (F).

جنية سريرية عديدة الفرب تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متوسطة اللد نصلها اخضر اعسر يملو موج اخضر . صفحت السفلى خلية البشرة || ازهارها وردية اللون ، زياء البشرة . ثمارها بيض .

١٤١٦٩ - سَمْفُورِين مُسْتَدِيرَة اُورَق

Symphoricarpus orbiculatus (S). Symphorine à feuilles rondes (F).

جنية سريرية قليلة الفرب تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها تطول نحو ٤ سم . نصلها مائل الصفعة العليا الخضار اللون ، ازغب السفلى || ازهارها وردية يملوا موج اخضر . ثمارها حرام اللون نيزية الشكل والقد .

١٤١٧٠ - سَمْفُورِين ، سَمْفُورِين ، كَسْبُودَة

Symphitum (S). Consoude (F). Comfrey (E).

جس نباتات عشبية برية معرة من فصيلة الحسيميات انواعها المرفوعة ١٥ منهاها الشرق الاذل وأروبه . اوراقها لائقة كاملة سنانية النصل . ازهارها نوري او عقودي التجميع . ازهارها صغيرة اللد انبوية || جيع انواعها طيبة اشهرها واغزرها مادة فعالة السفوفين الحزني .

١٤١٧١ - سَمْفُورِين مُخَزَنِي \* ، كَسْبُودَة مُخَزَنِيَة

Symphytum officinale (S). Consoude officinale, C. commune, Grande consoude (E). Common comfrey, Black-wort (E). Echter beinwurz, Walfwurz, Beerwurz (D). Consolida magglore (I).

عشبة سريرية معمرة تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . ارضها وشمية . مالها فراء فناء . اوراقها سنانية مستطيلة . ازهارها صغيرة اللد لونها يختلف باختلاف الفرب فيها البنفسجي والاريجاني والايض المشج بالاسفر . جلورها واذاها اوراقها طيبة معوية وتدخل في عدة مستحضرات .

١٤١٧٢ - سَمْسَقْ ، نَمُو ، شَمَاح Croissance (F).

سق النبات : علا ومال فهو سابق ومق . Growth (E).

١٤١٧٣ - سَمَك Plafond (F). Ceiling (E).

السمك هو السقف وسمك البيت سقفه .

١٤١٧٤ - سَمَك Paysanlago

غرز المسوك قرب الكركة لدعمها .



سم



سم



سمفون



سمفون مخزني

ماصحات. زعنفتها الظهرية تمتد من النظم الى طرف الذيل .  
زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || لحمها فاخر الصنف ،  
مغروب فيه .

١٤١٨٧ - سَمَكِي الشَّكْلِ  
Ichtyomorphe (F).  
Ichtyomorphous (E).

١٤١٨٨ - سُمْلَة  
Vase (F). Slime, Mud (E).  
ج سمل واسمال وسمال وسمول . بقية الماء والحماة في  
الحوض والندير .

١٤١٨٩ - سَمَلَقُ  
السلق : القفر لا نبات فيه وقيل القلاع المستوي الاسلس  
الاجراد لا شجر فيه . ج سلق .

١٤١٩٠ - سَمَلِيلَة  
Rhglio (S).  
Rhglio, Leptis (F). Rhglio (E).  
جنس حشرات من فصيلة السمليليات ورية ذوات الجناحين.  
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة  
والمعتدلة الحارة والباردة || اجسامها متفاوتة القد تطول  
من ١٢ الى ١٨ سم. رؤوسها كبيرة ، قليلة التكوير ،  
مستقلة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها  
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اغطائها مستطيلة . ملابسها  
صفيرة . كواسلها كبيرة . بطونها شبه مدنية الشكل .  
رواشنها كبيرة ، ملونة . ظنايبها قوائمها الوسطى والخلفية  
ثنائية المفاصل الحادة . اناؤها ملونة || تألف الحراج  
والغابات والحقايق . جميعها قانصة . يرقاها وانجها تعيش  
في التيرب والجلالة والاخشاب النخرة .

١٤١٩١ - سَمَلِيلِيَّات  
Rhagionidae (S).  
Rhagionidés (F). Rhagionidae (E).  
فصيلة حشرات من رية ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء  
استرالية . جميعها غائلة ، مقترمة || اجسامها متفاوتة  
القد ، تطول من ٦ الى ٢٠ سم. رؤوسها قليلة التكوير ،  
مستقلة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها  
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اغطائها مستطيلة . ملابسها  
صفيرة . كواسلها كبيرة . بطونها مستطيلة . رواشنها  
ملونة || اناؤها اكبر قدًا من ذكورها . يرقاها وانجها  
تعيش على ما تستطيع اقتراعه من دويسات ترحس في  
محيطها || اشهر اجناسها السمليلة والعريس .

١٤١٩٢ - سَمْنُ  
Beurre (F). Butter (E).  
سلا الزبدة المصنوعة بالمخاض الرية العتيبة .

١٤١٩٣ - سَمْنُ  
Engraisser (F). To fatten (E).  
بالغ في تذية الحيوان لتحسين لحمه وزيدته .

١٤١٩٤ - سَمْنُ نباتي  
Cocose, Végétaline  
هو دهن جوز الهند اي ثمر التاربيجل . وكل دهن مأكول  
مصدرة النبات .

١٤١٩٥ - سَمَنَّاكَة  
Griwière (F).  
Thrush aviary (E).  
مطيرة فيسيمة مشبكة الجوانب والسقف تستعمل لتربية  
السن .

١٤١٩٥ - سَمَك  
Poissons (F). Fish (E).  
حيوانات فقارية من خلق الماء تعتبر من ذوات الدم  
البارد ومن اذن الحيوانات الفقارية || رتبها وفصائلها  
واجناسها وانواعها نحو ٤٠٠٠٠ . تتميز باعضائها التنفسية  
المركزة على الخياشيم التي تقوم بعملية تبادل الغازات .  
وباضها الحركة التي تستند على الزناطف والمضلات .

١٤١٩٦ - سَمَك أَحْمَرُ هو النوع ، اطليا .

١٤١٩٧ - سَمَك التُرْسُ \*  
Rhombus (S). Turbot (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة المفلطحات . انواعه ٧  
موطنها الاقانس الاطلس والبحر المتوسط . جميعها كبيرة  
القد مستديرة مبطلة . طولها يراوح من ٤٠ الى ١١٠ سم.  
اثوابها الى الصبهة المختلفة الموج يعلوها نضج اسود .  
لحمها لذيق الطعم ، فاخر الصنف .

١٤١٩٨ - سَمَك الكَرَكِي  
Brochet, Esoce (F).  
Esox, Pike (E).  
هو الزنجور جنس اسماك نهرية كبيرة القد مستطيلة .

١٤١٩٩ - سَمَك سَلِيمَان  
هو السلون من الاسماك المشهورة .

١٤١٩٠ - سَمَك فَفِي هو الشحمة ، اطليا .

١٤١٩١ - سَمَك مُعَجَّر  
Ichtyolithe

١٤١٩٢ - سَمَك مُوسَى \*  
Solea (S). Sole (F).  
جنس اسماك بحرية من المسارات الجانيات الغوم انواعها  
ستة موطنها جميع البحار . اجسامها مفلطحة صغيرة  
القد او متوسطة . طولها يراوح من ١٥ الى ٦٠ سم.  
لحمها لذيق الطعم فاخر الصنف . اجودها اميقها ثجبا .

١٤١٩٣ - سَمَكَة  
Poisson' (F). Fish (E).  
راجع اسماك . ج سمك وسمك وسموك وسماك .

١٤١٩٤ - سَمَكَة بِشَمَاء هي الزنباية ، اطليا .

١٤١٩٥ - سَمَكَة طَائِرَة  
Poisson volant (F).  
Fish volant (E).

السكة الطائرة كوكبة نجوم جنوبية المقع مركزها تحت  
برج الدلو || عدد نجومها ١٧ . جميعها من المرتبة الخامسة  
وبا دوتها .

١٤١٩٦ - سَمَكَة مُوسَى الشَّالِيعَة \*

Solea solea, Pleuronectes solea (S).  
Sole commune, Perdrix de mer (F). Sol, Soul (E).  
نوع من سمك موسى . سمكة بحرية بيوض من فصيلة  
جانيات الغوم . اطائها منظم بجوار البلاد المعتدلة الحارة  
واغصها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك اسلم  
الغاف . عجبها عجمجي الحركة || جسمها مبسط الجرم ،  
الطليبي الثوزن ، يطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. تتميز

بالاستلقاء على الجانب الايسر مما يجعل عينيها في الصفة  
اليمنى من الرأس . فوجها بمائن المحيط التي تعيش فيه .  
الصفحة اليمنى الى الخلفي الزنبي الموج . الصفحة اليسرى  
الى الثيرة البيضاء . رأسها صغير الجرم ، انفس الخمل ،  
معتدل الشفق . فكها الاعلى يتقدم الاسفل . استناها  
صغيرة ، ذرية ، عديدة الصفوف . عيناها صغيرتان ،



سمك الترس



سمك موسى



سمكة موسى الشالعة

اللبن أو بيضاء أو زرقاء . ثمارها نورية عديدة البزور || تنويرها ربيعي .



سُمَّة

١٤٢٠٣ - سَمَنَيجَات \*  
Epacridaceae (S). Epacridae (E).

فصيلة نباتات جنينية وبجلية معمرة من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . منبتها بعض المناطق الجبلية من البلاد المتدلة الحارة || تنبت طويلاً في المراتع المتدلة الرطوية اغصانها الحراج والغابات || تتميز بكتلة ازهارها المتتامة على الاكافان . لونها الباهت الاليفي ثم الاحمر الازرقالي والازرق || اشهر اجناسها السمنة .



سُمَّة اللبن

١٤٢٠٤ - سَمَدَلْ جَمِيلَة \*  
Chloromyia formosa (S). Chloromyia belle (F).

حشرة من فصيلة اليرقاتيات . جسمها صغير القد . خلي القشار ، يطول من ٦ الى ٩ سم . رأسها مستدلل الجرم ، شبه مكور الشكل ، اسود اللون . عينها نافرتان قرمزيتان . ملابسها صغيرة . زياتانها منتصبان ، سداسيا الفصل . صدرها اخضر اللون ، جوي المالح ، مذهب الحمل . حفياتها مرسة . بطنها سداسي السكر ، اخضر اللون . ورشاتها متدلا اللحم ، حفيها اللون . قوائمها الى السرة || تألف المراتع التي تكثر فيها الاعشاب والنباتات البقلة || يوقتها دودية الشكل ، مراء اللون ، تمشي في الجلالة على المواد النباتية المنحلة .



سُمَّة جَوَالَة

١٤٢٠٥ - سَمَدَلْ \* ، سُرُفُوت ، سَمَدَلْ  
Salamandra (S). Salamandra (F).

ومن اسمائه روفون وسمنه وسندل . جنس ذوديات زساقنة من السمندليات . انواعه عديدة منها الارضية والقارزية والمائية . جميعها بليئة الحركة اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ١٧ الى ٢٥ سم . اولياها تخطف باختلاف الانواع فيها الاسود والاسود الاطمل والمذهب والاصفر . قوتها الحشرات والحوام || زم القماماء ان السندل يدخل النار ولا تحرقه وصيقة الامر ان جلج السندل يفرز مادة اكلالة قارضة تظلي النار الى حد نسفها . ج سمدل .



سُمَّة مطربة

١٤٢٠٦ - سَمَدَلْ أَسْوَد \* ، سُرُفُوت أَسْوَد  
Salamandra atra (S). Salamandra noire (F). Black salamander (E).

حيوان قازب سرلود من فصيلة السمندليات . جسمه مغلق الشكل ، وديعي القوائم ، يطول نحو ١٤ سم . عند الذكر ونحو ١٧ سم . عند الانثى . رأسه مستدير اعظم واسع الشدق ، كامل التسنين في الفكين . عيناه صغيرتان جاحضتان مكملتان الجفون . عتقه بالغة القصصر . ظهوره متتابع الاسقاط المتعاقبة . ذنبه غليظ القاعدة مستدق الطرف . قوائمه قصيرة وغلظية . قائمتاه الاماميتان رديعتا الاصابع طوله ١٢ سم .



سَمَنَيجَة

اما الخلفيتان فحاشيتا . ثوبه سوي اللون الاسود تملو ماجة بنفسجية || يبلغ كامل نموه بعمر اربع سنوات ويعيش نحو ٢٤ سنة . يألف المراتع القريبة من الماء . يسرح في الليل ويبعث في النهار بين الضجور وتحت الحجارة || قوته الحشرات واسرارها والديدان والزبوعيات || الانثى تضع على حافة الماء سديلان كاملا الاصلاء داما انحياشها الخارجية . ثم تدفع بها الى الماء حيث يقبضان دما حبة اشهر قبل ان يتسكنا من السير على الارض || يعتبر من القوارب النافعة .



سَمَدَلْ



سَمَدَلْ أَسْوَد

١٤١٩٦ - سُمَّة \* ، خَسَّ النعجة

Valeriana locusta, Valerianella olitoria (S). Valerianella potagère, Mâche, Bourslette, Doucette (F). Cornsalad, Milkgrass (E). Ackersalat, Echter Feldsalat (D). Valerianella, Dolce mangiare, Dolcetta (I). بقلّة زراعية من فصيلة النارديةيات . اوراقها ضمية فارشة مأكولة لزروع ويجود في جميع الاثرية المتدلة التركيب . تتكاثر بالبذر . بزورها صغيرة مستديرة تحافظ على قوة انبتها نحو ٥ سنوات .

١٤١٩٧ - سُمَّة \* ، سُمَّة

Turdus (S). Grive (F). Thrush (E). ج سمن وسمان وممان . جنس طير من الشحروريات . انواعه عديدة معظمها من القواطع . اجسامها مستطيلة ، رؤوسها صغيرة ، مناقيرها جالسة . ارساغها دقيقة عارية . اولياها تخطف باختلاف الانواع || قوتها الحشرات والبار . تدش اعشاشها في الاجار والادغال . اناتها تبش من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر . اشهر انواعه مائي .

١٤١٩٨ - سُمَّة اللبن \* ، سُمَّة الحدال

Turdus viscivorus (S). Grive draine, G. du gul, G. de brou (F). Mistle-thrush (E). طائر من اوابد الشرق الاوسط واروبة . طوله نحو ٢٢ سم . ظاهر ثوبه الى الصبهة السراء يعلوها موج جوي . زوره وبطنه وانيكه الى اليباض الاصفر تملو رفقة سراء || اناته تحضن مرتين في العام . تدش عشها في الصنوبر والسديان والزان .

١٤١٩٩ - سُمَّة مجوّالة \*  
Turdus mauvis (S). Grive mauvis (F). Fieldfare (E).

طائر من القواطع غثيف الطيران سريع . يحبب الشرق الاقصى واروبة وأفريقية الشمالية . يألف الغابات والحدائق والزارعين والبروج وصفات الاخر . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه ثوب سمنة اللب . بطنه الى اليباض الاغبر || ينش عشه في الادغال وفي العرص والقزاب والعصرية . اناته تحضن مرة واحدة || سربه كبير العدد يفوق المنه .

١٤٢٠٠ - سُمَّة مطربة \* ، سُمَّة شالعة

Turdus musicus (S). Grive musicienne, G. commune, Merle-grive (F). Song-thrush, Thrush (E). طائر من القواطع يحبب الشرق واروبة وأفريقية الشمالية والشرقية . طوله نحو ٢٣ سم . رأسه وعنته وظهوره وجناياه وذنبه الى الصبهة السراء يعلوها موج زبي . حذار جناحه الى الصفرة . زوره وجوشته وبطنه وانيكه الى اليباض الاغبر يملو تشبه اسمر || اناته تحضن مرتين في العام . ينش في الادغال والشجيرات الحرجية الكثيفة || وهو من الطيور الغريزة النشيطة التي تتعطل الانحان وتردها .

١٤٢٠١ - سَمَنَسُوس  
Sminthe  
اطلب عرانة .

١٤٢٠٢ - سَمَنَيجَة \*  
Epacris (S). Epacride (F).

جنس نباتات جنينية معمرة برية وفريزية من فصيلة السمنجيات . انواعها المروفة قليلة العدد منبتها بعض جبال البلاد المتدلة الحارة من المالح القدم || شكلها حبيب شبه بالنخس . سورها منتصبه فراء . اوراقها متعاقبة متناحية النصال الضيقة . ازهارها صغيرة مستطيلة الابواب حراء

## ١٤٢١٣ - سَمَنْدُودَةُ الْعَرَعَرِ \*

*Semanotus laursi* (S). *Sémanote du genre-vrier* (F). *Semanotus laursi* (E).

حشرة غاصلة خاشية من فصيلة القرنييات ورثية سفندات الاجنحة. تألف الجروود حيث يكثر العرعر والفران والايبل. خنافسها تعيش على الارواق والازهار وخوا المراريب. يرقاتها تركب الجروج والاضغان فتصيرها وتدرجها حتى الشكرير || جسمها متوسط اللد يطول من ٩ الى ١٢ سم. عند الذكر ومن ١٥ الى ١٨ سم. عند الانثى التي تتميز ايضا بذكر المزد. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والكوسل والزبان والبطن والجرازم ، اشجع الظهران الخفض بجدة متعرجة سوداء. رأسها معتدل الجرم. عينها كيرتات جاسطتان. زباناها خيطيان مهديان. ظهرها مستدير الطرف اللاحق عند الذكر || جيلها ثلاثي الخلو. تظهر الحشرة الجملة في نيسان وتبقى حتى ايلول. تسرح في النهار. تشاف بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع. ترز المكان بين القشور || البرقة عند الادراك تمام طيل من ١٨ الى ٣٠ سم. جسمها منحودب الظهر ، مبطل الملب ، قصير الرواجب النودية. ثوبها الى السرة يطولها موج اشجع وتبقى اسمر بعد من الخلفة الصدرية الثانية الى السكة البعلية قبل الاخرة. رأسها جزوي اللون يغور في الخلفة الصدرية الاول || طول الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما ينتهي عند مدخل آخر نفق احتفرته البرقة ضمن صلح من المواد النباتية المعجونة بالريال.

## ١٤٢١٤ - سَمَنْدُودَةٌ \*

*Scymnorhinus*,

*Scymnus* (S). *Scymnorhine* (F). *Scymnus* (E).

جنس اسماك بحرية سرودة من فصيلة السمندويات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اعصها المنطقة الممتدة من المغرب الى البرتغال || مسرحها ليلي ولا تشاهد قرب المهاد الا نادرا. قوتها الاسماك الصغيرة والسرطان والقشريات والرخويات || اجسامها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية. اعطائها ذلقة ، منفرجة الاضداد. اسنانها صغيرة ، متفاوتة الاشكال ، متألثة في الفكوك العليا والسفلى. اثوابها الى الزرق البحرية اليرداء المالح تقيم مع اقترابها من الظهور وتبيض وتغير عند البطن ، ويملونها في جوانبها بتجديد اسمر منكر المخطوط المتساوية || طولها بين متوسطة الصنف وكاعة. مسوكة فاخرة. مرغوب فيها || اشهر انواعها السمندوة المشقة والسندوة المساء.

## ١٤٢١٥ - سَمَنْدُودَةٌ مُشَقَّةٌ \* عَرَعَرٌ

*Echinorhinus spinosus* (S). *Echinorhine*, *Requin bouclé*, *Bouclé* (F). *Prickly-shark* (E).

نوع من السمندوة. سمكة بحرية سرود. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك اللجاج. اخلافا حنية ، تخشى الانسان وتبتعد عنه || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. مسكها غثن مبهر الشول المشقة بتبخس مجعنة ذرية الاطراف. ثوبها الى الزرق البحرية اليرداء المالح يبق وتشتد زرقته مع الاقتراب من بيع الظهور ويغير ويبيض عند البطن. ويملونها في جانبها بتجديد اسود منكر المخطوط. رأسها معتدل الجرم ، ذلق الملب. لها سفلى الاوتكار. شفقها معتدل الرحابة. اسنانها متراصة ،

## ١٤٢١٦ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ \* ، سَمَنْدُودٌ ، سَمَنْدَر

*Molge* (S). *Triton* (F). *Triton*, *Newt* (E).

جنس دويبات زسافة قازية من السمندليات. انواعها نحو ٢٠ جميعها صغيرة اللد مسطيلة الشكل مبطة. حنار ظهورها ليجي الاوتكار مسن الحافة. حنار اذنانها عادم التسنين. الوبها مزركة وسنجة ومديجة || قوتها اللبدان والحوام والبلايط. تألف المناطق تعيش فيها حتى فصل الشتاء. بيتها الشري يدوم نحو ٤ اشهر تخشى فيها تحت الحجارة وفي التراب.

## ١٤٢١٨ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ الْمَبْدُول

*Triton vulgaire* (F). اطبل نيوت مبلول.

## ١٤٢١٩ - سَمَنْدَلُ مَبْدُولٌ \* ، سَرْفُوت

*Salamandra salamandra* (S). *Salamander* (E).

حيوان قازيب سرلود من فصيلة السمندليات. جسمه متوسط اللد رباعي القوام يطول نحو ٢١ سم. عند الذكر ونحو ٢٤ سم. عند الانثى. رأسه مبطل ، مستدير الخط ، واسع الشدق ، كامل التسنين في الفكين. عيناه صغيرتان جاسطتان. عنقه بالغة القصر. قوائمه قصيرة وفليظة. التامحان الااميتان ربابعا الاصابع اما الخلفيتان فهابسيهما. جلده مشعل القشار. ثوبه الى السواد اللامع يطول تقيح اصفر يمتد من الرأس الى طرف الذنب || يعيش نحو ٢٤ سنة. يالغ صفات مجاري الماء. يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة. قوته الحشرات والبدان والرخويات || الاثني تضع على حافة الماء من ١٠ الى ٢٠ سيلا طول الواحد منها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. ٢٠ سم. تعلق كاملة الاعضاء ، كبيرة الخياشيم الخارجية. وبعد مرور ساعة من الوضع تدفع الاثني بصغارها في الماء فتبقى نحو سبعة اشهر الى ان تنقلص خياشيمها || يعتبر من القواذب النافعة.

## ١٤٢١٠ - سَمَنْدَلِيَّاتٌ

*Salamandridae* (S).

*Salamandridés* (F). *Salamandridae* (E).

فصيلة من السرفوتيات اجناسها وانواعها عديدة تجتمعها اربع عمارات اشهرها السندل والسندور.

## ١٤٢١١ - سَمَنْدُودٌ مَبْدُولٌ

*Triton vulgaire* (F). هو التيوت المبلول ، اطبل.

## ١٤٢١٢ - سَمَنْدُوتٌ \*

*Semanotus* (S).

*Sémanote* (F). *Semanotus* (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات ورثية غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الباردة. جميعها صغيرة اللد مبشرة الملب البقيق المستطيل. اجسامها تطول من ٨ الى ١٨ سم. رؤوسها وكوسلها سود او حر. اعقادها متعددة الالوان منها الاصفر والاشهب والحنطي والوردي والاسمر والاخير ، جميعها تنتهي بالاسود وتترسها عند اتصافها جدة عابقة اللون يلبق فيها الاسود || تسرح في النهار. تظهر في اواسط نيسان وتبقى حتى ايلول. مرتتها الازهار الحرجية والبرية || يرقاتها خاشية تعيش على جلود واغصان العرعر والايبل والزاب الخ ...



سمندل الماء



سمندل مبلول



سمندوت العرعر



سمندوة مشقة

## ١٤٢١٩ - سَمْنُونُوسُ مُعَصَّبُ الرَّاسِ \*

*Scymnus frontalis* (S). *Scymne à tête brève* (F).  
*Scymnus frontalis* (E).

حشرة خاتلة آفة نائمة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة غدييات الاجنحة. تألف جميع الاماكن التي يكثر فيها الاراك لانها مع يرقاتها تعيش عليه || جسمها قصير القند يطول نحو ٣ م. ثوبها الى السواد النعيمي يعلو في كل غمد بقع حمر. رأسها صغير الحجم. عيناها بارزتان. زباناها صقيان دقيقتان. فكهاا شيطان. ظهورها مستدير الطرف اللاحف. غذاءها شديدة الصلابة || كيفية الحمل. ارساؤها مستطيلة. رباعية العقل || ابيائها الحولية ثلاثة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئات الشتوي في اواخر الربيع. تسرح في النهار. تسافد بعد غروبها باسبوعين. تمتع المكن لطفاً شغفياً البعد على نصال الارواك || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ م. جسمها مستطيل الشكل. حطلي القرن ابرج الحمر. ابيض الحمل القلبي التجميع || طول الاكمال الذي تستمر نحو ثمانية ايام ينقضي. على النبات المائل حيث تنسل البرقة من نصل الورقة ان تم مراحل التطوير وينقل القشار.



سمندة ملساء



سمنوس سورى



سمنوس معصّب الرأس

## ١٤٢٢٠ - سَمْنَادُ \*

*Diplocadium*

جنس فطور مجهرية من الفيتحيات وفصيلة الوطحيات. جرهه الكيتينية منتصبة يعلوها فروع ششعية تنتهي بكتلة فردية أو ششعية التجميع. كتلته مستطيلة شفافة نثائية الخلية || انواعه عديدة معظمها لا مؤذ وبعضها يتطفل على المواد العضوية والنباتية المتحللة.

## ١٤٢٢١ - سَمْنَر \*

سمهر الزرع: لم يخلّف بقيات. السمهرة في الزرع هي عدم الاشتهاء. والانواع والفروقات المسمهرة هي القليلة الاشتهاء.



سَمُول

## ١٤٢٢٢ - سَمُول \*

*Diastata adusta* (S).

*Drosophile des fleurs* (F).

حشرة صغيرة من الحشبات (ذباب الخلل) يكثر وجودها في المناقع وعلى الازهار والثمار الناضجة.

## ١٤٢٢٣ - سَمُور \*

*Mustela* (S).

*Marte, Martre* (F). *Marten* (E).

جنس حيوانات لاجمة مقترنة من السوريات. انواعه عديدة موطنها العالم. تألف الاجراع واللبابات. تتسلق الاشجار وتسرح في الليل والثمار || اجسامها مستطيلة. رؤوسها اسطوانية الشكل. اغظاها ذلقة مقفولة. اذنانها عريضة كاسية. اذنانها مستطيلة جللة. جرائها قصيرة. غالبا ذرية حادة || انثاها تضع من ٣ الى ٤ جراء. تبصر بعد وضعها باسبوعين وتتسلق الاشجار بعمر ٧ اسابيع.

١٤٢٢٤ - سَمُورٌ سَبِيرِيه هو الزيلين، اظليه.



سمور

## ١٤٢٢٥ - سَمُورٌ شَائِعٌ، حَمَرٌ، سَمْسَلَر \*

*Mustela martes* (S). *Marte commune, Martre commune* (F). *Common Martre* (E).

نوع من السور. طوله نحو ٤٨ سم. ارتفاعه ٢٥ وذنبه ٣٠ سم. ذوائبه الجوزة الخفيفة. عقه وزوره وصدره يبيض || موطنه احرار الشرق الاقصى واوردية. يسرح في الليل والنهار وهو من الحيوانات الجريئة البطافة الجمّة التي لا تفت عن اي حيوان كان تستطيع اليه سبيلا.

رباعية الصوف في الفكين. عيناها لوزيتان. زعانفها الظهرية اثنتان. زعنفتها الذيلية كبيرة القند تكمل الشرجية || تصاد لمسكها الفاخر ولزيتها. لحمها كاعن الصف.

## ١٤٢١٦ - سِمْنُونَةُ مَلَسَاءَ \*، لِيَحْه

*Scymnorhinus lichia*, *Scymnus lichia* (S).

*Scymnorhine*, *Liche* (F). *Scymnus lichia* (E).

نوع من السمندة. سمكة بحرية مقترنة. اطعنا البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك المبحاج. اخلاها رضية لا تتشاكس ولا تقرب من الانسان || جسمها وشي الشكل يطول نحو ٣٠٠ م. سمكها عادم التورل والمناخس. ثوبها الى الوردية السمراء البنفسجية المولج يعلوها تمشيع اسود من الخط الجانبي الى شبح الظهر وتمشيع اغير فاييخ من الخط الجانبي الى قم البطن. رأسها معتدل الجرم. منتفخ الجبهة، ذلق الخطم. لها سفلي الارتكاز. شدقها معتدل الرباعية. اسنانها متوسطة الحجم. مثلة الزوايا. رباعية الصوف في الفكين. عيناها لوزيتان. زعانفها اثنتان. زعنفتها الذيلية كبيرة مجذافية القلقة العليا. زروانية السفلى || تصاد لمسكها الفاخر ولزيتها الجيد. لحمها كاعن الصف.

## ١٤٢١٧ - سِمْنُونِيَّاتُ \*

*Scymnidae* (S). *Scymnorninidae*, *Scymnidae* (F).

*Scymnorhinidae*, *Scymnidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية سرودلة من السفنقيات ورتبة الاشلاخ. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اطعنا معظم بحار العالم || اجسامها اهليجية الشكل تطول من متر الى ستة اذكار. اذواها الى الزرقاء البحرية العظلاء المولج يعلوها تجذيع متعرض اسمر في الجانبين. مسكه بعض انواعها شقيقة بدران شاككة. رؤوسها غروطية. اغظاها ذلقة. اشداقها معتدلة الانفرج. اسنانها لاقامية الانتظام بين الفكين || انثاها معتدلة الشار تضع في كل مرة، في فصل الصيف، من ٣ الى ٤٥ مجراً || اشهر اجناسها السمندة والمرينة.

## ١٤٢١٨ - سَمْنُونُوسُ سُورِي \* \*

*Scymnus syriacus* (S). *Scymne syrien* (F).

*Scymnus syriacus* (E).

حشرة خاتلة نائمة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة غدييات الاجنحة. تألف الحقائق والمباقل وبساتين الحشفيات. خنافسها ويرقاتها تعيش على القرمزيات والمغفرات || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة الكستنية تملوها تمشيعات حطلية تمود الى الحمل الاصهب القلبي التجميع || الكورل والقدمين. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زباناها صقيان صغيران. ظهورها مستدير المؤوض اللاحف. غذاءها شديدة الصلابة. ارساؤها رباعية العقل || ابيائها الحولية ثلاثة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئات الشتوي في اواسط نيسان. تسرح في النهار. تسافد بعد غروبها من مكنتها باسبوعين. تمتع المكن لطفاً على صفحات نصال اوراق النبات المائل حيث تعيش القرمزيات والمغفرات ... || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ م. جسمها اهليجي الشكل. ثوبها الى السمرة الكستنية المابقة يعلوها نحو اغير || طول الاكمال الذي يستمر نحو سبعة ايام ينقضي على النبات المائل حيث تتسلق البرقة وتنزل من نصل الورقة.

كالاجناس والمخوخ والجوز والكتنا. ويركب جنوع بعض الاجناس الحرجية كالستيان والقيقب والسنت والمصفاف والحور والدلب || مشبه يدخل من الجروح القديمة اليابسة فيمتري الابهية ثم القبيصة الخشبية الاولى التي يمتلئها بمادة لزجة كالصم تغلف شيئا فشيئا بعد ان تشقق الخشب بالطلوع والعرض على شكل مربعات تحيطها من جوانبها الستة اغشية المشيج البيضاء اللون || اما القطر بعد ذاته فهو الققص المتراكمة المنبسطة الحواشي المتضعبة المشرة. يظهر من ايار الى تشرين وهو سريع النمو قطر لكتته يبلغ نحو ١٠ سم. فيضته عديدة الالوان يلب فيها الاسفر الكبريتي ويوجد فيها الخنطي المايق والزاهي والبرتقالي والوردي والاصهب والاشقر والبنّي والابيض الاخير || وهو من القطور المأكولة لكته يشكو من مذاقه المز العلم. كانوا ولا يزالوا يستخرجون منه مادة صبغة صفراء اللون.

### ١٤٢٣٣ - سَمِيَّة حُرْشِيَّة

*Polyporus squamosus, Melanopus squamosus (S). Polypore squameux (F). White rot (E). Schuppiger porling (D).*

فطر من السميات كثير الانتشار يركب جنوع وارومات وجذور بعض النباتات الحرجية اخصها الحور والصنفاف والجوز. والمنشد والستيان والزان وقد يصيب التيت والدلب والجوز. قوته كلوية الشكل طويلا نحو ١٠ سم. لونها بني او سحلي. يطولها ستقة من الحراشف الدقيقة المايقة الملوخ. لبايه ابيض اللون طري في اول عهده ثم جلدي عند الادراك. رائحته كرائحة السل وهو من القطور المأكولة المستحبة العلم || اضارها قليلة لانه قلما يعلب الخشب والقلب || يكافح بالظهور بعد انتزاع القطر وتنظيف الجرح من الشكير اليابس والخشب الموصوم.

١٤٢٣٤ - سَمِيَّة *Epigène (F). Epigene (E).*  
نمت تعريفي يطلق على كل ما اتصف بالهامة.

١٤٢٣٥ - سَمِيدَر *Triton*  
هو سمندل الماء، اطله.

١٤٢٣٦ - سَمِيدَر مَبْدُول *Triton vulgaire (F).*  
هو التيت المبدول، اطله.

١٤٢٣٧ - سَمِيرُوم *هو الكرنس البري، اطله.*

١٤٢٣٨ - سَمِيم *Calluna vulgaris (S). Calluna vulgaris, Bruyère commune, Brande (F). Heather, Common ling (E). Gemeines heidekraut (D). Brendolo, Scopa carnica, Erica scopia (I).*  
جينة برية معمرة من فصيلة الخنشيات. ساقها رفراء تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. روافدها ضيقة، رابعية، متقابلة. ازهارها رابعية التركيب ليلكية اللون || تكثر في المناطق الجبلية الرملية. تستعمل استعمال الشج لفر وفي صناعة المكائس.

### ١٤٢٣٩ - سَمِيطَر

السيطر والسيطر والشيطر اسماء مختلفة لطائر واحد يدعى البشون الجبار طويلا المتق جدا يرى ابدأ في الماء الفصفص، اطله.

١٤٢٣٦ - سَمُورِيَّات، سَمُورِيَّات، عَمُورِيَّات *Mustelidae (S). Mustélidés (F). Mustelidae (E).*  
فصيلة حيوانات لاحة مفترسة تشمل السمور والسمرروب وابن عرس والقنصاة والقناتم والقربان والقيزون والرائل الخ:

### ١٤٢٣٧ - سَمُولُس \*، لَبِين الماء

*Samolus valerandi (S). Samole, Mouron d'eau (F). Brook-weed, Water pimpernel (E). Samoskraut, Salsbungen, Wasserpimpinelle (D). Samolo, Pimpinella aquatica (I).*

نبات عشبي بري متقني من فصيلة الربيديات. ساقه منتصب. اوراقه معتقة يضيئة متعاقبة. ازهاره عنقودي التجميع. ازهاره صفراء اللد يبيضه اللون خماسية البتلات. يقال ان عصارة سرقه تلجرح بسرعة.

١٤٢٣٨ - سَمُوم *Vent chaud (F). Hot wind (E).*  
الريح الحارة. قال ابو عبيدة السموم بالهار والحور بالليل.

١٤٢٣٩ - سَمِيَّات *Polyporaceae (S). Polyporacées, Polyporiacées (F). Polyporaceae, Polyporiaceae (E).*

فصيلة فطور من رتبة الدعاميات نكاهها كبيرة الحجم جلدية التركيب او لينة تحمل على صفحاتها السل بعض المسام والتجاويف. يوفئها شعبة التجميع رباعية شفاقة او ملونة || اجناسها وانواعها عديدة منها حولية ومنها معمرة تتغلف وتمش على الاجزاء اللينة || مشبهها الاجناس الحرجية والصناعية والثرينية والمثمرة || مشبهها يمتري اللحم والفكر والقلب فيسبب انحلال حواجز الابوية والخلايا ثم ينفض بيفه الكيف على الاجزاء الخشبية فيطبلها ويوصيها بفننه الليي او المكسبي او التخروفي او الهلالي || ومنها اجناس تتطفل على الخشابات المقطوعة والمصنوعة فتؤذيها وتطبلها || اشهر اجناسها من الربيعة الاقتصادية الزراعية : الحاقرية، الزار، الساجوج، السنجية، السمية، الطبق، الفليلس، القوس، الثريت.

١٤٢٤٠ - سَمِيَّة *Polyporus (S). Polypore (F).*  
جنس فطور من السميات. انواعها عديدة منها المأكولة ومنها المؤذية والسامة. يوصفها يتطفل على النبات فيوق به بعض الاضرار.

١٤٢٤١ - سَمِيَّة الْبِن \* *Polyporus coffeae (S). Phtiriose du caféier (F).*

فطر رمي من السميات يركب البن على اعضاءه الترية. يعيش من الستين الى الثلاث سنوات وقد يعلب الجلود والجذع || ويبدأ كمية الفطر تنشا عند ارموه الساق اذ يكائده المستطيلة، القضيبي الشكل، الزجبة التركيب، تمتد الى الجلود وتمتلكها بشبكة من المشج تمش على ما تفرزه الجلود من مواد سكرية يسبها ونخر الكوشيل. يكافح بالقضاء على الكوشيل التي تمش معظم حياتها خارج التربة على اعضاء النبات الهوائية.

### ١٤٢٤٢ - سَمِيَّة السِنْدِيَّان \*

*Polyporus sulfureus (S). Polypore sulfureux, Pourriture rouge du chêne (F). Brown checked wood rot (E). Schwefelgelber porling (D).*

فطر رمي من السميات يتطفل على سوق الاجناس المثمرة



سولس



مِيَّة الْبِن



مِيَّة السِنْدِيَّان



سسيم



## ١٤٢٥٠ - سَنَّا بَرِّي ، قَلْعِل ، قَلَال

*Cassia tora* (S). *Casse fédié*, *C. sauvage* (F).  
نوع من السنّا البري الطيبي . كزيره الرائحة ، كثير الثغرات  
الطبية . موطنه يواي سينا والعريش وغرب الجزيرة والصعيد .  
شجيرة تملو من المتر الى الثلاثة امتار .



سيني

## ١٤٢٥١ - سَنَّا عَدِيْجِي

*Cassia corymbosa* (S).  
*Casse corymbiforme* (F).  
نوع من السنّا الزيني . شجيرة جادة تملو من ٢٠٠  
الى ٣٠٠ سم . اوراقها ثلاثية او خاسية الازواج .  
وريقاتها سنانية النصل . عناقيدها الزهرية عذكوكة الشكل ،  
محورية وتاجية الارتكاز || ازهارها متوسطة القد ، جيلة  
الصغار . ثمارها قرون ليفية خشوية . صهاربا حلوة  
الطعم لزجة || ازهارها يذوم اربعة اسابيع بتدنى في البترة  
الاولى من تموز .

## ١٤٢٥٢ - سَنَّا مَرِيْلَنْدَة

*Cassia marylandica* (S).  
*Casse du Maryland* (F).  
ويضي السنّا الامريكي . نوع من السنّا الزيني السبروتي  
يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ثنائية او تساعية  
الازواج . وريقاتها اهليلجية النصل ، شاككة المكون .  
عناقيدها الزهرية كثيفة التجميع ، ازهارها الى الصغار  
الزراعي || ازهاره يسمر من آب الى تشرين .



سنّا مزهار

## ١٤٢٥٣ - سَنَّا مِرْهَار

*Cassia floribunda* (S).  
*Casse floribonde* (F).  
نوع من السنّا الزيني . وهو جنبة جادة تملو نحو  
٢٠٠ سم . اوراقها ثلاثية او خاسية الازواج . وريقاتها  
سنانية النصل الضيق اللزب . عناقيدها الزهرية عذكوكة  
الشكل . تاجية الارتكاز . ازهارها كثيفة التجميع .  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ١٤٢٥٤ - سَنَّا مَكِّي \* ، سَنَّا حِيْزَاي ،

*Cassia acutifolia* (S).  
*Casse à feuilles aiguës*, *Séné moka*, *Casse séné* (F).  
نوع من السنّا البري الطيبي يكثر وجوده في تمام البحر  
الاحمر . شجيرة صغيرة القد تملو نحو ٣ امتار . اوراقها  
خاسية او سباعية الازواج . وريقاتها ضيقة النصل  
الاخضر الاطلح المابح || تقع اوراقه وثماره سهول  
للعدة .



سنّا مكّي

## ١٤٢٥٥ - سَنَاح

*Sua* (F). *Soot* (E).  
هي المادة السوداء التي تتجمع وتلبد على جدران المداخن  
وقد تستعمل كمادة ازرق لها لا تخلو منه .

## ١٤٢٥٦ - سَنَاحَة مَبْدُولَة \*

*Diaea diaea* (S).  
*Diaea commun* (F). *Common diaea* (E).  
دوية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ،  
سداسية الشاثن ، من فصيلة اللوطيات || جسمها صغير  
القد يطلو نحو ٨ سم . عند الذكر ونحو ١٢ سم . عند الانثى .  
صدراها قطني الشكل ، صغير الحجم ، اسمر اللون .  
عيناها زنجيتان . شفاها صغيران . ذكاهما دقيقان . جرائمها  
متباينة الطول ، كثيفة الحب . يبطها يضي الشكل ،  
سحلي اللون تتوسطه بقعة جوزية || تألف الازواحي  
لللساة وتقترب من المساكن المألوفة . قبتها اخشوات  
الصغيرة . تسرح في التبار . بيائها الشتوي يستمر نحو  
خمس اشهر || عكدها صلبة لولبية الشكل تحميها تحت  
الحجارة || تعيش الانثى الى حين مجتم الحن وتحضنه ،



سَنَاحَة مَبْدُولَة

## ١٤٢٥٠ - سَمِيْجِي Tenon

خشفة في الثبر تحيط بعتق الثور كالمطوق وما سميكان .

## ١٤٢٥١ - سَمِيْكَ الذَكَب Crassicauda

*Crassicauda* (E).  
نمت تمريني يطلق على كل حيوان متساك الذنب .

## ١٤٢٥٢ - سَمِيْكَ السَّاق Crassicaule

*Crassicaule* (F).  
*Thick-stemmed* (E).  
نمت تمريني يطلق على كل نبات ساقه ميكة .

## ١٤٢٥٣ - سَمِيْكَ الوَرَقَة Crassifolia

*Crassifolia* (E).  
نمت تمريني يطلق على كل نبات يحمل اوراقا متساكة .

## ١٤٢٥٤ - سَمِيْلَقِي \* Cephalotaxe

*Céphalotaxe* (F).  
جنس اشجار حرجية سبروتية بطيئة النمو من الطسويات .  
انواعها المروفة قليلة البدن . جميعها شرقية المنبت مهددا  
اليابان والصين والهند وايران || اشجارها تملو من ١٠  
الى ٣٠ م . اغصانها متقاطعة . اوراقها ابيدة . نصلها ضيق  
الصفحة يطلو من ٥ الى ١٠ سم . ويعرض من ٤ الى ٦  
سم . صفحتي السفلى مقسوة الى خمسة خطوط ثلاثة  
منها خضراء واثنان اغبران . ازهارها رسيمة للسكن . عطرية  
التجميع || اغصانها صلبة جيدة الصنف ، شائعة  
الاستعمال الصناعي واللزني .

## ١٤٢٥٥ - سَمِيْلَقِي Tarin commun

*Tarin commun* (F).  
هو الكتمر المبدول ، اطبله .

## ١٤٢٥٦ - سِين Age

هي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة . وفي الشجرة  
منذ بدء نموها . وتعرف من الدواب بفحص اسنانها .  
اما من الشجرة فيفحص مراكز النمو السنوية في قطاع  
ساقها .

## ١٤٢٥٧ - سِين Dent

*Dent* (F). *Tooth* (E).  
من ج اسنان . تعتبر الانسان من اعضاء الجهاز الهضمي  
لأنها تقوم بوظيفة مضغ الطعام واعداده || مركزها في  
اسنخ الفك العلوي والسفلي . تتكون من ثلاثة اجزاء  
التاج والعتق والجذور . ومن طبقتين : الثلاثية للاسنة  
والحسية الباطنية المحسوسة || وتقسّم الانسان الى عدة  
اقسام مرجحها السمل المنوط بكل منها . في الخليل مثلا ،  
تقسّم الى : ثلثة واربعة وقارح وثواب وفريس .

## ١٤٢٥٨ - سِين العَجُوز

هي عرن الثمن ، اطبله .

## ١٤٢٥٩ - سَنَّا Cassia

*Casse*, *Séné* (F). *Senné* (D). *Cassia*, *Senna* (E).  
٤٠٠ منظها بري ويضعها زراعي تزييني . فيها  
الاشجار والشجيرات والجنابات . اوراقها مركبة ، وريشة ،  
شفسية . ازهارها متقوي التجميع . ازهارها صغيرة او  
متوسطة القد ، قصيرة الانبوب ، متراكبة الفصول والبتلات .  
ثمارها قرون غزيرية اسطوانية مستطيلة . منافعها الطبية  
موجبة || اشهر انواعها الطبية والزراعية ما على .

ويعيش الذكر الى حين يكوم الاثني التي تقضي عليه ||  
تعتبر من الدواب المفيدة .  
Emeri (F). سُنْبَادَج ، سُنْبَادَج (F).  
Emery (E).

مسحوق شديد الصلابة ينجم عن تحطيم القرن يستعمل في  
صقل وحش وتلك المادان والاخشاب .

1٤٢٦٧ - سُنْبَلْ  
Pince (F). Toe (E).  
من اجزاء الحافر عند الخيل .

1٤٢٦٨ - سُنْبَلْ  
هو الناردن ، اطبله ، منه الازرق والحداني والاقليطي .

1٤٢٦٩ - سُنْبَلْ هِنْدِي  
هو اخضر مكلي ، اطبله .

1٤٢٧٠ - سُنْبَلْ ، سُنْبَلْ ، سُنْبَلْ  
Epi (F).  
Ear of corn (E).

هي نورة بعض النباتات اخضها التنجيلة . والسنبلة  
مجموعة من السنبيلات المتتابعة المرتكزة على محور واحد .  
اما السنبلة فهي وحدة التزير وقد تكون ورة أو شعبة  
التجميع . ثمارها حبوب جافة .

1٤٢٧١ - سُنْبَلْ  
Epiage (F). Earing of grain (E).  
راجع ايسال .

1٤٢٧٢ - سُنْبَلْ  
شعبة من التجيل تعرف بالنجيل الازرق . اطبله .

1٤٢٧٣ - سُنْبَلْ  
Epi (F). Spica (E).  
نجم ثير من برج المذراء يعرف بالسالك الازل ، اطبله .

1٤٢٧٤ - سُنْبُولَة  
Cymbulia (S).  
Cymbulie (F). Cymbulia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجتمعات الاربل  
وفصيلة السنبليات . انواعها المرفوعة ثلاثة اعطائها البحر  
الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اخضها  
الجنوبية || اصدانها غضرية المادة ، اهلبيجة الشوزن ،  
شائكة الاطراف ، شفاقة . اجسامها شفاقة ، صغيرة  
الزوس ، ثنائية الواقط واليمين ، وحيدة الاعظام .  
زعانفها مسطحة رقيقة ، يضيئة الشوزن || تسبح وتزوم  
على ظهورها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء .

1٤٢٧٥ - سُنْبُولِيَّات  
Cymbullidae (S).  
Cymbullidés (F). Cymbullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجتمعات الاربل .  
اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار  
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدانها صغيرة ، اهلبيجة  
الشكل ، معتدلة التلطيط ، غضروفية المادة ، متجانسة  
المصاريع ، مستطيلة الزعانف اي الاردية المسطحة  
البيضية الشوزن || اعرف اجناسها واشهرها السنبولة .

1٤٢٧٦ - سَنَّة حِسَابِيَّة ، سَنَّة هَالِيَّة  
Exercice (F). Financial year (E).

هي في الاصطلاحات الحسابة حساب السنة من المدة  
التي تنقضي بين حسابين ختامين || وهي في الاصطلاحات  
المالية حساب المدة التي تنقضي بين ميزانيتين .

1٤٢٧٧ - سَنَّة ضَوِيَّة  
Année-lumière (F).  
Light-year (E).

السنة الضوئية هي المسافة التي يجتازها الضوء بمدة ٣٦٥  
يويا بمعدل ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر بالثانية . وقد تبلغ نحو  
عشرة آلاف مليار كيلومتر .

1٤٢٧٧ - سِنَاخِيَّات  
Hypocreaceae (S).  
Hypocracées (F). Hypocreaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة المشويات ورتبة الزقوت .  
تتميز باصنافها البدينة الزاهية الالوان || اجناسها  
عديدة تختلف باختلاف وثل البورغ وشكل الوثيمة وما  
تتملك من اعدان || اعرفها من الوجهة الزراعية  
الاقتصادية الاجناس التالية : الرءاء ، الماكوب ،  
العومبة ، البوم ، الفصية ، القنار ، الحية ،  
الهدكة ، الوبلة والوخيش .

1٤٢٧٨ - سِنَاد \* ، تَابِير ، تَابِيرُوس ، ساد  
Tapirus (S). Tapir (F). Tapir (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة السناديات . انواعه خمسة  
منها واحد اسوي واربعة امريكية . جميعها كبيرة  
الجثة الضخمة ، غليظة الرأس والخطم الذي يشبه الخرطوم  
القصير . ثوبها ابيض اللون ، اذنبا صغيرة مستقيمة ، ذيلها  
بالقصر || اخلاقتها هنية تعيش في المنائق والاحراج  
الكثيفة قوتها الاعشاب وجذور النبات .

1٤٢٧٩ - سِنَادِيَّات  
Tapiridae (S).  
Tapiridés (F). Tapiridae (E).

فصيلة حيوانات برية وحيدة الجنس تتميز بفخامة الجفة  
وطول الخطم وصغر الاذن وقصر الذيل . قوائمها ثلاثية  
الاصابع الحافرية .

1٤٢٨٠ - سَنَاقَة  
Gompholobium (S).  
Gompholobe (F). Gompholobium (E).

جنس نباتات برية جنينية وعشبية معمرة من البذراريات  
وفصيلة القرقيات الفراشية . انواعها المرفوعة نحو ١٢  
منبتها بعض مناطق استرالية || اوراقها صغيرة النصال  
متقابلة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها محورية  
الارتكاز او تاجية ، عطرية العرف ، منها الابيض  
والاصفر والوردي والارجواني || اوراقها وازهارها جميلة  
تؤذي الماشية وقد تسبب لها التسم والموت .

1٤٢٨١ - سَنَام  
Bosse (F). Boss, Hump (E).

حدبة في ظهر البير وهي كتلة حدبية تعلو السلسلة  
الغفيرة يستند منها الجمل ما ينفيه عن الطعام اذا خلا  
جوفه من الغذاء .

1٤٢٨٢ - سَنَام  
Basifuge (F). Basifugal (E).

نمت تعريفية يطلق على كل نبات هامي النوعة فقط .

1٤٢٨٣ - سَنَاقَة  
Production alternative (F).  
Alternative produce (E).

صفة الانجاز المتناوبة الحمل كازيتين .

1٤٢٨٤ - سَنَان الرَشْ  
Lance d'arrosage (S).  
Sprinkling spear (E).

جهاز يوضع في طرف القسطل او التبريع لضبط الماء  
وتوجيه رشه .

1٤٢٨٥ - سَنَانِي  
Lancéolé, Lanciforme (F).  
Lanceolate (E).

ما كان شكله كالسنان .



سناد

## ١٤٢٨٩ - سنجاب النخل \*

*Sciurus palmarum* (S). *Ecureuil palmiste* (F). *Palm squirrel* (E).

نوع من السنجاب صغير القد طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ١٢، ثوبه الى الصبغة الطحلاء تملو ثلاثة خطوط بيض تقطبه من النقرة الى الذنب || موطنه الهند. يألف الانجار المشرة اخصها النخل ويقترب من الاماكن الآكلة.



سquirrel

## ١٤٢٩٠ - سنجاب الهند \*

*Sciurus indicus* (S). *Ecureuil de l'Inde* (F). *Indian squirrel* (E).

نوع من السنجاب الكبير القد طوله نحو ٤٥ سم. وذنبه ٤٠، ثوبه متعدد الالوان رأسه واذناه وعقه وأبطاه الى الجؤفة القرمزية المواج. ظهره وذنبه وجرامزه سود. يظه الى الصفره التينية || يألف الارحاج الكثيفة يسرح في البهار. قوته البهار للمواد النباتية.



سنجاب النخل

## ١٤٢٩١ - سنجاب شائع \*

*Sciurus communis* (S). *Ecureuil commun* (F). *Common squirrel* (E).

نوع من السنجاب موطنه فسيح الارباع يمتد من اقاصي الشرق الى اطراف اروب. جسمه مستطيل الشكل يبلغ نحو ٢٥ سم. وذنبه ٢٢ سم. ثوبه الى الصبغة الصنائية، صدره ويظه الى البياض. فزاهو متحصنة شائعة الاستعمال.

## ١٤٢٩٢ - سنجابيات

*Sciuridae* (S). *Sciuridés* (F). *Sciuridae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضية تشمل عدة اجناس والعدد من الانواع. اعرف اجناسها السنجاب والجلمه والتاميه والمقلول والمربوط والبطوش والبستونيس والبطرميس. جميعها مستطيلة الاجسام والاذناب مملوطة البراطم العليا. موطنها العالم. تألف الثمايات والارحاج. تتسلق الاشجار. قوتها البهار ومختلف المواد النباتية.



سنجاب شائع

## ١٤٢٩٣ - سنجابيات الشؤوب \*

*Sciurormorphes* (F).

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القراضم تشمل ثلاث فصائل السنجابيات والحاروديات والهيريات.



سنجة

## ١٤٢٩٤ - سنجة \*

*Centrospora* (S). جنس فطور مجهرية من الردياتيات وفصيلة الطلعيات. يتميز بكتانهه المستطيلة الملب، المحببة الشكل والزيتونية اللون || يتغلف على الاوراق فيقرسها وعلى البهار فيعقبها قبل ادراكها || انواعه المعروفة اثنان :

*Centrospora acerina* (S). سنجة الاسفندان \*

*Centrospora bromi* (S). سنجة الثؤوب \*

*Bigarrure* (F). *Medley* (E). سنجة \*

اجتماع الاشكال والالوان دون رابط او قياس.



سنجوس

## ١٤٢٩٦ - سنجة \*

*Anergie* (F). *Anergy* (E). السنجة اخفاء عوارض الاهداف.

## ١٤٢٩٧ - سنجوس \*

*Pachycephalus* (S). *Pachycephale* (F).

طائر من الجواثم ذنبا ينتهي الى فصيلة المهرجات. موطنه يمتد من العراق الى ماليزية و يحجب موطها وعقبها في طلب القوت. قوته الحشرات والبرور والثمار البائنة.

## ١٤٢٧٨ - ستروزم

*Centrosome* هو الجسم المركزي المجري في الحيوان والخلوي في النبات.

## ١٤٢٧٩ - ستنروزم

هي العملية، اطلبها.

## ١٤٢٨٠ - ستنزونين

*Santonine* (F). *Santonin, Santoninum* (E).

جوهري فعال يستخرج من مختلف انواع الشج اخصها الليثان. وهو من المواد الطلية الشائعة الاستعمال.

## ١٤٢٨١ - ستيفراد

مقسوم الى مئة درجة.

## ١٤٢٨٢ - ستنيفرام

*Centigramme* (F). *Centigram* (E).

الجزء الواحد من اصل مئة جزء قسم عليها الغرام.

## ١٤٢٨٣ - سنثيل \*

*Scintilla* (S). *Scintille* (F). *Scintilla* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات انجاشيم وفصيلة الفلويويات. انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة من شط العرب الى شطوط الهند وجزر افانبا || اصداها بيضية الشوزن، وقيمة القن، ثائية المصاريع، مالة السطوح بجيلة الالوان الزائفة.

## ١٤٢٨٤ - ستيلير

الجزء الواحد من اصل مئة جزء قسم عليها الليتر.

## ١٤٢٨٥ - ستنيمتر

*Centimetre* (F). *Centimetre* (E).

وحدة قياسية مربعة تساوي جزء من اصل مئة جزء الذي يتألف منه المتر. والستنيمتر يقسم الى عشرة ملليمترات.

## ١٤٢٨٦ - سنج

السنج والسج هو الغناب، اطلبه.

## ١٤٢٨٧ - سنجاب

*Sciurus* (S). *Sciurus* (F). *Eichhörnchen* (D).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة السنجابيات. انواعه نحو ٧٥ جميعها صغيرات القد، مرهفات الحواس ولها اذنان طوال جيليات الصف. تألف الارحاج والثمار. تتسلق الانجار بسرعة وخفة. قوتها المارد النباتية. تفضل البهار والزيمات والزلي. يقال انها تتسلق ينش المصافير || ترتب اجسامها في صفوف الانجار، مداخها من الشرق وخارجها من الغرب. اناتها تقسم من ٣ الى ٦ اذراس تبهر يد وضها بانسبور || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

## ١٤٢٨٨ - سنجاب الغاب

*Sciurus tristriatus* (S). *Sciurus des jungles* (F).

نوع من السنجاب صغير القد طوله نحو ١٢ سم. وذنبه كذلك. ثوبه الى الصبغة الصنائية تملو ثلاثة خطوط صفر تقطبه من نقرة الراس الى طرف الذنب || موطنه سرندين. قوته البهار. يقترب من الاماكن الآكلة ويدخل المساكن في طلب السكاكر والخلويات والبياض.

من أي نوع كانت ان سفينة او غيرها ، الى مستأجرها ومن الواجب ان يشتمل كل كل شروط عقد النقل .

١٤٣٠٨ - سِنْدَ ثَلَاثِي (E). Triptyque (F).  
هو من السندات الخاصة التي يصرح بها بالاستيراد بمض الاشياء وقتياً . اخصها السيارات ال ان يعاد تصدير امثالها .

١٤٣٠٩ - سِنْدَ قَابِلِ الْاِسْتِزَالَةِ (F). Redeemable obligation amortissable (E).  
هو السند الذي يمكن تسديد قيمته عن طريق الاستهلاك .

١٤٣١٠ - سِنْدَ قِسْطِ التَّامِينِ (F). Billet de prime (E). Bonus bill (E).  
هو سند أذني يلزم به المؤمن ان يدفع الى المؤمن قسط التامين في يوم يتفقان عليه .

١٤٣١١ - سِنْدَ حَامِلِهِ (F). Billet au porteur (E). Bill to bearer (E).  
سند يلزم موقه دفع مبلغ معين من المال في موقه معلوم الى أي شخص كان يحمل هذا السند .

١٤٣١٢ - سِنْدَ لَدَى الْاِطْلَاعِ (F). Billet à vue, B. à volonté (E). Bill payable at sight (E).  
سند يلزم موقه ان يدفع الى شخص سمي او لاذنه مبلغاً من المال بمجرد تقديم السند اليه .

١٤٣١٣ - سِنْدَ مُرُورٍ (F). Passavant (E). Pass, Permit (E).  
سند بيان بضائع خاضعة لرسوم جمركية او غرائب غير مباشرة تفي منها في مرورها الى وقت معين ومن مسافة محدودة .

١٤٣١٤ - سِنْدَ مُقَدَّرُودِ التَّدَاوُلِ (F). Effet négociable (E). Negotiable bill (E).  
من السندات التجارية المقدورة التحويل والتعامل بها . تحوّر في صيغ خاصة وتكون قيمتها واجبة الاداء لدى الاطلاع عليها أو بعد أجل قصير .

١٤٣١٥ - سِنْدَ مُنْصَرَفٍ (F). Effet bancable (E). Bankable bill (E).  
هو السند الذي يحمل جميع الشروط المطلوبة لحسمه من البنك .

١٤٣١٦ - سِنْدَ أَرِيَّةَ ٥ ، دُوَيْرُورِيَّةَ ٥ (S). Deuterophoma (S).  
جنس فلور مجهرية من فصيلة الصفيديات . يتنشر بيكتيناته اللحية التركيب ، الموصوفة التي ، الخالية من الويئة الظاهرة . يوفاته قائمة عند اطراف المشج الذي ينفذ حول البكتية الداعل ٥ . نوعه الوسيد المعروف والمدرس حتى الآن هو التالي .

١٤٣١٧ - سِنْدَ أَرِيَّةَ الْحَفِظِيَّاتِ ٥ ، وَصَم سِكُو (S). Deuterophoma tracheiphila (S). Mal secco (F).  
فطر مجهري يصيب اليبون الحامض والارنج . مظهره الخارجي جفاف فنياني يحمل بعض الاثنا بعد اصفرار وذبول اورقها يتعبه جفاف اللحاء وانحراف لون المادة الخشبية نحو الجورة الزاهية ثم السرة القاتمة ٥ يكالغ بتقليم وحرق الاجزاء الموصوبة وتطهير الجروح .

ملجته الحياتي جماعي . جماعته متوسطة العدد ٥ جسمه صغير القذ بطول نحو ١٨ سم . رأسه كبير الجرم ، منقاره معتدل الحجم ، صليح . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، منقطوم الطرف . ثوبه الى الشقعة السوداء تميم في الرأس والرداء وتغير في البطن . زوره حاجي اللون يطوقه ستار اسود يمتد من قاعدة انتشار الى العين فالمنتق فاعل الصدر . اياهه منشفة بالاخير . منقاره ورغاء واصابعه الى السرة القاتمة ٥ يدشن عته في الاشجار الرقيقة . الاثنى تحفن وسدما من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يؤثن على الفناء .

١٤٢٩٨ - سَنَخ هو التخروب ، اطله . ج استاخ .

١٤٢٩٩ - سَنَخ (F). Collet (F). Collar, Neck (E).  
السرخ هو الأصل . وهو الجزء من اللجذ تنمره التربة . ج استاخ وسنوخ .

١٤٣٠٠ - سَنَدَ (F). Obligation  
كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط .

١٤٣٠١ - سَنَدَ (F). Bill (E).  
كل ورقة مكتوبة تحتوي على التزام يدفع مبلغ معلوم من النقد .

١٤٣٠٢ - سَنَدَ ، مُسَنَدَ (E). Titre (F). Bond (E).  
هو المحرر الذي يوضح فيه البمل القانوني او العقد المادي الذي يثبت آثار القانونية كسند الدين وسند الملكية . والسند صيغ عديدة ، اشهرها :

سند إذني  
سند اسمي  
سند إطلاق تصرف الدائن  
سند اعترافي  
سند أولي  
سند تنفيذي  
سند حامله  
سند وهمي

١٤٣٠٣ - سَنَدَ إِذْنِي (F). Billet à ordre (E). Bill payable to order (E).  
سند يصعد من يوقمه بان يدفع الى شخص آخر مبلغاً معلوماً بعد أجل قصير لدى اطلاله على السند .

١٤٣٠٤ - سَنَدَ الْخَزُونِ ، سَنَدَ ضَمَائِنِ (F). Warrant (E).  
سند أذني يثبت بموجبه رهن بضائع مودعة في المخازن العمومية .

١٤٣٠٥ - سَنَدَ الرَّهْنِ الزَّرَاعِي (F). Warrant agricole (E). Agricultural warrant (E).  
سند أذني يقدمه الزارع الى دكانته يثبت به انه رهن له دين تخليه من الحياة مستجاب زراعية او حصاداً صناعياً ومخاصيل ومأراً او عقارات بالطبيعة او بالتخصيص .

١٤٣٠٦ - سَنَدَ الرَّهْنِ الْعَقْدَارِي (F). Cédula hypothécaire (E). Mortgage schedule (E).  
سند مقدور التبادل كالأوراق المالية يدل على قيد الدين على العقار في السجل العقاري .

١٤٣٠٧ - سَنَدَ الشَّحْنِ ، لَدَ كَرَةِ الشَّحْنِ (F). Connaissance (E). Bill of lading (E).  
ايصال بالبضائع المشحونة يقسمه صاحب الشاحنة ،



سندارية الحفظيات



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد اخضر



سندباد أزغب

الاصابع || جسمها صغير القد بطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها مخروطي الشكل. عيناها لوزيتان صغيرتان. اذنانها خافتتا الغشاء الصوري الاسمر الغلاف. عنقها مستدلة القصر والشحانة. ذنبها مستدق الطرف، سريع الانقسام. ثوبها الى الصلبة الخنطية تملوها رقة مراء وتقطيع اخير. ساجه ثوبها تتميز بالشوكة اي انها تمانن المحيط الموصودة فيه || الاثني اكبر قدماً من الذكر وبهت ثوباً منه. تبيض من ٤ الى ٨ يبيضات تملوها في المواقع الجنوبية المعرض || تألف الرياح وكثيران الرمل. تعيش في افناق تخدها بين جذور النباتات. تسرح في النهار وتبيت في الليل. قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحمام || تعتبر من الزخافات النافعة.

١٤٣٢٥ - سِنْدِيَّيْ هو السنديان الاخضر، اطليه.

١٤٣٢٦ - سِنْدِيَّيْان بَلُوْط Quercus (S).

Chêne (F). Oak tree (E). Eiche (D). Quercia, Querce (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة السندباتيات. انواعه زهاء ٣٠٠ معظمها اشجار كبيرة دائمة. اشخاصها صلبة صناعية. اوراقها جامدة جلدية. ثمارها بطولية علية. قشور بعضها فلية ولوراقها دبابية || اشهر انواعه ما يتبع.

١٤٣٢٧ - سِنْدِيَّيْان اَبْيَض Quercus alba (S).

شجرة جادة مهددة امريكية الشالية. تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. ساقها بيضاء اللحاء. اوراقها عابطة تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٧ الى ٧.٥. نصلها ثلاثي او رباعي التفتصيص الجانبي، ازغب الصفحة السفلى، امط اللب. لونه يتصرف مع العمر من الاخضر الباهت الى البنفسجي || تفرقها تصير الحراشف. بطولها طري القشور واللباب.

١٤٣٢٨ - سِنْدِيَّيْان اَحْمَر Quercus rubra, Q. borealis (S).

شجرة سبروتية تملو من ٢٥ الى ٥٠ م. نبالها وزيناتها جزئية اللون. اوراقها تطلو نحو ٢٠ سم. وتعرض ١٥. نصلها مستعرض التفتصيص، واسع الاضلاع، جامد النسيج اللامع الذي يتصرف من الخضار الباهت الى الحمرة الجذوية || تفرقها في الشكل من الحراشف. بطولها كبيرة، غليظة، لونها الى الحمرة السراء.

١٤٣٢٩ - سِنْدِيَّيْان اَخْضَر بَلُوْط Quercus ilex, Q. Ballota (S).

Chêne vert, Yeuze, Ballote (F). Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Balote oak (E). Stecheiche (D). Eice, Leccio, Lecina, Quercia verde (I).

نوع سبروتي كثير الفروع يرغب في الارتفاع الكلية. اشجار تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها فائلة. سواها غليظة اللحاء الصلف الكاهية. اوراقها عرو، لاقامية الشكل والتسني، نصلها عابق الخضار اللامع، عرو، تد من ٦ الى ١٠ ازواج || تقاريفها بحجرة اللون، زغبية الحراشف المتراكبة.

١٤٣٣٠ - سِنْدِيَّيْان اَزْغَب Quercus lanuginosa, Q. pubescens (S).

شجرة جادة ترغب في الاراضي الكلية. تملو من ٦

١٤٣١٨ - سِنْدِيَّيْان \* Utricularia (S).

Utricularia, Lentibularia (F). Bladder-wort, Hooded water milfoil (E). Wassenauch, Grosser wasserhelm (D). Urticulaire, Erba vessica (I).

نبات عشبي بري مائي من فصيلة السندباتيات. جذوره حزبية، ساقه طراخية. اوراقه مركبة ريشية غليظة. ازهاره فردية او عشقوية التسجيع ترتكز على السراخ. لونها يختلف مع الانواع نية الاصفر والاحمر والازرق.

١٤٣١٩ - سِنْدِيَّيْان Lenticulariae,

Utriculariae (S). Lentibulariées, Utriculariées (F). Lenticulariae, Utriculariae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة، قليلة الاجناس والانواع جميعها من النباتات المائية التي تعيش في حمرة الماء او تطفو على سطحه. اشهرها السندباد.

١٤٣٢٠ - سِنْدِيَّيْان \* Thibaudia (S).

Thibaudia (F).

الواحدة سدرة. جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة الخنطيات. انواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية من المالكين القدم والجديد || سواها فروع تملو من مترين الى اربعة امتار. اوراقها متعاقبة، سنانية الاتصال الجامدة الامة. ازهارها غصي التسجيع، محوري الارتكاز. ازهارها جملة الشكل، عديدة الورد. جميعها الى الحمرة المتفاوتة التخفيف والملاجات.

١٤٣٢١ - سِنْدِيَّيْان \* ثُوْبَا عَقْدِيَّة Tetracelis articulata (S).

Thuya articulé, Cyprès à sandarac (F). Sandarach tree (E). Sandarachbaum (D). Sandaraca (I).

شجرة حرجية وصيدة الجنس واللون من السرويات. مهدا جبال الاطلس. ساقها فروع، كثيرة العقد القرابية. بطيئة النمو، تملو من ٥ الى ١٥ م. نبالها مبطة. اوراقها خضمية، رباعية، عرو. اكرانها كروية ظهرا يراوح من ٨ الى ١٢ م. جرهاها اربع غير متساوية القد || يستخرج منها صمغ السندباد المشهور. اشخاصها فاخرة الصنف عطرية العرف.

١٤٣٢٢ - سِنْدِيَّيْان \* Callitris (S).

Callitris (F). Arar tree (E). Echter schmuckzapfen (D). Callitris (I).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من السرويات. انواعه نحو ٢٥، سواها تملو من ٤ الى ٢٠ م. افاضها كثيفة التسجيع. اوراقها فلسية الشكل، عرو. ازهارها وصيدة الشق والسكن. اكرانها شبه كروية، سداسية او ثمانية الجراعات الشفرية الشكل، الخددة. بزورها الحليجية وصيدة الجناح || يستخرج من بعض انواعه صمغ السندباد الذي يشبه صمغ السندباد ويستعمل استعماله. لحاء اشجاره غنية بالمطمان. اشخاصه راحة، جيدة الصنف شائعة الاستعمال الصناعي.

١٤٣٢٣ - سِنْدِيَّيْان \* Psammmodromus (S).

Psammmodrome (F). Psammmodrome (E).

حيوان يبيض من المطاء وفصيلة السقايات قايامت الانسان، مكنتيات الالسة المشروعة، وراعيات القوام، خاسيات الجوهري من الجاسط.

١٤٣٢٤ - سِنْدِيَّيْان \* Psammmodromus (S).

Psammmodrome (F). Psammmodrome (E).

الحرارة. تملو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها لمساء اللحم. بناتها سرحة. اوراقها عرو، بيضية، مسنة الزام الاخير. نصلها جامد النسيج، بحري الخضار، خلي الصفحة السفلى، يطول من ٧ الى ١٥ سم. ويعرض من ٣ الى ٦ م. تفروقا خلي الحراشف الدقيقة. بلوطها مستطيلة.

### ١٤٣٣٧ - سِينْدِيَانْ بِلَاح ، بَلْخ

*Quercus coccifera* (S). *Chêne kermès*, *C. cocciné* (F). *Kermes oak*, *Scarlet oak* (E). *Kermes elche*, *Kermesbaum* (D). *Quercia della cocciniglia*, *Quercia del kermes* (I).

شجرة دغلة مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الكلسية، تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها عرو، اهليلجية، ذققة، تطول من ٢ الى ٦ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٥ م. نصلها صلب النسيج المائل للامع، لونه ال اخضر الزاهي، حناره مفرس الحافة، فسح الاضلاع، شائك الحلب || تفروقا شائك الحراشف المتراكبة. بلوطها لاسع القشرة الحظلية يملو توضيح عايق.

### ١٤٣٣٨ - سِينْدِيَانْ حَصْبَكِي الشمر

*Quercus conferta* (S). *Chêne à glands fasciculés* (F).

شجرة سريرية بحيلة الشكل تملو من ٣٠ الى ٥٠ م. اوراقها عابطة مستطيلة، نصلها متواج الصفحة. خلي الشرة السفلى. فصوص عديدة، متقاربة، ضيقة الاضلاع || تفروقا قلنسي الشكل، قليل العمق، متراكب الحراشف النقيقة الدرية. بلوطها تطول نحو ٣ سم. يملو تسنج مستطيل عايق. ثمارها ثنائية او ثلاثية التجميع.

### ١٤٣٣٩ - سِينْدِيَانْ رُومِي ، مَكْلُ

*Quercus aegilops* (S). *Chêne vélani*, *C. égilops* (F). *Valonian oak*, *Velani oak* (E). *Knoper elche*, *Valonian elche* (D). *Quercia da concia*, *Q. della vallonnes* (I).

شجرة سريرية مهدها الشرق الاذن تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابطة، بيضية، مسنة الزام الاخير، تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٧ م. نصلها جامد النسيج، منشاري الحافة || تفروقا كبير اللد مستطيل الحراشف شائع الاستمال في البياغة والصباغ.

### ١٤٣٤٠ - سِينْدِيَانْ شُورْ ، سِينْدِيَانْ الفِلِين

*Quercus suber* (S).

*Chêne liège*, *Surier* (F). *Cork oak*, *Cork tree* (E). *Kork elche*, *Korkbaum* (D). *Quercia sughero* (I).

شجرة جامدة مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط. يتكرر ويبدوها في افريقية الشالية، ترغب في الاتربة الرملية. تملو من ١٠ الى ١٥ م. لحاء ساقها غنية قوية التركيب يستخرج منها الفلين. اوراقها عرو، دائمة الخضار، تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض من ١٥ الى ٤٠ م. نصلها يضي الشكل جامد النسيج، امرط الصفحة العليا المايقة الخضار، ازغب السفلى الطلاء اللون. عروته من ٥ الى ٧ ازاوج || تفروقا غروطي الشكل اطمل الحراشف القصيرة المستعرضة. بلوطها متوسط القد، مدبب الشذام.

### ١٤٣٤١ - سِينْدِيَانْ حَبِيبَا

*Quercus tinctoria*, *Q. velutina* (S). *Chêne quercetron* (F).

شجرة سريرية تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. بناتها وزيماتها غليظة، زياة البشرة، صفراء اللون. اوراقها تطول

الى ٢٠ م. جلدها ودي. ساقها عقداء متعرجة. قشورها مصلفة، خشفة، سوداء اللون. اثنائها وبناتها زياة اللحم. اوراقها عابطة، خلية الصفحة السفلى، تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ م. تفروقا صغرة القد، مدبب الحراشف الشائكة. بلوطها دقيقة، مستطيلة، موجية، حادة الشذام الاسود.

### ١٤٣٤١ - سِينْدِيَانْ أَسْوَد

*Quercus ferruginea* (S). *Chêne noir* (F).

شجرة رقيقة مهدها امريكة الشالية. تملو من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها كبيرة اللد تطول نحو ٢٢ سم. نصلها ثلاثي او خماسي التخصيص، جامد النسيج، جامد، الحنار، خلي الصفحة السفلى || تفروقا رمعي الشكل. بلوطها صغيرة القد، ابرية الشذام.

### ١٤٣٤٢ - سِينْدِيَانْ آسِي الْوَرَق

*Quercus myrsinaefolia* (S). *Chêne à feuilles de myrte* (F).

شجرة سريرية مهدها اليابان. تملو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها مصلفة اللحم. اوراقها عرو، اهليلجية، آسية، تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ م. نصلها غائر المروق امرط البشرة. بحري اللون.

### ١٤٣٤٣ - سِينْدِيَانْ أَشْعَر ، سِينْدِيَانْ تُرْكِي ، لِكْ

*Quercus cerris* (S). *Chêne chevali*, *C. de Bourgogne*, *C. lombard*, *Cerre*, *Doucier* (F). *Iron oak*, *Mossycup oak*, *Turkey oak* (E). *Zerrelche*, *Turkische elche* (D). *Quercia cerro*, *Cerro* (I).

شجرة سريرية مهدها الشرق الاذن واروية تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابطة تطول من ١٠ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ م. نصلها جامد النسيج، عايق الخضار البحري، رياضي لو سداسي او ثماني التخصيص. عروته الرئيسية تمد من ٦ الى ١٠ ازاوج يتخللها اصصاب متعرجة بيبة || تفروقا قوي الحراشف الحظلية الخلية البشرة.

### ١٤٣٤٤ - سِينْدِيَانْ الْفَرْز ، عَذْر

*Quercus afaris* (S). *Chêne afaris* (F).

شجرة سريرية هرمية الشكل تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. يقال ان مهدها الجزائر وهي مبذولة في بعض جرد جبل القنينة و نباتان. اوراقها عابطة تطول من ٨ الى ١٠ سم. نصلها جامد النسيج، مفرس الصفحة المستديرة التخصيص. تفروقا اطمل اللون غروزي الحراشف الخلية البشرة. بلوطها كبيرة اللد طولا نحو ٤ سم. وقطرها ٢.

### ١٤٣٤٥ - سِينْدِيَانْ الْكَفْص ، سِينْدِيَانْ الْبَرْخَال ، عَقْص

*Quercus lusitanica* (F). *Chêne à gâles*, *C. du Portugal*, *C. des teinturiers* (F). *Dyer's oak*, *Gall oak*, *Nut gall oak* (E). *Echte gallische*, *Galläpfel elche* (D). *Quercia della galla* (I).

شجرة سريرية مبذولة، ضيقة اللوحة، منتصبة القروع تملو من ١٠ الى ٢٠ م. اثنائها وبناتها خلية اللحم. اوراقها عابطة تطول من ٥ الى ١٥ سم. نصلها يضي الشكل مفرس الحافة، شيق الاضلاع، خلي الصفحة السفلى، اغنصر العليا || تفروقا مدبب الحراشف بلوطها مستطيل الشكل، مدبب الشذام.

### ١٤٣٤٦ - سِينْدِيَانْ بَحْرِي الْوَرَق

*Quercus glauca* (S). *Chêne glauque* (F).

شجرة سريرية مهدها اليابان ترغب في المناطق المعتدلة



سنديان افرز



سنديان شور

جامد النسيج ، سنن الحافة ، عروقه متوازية الخطوط عددها يراوح من ٨ الى ١٢ زيباً كل واحد منها ينتهي بسن || تفرقها اهليجي الحراشف . بلوطها طويل نحو ٤ سم قطرها ٢ سم .

#### ١٤٣٤٨ - سِنْدِيَان لَاطِي لَاطِي الزَّهَر \*

*Quercus sessiliflora* (S). *Chêne sessile*, C. à trochets, Rouvre, Durin (F).

نوع سبروتي عديد الضروب يملو من ٢٠ الى ٣٠ م . أوراقها معتقة لا أذنيّة . نصلها ساجي أو ثنائي التفتيص ، خلي البشرة حل صفحته السفلى || تفرقه عادم الاهان ، دقيق الحراشف المتراكبة . بلوطه سوي اللون الخنطي ، مدبب الشّام .



سنديان كستي الورق

#### ١٤٣٤٩ - سِنْدِيَان لُبْنَان \*

*Quercus libani* (F). *Chêne du Liban* (S).

شجرة سبروتية مهددة جبال لبنان تملو من ١٠ الى ١٢ م . أفتانها صغيرة القد لوناً الى الصفار الخنطي . أوراقها عابطة تملو من ٥ الى ١٣ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ . نصلها جامد البشرة ، منشاري الحافة ، عابق الصفعة العليا الشديدة الخضار ، باهت السفلى الصفراء المواج . تفرقها يضيي الحراشف الجلمدة الخملية .



سنديان لاطيه الزهر

#### ١٤٣٥٠ - سِنْدِيَان هَالِي \*

*Quercus aquatica* (S). *Chêne aquatique* (F).

شجرة جادحة ترغب في الموائل الرطبة وقرب مجاري الماء . تملو من ١٥ الى ٢٥ م . أوراقها صغيرة القد ، قصيرة العتق ، مقرفة . نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم . وهو امرط البشرة على صفحته || تفرقها صاجي الشكل . بلوطها غليظة ، قصيرة ، حادة الشّام .



سنديان لباني

#### ١٤٣٥١ - سِنْدِيَان مَدْبَبَ الزَّوْق \*

*Quercus acuta* (S). *Chêne à feuilles aiguës* (F).

شجرة سبروتية مهددة الشرق ، ترغب في المراض الجنوبية المتحدرة . تملو من ٨ الى ١٠ امتار . أوراقها عروّة ، فضية ، مدبية الزام الاخير . نصلها عادم التسنين يطول من ٧ الى ١٤ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . يلو احمل اللون كفيف الزغب ثم ينحرف الى الخضار الاصفر . تفرقها متراكب السافات الحرفية الدقيقة .

#### ١٤٣٥٢ - سِنْدِيَان مِرْبَكِي \*

*Quercus mirbecki* (S). *Chêne de Mirbeck, Zâne* (F). Overcup oak, Mirbeck's oak (E). Mirbeck's elche (D). *Quercia bianca* aquatica (I).

شجرة سبروتية ترغب في المناطق المعتدلة المتحدرة نحو الحارة . مهددة افريقية الشالية واسبانيا . تملو من ٣٠ الى ٣٥ م . ياتلقها زاء . أوراقها عابطة ، منتبلة . نصلها جامد النسيج مفصص الحافة || تفرقها جامد الاهان ، فحين الحراشف القصيرة .



سنديان مرزء

#### ١٤٣٥٣ - سِنْدِيَان مَرْتَد \* ، سِنْدِيَان بِيْطَانِي ، رُوْر \*

*Quercus pedunculata*, *Q. robur* (S). *Chêne pédonculé, Rour, Gravelin* (F). British oak, Female oak, Red oak (E). Steleiche, Roteiche (D). *Rovera, Quercia pedunculata* (I).

نوع سبروتي عديد الضروب . اجماره هرية الشكل تملو من ٣٠ الى ٥٠ م . أوراقها عابطة معتقة طويلة الزناد . نصلها رباعي أو خماسي التفتيص ، ازغب البشرة يلو اخضر اللون ثم ينحرف ويتغير الى أن ينتهي بالاحمر . تفرقها محدد الحراشف الصغيرة القصيرة .

من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٥ . نصلها جامد النسيج ، سنن الحافة ، فسح الاصول ، خلي الصفعة السفلى || تفرقها قلنسوي الشكل . بلوطها صغيرة وقصيرة لوناً الى السرة الخنطية .

#### ١٤٣٤٧ - سِنْدِيَان صَفْصَافِي الزَّوْق \*

*Quercus phellos* (S). *Chêne saule* (F).

شجرة رقيقة ترغب في المراض الجنوبية وفي الاثرية للمتوسطة الانساج الميمنة النور . تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . أوراقها مستطيلة مدبية الزام الاخير ، حسيكة الصفعة . نصلها يطول نحو ١٠ سم . ويعرض ٢ سم . وهو امرط البشرة على صفحته . يلو اخضر اللون وينتهي ، في الخريف ، الى الحمرة الصفراء المواج || تفرقها قلنسوي الشكل ، دقيق الحراشف ، لونه الى الجلمة . بلوطها صغيرة القد ، سراء اللون .

#### ١٤٣٤٣ - سِنْدِيَان صِيْجِي \*

*Quercus chinensis*, *Q. variabilis* (S). *Chêne de Chine, C. variable* (F).

شجرة جادحة مهددة الصين ترغب في الموائل الباردة تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . أوراقها عابطة تملو من ٨ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جامد النسيج . سنن الحافة ، خلي الصفعة السفلى التي تبدو نفسية اللون . تفرقها متعرض الحراشف القصيرة الصلبة .

#### ١٤٣٤٤ - سِنْدِيَان طَوْرَا \* ، سِنْدِيَان التَّوَانِس \*

*Quercus toza* (S). *Chêne tauzin, C. doux, C. brosse, C. angoumois* (F).

شجرة جادحة ترغب في المراض الجنوبية . تملو من ٣ الى ١٥ م . جلودها مدادة ، قارضة ، فاسلة . أفتانها زياء السام وردية اللون . أوراقها عابطة تملو من ٦ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . نصلها خلي الصفعة السفلى || تفرقها صغير القد متباد الحراشف اللرية . بلوطها صغيرة ، لوناً الى السرة الزيتونية .

#### ١٤٣٥٥ - سِنْدِيَان غَاوِي الزَّوْق \*

*Quercus laurifolia* (S). *Chêne laurier* (F).

شجرة جادحة مهددة امريكية . تملو من ١٥ الى ٢٠ م . أوراقها تشبه اوراق النار . نصلها يطول من ٨ الى ٢٠ سم وهو امرط الصفحتين ، جبل الخضار الباقي . تفرقها قلنسوي الشكل ، صنبر الحراشف المقوسة . بلوطها صغيرة القد ، خنطية اللون ، يلوها مواج اسر زيب .

#### ١٤٣٤٦ - سِنْدِيَان كَبِير التَّحْمَر \*

*Quercus macrocarpa* (S). *Chêne à gros fruit* (F).

شجرة سبروتية جملة الشكل مهددة امريكية الشالية . تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . أوراقها عابطة تملو من ١٠ الى ٤ سم . نصلها حيا التفتيص ، صفحة العليا جملة الخضار الزامي اما السفلى فخنطية البشرة لوناً الى الصمبة || تفرقها خنطي الحراشف التي تبدو كاللاداب . بلوطها كبير القد طوله يراوح من ٥ الى ٦ سم . لونه الى الجلمة .

#### ١٤٣٤٧ - سِنْدِيَان كَسْتِي الزَّوْق \*

*Quercus castaneefolia* (S). *Chêne à feuilles de châtaignier* (F).

شجرة سبروتية مهددة القوقاز تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . أوراقها عابطة إشارية الشكل كاوراق الكستنة . نصلها

الجذع والافاندا . اوراقها غليظة اي انها تنقلب من مركبة ريشية ، في عهد الفتوة ، الى فلد بسيطة مبسطة في عهد البلوغ || جميعها من النباتات الراملة مهددا بالبلاد الحارة . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٤٣٦٤ - **سنط أبيض ، هراس** (S). *Acacia albida* (S). *Acacia blanc*, *Mimosa blanc* (F). *White acacia* (E). *Weisse akazie* (D). *Albero bianco* (I).

شجرة زينة سريرية . ساقها مغطاة الحاء اوراقها مركبة عابلة . ازهارها زبدية اللون .

١٤٣٦٥ - **سنط أزرق** (S). *Acacia cyanophylla* (S).

*Acacia bleu*, *Mimosa bleu* (F).

شجرة زينة سريرية تملو من مترين الى ٦ أمتار . فلدها مستطيلة الشكل ، نصلها لإع السنج الاخضر اللون ، الارزق المواج . عناقيدها الزهرية صغيرة القد . ازهارها كروية متوسطة الحجم جملة الصغار الزبدية المتأرجح || ازهارها يسمر طولك شهر آذار .

١٤٣٦٦ - **سنط أزغب** (S). *Acacia pubescens* (S).

*Acacia pubescent*, *Mimosa pubescent* (F).

جنية زينة جادة تملو من مترين الى ثلاثة أمتار . افنانها وراشاتها زياه . اوراقها عابلة مركبة . امشاطها غطية الورقيات تعد من ١٠ الى ١٥ زوجاً . عناقيدها الزهرية محورية وتاجية الاكثر . ازهارها خلية المالحق لوناً الى الصفرة النائية || ازهارها يدوم طوال شهر آذار .

١٤٣٦٧ - **سنط إسطنبول**

هو أليزيا الحرير ، اطلبا .

١٤٣٦٨ - **سنط أسود**

*Acacia nigricans*, *A. rufaefolia* (S). *Acacia noire*, *Mimosa noire* (F).

شجرة زينة جادة مظلية الشكل . افنانها وراشاتها مفضلة الزوايا . راساتها غنية . اوراقها عابلة ، مركبة ، امشاطها خيطة الورقيات المستطيلة ، نصلها الى الخصار المالحق الاسود المواج . ازهارها فردية او غصية التجميع ، فواحة العرف الذكي ، لوناً الى الصفار الكبريتي . ازهارها يدوم طوال شهر نيسان .

١٤٣٦٩ - **سنط أسود الخشب**

*Acacia melanoxylon* (S). *Acacia à bois noir*, *Mimosa à bois noir* (F). *Black wattle*, *Green wattle* (E). *Schwarze akazie*, *Schwarzwattle* (D). *Acacia nera* (I). شجرة جادة هريمية الشكل . كبيرة القد تملو من ١٠ الى ٣٠ م . افنانها مفضلة الزوايا . فلدها سنائية مستطيلة ، نصلها عابق الخصار الاسمر المواج . ازهارها كروية الشكل ، كبيرة القد ، فواحة العرف ، صفارها كبريتي . ازهارها يسمر من آذار الى نيسان .

١٤٣٧٠ - **سنط السنغال ، قتاد ، هساب**

*Acacia senegalensis*, *A. vereke* (S). *Acacia du Sénégal*, *Gommier blanc* (F). *Gum tree* (E). *Weissliche akazie*, *Verekebaum* (D). *Acacia del Senegal* (I).

شجرة مهددا بالبلاد الافريقية تكثر في السنغال يستخرج منها اجود الصوغ العربية .

١٤٣٧١ - **سنط العنقايد** (S). *Acacia pycnantha* (S).

*Acacia à pompons*, *Mimosa à pompons* (F).

شجرة كبيرة الحجم ، غيمية الشكل ، تملو من ١٠ الى

١٤٣٥٤ - **سنط يان مسن الورق**

*Quercus dentata* (S). *Chêne denté* (F).

شجرة سريرية جملة الشكل مهددا باليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . بناتها مستطيلة غليظة زياه الحاء ، زغبها اسفر اللون . اوراقها عابلة ، كبيرة ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتقرض من ١٠ الى ٢٠ سم . نصلها سبك السنج الجامد ، سباعي او ثنائي التجميع . هروقة بارزة خلية البشرة . صفحته السفل زياه طلاء . تفروقتها مستطيل الحرافش الخيطية البنية . بلوطها بيضي الشكل ، متوسط الحجم .

١٤٣٥٥ - **سنط يان مقدوني**

*Quercus macedonica* (S). *Chêne troyen* (F).

شجرة سريرية مهددا بالبلقان تملو من ١٠ الى ١٢ م . افنانها فتيقة صغيرة . اوراقها عابلة ، قصيرة المتق ، تطول من ٤ الى ٦ سم . وتقرض نحو ٢ . نصلها جامد السنج الاخضر على صفحته ، سن الحافة ، عدد هروقة يراوح من ٨ الى ١٢ زوجاً || تفروقتها ضيق الحرافش المستطيلة المقوفة .

١٤٣٥٦ - **سنط يان متفحفي**

*Quercus palustris* (S). *Chêne des marais* (F).

شجرة سريرية تجرد في المناطق ولا تخفى الرمال القاحلة تملو من ٢٥ الى ٤٠ م . اوراقها تطول من ٨ الى ١٢ سم . نصلها ثلاثي التجميع ، ازغب البشرة . خلي الصلع والعمود || تفروقتها صابحي الشكل ، دقيق الحرافش الريفية البريمة الطب . بلوطها متوسطة القد ، كستنية اللون .

١٤٣٥٧ - **سنط يانيسات**

*Cupulifères* (F). هي فصيلة أليوليات من ذوات الفلقين المديسات القناعات .

١٤٣٥٨ - **سنط يك**

*Syndic de faillite* (F). *Assignee in bankruptcy* (E).

هو الوكيل القانوني عن المفلس وعن كتلة الدائنين .

١٤٣٥٩ - **سنط يل \***

*Anamirta paniculata* (S). *Anamirta*, *Coque du Levant* (F). *Cockles plant*, *Cocculus indicus* (E). *Kokkelskörnerstrauch* (D). *Anamirta*, *Coccola di Levante* (I).

نبات بري وزراعي معمر وحيد الجنس والوتع من فصيلة القناريات . مهدد بالبلاد الحارة اخضعها الاسوية . ثماره طيبة ، غدرة ، مسهلة ومقوية شائعة الاستعمال تدعى سم السمك اطلبا .

١٤٣٦٠ - **سنسكار**

*Marte commune* (F).

هو السمور آشالع ، اطلبا .

١٤٣٦١ - **سنسقي**

*Plant enraciné* (F).

*Rooted slip* (E).

كل فسله او عقلة وما اشبه استقلت بمجولها وجزا فرها .

١٤٣٦٢ - **سنسنة** (F). *Pointe des vertèbres du dos* (F).

حرف فقار الظهر سنان .

١٤٣٦٣ - **سنط ، آفاليا**

*Acacia* جنس اشجار وشجيرات ونباتات برية وصناعية وزينية من فصيلة القرنيات . انواعه زهاء ٤٠٠ مغلها شاك



سنطيل



سنط اسود الخشب



## ١٤٣٧٨ - سَطَّ صَمْنِيّ، طَلَح، أم غيلان، بَنَك

*Acacia gummifera* (S). *Acacia gommier* (F). *Marocco gum tree* (E). *Berberische akazie*, *Talchbaum* (D). *Acacia gummifera* (I).

شجرة من المضاد كثيرة الشوك الحاد المنفذ مهددا أفريقية الشالية وقد انتشرت في جميع الاطراف الحارة . يستخرج منها صمغ السط الطيب الرائحة الكثير الاستعمال .

## ١٤٣٧٩ - سَطَّ عَرَبِيّ \*، قُرْط، شَوْكَة لَيْسِيَّة

*Acacia arabica* (S). *Acacia arabique*, *Mimosa arabique*, *Gommier rouge* (F). *Gum-arabic tree*, *Egyptian acacia* (E). *Arabischer gummibaum* (D). *Acacia arabica* (I).

شجرة برية وزراعية مبذولة في الشرق العربي . يستخرج منها الصمغ الاخر وهو متوسط الصنف يعتبر دون صمغ الطلع والحشاب .

## ١٤٣٨٠ - سَطَّ عَرَبِيّ، سَطَّ جَنْبَرِيّ

*Acacia juniperina* (S). *Acacia-génévrier*, *Mimosa-génévrier* (F).  
جنبه تزيينية سبروتية تملو من مَرَيْن الى ثلاثة امتار .  
افتادها اسطواني زياح الحاد . فلها صغيرة القد ،  
عرعرية الشكل ، صلبة النصل ، شاذكة المقصم ، لونها  
الى الخضار المايق . ازهارها سبيلة التجميع لونها الى  
الصفار اللبوني || ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

## ١٤٣٨١ - سَطَّ عَسْكَي، ظَبَّة

*Acacia mellifera* (S). *Acacia mellifère*, *Mimosa mellifère* (F).

شجرة تزيينية سبروتية جميلة الشكل تملو من ٣ الى ٥ امتار .  
مهددا الين وهام بحر القلزم .: اوراقها عابلة  
مركبة . ازهارها عقنودية التجميع ، صلبة اللون . صمغها  
قليل النزارة جيد الصنف .

## ١٤٣٨٢ - سَطَّ كَاذِب

هو الرويينية السطية ، أطلبا .

## ١٤٣٨٣ - سَطَّ كَاشَو، كَادَه نَدِي، خَيْرِا

*Acacia catechu* (S). *Acacia au cachou*, *Cachoutier*, *Catéchu* (F). *Catechu tree*, *Khair tree* (E). *Katechu akazie*, *Kace-mimosa* (D). *Acacia di cachou* (I).

نوع من السط الزراعي يستخرج منه الكاشو .

## ١٤٣٨٤ - سَطَّ لَوْتِي، سَمَر

*Acacia spicarpa* (S). *Acacia à spirales*, *Mimosa à spirales* (F).

شجيرة برية وزراعية كثيرة الشوك تستعمل للتسج سابقها  
قصيرة . فروصها واقتادها عديدة بتدلية الاطراف . اوراقها  
مركبة ، عابلة . ازهارها صفراء اللون ، قليلة الكثافة ،  
خفيفة العرق .

## ١٤٣٨٥ - سَطَّ مُجَنَّب

*Acacia alata* (S).

*Acacia allé*, *Mimosa allé* (F).  
جنبه تزيينية رפה تملو نحو المتر . اوراقها البانسة  
فلدية ، قنفا ، جنبانية الشكل تنتهي بمحكة حادة .  
ازهارها الى الصفرة الباقية || ازهارها يستمر ٤ اشبيع  
ايدها من اواسط اذار .

## ١٤٣٨٦ - سَطَّ مُسَمَّح

*Acacia ricana* (S).

*Acacia de Ricé*, *Mimosa de Ricé* (F).  
شجيرة سبروتية تزيينية تملو من مَرَيْن الى ٦ امتار .  
اقتادها مفلمة بتدلية الاطراف كالقرب . اوراقها فلدية

٣٠ م . فلها منجل الشكل ، مالم الصفحة الالامعة  
الباقية الخضار . عناقيدها الزهرية جامدة مستطيلة .  
ازهارها كبيرة القد ، عطرية العرق ، لونها الى الصفرة  
اللبنية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٤٣٧٢ - سَطَّ العُتْبَر

*Acacia farnesiana* (S). *Acacia farnèse*, *Mimosa farnèse*, *Cassier*, *Cassie* (F). *Cassia*, *Popinac*, *Sponge tree* (E). *Antillen-akazie*, *Schwammbaum* (D). *Acacia farnese*, *Farnesia odorosa* (I).

جنبه سبروتية تزيينية وصناعية تملو من مَرَيْن الى ثلاثة  
امتار . اوراقها عابلة مركبة . امشاطها وزرية ثلاثية او  
خماسية او سباعية . وريقاتها غطيلة تمتد من ١٥ الى  
٢٠ ذوبا || ازهارها كروية ، كبيرة القد ، فواحة  
العرق الطري يستخرج منها بالتقطير عطر العنبر  
المشهور || ازهارها يستمر طوال الصيف واخره .

## ١٤٣٧٣ - سَطَّ غُطَيّ الْوَرَق

*Acacia linearis* (S). *Acacia à feuilles linéaires*, *Mimosa à feuilles linéaires* (F).

شجيرة تزيينية تملو من مَرَيْن الى ٥ امتار . فلها ثلاثي  
العروق ، نصلها عظمي الشكل يطلو من ١٥ الى ٢٥ سم .  
ويرض نحو ٢ م . ازهارها صغيرة القد ، سبيلة التجميع ،  
زائفة الصفار الكبيري || ازهارها يستمر طوال شهر  
شباط .

## ١٤٣٧٤ - سَطَّ دَمَاع، سَيَال

*Acacia seyal* (S). *Acacia seyal*, *Arbre à gomme*, *Dellie* (F). *Shittah tree*, *Shittim wood*, *Thirsty thorn* (E). *Seyal akazie* (D). *Acacia seyal* (I).

شجرة برية وزراعية كثيرة العصارة المسنية . صمغها  
يعتبر دون صمغ القُرْط .

## ١٤٣٧٥ - سَطَّ رَانَسِي، سَطَّ كَثِير الزَّهَر

*Acacia retinodes*, *A. floribunda* (S). *Acacia floribond*, *Mimosa résineux* (F).

شجرة تزيينية سبروتية دائمة تملو من ١٠ الى ١٥ م .  
اقتادها الرخصة دقيقة طوية . اوراقها فلدية خفيفة  
مستطيلة وصيدة العرق . عناقيدها الزهرية تاجية الانكاز  
ازهارها كروية ، فواحة العرق ، صفراء اللون .  
ازهارها يستمر طوال السنة .

## ١٤٣٧٦ - سَطَّ مَرَح

*Acacia cultriformis* (S).

*Acacia-coutre*, *Mimosa-coutre* (F).  
جنبه تزيينية جامدة تملو من متر الى مَرَيْن . سابقها  
وفرصها اوراقها سرسة . فلها يفسية الشكل ، جامدة  
النسج البحري اللون . ازهارها عقنودية التجميع ،  
عناقيدها رقلة مستطيلة || ازهارها يستمر ٤ اشبيع  
تبدئي في اوائل ايار .

## ١٤٣٧٧ - سَطَّ شَالَع \*، سَطَّ عُنْبَرِيّ، مِيْمُوزَا

*Acacia decurrens*, *A. dealbata* (S). *Acacia parfumé*, *Mimosa commun* (F). *Silver wattle*, *Wattles* (E). *Silberakazie*, *Weissliche akazie* (D). *Acacia dealbata* (I).

شجرة سبروتية مبذولة تملو من ٨ الى ١٢ م . اقتادها  
واقتادها خلية الحاد . اوراقها عابلة مركبة . امشاطها  
عديدة . وريقاتها حرشفية . نصلها منسبب الصفحة  
في البهار ، ثنايا في البيل || ازهارها فواحة العرق ،  
لونها الى الصفرة الزائفة . يستخرج منها بالتقطير عطر  
العنبر || ازهارها يستمر من كانون الى اذار .



سط شامح



سط عربي

إلى ٢٠ سم. تتميز بأعينها الكبيرة المستديرة ، بزناقتها الظهرية المستطيلة الشائعة الشاككة ، بشكل ظهورها وبطولها المقطوعة المتوتر || ألوانها بيضاء البهتان يكثر فيها الأحمر والأزرق والأبيض والبرتقالي والوردي والغني .

### ١٤٢٩٧- سُفَط أَحْمَر ، تَيْلَن

*Holocentrum rubrum* (S). *Holocentre rouge* (F). سمكة بحرية يبيض من السفق وفصيلة العقنديات . أعطانها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط . يكثر وجودها قرب الشواطئ والمخادج المصرية واليمنية || جسمها اهليجي الشكل ، معتدل التبطيط بطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الحمرة الازرقوانية يعلوها موج اسف . رأسها شبه مخروطي الشكل قصير الخطم . عينها كيرتان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة كبيرة ، مستطيلة ، شاككة القسم الاسامي . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

### ١٤٢٩٨- سُفَط شَافِي

*Holocentrus chani* (S). *Holocentre chani*, *Chani* (F). سمكة بحرية يبيض من السفق . أعطانها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط اخصها المخادج التركية واليونانية || جسمها اهليجي الشكل ، معتدل التبطيط بطول نحو ١٨ سم. ثوبها الى الرعدة السمر المخرافة الماخجات القفصية . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم . فكها الاسفل يتقدم الاصل . عينها كيرتان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١٥ منخية الاطراف الحادة ١٥ مفصلية سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف مأكول .

### ١٤٢٩٩- سُفَط غَنَام

*Holocentrus ghanam* (S). *Holocentre ghanam* (F). سمكة بحرية يبيض من السفق . أعطانها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط اخصها المخادج الاقريقية || جسمها اهليجي الشكل ، معتدل التبطيط بطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الكلمة القفصية يعلوها في جانبيها غطان أفغان وصف من الخفصات صغير النقط المستديرة . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم . فكها متعادلان . عينها كيرتان ، بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٠ شعاع منها ١١ منخية الاطراف الحادة ٩ مفصلية سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة ، هلاية الشكل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

### ١٤٣٠٠- سُفَط مَبْدُول

*Holocentrus vulgaris* (S). *Holocentre commun* (F). *Common Holocentrus* (E).

سمكة بحرية يبيض من السفق . أعطانها معظم اقالم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || سرسها المخادج . لمخنها الحياتي كرسوي . جسمها شبه اهليجي الشكل ، معتدل التبطيط بطول نحو ١٨ سم. عرقفتها سننة الخمار . ثوبها متداخل الالوان تغلب فيه الشبهة القفصية ويعلوها في جانبيها خط خمس البقع المستديرة البرتقالية اللون . زناقتها الى الرعدة السمر يعلوها موج اسفر . رأسها يرمي الشكل ، قصير الخطم . شفتها متوسط الانفراج . فكها متعادلان . عينها كيرتان ، ناشزتان ، رفيضا الازتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة ، شائعة ، مستطيلة تتألف من ١٧ شعاع منها ١١ منخية الاطراف الحادة ٦ مفصلية سرسة . زعنفتها الشرسية

مستطيلة لوها الى الخضار البحري || انزهارها صفلية ، نغمة ، كثيفة التجميع ، متدلية ، لوها الى الصفرة الشاحبة || انزهارها يستمر نحو ٥ اسابيع ينتهي في اوائل نيسان .

### ١٤٣٨٧- سُفَط مُسْتَطِيل الْوَرَق

*Acacia longifolia* (S). *Acacia à longues feuilles*, *Mimosa à longues feuilles* (F).

شجرة تزيينية تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. أنفادها مفصلة الزوايا . فلدها سناني الشكل بطول من ٥ الى ٢٠ سم. ويبرص من ١٠ الى ٣٠ م. سايها الزهرية مستطيلة . انزهارها صغيرة اللثة شديدة الصفار || انزهارها يستمر من آذار الى ايار .

### ١٤٣٨٨- سُفَط مَسْخَاك

*Acacia armata* (S). *Acacia armé*, *Mimosa armé* (F). جنبة تزيينية سرهوية شاككة تملو من مترين . فلدها يبقية الشكل تطول نحو ٣ م. انزهارها عشكولية التجميع ، محورية الازتكاز ، لوها الى الصفار الباهت . انزهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

### ١٤٣٨٩- سُفَط هِلَالِي

*Acacia lunata* (S). *Acacia en croissant*, *Mimosa en croissant* (F). بحلة تزيينية سرهوية تملو نحو ١٠٠ سم. فلدها هلالى الشكل بطول نحو ٢٥ م. عناقيلها الزهرية صغيرة الحجم تحوي من ٤ الى ١٠ اذوار لوها الى الصفرة القامة . انزهارها يستمر من شباط الى آذار .

### ١٤٣٩٠- مُسْطَطَات

*Mimosées* (F). *Acacia*, *Mimosa* (E). سهل من فصيلة القرنيات . انواعه زهاء ١٥٠٠ منها الاجار والشجيرات والجنبايات والاشواب الممرة . منبها الاصقاع المخارة والمعدلة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية . انزهارها صغيرة منفردة او عشكولية التجميع ، محورية وتاجية الازتكاز ، ثلاثية او رباعية او خماسية الاجزاء .

### ١٤٣٩١- سِنَع

*Jointure des doigts* (F). *Jointing of fingers* (E). هي السلاي التي تصل ما بين الاصابع والرسغ ، ج استماع .

### ١٤٣٩٢- مُسْغَبَة

هي ابن عرس ، اطليه .

### ١٤٣٩٣- سَتَف

راجع تخم .

### ١٤٣٩٤- سِنَف

هو الاقننا المشجرة ، اطليا .

### ١٤٣٩٥- سَنَكَة ، حَبَبَكَة ، حَبَبَكَة ، عُلْكَة ، قَرَن

*Gousse*, *Ecale*, *Cosse* (F). *Husk*, *Pod*, *Shell* (E). ثمرة. فصيلة القطنيات كالفلو والبس والبليلة وغيرها . وهي وعاء ذات مصراعين يفتح بعد تمام نضجه عن بعض البزور .

### ١٤٣٩٦- سُفَط

*Holocentrus* (S). *Holocentre* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة العقنديات الشاككات الزمائف . انواعه المعروفة نحو ٣٠ موطنها بحار المناطق الحارة . جسمها صغيرة القد مأكولة ، طولها يراوح من ١٢



سفق



سفق غنام



سفق مبدول

تقابل الظهيرة . زعنفتها الذيلية فاقرة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

#### سفنقيات Plagiostomes

مرتبة اسماء بحرية من رتبة الاطلاق تشمل القرشيات والسفنقيات البحرية .

١٤٤٠٢ - سنقران هو العرن ، اطلبه .

١٤٤٠٣ - سنقرورة مَرَحَة

Ctenophora festiva (S). Ctenophore agréable (F).

حشرة لافضية من ذوات الجناحين وفصيلة القمصيات . جسمها معتدل القد قريب الشبه بقمص البقول يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى السمرة الملهله يعملوا تجذيع وتبيج اصفر . زباناها قلاويا الشكل ، عادما التهديد . روشاها الى الصفار الخجلي تملو بقية سمراء في وسط الزام الاخير || الاثنى اكبر قدماً من الذكر . بطنها مردني الشكل . تظهر الحشرة الجملة من ايار الى تشرين الاول . تألف الحراج والغابات والحدائق والبساتين || تمتع الاثنى مكها في لءاء الانجار الحمية المتفونة . يرقاتها تميش على المواد النباتية والعفوية المنحلة .

١٤٤٠٤ - سنقيات

هي القرنيات فصيلة نباتية ، اطلها .

١٤٤٠٥ - سنقياتاليه Sanvitalia (S). Sanvitalie (F).

جنس نباتات عشبية حولية ترينين من الثرونيات وفصيلة المركبات . انواعه ثلاثة . اوراقها منتقة متعاقبة . نصلها يضيي الشكل مهدب القاعدة لونه الى الخضار الاحمر . اذعارها جزؤية الرؤوس الوسطي ، رتقالية السينات الحاربية . يزورها مجتمعة ثنائية او ثلاثية الحك . اذعارها يستمر طوال الصيف .

١٤٤٠٦ - سنقر \* ، سنقرور ، سنقر ، سنقرور

Hierofalco (S). Gerfauc (F). Gerfalcon, Gyrfalcon (E).

جنس طير من عماره الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد الباردة . انواعه ستة جميعها من الجوارح الكبيرة الجفة . الجميلة الشكل والحندام . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويصلها من ١٣٥ الى ١٥٠ سم || اثنائها تختلف مع النوع والصمر يغلب فيها الابيض . مناسرها قوية منتقة البهرة الذرية الحادة . سواقطها كبيرة القد ، ذالقة الاطراف . اذناها مستطيلة جالسة . غخالها قوية . تألف الاجراح والجبال المشرفة على البحر . تصيد السجباب والاراب وتختلف القروام والبوط والاوز والنورس البع .. تنثر في الانجار البسقة او بين شجاليه الصخور البصرة . اثنائها تبضي وتحضن من ٤ الى ٥ رفنات نحو ٤ اسابيع . اما انواعه الستة فهي :

Gerfauc blanc (F).

سنقر ابيض

Gerfauc de Norvège (F).

سنقر النروج

Gerfauc d'Islande (F).

سنقر ايسلندة

Gerfauc du Groenland (F).

سنقر غروينلندة

Gerfauc de Hailball (F).

سنقر هليل

Gerfauc du Mexique (F).

سنقر المكسيك

Egretta garzetta (S).

\* سنقريل

Aigrette garzetta (F). Little egret (E).

طائر من الباشونيات يحرب المناطق الجنوبية الممتدة من

اليابان الى اوردية وافريقية واسرالية || طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى البياض الصاني . مقاره اصفر الانتساب . اسود الجسم . يتميز بريشه الخفاني الفاخر الصنف . يعيش اسراباً كبيرة . يألف المنابع . قوته الاسماك والصفادع وتختلف الحشرات . يدشن بين الامل والقصب اثنائه تبضي وتحضن ثلاث بياضات .

١٤٤٠٨ - سنقراني Cénomanian (F).

Cenomanian (E).

صاف حصليي يعتبر قاعدة سانات الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤٠٩ - سنقر Sommet d'une plante (F).

Summit of plant (E).

ارفع جزء في النبات .

١٤٤١٠ - سنقر Zébu (F). Zebu, Indian ox (E).

السنة ج سم هي الابقار الدربانية الرقيقة الحاروك السامي الشكل . اطلب درباني .

١٤٤١١ - سنقر Cyme

شكل من الانزعاج النوري قوله ان المالحق الزهرية تنشق في نقطة واحدة وتبلغ علواً واحداً متصارياً في الانتساب . والازكازك .

١٤٤١٢ - سنقر Arbre à production alternative

نمت تعريف يطلق على كل شجرة تحمل سنة وتضع اخرى كما في الزيتون .

١٤٤١٣ - سنقراني Sénonien (F). Senonian (E).

صاف حصليي يشمل النضيد الاوسط من الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤١٤ - سنقر هو الكسون ، اطلبه .

١٤٤١٥ - سنقر Felis (S). Chat (F). Cat (E).

جنس حيوانات صغيرة القد من فصيلة السنوريات ورتبة القوام منها رية وحشية ومنها انيسة الولة لا يخلو منها بيت || اسماء السنور كثيرة اشهرها القط والحمر والقبون والبس والبسين والخليد والخيوط والحمرس والدلم واليزون والككيس والحارون والفتار || اما كتيه فابو خدانش . وابو غزوان وابو الهشم وابو شامخ .

١٤٤١٦ - سنقر الزباد هو الزبادة ، اطلها .

١٤٤١٧ - سنقر بيري Chat tigré (F).

حيوان لاسم مقترس يدعى مري ، اطله .

١٤٤١٨ - سنقر بري \* ، سنقر Felis catus, Catus ferus (S). Chat sauvage (F). Wild cat (E).

اكبر انواع السنابر واشداً بلساً واصليها عوداً . طوله الكامل يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . جسمه من ٣٨ الى ٤٤ وذنيه من ٣٢ الى ٣٦ اما علوه الى الحاروك فواوح من ٣٧ الى ٤٣ سم . ثوبه الى الصبهة الصفراء والسرمار يملو تخطيط وتجزع اسود || يألف الاجراح يصرح في الليل وينساق الانجار . يتمدى على كل حيوان وطائر يستطع اليه سبيلاً .



سنقر



سنقريل



سنور بري

١٤٤٣٠ - سَهَقِيَّات المَنَاقِير

هي مشروبات المناقير ، اطبخها .

Epillet (F). Spikelet (E).

١٤٤٣١ - سَهَقِيَّة

هي وحدة التزهير في شكل الازهار السنبل . مجموعها المرفوف المتتابع الازتكاز على محور واحد يؤلف السنبلة .

Parapside (F). Parapside (E). ١٤٤٣٢ - سَهَقِيَّة ٥

السنبلة جزء من الحلقة الصدرية الثالثة ، عند الحشرات ، توصل لميلة اليرباد بالجناح وتحتها فيه . وهما اثنتان يمينى ويسرى .

١٤٤٣٣ - سَهَقِيَّة

السنيق كوكب نير ابيض الضوء .

١٤٤٣٤ - سَهَقِيَّة ٥

Mitra (S).

Mitre (F). Mitra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وفصيلة السليميات . انواعها المرفوفة كثيرة العدد والمعاصر منها يتناهز ٢٥٠٠ اعطائها بحار البلاد الحارة والاستوائية . معظمها يعيش على مذائق الرجان || اصداؤها عرناصة الشكل ، غروطية الاغقاب المخلزنة مستطيلة الفروج الفسيحة . اجسامها عادمة الشصور ، صغيرة الرؤوس ، ثنائية الفراس ، مستطيلة الاعظام || انواعها الموجودة في البحر الابيض المتوسط صغيرة القد باعثة الالوان . اما انواع بحار المناطق الاستوائية فكبيرة القد ، جملة الزخارف والالوان الزاهية || يعنوها في الهند « ماذنة » .

Mitridae (S). ١٤٤٣٥ - سَهَقِيَّات

Mitridés (F). Mitridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل امانيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، بعضها من متحشرات الاراضي المائية والبيض الآخر معاصر || اصداؤها بليغة المخلزنة ، مديبة الاغقاب ، خفيفة التجويف للقاعدي اللانسب الاستدارة || اعرف اجناسها واشهرها السنبية .

١٤٤٣٦ - سَهَقِيَّة ، سَهَقِيَّة

السها والسهي نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

Steppe ١٤٤٣٧ - سَهَقِيَّة ، قَهَقِيَّة

البرية والقلاذ وكل منبسط سهل بعيد الاطراف الفسيحة الممراتية .

Squame (F). Squama (E). ١٤٤٣٨ - سَهَقِيَّة

حشفة صغيرة طبيعية او عارضة .

Squameux (F). Squamous (E). ١٤٤٣٩ - سَهَقِيَّة

نمت تعريفي وصي يطلق على الاشنية الحيوانية الحشفية السطح .

Squamates (F). ١٤٤٤٠ - سَهَقِيَّات

Squamata (E).

رتبة من الزحافات . التصنيف الحديث يقسمها الى مرتبتين : مرتبة الحيات ومرتبة العظائيات .

١٤٤٤١ - سِنُور دَاجِن \*

Felis domestica, Catus domesticus (S). Chat domestique (F). Domestic cat (E).

هو القط المعروف باليس وأخر والخيول والخيول واليسين . ضره كثيرة البدن اعطاهما السلام . الاثني اصفر قدماً من الذكر ، عجلها يوم نحو ٩ اسابيع وفي قنص من ٣ الى ٦ جراء تبصر النور بعد وضعها باسبوعين .

١٤٤٤٠ - سِنُور شِيرَازِي \* ، قَطَّ اَنقَرَه

Catus angorensis (S). Chat angora (F). Angora, Angora cat, Persian cat (E).

ضرب من السنور الداجن هي الخلق مستطيل الورب الجلل الناعم .

١٤٤٤١ - سِنُور مُصَفَّد \* ، سِنُور مَرِين ،

Catus maniculatus (S). سِنُور مصري

Chat gané (F). Egyptian cat (E).

نوع من السنائر البرية والداجنة مهدد بلاد النوبة . قنصه المصريين في عهد الفراعنة وانتقل مع الرحالة وقوافل التجار من بلاد الى بلاد فوصل الى اوروبا عن طريق الجزيرة وسورية وتركيا ووصل الى الاندلس عن طريق ليبيا وقنصوا وجزائري . طوله الكامل نحو ٧٨ سم . جسمه ٤٤ وذنبه ٢٤ ثوبه سوي اللون يمتد عند الظهر . قوامه رفيعة مجزعة .

١٤٤٤٢ - سِنُور مَنُول \*

Catus manul (S).

Chat manul (F). Manul cat (E).

نوع من السنائر البرية القوية الشديدة التشط . مهدد جبال وياتي المنحول . طوله الكامل ٧٨ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٢٨ اما علوه فنحو ٤٥ سم . ثوبه مزيج من الاصفر والابيض والاسمر رأسه مبيج بالاسود . غداء مجزعا بالاسر المابق . اذنان صغيرتان . ذنبه مطوق التجزيع بالاسود .

١٤٤٤٣ - سِنُورِي

Félin (F). Feline (E). نمت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى فصيلة السنوريات .

١٤٤٤٤ - سِنُورِيَّات

Felidae (S).

Félidés (F). Felidae (E).

فصيلة حيوانية من رتبة الواسم تشمل السنور والاسد والبر والثر والوشق والناق الخ .

١٤٤٤٥ - سِنُور ٥

Nidicole (F). نمت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تنقف بشيلة عريضة لا تستطيع الاستغناء عن ابوها بعض الوقت .

١٤٤٤٦ - سِنُور ٥

هو الخطاف ، اطليه .

١٤٤٤٧ - سِنُور ٥

هو الزجم من كليات القدم ، اطليه .

١٤٤٤٨ - سِنُور

Alternativité de la fructification صفة الاشجار المتناوبة الحمل . يقال نبات سنو ورجرة سنه .

١٤٤٤٩ - سِنُورِي ، حَوِّي

Annual (F).

Annual, Yearly (E).

هو كل نبات يزهر في الحول الذي ينبت فيه ثم يذبل ويموت عقب الامطار .



سنور داجن



سنور شيرازي



سنور مصفد



سنور منول



سنبية

١٤٤٥٥ - **سَهْلُون** (F). **Vive**

جنس اسماك بحرية مشهورة باسم ترخون، اغلب ترخون.

١٤٤٥٦ - **سَهْلُون صَغِير** (F). **Vive petite**

سمكة بحرية تدعى أيضاً ترخون صغير، اطلها.

١٤٤٥٧ - **سَهْلُون عَنكَبُوتِي** (F). **Vive araignée**

سمكة بحرية تدعى أيضاً ترخون عنكبوتي، اطلها.

١٤٤٥٨ - **سَهْلُون مَبْدُول** (F). **Vive commune**

سمكة بحرية تدعى ترخون مبدول، اطلها.

١٤٤٥٩ - **سَهْلُون مَشَعِ الرَّاس**

**Vive à tête rayonnée** (F).  
سمكة بحرية تدعى أيضاً ترخون مشع الرأس، اطلها.

١٤٤٦٠ - **سَهْلُونِيَّات** (F). **Trachinidés**

فصيلة اسماك بحرية تدعى ترخونيات، اطلها.

١٤٤٦١ - **سَهْجُج** \* (S). **Haliastur vocifer**

**Pygargue vocifer** (F). Also called huard, African sea eagle (E).

طائر من الشياطين ينتمي إلى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. يقال أنه من أجل العقبان وأحبها وأجلها. موطنه القارة الإفريقية. طوله نحو المتر. ثوبه أبيض فاحش. رأسه وقنقه وصنقه وبؤشه وباطن منقعه وانيك إلى البياض الثلجي. ظهره وظاهر منقعه وسنمه إلى السواد الأزرق المرائج. مخالبه صفر || قوته الطير والاسماك والحيوانات الصغيرة ولا يفت من اللسر أبناً شاهده كأن له في اقتناصه لذة خاصة.

١٤٤٦٢ - **سَهْلُك**، **عَقَاب مُؤَزَّرَة**

**Pseudaeetus, Aquila fasciata** (S). **Pseudaeetus, Aigle à queue barrée** (F).

طائر من العقبان وصيد الجنس والنوع. جسمه مستطيل القند رصنه كاسي الريش. مخالبه طويلة. ثوبه إلى السرة الصفراء. منقعه مؤزر بالأبيض. ذنبه مشوح بخطوط متعرجة لونها إلى البياض الباهي || وهو من العقبان الأوابد موطنه يمتد من الهند إلى الشرق الأوسط واليابان وإيطاليا وإسبانيا وأفريقية الشمالية. يألف الغابات والأحراج ويجاري الماء وفضاف البحيرات. يصيد البط والوز والجمع والحوسل والحمام والدياج. يلدن عشه في صدور الصخور المنينة النائية. أثناء تبيض رقتين تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع.

١٤٤٦٣ - **سَهْلُون** (F). **Pseudaeetus**

السهم ضرب من العقبان يدعى أيضاً السهلوك، اطلها.

١٤٤٦٤ - **سَهْلِير أَشْكَال** (S). **Sehirus dubius**

**Séhire doux** (F).

حشرة من السهير وفصيلة الفاسياتيات. جسمها صغير القند، مبسط، اهليلجي اللون، وطول نحو ٨ مم. || ثوبها إلى الزرقة البنفسجية يعلوها موج شكل يسود فيه الاخضر فالسود فالأخضر || وأنها معتدل الحجم، قليل التكاثر. عظمها معتدل الطول. يتهاها صفيحان، ماحتان. زباناها مستطيلان. كرسها محدد الظهر.

١٤٤٤١ - **سَهْل** (F). **Plaine** (F). **Plain, Flat country** (E).

سهل ج سهل: هي الاراضي المستوية الطرح. مصدرها يمد إلى عاملين اساسيين: الارساب والاحتات والتسوية.

١٤٤٤٢ - **سَهْم** (F). **Action** (F). **Share** (E).

هو حصة أحد الشركاء في شركة مساهمة. وهو يبادل جزءاً من مجموع الاجزاء التي قسم إليها رأس مال الشركة.

١٤٤٤٣ - **سَهْم**، **حَصَة** (F). **Part**

هو جزء من ذمة مالية.

١٤٤٤٤ - **سَهْم الإِثْتِفَاع**، **سَهْم التَّمَتُّع**

**Action de jouissance** (F).

هو السهم التي دفعت قيمته وما زال حاملة يتقاضى ربحاً سنوياً عنه.

١٤٤٤٥ - **سَهْم الرَّامِي**

كوكب نير من برج الرامي المعروف ببرج القوس.

١٤٤٤٦ - **سَهْم المَاء** (F). **Sagittaire**

هو القطعة جنس نباتات مالية من المزاريات.

١٤٤٤٧ - **سَهْم الصَّاب** (F). **Action de quotité**

هو كل سهم لا يشارك فيه إلى قيمة معينة من القفود.

١٤٤٤٨ - **سَهْم إِمْتِيَاك**، **سَهْم مُقَصِّل**

**Action de préférence, A. de priorité** (F).

هو السهم الذي يجازي بالنسبة إلى السهم الاخرى إما بزيادة حصته أو بالأرباح أو في اقتسام الشركة عند حلها أو في حق التصويت أو في هذا كله مجتمعا.

١٤٤٤٩ - **سَهْم دُو عِلَاة** (F). **Action à prime**

هو السهم الذي يصدر بسعر أعلى من سعر المسى.

١٤٤٥٠ - **سَهْم رَأْس المَال** (F). **Action de capital**

هو السهم الذي تقابله حصة في رأس المال سواء أكانت عيناً أم نقداً يقابله سهم العمل أو سهم الصناعة الذي تكون الحصة فيه عملاً بدنياً.

١٤٤٥١ - **سَهْم قَبْضِي** (F). **Action d'apport**

هو السهم الذي يسلم إلى الشريك مقابل تقديم حصته عيناً.

١٤٤٥٢ - **سَهْم حَامِلَة** (F). **Action au porteur, Titre au porteur**

**Bearer certificate, B. bond** (E).

هو السهم الذي لا يبين فيه اسم شخص معين وتكون حيازته لأبواب ملكيته.

١٤٤٥٣ - **سَهْم مَدْفُوع القِيمَة** (F). **Action libérée**

هو السهم الذي دفعت قيمته كاملة أو كان ممدداً لحصة قدمها حاملة عيناً.

١٤٤٥٤ - **سَهْم مُتَعَدِّد الأَصْوَات** (F). **Action à vote plural, A. privilégiée**

هو من السهام التي تحوز حلتها في الجمعيات العمومية أصواتاً أكثر مما لحصة السهام الاخرى التي تتماثل معها سراً.



سَهْجُج

١٤٤٧٥ - سَوَاعِد (F). Vaisseaux mammaires (F).  
Mammary ducts (E). هي مجاري الحليب في الفرس .

١٤٤٧٦ - سَوَالِف (F). Epizootie (F).  
مرض المال وعلاته من آفة تصيبه .

١٤٤٧٧ - سَوَام مُتَوَحَّج \* (F). Cyanocitta cristata (S).  
Cyanocitta huppé (F). Blue Jay (E).

طائر من فصيلة الغربان . يعتبر من أجل طيور أمريكا الشمالية . يألف الإحراج والغابات . قوته الحشرات والبلوط والثمار والبذور ويبيض العصافير وجلايطها || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . صفته ألبيا ، من الرأس إلى الذنب ، زرقاء اللون سفاه المالح . صفته السفل من الزور إلى الأنيك ، ورياء اللون يضاء المالح . خط أسود يمتد جبهة وقلاذ سوداء تلوّن عقه . جناحاه وذنبه مجذعة بالأسود والاريد . رأسه متوج بكشفة سوداء يعطوها موج أزرق || يدشن عفه في الأشجار الرقيقة . الاثن تحضن سدعا من ٤ إلى ٥ بيضات بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

١٤٤٧٨ - سَوِيرُفُسْفَات (F). Superphosphate  
من الاسمدة الكيماوية الرئيسية . يشتمل عنصر الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد الزلالية الموجودة في الخلايا النباتية || خواصه وصفاته عديدة أمبرها :  
- حفن جذور النبات على الانشباب والتكاثر .  
- يحث النبات على إزهار الانزهار وجودة البوليح وسن التأثير والقند ومنع الانعاص .  
- تنشيط وحماية المادة البنية في السماء وبرادة الجذور وتقوية المناعة الذاتية وتمكينها من السمود في وجه الامراض الجرثومية .  
- الحول دون شذوذ الازوت وعواقبه الوضيمة فبا لو زادت نسبتة من المعدل الاقصى .  
والسورفسفات على اشكال منه المادي والمزدوج والمثلث وهذا يعود الى نسبة ما يحوي من الحامض الفسفوري القابل للذوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || يذر على التربة كالبوتاس قبل الزراعة ببعض الوقت ويعطمر جيدا وذلك لتتمكن الحماض الطبيعية مع انفعاها الكيماوية من تحويله الى غذاء قابل للتشيل عنه حاجة النبات اليه .

١٤٤٧٩ - سَوِيرُفُسْفَات الْعِظَام (F). Superphosphate d'os  
من الاسمدة الفسفورية المضموية الجزيلة النفع يحوي من ١٢ الى ١٨٪ من الحامض الفسفوري القابل للذوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || وهو بطلي الانفعاال ينشط البيئة الجرثومية ويحفها على التكاثر النغمي .

١٤٤٨٠ - سَوَجَر (F). Oléastre (F).  
هو الخلال الضيق الورق ، اطليه .

١٤٤٨١ - سَوَحَر هو الصفصاف ، اطليه .

١٤٤٨٢ - سَوْدَق \* ، صَقَرُ الْبَطْ (F). Falco nigriceps (S). Faucon des canards, Aléte (F).  
طائر من الصقور القواطع التي تجوب البلاد الممتدة الحرازة . جثته تقارب جثة الشاهين وهو امر الريش ،

جثتها وحنيبا ظهرها متادلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السرة . قوائمها مبشرة الحلب القصير || راحتها كركية .

١٤٤٦٥ - سَهِيرُ مَلْطُخ (S). Sehirus maculatus (S).  
Séhire maculé (F).

حشرة من السهير وفصيلة الفاسياتيات . جسمها صغير اللد ، مقلطح ، شبه يضي الشوزن ، بطول نحو ٧ م . || ثوبا الى الزرقا المدنية المالح يعطوها تلطيخ اغبر اشهب . رأسها صغير الجرم . غطها معتدل الطول . زياناها مستطيلون . عينها صغيرتان ، غائرتان . كوسها قمي الشوزن . جثتها وحنيبا ظهرها معتدلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السرة القامعة . قوائمها مبشرة الحلب || مرتها الكثير من الاعشاب اغصها الشفويات || راحتها كركية .

١٤٤٦٦ - سَهِيْقَة (F). Opercule (F).  
Operculum, Cover (E).  
هي الغلاف الرقيق الذي يد تحارب النحل . وهي غطاء اجنات الحمالاب . وهي النشاء الغسروي الذي يلحف مناخير الطير الخ ...

١٤٤٦٧ - سَهِيْل (F). Canope (F).  
نجم من كوكبة السفينة يتميز بريق لمائه الذي يأتي بمد البرجيس والابرق . يمد عن الارض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية اي نحو مليونين مليار كيلومتر .

١٤٤٦٨ - سَهِيْمَة ، بَلْمَنِيْت (S). Belemnites (S).  
Bélemnites (F). Belemnites (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الارجل مزدوجيات الحياض وفصيلة السهييات . انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من احافير الحقبة الترياسية . حياكلها صغيرة سهمية الشكل .

١٤٤٦٩ - سَهِيْمِيَات (S). Belemnitidae (S).  
Bélemnitidés (F). Belemnitidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الارجل مزدوجيات الحياض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المدد جميعها من متحجرات الاذنة الغائرة . يبدو ان ظهورها يعود الى العصر البليوري وانقراضها كان في العصر الطليثيري .

١٤٤٧٠ - سَوء النِيَّة (F). Mauvaise foi (F).  
Dishonesty, False-hood (E).  
هو معرفة الانسان ما ينطوي عليه عمله القانوني من عيوب واجرام .

١٤٤٧١ - سَوَاد هو الزعوب ، اطليه .

١٤٤٧٢ - سَوَادِيَّة هو زردور البادية ، اطليه ومن اسمائه ام سليمة .

١٤٤٧٣ - سَوَاكُ الْهِنْد هو البركشت ، اطليه .

١٤٤٧٤ - سَوَاكس  
نجر واحدته سواس . قال ابو جنيقة : السواس من الفناء وهو شبه المرخ له سفة مثل سفة المرخ وليس له شك ولا ورق ، يطلي في السماء ويستظل تحته وقال ايضا السواسي والمرخ والمنج متشابهة .



سهيمة



سوام متوحج



سودق

اصنع الرأس ، اسمر الظهر الموش ، اغبر البطن .  
رأسه وصفته وظهوره وصفقا وذنبه سفح المواج . منسره  
وعذابه سود || ينثر في الانجرار الباسقة التالية . يصيد  
القوامس والليلير اغصها الجردان والبط .

١٤٤٨٣ - سودقي ، ميزوكرتوب Mésocarp (F).  
Mesocarp (E).

هو الجزء المتوسط من غلاف الثمرة يعرف باللب في  
ثمار الترواك . تلطفه الخلطة ويلحف الانثوكرتوب حيث  
الجمجمة او البذور .

١٤٤٨٤ - سورنجات

هو الزرادة الدائم الخضرة ، اعليه .

١٤٤٨٥ - سورنجان ، سراج العولة

Colchicum (S). Colchique (F). Colchicum, Meadow  
saffron (E). Lichtblume, Zeitzose (D). Colchico (I).

جنس نباتات يصلية معمرة من فصيلة السورنجاتيات .  
انواعه زهاء ٢٠ معظمها بري ويضفها زراعي . مناتها  
الطبية عديدة اغصها در البول وتسهل المدة وتكسين  
الاصباح والحلث على السن . ويستخرج منها مادة  
قنولية تدعى كلثمين شائعة الاستعمال الطبي || اوراقها  
قرصية الانتشاب سنانية النصل المستطيل . ازهارها  
كبيرة اللقد مستطيلة الانبوب مدنية البتلات المتساوية .  
ثمارها كمار حقية الشكل تظهر مع الاوراق بعد ذبول  
الزهر واكبال ذوبله . اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٤٨٦ - سورنجان ابيض

Colchicum candidum (S). Colchique blanc (F).

نبات سروتي مهده جبال الشرق الاوسط . دوفسته  
برمعية الشكل متوسطة الحجم . اوراقه خفيفة مستطيلة  
فاشقة . ازهاره صغيرة اللقد ، يضاء اللون ، طويلة المآبر  
الصفر || ازهاره يستمر من آب ال ايلول .

١٤٤٨٧ - سورنجان اصفر

Colchicum luteum (S). Colchique jaune (F).

نبات سروتي مهده الجبل والافنان . دوفسته صغيرة  
الحجم اجاسية الشكل . اوراقه خفيفة مستطيلة ، نصلها  
معدب الصفحة الزاوية الخفسار . ازهاره صفراء اللون ،  
تتلها في نصف الشكل خلية البشرة الداخلية || ازهاره  
يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٤٨٨ - سورنجان الجبكي ، قرج الارض ،

عكنة Colchicum montanum (S).

Colchique de montagne (F).

نوع من السورنجان مهده المناطق الجبلية ذات الارية  
البردية . دوفسته صغيرة اللقد قطرها نحو ٢ سم . اوراقه  
تطول من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ٧ الى ١٢ سم .  
ازهاره صغيرة اللقد قطرها نحو ٥ سم . طولها يراوح من  
٦ الى ١٢ سم . || وهو السورنجان اللبي المشهور  
دوفسته تدعى بحيرة العطار وراز القطة ولعبة بربرية .

١٤٤٨٩ - سورنجان الخريف ، ختمل ، قائل

Colchicum autumnale (S).

Colchique d'automne, Veilleuse, Tue-chien, Safran  
des prés, S. bétard (F).

نوع من السورنجان المبطل . دوفسته يضيء الشكل

١٤٤٩٠ - سورنجان الشرق

Colchicum byzantium (S). Colchique d'Orient, C.  
à feuilles de varaire (F).

نبات سروتي مهده الشرق . غروب الزراعية عديدة .  
دوفسته كبيرة اللقد ، كروية الشكل ، مغلفة القاعدة .  
اوراقه تطول من ٢٢ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٧ الى  
١٠ سم . نصلها مخطط الصفحة كصل الخربوق .  
ازهاره كبيرة اللقد مستطيلة الانبوب الابيض ، خلية  
البتلات الوردية اللون || ازهاره يستمر طوال الشتاء .

١٤٤٩١ - سورنجان الحجم

Colchicum haussknechtii (S). Colchique d'Hausknecht  
(F).

مهده جبال الحجم . يرغب في الاماكن الصخرية .  
دوفسته شبه يضيء قطرها نحو ٦ سم . يملوا عتق يبلغ  
٧ سم . اوراقه ضيقة النصل الغند الصفحة . ازهاره  
خلية البشرة ، صفراء اللون ، وردية العروق ، مستطيلة  
الانبوب || ازهاره يدوم طولاى شهر تشرين الاول .

١٤٤٩٢ - سورنجان بركينسون

Colchicum parkinsonii (S). Colchique de Par-  
kinson (F).

نبات سروتي مهده غايات الشرق الادق . دوفسته  
متوسطة الحجم . اوراقه اهليلجية مستطيلة ، نصلها  
متأوج الختار فاشق التربة . ازهاره متوسطة اللقد ،  
انوبيا ابيض اللون ، بتلاتها مغلطة ومزجة بالابيض  
والاربعوني ، مآبرها زرق || ازهاره يستمر من آب  
الى ايلول .

١٤٤٩٣ - سورنجان دكسي

Colchicum decaisnei (S). Colchique de Decaisne (F).

مهده الشرق الاوسط . يزرع للزينة . يستمر من  
النباتات الرفعة . دوفسته متوسطة اللقد قطرها نحو ٤ سم .  
اوراقه الاولى سنانية النصل ثم تلها اوراق ضيقة ،  
ذلقة التزام الاخير . ازهاره صغيرة اللقد ، وردية اللون ،  
خلية العتق || ازهاره يستمر من تشرين الى كانون  
الناي .

١٤٤٩٤ - سورنجان عريض الورق

Colchicum latifolium (S). Colchique à larges  
feuilles (F).

نبات سروتي مهده الشرق الادق . دوفسته متوسطة  
الحجم . اوراقه كبيرة فاشقة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم .  
وتعرض من ٥ الى ٩ سم . ازهاره مستطيلة الانبوب ،  
تتلها مدنية الزام الاخير ، خلية البشرة ، لونها الى  
البيك يملوا موج اربعوني ، مآبرها صفر || ازهاره  
يستمر من آب الى ايلول .

١٤٤٩٥ - سورنجان قاحير \*

Colchicum speciosum (S). Colchique superbe (F).

مهده الشرق الاوسط . يزرع للزينة . دوفسته كبيرة  
اللقد ، قطرها نحو ٦ سم . اوراقه تطول من ٢٠ الى



سورنجان الخريف



سورنجان قاحير

١٤٥٠٢ - سَوَّسَة أَبَيْس \*  
*Schizanthus candidus* (F). *Schizanthus blanc* (F).  
 عشبة حولية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. أوراقها وريشة  
 قليلة الهدب والنتن. أزهارها كبيرة القذ مستطيلة  
 الانبوب، مفرصة الصفحة السفلى، لونها الالبياض  
 الماجي || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٣ - سَوَّسَة غَرَاهَم  
*Schizanthus grahami* (S). *Schizanthus de Graham* (F).  
 عشبة حولية او محولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها  
 معتدلة القروع. زفها مبشر التجميع. أوراقها وريشة  
 مهدبة. أزهارها كبيرة القذ، وردية اللون، صفراء  
 التبييج، يرتقالية الزراكش || أزهارها يستمر من  
 حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٤ - سَوَّسَة مَهْدَب  
*Schizanthus pinnatus* (S). *Schizanthus penné* (F).  
 عشبة حولية او محولة تملو من ٢٥ الى ٦٠ سم. ساقها  
 قراء، فروعها كثيفة التجميع زباء القلاء. أوراقها  
 وريشة مهدبة. أزهارها كبيرة القذ بنفسجية اللون صفراء  
 التبييج والمروق || أزهارها يستمر من حزيران الى  
 ايلول.

١٤٥٠٥ - سَوَّسَة تَحِيل  
*Schizanthus gracilis* (S). *Schizanthus grêle* (F).  
 عشبة حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. أوراقها زباء  
 النصل. أزهارها صغيرة القذ ليلية اللون يملوها تبقيج  
 بنفسجي حناره اصفر || أزهارها صبي.

١٤٥٠٦ - سَوَّسَة  
*Charançon* (F). *Weevil* (E).  
 كلمة شاملة تطلق على معظم الحشرات التي تنسب الى  
 فصيلة السويات. ج سوس || هي يملوها خنافس  
 صغيرة القذ تقرض الحبوب وتوقع بها اشد الاذى.

١٤٥٠٧ - سَوَّسَة الْأَرْز \*  
*Calandra oryzae* (S). *Charançon du riz* (F). *Rice weevil* (E).  
*Reiskäfer* (D).  
 حشرة من السويات ملوفا من ٣ الى ٤ سم. جسمها  
 مستطيل الشكل. لونها الى السمرة الخنطية تحمل على غصنها  
 اربع بقع حر || تركب شلب الارز وتقرضه قبل  
 قشره.

١٤٥٠٨ - سَوَّسَة الْبَرَام \*  
*Peritelus sphaeroides* (S). *Pérítèle gris* (F).  
*Peritelus griseus* (E). *Grauer Rüsselkäfer* (D).  
 حشرة من السويات ملوفا براوح من ٥ الى ٧ سم. ثوبها  
 حنطي اللون يملو زغبة غيره ومواج اسف || تركب  
 براص الانجار والشجيرات المختلفة الاجناس والانواع بما  
 فيها التفاح والتوت والكرمة والتبغ تقرض اطرافها او تنقبها  
 وتوقع بها اشد الاذى || يرتقها تمش في التربة على المواد  
 النضوية المنحلة.

١٤٥٠٩ - سَوَّسَة التَّوْب \*  
*Hylobius abietis* (S). *Charançon du sapin*, *Hylobus du pin* (F). *Fir-tree weevil*, *Pine weevil* (E). *Grosser branner Rüsselkäfer* (D).  
 حشرة من السويات. ملوفا نحو ١٠ مم. ثوبها الى السمرة  
 الكستنية يملو توش منسوب الزراكش اصفر اللون.  
 تركب الافنان والباناق الحولية تنفضي عليها. تمرى

٣٠ سم. وتقرض من ٧ الى ١٠، أزهارها كبيرة جبلة،  
 انبوبها يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها الى الازرقاني  
 الموشج بالاصفر || أزهارها يستمر نحو ٧ اسابيع  
 ينتهي في اواسط ايلول.

١٤٤٩٦ - سَوَّجَانْ كَلِيف  
*Colchicum amabile* (S). *Colchique gracieux* (F).  
 نبات جادح مهد الشرق. دوفسته صغيرة القذ،  
 أوراقها خنطية النصل الباهت الخضار. أزهارها خنطية،  
 مستطيلة الانبوب، صفيقة القروعة، اهليلجية البتلات.  
 يتلاها زباء البشرة الداخلية يملوها تخطيط وتجزع وردى  
 واريجواني || أزهارها يستمر طوال شهر ايلول.

١٤٤٩٧ - سَوَّجَانْ مَرْزَنْ  
*Colchicum variegatum* (S). *Colchique panaché* (F).  
 نبات مروج مهد وبراغي الزنآن. دوفسته  
 متوسطة القذ. أوراقها متصبية تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم.  
 وتقرض من ٢٥ الى ٣٥ سم. أزهارها مستطيلة الانبوب  
 الايض اللون، يتلاها خنطية البشرة، وردية اللون،  
 يملوها مواج اسر || أزهارها يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٨ - سَوَّجَانْ نِيَّات  
*Colchicaceae*,  
*Melanthaceae* (S). *Colchicacées, Mélanthacées* (F).  
*Colchicaceae, Melanthaceae* (E).  
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقة تشمل السوجان والمروج  
 وغيرها.

١٤٤٩٩ - سَوَّس ، عَرَقْسُوس ، شَجَرَة السَّوَّس ،  
 رِكَلِيس  
*Glycyrrhiza, Liquiritia* (S). *Régisse* (F). *Liquorice plant* (E). *Süssholz* (D).  
*Regolizia* (I).  
 جنس نباتات خشبية معمرة من فصيلة القرنيات القراشية.  
 انولها مهدبة بعضها زراحي صناعي. تتميز باستطالة  
 جلورها الجلمودية. أوراقها متعاقبة مركبة وريية.  
 وريقاتها يغبية النصل، عابقة الخضار. أزهارها  
 سلب التجميع، ابلي الاوتكار. أزهارها صغيرة القذ  
 لونها يختلف مع النوع، فيها الايض والازرق والبنفسجي.  
 ثمارها قرون صغيرة مبطلة. زورها مستديرة مقلطحة.  
 اعرف واشهر انولها السوس الخنزري.

١٤٥٠٠ - سَوَّس مَخْزَنْ \* ، عَرَقْسُوس مَخْزَنْ  
*Glycyrrhiza glabra, Liquiritia officinalis* (S). *Régisse officinale* (F).  
 جنبة صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. جلورها جلومودية  
 مادة اسطوانية الشكل، جرادتها سراء اللون، لها اصفر،  
 سكري الطعم. مادته الغلامة تدعى «ربوس» وهو  
 سهل خنطية يناسب المرقى والشيوخ والحولاء. ينفع  
 الصدر ويوقي الكبد. مسحوقه شائع الاستعمال الطبي  
 ويصنع منه شراب عرق السوس المستحب النافع.

١٤٥٠١ - سَوَّسَب  
*Schizanthus* (S). *Schizanthus* (F).  
 جنس نباتات عشبية حولية او محولة من فصيلة الخنازريات  
 انولها ٨ جيمها تريينية. أوراقها متعاقبة مركبة وريشة.  
 أزهارها منتي التبييج، ثابهي الاوتكار. أزهارها  
 جبلة الشكل، مفرصة، زاعية الالوان الشملة || اعرف  
 انولها واشهرها ما يلي.



سوس مخزني



سوس ابليس



سوسة الارز



سوسة البرام



سوسة التتوب



جميع أنواع التوتوب والصنوبر || يرقاتها تعيش على الجملوح المقلوبة اليابسة .

#### ١٤٥١٠ - سوسة الجزر \*

*Liparus coronatus*, *Molytes coronatus* (S). Charançon de la carotte (F). Carrot weevil (E).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٢ الى ١٤ سم. ثوبها الى السواد اللامع || يرقها صغيرة القدرم اللون، سوداء الرأس. تركيب جذور تفقرضها وتؤذيها .

#### ١٤٥١١ - سوسة الخططة \*

*Calandra granaria* (S). Charançon du blé (F). Granary weevil (E). Kornkäfer (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٣ الى ٤ سم. جسمها مستطيل الشكل . ثوبها الى السمرة الخنطية . تفقرض البر وتلتهم وقد تصيب السلت والشعير والذرة . يكثر ويوجدوا في الاهراء والخابز .

#### ١٤٥١٢ - سوسة الزيتون \*

*Otiorrhynchus meridionalis* (S). Charançon de l'olivier (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى السواد الفحشي يملوه حلب مبهر وقصير . ارجلها حر تركيب اوراق الزيتون تفقرض ساقه التصل || يرقها تعيش في التربة على جذور النباتات البرية .

#### ١٤٥١٣ - سوسة الصليبيات \*

*Ceuthorrhynchus assimilis* (S). Ceuthorrhynque des crucifères, Charançon de la rave (F). Turnip seed weevil (E). Kohlschotenrüssler (D).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٣ سم. جسمها بيضي الشكل ، حنطي اللون . تركيب بزور الصليبيات اغصنها الفتت والسلمج والخلود والملفوف .

#### ١٤٥١٤ - سوسة القليل \*

*Lixus algeris* (S). Charançon de la fève (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٣ الى ٢٢ سم. لها اسود لامع يملوه مواج حنطي || تركيب مع يرقها الازراق والازهار والحبوب .

#### ١٤٥١٥ - سوسة القرة \*

*Amalorrhynchus melanarius* (S). Ceuthorrhynque du cresson (F).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٥ سم. ثوبها الى الحنطي الباقع يملوه تجزيع الحنط اللون مستطيل المخطوط ومتموضعا || تركيب اوراق القرة وتمتج شكلها على الزهر فينتفج من يرقات تلتهم الحريبات والبرزور .

#### ١٤٥١٦ - سوسة الكاشم \*

*Otiorrhynchus ligustici* (S). Charançon de la livèche (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. ثوبها افيش اللون ، اسفج المراج || تركيب الكاشم وبعض النباتات الاخرى كالكرمة والشندرة والقمع حيث تقضم البراعم والاوراق || يرقها تعيش في التربة على جذور النبات .

#### ١٤٥١٧ - سوسة مخددة \*

*Otiorrhynchus sulcatus* (S). Charançon sillonné (F). Vine weevil (E). Dickmaulrüssler, Gefurchter (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٨ الى ١٠ سم. ثوبها الى السواد اللامع يملوه مواج حنطي . زباناها زبد

الفواصل، زفها ذهبي اللون . تركيب مختلف النباتات الحقلية والكرمة حيث تعيش على البراعم . يرقها تفقت بالجذور وباقراس النباتات التريضية .

#### ١٤٥١٨ - سوسل \*

*Schizandra* (S). Schizandre (F). جنس نباتات جنينة عارشة من فصيلة السوليات . انواعه ١٢ منها البرية والتريضية . اوراقها عابلة متعاقبة متعقة ، ستانية . ازهارها ابطية او محورية الارتكاز || اشهر انواعه التريضية ما يلي .

#### ١٤٥١٩ - سوسل اثمر

*Schizandra rubriflora* (S). Schizandre rouge (F). جنينة سرويتية عارشة تطول من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها اهليلجية الشكل تطول نحو ١٠ سم. ازهارها عنائيد مستطيلة ، متدلية ، لونها الى الحمرة الغامية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

#### ١٤٥٢٠ - سوسل الصين

*Schizandra chinensis* (S). Schizandre de Chine (F). جنينة سرويتية عارشة تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها بيضية ذلقة ، نصلها سنن الحافة يطول نحو ٨ سم. ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، عديدة البتلات ، من ٩ الى ١٢ ، عطرية العرف ، لونها الى الحمرة . ثمارها عنينة ، قريزية اللون ، حامزة الطعم ، مأكولة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٢١ - سوسل كبير الزهر

*Schizandra grandiflora* (S). Schizandre à grandes fleurs (F). جنينة جادحة، عارشة، عطلة، تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها بيضدية الشكل ، عادمة التسنين . ازهارها كبيرة القند ، عنقودية التجميع ، لونها الى الحمرة الوردية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٤٥٢٢ - سوسل مرمرى

*Schizandra marmorata* (S). Schizandre marbré (F). جنينة عارشة عطلة تطول من ٤ الى ٦ امتار . فروصها اسطوانية ، حراء اللون . اوراقها بيضية ، نصلها عايق الخفسار . امتناها جؤوية . ازهارها صغيرة القند مرمرية ، متدلية || ازهارها يدوم طوال شهر ايلول .

#### ١٤٥٢٣ - سوسل هنري

*Schizandra henryi* (S). Schizandre de Henry (F). جنينة سرويتية عارشة تطول من ٣ الى ٥ امتار . فروصها ثلالية الاصلع الخنجة . اوراقها اهليلجية ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جيل الخفسار الزاهي ، قليل التسنين . ازهارها ابطية ، فردية ، كبيرة القند ، عديدة البتلات ، يبيضه اللون ، حرية الرائحة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

#### ١٤٥٢٤ - سوسليات


*Schizandraceae* (S). Schizandraceae (F). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات . اجناسها وانواعها المعروفة لا يتجاوز عددها ١٧ . جميعها نباتات جنينة عارشة . بعضها بري والبعض الآخر تربي . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، متعقة ، ستانية النصال الجميلة الخفسار . ازهارها محورية او ابطية الارتكاز ، الانثوي سننلي التجميع ، اما الذكري فقروي . ازهارها صغيرة ،



سوسة الجزر سوسة الخططة



سوسة الزيتون سوسة الصليبيات



سوسة القليل سوسة القرة



سوسة مخددة سوسة الكاشم



سوسل

اوراقه شيقة التصل المحجن . أزهاره ثلاثية أو رباعية التجميع تطلو نحو ٦ سم. قناتها متقايلة لونها الى الصفار الباهت . بتلاتها الى الصفار الباقى يملو تمريق بنفسجي اللون ، حنطى الموج || أزهاره يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٤٥٣١ - سَوَسَن أَهْبَر Iris fulva (S).

١٤٥٣١ - سَوَسَن أَهْبَر Iris brun-roux (F). نبات جلموري سبروتي يرغب في الأماكن الرطبة . ساقه نحيلة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها تطلو نحو ١٠٠ سم. وتعرض في ٢ الى ٣ . أزهاره متوسطة القد ، عادمة اللون والرق . بتلاتها الخارجية والداخلية حنطية اللون يملوها توشيح بنفسجي واخضر ، وللداخلية منها ثنائية التفصيص || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ١٤٥٣٢ - سَوَسَن الْجَزَالِي Iris unguicularis (S).

١٤٥٣٢ - سَوَسَن الْجَزَالِي Iris à onglet (F). نبات جلموري عديم الساق ، وحيد الزهرة ، يرغب في المراض الجنوبية والاماكن الدافئة . اوراقه عصفية الشكل ، لتصلها جامد التسيج ، اخضر الصلحة العليا ، بحري السفلى . زهرته مستطيلة الانبوب ، كبيرة القد ، فواحة العرف ، بتلاتها الخارجية والداخلية الى الياكي الزاهي . حنطها ابيض || أزهاره يستمر من كانون الثاني الى نيسان .

#### ١٤٥٣٣ - سَوَسَن المتألف \* ، بِرَيْت ، سَبَاف Iris pseudacorus (S).

١٤٥٣٣ - سَوَسَن المتألف \* ، بِرَيْت ، سَبَاف Iris pseudacorus (S). Iris faux-acore, l. des marais, Flambe d'eau (F). Yellow Iris, Yellow water flag (E). Gelber schwertel, Wasserschwertellie (D). Iride gialla, Spadella d'acqua (I). نبات جلموري سبروتي يميلو يعيش في المواقع الرطبة وحل مجاري الماء وصفاف الانهار . يملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه حنطية الشكل ، بحرية التصل . أزهاره كبيرة القد خافتة العرف عادمة اللون . بتلاتها الخارجية والداخلية الى الصفار الزاهي يملو تمريق حنطى . أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ١٤٥٣٤ - سَوَسَن أُنْمَر Iris tigré (F).

١٤٥٣٤ - سَوَسَن أُنْمَر Iris tigré (F). نبات تزقيني من فصيلة السونيات مشهور باسم حومته ، اطباها .

#### ١٤٥٣٥ - سَوَسَن بَاهِت Iris pallida (S).

١٤٥٣٥ - سَوَسَن بَاهِت Iris pallida (S). نبات جلموري سبروتي يملو من ٦٥ الى ١٠٠ سم. ساقه نحيلة متقطعة . شرعانه ابيض اللون . قناتها تهبج قبل انبلاج الزهر . أزهاره متوسطة القد . عرفها ليموني الزاهية . بتلاتها الخارجية والداخلية زرقاء اللون الباهت . مرقها اصفر الانتشاب ، ابيض الطرف || أزهاره يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٣٦ - سَوَسَن بَحْرِي Iris halophila (S).

١٤٥٣٦ - سَوَسَن بَحْرِي Iris halophila (S). نبات جلموري سبروتي يرغب في المواقع الساحلية البحرية . يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه زياء التصل ، بحرية اللون . أزهاره متوسطة القد عادمة المرق . بتلاتها الخارجية يضاء اللون ، برتقالية العنق ؛ بتلاتها الداخلية مرقعة بالاصفر || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

ملونة ، الذكورية تحمل اربع بتلات والاثوية ثمانية || اشهر اجناسها السول الذي كان يعتبر في التصنيف السابق من فصيلة المغنوليات .

#### ١٤٥٣٥ - سَوَسَن Iris (S), Iris (F), Iris (E).

١٤٥٣٥ - سَوَسَن Iris (S), Iris (F), Iris (E). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السونيات اتواحه زهاء ١٠٠ منظمها جلموري وبعضها دوفسي . جماتها غليظة . اوراقها متقايلة ، متساوية السطح ، لتصلها مستطيل الصلحة متصل او عصبي الشكل . أزهاره كبيرة القد ثلاثية الانقسام تتميز بانجازها الخارجية المنخفضة الاطراف بينا الداخلية متصبية وابتلاهما القصيرة التي تملوها سمات نامية ملونة || اشهر انواعه الزراعة ما يتبع .

#### ١٤٥٣٦ - سَوَسَن اَبْيَض \* ، سَوَسَن فلورنسة ، دَهِي Iris florentina (S).

١٤٥٣٦ - سَوَسَن اَبْيَض \* ، سَوَسَن فلورنسة ، دَهِي Iris florentina (S). Iris de Florence (F). Florentine Iris, Orris-root plant (E). Florentinische Iris, Veilchenschwertel (D). Iride fiorentina, Giglio bianco (I).

١٤٥٣٦ - سَوَسَن اَبْيَض \* ، سَوَسَن فلورنسة ، دَهِي Iris florentina (S). نبات جلموري سبروتي مهد الشرق العربي . يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. أزهاره كبيرة القد ، فواحة العرف المطري . بتلاتها الخارجية يضاء اللون ، زرق الرحاض ، مرقها اصفر . بتلاتها الداخلية عاجية البياض . جماتها مستطيلة وحيدة اللون الكبريتي || أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران . يستخرج من جذاميره مواد تامة ناعمة ويستخلص من أزهاره مواد عطرية تدخل في صناعة الطيوب .

#### ١٤٥٣٧ - سَوَسَن أَجْرَد Iris imberbis (S).

١٤٥٣٧ - سَوَسَن أَجْرَد Iris imberbis (S). نبات دوفسي جادح . مهد افريقية الثالية . ساقه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مستطيلة شبه اسطوانية . أزهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، بتلاتها الخارجية مستهرة اما الداخلية فقصرية ومقطوعة || أزهاره يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٣٨ - سَوَسَن إِسْبَانِي \* Iris xiphium (S).

١٤٥٣٨ - سَوَسَن إِسْبَانِي \* Iris xiphium (S). نبات دوفسي جادح . ساقه تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة ، اسطوانية ، غنقدة ، بحرية اللون . أزهاره كبيرة القد حنطية العرف . بتلاتها الخارجية الى الصفار الزاهي ، بتلاتها الداخلية بنفسجي اللون يملو موج ارجواني || أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٤٥٣٩ - سَوَسَن أَصْفَر Iris lurida (S).

١٤٥٣٩ - سَوَسَن أَصْفَر Iris lurida (S). نبات جلموري سبروتي يملو من ٤٠ الى ٦٥ سم. أزهاره كبيرة القد ، حار قناتها يهبج قبل انبلاج الزهر . بتلاتها الخارجية زرق القاعدة والزام الاول ، صفر سائر الصلحة المموجة بالنفسجي . مرقها اصفر الجسم . اسود الطرف . بتلاتها الداخلية صفر الانتشاب ، زرق الصلحة تملوها رشفة جزوية || أزهاره يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٣٠ - سَوَسَن أَصْفَر Iris lutescens (S).

١٤٥٣٠ - سَوَسَن أَصْفَر Iris lutescens (S). نبات جلموري سبروتي يملو من ١٠ الى ٣٠ سم.



سَوَسَن اَبْيَض



سَوَسَن اِسْبَانِي



سَوَسَن المتألف

## ١٤٥٤٣ - سَوَسَن رُوْزْبَاخ Iris rosenbachiana (S).

Iris de Rosenbach (F).

نبات دوفضي، عادم الساق، رقه. أوراقه قصيرة. أزهاره قليلة العدد. بتلاتها الخارجية زبدية الانتصاب، بنفسجية الصفحة، عاجية الحثار. بتلاتها الداخلية إلى البنفسجي الباق، يملو تجزيع يرتقلى || أزهاره يستمر من شباط إلى آذار.

## ١٤٥٤٤ - سَوَسَن سِنْجَار Iris sindjarensis (S).

Iris du Sindjar (F).

نبات دوفضي جادح. مهد جزيرة ابن عامر. ساقه قصيرة تملو نحو ١٠ سم. أوراقه جيلة الخضار الزاهي. أزهاره كبيرة القد، خافتة العرف. بتلاتها الخارجية زرقاء اللون، صفراء الحرق، بتلاتها الداخلية اهليلجية الشكل متموجة اللون || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

## ١٤٥٤٥ - سَوَسَن سُورِي Iris lortetii (S).

Iris de Lortet (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد الجبال اللبنانية السورية. يملو من ٢٠ إلى ٤٥ سم. أزهاره متوسطة القد خافتة العرف، بتلاتها الخارجية إلى الزرقاء السبابة المنشفة واللمعة بالجزءية مررها ذهبي اللون. بتلاتها الداخلية وردية يملوها تمرق بنفسجي || أزهاره يدم طول شهر ايار.

## ١٤٥٤٦ - سَوَسَن سِيْبِرِيَّة \* Iris sibirica (S).

Iris de Sibérie (F).

نبات جلمودي سبروتي رغب في المناطق الباردة. ساقه اسطوانية جفاه تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه النامية حراء اللون ثم تستقر عند اككال نحوها على الاخضر الباق. أزهاره صغيرة القد جوفية الرائحة. قباياتها دسوة، بتلاتها مستوية الشكل، الخارجية منها بيضاء اللون تشوبها زرقه زاهية، والداخلية إلى الزرقه البنفسجية. غروبها الزراعية عديدة، فارقها ألوانها || أزهاره يستمر من ايار إلى حزيران.

## ١٤٥٤٧ - سَوَسَن شَالِب Iris versicolor (S).

Iris versicolore (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد امريكا الشمالية. يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه زبده النصل. أزهاره كبيرة القد عادمة العرف والمرق. بتلاتها الخارجية بضيض الشكل بنفسجية اللون عابطة الوسط. بتلاتها الداخلية وردية ارجوانية او بضيض اللون || أزهاره يستمر من ايار إلى حزيران.

## ١٤٥٤٨ - سَوَسَن شَبْكِي \* Iris reticulata (S).

Iris réticulé (F).

نبات دوفضي جادح. غروبها الزينية عديدة أوراقها بالوانها واسطالة انايبها. سوقها أثرية او شديدة التقصر. أوراقها صفية الشكل، فصلها يملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أزهارها كبيرة القد، فواسة العرف. بتلاتها الخارجية والداخلية متشابهة الحجم والون يملوها تشبيك ابيض السدة، اصفر اللحام || أزهاره يستمر من شباط إلى ايار.

## ١٤٥٤٩ - سَوَسَن شَوْشَان Iris susiana (S).

Iris de Suse, l. deuil, l. tigré, l. crapaud (F).

نبات جلمودي رقه مهد بلاد فارس. يملو من ١٥ إلى ٥٠ سم. أزهاره كبيرة القد عادمة العرف. بتلاتها

## ١٤٥٣٧ - سَوَسَن بَقْلِي، سَوَسَن دَوْقُصِي،

Iris slyrinchium (S).

عَنْصِيل  
Iris bermudiana, l. bulbeux (F). Crocus rooted iris (E). Rüsselschwertel, Schwelmrüssel (D). Iride doppio bulbo (I).

نبات دوفضي جادح مهده حوض البحر المتوسط. ساقه تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه خيطية، منبسطة. أزهاره صغيرة القد. اسديتها ملتحمة الاقدام، لونها إلى الزرقه اليلكية بتلاتها الخارجية موشة بالاصفر. أزهاره يستمر من نيسان إلى ايار.

## ١٤٥٣٨ - سَوَسَن بِيُورُك Iris bismarkiana (S).

Iris de Bismarck (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد الشرق الاوسط. يملو من ٣٠ إلى ٤٥ سم. أزهاره متوسطة القد عادمة العرف، بتلاتها الخارجية إلى الصفرة المنشفة واللمعة بالجزءية يتوسطها بقبة كستنية. مررها اصفر اللون. بتلاتها الداخلية إلى البياض الزيدي يملوها تمرق ازرق. أزهاره يدم طول شهر ايار.

## ١٤٥٣٩ - سَوَسَن ثَوْرُس Iris tauri (S).

Iris du Taurus (F).

نبات دوفضي جادح. مهد جبال تورس. أوراقه صغيرة القد، ضيقة النصل، فسقية الخضار. أزهاره متوسطة الحجم. بتلاتها اهليلجية الشكل ملوكة. صفحتها العليا ليلكية اللون يملوها تجزيع ابيض، صفحتها السفلى إلى الخضار الباهت || أزهاره يدم طول شهر نيسان.

## ١٤٥٤٠ - سَوَسَن جِرْمَانِي \* كَفَّ الصَّبَاغ Iris germanica (S).

Iris d'Allemagne, Flamme, Flamme, Iris des jardins, Iris armes de France, Gieulou bleu (F). German iris, Blue flower de Luce (E). Deutsche lisch, Blaue Iris, Schwertlilien (D). Iride germanica, Giglio celeste azzurro (I).

نبات جلمودي سبروتي لاقياسي الشكل والانتظام يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. شرعان أزهاره تبي اللون بنفسجي الرصاص. أزهاره كبيرة القد، عطرية اللون. بتلاتها الخارجية بنفسجية، مررها اصفر. بتلاتها الداخلية إلى الزرقه الزاهية، سماتها مستطيلة ملونة || أزهاره يدم طول شهر آب. جذامه طيبة. أزهاره صناعية كالسوسن الابيض.

## ١٤٥٤١ - سَوَسَن خَشَاش Iris humilis (S).

Iris humble (F).

نبات جلمودي سبروتي عادم الساق. وحيد الزهرة. أوراقه صفية الشكل، ضيقة، مستطيلة، جامدة النصل الباهت الخضار. زهرته ليلكية اللون الزاهي. بتلاتها الداخلية لسانية الشكل، اما الخارجية فاهليلجية. أزهاره يستمر من نيسان إلى ايار.

## ١٤٥٤٢ - سَوَسَن حَمَّانِي العُرف Iris sambucina (S).

Iris à odeur de sureau (F).

نبات جلمودي سبروتي يملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. حثار قباياته يهيج قبل انبلاج الزهر. أزهاره كبيرة القد، خاتية العرف الفواح، بتلاتها الخارجية تطول نحو ٦ سم. صفحتها زرقاء اللون يملوها تجزيع ابيض واربطاني. مررها اصفر. بتلاتها الداخلية جمدة الصفحة، صفراء اللون، يملوها تشبيك بنفسجي واملع اسف || أزهاره يستمر من ايار إلى حزيران.



سَوَسَن جِرْمَانِي



سَوَسَن سِيْبِرِيَّة



سَوَسَن شَبْكِي

الترينية عديدة. يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه زياء التصل البحري اللون. ازهاره متوسطة القد ، متعددة الالوان ، بتلاتها ملوكة الشكل ، حنطية الحار ، عادمة المرق || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ١٤٥٥٧ - سَوَسَنَ مُنْتَن \* قُوسِيس

*Iris foetidissima* (S). *Iris fétide*, l. gigot, l. à l'ail, Xyris puant (F). Gladdon, Gladwin, Stinkingiris, Roast-beef plant (E). Korallenschwertel, Stinkende iris (D). *Iris foetida*, *Fiamma foetida*, *Ricottaria* (I).

نبات جلمودي سبروتي يرغب في المواقع الظليلة. يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ساقه مضلعة. اوراقه متصلة الشكل ، متصلا باهت الخضار ، متين الرائحة عند الفرك. ازهاره متوسطة القد عادمة المرق. بتلاتها الخارجية ضيقة الصفحة ، زرقاء اللون. بتلاتها الداخلية الى الصفار الموشح بالبنفسجي || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

#### ١٤٥٥٨ - سَوَسَنَ مُهْدَب سَوَسَنَ مُهْدَب

*Iris japonica* (S). *Iris frangé* (F). نبات جلمودي سبروتي مهد الصين واليابان. يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه حيلة الخضار الزاهي الالام. ازهاره صغيرة القد ، عادمة العرف والمرق. بتلاتها الخارجية مهدبة الحار ، ليلكية اللون ، موشحة بالابيض والاصفر. بتلاتها الداخلية سوية اللون اليلكي الزاهي. ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ١٤٥٥٩ - سَوَسَنَ مُوشَح

*Iris variegata* (S). *Iris panaché* (F). نبات جلمودي سبروتي عديد الضروب الزراعية. يعلو من ٣٠ الى ٦٥ سم. ازهاره عديدة متوسطة القد ، قنابها خضرار اللون. بتلاتها الخارجية الى الصفار المرق بالبنفسجي ، مرقها حنطي. بتلاتها الداخلية الى الصفار. ازهاره يدوم طولا شهر ايار .

#### ١٤٥٦٠ - سَوَسَنَ لَحِيلِي الْوَرَقِ

*Iris graminea* (S). *Iris à feuilles de gramin*, l. avoine (F). نبات جلمودي سبروتي يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه صفية الشكل ، جامدة التصل ، بحرية اللون ، تطول من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متوسطة القد. بتلاتها الخارجية والداخلية مستديرة الشكل ، كبيرة الظفير لونها الى البنفسجي الموشح بالاصفر || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٦١ - سَوَسِنَات

*Iridaceae*, *Iridae* (S). *Iridaceae*, *Iridae* (E). فصيلة نباتية من وحيدات القلفة. اجناسها وانواعها كثيرة المدد . اشهرها السوسن والزعفران والديوث الخ.

#### ١٤٥٦٢ - سَوَسِي هو التوقحان الحزني ، اطلبه .

#### ١٤٥٦٣ - سَوَسِنَات

*Curculionidae* (S). *Curculionidae*, *Rhynchophores*, *Charançons* (F). *Weevils* (E). *Rüsselkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة. عاواها واجناسها وانواعها الممودة حتى الان زعا ٥٠٠٠٠ . جميعها صغيرة القد. رؤوسها عظمية الشكل تنتهي بمنك قاضم قاذب. قرونها الاستشارية صولبانية او مرقية. فواصلها تراوح من ١٠ الى ١٢. ارباغها، خاسية التكوين ، رباعية المظهر || مكها صغير الحجم ، كروي الشكل تحتمه الانثى فوديا في ثقب تعددا

الخارجية والداخلية وردية اللون لملاء الرخاض يعلوها تجزيع وتنديش اسره ، ويتوسط الخارجية منها بقس فصيحة قمعية السواد || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٤٥٥٠ - سَوَسَنَ شَبِيقَ الْوَرَقِ

*Iris stenophylla* (S). *Iris à feuilles étroites* (F). نبات دوفسي جادح . مهد الشرق الاوسط . ساقه اثرية . اوراقه ضيقة التصل . ازهاره كبيرة القد بنفسجية او زرقاء اللون يعلوها توشح عابق شديد السمة || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

#### ١٤٥٥١ - سَوَسَنَ طَنْجَمَة

*Iris tingitana* (S). *Iris de Tanger* (F). نبات دوفسي جادح . مهد افريقية الشالية . ساقه رفيعة تطلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه صفية الشكل والتصل . ازهاره كبيرة القد ، بتلاتها متساوية الحجم ، بنفسجية اللون يعلوها في وسطها بقع صفر || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

#### ١٤٥٥٢ - سَوَسَنَ عَكْرَبِي

*Iris plantifolia* (S). *Iris scorpion* (F). نبات دوفسي جادح . غروب الترينية عديدة ، تميزها يرتكز على قد الشراخ ولون الزهرة || شارينها الزهرية تطلو من ٨ الى ١٥ سم. ازهارها كبيرة القد ، فواحة العرف المطر ، بتلاتها ليلكية اللون الزاهي الالام . امتاعها الى الصفرة . اوراقها صفية الشكل ، جامدة التصل ، تطول نحو ٣٠ سم. || ازهاره يستمر من كانون الاول الى اذار .

#### ١٤٥٥٣ - سَوَسَنَ قَارِسي

*Iris persica* (S). *Iris de Perse* (F). نبات دوفسي جادح . مهد بلاد فارس . ساقه اثرية . اوراقه صغيرة وقصيرة . ازهاره كبيرة القد ، فواحة العرف البنفسجي . انبوبها يطول نحو ٦ سم. بتلاتها الخارجية ليلكية اللون ، مشرمة الحار الازرق . بتلاتها الداخلية صغيرة القد متجمجة اللون || ازهاره يدوم طولا شهر اذار .

#### ١٤٥٥٤ - سَوَسَنَ قَرَم

*Iris pumila* (S). *Iris pygmée* (F). نبات جلمودي سبروتي عديد الضروب الزراعية . يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقه ضيقة التصل البحري اللون . زهرته وحيدة تطول نحو ٢٥ سم. قنابها العليا بنفسجية بتلاتها ملونة تختلف مع الضروب . مرقها ازرق الجسم اصفر الطرف || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

#### ١٤٥٥٥ - سَوَسَنَ مَهْدَب

*Iris aurea* (S). *Iris doré* (F). نبات جلمودي سبروتي يرغب في المناطق الجبلية . يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه زياء التصل لونها الى الخضار الباهت . ازهاره كبيرة القد ، شرعائها اخضر ، بتلاتها الخارجية بيضيه الشكل ، بحمة الحار ، ملهبة اللون . بتلاتها الداخلية سنانية الصفحة ، زاهية الصفار الاشمل || ازهاره يدوم طولا شهر حزيران .

#### ١٤٥٥٦ - سَوَسَنَ مِلَوَكِي

*Iris spatulata* (S). *Iris en spatule* (F). نبات جلمودي سبروتي ميلول في المروج الرطبة غروب



سوسن متين

**١٤٥٧٤ - سَوْتَلَع** \*  
Pied du champignon (F).  
Tigel of mushroom (E).  
السوقة من الفطر والطروث ما كان أسفل الكتمة وقد يقوم مقام الساق في النبات ويعرف أيضاً بالمزروج.

**١٤٥٧٥ - سَوْتَلَع الْوَرَقِيَّ** (F).  
Foire des bestiaux (F).  
Cattle-fair (E).  
سوق يجتمع فيها الناس في أيام ملوية لبيع وشراء الماشية.

**١٤٥٧٦ - سَوْتَلَع**  
Aloë (S).  
Aloës (F). Aloes (E). Aloe (D). Aloe (I).  
جنس نباتات لحية معمرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه عديدة بعضها عديم الساق. أوراقها عريضة مستطيلة النصل، ضيقة التجميع. أزهارها عنقودية يحملها شواخ بسيط أو مشعب يستخرج من أوراق بعض أنواعه عصارة طيبة مرة الطعم، ماذنها الغائقة تدعى سولئين (Aloïne) مشهورة الاستعمال الطبي || أعرف وأشهر أنواعه ما يلي

**١٤٥٧٧ - سَوْتَلَع الْوَرَقِيَّ** (S).  
Aloë africana (S).  
Aloës africana (F).  
شجرة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها عديمة الفروع. أوراقها تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. نصلها باهت الخضار، شائك الحافة والمقعدة || أزهارها عنقودية لينة تطول نحو ٣٠ سم. لونها إلى الصفرة الزاهية || أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان.

**١٤٥٧٨ - سَوْتَلَع بَحْرِيَّ الْوَرَقِيَّ** (S).  
Aloë glauca (S).  
Aloës glauque (F).  
نبات عديم الساق. شواخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. أزهاره عنقودية التجميع، وردية اللون، يطولوا موج قريزي. أوراقها تطول نحو ٢٠ سم. نصلها بحري اللون، ذلق الزم الحاد الأخير، عديم الحشف، أسود اللثام القصير. أزهاره صيني.

**١٤٥٧٩ - سَوْتَلَع عَرِيض الْوَرَقِيَّ**  
Aloë saponaria (S). Aloës à larges feuilles (F).  
نبات عديم الساق. شواخه الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره حلقية التجميع كبيرة اللق، جميلة الحمرة الزاهية || أوراقها مستطيلة، مستعرجة، نصلها باهت الخضار يعلو بحزج أبيض، حشاه شائك الحافة، مديب الطرف الحاد اللثام || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

**١٤٥٨٠ - سَوْتَلَع قَرْن الْكَبْشِ، سَوْتَلَع مُشَجَّر**  
Aloë arborescens (S). Aloës corne de bœuf (F).  
جنية تملو من ٣٠٠ إلى ٤٥٠ سم. ساقها متسببة مشعبة الفروع. أوراقها مستقيمة على الساق بدون انتظام. نصلها مخنن التسنج، بحري الخضار، يطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. صفحته مخننة، حلزونية الالتواء على شكل قرن الكبش. أزهاره عنقودية لينة لونها إلى الحمرة المربانية || أزهاره يدوم من كانون الأول إلى آذار.

**١٤٥٨١ - سَوْتَلَع قَصِير الْوَرَقِيَّ** (S).  
Aloë brevifolia (S).  
Aloës à feuilles courtes (F).  
نبات عديم الساق يرغب في المراتق اللينة. أوراقها تطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. نصلها إلى الخضار الأزرق، أحسب الحافة، مديب المقعدة، مستطيل اللثام، شواخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. أزهاره حمر تطول نحو ٤ سم || أزهاره صيني.

لاحتضانه || ريقاتها عديمة الأرجل، مقعدة، مديبة الطرف. تمش على مختلف الأعضاء والمواد النباتية والمعدنية.

**١٤٥٦٤ - سَوْتِيَّ**  
Flagelliforme (F).  
Flagelliform (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان كالسوط شكلاً ولدانة

**١٤٥٦٥ - سَوْتِيَّات**  
Flagella (S).  
Flagellés (F). Flagella (E).  
شعبة حيوانات دنيا وحيدات الخلية من صف النقيجات.

**١٤٥٦٦ - سَوْتِيَّات أَصْلِيَّة**  
Enflagella (S).  
Enflagellés (F). Enflagella (E).  
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

**١٤٥٦٧ - سَوْتِيَّات جَذَرِيَّة**  
Rhizoflagella (S).  
Rhizoflagellés (F). Rhizoflagella (E).  
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

**١٤٥٦٨ - سَوْتِيَّات مَكْنِيَّة**  
Cystoflagella (S).  
Cystoflagellés (F). Cystoflagella (E).  
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

**١٤٥٦٩ - سَوْتِيَّات مُطَوَّقَة**  
Choanoflagella (S).  
Choanoflagellés (F). Choanoflagella (E).  
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

**١٤٥٧٠ - سَوُغِيَّ، سَوُغِيَّ** \*  
Cryptomeria (S). Cryptométrie, Sugl (F).  
سوي هو الاسم الياباني. شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من الطنوسيات. مهدها اليابان. ساقها ترتفع نحو ٧٠ م. قشرها حشوية اللون سمر الملاج. شوكها أبيض. خشبها أحمر جوي. افتادها أظنة الارتكاز. أوراقها غززية تطول من ٦٢ إلى ٢٥ م. لونها إلى الخضار الأزرق. أزهارها وحيدة الشق والمسكن. أكرزها كروية، قطرها يراوح من ١٠ إلى ٣٠ سم. جراحاتها حشوية الشكل مقعدة. بزورها جنية، مستطيلة، مرباية السنن || وهي من الأشجار السبروتية المتوسطة النمو. أقاليمها المناطق المعتدلة. تربغ في الألبان المديقة الدور المتوسطة الرطوبة || اغشائها صناعية جيدة الصنف.

**١٤٥٧١ - سَوُوق**  
Marché (F).  
Market, Market-place (E).  
هو المكان الذي تباع فيه الحيوانات والخاصيل الزراعية فتقول سوق الخيل والتمم والخضر والزهر ...

**١٤٥٧٢ - سَوُوق الْخَضَر**  
Halle, Marché des légumes (F). Market-hall (E).  
سوق تباع فيها البقول والخضراوات والفواكه.

**١٤٥٧٣ - سَوُوكَم** \*  
Laburnum (S). Aubour (F).  
جنس شجيرات ونباتات برية وزيينية من فصيلة القرنيات القرشاية. أنواعه عديدة جميعها سبروتية. أوراقها عابلة، مركبة، ثلاثية الورديات. أزهارها عطرية الرائحة، عنقودية التجميع، طويلة المالح، متدلية || أشهر أنواعه السقم الشائع المعروف بالابنوس الكاذب، أطليه.



سَوْتَلَع



سَوْتَلَع بحري اللون

Solena (S).

\* ١٤٥٨٩ - سَوَيْكٌ ٥

Solen (F). Solena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة السولنيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في  
جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمه اسطواني الشكل  
مستطيل تلحفه صدفة بالقرب مشطوفة المؤخر المنفرج.  
يمش مشطاً عمودياً في الرمال المقفورة بالماء || لحمه جيد  
الصنف مرغوب فيه .

Solenidae (S).

١٤٥٩٠ - سَوَيْكِيَّات ٥

Solénidae (F). Solénidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .  
اجناسها وأنواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ||  
اجسامها مستطيلة ، إرجلها اسطوانية ، أصدانها شبه  
عديدة الشكل ، ثنائية المصاريع المتساوية || اعرف  
اجناسها وأشهرها السولن .

Fagaceae (S).

١٤٥٩١ - سَوَيْكِيَّات

Fagacées (F). Fagaceae (E).

هي فصيلة السنديانيات من ذوات الفلقتين العدييات  
الاعمال . تشمل السنديان وإلزان والكسكتة .

Eurygaster integriceps.

١٤٥٩٢ - سَوَيْكَة

E. maurus (S). Souné, Sen (F). Sunn pest (E).  
Asiatische Getreidewanze (D).

وتسمى أيضاً بقصة الزرع . حشرة خاد من فصيلة  
الفاسيانيات . طولها يراوح من ٨ الى ١٢ م . جسمها  
مفلطح الشكل مسطح . ظهرها مجهز بئرس صفيحة درقية  
الشكل لونها الى الصفار الازرق تملوه خطوط مستطيلة قليلة  
الوضوح وبكتبان جليتان عند انتهابه || موطنها بلاد  
الشرق الأدنى . تركب الحشرة والشعر وتوقع بهما اشد  
الاذى لانها تمص السخ تخضع الاسبال وتفسد الذريل .  
تظهر الحشرة الكاملة في اواخر نيسان ثم تتزاوج بعد  
ظهورها باسبوع . كويها يدوم يضع سمات . وبعد كويها  
باربعة ايام تمتح الاثني مكها الصغير ، الكروي الشكل ،  
الاثير اللون ، عل صفحات المصصف العليا ، لطفاً  
متساوية يراوح عددها من ١٢ الى ١٤ وكل لطفة  
تحتوي من ١٢ الى ١٤ مكنة تنقف ، بعد متنها ينحو  
١٠ ايام ، من يرقات دقيقة تبلغ طولها الحشري بعد  
انقضاء اربعة اسابيع تكون غلظا قد مرت باربعة  
انسلخات || والسوية شارة في جميع ادوارها لا سياً  
في الدور الحشري . تكافح اما باستهلاك اسد الحوشر  
الفعالة تمهيداً على الزرع فيقتضي عليها بكاملها . واما  
بحرقها بعد جمعها ضمن اعياب خاصة تستعمل لهذه الغاية .  
ومن الطرق الناجمة استبدال انواع الحشرة البلدية بانواع  
باكورية تمكن الزرع من الاسبال والهيج قبل ان تتمكن  
منه الحشرة .

١٤٥٩٣ - سَوَيْدُ الْقَصَّةِ \* ، نِغْرِيلُ الْقَصَّةِ

Colaspidea atrum (S). Négril de la luzerne, Colaspide, Colaspide, Babotte noire (F). Luzerne grub (E). Colaspide atrum (D).

حشرة من النغريل من فصيلة النغريانيات جسمها يفي  
شكلاً . محبد الظهر . طولها يراوح من ٤ الى ٦ م .  
لونها الى السواد اللامع . تمتح مكها على الفصة فينتق  
عن يرقات تلثم الاوراق || تظهر في نيسان وتستر  
الى ايلول . تكافح باستهلاك الرتيوتين .

Aloë officinal

١٤٥٨٢ - سَوَيْكٌ عَظْرِي

يعرف بالالوة ، اطلبيا .

Aloë striata (S).

١٤٥٨٣ - سَوَيْكٌ مُخَطَّط \*

Aloë strié (F).

نبات عادم الساق شراخه الزهري يعلو من ٤٥ الى ٦٠  
سم . ازهاره مظلية التجميع ، حراء اللون . اوراقه تفل  
من ٤٠ الى ٦٠ سم . نصلها ثخين النسيج ، عادم الحصف ،  
مخطط الصفحة . عتوطها متباعدة لونها الى الجؤرة .  
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

Aloë plicatilis (S).

١٤٥٨٤ - سَوَيْكٌ مِرْوَحِي

Aloë éventail (F).

جنية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها متقابلة ،  
ثنائية التصفيف ، مروحية الهبة ، نصلها يطول من  
٢٠ الى ٤٠ سم . لونه الى الخضرة البحرية . حناره مسن  
الحافة . اسنانه نحيلة ، يضاء اللون . ازهاره ورقالية ||  
متوسطة القد ، طولها يراوح من ٤ الى ٥ سم . || ازهاره  
يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٨٥ - سَوَيْكٌ مُسْتَن

Aloë grandidentata (S).

Aloë à grandes dents (F).

نبات قادم الساق . شراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى  
٤٠ سم . ازهاره مستطيلة الشكل برقالية اللون || اوراقه  
تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم وتعرض نحو ٧ نصلها قليل  
التخديد مألوج الحفار الازرق ، مسن الحافة ،  
شاكلك الاسنان الحادة المتقاربة || ازهاره يستمر من  
حزيران الى تموز .

Aloë ciliaris (S).

١٤٥٨٦ - سَوَيْكٌ مَهْدَب

Aloë cilé (F).

جنية سريعة نحيلة الساق المستطيلة التي تطل نحو ١٠  
امتر . اوراقها خيشة التصل الذي يطلو من ١٠ الى  
١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . حناره مهدب الحافة حسفه  
ابيض اللون || ازهاره عتقوية التجميع لونها الى الحمرة  
الزاهية للالمة || ازهاره يستمر من آذار الى حزيران .

Terokia (S).

١٤٥٨٧ - سَوَيْك ٥

Térékie (F). Terokia (E).

جنس طير من طول الساق وفصيلة الترواقيات . انواعه  
المعروفة ثلاثة جميعها من الصوارب القاطع مشناعا البلاد  
الحارة الاسيوية والافريقية ، مصيفها البلاد المعتدلة الحرارة  
من آسية الشمالية الى اروبوة || اعرف انواعه وأشهرها  
السولة الشهاب .

١٤٥٨٨ - سَوَيْكَة شَهْبَاء \*

Terokia cinerea (S). Térékie grise (F).

طائر من السلم قريب الشبه من البويقة السلطانية . جسمه  
متوسط القد ، منبر الرأس ، مستطيل المتاد النقيق  
التليل الانعفات . رأسه وظهوره وجناحاه وذنبه الى الكهبة  
الشهاب . زوره وعنقه وجوشته وبطنه واغنيكه الى الشبهة  
البياض المالح . ذنبه غزوي الشكل ، قصير . ساقه  
الى السرة الطحلاء || قوته الاشباب والبزور والحشرات .  
انشاء تدن عتها في انموس تقيمه بين الاشباب النجيلية  
المستطيلة القليلة البعد من الماء . جصفها اربع يضاء .



سولع خلط



سولة شهاب



سولن



سولة



سويد القصبة

تتميز باستطالة الفك الأمامي الذي ينتهي بمظف صلب ،  
مستطيل الجرم ، مدبب الطرف . وتتميز أيضاً بدرجة  
انتفاخها التي تبلغ نحو ١٠٠ كيلومتر بالأساعة .

١٤٦٠٧ - سِيَانِيَّة  
Par série (F).  
From series, Standardized (E).  
هو في العرف الاقتصادي الانتاج الآلي بالجملة .

١٤٦٠٨ - سِيَال ٥  
Sial (F). Sial (E).  
اسم اصطلاحي يطلق على القشرة الأرضية الجامدة المكونة  
بمختلها من محاور صوانية وبازلتية ، تقدر سماكتها بنحو  
٦٠ كيلومتر ، تلتف الطلع شبه المائع الذي يدعى سيمه .

١٤٦٠٩ - سِيَالَة  
هي السط السباع شجرة لها ذوك ابيض طويل اذا نزع  
سأل منه ومن الساق صساعة لبنية طيبة . ج سيال .

١٤٦١٠ - سِيَالَة  
Fascie, Liste en tête (F).  
السيلة والساية شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .

١٤٦١١ - سِيَانِيَّان  
Siamang  
هو الجبين السند كليل ، اطليه .

١٤٦١٢ - سِيَانَامِيد  
Cianamide, Cyanamide  
السياناميد او الكلس الازوتي من الاسمدة الكيماوية  
التركيبية التي يستحصل عليها بتثبيت الازوت الجوي  
على كربور ، الكلسيم . اشكاله التجارية الشائعة  
الاستعمال ثلاثة :

١ - السياناميد المبرغل . يحوي من ٢٠ الى ٢٤٪  
ازوت مع ٧٠٪ كلس . حبيباته سوداء اللون ، ثوبية  
الرائحة .

٢ - السياناميد المسحق الزرني . يحوي من ١٨  
الى ٢٠٪ ازوت مع ٦٠٪ كلس ويضاف اليه نحو  
٣٪ من الزيت المعدني لتسهيل لتثريه . مسحوق اسود اللون ،  
دمي الملمس ، ثوبية الرائحة .

٣ - السياناميد القلوي او نيتراسياناميد . يحوي ١١٠٪  
ازوت اميدي و ١٠٥٪ ازوت نيتريكي . فهو كروي  
الحبيب ، عادم الرائحة . اسمر اللون .

١٤٦١٣ - سِيَانِيَّة ٥  
Cyanella (F). Cyanella (F).  
جنس نباتات جذموية برية وثرثرية من فصيلة الزنبقيات.  
انواعها المعروفة ستة منها بعض مناطق افريقية الجنوبية ||  
جذاميرها درية او دوفضية . سوقها شراعية فرعاء . اوراقها  
حاجسة ، مستطيلة ، متعاقبة ، زاهية الخضار . ازهارها  
عقودي التجميع . ازهارها صفيرة جيلة ، زرقاء اللون او  
صفراء || تزور في المراكز انما تجنى البرد .

١٤٦١٤ - سِيَانُوجِين  
Cyanogène (F). Cyanogen (E).  
غاز شديد التفاعلية مثال مركب من الكربون والازوت .

١٤٦١٥ - سِيَانُور ، سِيَانِيد  
Cyanure (F).  
اتحاد السيانوجين مع جسم بسيط .

١٤٦١٦ - سِيَانُطُسْ  
Ceanothus (S).  
Ceanotho, Ceanota (F). Blue tea bush, Red root  
tree (E). Säckelblume (D). Ceanoto (I).  
جنس نباتات برية وثرثرية من فصيلة البقيات . انواعه

١٤٥٩٤ - سُوَيْدَاءُ

Albumen, Albumine, Endosperme, Périsperme (F).  
Albumen, Albumin, Endosperme, Perisperm (E).  
مادة نقوشية او دهنية او آسية تكون في البزرة تحتلي  
منها الملقحة .

١٤٥٩٥ - سُوَيْدَاة هي الدلو ، اطليه .

١٤٥٩٦ - سُوَيْقُ سُلُفِي  
Hypocotyle (F).  
Hypocotyl (E).  
هو الجزء السفلي من الجنين مركزه بين السنج والفلقتين .

١٤٥٩٧ - سُوَيْقُ عُلُوي  
Epicotyle, Tigelle (F).  
Epicotyl (E).  
هو الجزء الامعل من الجنين مركزه فوق النتش و فوق  
الفلقتين تحمّل الساق من نمو .

١٤٥٩٨ - سُوَيْكَنَة  
Phlebotome (F).  
هي السكتة نوع من البعوض الصغير الساتك .

١٤٥٩٩ - سَوِيل  
Egal, Pareil (F). Equal, Like (E).  
السريل او المديل .

١٤٦٠٠ - سِيَانَج ، وَسْجِع  
Hale (F). Hedge (E).  
فاصل من اثمار او جنات حية يفصل الخديفة او  
الحقل عن غيرها .

١٤٦٠١ - سِيَانَاة  
Planète (F). Planet (E).  
السيارة او الكوكب السيار جرم فضائي كبير القدر  
يدور حول الشمس ويستمد منها النور كالارض وضارده  
والمرئخ والشمس ...

١٤٦٠٢ - سِيَانَج  
Ben (F).  
هو البان ، اطليه .

١٤٦٠٣ - سِيَانَف هو سوسن المناطق ، اطليه .

١٤٦٠٤ - سِيَانَف الْبَحْر  
Xiphias (S).  
Espadon (F). Swordfish (E).  
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من فصيلة الاسقمريات .  
انواعه عديدة يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة .  
تتميز باستطالة عظم ذكها الامعل الذي يدور كالسيف .  
اشهر انواعه سيانف البحر المعروف .

١٤٦٠٥ - سِيَانَف الْبَحْر الْمَعْرُوف \* ، اَبُوسَيْف  
Xiphias gladius (S). Espadon commun, Poisson  
épée (F). Common swordfish (E).  
نوع من سيانف البحر كبير الجثة والسيف والزئفسنة  
الظلمرية . طوله يبلغ حدة امتار . موطنه المتوسط  
والاطلسي .

١٤٦٠٦ - سِيَانِيَّات  
Xiphilidae (S).  
Xiphilidae (F). Xiphilidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف كانت في  
التصنيف الماضي من توابع فصيلة الاسقمريات || انواعها  
المعروفة قليلة العدد ، اشتهرها سيانف البحر والرياح والسارية .  
جميعها من الاسماك البنية التي لا تقترب كثيراً من المالح  
والسواحل || موطنها بحار البلاد الحارة غير انها لا تمتنع  
من تغيب اسراب الزئفة والسردين حتى في بحار البلاد  
المعتدلة الحرارة || اجسامها كبيرة القد و شمية الشكل ،



سيانف البحر المعروف



سيانلة

الاعنة . وهي صورة رِبِلْ قَائِمٌ عَلَى رِجْلِهِ الْيَسْرَى وَقَدْ رَفَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى فَوْقَ رَأْسِهِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى رَأْسَ غُولٍ .  
عُدَّ نَجْوِيهَا ٩٩ «شَهْرَهَا» «الْمَرْقُوقُ» وَ«رَأْسُ الْغُولِ»  
و«عَاتِقُ الثَّرِيَا» .

Pommier (F).

١٦٩٢٤ - سَيْبِيبْ

هو التَفْخَاحُ ، اَطْلَبْ .

١٦٩٢٥ - سَيْتْرِيسُ الزَّوْرُجْ \*

Scythris temperatella (S).

فَرَّاشَةٌ صَغِيرَةٌ الْقَدَمُ مِنْ فَصِيلَةِ التَّارَاتِيَا تُورِثُهَا إِلَى السَّمَرَةِ  
الْمُكَادَنَةِ . اجْتَمَعَتْهَا مَهْدَبَةُ الْإِطْرَافِ . زَيَانَاهَا عَيْطِيَانُ  
مُسْتَعْيِلَانُ . جِيلُهَا الْحَوْلِيُّ وَاحِدٌ . رَقَبَتُهَا تَدْمِي دَوْدَةَ  
الزَّوْرُجْ ، اَطْلَبْهَا .

١٦٩٢٦ - سَيْتْسُسْ هُو الزَّوْرَانُ ، اَطْلَبْ .

١٦٩٢٧ - سَيْتْفُورْ \* ، فُكْمَةُ مُتَوَجِّهَةٌ \*

Cystophora (S). Cystophore, Phoque & capuchon (F). Hooded seal (E).

حَيَوَانٌ بَحْرِي لَبُونٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْفَقْعِيَّاتِ . اَعْلَانُهُ مَجَاحُ  
بَحَارِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ مِنَ الزَّوْرُجِ إِلَى الْقُطْبِ وَالْأَرْضِ الْجَدِيدَةِ  
طُولُهُ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَمْتَارٍ . قُوَّتُهُ إِلَى السَّوَادِ الْأَزْرَقِ الْمَوَاجِ  
تَمْلُؤُهُ رَقَشَةً بِيضَاءً . رَأْسُهُ أَطْرَافُهُ سَوْدٌ . يَتَمَيَّزُ الذَّكَرُ بِخُزْمَةٍ  
فَيَاجِبُهَا تَمْلُؤُ الرُّأْسِ فَتَزِيدُهُ جَمْعًا ۥ الْإِنْثَى تَقْضَعُ جِرَاءً وَاحِدًا  
فِي الْحَوْلِ ، أَيْضًا الْوَحْدُ ثُمَّ يَسْرِعُ مَعَ الْعَمْرِ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ  
الْثَّاهِيَّ عِنْدَ الْكَتِفِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ۥ قُوَّتُهُ الْإِسْمَاكُ وَالْقَشْرِيَّاتُ  
وَالرَّيْشَوِيَّاتُ ۥ يَصَادُ مِنْ أَجْلِ فَرْوَتِهِ الْفَاحِشَةِ الصَّنْفِ .  
وَيَنْهَمُ مِنْ أَكْلِ الْحَمِّ وَاسْتِمْلَالِ الزَّيْتِ وَالْأَمْلَاءِ وَالنَّطَامِ .

١٦٩٢٨ - سَيْفُكَلْ ، كَلْبُ الْبَحْرِ . Mustel (S).

Emissole (F). Smooth hound, Prickly hound (E).  
لَا يُمْكِنُ اعْتِدَافُ اسْمِ «كَلْبِ الْبَحْرِ» لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى أَكْثَرِ  
مِنْ عَشْرَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْإِسْمَاكِ الْكَبِيرَةِ الْمُقَرَّمَةِ ۥ وَالسَّيْتِلِ  
جَنْسِ إِسْمَاكِ بَحْرِيَّةٍ وَلَوْ دُونَ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَيْكِيَّاتِ . أَنْوَاعُ  
الْمَعْرُوفَةِ قَلِيلَةٌ . اَعْلَانُهَا بِحَارِ الْبِلَادِ الْحَارَةِ وَالْمَحْدَلَةِ الْحَرَارَةِ  
جَمِيعَهَا مُقَرَّمَةٌ بِطَاشَةٍ لَا تَعْفُ مِنْ شَيْءٍ . سَرَسُهَا أَلَمٌ تَحْمَرُهُ  
كُلُّهَا ۥ أَجْسَامُهَا وَشَعْنَةُ الشَّكْلِ ، تَطُولُ مِنْ ١٤٠ إِلَى  
٢٠٠ سَم . أَلْوَانُهَا تَتَرَاوَحُ بَيْنَ الْكَلَسَةِ وَالرَّبْدَةِ الْمُتَفَارِقَةِ  
الْمَاجِاتِ . رُؤُوسُهَا مَحْزُورَةٌ . اشْتَدَّاهَا السُّفْلَى قَصِيرَةٌ  
مُتَأَخَّرَةٌ . اسْتَانَتَا صَغِيرَةٌ ، حَادَةٌ ، مِثْلَاسِكَةُ الرَّصَفِ .  
نَسِيْبَاهَا مَجْزُوزٌ بِصِيَامَاتٍ سَادَتُهُ تَنْتَفِعُ وَتَنْتَفِلُ عِنْدَ الطَّلَبِ .  
قِيَمَةُ النِّسَمِ تَتَأَخَّرُ مُؤَخَّرَةً عَنِ ۥ زَعَانِفُهَا مُتَابِعَةٌ التَّرْتِيبِ  
وَالْإِسْكَالِ . الذَّيْلِيَّةُ كَبِيرَةٌ ، مُسْتَطِيلَةٌ ، ثَنَائِيَّةُ التَّغْرِيقِ  
السُّفْلَى ۥ اَعْرِفْ أَنْوَاعُهَا وَشَهْرَهَا السَّيْتِلِ الْمَبْدُولِ وَالسَّيْتِلِ  
الْأَسْلَسِ .

١٦٩٢٩ - سَيْفُكَلْ أَمْلَسْ \* Mustel levis (S).

Emissole lise (F). Smooth hound (E).  
نَوْعٌ مِنَ السَّيْتِلِ . مِثْلَةُ بَحْرِيَّةٍ وَلَوْ . اَعْلَانُهَا الْبَحْرِ الْإِيْضَى  
الْمُقَرَّبُ وَبَعْضُ مَنَاطِقِ الْهَيْطِ الْإِسْلَاسِيِّ اَعْصَمَهَا الْمُتَطَلَّةُ  
الْمَحْدَلَةُ مِنْ جِبَلِ طَارِقِ الْكُونَاكِرِيِّ ۥ جَسْمُهَا وَشَعْنُهَا  
الشَّكْلِ يَطُولُ مِنْ ١٤٠ إِلَى ١٦٠ سَم . ثَوْبُهَا إِلَى الرَّبْدَةِ  
الْمُخْطِطَةِ تَزْرُقُ وَتَسْرِعُ فِي الظُّهْرِ وَتَقْبِرُ وَيَتَبَيَّنُ فِي الْبَطْنِ .  
مَسْكُهَا مَالِسُ الْبَشَرَةِ عَادِمُ الْحَتِيبِ ۥ لَحْمُهَا كَاعَمُ  
الصَّنْفِ ، قُلٌّ مِنْ يَرْغَبُ فِيهِ . مَسْكُهَا شَالِعُ الْإِسْكَالِ  
الصَّنَاعِي . زَيْتُهَا جَيِّدُ الصَّنْفِ .

الْمَعْرُوفَةُ ٢٠ مَنْتَبِهَا الْمَنَاطِقُ الْأَمْرِيكِيَّةُ الْحَارَةُ . أَوْرَاقُهَا  
عَابِلَةٌ مُتَعَابِلَةٌ بِسِطَةٍ . اَنْزَارُهَا خَشَوِيَّةٌ ، خَاسِيَةُ التَّرَكِيبِ  
مَلُونَةُ التَّوْبِجِ . ثَمَارُهَا جِرَاءُ ثَلَاثِيَّةُ الْفَلَقِ ۥ اَشْهَرُ أَنْوَاعِهِ  
مَا يَلِي .

١٦٩١٧ - سَيَانُطُونُسْ أَمْرِيكِي Ceanothus

americanus (S). Céanothe d'Amérique (F).

جَنْبَةٌ مَعْمَرَةٌ تَمْلُؤُ نَحْوَ ١٠٠ سَم . أَوْرَاقُهَا أَهْلِيلِيَّةٌ ،  
ذَلْقَةٌ ، مَدْبِيَّةٌ . نَصْلُهَا نَامُ النَّسِيجِ ، مَسْنُ الْحَافَةِ ،  
بَحْرِي الصَّفْحَةِ الْعَالِيَا ، اَنْزَابُ السُّفْلِ ۥ اَنْزَارُهَا عَالِيَةُ  
التَّجْمِيعِ ، قَبِيَّةُ الْبِلَاتِ لِلْإِسْكَالِ الْبِيْضِ ۥ اَنْزَارُهَا  
يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرِيَانِ إِلَى آبِ . يَسْتَخْرِجُ مِنْ جُلُودِهِ مَوَادَّ  
طَبِيْعَةً كَثِيرَةً تَنْفَعُ تَصْلُحُ فِي مَعَالِجَةِ السُّفْلِ وَالزَّحَارِ  
وَبَعْضِ الْحَيَاتِ .

١٦٩١٨ - سَيَانُطُونُسْ عَمَلِيَّيْ Ceanothus

velutinus (S). Céanothe velouté (F).

جَنْبَةٌ مَعْمَرَةٌ تَمْلُؤُ نَحْوَ ١٨٠ سَم . أَوْرَاقُهَا مُسْتَدِيرَةٌ  
الْقَاعِدَةُ ۥ مُسْتَطِيلَةُ النَّصْلِ الذَّلْقُ الْحَمْلِي الْبَشَرَةِ عَلَى صَفْحَتَيْهِ .  
اَنْزَارُهَا بِيْضَاءُ اللَّوْنِ ، عَشْكَوَلِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، صَغِيرَةُ الْقَدَمِ .  
اَنْزَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرِيَانِ إِلَى تَمُوزِ .

١٦٩١٩ - سَيَانُطُونُسْ سَمْتَجُونِي Ceanothus

azureus (S). Céanothe azuré (F).

جَنْبَةٌ مَعْمَرَةٌ جَادِسَةٌ تَمْلُؤُ مِنْ ١٠٠ إِلَى ٢٠٠ سَم . فُرُوعُهَا  
أَسْطَوَانِيَّةٌ ، زِيَادُ الْعِلَاقِ . أَوْرَاقُهَا سَنَائِيَّةٌ قَلِيلَةُ التَّنَسُّبِ .  
نَصْلُهَا أَغْصَنُ الصَّفْحَةِ الْعَالِيَا ، خَلِي السُّفْلِ الصَّلَاحِ  
اللَّوْنِ . اَنْزَارُهَا كِبَاسِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، سَقِيلِيَّةُ الشَّكْلِ ،  
سَمْتَجُونِيَّةُ اللَّوْنِ ۥ اَنْزَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَيْارِ إِلَى تَمُوزِ .

١٦٩٢٠ - سَيَانُطُونُسْ فَنْدَلِرْ Ceanothus

fendleri (S). Céanothe de Fendler (F).

جَنْبَةٌ مَعْمَرَةٌ فَرَّاشَةٌ شَائِكَةٌ ، تَمْلُؤُ مِنْ ١٠٠ إِلَى ١٥٠ سَم .  
فُرُوعُهَا بَحْرِيَّةُ اللَّوْنِ . أَوْرَاقُهَا بِيْضِيَّةٌ ، صَغِيرَةُ الْقَدَمِ ،  
عَادِمَةُ التَّنَسُّبِ . نَصْلُهَا مَالِسُ الصَّفْحَةِ الْعَالِيَا ، خَلِي السُّفْلِ  
الْقَضِيَّةِ اللَّوْنِ . اَنْزَارُهَا عَقْدِيَّةُ التَّجْمِيعِ لَوْنُهَا إِلَى الْبِيْضِ  
الْيَلْبَكِيِّ ۥ اَنْزَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرِيَانِ إِلَى تَمُوزِ .

١٦٩٢١ - سَيَانُطُونُسْ قُثُورِيَّ الزَّهَر Ceanothus

thyrsiflorus (S). Céanothe en thyrses (F).

ثَغِيرَةٌ تَمْلُؤُ مِنْ ٣ إِلَى ٦ أَمْتَارٍ . فُرُوعُهَا مُعْلَمَةٌ مَالِسَةٌ  
الْعِلَاقِ . أَوْرَاقُهَا أَهْلِيلِيَّةٌ ، عَادِمَةُ التَّنَسُّبِ . نَصْلُهَا  
اَنْزَابُ الْعُرُوقِ ، بَاهِتُ الْخَضَرِ . اَنْزَارُهَا قُوَّتِيَّةُ التَّجْمِيعِ ،  
سَقِيلِيَّةُ الشَّكْلِ ، زُرْقَاءُ اللَّوْنِ ۥ اَنْزَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَيْارِ  
إِلَى تَمُوزِ .

١٦٩٢٢ - سَيَانُطُونُسْ مُسْتَنْ Ceanothus

dentatus (S). Céanothe denté (F).

جَنْبَةٌ مَرْبُوتِيَّةٌ مَعْمَرَةٌ تَمْلُؤُ مِنْ ١٥٠ إِلَى ٢٠٠ سَم .  
أَوْرَاقُهَا أَهْلِيلِيَّةٌ مُسَنَّةٌ ، نَصْلُهَا مَالِسُ الصَّفْحَةِ الْعَالِيَا ،  
مُكَوِّفُ الْخَنَازِ السَّنَنِ ، خَلِي الصَّفْحَةِ السُّفْلَى الثَّغِيرِ  
اللَّوْنِ ۥ اَنْزَارُهَا غَسِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، زُرْقَاءُ اللَّوْنِ .  
اَنْزَارُهَا يَدُومُ طَوَالَ شَهْرِ أَيْارِ .

١٦٩٢٣ - سَيَاوُسْ ، فِرْسَاوُسْ Persée (F).

Persée (E).

سَيَاوُسٌ أَوْ فِرْسَاوُسٌ وَتَدْمِي أَيْضًا حَامِلُ رَأْسِ الْغُولِ ،  
كَوْكَبِيَّةٌ مَجْمُودٌ شَمَالِيَّةُ الْهَيْطِ مَرْكَزُهَا بَيْنَ ذَاتِ الْكُرْسِيِّ وَبَلَدِ



سَيْتْرِيسُ الزَّوْرُجِ



سَيْتْفُورْ



سَيْتِلْ أَمْلَسْ



لونها الى الجؤرة تركب قشور البَار قرب ادراكها قشورها.  
يكافح عند ظهوره باستمال احد الغواير النحاسية  
الخفيفة .



سيتل مبدول

### ١٤٦٣٨ - سَيْتُونُوجِيَّة ، عِلْمُ الْخَلَايَا

Cytologie (F). Cytologie (E).  
علم يبحث في ماهية وحياة الخلايا من جميع النواحي ان  
جسمورية او كيميائية او خلافا .

### ١٤٦٣٩ - سَيْتُونُورُفُولُوجِيَّة

Cytomorphologie (F). Cytomorphologie (E).  
الدراس القياي (المورفولوجي) الخاص بالفجيرة او الخلية .



سيتوان الزرع

### ١٤٦٤٠ - سَيْتُونٌ ٥

Sitona (S). Sitone (F).  
جنس حشرات صغيرة القد مستطيلة الجسم من فصيلة  
السويات . انواعه عديدة تطول من ٥ الى ١٦ م .  
انواعها مختلفة الالوان السوية يكثر فيها الاطمل والخطى .  
تركب مختلف نباتات الفصيلة القرنية . افراغها زبدية  
لا تتجاوز عطب بعض الاوراق .



سيتوان زياء

### ١٤٦٤١ - سَيْتُونٌ مُخَطَّطٌ ٥

Sitona lineata (S).  
Sitone du pois (F). Sitona lineata (E).  
حشرة غاضلة مؤذية من فصيلة السويات ورتبة مفدمات  
الاجنحة . خنافسها تمش على اوراق القطايات البرية  
والزراعية . يرقاتها تركب الجذور لتصلبها || جسمها صغير  
القد يطول من ٤ الى ٥ م . ثوبها الى الشبهة الخضراء تعلوها  
ماجة كستنية جؤوية تتقلب مع انعكاس البتور . راسها  
ستعرض الجرم . عينها كبريتان . زباناها رقيقان .  
متكها مشدل الطول . ظهورها مستدير الطول اللامع .  
غداها كهيئة الخمل ، خفيقتا التحزير القاطب . ارسافها  
رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تخرج  
الحشرة الجملانة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع وتعيش  
حتى اواخر تموز . ترحل في النهار . تتنافد بدم ظهورها  
باسويون . تمتع الحكن بل نصل الاوراق وفي التربة .  
اما متوسط ما تمتحه من مكن فنس ١٤٠٠ || البرقة عند  
بلوغها الادراك اتام تطول نحو ٦ م . جسمها مقوس  
الشكل عادم الراجوب ، تبي اللون ، اسمر الرأس || طول  
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة  
ضمن جراب من الطين والمواد النباتية .



سيتوان لمبعة

١٤٦٤٢ - سَيْتُونٌ ٥  
Cétine (F). Catin (E).  
السيتين مادة دهنية تستخرج من بعض انواع الحياتن اعصها  
النبر .



سيتون

### ١٤٦٤٣ - سَيْتُونُوجَان

Scarus siganus (S).  
Scare sidjan (F).  
سمكة بحرية من بنات مصقار مأكولة طية العلم كان  
لها شهرة في المصور النابرة .



سيتون غطلم

### ١٤٦٤٤ - سَيْج

Ruisselement (F).  
Run off surface (E).  
مقدار الماء الذي يسيل على مساحة معينة من الارض .

### ١٤٦٤٥ - سَيْج ، صَهَر ، اسَاح ، اسَاح ، سَيْك

Fondre (F). To melt. To cast (E).  
ذوب  
قاد او درج التي الى حالة اللاتية .

١٤٦٣٠ - سَيْتَلٌ مَبْدُولٌ \*  
Mustelus vulgaris, Mustelus mustelus (S). Emission commune, Moutelle (F). Prickly hound (E).  
نوع من السيتل . سمكة بحرية ولد . اعطائها فصيلة  
الاربام تشل معظم المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من  
المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || تعتبر من  
الاسماك البنية . سرسها عرض البسر || جسمها وشي  
الشكل يطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم . ثوبها الى الكلبة  
قزرة وتقم في الظهر وتغير في البطن . سكتها مبشر  
التصيب واوائل الصيرة النحاسية الحمر || سكتها شائع  
الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف . لحمها كائن  
قل من يرطب فيه .

### ١٤٦٣١ - سِيَوَان

Cétone (F). Chafer (E).  
جنس خنافس من فصيلة الجليات انواعه المعروفة نحو  
٣٠٠ جميعها جيلة الالوان الزاغبة تمش على رحيق  
الازهار ويصل العسارة النباتية التي تمتصها حبيبا استطاعت.  
يرقاتها تعيش على المواد العضوية المتحللة . اشهر انواعه  
ما يلي .

### ١٤٦٣٢ - سِيَوَانُ الزَّرْعِ \*

Oxythre funesta (S).  
Cétone stictique (F).  
نوع من السيتوان طولها نحو ١٠ م . ثوبها الى السواد اللامع  
تتلو رقة يضاء || تركب الزروع قبل الاسبال  
تفتقي على اقلها . وتركب الازهار على اختلاف  
انواعها وقد لا تمتع من زمامت الكربة في ابان الازراق .

### ١٤٦٣٣ - سِيَوَانُ زِيَاة \*

Epicometis hirtella (S).  
Cétone velue (F). Blossom feeder (E).  
نوع من السيتوان طولها يراوح من ٨ الى ١١ م . جسمها  
ازغب البشرة . ثوبها الى السمرة المايقة تعلو رقة خفيفة  
من البياض . غداها مشوبان بوشع زغبى اسهب الحرج .  
تركب اذهار الاجار المشرقة فتقرضها ولا تمتع من  
الوردة والازهار الخفيفة .

### ١٤٦٣٤ - سِيَوَانُ مَدَّهِيَّة \* ، جَعَلُ الزَّوْدِ

Cetonia aurata (S). Cétone dorée, Hanneton des roses (F). Flower beetle, Sap chafer, Green rose chafer (E). Goldrosenkäfer, Goldkäfer (D).  
نوع من السيتوان طولها يراوح من ١٤ الى ٢٠ م .  
ثوبها الى الخضر النحاسي تعلو ماجة ذهبية || تركب  
الازهار واوائل الناحية ، يكثر وجودها على الوردة والمان  
والمرارة || رقاتها تمش على المواد العضوية اعصها  
جذوع الصناعات المقطوعة .

### ١٤٦٣٥ - سِيَوُ يَلَاوَه

Cytoplasme (F).  
Cytoplasm, Cytoplasma (E).  
هي المادة الاولى اي المادة البروتوبلاذية التي تحرق  
بجيلة الخلية النباتية .

### ١٤٦٣٦ - سِيَوُ سَبُورِيَّة ٥

Cytosporina (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة السيفيات . بكتياته  
ضدية التجميع تحضها وزيمة درزية الشكل نائكة . شفراته  
اسطوانية . بويضاته غطيلة مستقيمة شفافة || انواعه  
قليلة اعرفها النوع الذي يمتري اللين الوسي .

### ١٤٦٣٧ - سِيَوُ سَبُورِيَّة الْيُوسِي ٥

Cytosporina citripedia (S).  
فطر مجهرى يصيب ثمار اللين الوسي فيمطها . مظهره  
الخارجي يقع مستديرة منخفضة السطح قطرها نحو ٧ م .

١٦٦٥٢ - سيراس هو الزجس البري ، اطلبه .

١٦٦٥٣ - سيراسيوم Cerastium (S). Céraiste (F).  
Starry grasswort (E). Hornkraut (D). Cerastio (I)  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . انواعه  
عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تربسي . سورها  
وفرعها مزغبة اللحم ، زهابها ابيض || اوراقها متقابلة  
نصلها ضيق الصفحة . ازهارها عديدة ، كبيرة القد ،  
بيضاء اللون || تزرع على حافة الممرات وفي المواق  
الصخرية || اشهر انواعه ما يلي .

١٦٦٥٤ - سيراسيوم ابيض \*  
Cerastium candidissimum (S). Céraiste blanc pur (F).  
يعلو من ١٢ الى ١٥ سم . فروعه عديدة متراكبة زهابها  
كثيف التجميع ، فضي اللون || اوراقه طول نحو  
٢ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهاره صغيرة القد شديدة  
البياض الثلجي || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٦٥٥ - سيراسيوم كبير الزهر \*  
Cerastium grandiflorum (S). Céraiste à grandes  
fleurs (F).  
يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . زفيه افرق الانتشاب .  
اوراقه خيطية طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم .  
ازهاره تعد من ٧ الى ١٥ ، قطر الزهرة يراوح بين ٣ و ٢ سم .  
ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

١٦٦٥٦ - سيراسيوم مزغبر ، أذن القارة  
Cerastium tomentosum (S). Céraiste tomenteux,  
Argentine, Oreille de souris (F).  
يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . زفيه كثيف التجميع مجعد .  
اوراقه منتصبه طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ٤  
الى ٦ سم . ازهاره مستطيلة ، بتلاتها سنائية الشكل لونها  
الى البياض الاغبر || ازهاره يستمر من ايار الى  
حزيران .

١٦٦٥٧ - سيرة ، سيلة ، مظمورة  
Silo  
حفرة مستديرة خاصة او بناء موصوف اسطواني الشكل  
ملسوط الارتفاع تحفظ فيها ، بعض البوت ، الحبوب  
والجنود والصالق والكلاء الخ .

١٦٦٥٨ - سيرفيس  
Syrts  
هي بقعة البغل ، اطلبه .

١٦٦٥٩ - سيرج ، شيرج  
Huile de sésame (F).  
Sesame oil (E).  
هو دغن السسم اي زيت يستخلص من زور السسم  
بعد نقعها بالماء وتصفيها وتحميصها وطحنها لاتاج  
الطبخية ثم تسرب الطبخية لغرز السرج عن الكسب .

١٦٦٦٠ - سيريس ، سيريس  
Cereus (S). Cierge (F). Hedge cactus, Torch thistle  
(E). Kerzenkactus, Säulenkaktus (D). Cero (I).  
جنس نباتات برية وتربسية من الصباريات الشوليات .  
انواعه زهاء ٣٠٠ تتميز بتاتلها الجسومري اللاقياسي .  
معظمها من نباتات المناطق الحارة الارامية . ازهارها  
جميلة الشكل وكبيرة القد || اعرف انواعه واشهرها  
ما يلي .

١٦٦٦١ - سيداك  
Sida (F).  
هو الخورق جنس نباتات عشبية من الخلياز يات .

١٦٦٦٢ - سيداكوية صفراء \* ، سيداك  
صفراء \*  
Cibaria fulvata (S).  
Cidaria jaune (F). Cidaria fulvata (E).

حشرة من فصيلة الاقيات وربة حشرقيات الاجنسة .  
موطنها يشمل بعض اقلام حوض البحر الابيض المتوسط  
والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشها جارية قوتها رقيق  
الانزار . مرتسها غاصلة تعيش على اوراق العوج  
والنسرين || جسمها صغير تقصيف يطول نحو ٩ سم .  
يسطها نحو ٣١ سم . رأسها مستدل الجرم اصفر اللون .  
عيناها صغيرتان . زبابها خيطيان . مرتسها متوسط الطول .  
جوفها اصفر اللون ، اكلف المواج . بطنها اصفر اللون  
اشعث المواج . رواشها ، عند التقئين ، الى الصفراء  
الكبريتي تملو في الزوج الامامي ثلاث بقع برتقالية ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح  
من المص من اقل فحة الليل . تماثل بعد ظهورها بنس  
سنة اسابع وتمتد المكان مبياديا على الصفحات السفلى  
من نصال الاوراق || السرعة تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم .  
جسمها اسطواني الشكل ، مالم القشار . ثوبها يمان  
البيثة التي تعيش فيها . رواجبها البنية الوسطى ماصة ما  
يعدو بها الى القشور والشب عند الانتقال || طور  
الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الجناة  
ضمن صلجة معتدلة الحبل .

١٦٦٦٨ - سيداق ، سيداق  
قل فيه : حجر ذو ساق قوية تشبه حراق ورماد حريق  
خشبه يبيض به غزل الكتان .

١٦٦٦٩ - سيلو ، حشم الفصاح  
Cidre (F).  
Cider (E).  
خر تصنع من عصير تفاح السيدر .

١٦٦٧٠ - سيراء ، قطير .  
Tegmen, Secondine (F).  
Tegmen, Secundine (E).  
هو اللشاه الشفاف الباطي الذي يغلف البيضة والبرز .

١٦٦٧١ - سيراقوريس \*  
Ceratophrys (S).  
Cératophrys (F).  
جنس ضفادع جامة من فصيلة الكدايات . انواعه المعروفة  
عشرة مهدها معظم بلاد امريكا الجنوبية || اجسامها كبيرة  
القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . عند الذكور ومن ٢٠ الى  
٢٥ سم . عند الاناث . رؤوسها غليظة مستعرضة تملوها  
تسومات غشوية جنية الشكل تكتنف الرأس والحلم وتعد  
كاجدة عبر الظهر الى العجز . عيونها كبيرة مستديرة  
جاسنة . اجفانها متوسية بقرن مديبة الاطراف غشوية  
المادة . فكوكها السفلى عادة الاسنان . بلاعيم الحوافية  
الصوتية كبيرة القد ليموية الشكل والقدر . اصابع قوائمها  
الامامية ملطقة . اصابع القوائم الخلفية نصفية الخطاب .  
جلودها مثاقلة || اثنائها متراكبة الالوان يكثر فيها الحطفي  
والاخضر والامر المايق والصنابي والاخر || تعيش معظم  
حياتها التي لا تقل عن ١٥ سنة في البر . تسرح في الليل  
وتبيت في النهار داخل انفاق سطحية تحتفروا في التربة ||  
قوتها الحشرات والقار والجوران والظاء والزوغ والاساريع  
والديدان .



سيداكوية صفراء



سيراقوريس



سيراسيوم ابيض



سيراسيوم كبير الزهر

البتلات اللانفصلة. عليها خامس الاسدية او عشارها. يبيضها بجهر يظل مستطيل غالباً ما يكون مشطوياً منذ النضارة || اشهر اجناسها السيريلى.

#### ١٦٦٦٨ - سِيرِيَّة \* Cyrena (S).

Cyrène (F). Cyrena (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحات الخياشيم والارجلين من فصيلة السيريديات. انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع انهر وبحيرات المناطق الحارة || اصنافها كبيرة القد، شبه قلبية الشكل، لامتساوية المصارع والاصابع، ثلاثية الانسان الرئيسية، ثنائية المصارع الطويلة || تعيش في الاسمال. لحومها مأكولة، مبتذلة الصنف.

#### ١٦٦٦٩ - سِيرِيَّسُ Cerenox

مظهر زراعي شديد الفاعلية يستعمل في مكافحة بعض امراض الشوندر اخصها الامراض التي تركب البزور عند انتاشها والشتول اخصها اشهرها القومى وخفيف باربانوم والقويس || مادته الفتالة تركب على مركبات عضوية خالية من المادان والازيت عادمة الرائحة لا تؤذي الانسان والحيوان ولا تؤثر على الجلد والافشاة الحظاية. يستعمل على حالته مسحوقاً ناعماً جافاً بمعدل ٣٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو من بزور الشوندر والخيار والكتان والبنورة والقطن.

#### ١٦٦٧٠ - سِيرِيَّيَات \* Cyrenidae (S).

Cyrénidés (F). Cyrenidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات صفيحات الخياشيم والارجلين. اجناسها وانواعها عديدة، منها الغابرة وهي من متحجرات الاراضي الجيرية، ومنها المعاصرة وهي منتشرة في معظم انهر وبحيرات العالم || اصنافها صليوية او قمية الشكل ملحوقة بشفاء اخضر اللون او بني. مثابها ثنائية، طليقة، صفيرة او معتدلة اللون. ارجلها صفيحة الشكل || تعيش منفردة في الاسمال. وقاعها الشوي ينشر من اواسط الخريف الى اوائل الربيع || اعرف اجناسها واشهرها السيرية والصلفود والسلام واللغاة والقيشرة.

#### ١٦٦٧١ - سِيرَال \*، سِيرْسَل، بَاهِرَة لِيْقِيَّة Agave sisalana (S).

Agave sisal, Chanvre de sisal, Sisal (F). Sisal hemp (E). Sisalhant, Hanfrás (D). Canapa di sisal (I).

نوع من الباهرة سابقا تملو نحو متر، قطرها يراوح بين ٢٠ و ٣٠ سم. شراخها يرتفع من ٤ الى ٤ امتار. اوراقها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فصلها بحري اللون، حناره غسروي التركيب، مقعصة ذرية، مذلها اسمر || اوراقها ليقية متناحية شائعة الاستعمال.

#### ١٦٦٧٢ - سِيرَالِيَّيَات، عَشْدِيَّيَات Caesalpinea (S).

Césalpinidés (F). Caesalpinea (E). سيب من الثريات اجناسها وانواعه نحو ٦٠ منها الاجنار والشجيرات والجنات والاصحاب. ازهارها غنظلة الالوان يثلب فيها الاصفر والاحمر. ثمارها قرنية مبطلة مستعرضة يفتحجر منها صباغات حر وصفر. اشهر اجناسها الهندام، اطليه.

#### ١٦٦٧٣ - سِيرَامِيَّة \*، عَشْقِيَّة الْقَصَب، دُرْدَة الْقَصَب الْكَبِيرَة Sesamia nonagriodes, S. cretica (S).

Sésamie (F). حشرة من الغنقيات طولها نحو ١٦ سم. رأسها وصدرها

#### ١٦٦٦١ - سِيرُوسُ الْأُرْجَتَيْنِ Cereus pasacana (S).

Cierge pasacana (F).

نبات منتصب يعلو من ١٠٠ الى ٥٠٠ سم. ساقه عديدة الصلوع القليلة المنق. سدرياته حنطية اللون هدبا حجري المسلس، ابيض اللون، يطول نحو ١٢ سم. || ازهاره دجوية الانبلاج، متوعدة القد، تطول نحو ١٠ سم. لونها ابيض الاخضر للمواج || يعيش ويزهر على شواطئ المتوسط.

#### ١٦٦٦٢ - سِيرُوسُ الْبِرَاكِيل Cereus jamacaru (S).

Cierge mandacaru (F).

نبات منتصب يعلو من ٦ الى ١٠ امتار. ساقه بحرية اللون، رباعية او سداسية التضلع. هدبا شدام شائك يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ازهاره كبيرة القد، بيشاء اللون، دجوية الانبلاج. يعيش ويزهر على شواطئ المتوسط.

#### ١٦٦٦٣ - سِيرُوسُ الْمَكْسِيك \* Cereus hoppenstedti (S).

Cierge de Hoppenstedti (F).

نبات منتصب يعلو من ٦ الى ١٠ امتار. ساقه بحرية اللون، عديدة الصلوع البارزة المتضعة. سدرياتها سمر. هدبا احمل، كثيف التجميع، لاتياني اللون. ازهاره نهائية الانبلاج، فصلها وردية اللون، بتلاتها بيض || يعيش ويزهر على شواطئ المتوسط.

#### ١٦٦٦٤ - سِيرُوسُ بُولْيِيَّة Cereus celsianus (S).

Cierge de Cels (F).

نبات منتصب يعلو نحو ١٠٠ سم. ساقه عايقة الخشار متشعبة، عديدة الصلوع تنتهي بضمه من المذب قلنسوية الشكل. سدرياتها جوية اللون، هدبا اصفر يطول نحو ٨ سم. يتوصله شدام حنطى يطول من ١٢ الى ١٦ سم. ازهاره كبيرة القد، حراء اللون، دجوية الانبلاج. يعيش ويزهر في مناطق الزيتون.

#### ١٦٦٦٥ - سِيرُوسُ ثَلَاثِي الصُّلْعُ Cereus

triangularis, C. undatus (S). Cierge trigone (F).

جنية عارضة تنمكس بجذورها الحوالية. ساقها ثلاثية الصلوع الخمنية. ازهارها دجوية الانبلاج، بيشاء اللون، كبيرة الحجم، قطرها نحو ٣٠ سم. ثمارها ارجوانية اللون، يبيضه الشكل والقد، مأكولة لذيدة العلم || تعيش وتكثر على شواطئ المتوسط.

#### ١٦٦٦٦ - سِيرِيل \* Cyrrilus (S).

Cyrrille (F).

جنس نباتات برية، جنية، معمرة، من فصيلة السيريديات. انواعه المعروفة قليلة العدد، منهاها بعض مناطق امريكا الحارة || سيقها منتصب، قليلة الفروع. اوراقها منقطة متعاقبة، متقاربة. فصلها ستانية، جامدة، غائرة الرق والاصحاب. ازهارها غشوية، ستينية التجميع، محورية الارتكاز، بيشاء اللون او تبية.

#### ١٦٦٦٧ - سِيرِيلِيَّات \* Cyrrilaceae (S).

Cyrrilacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. تتألف من ثلاثة اجناس تضم اكثر من ثلاثين نوعاً. اعطائها الاصصاع الحارة من البلاد الامريكية || نباتات جنيات وشجيرات. اوراقها منقطة، متعاقبة. ازهارها غشوية، صفيرة اللحم، ستينية التجميع. كلوسها خاسية الاجزاء. توجعها خاسية



سِيرُوسُ الْمَكْسِيك



سِيرِيَّة



سِيرَال



سِيرَامِيَّة

## ١٤٦٨١ - سيبسب

السيبب والساسب : شجر تنضج منه السهام .

Sesbania (S).

Sesbane, Sesbanie (F). Sesban, Danchi plant (E). Sesbanie, Schnurfrechme (D). Sesbania (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة البقوليات . أنواعه عديدة مهددة للمناطق الاستوائية والحارة . معظمها بري وبعضها زينة . يقال أنها من النباتات الطبية يتداوى بها لثغيبت حمى اللانحة || أشهر أنواعه الثلاثة التالية :

S. à fleurs écarlates (F).

سيسان شامي الزهر

S. à grandes fleurs (F).

سيسان كبير الزهر

S. d'Egypte (F).

سيسان مصري

وهو جنبة معمرة صفراء الزهر مأكولة البهار القرنية .

Saccostome (F).

١٤٦٨٢ - سيسكست

هو الصفصفا حيوان قاضم من الفأريات .

Séséli de Crète (F).

١٤٦٨٤ - سيسليوس

هو الشرعوب أخزني ، اطليه .

Antirrhinum (S).

١٤٦٨٥ - سيمم أنثريونم

Mufler (F). Snapdragon (E).

جنس نباتات ليبية عغشفية من فصيلة الخنازيريات . أنواعه ١٢ منها المعمرة والحولية والبرية والزيينية أوراقها السفلى متقابلة الارتكاز أما العليا فتناحية . نصلها يختلف مع الأنواع كثر فيه الاستطالة . أشهر أنواعه ما يتبع .

١٤٦٨٦ - سيمم أونسيموم \*

Antirrhinum orontium (S). Mufler oronce, Antirrhine (F). Call's-snout, Lesser snapdragon (E). Kleines löwenmaul (D). Gallinacia, Gallinella (I).

نبات عشبي حولي بري وزراعي . ساقه فروع متعصبية . تطلع من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقه مستطيلة . أزهاره إبطية الارتكاز فردية التجميع تشبه رأس الكباش . لونها إلى الوردي الموشح بالأصفر . تحوي بعض المنافع الطبية وتوقف الإسهال || أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

١٤٦٨٧ - سيمم أصريته \* ، عماماقيفسس

Antirrhinum asarina (S). Mufler petit-asaret, Asarine (F). Bastard asarum (E). Unechte höselwurcz (D). Asarina (I).

نبات عشبي طيب بري معمر يطلع من ٢٠ إلى ٦٠ سم . ساقه زغبية فروع . أوراقه كلوية الشكل . أزهاره عطرية الرائحة ، كبيرة الحجم لونها إلى الأبيض الأصفر تملو غطوط وردية || أزهاره يستمر من نيسان إلى أيلول .

١٤٦٨٨ - سيمم داليم

Antirrhinum glutinosum (S). Mufler glutineux (F).

نبات عشبي حولي صغير اللد ، ساقه دقيقة زهاب . أوراقه زغبية متعاقبة . أزهاره متوسطة اللد لونها إلى الصفرة الزاهية يملو غطوط آخر || أزهاره يدوم طوال الصيف .

١٤٦٨٩ - سيمم داليم الخضار

Antirrhinum sempervirens (S). Mufler toujours vert (F).

نبات عشبي زغب معمر ، يطلع من ١٠ إلى ٢٥ سم .

وروشها الامانيان الى النبي المشوب بالصفرة . بطها وروشها الخلفيان الى الابداد الغني || يرقها تطلع نحو ٤ سم . ظهرا قرنفلي اللون . مدنها أصفر . تركب الصمان واللده والتمش وغيرها .

Caesium, Césium (F).

١٤٦٧٤ - سيزيوم  
معدن من فصيلة البوتاسيوم قليل الوجود والاستعمال احادي التكاثف رمزه (Cs - سز) وزنه الاتي ١٣٢,٦ طليه المشوري يتميز بجليه الازرقين اللامعين .

Cis (S). Cis (F). Cis (E).

١٤٦٧٥ - سيسس \*  
جنس حشرات من فصيلة السيسيات ورثة عذيات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، عمودية ، اهليجية ، تطلع من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، ملحوظة . عيونها بارزة ، تأثرها وبلاصها نظامية . قرونها الاستشارية دودية الأطراف . كراسلها كبيرة ، مقنية الشكل . انحاءها لائحة ، قوائمها نشيطة . انوارها ملونة ، يكثر فيها اللون السوي اشيعها الاسمر القاتم والكسني || جميعها عارضة تعيش على مختلف انواع الفطور انحصار الفاريقونيات والسيات .

١٤٦٧٦ - سيسس هو الياسين ، اطليه .

١٤٦٧٧ - سيسس . Politiser (F). To politicize (E).

اعطى الصفة او الصبغة السياسية . كقولك سيسس الانتخابات البلدية .

١٤٦٧٨ - سيسس

Garrot (F). Wither (E).  
الحاروك من القرس والحار والبلج ج سايي .

١٤٦٧٩ - سيسارون \*

Sium sisarum (S).  
Chervil, Chérouil (F). Skirret (E). Zuckermark (D). Sisso, Ninsi (I).

نبات زراعي معمر من فصيلة الخيميات . جلوه عسقلية مستطيلة مأكولة تطلع كجلود السلفيل . لبها ابيض اللون والمكسر ، نشوي التركيب سكري العلم .

١٤٦٨٠ - سيسارون كبير \* ، جمر أبيض

عرق ابيض ، استطالين

Peucedanum sativum, Pastinaca sativa (S). Panais, Pastenade blanche, Pastenais, Grand chervil (F). Parsnip, Common parsnip, Cow cakes (E). Pastinake, Echter pastinake (D). Pastina, Pastinaca (I).

نبات حول عسقلية يطلع وطني من فصيلة المركبات . عسقله حزائي او لفي الشكل . أوراقه مركبة متعاقبة . ورقها متعاقبة مقرضة النصل . أزهاره صفراء . ثماره برود مملحة وغددة || عثروه الزراعية عديدة منها البقية المأكولة المساقط ومنها العلفية التي تعتبر من اجود الاغذية واجزها نغماً لاها تحوي :

من ٢١ الى ٢٣ ٪ مواد جافة .  
من ١٥ ٪ الى ٢ ٪ مواد ازوتية .  
من ١٠ ٪ الى ١ ٪ مواد دهنية .  
من ١٥ ٪ الى ١٦ ٪ مواد سكرية .

وهو يرغب في الاترية المتوسطة الانجماع ، المعية النور . اقلية البلاد المعتدلة الحرارة . يغفل المناطق البحرية التي يكثر فيها الصباب .



سيس



سيسارون (جلود)



سيسارون كبير



سيسان



سيمم اونسيموم



سيمم اصريته

## ١٤٦٩٨ - سِيمَسْتَدِيل ٥ - عُثْفَسَاةَ بَرْمِيَّة

Cicindela (S). Cicindèle (F).  
جنس حشرات مغترسة ناعمة من فصيلة السيستيليات.  
أنواعها عديدة جميعها صغيرة القند طولا براوح من ١٠ الى ١٧ م. اجسادها غصير مختلفة المواجه تعلوها نقط بيض  
او زراكن ملونة. تكثر اثناء الصيف في المواقف الرملية.  
القليها يمتد من الشواطئ البحرية الى الجبال || اشهر  
انواعها ما يلي .

## ١٤٦٩٩ - سِيمَسْتَدِيلُ الْحَقْل ٥

Cicindela campestris (S). Cicindèle champêtre (F).  
حشرة من السيستيليات تطول من ١٢ الى ١٥ م. لونها  
الى الخضار اللامع الجميل تعلوها زراكن عاجية لاقامية  
للشكل . جنسائه واربيله قرمزية اللون منع المواجه .  
مرسه يقوم من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .

## ١٤٧٠٠ - سِيمَسْتَدِيلُ الشَّاطِئ ٥

Cicindela trisignata (S). Cicindèle des plages (F).  
حشرة من السيستيليات تطول من ١٠ الى ١٢ م. لونها  
الى الخضار النحاسي ، حثار غديها خطي اللون ،  
زراكنها متساوية || نرسح طوال الصيف .

## ١٤٧٠١ - سِيمَسْتَدِيلِيَّات ٥

Cicindélides (S). Cicindélides, Tiger beetles (E).  
Sandlaufkäfer (D).

فصيلة حشرات ناعمة من رتبة غدييات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القند ، رؤوسها  
مستعرضة . قرونها الاستشعارية خطية مركبة من ١١  
فاصلة . ارجلها دقيقة مستطيلة . اجسادها مزركشة .  
واحي من سرعة الحركة ، خفيفة الطيران ، تسرح في النهار  
ورغب في الاماكن المعرضة للشمس . تغرس ما تستطيع  
اليه سيول من الحشرات والبرقات والحوام || اشهر اجناسها  
السيستيل .

## ١٤٧٠٢ - سِيمَسُو

Dalbergie lisso (F).  
مجرة حربية قاضرة الخشب ، اغلب دلبرجية سيمو .

## ١٤٧٠٣ - سِيمَسُون ٥

Caesio (S).  
Césion (F). Caesio (E).  
جنس اسماءك بمجرة من شاكاتك التوائف فصيلة المتحوليات.  
انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطائها بحار البلاد الحارة ||  
اجسادها شبه بيضبة الشون تطول من ١٨ الى ٢٤ م.  
الوايها الى الشفحة الرصاصية او الفضية او النحاسية .  
زعافنها القهريه ضيقة ، مستطيلة ، مؤخرة الى الراء .  
الحوضية مزوانية الشكل . الذيلية غائقة . رؤوسها  
غروبية ، ضيقة الاشداق . عيونها ماسحة || لحويها  
ماكولة ، جيدة الصفت .

## ١٤٧٠٤ - سِيمَسُون وَيَدْعَى سِيُون هُو الذرة ، اطليا .

## ١٤٧٠٥ - سِيمِيَّات ٥

Cildae, Cildidae (S).  
Cildés, Cildés (F). Cildae, Cildidae (E).  
فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد الباردة  
والمعتدلة الحرارة || اجسادها صغيرة ، شبه اطيحية الشكل .  
تطول من ٢ الى ٥ م. رؤوسها صغيرة ، ملسوفة . عيونها  
بارزة . تأشيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية

اوراقها دائمة جلدية النصل . ازهارها صغيرة طويلة الزناد  
لونها الى الصفار اللغبي || ازهارها يستمر من حزيران  
الى ايلول .

## ١٤٦٩٠ - سِيمَسَمَ رَهْلُ الْوَرَقِ

Antirrhinum molle (S). Muffier à feuilles molles (F).  
نبات شجبي زهني معمر يطول من ١٠ الى ٤٠ م. اوراقه  
رهلة النصل المستطيل . ازهاره متصلة القند طولا نحو  
٣ م. لونها الى الصفار الالبيش || ازهاره يدوم  
طوال شهر تموز .

١٤٦٩١ - سِيمَسَمَ مَاجُوس \* ، تِمَ السَمَكَة ،  
أَنْفُ الْعَجَل ، أَنْفُ الثَّورِ

Antirrhinum majus (S). Muffier des jardins, Gueule  
de lion, Gueule de loup, Pantoufle (F). Great snap-  
dragon, Dog's mouth, Dragon's mouth (E). Grosses  
lœwenmaul, Hundskopf (D). Antirrhino, Muso di  
vitello, Capo di buie (I).

نوع من السيم وهو نبات زهني معمر . سوقه فراء  
تطول من ١٥ الى ٨٠ م. اوراقه لينة متعقبة متعاقبة  
في الزايم الاول من الساق ثم تتعاقب . ازهاره كبيرة القند  
معتقبة التجميع متعاقبة الازكاك تملو كامل الزايم  
الاخير من الساق || غروبها عديدة تختلف باختلاف  
قندا ويجمع ازهارها وبالوانها التي تشمل الالبيش والاصفر  
والوردي والقرنبي مع ما يتخللها من الالوان المركبة .  
ازهارها يستمر من نيسان الى تشرين || وهو ايضا من  
النباتات الصناعية التي يستخرج من زورها زيت نافع  
ماكل وصناعة اوراقه وازهاره تليل الجلد وتكسح بش  
الحمام || يتكاثر بالبذور وغرس في مستقوه على ابعاد  
واحي من ٣٠ الى ٥٠ م. وذلك في اواسط الربيع  
وبعد تنبيتها في المثلث || يحرق في جميع الاثرية الزراعية  
ولا يغشى سوى الرطبة والقوية الاندماج لانها تنقش  
بعض الارصام القهريه التي تؤذيها .

## ١٤٦٩٢ - سِيمَسَمَ هُورُكَدِي

Antirrhinum  
maurandioides (S). Muffier-maurandie (F).  
نبات لبني متسلق معمر يطول من مترين الى اربعة امار  
اوراقه سهمية معتقبة متعاقبة . ازهاره متصلة القند ،  
قرمزية الاطراف والشفحة الخارجية . صفحتها الداخلية  
صفراء اللون ، خلية البيرة || وهو من النباتات الزهقة  
القليلة الانتشار . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

## ١٤٦٩٣ - سِيمَسَمَوَرَاك

Séismographe, Sismographe (F). Seismograph (E).  
جهاز آلي يستخدم في تسجيل الزلازل فيدون مقدار  
الانحراف الذي تحدثه الزلزلة ويمكن من تحديد المدى  
ومعركة نقطة الانطلاق .

## ١٤٦٩٤ - سِيمَسَمَوَلُوجِيَّة

Sismologie (F).  
Sismology (E).  
السيمولوجية علم يبحث في الزلازل .

## ١٤٦٩٥ - سِيمَسِيَّات

Antirrhinées (F).  
Antirrhineae (E).  
سبط من فصيلة الخنازريات اشهر انواعها السيم .  
١٤٦٩٦ - سِيمَسَسَبَر هُو السمر الامرط ، اطليه .  
١٤٦٩٧ - سِيمَسَسَبَرُون هُو السارة ، اطليا .



سيم مَاجُوس



سيستيل الحقل



سيستيل الشاطئ



سيمون

انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة اغصها البحر الاحمر || اجسامها كالحطاب، المفروض الخثار والزين الصمن، يرتكز على ارجل فية مطاطة يحرقها الكثير الكثير من الاليات الدقيقة .

#### ١٤٧١٣ - سيففاليات \* Cepheidae (S).

Céphéides (F). Cepheidae (E).  
فصيلة من المدوس الصنفيات الراسيات تشمل بعض الاجناس والانواع جميعها في الاصل القصرية المنشعبة المحفوفة بخيوط مستطيلة متعرجة || اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها السيفاء .

#### ١٤٧١٤ - سيففقي \* Propithecus (S).

Propithecus, Sifaka (F).  
سيفق هو الاسم للمفانيث . جنس حيوانات لبونة من الليموريات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها مدغشكر || اجسامها رفيقة ، مستطيلة القوائم والذنب ، قصيرة الاذنان . جلودها سود . فراؤها تختلف مع الانواع منها الاسود والجزوي والاشهب الاصفر || ملابنها الحيالي جماعي . اناثها ثنائية الثدي . تسرح في الليل وتبيت في النهار على الاشجار وتقتل عليها بغفة الطير || قوتها الثار وبعض المواد النباتية اغصها الزنعات والجذور || اشهر انواعها السيفق المتوج (S) Propithecus diadema .

#### ١٤٧١٥ - سيففنة \* Cerionis (S).

Cerionis, Fisan cornu (F). Tragopan (E).  
جنس طير من فصيلة التفريجات . موطنه الشرق . انواعه اربعة جميعها كبيرة الجثة طويلا براجون من ٧٠ الى ٨٠ سم . رؤوس كدورها مدبجة بزوائد لحمية فياجية تشبه قبة القرن . مناقبها قصيرة قوية . سواقطها معتدلة الطول . اناثها مستديرة . ارساغها عارية حادة الصبغة . اثارها متشابكة متقاربة ترتكز على الاصهب الملبان يعلو توشم وتوشح وتؤاذر احمر وايض واسود || قوتها الاغصان والحبوب والاوراق والبراعم والثمار والخسرات . يجمعها الانجار الافقية الاغصان || تدن في الاشجار القليلة الارتفاع . اناثها تحضن نحو ١٨ بيضة || اشهر انواعها ما يتبع .

#### ١٤٧١٦ - سيففنة تمينكلي Cerionis temminckii (S).

Tragopan de Temminck (F).  
نوع من السيفنة موطنها الصين تألف الاجراج الجبلية الكثيفة .

#### ١٤٧١٧ - سيففنة سوداء الرأس و جيمور Cerionis melanocephala (S).

Tragopan à tête noire, Jewar (F).  
نوع من السيفنة موطنه الهند يكثر غربي حلايا رأسه اسود الريش احمر الحواج .

#### ١٤٧١٨ - سيففون هو التجير ، اطليه .

#### ١٤٧١٩ - سيففونيا \* Siphonia (S).

Siphonie (F). Siphonia (E).  
شجرة ارجية وزراعية صناعية من فصيلة البيرويات . ساقها متصصة ريفية . اوراقها منعقة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات البنيضية التصل . نصلها بجبل الخفسار ، مائل البشرة || ازعاها طرية ، وسيدة المسكن . يستخرج منها بالخز عصارة حلابية تستعمل في صناعة اقصر انواع المطاط || نباتها الطوعي الآيام الرطبة ورضفات الاثر . زراعتها تستوجب كثرة الري .

ديوسية الاطراف ، ثمانية الفصل او عشاريتها . كواسلها كبيرة ، مدبجة ، تلحف الرأس . اغدادها لاسفة . قوائمها فسطحة . ارساغها رباعية المثلث . اثارها ملونة || معظم انواعها يألف الحياة الجماعية ويميش على السيات والغاريقونيات || اشهر اجناسها السيس .

#### ١٤٧٠٦ - سيففون \* Siagona (S).

Siagone (F). Siagona (E).  
جنس حشرات قانعة من فصيلة السيفونيات وربة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقاليم البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبطة ، تطول من ٩ الى ١٢ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، قلادية الشكل . تأثيرها ضالعية . فكوكها نظامية . كواسلها غصورية . اغدادها لاسفة ، نخلة التصفيد الغالب . قوائمها شديدة النشط . اثارها وسيدة اللون ، يكثر فيها الاسود الفحمي فالاسف فالحجوي || الحشرة الجبلانة قانعة . مسرعا دجوي . البرقة واجبة .

#### ١٤٧٠٧ - سيففونيات \* Siagonidae (S).

Siagonidae (F). Siagonidae (E).  
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبطة ، تطول من ٨ الى ١٦ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها ناشزة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . تأثيرها بارزة ، قياسية . فكوكها نظامية . براجها مزنة . كواسلها مختصرة ، غصية القواعد . اغدادها نخلة التصفيد الغالب الذي يمد ٨ اغخايد || مكبا شبه اسطواني الشكل تنمحه الاثني فرديا في التربة . يرقانها سداسية القوائم والمثلث . حورياتها عريضة تنحور في التربة داخل اوراق انبوية الشكل مسطوية الرأس والمثلث . جمع انواعها دجوية المسرح ويحلتها النور . معظمها مقترن ويمضها غاخل || اشهر اجناسها السيفون .

#### ١٤٧٠٨ - سيفف Trichlurus (S).

Trichlure, Trichlure, (F). Cutlass fish, Halralt (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة السيفيات . انواعها المعروفة ستة اصطناعا بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها تشبه السيف وهي مستطيلة ذرية مدبجة الذنب . رؤوسها مخروطية الشكل . ذعانها الظهرية تمتد من مؤخر الرأس الى طرف الذنب . اثارها الى الطحلة الرمادية يعلوها موج فقي شديد اللمعة .

#### ١٤٧٠٩ - سيفف C.I.F., C.A.F.

سفر البضائع على ذمة شاربيا .

#### ١٤٧١٠ - سيفف الجيسار Is Dorade, Xiphias (F).

Dorado, Xiphias, the Sword-fish (E).  
سيف الجبار كوكبة نجوم جنوبيه الميخ مركزها بين كوكبي الثور والسفينة || عدد نجومها ٢٩ اسبعا من المرتبة الرابعة .

#### ١٤٧١١ - سيفف الغرباب هو الدلبوث ، اطليه .

#### ١٤٧١٢ - سيففهاء \* Cepheea (S).

Céphée (F). Cepheea (E).  
جنس حيوانات بحرية من المدوس وفصيلة السيفاليات .



سيفون



سيف



سيفاء



سيفق



سيفنة



سيفونيا

## ١٤٧٢٠ - سيفي الشكل

Ensiform (F).

Ensiform (E).

نمت وصفي يطلق عل ما هو شكله كالسيف .

## ١٤٧٢١ - سيفي الورق

Enisifolié (F).

Enisifolié (E).

نمت وصفي يطلق عل الاوراق السيلية الشكل .

## ١٤٧٢٢ - سيفيات

Trichiurideae (S).

Trichiurideae (F). Trichiurideae (E).

فصيلة اسماء بحرية من شائكات الزعانف اجناسها وأنواعها عديدة اشهرها السيف ، اطليه .

## ١٤٧٢٣ - سيفمور

Sycamore (F).

هو الجينز ، اطليه .

## ١٤٧٢٤ - سيكا \* ، مَهَاة سيكا

Saiga tatarica (S). Saiga, Antilope saiga (F).

حيوان عاشب ليون يجتر من الغياه . اطالته الفأيرة كانت تشمل جميع المرتفعات الاسيوية والاروية . اطالته الحاضرة محصورة ببعض مرتفعات آسية الغربية واروية الشرقية || جسمه وبع القامة ، متوسط القد ، غليظ العنق والقوائم ، مصنع الجبهة والانف والقنم واللحن . الانثى جهاء ، ثنائية الاغلاف . الذكر جالس القرن المديب الطرف . ثوبه الى التسلية الذراء تسر قرب الظهور ويتبيض في الصيف والبطن || اجله سبعة اثمار ، ذكر مانع وثلاث اناث وثلاثة جهاء .

## ١٤٧٢٥ - سيكار

Cigare (F). Cigar (E).

لقافة من التبن الخامس تتميز بجلوها من المواد الغريبة عن التبع . توامها تبن مستعرض الحرم يضي الحشرة تحفته ادد مستطيلة تدعى الرباط تطلقها صفحة من التصل تدعى التقيص او الكاب او الجلباب .

## ١٤٧٢٦ - سيكاركة ، لقافة

Cigarette

السيكارة انبوب من الورق البقيق الناعم يلف كية من التبن المهروم . اشتمالها يولد دخاناً يستنشقه المدخن من فيه ثم يطرده مع الزفير بعد الاستمتاع بطعمه وتأثيراته .

## ١٤٧٢٧ - سيكاس

Cycas (S). Cycade (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السيكاسيات . انواعه ١٠ مهدا المناطق الحارة الاسيوية والافريقية . جذوعها واوراقها تشبه جذوع واوراق النخل غير انها قليلة الارتفاع عن الارض . وهي من النباتات الثنائية المسكن . اثمارها مثالية مخروطية الشكل . ثمارها زور خضنة غزيرة المادة اللببية والخشبية المعسدة النعم . يستخرج من جذوع معظم انواعه مادة نشوية مأكولة تدعى ساغو لكنها اقل جودة من التي تستخرج من شجرة الساغو .

## ١٤٧٢٨ - سيكاس افرقيسي \*

Cycas circinalis (S). Cycade à feuilles en crosse (F). Broad leaved cycas (E). Cycasbaum (D). Cicadée (I).

شجرة زراعية مهدا افريقية الاستوائية . جعلها يملر من ٣ الى ١٥ م . سفها يطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . غوصه منجل التحسين . تصله جبل الحفار العاين ، مديب القصة الشاككة . يستخرج من جلده مادة نشوية مأكولة تشبه الساغو .

## ١٤٧٢٩ - سيكاس ياباني

Cycas revoluta (S).

Cycade du Japon, C. enroulé (F). Cycas palm of Japan (E). Japanischer cycasbaum (D). Planta del cicadée (I).

شجرة ترينية جميلة الشكل مهدا اليابان تعيش على شواطئ البحر المتوسط . تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . جعلها غليظ الشكل والقد تكسو الحرافش البقية . سفها يطول من ٦٠ الى ٢٠٠ سم . غوصه متقارب التجميع . تصله عايق الحفار اللامع عجين الحنار ، شاككة النعصة .

## ١٤٧٣٠ - سيكاسيات

Cycadacées (F).

Cycadaceae (E).

فصيلة نباتية من عريانات البزور . اجناسها وأنواعها عديدة اشهرها السيكاس .

## ١٤٧٣١ - سيكران

هو البنج الابيض ، اطليه .

## ١٤٧٣٢ - سيكلامين

هي السكين مادة قلبية سامة تستخرج من البرملثيا .

## ١٤٧٣٣ - سيكل

Fluxion (F). Fluxion (E).

انفعا اي سائل كان وخاصة الدم نحو نقطة معينة من الجسم .

## ١٤٧٣٤ - سيكل

Torrent (F).

جداول مجراه شديد الانحدار يسرب المياه بسرعة .

## ١٤٧٣٥ - سيكل

Sil

ضرب من التراب الملعني .

## ١٤٧٣٦ - سيكلان

Jetage (F). Discharge (E).

غطا يسيل من الانف اسبابه عديدة اكثرها تدل عل امراض في مجاري التنفس .

## ١٤٧٣٧ - سيكلان

هو العلوك ، اطليه .

## ١٤٧٣٨ - سيكلان تجصي

هو حشيشة الذباب ، اطليه .

## ١٤٧٣٩ - سيكلانيات

Silénées (F). Silenaceae (E).

سبط من القرنفليات .

## ١٤٧٤٠ - سيكله

هي السيرة ، اطليه .

## ١٤٧٤١ - سيكله \*

Scyllosa (S).

Scyllifée (F). Scyllacea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارويل غلافيات الخياشيم وفصيلة السيليات . انواعها المعروفة قليلة اعطائها معظم بحار البلاد الحارة تعيش على التنبوت البحرية || اجسامها عريضة ، حلانية ، مستطيلة ، مغطاة بالظهور الثنائية الاكطار ، رباعية الزوائد الجنسية ، مكررة الرؤوس الصغيرة ثنائية اللواس المغددة . خياشيمها انابيب دقيقة تطوق الزوائد .

## ١٤٧٤٢ - سيكس

Stalis (S).

Stalis (F). Stalis (E).

جنس حشرات خاضلة او قرصانية من فصيلة السيلسيات ورثة سادات الاجنسة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع الاقطار المعتدلة الحارة || اجسامها اهليلجية ،



سيكا



سيكاس افريقي



سيكس

\* ١٤٧٤ - سيليكة السنديان \*  
 Celama confusalis (S). Célama confuse (F).  
 Celama confusalis (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها مغرب مجاهد حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها غاشلة قوتها اوراق السنديان || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ م . بسطها مثلها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الحجم . عينها كبرتان . زبانا حزينان يققان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها اطحل اللون ، حنطلي اللبنة والمواج . بطنها الى الحنطلي الاصفر المظوق بالبي || رواشن الذكر الى الصبهة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي زراكن وتزاويق حنطية ويعلوها في الزوج الخلفي جدة اسفينية كستنية ومشحة حنطية سمراء تطوق الحنط . رواشن الانثى الى الصبهة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي بقعة قاعدية سمراء واخرى طرفية حنطية ، ويعلوها في الزوج الخلفي مشحة خنارية رمادية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى حزيران . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول نحو ١٨ م . جسمها وشعي الشكل اريك اللون تملوه مجموعات من الملب الجفوري متتابعة الصفوف تكنتن كامل السكر باستثناء الشرجية . رأسها ضخم اسود . مدنها ورواجها الى الطحلة البهراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي داخل صليجة زورقية الشكل .

\* ١٤٧٤٨ - سيليكة مبيجة \*  
 Celama centonalis (S). Celama centon, C. tachette (F). Celama centonalis (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها احراج حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها غاشلة قوتها اوراق النباتات الحرجية المختلفة الاجناس والفضائل || جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م . بسطها نحو ١٩ م . رأسها معتدل الحجم . عينها كبرتان . زبانا مشطيان عند الذكر ، غيظيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها كثيف الحمل الاطحل الغني المواج . بطنها حنطلي اللون اسمر المواج || رواشن الذكر والانثى الى الصبهة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي عند الذكر زركشة حنطية وتبقى صناعي وبعدة قاعدية سمراء ، ويعلوها في الزوج الامامي عند الانثى تبيج ابيض وزركشة حنطية وتضعان طرفيان اسمران || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكن مباحدا على نصال اوراق النبات المائل || السرقة تطول نحو ١٧ م . جسمها وشعي الشكل ، اطحل اللون تملوه مجموعات من الملب الجفوري . مدنها ورواجها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي ضمن صليجة زورقية الشكل .

\* ١٤٧٤٩ - سيلندريوم \*  
 Cylindrium (S).

جنس فلور مجهرية من النوسيات وفصيلة البليحات . ابراهه قليلة العدد والاذى . جسمها دية تركب الاوراق المتناثرة ، الجافة ، المتراكمة على التربة .

مستطيلة ، تطول من ١٠ الى ٢٢ م . بسطة اجنحتها تتراوح من ٢٠ الى ٣٠ م . رؤوسها ثائثة شبه مربعة . اجهزتها الفنية ساحة . ميونسا صغيرة ، مستديرة ، فائضة . قرونها الاستشعارية غيظية ، مستطيلة . انوثاها سمراء اللون او سوداء . اجنحتها كبيرة ، لافة ، جلونية الاسترسال ، غشائية ، شفافة او سمراء || يرقاتها مفرسة ، مائية او سائلة .

\* ١٤٧٤٣ - سيليديات \*  
 Sialidae (S). Sialides (F). Sialides (E).

فصيلة حشرات من رتبة سادات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . رؤوسها شبه مربعة الشكل . عيونها جانبية ، عادمة الزنم . قرونها الاستشعارية غيظية مستطيلة . اجنحتها غشائية لافة ، بمشها شفاف والبعض الآخر اسمر اللون او اكهم || يرقاتها مائية ، مفترسة . طرورها البري يستمر نحو ٢٠ شهرا . انسلخاتها عشرة ، سبعة منها تجري في الماء والثلاثة الاخيرة في التربة || اشهر اجناسها السليس .

\* ١٤٧٤٤ - سيليفيديات \*  
 Silphidés (F).

\* ١٤٧٤٥ - سيليفيت \*  
 Sylvinite  
 هو معدن البوتاس قبل تصنيحه يتركب من كلوريد البوتاس والصوديوم مع بعض الاملاح انحصها املاح المنيزيوم والكلسيوم || يستعمل كماد بوتاسي بنسبة اثنين يعمري من ١٨ الى ٢٢٪ من البوتاس الصنف ونحو ٥٠٪ من مختلف الاملاح .

\* ١٤٧٤٦ - سيليكة بحريرة اللون \*  
 Cillix glauca (S). Cillix glauque (F).  
 Cillix glauca (E).

حشرة من فصيلة الدريباتيات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها غاشلة قوتها اوراق الزعرور والفلوخ البري ... || جسمها صغير معتدل الحجم . عينها كبرتان . زبانا مشطيان عند الذكر ، غيظيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها بحري اللون اسمر المواج . بطنها بحري اللون ، حنطلي المواج || رواشها ، عند الشقين ، الى الخضار البحري الاصهب المواج تملوه في الزوج الامامي بقية كستنية وتنطيط اسمر ، وتعلوه في الزوج الخلفي مشحة حنطية تستبق المختار || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتتمتع المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة تطول نحو ١٨ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشار ، فري التبول الجاذبية . نوثاها الى الخضار اللامع يعلوه خط ثيبي اصفر وسمية غطوط منتمرة سمراء اللون . شوطها مطوقة بالانمر . سكنتها الشرجية تنتهي بسن قزنية المادة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صليجة تحكيها السرقة بين شقوق اللحاء او تحت القشور .



سليكة بحيرة اللون



سليكة السنديان



سليكة مبيجة



البلغية الوسطى ماعحة ما يضطرها الى التفرس والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرعة بين الاوراق التي تبجمها بخيوط حزيرية .

١٤٧٥٧ - سيمابيه \* Simaba (S), Simaba (F).

جنس اثمار برية طيبة من فصيلة السحرويات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدا بعض مناطق امريكا الحارة || اثمارها ترتفع من ٦ الى ١٠ اثمار . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وقرية التجميع ، خاسية او سابعية او تساعية الورزيقات السنانية التصل || اثمارها طرية الاثناز ، سفلية التجميع ، ثمارها حبوب لوزية . أشهر انواعها الطيبة الثلاثة التالية :

١٤٧٥٨ - سيمابيه حد يدية \* Simaba ferruginea (S), Simaba ferrugineux,

Cédon du Brésil, Calunga (F). نوع من السبابه . ثمرتها تملو نحو عشرة اثمار . مهدا البرازيل واخصها مقاطعة باهيا || تستعمل في معالجة الحميات وشد الاسهال وصر الحفم .

١٤٧٥٩ - سيمابيه سدروية \* Simaba cedron, Quassa cedron (S),

Simaba cédrón, Cédrón, Cédrónelle (F). Cedron tres (E). نوع من السبابه . ثمرتها تملو نحو عشرة اثمار . مهدا البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || ثمارها شائعة الاستعمال الطبي . يملجون بها الكلب ولدغ الافاعي وبعض الحميات || مادتها القلابة تدعى سدري (Cédrine) مرة المذاق كالكتيا .

١٤٧٦٠ - سيمابيه قلد ريفيه \* Simaba valdivia, Picrolemma valdivia (S),

Simaba de Valdivia (F). نوع من السبابه . ثمرتها تملو نحو ثمانية اثمار . مهدا البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || يستخرج من ثمارها مادة جمالية شديدة الرفع تدعى فلدريفين (Valdivine) ٢ ملغرام من هذه المادة تقضي على الاربث || تستعمل طبياً في معالجة الحميات المعادة . مسحوق قشور ثمارها مقي . فعال .

١٤٧٦١ - سيمابيه \* Sémétiologie (F),

Sméology (E). فرع من علم اللب يختص بدرس غرار وأعراض الامراض واستلاالاتها .

١٤٧٦٢ - سيمندس \* Cymindis (S),

Cymindis (F), Cymindis (E). جنس حشرات قاصصة من فصيلة اللييات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها هيفاء ، معتدلة التبلط ، تقطو من ٨ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستعارية خطية . تأثيرها وفكوكها ولاصها قياسية . كولاسها مخضرة . بطونها مسطيلة . اثمادها لاصحة وبعضها شبه لاصح . قوامها نشيطة . اثمابها متباينة الالوان الجميلة الزاهرة || الحشرة الجملانة قاصصة والبرقة ايضا .

١٤٧٥٠ - سيلوري Silurian (F), Silurian (E). نمت ترميفي بطلق لل الحقة الثانية من الاباج القديم . فيقال العصر السيلوري والاراضي السيلورية ، وهي تتميز باحتوائها على الكثير من الاسماك المصقفة الرؤوس اي على اول تقاريدات .

١٤٧٥١ - سيلوفان Cellophane ملدن سيلوزي شفاف قابل اللون .

١٤٧٥٢ - سيلليات \* Scyllidae (S),

Scylléides (F), Scylléides (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مغميات الارجل غلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها عريضة ، حلالية ، مستطيلة ، رباعية الزوائد الجانبية الشكل . رؤوسها صغيرة . ملاسها صلبة || اعرف اجناسها السيلة والثيرة .

١٤٧٥٣ - سيليس ، صوان Silice (F),

Silica, Flint (E). جسم مركب من السيليوم والاكسجين وهو من أكثر الاجسام ثبة واعما انتشاراً يوجد في الارض اما على صاله او على شكل سيليكات .

١٤٧٥٤ - سيليسوم ، سيلكون Silicium

فلزات ثلاثي التكافؤ ريزه (Si - س) ينصهر في ١٢٠٠ °س . ويتحد مع الكبريت في ٦٠٠ °س . ومع الاوزون في ١٠٠٠ °س . يستخرج من السيليس او من فيوسيليكات البوتاسيوم .

١٤٧٥٥ - سيليكات ، صوانات Silicate

ملح يحصل من امتزاج الحامض الصواني باحدى القواعد كالپوتاس والكلس . يقال سيليكات البوتاس وسيليكات الكلس .

١٤٧٥٦ - سيلينية حلالية \* Selenia lunaria (S), Sélénie lunulée (F),

Selenia lunaria (E). حشرة من فصيلة الارقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اربوية . فراشها جارية قوتها رقيق الزهار . سرتها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية اعصها البروق || جسمها متوسط القه يطول نحو ١٤ م . سبطها نحو ٣٨ م . رأسها مستدل الجرم . عيناها كبيرتان . زلماتها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، غطيان عند الانثى . جوشها وعلتها كيفا الخمل ، حطيا القرن || رواشها عند الشقين ، الى الخلفي الالصه الموج تملو في الزوج الاسامي جده وسلى سمراء وخط مقوس اسمر وبقة حمراء وتملو في الزوج الخلفي جده سمراء || لها جيلان في الخمل . تظهر قرائة الجيل الاول في نيسان وتظهر قرائة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتتممكن لطفاً تطفها مادة غريبة تقيتها على الصفحات السفلى من نعال الارواق || البرقة تطلو من ٢٨ الى ٣٦ م . جسمها اسطواني الشكل يبدو كانه قلعة من قصب ماس القشار تملو ثلاثة ازواج من العمل المتعاقبة . ثوبها الى الكسني الاشعث . ثوبها شديدة السمرة . رأسها اسود . رواجها



سيلينية ملاية



سبابه

ساقها وفروعها منتصبة ، مخددة ، زياه ، الهام منتفخة الزغب . اوراقها اهليجية مستطيلة مفلقة التصل . ازهارها رؤسية صفراء اللون || اعرف انواعه ما يقع .

١٤٧٧٣ - سِيُونَان تَقَرِي \* Cephalaria tatarica (S).  
Céphalaire de Tartarie (F).

نوع من السيوان الممر مهد روسية الشرقية . يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . يقال انه ارفع عشية منتصبة مرفوعة . ازهاره متصلة القد ، صفراء اللون تجمعها رؤسيات كبيرة ثلاثية او خاسية الشكل .

١٤٧٧٤ - سِيُونَان سوري \* طَرْدَان Cephalaria syriaca (S). Céphalaire de Syrie (F).

نوع من السيوان الممر . مهد البلاد السورية . يكثر بين الزروع . يعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . || ازهاره عكوكي الشكل رؤسياته خاسية او سباعية التجميع . ازهاره صفر .

١٤٧٧٥ - سِيُونَس \* Sicyos (S).  
Sicyos (F). Sicyos (E).

بجلة معمرة عارفة من فصيلة القرقيات . منبتها بعض المناطق الامريكية . ساقها تطلو نحو عشرة امتار . حوافها ثلاثية او خاسية الشعب . اوراقها قلبية الشكل ، خاسية الفصوص . ازهارها الى الحصار الاصفر . المتكية منها عشوية التجميع ، الملقية خسية ، مستطيلة المالحق . ثمارها بيضيه تطلو نحو ١٠ سم . وتقرض نحو ٧ سم . لونها الى الحصار البصري الاربيد المالحق ويعلو سطحها صفت ذيب قليل الصلابة . تؤكل مطبوخة .

١٤٧٧٦ - سِيُونَة ، مِيَع Liquidité (F). Liquidity (E).

صفة المواد البائلة اللامعة .

١٤٧٧٧ - سِيُون \* Clonus (S). Clone (F).

جنس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تطلو من ٣ الى ٥ سم . انواعها مختلفة الالوان يكثر فيها الخطي الاصفر المالحق ، اغادها مديجة ومزركشة وفيها المخذدة والمهدبة || ريقها مؤذية تركب نباتات الفصيلة الخنازيرية فتتغصم الوراق وتقرضها .

١٤٧٧٨ - سِيُون المَرَّان \* Clonus fraxini (S).  
Clone du frêne (F). Clonus fraxini (E).

حشرة غاشلة من فصيلة السويات رقية مفعدات الاجنحة . تألف البراري والزارعين . غنائها ويرقاتها تعيش على اوراق الزيتون والمَرَّان || جسمها صغير القد يطلو من ٤ الى ٤ سم . ثوبها الى السمرة المتكتنية تملوها في طوارها فلوس وتزاولق مختلفة . رأسها صغير الحجم ، مستطيل الملك المستقيم القاصم الثاقب . عينها صغيرتان . زبانها مرفقتان صولجانيان . طوارها بيضي اللون . غذاءها متناحدا التمزيز القاطب . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجلجلة من مكانها في اوائل نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة ، عند بلوغها الإدراك التام ، تطلو نحو ٥ سم . جسمها اهليجي الشكل ، مدب الرأس والطرف ، حنكي اللون الاصفر المالحق ، اسمر الرأس والشرج .

١٤٧٧٣ - سِيَمَة \* Sima (F). Sima (E).

اسم اصطلاحي يطلق على القطع المختزني شبه المالحق الموجود في وسط الكرة الارضية بين الطبقة السطحية المعروفة بالسيال وبين النواة المركزية . تقدر حرارة هذه الطبقة اي السيمه بنحو ١٥٠٠ درجة ستيفراد . ياجع حزام مشتل .

١٤٧٦٤ - سِيَمَا Facié (F).

هيئة الوجه .

١٤٧٦٥ - سِيَمِيرِس Saïmiris

هو الكريز ويكس فرد من فصيلة السبوسيات .

١٤٧٦٦ - سِيَتْرَاكْسِيَا Cintractia (S).

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراهيويات تتميز بجبهها البام البارز الانتشاب ، الاردي الشكل . انواعه قليلة العدد تصيب بعض الاسليات والسدمات فتصلها .

١٤٧٦٧ - سِيَتْنَعَام \* ، دُوْدَة مَزْدَوَجَة ، دُوْدَة خَرَاء Syngame

جنس ديدان سلكية طفيلية تعيش على جهاز تنفس بعض الطيور اخصها الحجل والتلرج || تمت بالدودة المزدوجة لان الذكر منها يلاصق الانثى ولا يفرق ضها .

١٤٧٦٨ - سِيَكْنُونَة Quinquina

هي الكنكنيا التي يستخرج منها الكينا ، اطبا .

١٤٧٦٩ - سِيَتْنُوسِيَت Cénocyte (F).

اسم يطلق على جميع الكائنات الضوية المركبة من عزام .

١٤٧٧٠ - سِيَتْنُومِيَس \* Cynomys (S).

Cynomys, Chien-rat, Chien des prairies, Marmotte des prairies, Ecureuil jappant (F).

Prairie dog (E). Præriehund (D).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجانيات . انواعه خمسة جميعها امريكية . اجسامها ربة تطلو من ٢٧ الى ٣٥ سم . اذانها من ١٠ الى ١٢ سم . رؤوسها فليظة . عينها مستديرة . اذانها عريضة وقصيرة . جرمها قوية . اصابعها خاسية ، اطرافها حادة . اوثابها سوية اللون يكثر فيها الرمادي الاصعب || ساقها جماعية . تألف الحشاب حيث تركز قراها التي يراوح عدد اجسامها من ٥٠ الى ٤٠٠٠ جمرة قلنوسية الشكل قطرها نحو ١٢ سم . وعلوها ٦٠ تبعد الواحدة عن الاخرى من ٥ الى ٦ امتار . مدخلها وغاريها اتفاق مستقيمة عفاها نحو ٣٠ سم || بيتها الشتوي يدوم ما دام الصقيع والجليد . قراها الاعشاب والجنود والبزور والحبوب والفار والجرذان .

١٤٧٧١ - سِيَهَنَك

التراب الذي تغيره الريح عن الارض .

١٤٧٧٢ - سِيُونَان Cephalaria (S). Céphalaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الدياسيات .



سينام



سيويس



سيوان تري



سيوان سوري



سيوس




سيون




سيون المَرَّان



- 1 اعطيطو 2 عقيريط 3 صَبَّوح 4 كَلَار مِيلو 5 كَلَار لورب 6 حَبَّار 7 لَوِيَّة 8 عَرَاة 9 دَوَاكُت 10 قَشَاة 11 حَارون بَرمي 12 حَلَوَن  
 رَيق، قَوْطَة 13 حَلَوَن سَتَن 14 بَرَايس 15 اَعَاطَة 16 حَفِيَّة 17 لَنَة 18 دَوَس 19 قُرط 20 اَرِيَّة 21 عِلَاة 22 كَوَاكُت 23 سَلَاة 24 شَيفر -  
 25 لَقِيَّة 26 كَرِيز - كَرِيز صَوِيَر 28 طَرِب 29 غَلِيَّة 30 جَنِك 31 قَلَوَن مَنُوح 32 سَلِيَّة 33 رَوَدَن سَتِيل 34 رَوَدَن حَنِي 35 شَك 36 بَرَق حَبَّار  
 37 بَرَق صَقِيل 38 طَلَاكُت 39 مَرَي مَنُوك 40 مَرَي اَبُو دِنَار 41 مَرَي قَنَرَال 42 بَنسُوع 43 مَلَب 44 مِدَاء 45 يَلَة 46 دَمَد اَرَوَن 47 دَمَد هَبَاء -  
 48 دَلَاغ 49 جَلَاظ 50 عَسِك 51 سَلِيَّة 52 سَرِيَت 53 كَوَكِيكُت 54 بَرَاكُت 55 مَادِيَّة 56 جَلِيَّة 57 بِلُون 58 قَبِيَّة 59 قَرَصَة 60 قَبِيَّة عَمِيَّة 61 كَمِيَّة  
 62 لَقِيَّة 63 جَنَصِيَّة 64 لَنَج 65 مَادِيَّة مَرِيَّة 66 مَادِيَّة عَشَن 67 مَادِيَّة عَدَاة 68 مَتَلِي مَلَب 69 مَتَلِي مَلَب 70 مَتَلِي مَلَب 71 اَدَل اَلِبر 72 مَادِيَّة -  
 73 قَبِيَّة مَادِيَّة 74 نَعْمَة مَدَن 75 حَايَة 76 خَلِيل 77 عَار 78 نَفَاة اَرِيكِيَّة 79 نَفَاة كَوِيَن 80 مَشَق لَفَاط 81 مَشَق رِيَس 82 مَشَق اَلِيق -  
 83 اَلِيَّة 84 خَرَقَة 85 جَرِيَن 86 كَرَدَم اَبِيغ 87 كَرَدَم مَدِي 88 كَاة 89 زَوَر 90 قَوِيَّة 91 كَشْفَة 92 سَوَن 93 مِيَمَت 94 طَلِيَن 95 هَوَرَة



- 1 قباب - 2 فرخ - 3 أنثى - 4 كبدية مبلولة - 5 زلفية - 6 كبدية - 7 مبداء - 8 سمون - 9 موك - 10 جدادة - 11 جناح - 12 جنيش - 13 رساجة - 14 بحري - 15 شطارة مبلولة - 16 نحال - 17 ديك البحر - 18 دلاغ - 19 لغوط - 20 عثاف الماء - 21 شكة البحر - 22 نهري - 23 غسمة - 24 حنديك - 25 حودي - 26 أبو طبق - 27 سم - 28 طروق القرن - 29 طرنبوج صغري - 30 زمر بحري - 31 زمر أبو شوكة - 32 زنبير - 33 لغ - 34 أم قوس - 35 لينده - 36 بوش المنوسك - 37 قنبرور - 38 أبو منقار - 39 طراغور - 40 سياف البحر - 41 أبو سيف - 42 شير - 43 ردة - 44 أنقليس



1 بوم - 2 شيطون - 3 دوح سبي - 4 بيلاس - 5 لعل - 6 سلمون - 7 زنجور ، سمك الكراكي - 8 دسالة - 9 لشك - 10 كراخ ، ملجوم البحر - 11 دنكة - 12 ابو عتيق ، ازيب البحر - 13 مكرور - 14 زركانة - 15 سمعان البحر - 16 نفير ، غزال الماء - 17 ابو صغوق - 18 ابو صغوق اعظم - 19 جلكي - 20 جيرة - 21 ديب الموت - 22 الشكة - 23 حفش - 24 حويل - 25 غراء - 26 قرش - 27 رشادة - 28 مودية ، عقاب البحر - 29 طرئون



- 1 شادين - 2 صقر فترالي - 3 عقاب ذهبي - 4 عقاب ثيمري - 5 عقاب الليل - 6 بومة - 7 بومة - 8 أم الصفر - 9 بطة - 10 كندور - 11 نرس - 12 لوري - 13 نوبة - 14 المارونة - 15 متوجة حربية - 16 كندور حراء التوتة - 17 كندور صفراء التوتة - 18 كندور فديتر - 19 كندور وديت - 20 قمرزة - 21 بيدا، الزامي - 22 بطيئة بامرة - 23 بطيئة جملة - 24 قنطرة صفراء - 25 غنوج - 26 بيدا، صفيرة - 27 آريا صفراء - 28 آريا صفراء - 29 آريا بنفسجية - 30 دفتاش - 31 حستون - 32 بقات - 33 نطحة - 34 بداس - 35 دج - 36 عقاب أزرق - 37 طرزان - 38 فتاج كير - 39 فتاج سوسي - 40 فتاج يوتي - 41 سنوبر - 42 عشتاف - 43 بادرغوس - 44 موزة - 45 أبو الحن - 46 دشتة - 47 عقاب - 48 ملشور ابيض الجناح - 49 ملشور احمر الجناح - 50 رصعة - 51 زرقف ازرق - 52 ديدك الجبل - 53 سمر - 54 نفاكر كير - 55 نافقة الصنوبر - 56 وورر احمر الجناح - 57 وورر اخضر الجناح - 58 مطرود



- 1 طائر الفردوس الاسود - 2 ريشة سباني - 3 طائر الفردوس الاحمر - 4 طائر الفردوس الكبير - 5 كيايه (الاسم الخاطئ) - 6 كليلي - 7 سكود - 8 ربيع الطوق الصغير - 9 ربيع الطوق الاسود - 10 طائر النبال - 11 فراخن جهوري - 12 فراخن غلوم الثالث - 13 فراخن موه - 14 ريشان - 15 ابو طير - 16 قنبرالي - 17 زعفراني - 18 ابو رباح - 19 تير شعاع الشمس - 20 تير راتح - 21 تير جوليا - 22 معلق احمر اللب - 23 معلق تانك - 24 معلق احمر الفلور - 25 معلق جبل - 26 ابو ريش اسبق - 27 طرود - 28 شرة زرقاء الصدر - 29 تيرة سكوت - 30 ملكين - 31 مانت فان - 32 مانت سان - 33 لاوردي زرقاء المالح - 34 ام حرة - 35 لاجيزيه مدعفة - 36 دمقر طويل اللب - 37 شلبي - 38 ام ربال - 39 تيرة جوردان - 40 تيرة طسنة - 41 فزاع ابو طية - 42 هليشت بونايرت - 43 دريش رباح - 44 سكستور - 45 فلوريس اذن - 46 غريس احمر الزرد - 47 طرطوس ارق - 48 غريس ابيض الفيل - 49 غريس زيردي - 50 لغريس يهي - 51 لغريس طلوبي - 52 لغريس محبوب - 53 لغريس حوك - 54 لغريس مدق - 55 فزار - 56 طلوران - 57 مول طويل الخشار - 58 تيرة كليوب - 59 دماب



- 1 طاووس - 2 ارفوس - 3 تارنج شائع - 4 تارنج مذهب - 5 تارنج امهرست - 6 تارنج لامي - 7 تارنج ايلو - 8 تارنج مزخرف - 9 تارنج اوردو - 10 حرجيل - 11 تارنج بودابو - 12 سيفه شمين - 13 سيفه سير - 14 تارنج ازن - 15 حنط - 16 كيت - 17 غرغر لسري - 18 كولانه - 19 عرقان ، ديك بري - 20 ديك مقاتل - 21 ديك الس - 22 ديك كوششي - 23 ديك ميورغ رافعه - 24 حبيثه داجنه - 25 حبيثه لساء - 26 حمام زاجل - 27 حمام مزرك - 28 حمام مطوك - 29 حمام كيشي - 30 حمام يشقو - 31 حمام رور - 32 حمام مراميش - 33 حمام طالي - 34 بط اهل - 35 اكس شرق - 36 اروزه - 37 تم ابيض - 38 تم اسود - 39 غشوك - 40 ايشه - 41 بوقيل واث - 42 بوقيل ذرب القنب - 43 عبق - 44 زغم مطوك - 45 زغم لاهام - 46 كنار - 47 فنور ميطل - 48 فنور برتقال الصدر - 49 فنور اكب - 50 بنال لاجل - 51 بنال احمر - 52 برور







# ش



لاحت. قوائمها مستطيلة ، دقيقة || ثوبها الى السمرة السوداء باستثناء قاعدة الرأس والقوائم فانها زنجارية اللون || تعيش من تنصها على سطح المياه الراكدة وعلى الضفاف حيث تدمو بين النبات بذات الرضاقة التي تنظهرها على سطح الماء .

Alosa (S).

١٤٧٨٣ - شابل

Alose (E). Alicie shad (E).

جنس اسماك كبيرة القند من فصيلة الصابونيات . انواعها قليلة العدد موطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها مقطوعة مستطيلة ، حنار يطنها شائك الحراشث || اشهر انواعها الشابل المبدول والصابونة .

Alosa vulgaris (S). \* شابل مبدول \*

Alose commune (F). Common alicie shad (E).

نوع من الشابل وهو سمكة كبيرة القند تطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . موطنها المتوسط والاطلسي . تسرا في المياه العذبة وقد يتم ذلك في الربيع ثم تعود الى البحر في اواخر الصيف || لحمها لذيق اللحم . لكنها كثيرة الحسك .

Gros et gras (F). Stout and fat (E). شابلين \*  
صفة الحيوان السمين الكانز .

١٤٧٨٦ - شاتين ، شُرْصُول

Imperméable à la lumière (F). Light-tight (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا يتغلل منها النور .

Arboricole (F).

١٤٧٨٧ - شاجير

Living in trees (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالاخبار او يعيش من الاخبار وطبها .

١٤٧٧٩ - شايركات الماء

Hydrometridae (S). Hydrométrides (F). Hydrometridae, Water striders (E).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة . حشرات هوام ملوك الارجل تقيم فوق الماء كانوا تفره || اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الجورس وشابة الماء .

Hydrometra (S).

١٤٧٨٠ - شايركة الماء \*

Hydromètre (F). Water strider (E).

جنس هوام من فصيلة شايركات الماء . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها نحيلة الاجسام ، دقيقة الارجل المستطيلة . تعيش من تنصها فوق المياه الراكدة . تدمو على سطح الماء بحفة || موطنها جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة .

١٤٧٨١ - شايركة الماء الرمضاء

Hydrometra cinerea (S). Hydromètre gris (F).

حشرة من فصيلة شايركات الماء . جسمها صغير مستدق يطول من ١١ الى ١٤ مم . || رأسها دقيق ، مكور الطرف . غططها نحيل . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان ، فاشرتان . كسلها شبه يرمي الشكل . ظهرها غيب وقصير . قوائمها مستطيلة . ارساغها ثلاثية القفل || ثوبها الى الوردية البهراء يمتد في الرأس وفي كل حرقفة ومور || تعيش من تنصها على سطح الماء حيث تدمو بسرعة مدعشة .

١٤٧٨٢ - شايركة الماء التقيعية

Hydrometra stagnarum (S).

Hydromètre des étangs (F).

حشرة من فصيلة شايركات الماء . جسمها مستدق الجرم يطول من ٩ الى ١٣ مم . || رأسها دقيق مستطيل . غططها قصير . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان كبيرتان . كسلها اسطواني الشكل ويطبها ايضاً . ظهرها غيب



شايركة الماء



شابل مبدول

١٤٨٠٤ - شاري هو دافع الصاعقة ، اطلبه .

١٤٨٠٥ - شاسيب ، شاسيف Maigre, Sec (F).  
Meagre, Dry (E).

المهزول من الحيوان شمرأ أو خفلاً مريضاً .

١٤٨٠٦ - شاش الشامي  
هو البليس وهو الكانج ، اطلبها .

١٤٨٠٧ - شاص ، مشوتّر Raide (F). Stiff (E).

١٤٨٠٨ - شاصير Faon (F). Fawn (E).  
الشاصر والشصر : ولد الطليعة .

١٤٨٠٩ - شاطب Anomoure (F).  
نمت تمريني يطلق عل كل ذنب يشذ بشكله عن المألوف .

١٤٨١٠ - شاطرة هي البطونقا الطليعة ، اطلبها .

١٤٨١١ - شاطط Anomal (F). Anomalous (E).  
شاذ ، غالف نواميس الطليعة او قواعدها .

١٤٨١٢ - شاطئي Bord, Rivage (F).  
Edge, Shore (E). هو شط البحر أو النهر .

١٤٨١٣ - شاعيب ، مشعب Rameux (F).  
Branching (E). الشجر الكثير الفروع .

١٤٨١٤ - شاعث Sparsile (F). Sparsile (E).  
الشاعث هو النجم المنفرد في الفضاء . كل نجم لا يدخل في مجموعات الأبراج أو المجموعات الكوكبية يعتبر من الشواعث .

١٤٨١٥ - شاعج Asymétrique, Inégal (F).  
Asymmetrical, Unequal (E). صفة الشيء اللامتناسق الاجزاء . م. شواء وشياف . ج شواغ وشغو .

١٤٨١٦ - شاف Curatif (F). Curative (E).  
صفة العلاج الذي يقضي عل المرض فيسبب الشفاء .

١٤٨١٧ - شافعة Ulcère (F). Ulcer (E).  
هي القرعة او القرعة الداملة .

١٤٨١٨ - شافير هو الشفر ، اطلبه .

١٤٨١٩ - شافع Bélier (F). Ram (E).  
الشافع من الفئان كالتيس من المعزى .

١٤٨٢٠ - شافول ، مطمّر ، قادن

Fil à plomb (F). Plumb-line (E).  
جهاز مركب من قلمة من النحاس أو الحديد عمودية الشكل ، معلقة بخط قوي ، يستعمله البناء لتثبيت من صفة عمودية اتجاه ما ينشئ .

١٤٨٢١ - شاكّة Acaena (S).  
Acéna, Acène (F). Burr, Rosy spined bur (E). Wierdhaken, Acène (D). Acaena (I).  
جنس نباتات برية وزراعية تريبيتين من فصيلة الورد يات .  
انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . سوكها وفروعها شاكّة .

١٤٧٨٨ - شاح Autotrophe (F).  
Autotrophic (E).

شاح م. شاحية ج. شواح. نمت تمريني يطلق عل جميع النباتات التي تمتص مواد الغذاء من الطليعة فتصمرها وتمثلها بواسطة الطاقة الشمسية .

١٤٧٨٩ - شاحبة ، فاتكة Déchaumouse (F).  
Stubble-plough (E). محراث الشحب او الفتح .

١٤٧٩٠ - شاحن الشاحن من كلاب الصيد الذي يجده الطريد ولا يصيد .  
ج شواحن .

١٤٧٩١ - شاحنة ، كمثيون Camlon (F).  
Dry (E). سيارة مجهزة لنقل الاحمال .

١٤٧٩٢ - شادول Mimétique (F). Mimetic (E).  
نمت وسن تمريني يدل عل النبات الذي ينسجم شكلاً ولوناً مع البيئة التي يعيش فيها .

١٤٧٩٣ - شادين Faon (F). Fawn (E).  
ولد الطليعة .

١٤٧٩٤ - شادنج Hématite (F). Haematite (E).  
هو حجر الدم ، اطلبه .

١٤٧٩٥ - شادوف Chadouf (F). Well-sweep (E).  
الشادوف او الدالية آلة بسيطة قديمة المهد والاستعمال ،  
قيامها دلو وثقال . كانت ولا تزال تستخدم في رفع المياه  
من مجاريها المنخفضة .

١٤٧٩٦ - شادي Cercopithèque de Saba  
هو حبرس سبا ، اطلبه .

١٤٧٩٧ - شاذّ Hétéroclite (F). Heteroclitte (E).  
ما خرج من قواعد المجانسة او من مألوف نوعه .

١٤٧٩٨ - شاز ، شازر الموضع الغليظ الكثير الحجارة .

١٤٧٩٩ - شازر Désoperculer (F). To uncup (E).  
شار واشتار العمل : استخرجه من الوقية واجتناه فهو مشور .

١٤٨٠٠ - شارد ، إيون Ion  
الشوارد والايونات هي نواتج التحليل وتكون بدورها نواتج التحليل الكيماوي الناتج عن مرور التيار الكهربائي في الجسم المقصود . راجع إيون .

١٤٨٠١ - شاردويّ Ionique (F). Ionic (E).

١٤٨٠٢ - شارقات الأجنبية \* Planipennes (F).  
رتبة شحرات ناعمة من طبقة عصيات الجناح . فصائلها  
وابناسها كثيرة العدد . تتميز برووسها الممبوبة . مخانقها  
متعددة القد ، اجنحتها مستطيلة ، تأثيرها مجهزة لقمص .

١٤٨٠٣ - شارقات الأسنان Acrodontes (F).  
Acrodontes (E).

نمت تمريني توصف به العظام من ذوات الاسنان الشارقة  
المرتزة في الحافة الخارجية من الفك الاعل . يقابلها  
قابضات الانسان .



شارقات الاجنحة

تدثر في صدوع شعث السخور وفي أوقايها العام تلو العام والمش قرب العش . حشبتاً مؤلفة من يفتين لوتها الى البياض الاخير تملو ماجة غضراء او حمراء وبض النقط الجوزية . الترخيم يستمر نحو اربعة اشابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يثخن لها الغذاء .



شال

١٤٨٣٣ - شاكينة عقابية \* ، شاكينة أفريقية \*  
Fregata marina, Aetazag aquilus (S).  
Frégate-Aigle, F. marine, Grando frégate (F).

نوع من الشاكينة . طائر كبير القد ، مستطيل الجسم ، طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٢٠ سم . أما وزنه فلا يتجاوز ١٥٠٠ غرام || ثوبه اسود اللون ، اغضر المواج . وزره ويتقاده الى الحمرة . حلقه عين شديدة السواد . رجلاه الى الجوزة || قوته الاسماك يصطادها من البسر ويختلسها من منقايه طيور الماء || اعطاه مجاح افريقية الاستوائية والحارة ان عل المحيط الاطلسي الى عل المحيط الهندي .



شامو

١٤٨٣٤ - شاكينة هندية \*

Fregata minor, Aetazag minor (S).  
Frégate indienne, Petite frégate (F).

نوع من الشاكينة . طائر متوسط القد ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٦٠ سم . وتبلغ بسطه نحو ١٢٠ سم . وزنه لا يتجاوز ٧٥٠ غراماً || اعطاه تحت من مجاح جزر الزايج الى الهند والبحر الاحمر || ثوبه الى السواد الازرق المواج . مقدم عنقه الى البياض الاخير . حلقه عين كسنية اللون . منقاده شديدة السرعة . رجلاه الى السمرة يطولها مواج بحري || قوته الاسماك يصطادها كالشاكينة المغاية ويذثر مثلها في صدوع السخور ووقايها .



شاكينة

١٤٨٣٥ - شاه اسبرم ربي  
Querrellet (F).  
اطلب خزامى بحرية .

١٤٨٣٦ - شاه بآل  
Autour commun (F).  
Goshawk (E).  
هو البازي ، اطليه .

١٤٨٣٧ - شاهبانتج  
Aunée conyze (F).  
هو البرنوف ، اطليه .

١٤٨٣٨ - شاهبيلوط  
Châtagnier (F).  
هو الكستنا ، اطليه .

١٤٨٣٩ - شاهبيلوط الحصان  
Marron d'Inde (F).  
Horse-chestnut (E).  
ثمره اللندلي الهندي ويقال لها أيضاً قسطة الحصان وقسطة مرة .



شاترج

١٤٨٤٠ - شاترج \* ، كسفرة الحبر

Fumaria (S). Fumeterre (F). Ramping fumitory (E).  
Erdrauch, Rankenerdrauch (D). Fumosterno, Fumaria di flor bianca (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الشاترجيات . اردائه منقطة ، متعاقبة ، مركبة . نصلها كبير التفرغص ، باحت الخضر البحري ، يفوح عنه رائحة مادة طيارة تفعل قتل الدخان تأخذ الالف وتدفع العين || ازهاره لاقامية التجميع ، صغيرة القد ، لونها الى البياض الاغيش يملو مواج وردي .

اورائها مركبة . وريقاتها يضيئة التصل المسن الحافة . ازهارها حلقية التجميع صغيرة القد يندب فيها الاصفر والاحمر || انزهارها صيفي .

١٤٨٣٧ - شاكيس \*  
Apogamique (F).  
Apogamical (E).

كل نبات يتكاثر بالبرعة او القمعة لانه فقد خاصية التكاثر بالاخصاب الطبيعي اي بتفطيج الازهار يدعى شاكس .

١٤٨٣٨ - شاكلة  
Flanc (F). Flank (E).  
هي الاصل والخامسة . ج شواكل .

١٤٨٣٩ - شال \*  
Synodontis (S). Synodonte (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة السلوريات انواعه نحو ١٥ جميعها من اسماك مياه المناطق الاستوائية والحارة . اشهر انواعه شال النيل والرزوق والسبي والقرقرور . جميعها مأكولة ، طوبها متوسطة الصنف .

١٤٨٤٥ - شاليم  
Seige (F). Rye (E).  
هو الشليم ، اطليه .

١٤٨٤٦ - شالوف  
Cascade (F). Waterfall (E).  
هو الشلال صخر حجه وارفع منحدره .

١٤٨٤٧ - شامة ، شم  
Odorat (F). Smell (E).  
احدى حواس الجسم الحاسة لاسيا عند الحيوان الذي يمتد عليها في غذائه || عضو الشم هو الانف يلمس بالته الاعف مغلف بقشاه غاطلي يلمس الاصابع التي تنقل الاحساسات الشمية الى المراكز الخاصة بها في المخ .

١٤٨٤٨ - شامكة  
Membre (F). Limb (E).  
الشامة : قائمة أدابة . ج شوامت . ويقال لها الدارجة .

١٤٨٤٩ - شامكة \* ، شاماذ  
Thérildion (F).  
جنس عتاكب من فصيلة التناذيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد او صغيرة . اجسامها شبه يضيئة الشكل ، جرائزها دقيقة مستطيلة . تحبك نواصها عل النبات وفي تجاريف السخور والجدران والابنية الممجرة .

١٤٨٥٠ - شاملات الكف  
Totipalmes  
يؤينة طيور من تشكيلات القدم فيها البجع والفاق وغيرهما .

١٤٨٥١ - شان  
Suture du crâne (F).  
Suture from the cranium (E).  
هو درز التجمف ومويشل الدرز الاكليل والسهم واللامبي .

١٤٨٥٢ - شاكينة \*  
Fregata, Aetazag (S).  
Frégate (F). Frigate-petrel (E).

جنس طير من كليات القدم وفصيلة البجيمات . ل نومان معروفان : الشاكينة المغاية والشاكينة الحنطية || اعطاه مجاح البلاد الحارة والاستوائية . تألف المواق الصخرية والصخور الشارة على البسر || اجسامها مستطيلة . اذنانها فارقة . منقايها متدلة التبيط ، حلبة الملائط الدليا الدورية . منقطة الملائط السفلى . ارساها قصيرة شاتر اصباها نصفية الكثاف . مغالها بحمنة ، ذرية || طوانها شديدة السرعة . قوتها الاسماك تنقض عليها من الاجواء كاسهم وتختلسها من منقايه الزنج والاخيل والقرور ||

## ١٤٨٤٨ - شايو\* ، كُسو

Brayers anthelmintica, Hagenia abyssinica (S).  
Cousotier, Couso, Kouso (F). Kusso, Tapow-  
worm plant (E). Kosobaum (D). Cusso (I).  
شجرة برية طيبة من فصيلة الورديات منها بلاد الحبشة .  
اوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها سنانية النصل ، مجنحة  
الشكل . ازهارها عقنودية التجميع ، تاجية الارتكاز  
تستعمل في الطب وتدخل في عدة مستحضرات اعصها  
الادوية المعوية .

١٤٨٤٩ - شايوي Aguidier (F).  
هو السقاء الذي يوزع مياه اري على مستحقها .

١٤٨٥٠ - شائع ، مشاع ، مُشْتَرَك Indivis (F).  
Unvidité (E).  
هي الملكية الشائعة وهي حالة قانونية يوجد فيها من يملك  
حقاً مشتركاً مع غيره .

١٤٨٥١ - شاليكُ النجار Echinocharpe (F).  
Echinocarpous (E).  
من النباتات ما كانت قشور ثماره محفوفة بالغلب الشالك .

١٤٨٥٢ - شاليكُ الجناح Uncipenne (F).  
من الطير ما كان جناحه مجهز ببعض الريش الشالك  
الاطراف .

١٤٨٥٣ - شاليكُ الدكَب Echinnure (F).  
Echinourous (E).  
نمت تمريني يطلق على كل حيوان او دوية يملؤها في  
ذنبها حلب شالك .

١٤٨٥٤ - شاليكُ القَرَام Echinpède (F).  
Echinipéd (E).  
نمت تمريني يطلق على كل دوية او حشرة يملؤها في  
قوائمها مناعس حادة كالشوك او حلب جامد شالك .

١٤٨٥٥ - شاليكاتُ الرأس Acanthocéphales (F).  
Acanthocéphala (E).  
صنف من الدود الخيطيات رؤوسها واعظامها مسلحة  
بالشوك .

١٤٨٥٦ - شاليكاتُ الزَعَالف Acanthoptera (S).  
Acanthoptères, Acanthoptéry-  
giens (F). Acanthopterygien (E).  
رتبة من الاسماك الخيطيات . صفاتها واجناسها وانواعها  
كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها نهرى || اشهرها  
البوري والآن والقاريس والمرجان الخ .

١٤٨٥٧ - شاليل الدليل Niqueté (F).  
Nicking (E).  
الفرس الذي قطعت عضل ذنبه الخافضة لتسول .

١٤٨٥٨ - شايي Thea (S). Théier (F). Tea plant (E).  
جنس جنبات وجنبيات برية وزراعية صناعتها من فصيلة  
الكاسليات . مهد الصين . انواعه ١٦ جميعها متعاقبة  
الاوراق المنقطة ، نصلها صغير القد ، مستطيل الشكل ،  
سنة الحافة . ازهارها ابضية الارتكاز ، فردية او ثلاثية  
التجميع ، لونها يراوح بين الالبيش والاصفر . عرفها  
غانت الرائحة المستحبة || اشهر انواعه الزراعية الشاي  
الصيني ، اطلبه .

## ١٤٨٤٩ - شاعترج مخزني\* ، بقلة الملوك

Fumaria officinalis (S). Fumetere officinale, Fiel de  
terre (F). Fumitory, Fumitarre (E). Echter Erdrauch  
(D). Fumosterno officinale, Fiele di terra (I).  
نبات عشبي حولي يري طبي من فصيلة الشاعترجيات .  
اوراقه مرة العلم غزيرة المادة القلوية الفعالة وبعض  
الحوليس العضوية النافعة . فركها يجر ما تحواه من مواد  
طيارة تهيج الانف وتوسع العين .

١٤٨٤٢ - شاعترجيات Fumariaceae (S).  
Fumariacées (F). Fumariaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة  
العدد جميعها نباتات عشبية . ازهارها متدغمة الراسات ،  
مزدوجة الفصل ، رباعية البلات ، ثنائية الاسدية الجانبية  
الارتكاز الثلاثية الانقسام || ثمارها جراء ثنائية الكرايل .  
يزورها آسية مزيوته .

١٤٨٤٣ - شَاهَد Témoïn (F). Witness (E).  
هو الذي يدل بالشهادة . والشاهد قد يكون :

شاهد إثبات Témoïn à charge (F).  
شاهد زور Témoïn faux (F). Falsely witness (E).  
شاهد حل الشخصية Témoïn certificateur (F).  
Certifier witness (E).  
شاهد غير مباشر Témoïn indirect, Médias (F).  
Mediate witness (E).  
شاهد قابل اللعن Témoïn reprochable (F).  
Reproachable witness (E).  
شاهد نفي Témoïn à décharge (F).  
Witness for the defence (E).

١٤٨٤٤ - شَاهِسَقَرَم هو الحيق الصغير ، اطلبه .

١٤٨٤٥ - شاه صيني هو التامول ، اطلبه .

١٤٨٤٦ - شاهين Falco peregrinus (S).  
Faucon commun, F. pèlerin, F. voyageur (F).  
Peregrine falcon, Royal falcon, Shahin (E).  
طائر من الصقور وفضيلة الصقريات . عروقه عديدة

منتشرة في معظم الاقطار الاسيوية والاروية . وهو كبير  
الحامة والسقط ، اسود الرأس ، طويل القوائم ، واسع  
العينين ، رحب الصدر الاخير المشرب ، قصير العنق  
الايض ، مثل " الزور ، جليسه الفخزين ، قصير  
الساكن . ذنبه اسود مستطيل تعلوه بعض الزرقعة || وهو  
ارد من الصفر واييس مزاجاً ولاجل ذلك تكون حركته  
من العلل الى السفلى شديدة الانقضاض || جمه شواحين  
وشياحين . قال فيه عبدالله بن المبارك :

« قد يفتح المرء حانوتاً لتجره  
وقد فتحت لك الحانوت بالدين  
بين الاساطين حانوت بلا غلق  
تبتاع بالدين اموال  
صيرت دينك شايحاً تصيد به  
وليس يقلع اصحاب الشواحين »

١٤٨٤٧ - شاهين Alshain

الشاهين نجم نير من كوكبة العقاب .



شاعترج مخزني



شاهين



شايو ، كسو



شاي المزوج



شاي بفسلفانية



شاي صيني



شَبَّ اللَّيْلِ

تزارح من ٣ الى ٥ امتار || استأثر اوراقها يبدأ بمد  
الفرس بثلاث سنوات واجود الارواق ما نتج من الاثتان  
الفتية || اشهر البلاد المنتجة لشاي : الصين واليابان  
والهند وامند الصينية وجزر الزايج وسرنديب .

١٤٨٦٦ - شايين  
المادة القلووية الموجودة في ورق الشاي وهي معظمها من  
البينين .

١٤٨٦٧ - شَبَّ  
الشب او حجر الشب، ملح معدني بلوري التركيب  
ابيض اللون حازم الطعم يتكون في الطبيعة من بعض  
الكبريتات انحصار كبريتات الالومنيوم والبوتاسيوم .  
يذوب في الماء ويصهر في حرارة ٩٢٠°س || يستخدم  
في عدة صناعات انحصار الصباغة القطنية والصرفية حيث  
يثبت الالوان ويذكيها . ويستعمل في ترويق المياه الملوحة  
وفي حفظ الجلود ... كما يستعمل في الطب .  
وهو من القوابض التي توقف الزيف والرفاث .

١٤٨٦٨ - شَبَّ اللَّيْلِ \* ، نَوَّار اللَّيْلِ ، شَوَّاق ،  
شَبَّ الظريف

Mirabilis(S). Nyctage, Belle-de-nuit(F). Four o'clock  
plant (E). Wunderblume (D). Bella di notte, Me-  
raglia, Gelsomino di notte (I).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النرجس . انواعه  
عديدة تتميز بجمورها القليلة الشكل . اوراقها متعاقبة ،  
السفلية منها مقعقة اما العلوية فلافنة . ازهارها بيضاء  
الشكل ، زاهية الالوان ، تنفتح في الليل وانيلجها يوم  
من غروب الشمس الى سطوع الفجر || اشهر انواعه  
الزينة ما يتبع .

١٤٨٦٩ - شَبَّ اللَّيْلِ الإفريقي ، شَوَّاق إفريقي  
Mirabilis dichotoma (S). Nyctage dichotome, Belle-  
de-nuit dichotome (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تملو من ٦٠ الى  
١٢٠ سم . ساقها نحيلة . اوراقها لائنة ، بيضية . ازهارها  
صفراء ، عطرية العرف ، يضاء اللون او حمر .  
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٤٨٧٠ - شَبَّ اللَّيْلِ الجلبني ، شَوَّاق جلبني  
Mirabilis jalapa (S). Nyctage faux-jalap, Belle-  
de-nuit faux-jalap, Merveille du Pérou, Herbe triste(F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تملو من ٥٠ الى  
١٠٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ، نصلها ازغب الصفعة  
السفل ، ذلق الزام الانبير . ازهارها عديمة العرف  
تطوّل نحو ٣ سم . لونها برّاق من الابيض الى الاحمر  
والاصفر والمزيج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .  
جلودها تستعمل في غش الجلب .

١٤٨٧١ - شَبَّ اللَّيْلِ المُسْتَطِيلُ الزَّهْر ، شَوَّاق  
مُسْتَطِيلُ الزَّهْر  
Mirabilis longiflora(S). Nyctage à longues fleurs, Belle-de-nuit à longues  
fleurs, Belle-de-nuit odorante (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تملو من ٦٠ الى  
١٢٠ سم . اوراقها زباد النصل دقة . ازهارها مستطيلة  
الانبيب ، خلية البصرة ، فواحة العرف ، يضاء اللون ،  
حراء القاعدية الداخلية || ازهارها يستمر من تموز الى  
ايلول .

١٤٨٥٩ - شاي  
هو ورق جنبة الشاي يخبث فيجوع ويحف في الشمس .  
ثم يلف ويحمص في مجافيت خاصة . ثم يمد للاستهلاك  
يعد تحضيره وزجه بنسب متفاوتة القدر بين مختلف  
اصناف الوراق || يحصوله العالمي المحلي نعام ٥٠٠٠٠  
طن || اما تركيبة الصينيه فهو :

ماء	من ٨٥٠ الى ١٠٧٠ %
رمد	من ٨٠ الى ٧٠ %
مواد ازوتية	من ٢٣,٢٥ الى ٢٧,٤٠ %
مواد دهنية عطرية	من ٠,٣٨ الى ٠,٧٨ %
عطان	من ١٥ الى ١٥,٦٥ %
شايين (بينين)	من ١١٠ الى ٣٨٠ %

ويصف الحولوش الضوية والاملاح المعدنية بنسب يراوح  
مجموعها من ٣ الى ٧ %

١٤٨٦٠ - شاي العَرَب هو القات ، اطبله .

١٤٨٦١ - شاي المُرُوج \* ، قَسُوس  
Ledum (S). Ledon, Romarin sauvage (F). Crystal-tea,  
Marsh cystus, Marsh rosemary (E). Sumpforst, Wil-  
der rosmarin (D). Ledone, Ramerino di palude (I).

جنس نباتات معمرة ابيدة من فصيلة الخنجليات . انواعه  
قليلة بعضها بري وبعضها زينة . سوقها فرعاء تملو من  
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة عطرية العرف .  
ازهارها عذكوكة التجميع ، تاجي الازنكار . ازهارها  
خامسة البتلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حرية  
الرائحة || اوراق حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال  
الشاي || اشهر انواعه ما يتبع .

شاي المروج المنقني  
Ledum palustre (S).  
Lédon des marais (F).

شاي المروج المريض الورق  
Ledum latifolium (S).  
Lédon à feuilles larges (F).

١٤٨٦٢ - شاي المكشيك هو الزريح ، اطبله .

١٤٨٦٣ - شاي برّاغواي هو بحشة الشاي ، اطبله .

١٤٨٦٤ - شاي بفسلفانية \* ، مَوَرْدَة أَرْجَوَانِيَّة  
Monarda purpurea, M. didyma (S). Monard  
pourpre, Thé d'Oswego, T. de Pensylvanie (F). Oswego  
tea, Mountain tea (E). Osweguto, Doppelblen-  
balsam (D). Monarda cremisina, M. scarlatina (I).

نوع من الموردة . وهو نبات عشبي معمر من فصيلة  
الفسليات . ساقه كثيرة الازداد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم .  
اوراقه مقعقة ، نصلها كامل الصفعة ، ساني الشكل ،  
منشاري الحافة ، ازغب البصرة ، عطري الرائحة . ازهاره  
عذكوكة التجميع ، مستطيلة القد ، أرجوانية اللون ،  
فواحة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .  
اوراقه صلبة ناعمة تستعمل استعمال الشاي .

١٤٨٦٥ - شاي صيني \*  
Thea chinensis, T. viridis (S). Théier de Chine(F).  
Tea plant (E). Teesrauch (D). Tè, Thé (I).

اشهر انواع الشاي واعمها ازراعة واكثرها ضرورياً واجيدوا  
انتاجاً . وهو شجيرة معمرة تملو من مترين الى ستة امتار .  
متوسط علوها نحو ٣٥٠ سم . ترغب في الغمام وفي الاربة  
المروية القليلة الانساج . تحب رطوبة التربة المستحكة  
ولا تتأثر بالبرد || تفرس الشجيرة في مستقرا على ابعاد



شَبَّ النَّهَار

## ١٤٨٧٢ - شَبَّ النَّهَار \* شَبَّاب مَكَلَّتْ الْأَلْوَان

*Convolvulus tricolor* (S). *Belle de jour*, *Liseron tricolore* (F). *Three coloured bindweed* (E). *Dreifarbige Winde*, *Kriechwinde*, *Winde* (D). *Bella di giorno*, *Emerocale* (I).

نبات عشبي حولي تزيين من فصيلة البلياتيات. أوراقه أهليلجية الشكل، تصلها خلى البشرة. أزهاره كبيرة القند، زرقاء البوق بيضاء الأنبوب، صفراء القاعدة. تنتشر في النهار وتقلق في الليل || ضروبه الزينية عديدة جميعها زاهية الألوان || أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٤٨٧٣ - شَبَّاب هو الطبل، اطلبه.

## ١٤٨٧٤ - شَبَّابَة \* Coleophora, Eupista (S). Coléophore, Eupiste (F). Casebearers (E). Futerarmotten, Sackmotten (D).

جنس فراش من المنغيات. أنواعه عديدة أسطفاً الاقاليم المتدلة والباردة. جميعها نخيلة الجسم صغيرة القند، بطنها تراوح من ١٦ إلى ٢٢ مم. أجسامها حنطية. رواشتها الانامية إلى الصفرة تعلوها الزواكش المختلفة الألوان. رواشتها الخلفية إلى البياض الاخرى يملؤها تزيين مختلف مداه ولونه مع الأنواع. اطار رواشتها حريش النهديب تكثر فيه الألوان القاتمة كالاخر || رقاتها تحمل قراءاً لاقياس الشكل والون تلجأ اليه كما تقفل الحلازين. وهي عاصلة وثامة تركيب النباتات البرية والاشجار المثمرة تنضم الاوراق والثمار.

## ١٤٨٧٥ - شَبَّابَة

الشاة: المغرب ساعة تولد. وقيل مغرب صفراء. وقيل حة المغرب.

## ١٤٨٧٦ - شَبَّابَس

هي السبارس سمكة من السرغوس، اطلبها.

## ١٤٨٧٧ - شَبَّابَرَق \* شَبَّابَرَق، شَبَّابَرَق، تَشَبَّابَرَق

*Ononis antiquorum* (S). *Ononide antique*, *Bugrane*, *Arrête-bœuf* (F). *Tall rest-harrow* (E). *Südlische Hashechel* (D). *Bulimacola*, *Arresta bovi* (I). نوع من التين وهو جنية متوسطة القند غليظة الجذور المستطيلة. الاقنية الامتداد. اوراقه مركبة، عايقة الخضر. أزهاره عشودية التجميع بحيلة الشكل صفراء اللون يملؤها تزيين وردي || يقال أنها من النباتات الطبية تنفع أزهارها ينفع الصدر.

## ١٤٨٧٨ - شَبَّابَرَق

*Février* (F). *February* (E). يعرف أيضاً بـسوبات و فبراير. الشهر الثاني من السنة الشمسية مركزة بين كانون الثاني وآذار. وهو من استحداث الرومان وكان عنهم شهر التطهر وأخر شهور السنة. ثم أصبح في رصفه الحالي منذ القرن الخامس قبل الميلاد. عدد أيامه ثمانية وعشرون يوماً إلا في السنين الكبيسة فهو تسعة وعشرون || في السابع منه تسقط الجمرة الأولى ثم يجري الماء في العيد. وفي الرابع عشر تسقط الجمرة الثانية وفي الحادي والعشرين تسقط الجمرة الثالثة. وبسبب سقوط الجمرات ان الناس كانوا يتخلون في قديم الزمان اغنية ثلاثة في الشتاء يحيط بعضها ببعض وكان الخيال الاول مأوى للواجم الكبار كالحيل والابل والبقر. والخيال الثاني للواجم الصغار كالتمم وهم كانوا في الخفاء الثالث. وكانوا يشعلون جمرات النار في كل غياه ويتخلون



شَبَّابَة



شَبَّابَرَق

الجمر للاسقاط. فلما كان السابع من شباط اخبروا دواجم الكبار الى الصحراء وجعلوا الصغار مكانها وهم سكنوا مكان الصغار فتمت سقطت من الجمرات الثلاث جرة. فاذا مضى اسبوع آخر اخبروا الغنم أيضاً الى الصحراء وهم سكنوا مكانها فتمت سقطت جرة اخرى. فاذا مضى اسبوع آخر اخبروا الى الصحراء وتركوا اشمال النار لقلعة البرد وعليه المواء فسقطت الجمرة الثالثة || وفي السادس والعشرين من شباط اول ايام المجوز ويسام المجوز سمة: ثلاثة من شباط واربعة من آذار وهي لاخضر من البرد والرياح.

تقومه الزراعي. اعماله الزراعية عديدة. اغصها:

١ - في الزراعات العامة الموسمية- توزيع الاسمدة الازوتية النيتراية على الزروع بمعدل ٢٠ كيلو لدم الواحد وذلك لتنشيط النمو الخضرى الذي يقرر جودة الاسبال ووفرة الانتاج. بذر الحردل. الاعتناء بمشائل البقول والتبوع ووقايتها من تقلبات المومل الجوية ومن عبث الحشرات والاصام. المباشرة، عند اوامر الشهر، بتوزيع الاسمدة الكيماوية المركبة على الارثة لمدة لزراعة البقول والخضار.

٢ - في الاشجار المثمرة- متابعة غرس نصوب الاشجار المثمرة على اختلاف انواعها. ومتابعة التشجير والتقليم ثم دفع القمامة وهرقها بكاملها. متابعة نفض الاشجار بالزيوت البيض الخفيفة والموالكن الفعالة.

٣ - في الحمضيات- تهيئة وفرس مشائل التارنج والليمون الحلو. تنظيف سوق وفروع الاشجار من البعاه الصلقة والبقايا اليابسة والكشف على جذوع الاشجار للمرضة والحاروط ونفضها بمحلول سلفات النحاس والكلس.

٤ - في الزيتون- انجاز جميع الاعمال الزراعية التي تمرر القيام بها في الشهر الماضي اغصها للتسييد والحرق والتقليم والتقليم.

٥ - في الكروية- حرق الكروية وتقليمها ثم نفضها بمحلول سلفات النحاس. متابعة الدرس ان في المشائل او في المستقر بعد مراعاة موقع التربة وظروفها الحكيمة ومقدورها الاندماجي.

٦ - في الموز- المباشرة بغرس نصوب الموز في الارثة الخفيفة القليلة الاندماج. تسييد الزراعات القائمة بالاسمدة الكيماوية المركبة والانتباه الى اضافة الكلس حيث تدعو الحاجة.

٧ - في الاشجار الحديقية والحرجية - متابعة غرس الاشجار النافعة والسرور والكروية والاكاليبتوس الخ..

٨ - في الخضار والبقول- متابعة زرع البقول التي صار تدمادها في الشهر المنصرم بضاف اليها التقريب والكمون والقرع. تسييد زراعات الباذنجان لدفعها في استمرار النمو والاشجار. المباشرة بزراعة الخيار والكوسى والقرع في المواقع الدافئة.

٩ - في الزهور- عرق التربة وتمشيتها ونثر الاسمدة الكيماوية المركبة. تقليم الورود والمباشرة بغرس الزهور الصيفية على اختلاف انواعها.

## ١٤٨٧٩ - شَبَّابَة ٥

*Carpiculture* (F). *Carp-breeding* (E). الشبابة تربية الشبوط، وقد يتم ذلك في غدران فيسمة متوسطة الغور.

## ١٤٨٨٠ - شَبَّابَم

*Cordon & fixer* (F). *Fasten-string* (E). خيط يشد الشيء لاستقراره في مكانه.





شباب



شيث البصيلات



شيث



شيث بري



شيثان



شيع

## ١٤٨٩٠ - شَيْثَانِيَّات \* Geophilidae (S).

Geophilidae (F). Geophilidae (E).  
فصيلة دويبات من الدخانيات الشفويات الاسحاق.  
اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها الشيثان.

## ١٤٨٩١ - شَيْثَانِيَّات \* Demodicidae (S).

Demodicidae (F). Demodicidae (E).  
فصيلة حشرات جلدية مجهرية من رتبة القراديات. لا  
ترى بالعين المجردة، اجناسها مسطلة، ارجلها قصيرة.  
تميش على غدد وبصيلات الشعر. تراكب جميع الحيوانات  
الثديية ولا تمتص من الانسان.

## ١٤٨٩٢ - شَيْثَع \*، شَيْثَعَة \* Buthus (S).

Scorpion jaune, Buthus (F). Yellow scorpion (E).  
ج شبايع. جنس عقارب متوسطة القد او كبيرة، حنطية  
اللون، صفراء المراج. تتميز بملقائها المزدوجة الانسان  
الداخلية. اعطائها البلاد الحارة. تكثر في الارضية  
الريلة. مدمرها دجوي، راجع عقرب.

## ١٤٨٩٣ - شَيْثَع أَصْفَر \* Scorpion jaune (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب اصفر، اطلبه.

## ١٤٨٩٤ - شَيْثَع حَنْطِي \* Scorpion brun (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب حنطي، اطلبه.

## ١٤٨٩٥ - شَيْثَعِيَّات \* Scorpionidae (S).

Scorpionides (F). Scorpionidae (E).  
فصيلة دويبات ولود غيبية من رتبة القرعيات. اجناسها  
وانواعها عديدة. اعطائها البلاد الحارة. جميعها دجوية  
تسعى في الليل وتسريع في النهار في غبار، تألفها بين  
الحجارة ونحما.

## ١٤٨٩٦ - شَيْثَع \*، شَيْثَعَة \* Talitrus (S).

Talitrus (F). Talitrus (E).  
جنس دويبات بحرية من القشريات الملبيا وفصيلة  
الدخانيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار  
المناطق الباردة والمتعدلة الحرارة. تميش على الشواطئ الرملية.  
جميعها قاصصة وتنتن في الرمل بصره || اجسامها صغيرة  
تطول من ٥ الى ٧ سم. اوتوا الى الشبه الزرقاء يملوها  
مواج مرجاني يتخلله الحنطي عند حارة السكم || جميع  
انواعها مأكولة كالاربيان.

## ١٤٨٩٧ - شَيْثَر \* Trèfle (F).

Clover (E).  
هو النفل. وقد جاء في لسان العرب : « نبات شبيه بالزلف  
الا انه ابل واعظم ورقا مغرب شوب بالفراسية ».

## ١٤٨٩٨ - شَيْشَر \* Empan (F).

Span (E).  
الشير المساة الواقعة بين طرفي الابهام والخنصر عند كامل  
نحبا. متوصلها ٢٢ سم.

## ١٤٨٩٩ - شَيْشَرِيَّس \* Chamelon (F).

Young camel (E).  
هو الجمل الصغير لا يزال يتبع امه.

## ١٤٩٠٠ - شَيْشَرِي \* شيركة

هو الشبارق، اطلبه.

## ١٤٩٠١ - شَيْشَرِي \* Chaton (F).

Catkin (E).  
ازهار سليل قدي الشكل صغير الازهار التركية المتتابعة.

## ١٤٨٩١ - شَيْثَان \* Skimmia (S).

Skimmie (F).  
جنس نباتات برية وريسية من فصيلة البشيات. انواعه  
قليلة المدد جميعها جنبات سرورية ترطب في المناطق  
المتعدلة المنحرة نحو الحارة. سوقها منتصبة فرياه. اوراقها  
عرونة متعقبة متعاقبة. نصلها جامد الصفحة الاصلجية  
توشم الغدد الدقيقة الشفافة. ازهارها حشوكي الشكل  
طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد، كثيفة التجميع،  
فواحة العرف المستحب. ثمارها عنية، كرزوية الحليم،  
حمره اللون، مأكولة.

## ١٤٨٩٢ - شَيْثَانَك \* هو البرون، اطلبه.

وقد تكتب ايضاً شايانك.

## ١٤٨٩٣ - شَيْثَب \* Taureau (vieux) (F).

الشيب والشوبر : المن من الثيران. Bull (aged) (E).

## ١٤٨٩٤ - شَيْثَب \* Aneth (F).

هو الثيب، اطلبه.

## ١٤٨٩٥ - شَيْثَب \* Demodex

جنس حشرات من الشيثيات الجلدية المجهرية. انواعه  
عديدة تميش على غدد الشعر وبصيلاته. تنطفل على جميع  
الحيوانات الثديية وقد تصيب الانسان فتسبب سقوط  
الشعر وما لا يطاق من الحكة.

## ١٤٨٩٦ - شَيْثَبُ الصَيْبِيَّات \* Demodex follicularum (S).

Demodex folliculaire (F).  
نوع من الشيث المجهرية يركب الموالي اجسامها الايقار  
والاغنام ويركب الكلاب والسانير وتكلف شعرا ويلوحها  
ويوقع بها اشد الاذى. وعندما يصيب الانسان يتركز  
عادة في وجهه.

## ١٤٨٩٧ - شَيْثَب \*، شَيْثَب \* Anethum graveolens (S).

Aneth, Fenouil bâlard (F). Anet, Dill, Dill-seed (E). Gartendill, Dill fenchel (D).  
Aneto, Aneto odoroso, Neto (I).  
نبات عشبي معمر من فصيلة الخيميات. قريب الشبه  
من الثيار وقد يستعمل استعماله في التوابل. اوراقه متعاقبة  
مركبة خيطية. يستخرج منها ومن البزور زيت طيار  
له استعمال الطبي || تقيح اوراقه وتجذوره فيجد المدة  
والامه ويصرف الغازات ويهدئ الاعصاب.

## ١٤٨٩٨ - شَيْثَب بَرِّي \*، مَوْم \* Meum athamanticum (S).

Aneth sauvage, Meum (F). Meu, Bold-money, Spignel (E). Wilder dillen, Feine  
Bäurwurz (D). Meo, Meo barbuto, Finocchio (I).  
نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الخيميات. جلوره  
وساقه واوراقه وبزوره تقيد المدة وتقوي القلب وتصفو  
الغازات وتوقف الفواق. يستخرج من جميع اجزائه زيت  
طيار نافع له استعماله الطبي.

## ١٤٨٩٩ - شَيْثَان \*، شَيْثَان \* Geophilus (S).

Géophile (F). Geophilus (E). Erdläufer (D).  
جنس دويبات مغرمة من فصيلة الشيثانيات. انواعه  
عديدة اجسامها مبطة دقيقة مستطيلة مركبة من شرات  
المخلفات. جراسها تمد من ٤٢ الى ٧٣ زوجاً لكل حلقة  
زوج. اعطائها العالم. تألف الارضية الرملية. تميش  
تحت التبل والصلاب. تسرع في الليل. فواسلها فسفورية  
مضية. افانها سطحية. قويا الحارطين والديدان. تعتبر  
من الدويبات الفاضلة لانها تقسم الجزر والسيادون.

1٤٩١٦ - شَبَن (F). Engraissement (F). Fattening (E).  
علف الدواجن لتسمينها. وهي عملية اقتصادية ترتكز  
على قواعد تقنية وثيقة الارتباط بالعناصر الغذائية المختلفة  
للمفاعيل التي تحوّلها الاكلات من الاعشاب الى الحبوب.

1٤٩١٧ - شَبَنَم\* ، كَزُور (F). Casuarium (F).  
Casuar (F). Casowary (E).

جنس طير من الشبنيات قريب الشبه من النعام. انواعه  
٦ جميعها كبيرة الجثة. كناية الرأس ، جالسة المناد ،  
قصيرة العنق ، زغبية الريش. جملة الاطوار الزاخرة  
الالوان. ذكورها واناثها تحمل بالثوب نفسه ومن ميزاتهما  
ان الذكر يحضن البيض دون الانثى || اعطاه بلاد  
الهند وجوارها. يأنف الغابات الكثيفة وصفات الأهر  
الدخلة. قوته الحشرات والمظاء والغضادع.

1٤٩١٨ - شَبَنِيَّات (F). Casuaridae (F).  
Casuaridés (F). Casuaridae (E).  
فصيلة طيور من الموادي قريبة الشبه من النعام الا انها  
اصغر قدماً واقل صغراً وساقاً. تتميز بقبحاتها الكنايية،  
بمنايقها الجالسة ، باجنحتها القصيرة وبزها الوان ورشها  
اللامع. جميعها غيرة الخلق نفور وعقوق.

1٤٩١٩ - شَبَنَة (F). Cuivre jaune (F). Brass (E).  
هو النحاس الاصفر.

1٤٩٢٠ - شَبَنَة المَعْدَن ، مَعْدَنِيْد ، فِلَزَات (F).  
Métalloïde (F). Metalloïd (E).  
اشياء المادان مواد بسيطة تتميز بقلّة ايساليتها للحارة  
والكهربية ، كما تولدت مع الاكسجين الحامض  
والاكسيدات اللانفتملة.

1٤٩٢١ - شَبَنَة انْتِفَاع ، انْتِفَاع حَكْمِي (F).  
Quasi-usufruit (F).  
صيغة فقهية معناها الانتفاع بالمستهلكات وعلى المستمع  
الذي استهلكها او باعها شراً ان يرد امثاله وزناً وصفة  
ومثلاً حين زوال الانتفاع.

1٤٩٢٢ - شَبَنَة حَيَازَة ، حَيَازَة حَكْمِيَّة (F).  
Quasi-possession (F).  
هي حيازة حق ارتفاق.

1٤٩٢٣ - شَبَنَة قَلَوِي (F). Alcaloïde (F).  
Alkaloid (E).  
مادة عضوية ازوتية تستخرج غالباً من بعض النباتات  
التابعة لتثايبات الفلقة. راجع قلويد.

1٤٩٢٤ - شَبَهَان (F). Laiton (F). Brass, Latten (E).  
هو النحاس الاصفر.

1٤٩٢٥ - شَبَهَان ، صَامُور (F). Pallurus (F).  
Pallure (F).  
جنس اشجار وبشبات شاكدة من فصيلة البقيعات.  
انواعها عديدة تملو من مرتين الى ١٥ م. افئاضها كثيفة  
مترابكة. اوراقها متعاقبة ، منعقة ، بيضية النصل.  
انزعاجها عثكولي التسجع ، ابطي الارزكاز. انزعاجها  
مترنقة اللد صفراء اللون. ثمارها قيمة الشكل. مرتفعة  
الاطراف المجنحة. يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية.  
اشهر انواعها الشبان الشالك.

1٤٩٢٦ - شَبَرَقِي\* (F). Amentiforme (F).  
Amentiform (E).  
ما كان شكله شكل الشبرقة.

1٤٩٢٣ - شَبَرَم (F). Euphorbe pityuse (F).  
هو الشرب من النباتات الجحالية المؤذية ، اطلبه.

1٤٩٢٤ - شَبَرَقَة (F). Valgue hémiptère (F).  
حشرة مؤذية من الجمليات تدمى فلقوس ، اطلبه.

1٤٩٢٥ - شَبَرَقَة الطُور (F). Renouée des oiseaux (F).  
هو البطباط ، اطلبه.

1٤٩٢٦ - شَبَرَقَات (F). Persicaire indigotier (F).  
هو البطباط النيل ، اطلبه.

1٤٩٢٧ - شَبَرَق\* (F). Polydesmus (S).  
Polydesmus (F). Polydesmus (E).  
جنس دويبات من فصيلة الشبريات. انواعه المعروفة  
تحت اجسامها مبطلة مستطيلة مركبة من ٢٠ حلقة  
مضمورة الفواصل. طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم.  
تألف الخدائق والمباقل. تعيش تحت البعل مكررة كالحام.  
قوتها المواد النباتية. تسرح في الليل تقضم الجزر وسائر  
البقول الرطبة.

1٤٩٢٨ - شَبَرَقَات\* (F). Polydesmidae (S).  
Polydesmidae (F). Polydesmidae (E).  
فصيلة دويبات من السعدانيات الشفويات الارجل ،  
اجسامها وانواعها عديدة اشهرها الشبتر.

1٤٩٢٩ - شَبَق (F). Nymphomanie (F).  
Nymphomanie (E).  
هو الانفصام والقلّة يمدد الى هيجان الشفر واستمرار حالة  
الودقان في الانثى.

1٤٩٣٠ - شَبَقَة ، شَبُوق (F). Turgescence (F).  
انتفاخ وتور في الاربعة يصلها ويؤديها حبساً.

1٤٩٣١ - شَبَكَة (F). Filet (F). String (E).  
هي المغزقة تصاد بها الاسماك.

1٤٩٣٢ - شَبَكَة رِي (F). Canalisation, Réseau de canaux (F).  
مجسمة الاقنية في ثخين الري في مزرعة او منطقة او بلاد.

1٤٩٣٣ - شَبَكِيَّات الأجنحة (F). Raphidioptères (F). Raphidioptera (E).  
رتبة حشرات نافذة من طبقة عصيات الجناح. تشمل  
فصيلة واحدة وبعض الاجناس والالوان. اجسامها  
متوسطة القد ، روتوها نافذة ، بمخاتها مستطيلة. وهي  
من الحشرات الاربعة للاحة في دورها الري والحرثي.

1٤٩٣٤ - شَبَكِيَّة (F). Rétine (F). Retina (E).  
احدى طبقات العين الداخلية تأتي بعد القرنية والقرنية.  
تتكون من وحدات مصيبة تبدو كالغشاء الرقيق يغلف  
سطح العين الباطني. مركزها وراء العنسة وهي تستقبل  
الاشعة الضوئية فتنتقل عليها المرئيات التي تنقلها شبكة  
الاعصاب الى المنطقة البصرية بالمخ.

1٤٩٣٥ - شَبِل (F). Lionceau adulte (F).  
Adult young lion (E).  
ولد الاسد اذا ادرك الصيد ج اشبال وشبال.



شَبَرَم



شَبَرَق



شَبَن

## ١٤٩٢٦ - شبهان شائك\*، صامور شائك

*Paliurus aculeatus*, *P. spina-Christi* (S). *Paliure épineux*, *Epine du Christ*, *Argolou*, *Porte-chapeau* (F). *Garland thorn*, *Christ's thorn*, *Jerusalem thorn* (E). *Südlischer Stechdorn*, *Christdorn* (D). *Pallurus*, *Spina di Christo*, *Porto capello* (I).

نوع من الشبان الكثير الشوك المركب المستطيل الاعف. جنبته تملو نحو ٣ امار. يستعمل في السياجات. سياجه لا يقم. يعيش في جميع الارضية الزراعية ولا يخشى الرطوبة.

Adulte (F). Adult (E).

شبيوب

هو من البقر والغنم والماعز ما تم نمو واكتسبت اسنانه. ويقال له شيب.

Chellifer (S).

شبيوة

*Chellifère*, *Scorpion des livres* (F). *Chellifer* (E). جنس حشرات نافعة من العنارب الكاذبة تعيش في البيوت وفي شقوق الاخشاب اليابسة قوتها الحشرات الصغيرة انحصا التي تقرض الاوراق واليابس.

## ١٤٩٢٩ - شبيوة سرطانة\*

*Chellifer cancrioides* (S).

*Chellifère cancrioide*, *Scorpion des livres* (F). *Book scorpion* (E). *Bücherskorpion* (D).

نوع من الشبيوة، دوية من فصيلة الكرنبيات ودية القربيات الكاذبة. موطنها جميع اسقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الخنطية. صدرها مزلاني. مقبها مستطيلان يثنيان علىقطين كلاتط المقارب. بطنها عادم الذنب. عيناها مركبتان صغيرتان. جرابها دقيقة مستطيلة || تألف المواقع المظلمة والبيوت الاطلة والحلربة. تعيش بين الاخشاب وفي شقوقها. قوتها الحشرات الصغيرة انحصا التي تقرض الثياب والورق || تعتبر من الدويبات النافعة للامموية.

## ١٤٩٣٠ - شبيوط\*، سابوت، سابوط، سبوط

*Cyprinus carpio* (S). *Carpe* (F). *Carp* (E).

جنس اسماك مأكولة من فصيلة الشبوطيات. انواعه عديدة معظمها من اسماك المياه العذبة. جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. تتميز بفستانها وسطها، وفة ذنبها وقصر رأسها ولين زانفها ورسات فكها الاعلى. قوتها الاخشاب المائية. تعيش وتتكاثر في الاسماك البقية الغور.

## ١٤٩٣١ - شبوطيات

*Cyprinidae* (S).

*Cyprinidés* (F). *Cyprinidae* (E).

فصيلة الشيايط من رتبة مفتوحات المشانة. تشل عدة اجناس اشهرها الشبوط والبيس والمطوقة.

## ١٤٩٣٢ - شبليات، شواقيات

*Nyctaginaceae* (S).

*Nyctaginacées* (F). *Nyctaginaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها عديدة اشهرها شب الليل والبونفيلية والابروية.

*Scorpionnet* (F).

Young scorpion (E).

شبيدع

صغير الشبوع والقرب.

Jabiru

شبيور

هو الكثير، امله.

## ١٤٩٣٥ - شبيصة\*، وتيلاء الابنية

*Segestria* (S). *Ségestrie*, *Araignée des caves* (F). *Cellar spider* (E). *Kellerspinne* (D).

دوية من العناكب الساعية القاصة ثنائية الراويا سداسية المشانق من فصيلة الشياحيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم. عند الذكر ونحو ٢٨ مم. عند الانثى. صدرها مستطيل الشكل، اسمر اللون، بنسجي المواج. عيناها زنجيتان. شيفها غليظان شليمان. فكهاا غليظان. جرابها شطية، كثيفة الحلب. بطنها بيضي الشكل، اسود اللون، بنسجي المواج || تألف الكهوف والغارور والاقبية والحانج والمساكن الارضية. مسرحها دجوي. غدها عكدة قرابية الشكل تسجها في الشقوق. قوتها الحشرات تسمى اليها ببرصة مدعته || لسبها ملحة مؤذية تسبب حى خفيفة تستمر نحو ثلاثة ايام.

*Xanthium* (S).

شبيط

*Xanthium*, *Lampourde* (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة المراكيات انواعه || اوراقها متعاقبة، منعقة، مغرسة التصل المتجمع السفحة. ازهارها عتوكية التجميع، محورية الارتيكاز. منافها الطيبة عديدة تدخل في عدة مستحضرات وتراكيب اشهر انواعه الحثي والسلي.

## ١٤٩٣٧ - شبيط حثي، كور العبيد

*Xanthium abyssinicum* (S). *Xanthium abyssin*, *Lampourde d'Abyssinie* (F). *Burdock*, *Cockle-bur* (E). *Spitzklette* (D). *Lappola* (I).

نوع من الشبيط. مهد بلاد الحبشة. منافها الطيبة عديدة انحصا الامراض الجلدية.

## ١٤٩٣٨ - شبيط سلمي\*

*Xanthium strumarium* (S). *Lampourde des écrouelles*, *Petite bardane* (F). *Lesser burdock*, *Burweed* (E). *Echte Spitzklette* (D). *Lappa*, *Lappolone*, *Xantio*, *Bardana* (I).

نوع من الشبيط الملبلول مهد البلاد المعتدلة الحارة يكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة. يستعمل في معالجة داء الخنازير.

*Tuyau de pipe* (F).

شبيق، صنبور

هو قصبة الفلون من اي مادة كانت.

*Amaryllis*

شبيك

هو الاماريلس، اطلبه.

*Nassa* (S).

شبيكة\*

*Nasse* (F). *Nassa* (E).

جنس حيوانات بحرية من الزحويات مديات الارجل وفصيلة الشبيكات. انواعها الناصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها شطية تعيش على الشحاف والرمال المنصورة بالمال. اصدانها شبيبة بالسلال الشبيكة المستعلة للصيد، جميعها غلظة الاغقاب الذرية، متباينة المظهر الخارجي، منها المائلة والمقرزة واخذة والمقرزة || اجسامها كبيرة. رؤوسها بسيطة، مستعرضة، ثنائية القوائم المستعلة المعيرة القواعد. اعطاشها انبوبية مستعلة. ارجلها فارقة ثنائية الاذينات الصغيرة الطرفية الارتيكاز.



شبهان شائك



شبيوة سرطانة



شبيوط



شبيكة



شبيط سلمي



شبيكة

Calypso ١٩٥٢ - شجاعة ٥ ، كليبتوسبوره ٥  
جنس فلور مجهرية من فصيلة الشجائيات . أنواعه قليلة  
تتميز بدعاماتها الخيطية اللون ، المستطيلة الورنية ، الشفافة  
الانقسام ، الثنائية أو الرباعية الاضية || أما دعاماتها  
فتنمو وتتكاثر على الخلايا الادمية اغصانها خلايا الاوراق  
والتواقي .

١٩٥٣ - شجاعة السقام ٥  
Calypso goppertiana, Acidium columnare  
(S). Rouille de l'airielle (F).

فطر مجهرية يتطفل على القمام فينبط الاوراق ويؤذي  
التواقي . وهو من الفطور التي تقضي طورها الايدي  
على التزوب وتتطفل بطورها النحاسي على القمام || مظهره  
الخارجي اصفرار في الاوراق يعقبه استسالة في التواقي  
ثم جفاف في السماء وصلاية في الايام تؤدي الى اختلال  
الانزاع النشوي فتسقط الاوراق قبل زمن الاعبال وتبين  
التواقي قبل اكمال دورها الحولية || يكافح باستمال  
مركبات النحاس .

Plant (F). Slip (E). ١٩٥٤ - شجاعة  
هي كل نبتة جديدة مستقاة الجلود يمكن نقلها وغرسها  
في مستقرا . ج شتيل .

Hiémal, Nival (F). ١٩٥٥ - شتوي  
Hiémal, Nival (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو ويزهده في الشتاء .

Plantule (F). ١٩٥٦ - شجاعة ، نبتة  
Young slip (E).  
كل شتلة في زمن النشوء الاول قبل ان يجوز اقتلاعها .

١٩٥٧ - شت  
الشجاعة مثل التفلح الصغير . طيب الريح . مر الطعم .  
يذبح بوفرة وهو كورن الخلاف . وله رمة مودة وسنة  
صغيرة فيها ثلاث حبات او اربع سود مثل الشنيز يرصاه  
الحمام اذا انتثر . واحده شة (اللسان) .

Abeille ouvrière (F). ١٩٥٨ - شت  
Working bee (E).  
هي النحلة العاملة . ج شتات .

١٩٥٩ - شجاعة هي السداة ، اطباء .

Arboriculteur (F). ١٩٦٠ - شجاعة  
Arboriculturist (E).  
العلم المشتغل بالبحث عن اسوال الشجر (ابن البيطار) .

Dendrologie (F). ١٩٦١ - شجاعة  
Dendrology (E).  
علم يبيت في هوية الاشجار وتصنيفها وتنسيقها .

Echis carinata (S). ١٩٦٢ - شجاعة  
هو الوريد اقمي عظيمة ضخمة الرأس دقيقة المتق رقاشا  
كدرام . اذا غصبت وضاع خلفها انتفتحت . اصطناعها  
البلاد الحارة تكثر في اواسط افريقية وفي الصحراء البرية  
وفي اليمن .

l'Hydre femelle (F). ١٩٦٣ - شجاعة أنثى  
Hydra (E).

الشجاعة الاثى كوكبة نجوم جنوبية المفع مركها تحت  
الغراب والباطية والسداس ووق بروج السرطان والاسد

Nassidae (S). ١٩٦٢ - شجائيات ٥  
Nassidae (F). Nassidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل .  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات  
الاراضي التالوية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار  
العالم || جميعها واجبة تعيش على جيف الحيوانات البحرية ||  
اصطناعها شبيهة الاشكال ، يكثر فيها الشكل القلبي  
المستطيل الطرف الذرب . جميعها ملونة ، بعضها مائل  
الصعقة والبعض الآخر مسطح او محز أو مخدّد ||  
اعرف اجناسها واشهرها الشبيكة .

Hiver (F). Winter (E). ١٩٦٣ - شجاعة  
احد اصول السنة الاربعة يبدأ عندما تكون الشمس في  
ذروة بعدها من الست وهو يوم ٢١ كانون الاول في  
نصف الكرة الشمالي ويمتد الى ٢١ آذار || وهو يتبع:  
١- بقلة مقبولة الاستثناء باستثناء مناطق حوض البحر  
المتوسط . ٢- بشدة القار لا ساء عند الانتماء عن خط  
الاستواء وعند الانخفاض عن سطح البحر . ٣- بكثرة الثلج  
واستباب الجليد في المناطق الشالية . ٤- بسكون الطبيعة  
واعمال الانجار النخيفية وبيات الحيوانات والحشرات  
المستكنة وهجرة الطيور القواطع الخ .

Hibernal ١٩٦٤ - شتالي  
نمت تعريفي يطلق على ما هو مختص بقصل الشتاء .

Défectuosité, Malformation (F). ١٩٦٥ - شتور  
Defect, Malformation (E).  
يقال ثمار لا شتر فيها اي لا عيب فيها .

Entropion (F). ١٩٦٦ - شتور داخلي  
Entropium (E).  
عارض قوامه تغيير حالة الشئ وانقلابه من الخارج الى  
الداخل .

Ceterach (S). Cétérac (F). ١٩٦٧ - شتور  
جنس نباتات سرخسية من فصيلة السباجيات . أنواعه  
عديدة يكثر ويؤدها في المراتق الرملية بين الصخور وعلىها .  
اشهر انواعه الشتور الخنزيري .

١٩٦٨ - شتور خنزيري ، حشيشة الذهب  
Ceterach officinarum (S). Cétérac officinal, Dau-  
rade (F). Scale fern, Scaly spleenwort, Rusty-back  
(E). Echter Volfarn (D). Ceterach, Cetracca, Erba do-  
rata (I).  
نوع من الشتور يعيش على الصخور والجدران . يستخرج  
منه صباغ ذهبي اللون . يقال ان النبات يكامله يقيه  
السعال ويحلي الصدر .

Palmure (F). ١٩٦٩ - شتور  
الشترة والشترة والحطاب واحد . راجع حطاب .

Espace entre 2 doigts (F). ١٩٧٠ - شتور  
التفرجة بين الاصابعين .

Carence (F). Deficiency (E). ١٩٧١ - شتور  
الشتور هو افتقار الجسم النباتي الى عنصر من عناصر الغذاء  
الرئيسية او الثانوية .



شتور مخزني



شتة القمام

والغداة || عدد نجومها ٦٠ والعرب تسمي النير الذي على آخر المتق والفرد و لانفراده عن اشباهه . ولها نير آخر من المرتبة الثانية يدعى « قلب الشجاع » .

١٤٩٦٤ - شجّاع ذكر (F). l'Hydre mâle (F). Hydus (E).

الشجاع الذكر كوكبة نجوم اقرب الى الجنوب من الشجاع الاثني . مركزها بين الطوّان والشبكة والحرياء والثن || عدد نجومها ٢٩ جميعها من المرتبة الرابعة ودونها .

١٤٩٦٥ - شجرة (F). Arbre (F), Tree (E).

تجمع على الشجر والاشجار والشجرات . والشجر من النبات ما قام على ساق وما سما بنفسه دق او جل . يتميز بجذوره المنتدة في باطن التربة تعلوها جذوع غشبية التركيب تستقر عليها الاغصان والافانيد التركيبية || يقال في تصغيرها شجرة وشيرة . اما الشجر فثبت الشجر . والشجرة ارض تثبت الشجر الكثير . وهذا المكان اشجر من هذا اي اكثر شجرا ويقال واد شجير ولا يقال اشجر .

١٤٩٦٦ - شجرة إبراهم (F). Gattilier commun (F).

في الارث جنبه طيبة ممرّة .

١٤٩٦٧ - شجرة الأنداء (F). Mammée (F).

في الجباس ، اطلها .

١٤٩٦٨ - شجرة الأشق (F). Dorème (F).

في الدورم ، اطلها .

١٤٩٦٩ - شجرة البخت (F). Clérodendre (F).

في البختية ، اطلها .

١٤٩٧٠ - شجرة البركاز (F). Sterculier (F).

في البرازية ، اطلها .

١٤٩٧١ - شجرة البق (F). Orme (F).

في البرقيما ، اطلها .

١٤٩٧٢ - شجرة البهاء (F). Calodendron (F).

في الكالودندرون ، اطلها .

١٤٩٧٣ - شجرة التوكيب\* ، شجرة الزلتيق (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

شجرة مردنية الشكل من فصيلة اللوتيات . مهدا امريكة الشمالية . تمل من ٢٠ الى ٣٥ م . اولها متعكة كبيرة النصل الرباعي او السداسي التفرع . ازهارها عريفة الرائحة كبيرة القذ ثلثه التوليب ، لوها الى الصغار الاخضر غشيا نام الزمّة ، خفيف الوزن ، تبي اللون ، مرغوب فيه || ازهارها ينسمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

١٤٩٧٤ - شجرة التيس (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الهيدفاريقون المنن ، اطلها .

١٤٩٧٥ - شجرة التلج (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في زمرّة الديك ، اطلها .

١٤٩٧٦ - شجرة الجرد (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الروبيلية السلية ، اطلها .

١٤٩٧٧ - شجرة الجرج (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في المسيس ، اطلها .

١٤٩٧٨ - شجرة الجيال (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في غافور الجبال ، اطلها .

١٤٩٧٩ - شجرة الجين\* (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في اروز حلايا ، اطلها .

١٤٩٨٠ - شجرة الحرير (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الصقلاب السوري ، اطلها .

١٤٩٨١ - شجرة الحليث (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الانجندان ، اطلها .

١٤٩٨٢ - شجرة الحشاش\* (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

Oxydendron arboreum, Andromeda arborea (S), Oxydendron en arbre, Arbre à l'oselle (F), Sorrel tree, Sour-wood (E), Sauerampferbaum (D), Albero ossalide (I).

شجرة حرجية وزينية من فصيلة الحليثيات . مهدا امريكة الشمالية . تمل من ١٥ الى ٢٠ م . اولها حامضة الطعم ، عابطة ، متعكة ، نصلها ايليبي الشكل ، مسن الحافة ، جبل الخضار اللامع . ازهارها عذقي التجميع ، تاجي الاركاناز . ازهارها جلجلية ، مستطيلة ، تحلية البشرة ، يبيض اللون || ثمرها واروفا غشائية ، صياغها اسود .

١٤٩٨٣ - شجرة الحمص (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في المرشان الكبير ، اطلها .

١٤٩٨٤ - شجرة الحنيكة (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في التويا الشرقية ، اطلها .

١٤٩٨٥ - شجرة الخبز (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الجاكا ، اطلها .

١٤٩٨٦ - شجرة الدكن\* في التيق المسهل ، اطلها .

١٤٩٨٧ - شجرة الرهبان (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في البختية ، اطلها .

١٤٩٨٨ - شجرة الزبدة (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في ياسية السمن ، اطلها .

١٤٩٨٩ - شجرة الزلتيق (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في شجرة التوليب ، اطلها .

١٤٩٩٠ - شجرة الساعو (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في السافقية ، اطلها .

١٤٩٩١ - شجرة السباء (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الايلنطس ، اطلها .

١٤٩٩٢ - شجرة السمين\* في غيراء الحاملين ، اطلها .

١٤٩٩٣ - شجرة السيوك (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الاراك ، اطلها .

١٤٩٩٤ - شجرة السوس (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في السوس ، اطلها .

١٤٩٩٥ - شجرة الشحم\* (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

Stilllingia sebifera, Sapium sebiferum (S), Stilllingie, Arbre à suif (F), Chinese tallow tree, Vegetable tallow (E), Chinesischer Talgbaum (D), Albero del sego, Sevo vegetale (I).

شجرة صناعية من فصيلة التريبات تكثر زراعتها في بعض المناطق الشرقية والامريكية . يستخرج منها شحم نباتي مأكول يحفظ بعض الوقت لانه لا يتأكسد بسرعة .

١٤٩٩٦ - شجرة الشمع (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الشمعية ، اطلها .

١٤٩٩٧ - شجرة الصابون (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في الرتبة ، اطلها .

١٤٩٩٨ - شجرة الصنغ الاناثو (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في البكسا ، اطلها .

١٤٩٩٩ - شجرة العرب (F). Liriodendron tulipifera (S), Tulipier (F), Tulp tree, Lyre tree, Saddle tree (E), Echter tulpenbaum (D), Liriodendron, Tulpifero (I).

في التيق الحقل ، اطلها .



شجرة التوليب



شجرة الحامض



شجرة الشم

١٥٠١٩ - شجيرة القتال في قرارة النيران ، اطلبا . Arbuste (F). Bush, Shrub (E). شجيرة

هي من النبات كل شجرة صغيرة القد تملو الجنبه ولا تترك الشجرة .

١٥٠٢٠ - شحاج ، شحيج Brailment (F). صوت البغل والحمار . Bray of an ass (E).

١٥٠٢١ - شحاج حار الوحش اطلبه . Onagre (F).

١٥٠٢٢ - شحاج هو البروش اطلبه . Etiage (F).

١٥٠٢٣ - شحاريات ، شحريات فصيلة نباتية تعرف بالطحليات ، اطلبا .

١٥٠٢٤ - شحب ، فتاح Déchaumage (F). Digging up the stubble (E).

هي الحراثة السطحية التي تنقب الحصاد الغاية منها هوية التربة واقتلاع الجدام وطمره .

١٥٠٢٥ - شحر

الشحر والشمرة : الشط الصفيق ويجري الماء في بطن الوادي .

١٥٠٢٦ - شحورور Turdus (S). Merle (F). Black bird (E).

جنس طير من القواطع وفضيلة الشحورور هي أنواعه عديدة تتميز بأصواتها الرخسة التفرید ، بعضها المستندرة وبأصواتها البتقة المستطيلة التي تحكما من الانتقال على الأرض بسهولة كلية || قوتها الحشرات والتديان والبار . تألف الحقائق والسيجايات والادغال وأحراج الصنوبر والسنديان . تدثر في الاشجار . اناتها تفيض من ٤ الى ٦ يضايت تحضنها بتناوبة الذكور نحو اسويين . لشهر انواعه ما يلي .

١٥٠٢٧ - شحورور أسود \* Turdus merula (S). Merle noir, M. vulgaire (F). Common black bird (E). Amsel, Schwarzdrossel (D).

نوع من الشحورور وهو طائر غريد له شتاه وصفيه دون ان يكون من القواطع التي تجوب البلاد . طوله نحو ٢٦ سم . ذكره أسود الثوب ، جزوي المنقار وسواجب العين . أثناء فحمة الظهر ، غرام العين الموش بالاسود والاصهب . منقارها اسمر || قوته الحشرات والتديان والحزون والبار . يألف الحقائق والنايات . يثن عشه في الادغال القليلة الارتفاع .

١٥٠٢٨ - شحورور مدَّهَب Turdus aureus (S). Merle doré (F). Gilded black bird (E).

نوع من الشحورور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه الى الصفار الذهبي تملو رشفه سوداء || يألف الاحراج والنايات الكثيفة . يثن عشه في سم الاشجار .

١٥٠٢٩ - شحورور مطوق

Turdus torquatus (S). Merle à plastron (F). Ring-ousel (E).

نوع من الشحورور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه الى الزبدية الفحمة المواج . زوده ابيض اللون || يألف الحقائق وأحراج الصنوبر والسنديان . يثن عشه في الاشجار الفناء القليلة الارتفاع .

١٥٠٠٠ - شجيرة القتال في قرارة النيران ، اطلبا .

١٥٠٠١ - شجيرة القليل الكاذب في الشكينس ، اطلبه .

١٥٠٠٢ - شجيرة القلس في اسرافالوس نوراس ، اطلبه .

١٥٠٠٣ - شجيرة الكبد ، بلدس

Boldoa fragrans, Peumus boldus (S). Boldo, Boldu (F). Boldo, Wood tree (E). Chilenischer Boldobaum (D). Boldo (I).

شجرة من فصيلة الشيات مهددا بلاد الشيل . اوراتها عروية ، عطرية العرف ، طيبة ، تستعمل في علاجات الكبد ويستخرج منها مادة فعالة تدعى بولدين (Boldine) تستعمل كخفة ومقوية وعاضة . ثمارها سكرية الطعم مأكولة وهي كالزعرور قدأ وشكلا .

١٥٠٠٤ - شجيرة الكلب في الأليم الذهبي ، اطلبه .

١٥٠٠٥ - شجيرة اللبن

Brosimum galactodendron (S). Brosime, Galactodendron utile, Arbre à lait, Piratinère (F). Cow tree, Milk tree (E). Milchbaum, Kuhbaum (D). Palo di vacca, Albero del latte (I).

شجرة من فصيلة القراصات . مهددا امريكة الاستوائية . ينبتا الاماكن القاحلة . تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراتها ممتعة صمائية ، كبيرة التصل . انزعارها ثنائية المسكن ، قديمة التجميع ، ثمارها جزام جلدية القشور ، مأكولة البزور . يستخرج من ساقها باخر عصارة لبنية تشبه الكتانة شكلا وزكيا ، تؤكل ملاطجة ويصنع منها شيء كالجين .

١٥٠٠٦ - شجيرة الله في الايلنلس ، اطلبه .

١٥٠٠٧ - شجيرة المسافر في الرنولا ، اطلبا .

١٥٠٠٨ - شجيرة المطاط في الهيفية ، اطلبا .

١٥٠٠٩ - شجيرة المعيد في الجينكو ، اطلبه .

١٥٠١٠ - شجيرة المقل في الدوم ، اطلبه .

١٥٠١١ - شجيرة المتبعة Liquidambar by styrax (F). في النبر الساع الامريكي ، اطلبه .

١٥٠١٢ - شجيرة النبق في السدر ، اطلبه .

١٥٠١٣ - شجيرة الوالك في ابرتيلون ، اطلبه .

١٥٠١٤ - شجيرة غيب القرد في البوباب .

١٥٠١٥ - شجيرة لسان العصفور في المران ، اطلبه .

١٥٠١٦ - شجيرة هوة في الازردست ، اطلبه .

١٥٠١٧ - شجيرة مريم في قوقمان نباتا ، اطلبه .

١٥٠١٨ - شجينة Ramification (F). يجعل عروق الشجر من اغصان واقناد واقنان وخرايب .



شحورور اسود

أوراقه تطول نحو ٥ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها جيل الحفار اللامع. ثماره صغيرة القد سواء الرن || ازفراره يستمر من نيسان إلى أيار.

### ١٥٠٣٧ - شُحُص عَرِيضَ الرِّوْق

*Phillyrea latifolia* (S). *Filaria à larges feuilles*, *Phillyrée à larges feuilles* (F).

نوع من الشصص شجيرة تملو من ٦ إلى ٨ أمتار. أوراقه قليلة الشكل نصلها مستعرض القاعدة، سنن الحافة، شائكة. ثماره عنية الشكل والقد، مقبولة القبة، غدة الطرف. لونها إلى السرة السوداء || ازفراره يستمر طوال شهر أيار.



شحورة

### ١٥٠٣٨ - شُحُص مُتَوَسِّطَ الرِّوْق

*Phillyrea media* (S). *Filaria intermédiaire*, *Phillyrée intermédiaire* (F).

نوع من الشصص شجيرة تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. أوراقه اهلجية الشكل نصلها سنن الحافة عريضة نحو ٢ سم. ثماره عنية الشكل والقد، جزوية الرن || ازفراره يستمر من نيسان إلى أيار.

### ١٥٠٣٩ - شُحُص مَزِيَّان

*Phillyrea decora* (S). *Filaria décoratif*, *Phillyrée décorative* (F).

نوع من الشصص شجيرة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقه تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٥ سم. نصلها جلدي التسج الباهت الحفار. ثماره ييفية الشكل. لونها إلى البنفسجي المائى || ازفراره يستمر طوال شهر أيار.



شصص

### ١٥٠٤٠ - شُحُط

*Fiente* (F). *Dung* (E).

الشحط : ذرق المائر.

### ١٥٠٤١ - شِطَّازَة

*Cyclopterus* (S). *Cycloptère* (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشطازيات ثلاثيات الزعانف. انواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها متوسطة الحجم، كردية الشكل، تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. سوكها بحجمية وشئلة. رؤوسها مستديرة، قصيرة الاعظام، رفيعة العين، صغيرة الاشدان || الؤاسا تختلف مع الانواع، تكثر فيها الربعة السراء. زعانفها عديدة التسع. تحمل في مقدمها بحجمية طباية مستديرة مؤلفة من الزعنفتين الحوضيتين المتصقتين، تمكئها من التمسك بالأسل الصخور حيث تكمن راصدة قدم فرائسها || اعرف انواعه واشهرها الشطازة المبدولة.

### ١٥٠٤٢ - شِطَّازَة مَبْدُولَة

*Cyclopterus communis*, *C. lumpus* (S). *Cycloptère commun*, *Lump*, *Lompe*, *Lître de mer* (F). *Lump-fish*, *Sea-owl*, *Cock-padd*, *Haff-padd* (E).

نوع من الشطاز. سمكة بحرية بيوض. اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والحيط الاطلسي || جسمها يفيهي الشكل، معتدل البطيظ، يطول نحو ٥٠ سم. ويملوه من الرأس إلى الذنب سبعة صفوف من التبل المتباينة الاحجام. نوبها إلى الربعة يملوه تسنج ازرق يسر في الظهور ويفير في الجانبين ويصفر في البطن || رأسها معتدل الحجم، مستعرض الشكل، قصير الحظ، صغير الشف



شطازة مبدولة

### ١٥٠٣٠ - شُحُورِيَّات

*Turdidae* (S). *Turdidés* (F). *Turdidae* (E).

فصيلة طيور من الجولم المشروبات المنافع منها الشحور والسنة.

### ١٥٠٣١ - شُحُورِيَّات في السحليات، اطليا.

### ١٥٠٣٢ - شُحُورَة

*Mantispa* (S). *Mantispa* (F). *Mantispa* (E).

جنس حشرات مقترنة من فصيلة الشحوريات وربة شارات الاجنحة. انوعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها صغير نحيل مستطيل يفيه بشكله شكل السرعفة. رأسها صغير. عضلها مخروطي. عينها بارزتان. زبانا دقيقان. كولها شبه انبوي. مستطيل. اجنتها اربعة. جميعها شفافة كثيرة العروق والاعصاب. جرائزها ثلاثة ازواج منها زوج امامي غصص للقبض أو القنص وهو كبير القد، ضلع القنوب المشاري الحافة الداخلية، مكن الرسع المسن المختار والذي ينطبق على مشار القنوب انطباق الملقط || الاثني اكبر قدماً من الذكر. والربة مقترنة كالشرة الجملة. يقال ان الاثني تمنع المكن في عكادب التاكب واخصها الخندرق.

اعرف انوعها واهرها :

### الشحورة الوثنية

*Mantispa pagana* (S).

*Mantispa palenae* (F).

التي يكثر ويروها في معظم مناطق الوسط الباني.

### ١٥٠٣٣ - شُحُورِيَّات

*Mantispidae* (S). *Mantispidés* (F). *Mantispidae* (E).

فصيلة حشرات من صيبات الاجنحة وربة شارات الاجنحة. اجناسها وانوعها عديدة اعطانها بعض اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || تنيز باجسامها النحيلة المستطيلة وبجرائزها الامامية الكبيرة المجهزة للقنص. اجنتها شفافة كثيرة العروق. الؤها تختلف مع الاجناس والانواع || اناها اكبر قدماً من ذكورها. بعض انواعها يهريز نحو ٨٠٠٠ مكنة. مكنها اهلجي الشكل مذنب || اشهر اجناسها الشحورة

### ١٥٠٣٤ - شُحُص، شُحُص

والشامة والشصاء والشصمة : شاة ذهب لبها كله. وقيل السينة. وقيل التي لاجل بها. وقيل التي لم ينز عليها قط. ج. اشماس واشص وشاماس.

### ١٥٠٣٥ - شُحُص

*Phillyrea* (S).

*Filaria*, *Alavert*, *Aouret*, *Phillyrée* (F). *Mock privet* (E). *Feinblizige Lorbeerlinde* (D). *Filaria* (I).

جنس شجيرات برية ورتينية من فصيلة الرتينويات. قريبة الشبه بالهم اوراقها ابيدة. صغيرة النصل، متقابلة. ازهارها صغيرة، محورية او راقها ابيدة. ثنائية المسكن، رباعية النصل والبتلات، ثنائية السداة. ثمارها عنية عجمية لونها إلى البنفسجي الاسود || اعطانها شديدة الصلابة تستعمل في بعض الصناعات || اشهر انواعه ما يلي.

### ١٥٠٣٦ - شُحُص شِيْبَ الرِّوْق

*Phillyrea angustifolia* (S). *Filaria à feuilles étroites*, *Phillyrée à feuilles étroites* (F).

نوع من الشصص شجيرة تملو من مترين إلى اربعة أمتار





طولاً نحو ٤ سم. تتميز بجسمها الخروطي الشكل، زعنفتها الشريعية الفارقة وبسيفها الرقيق الكبير .



شُحَاة

١٥٠٧٦ - شُحَابِيَّات  
الشخير من أصول الخيل . قال الاصمعي : الشخير من الهم والنخير من المنخريين والكرير من الصدر .

١٥٠٧٧ - شُحَابِيَّات  
صفة الشيء المتشبه المادم الانجم .

١٥٠٧٨ - شُحَابِيَّات  
Diathermane (F).  
Diathermic, Diathermanous (E).

نعت ترميضي يطلق على كل مادة تنفذ الحرارة دون أن تستمر منها .

١٥٠٧٩ - شُحَاة ، قَرْنٌ ، وَبَطْ  
Atteiler (F).  
To put horses etc... (E).

ربط الدواب بالخرور .

١٥٠٨٠ - شُحَاة الأَزْهَار \*

Salticus floricola, Salticus floricola (S).  
Saltique floricole (F). Salticus floricola (E).  
دويبة من العناكب الساعية القاذفة ثنائية الرواية سداسية المشانين من فصيلة الشداحيات || جسمها صغير القد يطول من ٥ إلى ٨ سم. الاثنى أكبر قدماً من الذكر . صدراها أسود اللون، أحر الحلب الكثيف . عيناها زُمَيْتَان . شيفها صغيران مَحْدِيَان . فكها صولجانيان . جزامها مستقلة . بطنها بيضي الشكل، اسمر اللون ، أبيض الزناويف والأزويق || تألف المشانين ويجاري الماء حيث تكثر الأزهار . تسرح في النهار تسمى وراء قصتها وكفها وقفراً . قوتها الحشرات الأغصاني التي تنسب إلى ذوات الجنائين تترصص لها قرب الأزهار || مكذبها بيض في التربة تحفره تحت الحجارة || تعتبر من العناكب المفيدة .

١٥٠٨١ - شُحَاة تَمَلِيَّة

Salticus formicarius (S). Saltique fourmi, Myrmarachne fourmi (F).

دويبة من العناكب الساعية القاذفة من فصيلة الشداحيات . جسمها مستدلل القد يطول من ١٢ إلى ١٨ سم. الذكر أصغر قدماً من الاثنى . صدراها أسود اللون وباهي النقط الأبيض . عيناها زُمَيْتَان . شيفها ضليان . فكها مقوسان . جزامها كبيرة كثيرة الحلب . بطنها جزوي اللون يطلو تجلجج أبيض مقترض || تألف المروج والمراعي . تسرح في النهار . سبها قريب الشيء بسعي التلعة مما دعى إلى وصفها به || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحمام . مكذبها بيض في التربة تحفره تحت الحجارة || ملجئها الحثائي كلين سائر العناكب . بيائها الشوي لا يتجاوز ١٨ أسبوعاً || تعتبر من العناكب النافعة .

١٥٠٨٢ - شُحَاة أَحْيَات \*  
Salticidae (S).  
Salticidés (S). Salticidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الزيرليات . اجناسها وأزواجها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم انظار العالم اغصانها انظار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مفترسة صغيرة القد زاهية الالوان البراقة تسرح في النهار وتحت اشعة الشمس . تسمى وراء قصتها وكفها وقفراً || أشهر أنواعها الشداحة .



شُحُورَة



شُحَاة الأَزْهَار

١٥٠٦٤ - شُحَاب هو الحليب ، اطليه .

١٥٠٦٥ - شُحَابِيَّات \*  
Chrysididae (S).  
Chrysididae (F). Chrysididae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، متوسطة الحجم او صغيرة . اقواسها زاهية الالوان الالامدة الموج . رؤوسها صغيرة . جواشها غليظة . بطنها مركبة من أربع حلقات ورجلات ، حثارها مسنن الحافة . شوارها التناسلي ثلاثي الحلقات ، مدبب الاشارة || انثائها تنقل على غلايا النحل والزناير وقد تحتسكها في جوف الخوازيق فينقذ من يرقات قنقرس الدجبة وتلق الشهد .

١٥٠٦٦ - شُحَاة \* ، فلي شُحَاة

Tetracerus quadricornis (S).  
Tétracère, Antilope tchikara (F).  
حيوان لين يجتر من الغطاء وحيد الجنس والنوع ، موته الحث || يتميز بصغر جسمه وبقرنيه الاربعية ، اثنان صغيران يطولان العينين واثنان متوسطان يطولان الرأس .

١٥٠٦٧ - شُحَاة \*  
Diathermanité (F).  
Diathermancy (E).  
الشحالة خاصة انفاذ الحرارة المشعة .

١٥٠٦٨ - شُحُوت  
Fagot (F). Faggot (E).  
هو الجزال حطب دقيق .

١٥٠٦٩ - شُحَابِيَّات \*  
Scilbum (S).  
Scilbe (F).  
جنس حشرات من فصيلة الشداح . انواعه قليلة تشبه الزناير . طولها يراوح من ١٨ إلى ٢٨ سم. لونها الازرقه انقمر المالج . يكثر وجودها من ايار الى تموز .

١٥٠٧٠ - شُحَابِيَّات لاهب \*  
Chrysis ignita (S).  
Chrysis enflammé (F).

حشرة من الشداح صغيرة القد طولاً نحو ١٢ سم. رأسها ووجهاها الالوان الخضراء الزرقاء . بطنها ذهبي اللون يطلو موج اخضر . يكثر وجودها قرب مجاري الماء وفي جوار النحل والزناير .

١٥٠٧١ - شُحُور \*  
Etanponner (F).  
To stay, to shore (E).

سند الاغصان المثمرة لثلا تنكسر .

١٥٠٧٢ - شُحُور \*  
Pristipoma (S). Pristipome (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة القرغيات . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحار الحارة || له نوعان مرتمها المتوسط : التكروري والقرقور .

١٥٠٧٣ - شُحُش  
هي ثنات اليربع اي الحجارة الكلسية الرخوة (ابن القلقاع).

١٥٠٧٤ - شُحُور \*  
Filtrer (F). To filter (E).  
غزل الشراب : صفاء .

١٥٠٧٥ - شُحُور \*  
Caranx rhonchus (S).  
Caranx ronfé (F).  
نوع من الشج وي سمكة مأكولة توجد في المتوسط يبلغ

الخاتر الخارجي بالحمي او بالازرق || لحوبها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١٥٠٩٢ - شُدْفِيل مَرَقُوش \*  
Schedophilus punctatus (S).  
Schedophilus punctatus (E).

نوع من الشدليل . يمكن بحرية يروض . اعطائها بحار البلاد الحارة اغصنها البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه يضيء الشكل ، معتدل التعليل يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الطحلة الفضية تملوها رقة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية . ظهورها اعين خضاباً من جانبيها وبطنها . زعانفها الظهرية والشرجية غضة الخاتر الخارجي بالازرق || رأسها صغير الحجم ، خدروني الشكل ، قصير الخطم . فيها عمودي الصف المتدل الانفراج . فكها الاعلى يتقدم الاسفل بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان || مرسها مشاب التاف القرية الغور || لحنها متوسط الصنف ، مأكول .

١٥٠٩٣ - شُدْن  
شدن الثوب وجميع ولد ذوات الظلف والحنف : قوي وترعرع واستغنى عن امه .

١٥٠٩٤ - شُدْن  
Cervua (S).  
Cérwane, Cerruane (F). Cervua (E). Cerunblume (D). Cervua (I).  
جنس نباتات عشبية برية عفائية من فصيلة المركبات . انواعها قليلة العدد منتبها الجزيرة وبعض المناطق المصرية والافريقية . سوقها وفروعها منتصب متوترة ، نورها كاليامين .

١٥٠٩٥ - شُدَيْفَة \*  
Scaevola (S).  
Scévole (F). Scaevola (E).  
جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة اللبيليات . مهدا استرالية . سوقها منتصب صلبة تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متناحية متفكة . ازهارها يبيض اللون . كورسها وتوحيجاتها خماسية الفلق المشقوق من جهة واحدة فتدلو كأنها شدا || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٥٠٩٦ - شُدَيْفَة صَغِيرَة الْوَرَق \*  
Scaevola attenuata (S).  
Scévole à feuilles atténuées (F).  
نوع من الشديفة . ساقيها تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها سنائية تطول من ٥ الى ٨ سم . نصالحا مسننة الخاتر . ازهارها يبيض اللون تطول نحو ٢ سم . كورسها شارقة مستعرضة الفلق || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٥٠٩٧ - شُدَيْفَة عَظْرِيَّة \*  
Scaevola suaveolens (S). Scévole odorante (F).  
نوع من الشديفة . ساقيها تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها اهليجية الشكل تطول نحو ٨ سم . نصالحا سميكة الصنفعة ، متبادلة التسنين الخاتري . ازهارها يبيض اللون ، طولها نحو ٢ سم . قطرها نحو ٣ سم . عطرية العرف المستحب || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

١٥٠٩٣ - شُدَاد  
Tirant (F). Tie (E).

خشية او مرزبة يشدد بها البناء .

١٥٠٩٤ - شُدَيْفَات \*  
Membracidae (S).  
Membracids (F). Treehoppers (E).  
Buckelzirpen, Buckelzikaden (D).

فصيلة حشرات من فصليات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها مناطق البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، يكثر فيها الشكل الخروطي . رؤوسها وكواسلها مستعرضة . عيونها ناشرة . اجتمعتها جلوية الاستمرار ، لاحقة ، شفافة او صفراء اللون || اقوابها واجتمعتها تمتاز المواقع الموجودة فيها .

١٥٠٩٥ - شُدَان \*  
Raphicerus (S).  
Raphicère, Raphicère (F).  
جنس حيوانات عاشية بحرية من الطياء . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها القارة الافريقية اغصنها المناطق الجنوبية || اجسامها مستقيمة القدر ، هيا . اناتها جماء الرؤوس ، ثنائية الاخلاف . ذكورها جالسة القرون الصغيرة القصيرة . اقوابها الى الصبهة الخنطية تعمق مع اقوابها من الظهر وتفرع عند البطن . اعرف انواعها :

شُدَان الريف  
Raphicère champêtre (F).  
Steenbok (E).  
شُدَان اسود الاذن  
Raphicère à oreilles noires (F).  
Grysbok (E).

١٥٠٨٦ - شُدَخ \* ، جَدَايِيَّة الْمَاء  
Hydrotropisme (F). Hydrotropism (E).  
منسج يسير . الماء ويحدد مداه . الماء ينشط شماغ تجبه وازدياد حجم الخلايا فيسبب اسديداً في النسج التي تجبه وتقميراً في النسج الماكسة ينجم عنه اعوجاج شدي .

١٥٠٨٧ - شُدَخ  
هو القطفية ، اطلبا .

١٥٠٨٨ - شُدَخ هندي  
هو القطفية الخضراء ، اطلبا .

١٥٠٨٩ - شُدَفَة  
Segment (F). Segment (E).  
هي السكة ، اطلبا .

١٥٠٩٠ - شُدَتِي  
Entomozoaire (F).  
Entomozoon (E).

نعت ترميني يطلق على كل حيوان من ذوات الاجسام الشدنة .

١٥٠٩١ - شُدْفِيل \*  
Schedophilus (S).  
Schédophile (F). Schedophilus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الاسقمريات شاذكات الزعانف . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة وبعض مناطق المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، اهليجية الشكل ، تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . رؤوسها خدرونية ، قصيرة الاعظام ، معتدلة الاشدا . عيونها كبيرة ، مستديرة ، ناشرة || اقوابها الى الرتبة او الطحلة الفضية المواجه يملوها بقيق فحمي او رقة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية الفارقة . ظهورها اعين خضاباً من جوانبها وبطنها || زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة القد غضة



شَدَان



شدليل مرقوش

## ١٥٠٩٨ - شديم \* ، قرند المغرب

Pithecius inuus (S). Magot (F).

قرند وحيد الجلس والنوع من فصيلة الميموريات. موطنه بلاد المغرب. جسمه سموري الشكل يطول نحو ٧٠ سم. ويرتفع من ٤٠ إلى ٥٠. ثوبه الى السرة الصفراء الملوحة. رأسه وعصره الى السرة الداكنة. بطنه الى البياض الاغبر. ذنبه جملة || يمشي على الاغجار وبين الصخور. قوته الاعشاب والجذور والثمار.

## ١٥٠٩٩ - شذكة

Glossina (S).

Glossine (F). Glossina (E).

جنس حشرات من فصيلة الذباب تنقل الى الحيوان الذي تسلمه طائفة من الامراض الطفيلية المؤذية. انواعها عديدة ، موطنها المناطق الاستوائية وجوارها.

## ١٥١٠٠ - شذكة لاسعة \* ، زُمب ، ذُبابَة

Glossina morsitans (S).

Glossine mordante, Mouche tsé-tsé (F). Tsetse-flie (E).

احبت انواع الشاة واكثرها انتشاراً تلص الانسان وتسبب له مرض النوم وتلص الخيل والابل والبقر قبلها. موطنها مستنقعات افريقية الاستوائية والوسطى.

## ١٥١٠١ - شذكم

Dard (F). Sting (E).

حقنة المغرب والزيور والنحلة الخ.

## ١٥١٠٢ - شذكم \* ، صبريس (S). Picarel (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المتواليات ، انواعه عديدة اصطناعها بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اهليجية الشكل. اغصانها غروبية مستنقة الاطراف. فكوكها عادمة التستين. زعانفها الظهرية وحيدة مستطيلة. زعانفها الشرجية فارقة || اشهر انواعه الشذامة المبلولة ، اطليا.

## ١٥١٠٣ - شذامة مبدولة \* (S). Smaris vulgaris (S).

نوع من الشاذم وهي سمكة مبلولة في المتوسط. طولها اراوح من ٢٤ الى ٢٦ سم. ثوبها فني اللون حنطلي التجزيع والتوشيم يسمر ويحيط مع اقترابه من فيج الظهر. سرها يسير على شكل مروحة. لحمها خوص الصف.

## ١٥١٠٤ - شذرك

Paillettes d'or (F).

Grain of gold-dust (E).

الشذر: قطع من الذهب الطبيعي لا تزال على حالتها البدائية || والذرك: اللؤلؤ الصغير. الواحدة شذرة ج شذرات وشذور.

## ١٥١٠٥ - شذرك (F). Anomalie (F). Anomaly (E).

هو الايضاد من المسلك النظامي المألوف.

## ١٥١٠٦ - شذرك هو الابتاع ، اطلب.

## ١٥١٠٧ - شذرك (F). Sirop (F). Syrup (E).

كل صمير سكري العظم يستحب العرف.

## ١٥١٠٨ - شذركة الراعي \* (S). Nemopanthes (S).

Némopanthé (F). Mountain holly (E). Berghulst (D). Nemopanto (I).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة البهشيات. منها امريكة الشامية. انواعها قليلة جميعها جنبا وشجيرات تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها دقيقة مفصلة.

اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مستطيلة ، متصلها اهليجي الشكل مسن الحافة. ازهارها ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، طويلة الزناد ، رباعية او خماسية البتلات البيض. ثمارها عنينة الشكل حراء اللون ، قطرها نحو ٧ مم.

## ١٥١٠٩ - شذرك هو الملى السامة ، اطلب.

## ١٥١١٠ - شذركة (F). Spark (E). Etincelle (F).

ما يتطاير من النار. ج شرار وشرور.

## ١٥١١١ - شذركس Dextrine

هو الكسترين ، اطلب.

## ١٥١١٢ - شذركة Rhizographie, Rhizologie (F). Rhizology (E).

الشراسة علم يبحث في تركيب جلود النبات وفي تحليلها وظائفها.

## ١٥١١٣ - شذركسي Véliforme (F). Velliform (E).

تمت تعريفي يطلق ، في علم التاريخ الطبيعى ، على ما هو شكله كالشرع.

## ١٥١١٤ - شذركة ، شذركة Collectivité (F).

صفة ما هو مشترك. يطلق على الجماعات والفتات.

## ١٥١١٥ - شذرك

هوام كالبعوض تكثر قرب الماء ، تنثى وجه الانسان ولا تمض. الواحدة شذركة.

## ١٥١١٦ - شذركيف سلخ الحية اذا القته.

## ١٥١١٧ - شذركة Planche basse (F).

هي المسبكة المنخفضة التي يتم فيها بناء الجبر. ج شرب وشربات.

## ١٥١١٨ - شذركة Purge.

هي الدواء المسهل الذي يطلق البطن. اشهر الشربات البيطرية: سلفات الصوديوم وسلفات المغنيزيا وزيت الخروع.

## ١٥١١٩ - شذركيس \* Cirrhibarbis (S).

Cirrhibarbe (F).

جنس اسماك بحرية من شاذكات الزعانف وفضيلة القويونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعها بحار الجنوب الافريقي || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة الطول ، رؤوسها غروبية ، صغيرة ، اثنائها المليا والسفل بجهاز بلولاس دقيقة ، عيونها ناشرة. زعانفها الظهرية قاطبة. الصدرية والحوضية صغيرة. الشرجية مستطيلة. الذيلية شبه مستديرة. اثارها رديئة اللون نفسية الموانج || لحمها مأكولة ، متوسطة الصف.

## ١٥١٢٠ - شذركيل Kleinia (S). Kleinie (F).

جنس نباتات عشبية او خشوشية من فصيلة الحريكية انواعه عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم. اوراقها ملحية النصل ، سنانية الشكل ، متعاقبة. وريساته الزهرية عادمة اللينيات والكميات يطولها سف من القنابات. بلوره جهازه بقنابات قطبية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.



شديم



شذرة لاسعة



شذامة مبلولة



شذركة الراعي



شريس

## ١٥١٢١ - شربل الجزيرة

*Kleina pendula* (S). شربل قاروش  
*Kleina étalée* (F).

نوع من الشربل المعمر مهدد بخطر الانقراض في الجزيرة العربية. إلى المملكة الأردنية. ساقه خشبية عديمة الفروع. أوراقه اسطوانية النصل، بحرية اللون، طول نحو ٢ سم. رؤسها الزهرية فردية، كبيرة القد، أرجوانية اللون، يرتقاها الموالج || تنوره يستمر من أيلول إلى تشرين الأول.

*Kleina semperviva* (S). *Kleina sempervivum* (F).

نوع من الشربل المعمر أصطناعه الجزيرة العربية. ساقه خشبية سرسة منتصبة غليظة الجنت طول نحو ٣٠ سم. أوراقه قصيرة الاعتناق بارزة المروق طول نحو ٦ سم. وترس نحو ٣. رؤسها الزهرية كبيرة القد فردية. أو ثنائية التجميع، هامة الارتكاز حراء اللون || تنوره صبي يودم من أسبوع إلى أسبوعين.

## ١٥١٢٢ - شربل بهمي

*Kleina radicans* (S). شربل منقبسط  
*Kleina rampante* (F).

نوع من الشربل المعمر. ساقه خشبية نحيلة تطول نحو ٣٠ سم. وتنبت على التربة. أوراقه رشيعة الشكل صغيرة القد. رؤسها الزهرية فردية أو ثنائية التجميع قرصها أبيض اللون، قناباتها تنفسجية || ساقه وأوراقه وأزهارها رائحة العرف || تنوره غربي يستمر نحو ٣ أسابيع.

*Kleina fulgens* (S). شربل بهمي

*Kleina éclatante* (F).

نوع من الشربل الحولي، ساقه خشبية منتصبة عديمة الفروع طول نحو ٤٠ إلى ٤٥ سم. أوراقه مسوطة اهليلجية تطول نحو ٨ سم. وترس نحو ٣. نصلها أخضر اللون آخر الموالج يحمل في حناؤه من على جانبي صفحته ثلاثة أسنان مدببة. رؤسها الزهرية هامة الارتكاز، فردية أو ثنائية التجميع. كبيرة القد، حراء اللون منشدة بالأبيض || تنوره شوي يستمر نحو ٣ أسابيع.

## ١٥١٢٣ - شربل ترابي

*Kleina acutis* (S). شربل تربي

*Kleina acule* (F).

نوع من الشربل المعمر. ساقه ليفية جلمة يملؤها شراخ يرتفع نحو ٢٠ سم. ينتهي بروسة زهرية فردية كبيرة القد بيضاء اللون. أوراقه متقاربة نصف حاشنة. نصلها أخضر اللون، أحر المقص، تحدد الصفحة، يطول من ١٠ إلى ١٦ سم. ويترس من ٣ إلى ٥ سم. || تنوره ربيبي يستمر نحو ثلاثة أسابيع.

*Kleina antephorium* (S). *Kleina antidote* (F).

نوع من الشربل المعمر. ساقه خشبية فراء طول نحو ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه اهليلجية الشكل، ناشرة المروق، غمدية الصفحة. رؤسها الزهرية كثيرة العدد، بيض الإقراص، غير القنابات || يقال إن أوراقه وأزهارها رتيقية بحرية || تنوره يستمر طوال شهر تشرين الثاني.

## ١٥١٣٠ - شربين\*، سزو رشيق، سزو فضي

*Chamaecyparis* (S). *Cypress argenté*, *Faux-cypress* (F).

جنس أشجار حرجية رزينية من سبط السرايات وفضيلة الصنوبريات. أنوعها ٦ تتميز ببناتها المورقة الباطلة. أوراقها أبيض، فلسية، متقابلة، مفالوة، مرصومة على أربعة صفوف. بشرة حراشفا السطلي نضبة الموالج. أزهارها طرفية، وحيدة الشق والمسكن، والذكورة منها قنابية القاعد ملوحا لاسدية الاقنابية الجيوب || نماها أكرار كروية الشكل، شغيفة الجراعات الخصفية الشكل الليغية التركيب || بزودها صغيرة القد، شبه مستديرة، ضيقة الجناح، حولية أو محولة البلوغ. سمها مربابي بطيء الانتاش.

## ١٥١٢٤ - شربل دلفي الورق

*Kleina nerifolia* (S). *Kleina à feuilles de laurier* (F).

نوع من الشربل المعمر. ساقه عقدية خشبية غليظة الجلمع طول نحو ٣ أمتار؛ فروع كثيرة العدد أفيقة الانتشاب. أوراقه دلفية الشكل بحرية اللون عابلة، نصلها سنان الصفحة يطول من ٩ إلى ١٢ سم. رؤسها الزهرية عكولية التجميع، متوسطة القد، صغر الإقراص، غير القنابات || تنوره يستمر من تشرين الأول إلى الثاني.



شربين

## ١٥١٢٥ - شربل عطير

*Kleina odorata* (S). شربل عطير

*Kleina odorante* (F).

نوع من الشربل المعمر مهدد بالانقراض في الجزيرة العربية. ساقه عقدية خشبية طول نحو ٣ متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقه سنانة النصل تطول من ٦ إلى ٩ سم. صفحتها ثلاثية المروق الناشزة. رؤسها الزهرية عكولية التجميع، متوسطة القد، صفراء اللون، أزهارها وأغشابه عطرية الرائحة بعد جفافها || تنوره يستمر طوال شهر تشرين الثاني.

## ١٥١٣١ - شربين صوارة، صوارة

*Chamaecyparis pisifera* (S). *Cypress à pois*, *Sawara* (F).

نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية كبيرة القد، مودية الشكل. موطنها اليابان، ترغ في الأثرية البرية الرطبة. طول نحو ٤٠ م. لحاء ساقها الاربدة السمر. بناتها نحيلة، متدلية، مورقة. أزهارها الذكورية إلى البنفسجي العايق تملوه مشعة صفراء. أزهارها الانثوية إلى الوردية الوردية الموالج || أكرارها صغيرة القد حمرار اللون، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم.

## ١٥١٢٦ - شربل عتمتي

*Kleina amanensis* (S). شربل عتمتي

*Kleina de l'Amanie* (F).

نوع من الشربل المعمر أصطناعه الجزيرة العربية. ساقه خشبية بحرية اللون فراء طول نحو ٨٠ سم. فروعها أفيقة الانتشاب. أوراقه مسوطة الشكل، باحة الخصار، ثلاثة المروق الناشزة المابقة الموالج. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويترس نحو ٤. رؤسها الزهرية طرفية الارتكاز ثنائية التجميع صفراء اللون || تنوره ربيبي يستمر نحو الشهر.

## ١٥١٣٢ - شربين عطير هو السدرال، الحلبه.

*Chamaecyparis formosensis* (S). *Cypress de Formose*, *Beniki* (F).

نوع من الشربين وهو شجرة سبروتية كبيرة القد، مودية الشكل، سريمة النود طول نحو ١٠ م. موطنها جبال فورموزه. لحاء ساقها إلى الجردة المابقة. بناتها مورقة منتصبة تجلس مع العمر || أزهارها الذكورية أبق من

## ١٥١٣٩ - شُرْبِينَة حَلَايَا \*

Chourtka himalayensis (S).  
Chourtka de l'Himalaya (F).

طائر من الشرق. موطنه يمتد من جبال حلايا إلى الأندمان وإيران. يألف البراري والأحراج على السواء. قوته يمدّ وقصصها والتدل وبانها إلى جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبه إلى السواد الأخضر المالح. زوره وعقته إلى الوردية يطولها طوق أسود يمتد حتى الحشر والين. صدره إلى الوردية المنمشة بالأسود. جناحاه لاسفان. قواده إلى الوردية. ذنبه قصير، مقطوم الطرف || يدشن عشه في أقصوص يقيمها بين الأشجار الكثيفة. الاثنى تحضن من ٨ إلى ١٢ بيضة. ترضعها يستمر نحو ٣ أسابيع تقوم به الاثنى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء.

## ١٥١٤٠ - شَرْث

Engelure (F). Chilblain (E).  
عارض يصيب الأشجار في مختلف فروعها من جراء الصقيع فيسبب للحاء ويسبب جفافه || وهو في الحيوان تصعيب الأطراف ويذعن الحصر.

Rectum

١٥١٤١ - شَرْج  
هو الجزء الأسفل من الأمعاء ينتهي عند الاست حيث يخرج البراز.

١٥١٤٢ - شُرْجَبَان ، شُرْجَبَان  
هو الشرجات ، أطبها .

١٥١٤٣ - شُرْجَبَانِيَّات  
هي الشرجاتيات سبط من الفصيلة الباذنجانية .

Anal

١٥١٤٤ - شُرْجِي  
نمت تمرني يطلق على كل ما له صلة بشرج الحيوان .

١٥١٤٥ - شَرْج  
Galaxie (F). Galaxy (E).

الشرج ، حسب التعريف الفلكي الحديث ، هي أولاً المجرّة المعروفة بدرب التبانة والطريق اللبني . وهي بالتالي وعلى وجه الشمول ، كل مجموعة سدم في الفضاء . لذلك فهي متباينة الأشكال والحجوم . أصغرها حجماً يقدر طويلاً بمئات ألوف السنين الضوئية .

١٥١٤٦ - شَرْج  
Canine du chameau (F).  
Canine tooth of the camel (E).

١٥١٤٧ - شَرْج الْهَلَك  
Grenadille (F).  
جنبه عارضة مشرة تدعى آلامية مأكولة ، أطبها .

١٥١٤٨ - شُرْحَات ، شُرْجَبَان  
Cestrum (S).  
Cestreau, Galant (F). Night blooming Jasmine (E).  
Hammerstrach (D). Cestrene (I).

جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية من سبط الشرجاتيات وفصيلة الباذنجانيات . أنواعه نحو ٦٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة بعضها يزرع للزينة ومنها أنواع كريمة الرائحة لا تخلو من العناصر الجالية القاتلة || سورها تملو من ١٠٠ إلى ٣٥٠ سم. أوراقها كاملة متعاقبة. نصلها عايق الحفرة ، مائل الصفنة العليا ، خراشغل. أزهارها متوسطة القد ، مستطيلة الأنبوب . ثمارها جوزية الشكل والحجم ، مختلفة الألوان .

الانثوية لونها إلى الزرقة البنفسجية يطولها موالج اصفر يتخلله ثوب من الوردي || اكرازها غروطية الشكل، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٦ م.

## ١٥١٣٩ - شُرْبِين لُؤْسُونِيَّة

Chamaecyparis lawsoniana, C. boursieri (S). Cyprès de Lawson (F). Port Orford cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية ، كبيرة القد ، سريعة النمو، موطنها أمريكا الشمالية تملو نحو ٦٠ م. لحاء ساقها إلى الوردية الخمر. بناتها موقرة لونها إلى الأخضر البحري الاطلل المالح. أزهارها الذكرية قرمزية اللون بنفسجية التوشيع . أزهارها الانثوية إلى الوردية الوردية الموالج || اكرازها صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. رضاءها شائعة . يكثر استعمالها في صد الرياح .

## ١٥١٣٥ - شُرْبِين مُتَقَعِي

Chamaecyparis thyoides, C. sphaeroides (S). Cyprès faux-thuya (F). White cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية متوسطة القد ترفع في الاراضي المنقمية . تملو نحو ٢٥ م. لحاء ساقها إلى الوردية السمراء . بناتها متعصبة . اوراتها دقيقة. أزهارها الذكرية بنفسجية اللون، قرمزية التوشيع . أزهارها الانثوية فسنتقية الاساس ، وردية الموالج || اكرازها سداسية الجراعات ، قطرها نحو ٦ م.

## ١٥١٣٦ - شُرْبِين لُؤْسَا ، لُؤْسَا

Chamaecyparis nutkaensis, C. nootkatensis (S). Cyprès de Nutka, Nootka (F). Nootka sound cypress, Yellow cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة جادة كبيرة القد ، اجابية الشكل ، موطنها أمريكا الشمالية . ترفع في المناطق الرطبة، تملو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوزة السمراء . بناتها متدللة الأطراف ، شديدة الخضار الباهت ، عادمة الموالج الغضبي || اكرازها رباعية او سداسية الجراعات ، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ م.

## ١٥١٣٧ - شُرْبِين هِينُوكِي

Chamaecyparis obtusa, C. brevifolia (S). Cyprès hinoki (F). Hinoki cypress (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة القد ، مردنية الشكل. موطنها اواسط وجنوب اليابان. تملو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوزة الخمر، بناتها موقرة، مزدوجة التصفيف ، غمدية . أزهارها الذكرية بنفسجية اللون يطولها توشيع وردي واصفر . أزهارها الانثوية إلى الوردية الخضراء تملوها مشمة وردية وماجة زرقاء || اكرازها غروطية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م.

١٥١٣٨ - شُرْبِينَة  
Chourtka (S).  
Chourtka (F). Chourtka (E).

جنس طير من فصيلة الطيوريات ورتبة الدجاجيات . أنواعه المعروفة نحو ٦ أعطانها تمتد من الهند إلى جبال سيبرية . تألف البراري والأدغال والأحراج . قوتها الحبوب والبرور البرية وبغض الحشرات ومكها وأغصها الجنادب والتدل إلى اجسامها ربعة ، طولها من ٢٤ إلى ٢٨ م. رقوسها متوسطة الحجم . اعانها قصيرة . مناقبها صغيرة . اجنحتها لاسفة . اذناها قصيرة ، مقطومة الأطراف . اولوها متباينة الألوان ، جميعها مطوقة الزور والصدر || ملونها الحياتي جامعي إلا في زين التناصف والحضانة افواجها تعد من عشرة أزواج إلى خمسين زوجاً || اعرف أنواعها واشهرها شرقة حلايا .



شرقة حلايا

## ١٥١٥٧ - شُرُوحَاتُ مُسْتَجِدَّة \*

*Saurus fasciatus* (S). Saure rayé, Lambert (F).  
*Saurus fasciatus* (E).

سمكة من الشرذوح ، اصطناعا معطر اقاليم البحر الابيض المتوسط . جسمها وشي "الشكل يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . ثوبها الى الرعدة الغفيرة يبق عند الظهر ويبرز عند البطن . زعنفتها اصباها مسنجان بثلاثة خطوط قاطبة زرقاء اللون . زعنفتها الذيلية مغلفة بالازرق || رأسها مخروطي الشكل ، كبير الفم ، واسع الشدق الرطب . اسنانها كثيرة العدد ، ثلاثية الصنوف في الفكين . عينها صغيرتان ، مستديرتان ، ماحتان || زعنفتها لينة متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية الاولى شرعية . الظهرية الثانية جعدة . الصدرية صغيرة . الخوضية كبيرة || لحمها جيد الصنف لكنه كثير الحسك النقي .

١٥١٥٨ - شُرُوحَاتُ \*  
Filicinae (F).  
Filicinae (E).

شعبة من مستورات الزهر الوعائية . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها من احافير الارزنة الغابرة اغصها الحقبة الديفوية || نباتاتها متباينة التركيب المهيكل منها المشبية واليغية والخشوشية . جميعها مجهرية بزوائد وريقة تدعى مراحم .

١٥١٥٩ - شُرُوش  
يقال هو عقدا الجبل وله شك اسفر . (اللسان) .١٥١٦٠ - شُرُوشُوف  
Epigastre (F) Epigastrium (E).  
الجزء الاوسط العلوي من البطن يمتد من السرة الى القص .١٥١٦١ - شُرُوشِين \*  
Chersina (S). Chersine (F).  
جنس سلاف من فصيلة السحفيات . انواعه عديدة ، مهدا البلاد الحارة ، جميعها ارضية المسرح خاضعة . ذلهيا شديد الاحتداب والصلابة لونه الى السرة يعلو تبييض اصعب . طول اجسامها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم . بيئاتها الشترية يدوم نحو ١٠ اشهر .١٥١٦٢ - شُرُوش  
هو الجذر ، اطبله .١٥١٦٣ - شُرُوش  
يقال شرش النبات اذا نشيت شروشه في التربة . راجع استعرق .١٥١٦٤ - شُرُوشُور ، شُرُوشِور  
"نبت يذهب حبالا على الارض طولا كما يذهب القطب وليس له شك يودي احدا تسن الابل عليه وتقره" (ابو حنيفة) وهو من نبات البادية . واحدة شرشرة .١٥١٦٥ - شُرُوشُوق  
Rolleir bleu (F).  
هو الشراق الازرق ، اطبله .١٥١٦٦ - شُرُوشُور ، بُوَشُوش  
Fringilla (S).  
Pinson (F). Finch (E).  
جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه قليلة جميعها صفورية صغيرة القد . منافعها غرطية جالسة . اجتمعت مستطيلة ذلقة ، اذناها طويلة فارقة ، ارساغها دقيقة . وهي من المعانير الثريدة المأمونة الزقوة . قوتها الحشرات والبرور البرية . تدش في الاجمار . انائها قبض من ٤ .

## ١٥١٦٩ - شُرُوحَاتُ اللَّيْلِ ، يَاسَمِين اللَّيْلِ

*Cestrum nocturnum* (S). Cestreau nocturne, Galant de nuit, jasmin de nuit (F). Night scented Cestrum, Night jasmine (E). Nachtsstrauch (D). Galante di notte (I).

نوع من الشرغات يزرع لثزين ، يطر من ٢٠٠ الى ٣٠٠ م . اوراته اهلبيجية عاقبة الخضار الاعم . ازهاره جملة اللون ، ارجوانية اللون ، عرفها دجوي بفوح في الليل ويغيت في النهار || وهو من النباتات السبروتية المسرة التي تعيش وتجد في جميع المواقع والازربة .

١٥١٥٠ - شُرُوحَاتِيَّات ، شُرُوحَاتِيَّات  
Cestrinées (F).

سبط من فصيلة الباذنجانيات ، اشهر اجناسه الشرغات .

١٥١٥١ - شُرُوحُوب  
Apophyse (F). Apophysis (E).  
هو مظم الفقار . ج شرخايب .١٥١٥٢ - شُرُود  
هو السرخس الذكر ، اطبله .١٥١٥٣ - شُرُودِيَّات \*  
Dasypoctidae (S).  
Subongulés, Dasypoctidae (F). Subongulates, Dasypoctidae (E).

فصيلة حيوانات لبرنة قاضمة من مرتبة . شحيات الشوزب ورتبة القوام . اجناسها وانواعها عديدة اجسامها مختلفة الاشكال والاحجام . اذناها عريضة . اذناها جداد او قصار . قوائمها متوسطة او رقيقة . فراؤها خشنة الورب والصوف || موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . جميعها دجوية تنورة مهلة الادجوان والترويض . قوتها المواد النباتية || اعرف انواعها واشهرها الاغوتي والباكاس والماره والكايباه والكركايب .

١٥١٥٤ - شُرُودِيل \*  
Cercidophyllum (S).  
Cercidophylla (F).

جنس نباتات سبروتية مسمرة من فصيلة الشرشوفيات . انواعه قليلة العدد مهدا الشرق . اشجاره كبيرة القد هرية الشكل تملو من ١٦ الى ٣٠ م . سوقها غليظة . اوراتها مابلية معققة متعاقبة . نصالها ثلثية الشكل ، مفردة الخمار ، بارزة البروق ، متساوية الطول والعرض . صفحاتها العليا جملة الخضار الزاهي ، صفحاتها السفلى خلية البثرة غبراء اللون . اعناقها بنفسجية . ازهارها عادمة الكأس والتويج . الذكرية منها عديدة الاسدية اما الانثوية فثنائية او رباعية او سداسية الاسدية ، مستطيلة الاقلام البارزة . تصلح لتجريع وزرع في الحدائق .

١٥١٥٥ - شُرُودِيلِيَّات \*  
Cercidophyllaceae (S).  
Cercidophyllacées (F). Cercidophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من مستقالات القمالات اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها اشجار متوسطة القد او كبيرة معظمها بري وبعضها حدائق .

١٥١٥٦ - شُرُودُوح  
Saurus (S).  
Saure (F). Saurus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة اللوسيات ورتبة مفتوحات الماشاة || انواعها المعروفة سبعة معظمها من اسماك بحار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها وشية الشكل ، مستطيلة . اثوابها مختلفة الالوان . السائد فيها الرعدة الرصاصية الغفيرة المواج ، تسمر وتبقى في الظهر وتزهر في البطن || تتميز باشداها الكبيرة وبزعانفها الذيلية الفارقة || طوعها جيد الصنف غير انها كثيرة الحسك النقي || اشهر انواعها الثردوسة المنسبة .



شرذوة مستجدة



شرشين

## ١٥١٧٧ - شُرُط اسْتِثْنَاء الاختصاص

Clause attributive de juridiction (F). Attributive clause of jurisdiction (E).

شرط اتفاقي يقضي بطرح المنازعات التي قد تنشأ عن العقد على محكمة معينة .

## ١٥١٧٨ - شُرُط الاختصاص ، مُطَارَعَة

Compromis (F). Compromise, Mutual agreement (E).

المشاركة هي اتفاق يبرمه كتاباً من يشترط بينهم نزاع ، على ان يحكموا في فصله شخصاً يتراضون عليه بقض حكم . وتعتبر المشاركة عقدًا من عقود التراضي وهو لا يصح إلا من له اهلية الاداء المطلقة .

## ١٥١٧٩ - شُرُط الأمر ، شُرُط الأذن

Clause à ordre (F).

هو شرط يقضي حتماً نص صيغة « لأمر وإذن » وبذلك يمكن تحويل الدين بالتظهير . اما صيغة التظهير فهي : « ادفعوا لأمر فلان ... »

## ١٥١٨٠ - شُرُط التفضيل

Pacte de préférence (F). Preference clause (E).

اتفاق يلتزم المرء بمقتضاه اذا اعزم تحرير عقد معين ان يفضل المودع به بنفس الشروط التي يبرمها الغير .

## ١٥١٨١ - شُرُط الضمان

Clause du croir (F).

Guarantee clause (E).

شرط يلزم الكفيل او الوسيط على دفع ثمن المشتري الى البائع اذا تأخر الشاري عن ذلك .

## ١٥١٨٢ - شُرُط الوقاية

Clause de sauvegarde (F). Safe-guard clause (E).

شرط يربط الى ربط الالتزامات المالية ببعضها بعض فيصبح تنفيذ بعضها معلقاً على تنفيذ البعض الآخر .

## ١٥١٨٣ - شُرُط تهديد يدي

Clause comminatoire (F). Comminatory clause (E).

شرط خاص يدرج في عقد التبرع يتم القيام بعمل معين ما ويتصل على اقتطاع مقدار معين فبأ اذا امتنع المتبرع له عن القيام بالعمل المطلوب .

## ١٥١٨٤ - شُرُط جزائي ، شُرُط عقوبة

Clause pénale, Pénalité (F).

Penal clause, Penalty (E).

شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزائي للتعويض الذي يجب على المدين اذا لم ينفذ او اذا أخر تنفيذ التزامه .

## ١٥١٨٥ - شُرُط حصّة الأسد ، شُرُط ضيقية

راجع اشتراط حصّة الأسد .

## ١٥١٨٦ - شُرُط رفع المسؤولية

Clause de non-responsabilité (F). No responsibility clause (E).

شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على اني المسؤولية عن المدين اذا تأخر في تنفيذ التزامه . وهو من الشروط المحظورة في عقد النقل .

## ١٥١٨٧ - شُرُط عُلُق الرِّهْن

Pacte commissaire (F). Binding on pain of clause (E).

هو اتفاق في المقود للمرته الطرفين ينص فيه على انه في حالة عدم تنفيذ احد الطرفين للالتزام الذي انشده عليه العقد فسخ العقد بقوة القانون دون ان ترفع بشأنه دعوى

الى ه . يضاف تحضها بمناوبة الذكور || اشهر انواعه الشرشور الشائع والجبلي والافريقي .

## ١٥١٧٧ - شُرُور جَبَلِي

Pinson d'Ardennes, Pinson de montagne (F). Brambling, Mountain finch (E).

يرف بالانغاري ، اطلبه .

## ١٥١٨٨ - شُرُور شائع

Fringilla coelebs (S). Fringilla commun (F). Chaffinch (E). Buchfink (D).

نوع من الشرشور طوله من ١٦ الى ١٧ سم . جسمه سواد الريش . راسه وقفته وصقته الى الزرقة الرمادية المواج . ظهره اسمر اللون تلوه ماجة زيتية . زمكاه الى الخضرة . سقاه بلون ظهره يمتزجها خضان عاجيان . صدره الى الجذوة الخمرية ، يلمع ينحرف الى الصبغة وينتهي بالابيض . الاثني اصفر قدماً من الذكر واهت ثوباً .

## ١٥١٨٩ - شُرُوريات

Fringillidae (S). Fringillidae (F).

فصيلة طير من الجوائم الخروطيات الناقير . منها الشرشور والحسون والتمار والكنار .

## ١٥١٧٠ - شُرُور

Sarcelle (F). هو الخلد ، اطلبه .

## ١٥١٧١ - شُرُور شتوي

Sarcelle d'hiver (F). هو الخلد الشتوي من طيور الماء ، اطلبه .

## ١٥١٧٢ - شُرُور صيفي

Sarcelle d'été (F). هو الخلد الصيفي من طيور الماء ، اطلبه .

## ١٥١٧٣ - شُرُور

هو الصديق ، اطلبه . ج حراس وشرسة .

## ١٥١٧٤ - شُرُور

Imperméable à la lumière (F). هو ما كان لا ينفذ النور . راجع شاتن .

## ١٥١٧٥ - شُرُور

هو كل نص خاص يرتبط عملاً قانونياً .

## ١٥١٧٦ - شُرُور ، شُرُور

هو تمليك انقاد عقد قانوني على حدوث حدث في المستقبل مشكوك في حدوثه . وقد يكون الشرط :

شرط استحالة ، محتمل

Condition casuelle (F).

Casual C. (E).

شرط اداري

Condition protestative (F).

Protestor C. (E).

شرط توقيفي ، ملحق

Condition suspensive (F).

Suspensive C. (E).

شرط فاسخ

Condition résolutoire (F).

Abrogating C. (E).

شرط محظور ، غير جائز

Condition illécite (F).

Illécit C. (E).

شرط مخفق

Condition défallie (F).

Failing C. (E).

شرط مستحيل

Condition impossible (F).

Impossible C. (E).

شرط رافض ، منافي للاخلاق

Condition Immorale (F).

Immoral C. (E).



شرشور شائع

## ١٥١٩٦ - شُرطية أنيقة، بيضوية أنيقة

Baeria gracilis (S). Baérie gracieuse (F).

نوع من الشرية عشبية زينة حولية. ساقها فراء تملو ١٥ سم إلى ٣٠ سم. أوراقها كاملة سائبة النصل. رؤيساتها الزهرية عديدة اللسنيات لونها إلى الاصفر الجميل || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

## ١٥١٩٧ - شُرطية مذهبة، بيضوية مذهبة

Baeria chrysostoma (S). Baérie dorée (F).

نوع من الشرية عشبية زينة حولية. ساقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها كاملة سائبة النصل. رؤيساتها الزهرية عديدة اللسنيات الكبيرة المستطيلة، لونها إلى الصفار المذهب || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

## ١٥١٩٨ - شُرطين

الشُرطين منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الأولى. ويقال لها قرنا الحمل والتالح. وهما مترضان من التال من الجنوب. والى جانب التال منها كوكب صغير || رقيب الشُرطين يدعى النفر.

## ١٥١٩٩ - شُرطاف، شُرطان

Spathe

قنابة طلمة النخل وما أشبه. وهو الكانور.

## ١٥٢٠٠ - شُرططط

Phellandrium (S).

Phellandrie (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخياميات. أنواعه قليلة العدد منها المناطق المتدلة، جميعها ترهب في الموائع الرطبة. أوراقها متعاقبة مركبة قريبة الشبه من الشوكران || أعرف أنواعه وأشهرها والشُرطط المتقي.

## ١٥٢٠١ - شُرططط متقي، شُرطان الماء

Phellandrium aquaticum, Enanthe phellandrium (S). Phellandrie aquatique, Fenouil d'eau (F). Water drop-wort, Water hemlock (E). Wasser Fippendel, Wasser Pfersaat (D). Felandrio, Finocchio acquatico (I).

نوع من الشُرططط وهو نبات عشبي بري معمّر يكثر في المناطق والأراضي الرطبة. يعتبر من النباتات السامة التي تؤذي الماشية || استبحار ازهاره الغليظة بالماء يفيد الربو ويستخرج من بزوره مادة طوية جمالية لها استعمالها الطبي.

## ١٥٢٠٢ - شُرططط

Etêter (F). To pollard (E).

شُرطط القضيبي: قطع رأسه النامي. والشُرطط: قطع الرؤوس النامية في النبات.

## ١٥٢٠٣ - شُرطط

Démagogie (F).

Demagogy (E).

الشرطة حالة اجتماعية تسود فيها فوضى آراء الذين يدعون مناصرة الجماعات أو الشعب.

## ١٥٢٠٤ - شُرطط

Démagogique (F).

Demagogic (E).

نعت ترميى يطلق على كل ما من شأنه تحريض أهواء الجماهير وشهواتها اللانظامية.

## ١٥٢٠٥ - شُرطط

Démagogisme (F).

Demagogism (E).

الشُرططية مذهب الذين يبشرون بالشرطية.

النسخ. وهو أيضاً اتفاق يبيع به الرأى للمرتب الحائر الرهن، الاستيلاء على الرهن في حالة عدم وفاء الدين عند حلول أجله وهذا الشرط محظور قانونياً.

## ١٥١٨٨ - شُرط مألوف

Clause de style (F).

Style clause (E).

هو من الشروط التي تدرج في جميع العقود المتشابهة بطبيعتها: مثال ذلك ما يرد في عقود الإيجار بأن المستأجر قد عين الأرض المؤجرة مائة تنني دعوى الجهالة شرعاً.

## ١٥١٨٩ - شُرط معدّل، شُرط متخالف

Clause dérogatoire (F). Derogatory clause (E).

هو كل نص يدخل بمقتضاه تعديل على الاتفاق المقرد أو ينصرف به عنه.

## ١٥١٩٠ - شُرط مقدّسة المتنازع فيه

Pacte de quota litis (F). Quota litis clause (E).

شرط يتخذ بين الخصم والمتقاضى على أن أتأب القضية تكون جزءاً من كسبه وهو محظور في اللوائح المهنية.

## ١٥١٩١ - شُرطية

Shortia (S).

Shortie (F). Shortie (E).

جنس نباتات عشبية ركوبية معمرة من فصيلة القرنبيات الفراضية معقودة التبريد على اسم العلامة وشُرطية. ركبها مستطيلة. أوراقها جلدية الانتشاب مستديرة الشكل أو كلوية، جلدية النصل. أزهارها ملونة خاسية البتلات والاسدية الخصية، خاسية الاسدية العقيمة. أنواعها المعروفة قليلة أشهرها التالية:

## ١٥١٩٢ - شُرطية كبيرة الزهر \*

Shortia grandiflora (S).

Shortie à grandes fleurs (F).

نوع من الشرية الزينة. مهددة بعض مناطق أمريكا الشمالية. أوراقها كبيرة القد، شبه مستديرة الشكل، قليلة القاعدة، مسننة الحار. أزهارها بيضاء اللون، خافتة العرف، قطرها نحو ٣ سم. || تنورها يستمر من أيار إلى حزيران.

## ١٥١٩٣ - شُرطية وحيدة الزهرة

Shortia uniflora (S). Shortie uniflora (F).

نوع من الشرية الزينة. مهددة اليابان. أوراقها كبيرة، كلوية الشكل، مسننة الحار المقرمش. زهرتها وحيدة، وردية اللون، خافتة العرف، قطرها نحو ٥ سم. || تنورها يستمر نحو أربعة أسابيع ابتداء من أواخر نيسان.

## ١٥١٩٤ - شُرطية، بيضوية

Baeria (S). Baérie (F).

جنس نباتات برية وزينة من فصيلة المركبات. أنواعها عديدة معظمها أمريكي المهد. ساقها فراء. أوراقها متعاقبة. أزهارها رؤيوي التجميع، قناباتها عديدة الفصل فردية الصف. تحويها غرورية الشكل. بزورها مجنحة مستطيلة قليلة العرض || أعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

## ١٥١٩٥ - شُرطية إكليلية، بيضوية إكليلية

Baeria coronaria (S). Baérie coronaire (F).

نوع من الشرية الزينة الحولية القواسم العرف المستحب. ساقها زياء البشرة فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مفردة خطية التشرج. رؤيساتها الزهرية كبيرة القد عديدة اللسنيات المتوسطة الطول لونها إلى البرتقالي. بزورها مجنحة كثيرة الحسك || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.



شرية كبيرة الزهر



شُرطط متقي





شُرُوب حَقْل



شُرُوب غُرْنِي



شَرَا



شُرُوب أَخْضَر



شَرَق



شَرَق

كروية الشكل قندرها يراوح من حجم البقلة الى الجوزة الصغيرة || اشهر انواعه وأعرجها الشرغوف الاسفر .

١٥٢١٣ - شُرُوبُ أَخْضَر \* *Hyla arborea* (S). *Rainette verte* (F). *Green Tree-frog* (E).

نوع من الشرغوف . اصلانه يمتد من اليابان الى الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والى وسط افريقية والى افريقية الشمالية || جسمه صغير الجرم ، يطول عند الذكر من ٤ الى ٥ سم . ويطول عند الانثى من ٦ الى ٧ سم . جلده مائل القشور ، عديم السم . عيناه نارشان ، جاحشان . خطمه مستعرض الشدق . ذكك السفلى عديم الاستان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية طليقة اما اطرافها مجهزة بطيات محببة يمكنها من السير على السطح المائلا || ثوبه الى الخضار الزاهي ولكنه يمتدح البنية التي يعيش فيها لذلك فهو عديد المالحات || يعيش معظم حياته متخفيا بين الاشجار والنباتات القريبة من الماء . يسرع في التهرب ويبيت في الليل مخفيا بين الارواح . قوته الحشرات والحوام || الانثى تترأ نحو ٨٠٠ دجيلة في شلة متجمعة الميوط تقذف بها في الماء فتلصق ببعض النباتات او القصباء المغمورة . التفث يتم غالبا ، بعد التشرية ياسيرين والبالط يتبقى في الماء نحو ثلاثة اشهر ريثما يتم تطورها .

١٥٢١٤ - شُرُوبِيَّات *Hylidae* (S). *Hyllidés* (F). *Hyllidés* (E).

ونهم من سمها ضفادع الشجر . فصيلة حيوانات من لمة الروبيات ورتبة السونيات ورتبة التبروات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || جمع انواعها صغيرة القند ، درداء تحمل الانثى في فمها كالبان . السنبها خفيفة ، مستطيلة . اطراف اصابعها مجهزة بطيات محببة يمكنها من تسلق السطح المائلا . قندرها الامامية عادمة الاخلاص . اما التتو العظمي الذي يمتدح فقرة العنبر ويغطها ويتجاوزها من اليمين واليسار فبين التتد || اشهر اجناسها الشرغوف والشفدع والمجاة .

١٥٢١٥ - شَرَف ، شَرَف ، شَرَف الشرف : نبت اخر تصبغ به الثياب (ابن الاعراب) .

١٥٢١٦ - شَرَقَت \* ، فَعَر التَّلُوج ، شُولُودَكْسِه *Chionodoxa* (S). *Chionodoxe*, *Gloire des neiges* (F). *Glorie of the snow* (E). *Schneestolz* (D). *Gloria di neve* (I).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الزنبقيات انواعه المعروفة نحو ٨ مهدها الشرق الاوسط ، ترب في المناطق المعتدلة المنخفضة نحو الباردة . جميعها صغيرة القند تلون من ١٠ الى ٢٥ سم . وهي قريبة القبة من الاشقل . ازهارها انبوية الشكل بتلاتها مندحة الزايمان الاول والثاني طليقة التالك والرايح ؛ اسديتها سنانية الشكل . الوانها عديدة فيها الازرق والارزق والوردي والبنفسجي .

١٥٢١٧ - شَرَق \* ، صَقَر الغُرَّال ، تُوْمَدِي *Falco chiqueura* (S). *Falcon chiqueura* (F). *Falcon cherrug* (E).

طائر من فصيلة الصقريات طوله نحو ٤٠ سم . وبهته ١٠٠ سم . وهو اجل الصقور ثوبا واحسنا توشجا واسلحا تنيرا ولها مواجا وأسرعا قاتلا وانجادا . موطنه فسح الارجاب يمتد من الهند الى الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية . يألف العمران ويبتعد عن الغُر المحرس .

١٥٢٠٦ - شُرُوب *Tordylum* (S). *Tordyle* (F). جنس نباتات عشبية برية حولية وبولية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة خمسة : اوراقها متعاقبة ، معققة ، لاطقة الاذينات ، كثيرة التفريش . ازهارها صغيرة القند ، بيضاء اللون || اشهر انواعها الشرغوب الغُرني والشرغوب الحقل .

١٥٢٠٧ - شُرُوب حَقْلِي \* ، تُوْمَدِي *Tordylum suaveolens* (S). *Tordyle suave* (F). *Hedge parsley* (E). *Zirmet* (D). *Tordillo* (I).

نوع من الشرغوب الحولي البري يكثر في الحقول المزدرة ، اوراقه وازهاره مستطيلة العرف المنمش . ازهاره بيضاء اللون . جلوره طيبة يقال انها تفيد الصرع وتسكن اوجاع الرأس .

١٥٢٠٨ - شُرُوب تَحْزَنِي \* ، مَسْكَلي ، سَيْتَسُون *Tordylum officinale* (S). *Tordyle officinale*, *Sésél de Crète* (F). *Small hortwort* (E). *Kretischer Sésel* (D). *Tordillo*, *Seseli di Crète* (I).

نوع من الشرغوب البري المحول . اوراقه معققة ، متعاقبة . نصلها كثير التفريش والتشريح . ازهاره الى البيضاء الوردي || ينبت في التربة الطينية المتوسطة الاندماج والروطية . جلوره طيبة تفيد الصرع وداء النقرة .

١٥٢٠٩ - شَرْعِي ، قَضَائِي *Juridique* (F). *Juridical* (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان مطابقا لمقتضيات الشرع .

١٥٢١٠ - شَرَح ، شُرُوفُون ، شُرُوف *Tétard* (F). *Tadpole* (E).

هو صغير الضفادع . رقد يطلق ، تعميما ، على الضفادع في دورها البوملي القائم بين نفث البصيل وكال الشكل النهائي .

١٥٢١١ - شَرُغَال \* *Chirogalus* (S). *Chirogale* (F). *Chirogalus* (E).

جنس حيوانات لبونة من الليموريات . انواعها المعروفة خمسة موطنها جزيرة مدغشقر . تألف الغابات والاحراج . ملجئها الحياتي جماعي . جماعتها قليلة العدد || اجسامها برة ، رشيدة ، صغيرة ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . بما فيه الاذنان التي يراوح طولها من ١٠ الى ١٥ سم . رؤوسها برميعة الشكل . اذانها صغيرة مستديرة كاسية . عيونها كبيرة مستديرة نافذة . اذواها اطروح بين السرة المابقة والسرة الخلفية || قوتها الثار والحبوب والبلور والعلل والصانير والخشرات الكبيرة . بيئاتها الشجرية حيث تستكن في غيبوبة تامة يستمر من ١٠٠ الى ١١٠ ايام .

١٥٢١٢ - شُرُوب *Hyla* (S). *Rainette* (F). *Tree-frog* (E).

جنس ضفادع من فصيلة الشرغويات . انواعها المعروفة نحو ١٣٢ منتشرة في معظم اقطار العالم القديم ، من اليابان الى اطراف ادوية وافريقية الشمالية باستثناء الهند واروبة الشمالية || اجسامها صغيرة القند تطول من ٣ الى ٧ سم . اذواها الى الخضار المتفاوت المالحات والزاهي . تعيش معظم حياتها التي تطول نحو عشر سنوات في البر تملو الاشجار وتقيم عليها || ذكورها مجهزة بلغة صوتية

## ١٠٢٢٧ - شَرْم قَلْبِي الْوَرَق

*Carpinus cordata* (S). Charme à feuilles en cœur (F). نوع من الشرم مهدد اليابان. شجرته سرية تجرد في جميع المواقع والأماكن. تملو من ١٢ إلى ١٨ م. أوراقها تملو نحو ٨ سم. فصلها بيضى الشكل، قلبى القاعدة، مدبب الطرف. غشبا جامد الرقعة، شديد الصلابة، شائع الاستعمال الصناعي.

## ١٠٢٢٨ - شَرْم كَرْوَلِيَّة

*Carpinus americana* (S). Charme de la Caroline (F). نوع من الشرم بجبل الشكل. مهدد البلاد الأمريكية. يملو من ٦ إلى ١٠ أمتار. يتميز ببراعم الغليظة القصيرة. أوراقه تحمر في أواخر الصيف وتبقى على أحمرها حتى الإصباح الذي يتم في أواخر الخريف || يعتبر من الأنواع الجاذبة التي لا تجرد في أي موقع كان.

١٠٢٢٩ - شَرْن *Fendu* (F). Clef, Split (E). صفة ما كان مشقوق أو مفلول أو مصعد.

١٠٢٣٠ - شَرْنَال، عَصَفَة *Pampe* (F). Blade (E). ورقة الحطاة والشعر ومعلم النباتات التجيلية.

## ١٠٢٣١ - شَرْنَب\*، شَبْرَم، بَوْنُوح

*Euphorbia pithyusa*, *Tithymalus cutifolius* (S). *Euphorbia pityusa* (F). Wild petty spurge (E). Tenfelsmilch (D). Pitiusa, Scebram (I).

نوع من الغريبون وهو نبات عشبي بري معمر يكثر في الأتربة الرملية الرطبة. لا شأن له في الزراعة إلا أنه من النباتات السامة الشديدة الضرر. كان يستعمل في الماضي البعيد كسهل جارف. وقد جاء من ابن البطار قوله: «وقد قتل به الجبال الطراقات خلقاً من الناس». عيشته فرحاً تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. ساقه لينة الصلابة. عديدة متفاعة، ستانية الشكل، فصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو وحيد الصلغ، عادم المرقق والشرايين، لونه إلى الخضار المائى. ازهاره سنبل التجميع تاجي الارزكاز، ازهاره صفيرة القذ زرقاء اللون || ساقه وفروعه متينة لدنة تستعمل في صناعة السلال.

١٠٢٣٢ - شَرْنَبِيَّات *Andraceae* (S). *Andraceae* (E). فصيلة من الطحالب تنتمي إلى رتبة السفانات.

١٠٢٣٣ - شَرْنِي *Falcinellus* (S). *Falcinelle* (F). *Falcinellus* (E).

جنس طير من طول الساق وقصيلة التنظليات. انواعه المعروفة أربعة، ثلاثة منها أمريكية الموطن واحد مهدد بالانقراض. أجسامها كبيرة. أعتاقها وصفوها مستطيلة. مناقبها مقوية. ألوانها مختلفة الألوان السبعاء المواج || جميعها من القواطع. تألف الحياة الجماعية. مرها عند الرحيل لا يقل عن ألف زوج. تسير شطوط متوازية متتالية لا تنصرف إلا عند الهبوط حيث تأخذ شكل الأقواس المتتالية || قوتها الديدان والحشرات المائية والقشريات || اعرف انواعه وأشهرها الشرني البهي.

١٠٢٣٤ - شَرْنِي بَهِي *Falcinellus igneus* (S). *Falcinelle éclatant* (F).

طائر من الشرني أطلق عليه العالم بوفون، فيما مضى، اسم كروان إيطاليا (Courlis d'Italie). أعضائه تشمل بعض المناطق الآسيوية والشرق الأوسط وأوروبا الجنوبية الشرقية

بصيد القوام والمصاير. يذئث في أصالي الأشجار البلسقة. أثنائه تنصع أربع وفئات تحضنها وحدها.

١٠٢١٨ - شَرُوق *Rollier* هو الشرارق، أطلبه.

١٠٢١٩ - شَرْمَة *Société, Compagnie* (F). *Society, Company* (E).

عقد بين شخصين أو أكثر يتفقون به على أن يقدم كل منهم شيئاً للعمل به واقتسام أرباحه.

١٠٢٢٠ - شَرْمَة إِرْتِقَابِيَّة *Tontine* شركة يؤلفها أشخاص متقاربون في السن عادة يقدمون فيها ودوس أموال ويشترطون توزيعها على الأحياء منهم بعد زمن معين.

١٠٢٢١ - شَرْمَة الْبَنَان *Fruitière* (F). *Fruiterer* (E). شركة أو جمعية تعاونية تجمع الحليب وتصنعه.

١٠٢٢٢ - شَرْمَة مَخَاصِة *Société en participation* (F). *Profit-sharing society* (E).

شركة تجارية مسترة وجوباً فعلوها أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقتسبا بنسبة معلومة ما تنتجه بعض الأعمال التجارية التي يقوم بها أحد أو بعض الشركاء أو ما يدور استغلال تجاري تمتد الإجل يقوم به الشركاء جميعاً بهمهم.

## ١٠٢٢٣ - شَرْم\*، شَرْنَبُونُس، نَبْرِيَّة

*Carpinus* (S). *Charme* (F). Horn beech, Yoke elm, Hornbeam (E). Hagebuche, Hainbuche, Hornbaum (D). *Carpine*, *Carpano* (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البتوليات رغب في الأراضي الرطبة. اغشائها صلبة صعبة الكسر تستعمل في صناعات عديدة اغشها الأنيار وما أشبه || سوقها متنبصة. قشورها ملس. أوراقها نائفة، متعاقبة، منفقة. ازهارها وحيدة المسكن. شاربها الذكورية متأخر من هربها الانثوية أكثر من اسبوع || أشهر انواعه الخمسة التالية.

١٠٢٢٤ - شَرْم الشَرُوق *Carpinus orientalis* (S). *Charme d'Orient* (F).

نوع من الشرم مهدد الشرق الأوسط. شجرته صغيرة القذ تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها متراكبة الأغصان، حمراء الحلاء. أوراقها صفيرة القذ. فصلها قلبى القاعدة، مسن الحافة || غشبا شديد الصلابة، حنطى اللون.

١٠٢٢٥ - شَرْم الْيَابَان *Carpinus japonica* (S). *Charme du Japon* (F).

نوع من الشرم مهدد اليابان. شجرته شبه هرمية الشكل تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أوراقها تملو نحو ١٢ سم. فصلها مستدير القاعدة، ذلق الطرف متباعد التنسج. متسج الصفعة || يعتبر من الأنواع الجاذبة التي تتطلب بعض المواقع الخاصة.

## ١٠٢٢٦ - شَرْم بَتُولِي، شَرْم مَبْدُول

*Carpinus betulus* (S). *Charme commun*, *Charmille* (F).

نوع من الشرم السبروتي المربى الشكل، يملو من ٦ إلى ١٨ م. أوراقه مجعدة النصل، مسنة الحافة، صفحتها تملو نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٥ عروقها متساوية الانتساب عددها يراوح من ٧ إلى ١٥ زوجاً.



شرم



شرنب



شرني بهي

## ١٥٢٤١ - شَرَفِيَّات \*، غُلُوطُون، غُلُوطُون

Gulo luscus (F), Glouton, Goulu, Carcajou (F), Gluton, Wolverine (E).



شَرَفِيَّات حَمراء

حيوان وسيد الجنس والنوع من السروحيات اللامع.  
جنت مستطيلة الشكل طويلا الكامل يراوح من ١١٠ الى ١٣٠ سم. رأسه كبير القد غروطي الشكل. اذناه مستديرتان. قوائمها قصيرة، خاسية البرازن الحادة. ذنبه جتل الصوف. يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. فروته لينة ناعمة لونها الى الصبغة الخفيفة اللامعة المالح. موطنه البلاد الشمالية الاسيوية والامريكية. اثناء تقص اربعة جراء تربتها نحو الحول.

## ١٥٢٤٢ - شَرَفِيَّات \*

Acrasie (S).

Acrasies (F), Acrasie (E).

فصيلة من الفطور الخاطئة. اجناسها وانواعها عديدة تعيش على بعض المواد الرطبة اعصها خيرة البرقة والبراز. وبراز الحيوانات المائية كروث الدواب وضفادع البرق. جهازها البولي مغلول بمادة حلالية يخلط فيها الشكل والحجم واللون مع اختلاف الاجناس.

## ١٥٢٤٣ - شَرَفِيَّات \*

Melandrya (S).

Melandrye (F), Melandrya (E).

جنس حشرات من فصيلة الشروحيات ورثة غديات الاجنحة انواعها المرفوعة عشرة منتشرة في معظم حراج السويليات في العالم. اجسامها مستطيلة الشكل، معتدلة التسطيط، تطول من ١٠ الى ١٦ مم. رؤوسها صغيرة، مستعرضة، قليلة التشويز. عيونها بارزة. كثيرها معتدلة الجرم. ملاحسها الفككية كبيرة. قرونها الانتشارية قلابية. كواسلها محبة مقببة. طبخها مستطيلة، مدنية المؤخر. اغامدها تلحف كامل الكليل باستثناء الطرف اللدب. قوائمها نطيفة. اثنائها وحيدة اللون منها البانديجاني والازرق الاسود المالح والابيض والاصفر والبنديجاني. تألف الجلود النشرة من مختلف انواع السويليات. شكلها دجوي. طراتها سريع الحركة. قوتها اوراق النبات والمواد النباتية المنطحة. يرقاتها فاتحة وعادة.

## ١٥٢٤٤ - شَرَفِيَّات \*

Melandryidae (S).

Melandryidés (F), Melandryidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة. اجسامها متقاربة الجرم، يتكرر فيها الشكل المستطيل. اطوالها تراوح من ٤ الى ١٦ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. ملاحسها الفككية كبيرة، متدنية. قرونها الانتشارية غيطية او صوطانية او قلابية. وعدد فصلها ١٠ او ١١. كواسلها مستعرضة. اغامدها لاحقة. قوائمها نطيفة. اسرارها رباعية القلق في الزوج الخلفي، خماسية في الزوجين الامامي والاصط. اثنائها ملوثة. جميعها غاصلة دامتة تعيش على مختلف انواع النبات وعلى الاشعاب النخرة والفطور وتحت اللحاء. يرقاتها خاشبة او فاتحة او شكاركة. اشهر اجناسها الشروقة والدراسة والمصاف.

## ١٥٢٤٥ - شَرَفِيَّات \*

Leptosperme (F).

جنس اشجار ونباتات من الشرايات وفصيلة الآيات. انواعه عديدة، نحو ٣٠. اوراقها صغيرة متعاقبة سطرية. ازهارها فردية التجميع محورية الارتيكار. ثمارها كمبورية كثيرة البزور الدقيقة. اوراقها وازهارها غنية تستعمل في عدة علاجات مقوية.

وافريقية الشمالية. جسمه كبير القد يطول نحو ٧٠ سم. ثوبه الى الصبغة الورداء السغماء المالح. رأسه عايق اللون. ظهره ويتناحاه غصن المالح. عتقه ورجلته وبلته الى السمرة الخطيئة. متفاده وصدقة عنه الى السمرة الكستانية. رجلته الى الخضار البحري المالح. يآلف النائم والاعوار والاهوار وضفادع مجاري المياه القليلة الانسياب. قوته البيدان والحشرات المائية والبلعيط والقشريات او بدثن في الانجار والشريرات المائية على ارتفاع متر او اقل عن سطح الماء. عتله مجموعة من البيدان والقشريات والجندور والقش. اثناء تقص من ٣ الى ٤ يعضات لونها الى الخضار الازرق المادم التوشيش تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع.

## ١٥٢٤٥ - شَرَفِيَّات

Effaner, Effaumer (F).

To strip of leaves (E).

قطع رؤوس الصف.

## ١٥٢٤٦ - شَرَفِيَّات

Effanage (F), Stripping (E).

انقطاع رؤوس صف الزرع عند افراط النمو وقد يتم ذلك قبل الاسبال.

## ١٥٢٤٧ - شَرَفِيَّات

Cocon

في الصلبة، اطلبها. ج شرائق.

## ١٥٢٤٨ - شَرَفِيَّات

هو الشرغ، اطلبه.

## ١٥٢٤٩ - شَرَفِيَّات حَمراء \*

Pyrochroa coccinea (S), Pyrochre rouge (F).

Pyrochroa coccinea (E).

حشرة واسعة غاصلة دامتة والجم من فصيلة الشريسيات ورثة غديات الاجنحة. تألف الاجراج والبراري. خافضها تعيش على بيلات الانجار وعلى اوراق النبات. يرقاتها في اول عهدها تعيش على المواد النباتية والمقصية ثم على ما تقتضيه من اساريع الحشرات الخاشبة. جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ مم. ثوبها احمر اللون. الرأس اسراس وارامز. رأسها مستدير الجرم. شكلها ضليمان. زياتها مستطيلان، مشطيان عند الذكر، منشاريان عند الانثى. عيناها بارزتان. ظهرها مستدير الطرف اللاحف، كثيف الخمل، عادم التحزير. لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في نيسان ويتبقى حتى تموز. تسرح في النهار. تسافد في ايار. تنجح الممكن مبيحاداً تحت لحاء الانجار وقشورها في البرقة عند بلوغها الكمال الجسدي تطول نحو ٢٤ مم. جسمها مستطيل الشكل مبطل الجرم، اغبر اللون، مستغلط الرأس البني، ضليع التأثير الفككية، سداسي الرواجب السمر. طول الكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة.

## ١٥٢٤٠ - شَرَفِيَّات \*

Pyrochroidae (S).

Pyrochroidés (F), Pyrochroidae (E).

فصيلة حشرات واسعة وقاصصة من رثة غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تألف الخويس والنباتات التريينية وازهار النباتات الطموعة والزراعية. جميعها صغيرة القد مبطله الاجسام المستعرضة المؤخر. زياتها مركبة من ١١ فصلة وهي مشطية الشكل عند الذكور، منشارية الشكل عند الاناث. اسرارها خاسية القلق باستثناء الزوج الخلفي فانه رباعي. يرقاتها مبطله الجرم تعيش تحت لحاء الانجار وقشورها الصلفة ساعية وراء يرقاتها الحشرات الخاشبة للقضاء عليها. اشهر اجناسها الشريسية.



شَرَفِيَّات



شَرَفِيَّات



شَرَفِيَّات

**Senecio argenteus (S). شَرَوْنَةُ فِصْبِيَّة**  
**Sénéceon argenté (F).**  
 نوع من الشرونة وهي عشبة سربوتية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها سمكة التصل المفصص والمسنن، خلية البشرة، فضية اللون. ازهارها الى الصفرة الباهتة. ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

**Senecio doria (S). شَرَوْنَةُ مَذْبِيَّة**  
**Sénéceon Doria, Herbe dorée (F).**  
 نوع من الشرونة وهي عشبة سربوتية معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها اهليلجية الشكل، لحية التصل، بحرية اللون، تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٠ ازهارها متوسطة القد، فاشرة البند، لونها الى الصفار المذهب || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

**Senecio flammeus (S). شَرَوْنَةُ نَارِيَّة**  
**Sénéceon rouge-feu (F).**  
 نوع من الشرونة وهي عشبة سربوتية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها الجذعية مستطيلة الممتد، سنانة التصل المسنن الخافت. أوراقها السفلى قصيرة الاعناق، بيضيه الشكل، عادمة التسنين. ازهارها ناروية اللون، حراء اللون، عذقية التجميع || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

**Sénéclonées (F). شَرَوْنِيَّات**  
 سبط من فصيلة المركبات نباتاته عدة مئات مختلفة الاشكال والاحجام. اشهرها الشرونة.

**Truffe gâtée (F). شَرِيَاخ**  
**Tainted truffle (F).**  
 الكساة الفاسدة التي قد استرخت (السلالة).

**Cepola (S). Cépole (F). شَرِيَاط \*٥**  
 جنس اسماك بحرية من فصيلة العنجيليات. انزاعة المعروفة قليلة، اعطائها المتوسط وبحار البلاد الحارة. اجسامها سوية الشكل حراء اللون. رؤوسها غليظة مقطوعة الاخطام. زعانفها الظهرية والبطنية تمتد من الراس الى الذنب. زعنفتها الشرجية عريضة الشكل. لحمها عادي الصنف قل من يرغب فيه.

**Cepolidae (S). شَرِيَاطِيَّات ٥**  
**Cépolidés (F). Cepolidae (E).**

فصيلة اسماك بحرية من الطغيات ثلاثيات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك اساطم التقاف || اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش بين المشرابات وفي الاساطل || اجسامها سوية الشكل تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ألوانها متباينة اللون. زعانفها الظهرية والشرجية قامة. رؤوسها خنفسه، غليظة. اشدافها رحبة. ميويتا كبيرة || لحومها كاسنة الصنف، قل من يرغب فيها.

**Artère (F). Artery (E). شَرِيَاك**

هو الرعاء الذي يحمل الدم من القلب الى سائر اجزاء الجسم يقابله الوريد الذي يعيد الدم من اجزاء الجسم الى القلب. اما اتصال الشريان بالوريد فيم بواسطة الاوعية الشعرية التي توصل الشريان بالوريد. تقسم الشرايين الى اجسام الجوالي الى اربعة اقسام رئيسية: اولا الشريان الاخر (الاورطي) الذي ينبع من البطن

**Leptospermées شَرَهِيَّات، شَرَهِيَّة**  
 سبط من فصيلة الآسيات، اشهر انواعه الشري.

**Miel (F). شَرُو**  
 هو السمل، اطلبه.

**Mutation شَرُو**  
 هو الانتقاء، اي التبدل الجفائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع او ضرب من الياحي.

**Senecio (S). شَرَوْنَةُ**  
**Sénéceon (F), Groundsel (E), Greiskraut, Kreuzpflanze (D), Senecio, Senacione (I).**  
 جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ١٣٠٠ منتشرة في جميع اسواق العالم. معظمها بري وبعضها زراعي. منها الاعشاب والجنبات والشجيرات المتباينة الاشكال والالوان || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

**Senecio elegans (S). شَرَوْنَةُ الرِّيْقِيَّة**  
**Sénéceon d'Afrique, S. des Indes (F).**  
 نوع من الشرونة وهي عشبة حولية ومعمرة تملو ٣٠ الى ٦٠ سم. أوراقها سنانة التصل، زياه البشرة. ازهارها وديدة او ليلية البتلات. اقمارها الى الصفرة، قناباتها موشحة بالاسود || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

**Senecio aurantiacus (S). Sénéceon orangé (F).**  
 نوع من الشرونة وهي عشبة ريفية معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها قليلة الحمل والزرغب، بيضيه التصل، مدبية المقعدة. ازهارها برتقالية اللون، سمر القرمص، صفيرة العلق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

**Senecio sagittifolius (S). شَرَوْنَةُ سَهْمِيَّة**  
**Sénéceon à feuilles sagittées (F).**  
 نوع من الشرونة وهي جنبة جادة معمرة تملو نحو ثلاثة امتار. أوراقها سهمية الشكل والسفل منها كبيرة فارشة طول نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٤٠ || ازهارها كبيرة القد، كثيرة العدد، عذقية التجميع، تاجية الارتكاز. قناباتها تينية اللون، لسنانها عاجية || ازهارها يستمر طوال الخريف.

**Senecio vulgaris (S). Sénéceon commun (F). Common groundsel (E).**  
 نوع من الشرونة وهي عشبة برية حولية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها سنانة التصل، شترية الحافة، زياه البشرة على صفحتها السفلى. ازهارها صفراء اللون. عاقية القرمص. يكثر وجودها في الاراضي المزدرة. قناباتها الماشية لحسونة أوراقها وبرتبانها || يقولون انها طيبة تنظم الطست وتقويه.

**Senecio scandans (S). شَرَوْنَةُ عَاكُوشَة**  
**Sénéceon grim pant (F).**

نوع من الشرونة وهي جنبة سربوتية عارشة معمرة تملو نحو ٤ امتار. فروسها متراكبة فناء. أوراقها اهليلجية مستطيلة الزام الاخير، نصلها خلى البشرة على صفحتيه رويساتها الزهرية ثمانية التركيب، عذقية التجميع، تانية الارتكاز || ازهارها يستمر طوال الخريف.



شرونة شائلة



شرياك

Dessiccation totale (F). ١٥٢٧٥ - شَرَّازَكَة

Total desiccation (E).  
شُرَّالْيَه شَرَّازَة : كان يابساً جداً .

Encyrtus (S). ١٥٢٧٦ - شُرَّالْف

Encyrtus (F). Encyrtus (E).

الواحدة شَرَّازَة . جنس حشرات نافعة من فصيلة التفرافيات .  
أنواعه متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة  
الحرارة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الحرفشيات  
والعدديات || أجسامها صغيرة ، أسطوانية الشكل ، تطلو  
نحو ٢ م . م . اجتمعت غشائية ، شفافة ، كبيرة عند الشقين .  
ألوانها سوية الألوان القائمة .

Schizogonia (F). ١٥٢٧٧ - شَرَّالْكَة

Schizogony (E).

الشَرَّاة مدجج تكاثري خاص تسلكه البويضات اللاشقية  
حيث إن السيتوبلازما تنجز إلى قد عددها يفاهي عدد  
الجبلات .

Encyrtidae (S). ١٥٢٧٨ - شَرَّالْفِيَّات

Encyrtidae (F). Encyrtidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجتمعة المحصورة .  
أجسامها وأنواعها المعروفة كثيرة العدد . جميعها نافعة  
تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين وحرفشيات  
الاجتمعة . أسطانتها معظم أقطار العالم باستثناء المناطق  
الباردة والأساوية || حشراتها صغيرة القدر تطلو نحو  
ملليمتر واحد . أجسامها وقرونها الاستعارية متباينة  
الاشكال . رؤوسها مستعرضة . جوفائها اكبر من بطونها .  
مرزاتها صغيرة مستقيمة . ألوانها مختلفة ووحيدة اللون ،  
يلعب فيها الموالج الاسفح || أشهر اجناسها الدقار  
والملوس والليرة والشراش .

Schizocodon (S). ١٥٢٧٩ - شَرَّالْقُد

Schizocodon (F). Schizocodon (E).

نبات عشبي ممر من فصيلة الخملنجيات . منته الجبال  
في المناطق المعتدلة الحرارة || ساقه جذمة . أوراقه ابيدة ،  
قرصية الانتشاب ، شبه قلبية الشكل ، مستطيلة المالحق .  
نصالحها جلدية مسنة الخنار ، لونها إلى الخضار الاسفح  
الموالج يطوقه هامش احمر || ازهاره وريدية اللون ، قطرها  
نحو ٣ سم . تنويره يستمر من آذار إلى نيسان .

Flanc abrupt (F). Abrupt flank (E). ١٥٢٨٠ - شَرَّوْن

جنب الوادي الوعر الهادي .

Osselet (F). Knuckle-bone (E). ١٥٢٨١ - شَرَّوْكَة

كل عظيمة من اطراف القوائم تدعى شَرَّوْكَة . ج شَرَّوْن وشَرَّوْن .

١٥٢٨٢ - شَرَّوْب

الغصيب من الشجر قبل ان يصلح . ج شَرَّوْب .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). ١٥٢٨٣ - شَسْ

اسم شامل يطلق على الصخور المنفذة التركيب التي  
تنقسم الى صفائح . ج شَسْ .

Olpidium (S). ١٥٢٨٤ - شَسْ

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمغريات . تكاثرها  
لاشي ، تتميز بغشائها البوقية المستديرة . يوغها كروي  
الشكل يحمل حبة غليظة دقيقة || معظم فطوره

الايسر يلفوق جذع الرثة اليسرى ثم ينحدر نحو الصدر  
حيث يتفرع وينشعب || ثانياً للشران السباتي وهو  
يقسم الى قسمين : الظاهري الذي ينلظي ظاهر الرأس  
والوجه وينظم النخ ، والباطني الذي ينلظي معظم باطن  
الجسم || ثالثاً شرابين الاطراف العليا والسفل وهي  
الشران الايطي والمعدني والحرقى || رابعها الشرايين  
السطحية التي تسير تحت الجلد . أشهرها الكبيري والمعدني .

Nervure tertiaire (F). ١٥٢٦٣ - شَرَّيَّان عَصَب

Tertiary nerve (E).

هو في نصل الاوراق النباتية ، الخرى النسفي الذي يتفرع  
من الفرق .

١٥٢٦٤ - شَرَّيَّان صُبَّاني هو الدواج ، اطلبه .

Sauvageon, Franc (F). ١٥٢٦٥ - شَرَّيَّكَة

Wild stock, Ungrafted (E).

النبته الحاصلة من بزة ولم تقطع ، ج شَرَّيَّكَة .

Radicle (F). ١٥٢٦٦ - شَرَّيَّس

هو الجذر ، اطلبه .

١٥٢٦٧ - شَرَّيَّ الماء \*

Sparganium ramosum, S. erectum (S). Sparganier  
rigide, Rubanier, Ruban d'eau (F). Common burd-  
reed, Knop sedge (E). Astiger igelkolben (D). Bledo  
Chiodo di Dio (I).

نوع من السافرة وهو عشبة مائية معمرة من فصيلة البوطيات .  
أوراقه متعاقبة ، حاضنة ، مصغية الشكل ، جامدة للتصل ،  
سادة الاطراف . ازهاره ابطية وهامية ، كروية الشكل ،  
متتامة . يوجد في مياه البلاد المعتدلة الحرارة .

١٥٢٦٨ - شَرَّيَّيَّات ، رَيَّيَّات

Taeniadae (S). Taeniadae (F). Taeniadae (E).

فصيلة ديد من المتطفلات اجناسها وأنواعها عديدة تتطفل  
على مختلف الحيوان .

١٥٢٦٩ - شَرَّيَّ غُصَّيَّري

هو البت الغصاري ، اطلبه .

١٥٢٧٠ - شَرَّيَّكَة هي شكاكة الية ، اطلها .

١٥٢٧١ - شَرَّيَّك

Associé (F). Associated (E).

هو كل عضو في شركة او جماعة منتظمة .

١٥٢٧٢ - شَرَّيَّك في الالتزام

Coobligé (F). Coobligant (E).

هو من كان ملزماً بمقتضى التعاقد او القانون ان يشترك  
في دفع دين بالتضامن مع غيره .

١٥٢٧٣ - شَرَّيَّكَة \*

Scissurella (S). Scissurella (F). Scissurella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مغديات الارسل  
وفصيلة القبايبات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع  
بحار العالم || اصداؤها صغيرة ، رقيقة ، شفافة ،  
مشرقة المختار القاعدي الهادي الرأس . أجسامها شفافة  
مستطيلة ، صغيرة الرؤوس ، سداسية القوامس المهدبة .

١٥٢٧٤ - شَرَّيَّين هو الكشوث العربي ، اطلبه .



شَرَّيَّ الماء



شَرَّيَّكَة



شَرَّوْد

١٥٢٩٣ - شُسْنَة خَضِرَاء \* ، نَقَّار أَخْضَر  
Gecinix viridis (S). Gécine vert, Pic vert, Pivert (F).  
Green woodpecker (E).

طائر من الشَّن موطنة فيح الأرباء يمتد من الهند الصينية إلى الجزائر أدوية || جسمه بطول نحو ٣٣ سم. ثوبه جميل الألوان الزاخرة، متداخل الأخضر والاحمر والاصفر والاسود والابيض. رأسه احمر اللون. ظهوره الى الاصفر الاصفر المالح. اذنيه اصفر. بطنه الى الخضار القاتم الزاهي. عجمه الى السواد اللامع يرتكز على خط احمر يمتد من قاعدة المنار الى اعلى العنق. جناحاه مخضمان بالاسود والابيض والاصفر. منقاره خشن اللون اسود البيج || يألف الاسراج والغابات والرياض القريبة من مجاري الماء. قوته الحشرات واساريمها ويرقاتها ومكها يلحقها بسمرة البرق يمكنه عليها لسانه المنطع الاخاذ. يمتد منه في تجاريف الاشجار. اثناء تصنع من ه الى ٨ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٥ الى ١٨ يوما.

١٥٢٩٤ - شُصِّي \*  
Schistoux (F). Schistose (E).  
ما كان منضد التركيب كالشس.

١٥٢٩٥ - شُصِيغَة \*  
Curvularia (S).  
جنس فطور مجهرية من الريذانيات وفصيلة الطحليات. انواعها قليلة العدد جميعها ربية قليلة الاذى تعيش على الانسواء النباتية الدالة || اعرف انواعها شُصِيغَة الحُروغ (Cur. lunata) التي تعيش على اللحاء السائرة نحو الياس في الحُروغ والمتنا وبمض الحفصيات.

١٥٢٩٦ - شُصْبِيدَار \*  
Tamier (F).  
هو الفلشرين ، اطليه.

١٥٢٩٧ - شُصْدَقَب \*  
قال دارد الانطاكي: « ثبت يميل الى صفرة واصله الى الحمرة فقه العلم فيه حدة يسيرة واجوده المجلوب من در النوبا. وهو ينفع من الاستسقاء والجنين وعسر التنفس ويحل البلغم ويدير البول ويزيل الريح ».

١٥٢٩٨ - شُصَم \* ، عَيْن الدِيك ، عَصْبَة السُّوس  
Abrus pectorius (S). Abre à réglisse, Liane à réglisse, Arbre à chapelet, Pois d'Amérique (F). Bead tree, Wild liquorice, Rosary pea (E). Paternosterkraut (D). Falsa liquirizia, Liana regolizia d'America (I).  
نوع من الابروس وهو جنبة زراعية عارضة. جلورها صناعية تشمل استعمال السوس. زهورها مستديرة الشكل وقشورها جامدة ، سلية ، جزئية اللون ، سوداء النقطه ، تشمل على صناعة البساتن والقلائد. لبابها دهني يفيد الاسماء وبهم من استخرج منه مادة الابرين.

١٥٢٩٩ - شُصْنَة \* هي الانموذج والبنية.

١٥٣٠٠ - شُصَّ \*  
Elleschus (S).  
جنس حشرات من غديات الاجنحة ولسيلة السوسيات. انواعها المعروفة عشرة منتشرة في معظم اقطار البلاد الممتدة الحرارة. معظمها دامن يعيش على المواد النباتية المنحلة وبعضها يعيش على شياق الحور والصفصاف || اجسامها صغيرة اهليلجية الشكل. كواثيلها محدبة نائفة الزوايا. احمادها لاسفة مخددة ، منها انواع ثنائية البقي وغيرها رباعية. قرونها الاستشعارية صلبة الشكل. قوايلها نشيلة مستدلة القد. اثنائها تترافق من الشقة الى السرة يطولها خلل صناعي. يقبها الى السرة القمحية.

عسار يتطفل على النباتات الزراعية. اشهرها واضرها شس التبوغ والملفوف والتفل.

١٥٢٨٥ - شَسَّ التَّبُوغ \*  
Oidium nicotianae (S).

نوع من الشس يصيب سنج الشتل الفنية ، يركب اليانها الناشئة وخالهاها فيلونها ويقضي عليها || يكافح بتطهير التربة قبل البذر او باستعمال احد الفوطاير النحاسية المخففة عند ظهور اللوم.

١٥٢٨٦ - شَسَّ المَلْفُوف \*  
Oidium brassicae, Chytridium brassicae (S).

نوع من الشس يركب سنج الملفوف وقد يكثر في المشتال الربوية فيحطب سوق الشتل عند سطح التربة ويسبب يباسها الجزئي ثم انطاشها فوق بعضها وهرابها وموتها. يكافح باستعمال احد الفوطاير النحاسية او غيرها من الفوطاير الحديثة التي يزداد عددها كل يوم.

١٥٢٨٧ - شَسَّ التَفَل \*  
Oidium trifolii (S).  
نوع من الشس يركب اوراق التفل فيؤذيها ويسبب يباسها || يكافح باستعمال احد الفوطاير النحاسية وذلك بعد حش التفل عدة وبجيرة لا تتعدى ٢٤ ساعة.

١٥٢٨٨ - شُصِيغِي \* حُصَارِي ، هَامِيغِي  
Marginal (F). Marginal (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو في الحُتار او ما جاء على الحاش.

١٥٢٨٩ - شُصِيغِيَّة \*  
Marginalisme (F).  
Marginalism (E).

الشصية نظرية اقتصادية تقول بان تحديد قيمة الشيء منوط بعامل الحاجة اليه.

١٥٢٩٠ - شُصَّف \*  
الشص : البسر الذي يشقق ويجفف.

١٥٢٩١ - شُصْكَس \*  
Chascax (S).  
Chascax (F). Chascax (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مملئات الابريل وفصيلة التينينيات. انواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي || اصداها مستديرة القد ، مرديلة الشكل ، ملونة ومزخرفة. فوطاتها فضية مسطيلة ، مالة الاريفسة العادمة التنفين || اعرف انواعها شُصْكَس مديرا (C. maderensis) الذي يكثر ويوجد على شطوط جزيرة مديرا.

١٥٢٩٢ - شُسْن \*  
Gecinix (S).  
Gécine, Chloropic (F).

جنس طير من فصيلة النقاريات يتسلق جلوع الاشجار وينقب قشورها وشكبرها في طلب الحشرات واساريمها. ونبغ المعروفة قليلة العدد. راسه شنة || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٣٣ سم. اثنائها متداخلة الالوان الجسيلة يتنلج فيها الاخضر. مناقبها غروبية ، مسطيلة ، مخددة. اجنتها متوسطة الحجم والانفراج. اذنانها رتاجية الريش. اصداها قصيرة. اجسامها قوية. غالبا مستقلة الاطراف المخددة الحادة || اشهر انواعها الشنة الخضراء.



شس التبوغ



شس الملفوف



شس التفل



شنة غصراء



شش



شص



شصاب الشرم



شصب الحور



شصب الصنوبر



شصب الكتان

١٥٣٠٩ - شَصَبُ الْكَتَانِ \* (S). Melampsoira lini (F).

فطر مجهرى يتطفل على جميع أنواع وضررب الكتان من برية وزراعية فيطبع الأوراق ويطلع بالانتاج . يتطفل أولا بشكله الاثيدي في اوائل الربيع حيث يركب نصل الأوراق على صفحته . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب لها الى الصفرة البرتقالية . وعند اكمال طوره الاثيدي تعمل ذماتحه في طورها العصامي فتخرج البشرة عن بورغ كالحباب لونه الى الجؤرة الزاوية . يكافح وقائيا أولا باجتناب المواقع الرطبة . ثانيا باجتناب الاثرية القوية الاندماج . ثالثا باجتناب الاكثار من الاسمدة الفسفاتية . رابعا باستعمال البورق بمعدل ٥ او ٥ كيلو لدم الواحد .

١٥٣١٠ - شَصَبُ الْمُضَافِصِ \* (S). Melampsoira evonymi-capreaum (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق ونواصي المضافص فيؤشبه ببثور الاثيدية الكثيفة التجميع التي تبرز صفراء اللون على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى دمايل من الدمايح ، لونها الى الجؤرة تطعب انجبة الاوراق وتسبب يسهلها .

١٥٣١١ - شَصَبِيَّات \* (S). Melampsoiraceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الصمليات تتميز بتكوين اعضائها التناسلية (الناسل) تحت البشرة او تحت القاعدة الادمية . اثيراتها فارشة طليقة . ذماتحها صفيرة تنبؤ منطفة ثم تنفلق عن بويئات فردية النشوء لكيفية التجميع . اجناسها عديدة ، اشهرها واعرفها من الوجهة الاقتصادية الستة التالية : الشصب والشصاب والشصبي والزينة والسلاج والشفنة .

١٥٣١٢ - شَصْدُقُ الرِيحِ \* (F). Rose des vents (E).

هو الصميم المتفرع به عاليان معاصر مهب الرياح . يشمل ١٦ اتجاهاً منها اربعة رئيسية وهي الشمال اي الحنوا

١٥٣٠١ - شِصْ ، صِينَارَة (F). Hameçon (F).

عُظْافٍ او كلاب صغير من فولاذ يثبت في خيط والحيط في عصا طويلة . يستعمل لصيد السمك .

١٥٣٠٢ - شَصَاب \* (F). Melampsoiridium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيات يتميز بدماتحه المادامة التكتات وبعداماته الحطية الجلول والشاء . اثيراته تركب الاوراق على صفحتها السفلى . مظهرها الخارجي بثور صفيرة وتقالية اللون مبشرة بدون ترتيب الى ان تدخل في طورها العصامي حيث تأخذ اللون الحطلي ثم تنفلق الى انواعه قليلة اعرفها شصاب البتولا وشصاب الشرم .

١٥٣٠٣ - شَصَابُ الْبَتُولَا \* (F). Melampsoiridium betulinum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق البتولا فيؤشبه بسقطها الباكرك . مظهره الخارجي ، في طوره العصامي ، يقع مضلعة مبشرة لونها الى الصفرة تبدو على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى بثور مكونة من الدمايح الدماعية الحطية اللون || اضراره زعيدة لا تستوجب المكافحة .

١٥٣٠٤ - شَصَابُ الشَّرْمِ \* (F). Melampsoiridium carpin (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الشرم فيؤشبه || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب تركب النصل على صفحته السفلى . تبدو صفراء اللون ثم تتحول الى الحطلي فخطب نسيج النصل وتسبب الاجبال الباكرك . لا يستوجب المكافحة .

١٥٣٠٥ - شَصَب \* (F). Stérilité des plantes (F).

هو عدم اثمار النبات سببه عارض مجسوري يمنع النبات عن التثوير او يحول الاثمار الى اوراق من فرط النمو .

١٥٣٠٦ - شَصَب \* (F). Melampsoira


جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيات يتميز بدماتحه المجهزة بتكتات دبوسية . دماحاته ممراسة ، وشيمية الارثكاز لا وتيرة || انواعه عديدة لا تقل عن ٢٠ اشهرها ما يتبع .

١٥٣٠٧ - شَصَبُ الْحَرَوِ \* (F). Melampsoira rostrupii, Caoma mercurialis (S).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الاثيدي على الحور فيركب الاوراق والسوق . وهو على الاوراق يقع صفيرة عديدة مبشرة بدون انتظام تكثر عنه الحرات النصل وفي زامه الاخير تسطبه وتسبب سقوط الاوراق وضعت الاشجار .

١٥٣٠٨ - شَصَبُ الصَّنَوْبَرِ \* (F). Melampsoira pinitorqua, Caoma pinitorquum (S).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الاثيدي على غراخبي ونواصي الصنوبر كما يركب بشكله العصامي اوراق الحور . مظهره الخارجي على نواصي الصنوبر يقع صفير صفيرة الشكل طويلا نحو ١٢ م وعرضها ١٠ يملؤها قصبات صفيرة شمولية تقرح للحاء وتطلع بالبشرة فصب تحجين النامية ان لم تقصر عليها .



معتقة، نصلها مالم البشرة شديد الخضار. تزرع لهاها الخريطة الشكل، الشديدة الحرارة والغنية بيمض الفيتامينات الرئيسية اعصها الفيتامين « ث ».

Partager en 2 parties égales (F). **شَطَر** ١٥٣٢٢  
To share in equal division (E).

قسم الشيء الى جزئين متساويين.

١٥٣٢٣ - **شَطَط كَتِي** \*

Sarcidornis melanoeca (S).

Sarcidornis noirâtre (F).

طائر من فصيلة البليات. اصلاؤه تمتد من افريقية الاستوائية الى برمانيه في الهند || جسمه كبير القدر مستطيل المتق يعمل في الصفحة العليا من متفاده لخصه لحمية جزوية اللون. جناحاه كبيران لافان. ذنبه جمد. ثوبه متراكب الاضفر والبنيفسج والاسود. مؤخر عنقه وصدره وبطنه الى البياض الاخير.

Excédent (F). Exceeding (E). **شَطَط** ١٥٣٢٤

هو ما زاد او تبقى او فاض. يقال لا وكس ولا شطط اي لا نقصان ولا زيادة.

١٥٣٢٥ - **شَطَط السُلْطَة، تَحَاوُر السُلْطَة**

Excès de pouvoir (F). Excess power (E).

هو ان يتجاوز احد القضاة او المأمورين الاداريين حدود سلطته.

١٥٣٢٦ - **شَطَف** \*

Discope جنس اسماك بحرية من فصيلة الفريجات ورتبة شالكات الزعافت. انواعه عديدة جميعها كبيرة القدر. جملة المنظر، مأكولة، للذئبة اللحم. طولها يراوح من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اشتهر ان اسماك المحيط الهندي وبعضها يعيش في البحر الاحمر || من انواعه المشهورة البهار والشطف والشطف الوردى والشطف الاسمر والمهر.

Discope nigra ١٥٣٢٧ - **شَطَف اَسْمَر**

سمكة من الشطف، كبيرة القدر طول نحو ٩٠ سم. ثوبها الى الطحلة السراء. مرتبطة بيند من البحر الاحمر الى الخليج الفارسي والهند وسرنديب.

Discope sebas ١٥٣٢٨ - **شَطَف وَدِي**

سمكة من الشطف كبيرة القدر طول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى الوردية المذهب المواج يطولو تخطيط احمر قاطب يمتد من الرأس الى التفرج. لحمها لذيذ الطعم مرغوب فيه. تكثر في المياه الهندية والاسترالية.

Chaetomys (S). **شَطْمُوس** ١٥٣٢٩ \*

Chétomys (F). Chaetomys (E).

حيوان لبون قاتم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الشحيمات موطنه البرازيل. طول نحو ٥٠ سم وذنبه ٢٥. رأسه غليظ مفطع. ذقنيه مقطوع. خنثياته مقرطشتان عيناة واذاؤه صغيرة. جرابزه معتدلة القدر. اظافره قوية سادة. ذنبه كاسي القامة، حرسش الباني، لا اخاذ. شعره هلي هدي فحاز يتخلله شوكة قصير كلالش ينفض عنه الدفاع من النفس || يألف اللبابات والاحراج والمراعي والحقول. يسرح في الليل. يتسلق الانجار. قوته المواد النباتية على اختلافها.

والجنوب اي القبلية والشرق اي الصبا والغرب اي الدبور. واربعة ثانوية وهي الشمال الشرقي اي الحيف والشمال الغربي اي الجرياء والجنوب الشرقي اي الازيب والجنوب الغربي اي الصابنة. ومثانية ثالثة وهي الشمال الشرقي اي هيف الشمال، والشرق الشرق الشمالي اي هيف الصبا، والشرق الشرق الجنوبي اي ازيب الصبا، والجنوب الجنوبي الشرقي اي ازيب الجنوب، والجنوب الجنوب الغربي اي صابنة الجنوب، والغرب الغرب الجنوبي اي صابنة الغرب، والغرب الغرب الشمالي اي جرياء الغرب، والشمال الشمال الغربي اي جرياء الشمال.

Petit de la gazelle (F). **شَوَصَر** ١٥٣١٣  
Young gazelle (E).

هو صغير الغزال ويدعى جداية. ج اشجار وشواصر.

Mauvaise lactière (F). **شَوُوس** ١٥٣١٤  
Bad milk (E).

انثى البهائم القليلة الدر. ج شصص وشصاص.

Melampsorella ١٥٣١٥ - **شُصِب** \*

جنس تطور مجهري من فصيلة الشصيبات. يتبين بذماثفه الديمة التكاثر وبذماثفه الشفاقة الجلول والنشأ. طوره الانثي يتصل بسقلان شارف || انواعه قليلة اعرفها شصيب التوب.

١٥٣١٦ - **شُصِب التَّوْب** \*

Melampsorella caryophyllacearum, Melapsora cerastii, Acidium elastinum (S). Rouille vésiculaire du sapin. Balai de sorcière des rameaux de sapin (F).

فطر مجهري يتطفل على التوب فيؤذيه ويقوده الى المكدة (تكتسه السامرة). مظهره الخارجى يفور صغيرة خيطية التجميع والرتيب لا تباينة الشكل والحجم تركب التصل على مسحة السفل بمؤازة الفلج تصطب الاحداد والتوالي وتسبب المكدة الذي يشوه الانجار ويؤخر نموها. يكاتف بالتطاع وشرق الافناد المكودة.

١٥٣١٧ - **شُط** هو الشاطي. ج شطوط وشطان.

Talle (F). Sucker (E). **شُطَة، شُطِيَة** ١٥٣١٨

الشطوع ج شطوع واشطاعه هي فراخ الزرع. يقال شطا واشطأ الزرع فهو شطلي.

Trisetum (S). **شُطاس** ١٥٣١٩

Trisète (F). Trisetum (E).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية من فصيلة التيجليات. انواعه المعروفة قليلة المدد منها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || شكلها قريب الشبه من الخمرال. بعض انواعها شطي. عصفتها مستطيل، باثت الخضار. ازهارها منفرج متعابد السنبليات.

Radiation (F). **شُطَب** ١٥٣٢٠

محر من جدول او مجمل.

Capsicum conicum (S). **شُطَة** ١٥٣٢١ \*

Piment à bouquet rouge (F). Cone pepper (E). Kleine Beisbeere (D). Pepe d'Arabis, Pepe rosso piccolo (I).

نوع من الفليفلة وهي بقلة عشبية حولية من الفصيلة الباذنجانية. تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سهمية



شصيب التوب



شط



شطفنت كتي



شطف



شطوس



Toile d'araignée (F). Cobweb (E). **شُع** ١٥٣٤١ -

هو بيت الشبكات الموشى بالنس .

Andouiller (F). Tine (E). **شعاب** ١٥٣٤٢ -

هو الانشعاب الطليحي الذي يحصل في قرون الايل والاريل واليسود . وين هذه الشعاب يمكن تحميد عمر الحيوان .

Endroit boisé (F). **شَعَار** ١٥٣٤٣ -

Wooded side (E).

الشعار : مكان ذو شجر . وهو الشجر اللثف او ما كان من الشجر في اين وطاء من الارض .

Rayon de lumière (F). **شُعَاع** ١٥٣٤٤ -

Ray of light (E).

عصره الشمس المنسكب الذي تراه منشراً كالخيل .

Barbes (F). **شُعَاع ، شعاع ، شعاع** ١٥٣٤٥ -

Beard, Bristles (E).

هو سنا السنبل اذا يبس وما زال على السبله || يقال اشع الزرع اذا اخرج شعاع .

Actinomeris (S). Actinomère (F). **شُعَاع** ١٥٣٤٦ -

جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه قليلة . اوراقها فتاة الشكل ، السفلى منها متعاقبة والعلوية متعاقبة . ازهارها صفر . تحته كروي الشكل اسف . يزورها مفلطحة مجنحة ثنائية المسك || اشهر انواعه الطليعي وشعاع سكرورزا .

Rayon Incident (F). **شُعَاع سَاقِط** ١٥٣٤٧ -

Incidental ray (E).

١٥٣٤٨ - **شُعَاع سَكْرُورْزَا**

Actinomeris squarrosa, A. alternifolia (S). Actinomère à feuilles alternes (F).

نوع من الشعاع وهو نبات عشبي معمر يملو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه متعاقبة ، مستطيلة ، مدبة ، لائقة ، جلدية النصل ، مسنة الحافة . ازهاره رؤسية عديدة ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . || ازهاره خريفي .

١٥٣٤٩ - **شُعَاع طَبِي ، حَكِيْفَةُ السَكْرِي**

Actinomeris hellanthoides (S). Actinomère-Soleil, Herbe au diabète (F). Diabète weed (E). Strahlblume (D). Erba du diabète (I).

نوع من الشعاع وهو نبات عشبي معمر يملو نحو المتر . اوراقه بيضيه لسة لائقة ، نصلها اذني الصلعة السفلى . ازهاره رؤسية قطرها من ٥ الى ٨ سم . لونها الى الصفار الشبي || ازهاره يسمر من تموز الى ايلول . يقال انه يفيد السكري .

١٥٣٥٠ - **شُعَاع مَا وَرَا النِّسْجِي**

Rayon ultra-violet (F). Ultra-violet ray (E).

١٥٣٥١ - **شُعَاع مَخْرَجِي**

Rayon cathodique (F). Cathodic ray (E).

١٥٣٥٢ - **شُعَاع**

Radiateur (F). Radiator (E).

جهاز كهربائي يزيد مساحة الاشعاع .

١٥٣٥٣ - **شُعَاعَة**

Actinauxisme (F).

Actinauxisme (E).

الشعاعية تأثير الاشعاع ان غيالي او وضائي على نمو

النبات .

١٥٣٣٠ - **شَطْن**

Difformisme (F). Deformism (E).

هو اليب التناسبي او الخلو من التناسق للألوف والانجم المقول او المتع .

١٥٣٣١ - **شَطْنِي**

Cespitieux (F). Cespitose (E).

نمت تيسف به النباتات الكثيرة الاشطاء اغصنها النباتات التجيلية .

١٥٣٣٢ - **شَطْنُوس**

Dissident (F). Dissident (E).

الشطوس من خالف او ناقض الغير .

١٥٣٣٣ - **شَطُون**

Squalius (S).

Chevaline, Chevesne, Chevenne (F). Chub (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الخفانة . انواعه عديدة منتشرة في معظم بحيرات وانهر البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها وشعية الشكل . زعانفها الظهرية فردية ، متوسطة الحجم تقابل الزعانف الشرجية المنقشرة الى شطرين || ألوانها متباينة الالوان المختلفة تكثر فيها الريدة والزرقه البنفسجية . جوانبها وبطنها فضية الالبن . زعانفها الى الصفار الاخضر المواج الى الهمرة السمراء اعرف انواعه واشهرها الشطوة المبلولة وشطوة سوي .

١٥٣٣٤ - **شَطُونَة سَوِي**

Squalius souffia (S).

Chevaline souffie (F). Bull-head (E).

سمكة نهريه يبيض من الشطون . اعطائها والرافد والانهار الجراف السريعة التيار || جسمها صغير القذ يطوق نحو ١٦ سم . ثوبها الى الزرقه البنفسجية . جانباها وبطنها الى النقي . زعانفها الى الخضار الاصفر المواج || لجها كامن الصفن ، قل من يرغب فيه .

١٥٣٣٥ - **شَطُونَة مَبْدُولَة**

Squalius cephalus (S). Chevaline commun,

Meunier (F). Miller's-thumb, Bull-head (E).

سمكة نهريه يبيض من الشطون . اعطائها معظم انهز وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها كبير القذ . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبها الى الريدة الزراعية . ظهرها اعين من بطنها . زعانفها الى الخضار الاصفر المواج || الاثنى تسراً من نيسان الى ايار || لجها متوسط الصفن ، مأكول .

١٥٣٣٦ - **شَطِيْب**

Allosome (F). Allosome (E).

اسم يطلق على كل نثية فردية كانت ام اكثر موجودة في جيلة الغامة اما تختلف شكلاً وقدما من النشب المدلية . وقد يعزى اليها التأثير الشقي .

١٥٣٣٧ - **شَطِير**

Section (F).

نمت تريفقي يطلق على ما هو قابل الانقسام .

١٥٣٣٨ - **شَقْلَق**

Bistournage (F).

Castration by torsion (E).

حزم خصبي الكشب بين عودين وشدها بعقب حتى تدبلا .

١٥٣٣٩ - **شَطِيْة**

Péron (F). Fibula (E).

قصبة الساق السفري .

١٥٣٤٠ - **شَطِيْف**

Racorn (F). Harden (E).

الشطيف من الشجر : ما لم يجد ربه فصل من غير

ان تدبب تنوته .



شطوة مبلولة

الى السرة المخنقة بالاصفر. تركب الأيل والاريل والحيور والفرير.

### ١٥٣٧٢ - شُعْرَاءُ الْبَلَشُون

*Ornithes metalica* (S). *Ornithes du héron* (F).  
نوع من الشعراء غليظة الجثة ، قصيرتها ، طولها نحو ٤ م. رأسها مستعرض الشكل ، عيونها كبيرة. عظمها هلي الخازر. ثوبها الى الخفي اسف المواج. تركب البلشون والقيق.

### ١٥٣٧٣ - شُعْرَاءُ الْحَتَام

*Pseudolynchia maura* (S). *Mouche du pigeon* (F).  
نوع من الشعراء جنبها مستعرضة مخصورة ، طولها من ٥ الى ٦ م. ثوبها الى السرة الخفيفة. عيونها كالقنق. تركب الحام على اختلاف انواعه.

### ١٥٣٧٤ - شُعْرَاءُ انْطُطَف

*Craeterrhina pallida* (S). *Anapère pâle* (F).  
نوع من الشعراء. طولها نحو ٦ م. ثوبها حطلي اللون ، اغبر المواج. جناحها مردنية الشكل ، صغيرة القد ، يطنها غليظ المؤخر فارق الطرف. تركب الخطف.

### ١٥٣٧٥ - شُعْرَاءُ انْخِطِل

*Hippobosca equina* (S). *Hippobosque du cheval* (F).  
نوع من الشعراء جنبها غليظة الشكل مخصورة ، طولها نحو ٧ الى ٨ م. ثوبها الى الصهبة السراء. جناحها مستطيل شفاف. يطنها مستعرض الشكل مدبب الطرف. تركب الخيل والابقار والكلاب.

*Stenoperyx hirundinis* (S). *Mouche de l'hirondelle* (F).  
نوع من الشعراء طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السرة العابقة جناحها مستطيل ضيق. يطنها فارق الطرف ، تركب السنوق وقد تصيب الانسان فتثله.

### ١٥٣٧٧ - شُعْرَاءُ الطَيْر

*Ornithomyia avicularia* (S). *Ornithomyie aviculaire* (F).  
نوع من الشعراء غليظة الصدر ، نحيلة البطن ، طولها نحو ٦ م. ثوبها الى الريدة السراء. تركب الطير على اختلاف فصائله وانواعه من الكواسر الى الجوامث والواجين.

### ١٥٣٧٨ - شُعْرَاءُ الْغَنَم

*Melophagus ovinus* (S). *Mélophe du mouton* (F).  
نوع من الشعراء العادة الاجنسة. طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السرة الخفيفة الثفراء المواج. رأسها صغير القد ، مقلطح الشكل ، غائر في الصدر ، عظمها دقيق مستطيل ، يطنها وسيد الترجة المستدرة اعدم التحيزر. قوائمها زبله الجسم ، حادة الخالب. تركب الغنم فتؤذيها.

### ١٥٣٧٩ - شُعْرَاءُ الْكَلَاب

*Hippobosca capensis* (S). *Hippobosque des chiens* (F).  
نوع من الشعراء طولها نحو ٨ م. ثوبها الى الطحلة الثفراء يعلموها مواج اسف. جنبها مستطيلة ، جناحها متوسطا الطول ، عيونها بلون المناب. تركب الكلاب والذئاب والثالب.

### ١٥٣٨٠ - شُعْرَان

عشب اخضر يفرس الى الثيرة (ابو حنيفة).

### ١٥٣٨١ - شُعْرَانِيَّة

هي الثبر ، اطلبه.

١٥٣٥٤ - شُعَاعِيَّة (E). *Radiant, Radiate* (F).  
نعت تعريفي توصف به الازمار والحيوانات الدنيا الشعاعية الشكل.

١٥٣٥٥ - شُعَاعِيَّة (E). *Radiaire* (F).  
ما كان تظليه او ترتيبه او تجهيزه شعاعي الشكل.

١٥٣٥٦ - شُعَاعِيَّات (F). *Radiolaires* (F).  
رؤية كائنات حيوانية دنيا من الحفريات.

١٥٣٥٧ - شُعَاعِيَّة (E). *Radiées* (F).  
سبط من فصيلة المركبات منه الاسطر والاقومون البهار وحشية السعال.

١٥٣٥٨ - شُعْبِيَّة (E). *Section*  
الشعبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الطائفة وقبل الطبقة.

١٥٣٥٩ - شُعْبَر (E). *Shēber*  
هو ابن آوى الهندى ، اطلبه.

١٥٣٦٠ - شُعْبَعَة (E). *Plasmode* (F). *Plasmodium* (E).  
ركيبة في النسيج النباتية الحية يسببها تجميع بعض الغطور الدنيا.

١٥٣٦١ - شُعَر (E). *Pelage* (F). *Coat* (E).  
هو الثوب الذي يغطي جلد الحيوان الثديي وقد يكون من الشعر او الصوف او الور.

١٥٣٦٢ - شُعَر (E). *Poil* (F). *Hair* (E).  
هو ما ينبت من مسام البدن. الواحدة شعرة وهي مركبة من جزئين : ا جلد الملمون في الجلد وهو الذي ينبت بالبصلة تظليها غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، ويسم الشعرة الخارجى الخيطي الشكل المختلف الطول والحفة واللون.

١٥٣٦٣ - شُعَرُ الْأَرَض (E).  
هو كزبرة البئر ، اطلبه.

١٥٣٦٤ - شُعَرُ الْأَرْتَب (E).  
هو ذيل الارنب ، اطلبه.

١٥٣٦٥ - شُعَرُ الْبَيْت (E).  
هو الصفصاف الرومي ، اطلبه.

١٥٣٦٦ - شُعَرُ الْبَيْر (E).  
هو كزبرة البئر ، اطلبه.

١٥٣٦٧ - شُعَرُ الْبُول (E).  
هو كزبرة البئر ، اطلبه.

١٥٣٦٨ - شُعَرُ الْبَقَار (E).  
هو الثام الساني ، اطلبه.

١٥٣٦٩ - شُعْرَاءُ (E). *Hippobosca* (F). *Hippobosque* (F).  
جنس ذباب لاسع من فصيلة الشعراويات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد. قوتها الدم مقتصة من الثدييات والطيور بعد ان تلهب الجلد بلذغها المولم.

١٥٣٧٠ - شُعْرَاءُ الْإِبِل (E). *Hippobosca camelina* (S). *Hippobosque du chameau* (F).  
نوع من الشعراء السراء اللين طولها نحو ٦ م. تركب الايل فتؤذيها وقد تسبب لها الجرب.

١٥٣٧١ - شُعْرَاءُ الْإَيْل (E). *Lipoptena cervi* (S). *Lipoptène du cerf* (F).  
نوع من الشعراء غليظة الجثة طولها من ٤ الى ٦ م. ثوبها



شعراء الأبل



شعراء الحام



شعراء الخيل



شعراء الطير



شعراء الغنم



شعراء الكلاب

## ١٥٣٨٢ - شَعَرَانِيَّات

هي البريات فصيلة خشرات من ذوات الجناحين، اطبا.

## ١٥٣٨٣ - شَعَرَانِيَّات

Hippoboscidae (S). Hippoboscides (F).  
فصيلة خشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها صلبة. اجنحتها عند وجودها، مستطيلة. رؤوسها صغيرة مفلطحة. اغطائها ناعقة ماصة. قرونها الاستعمارية اسادية الفاصلة، دقيقة، غائرة. صدورها غليظة. بطنها مبطلة. غالبها سادة مكها ينقش في جيب الزكة تحتمه الاثني او بالاحرى تنصه رفاقا كاملة تسرح بعد وضها بساعة ثم تنحل الى طاردي بعد بضعة ساعات || تعيش طفيلية على ما تحتمه من دم الطير والثدييات.

## ١٥٣٨٤ - شَعْرُور

هو القريون الخزني، اطبا.

## ١٥٣٨٥ - شَعْرُورَة

ثمرة القشاة الصغيرة القدة.

## ١٥٣٨٦ - شَعْرِي شَامِيَة، شَعْرِي غَمِيضَاء،

عَمِيضَاء  
Procyon (F). Procyon (E).  
ثلاثة اسماء لنم نير من كوكبة الكلب الاصفر يمد عن الارض نحو عشر سنوات غميضة. وهو من منازل القمر. راجع غمضاء.

## ١٥٣٨٧ - شَعْرِي بِمَالِيَة، شَعْرِي عَبُور،

أَبْرَق  
Canicula, Sirius (F).  
Canicula, Sirius (E).

الشعرى البانية والشعرى البور والأبرق ثلاثة اسماء لنم واحد من كوكبة الكلب الاكبر يعتبر الم نجم في الفضاء || من اساطير الاقدمين ان سهيلاً اقبل من ناحية اليمن واقبلت الشعرى، البانية والشامية، من ناحية الشام حتى انتهى المسير الى المحرة. فوقف كل من الفريقين على شاطئ المحرة وخطبها سهيل فاجابته على الزواج وعبرت اليه البانية منها فقبل لها الشعرى البور. ولم تستطع الشامية ان تميز فوقفت تبكي وتذفر الدموع الحارة من عينها الغامضتين فقبل لها الشعرى الميضاء.

## ١٥٣٨٨ - شَعْرِي

Capillaire (F). Capillary (E).  
نمت وصني وتبرني يقلت على ما له علاقة بالشعر وعل ما يشبه الشعر كالانابيب الشعرية والبرانين الشعرية الخ.

## ١٥٣٨٩ - شَعَشَعَاء \*

Caryota urens (S).  
Caryote brûlant (F).  
نوع من نخل الكريته مهدد المهدد والبنغال والكوشئين وجزر الزايج. ساقه منتصبه اسطوانية تسلم نحو ٢٠ م. قلوها يراوح من ١٠ الى ٥٠ سم. سفها ثنائي التركيب، مروي الشكل، غليظ الكرب، يطول نحو ٥ امار ويبرص من ٣ الى ٤ || ثماره مأكولة لكنها حريفة الثشور يستخرج منها دهن الكريته || وقد زرعت للزئين وهو من النباتات البطيئة النمو الجميلة الخضار الفتية.

## ١٥٣٩٠ - شَعْمُور

Cocotier commun (F).  
هو الجوز الهندي. اطبا نارجيل معروف.

## ١٥٣٩١ - شَعَف

Ecorce de prosopie (F).  
هو قشر الفاف.

## ١٥٣٩٢ - شَعَفَة

Culmen (F). Culmen (E).  
الشفة من كل شيء اعلاه وبين الكفاة رأسها وبين الجبل رأسه. ج. شفت وشويف وشفقات وشفات.

## ١٥٣٩٣ - شَعَفَة، نَقَطَة، قَطْرَة

Goutte (F).  
Drop (E).  
القطرة الواحدة من المطر او من اي سائل كان. ج. شفت.

## ١٥٣٩٤ - شَعَل

يباض في ناضية الفرس او ذبه وقد يكون في الفذل.

## ١٥٣٩٥ - شَعَن

Fane (F). Haulm, Dead leaf (E).  
ما تنأثر من ورق الشب ويختلف مقام الرقة به ذبوله.

## ١٥٣٩٦ - شَعْبَر

هو ابن آوى الصحراء، اطبا.

## ١٥٣٩٧ - شَعُور مَصَّه

Poils absorbants (F).  
شعور دقيقة في اطراف الجذرات تمتص بالتحال الباغي المواد المعدنية الذاتية في ماء التربة فتلتها وتصيرها التسغ الباهل اي التسغ الصاعد.

## ١٥٣٩٨ - شَعْبِيَّات

Bronchies (F). Bronchia (E).  
اعضاء التنفس في الحشرات تقوم مقام الرقة في الحيوان.

## ١٥٣٩٩ - شَعِير، شَعُور، شَعُور

Hordeum (S). Orge (F). Barley (E). Gerste (D). Orzo (I).  
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. يعتبر من اقدم النباتات الزراعية واسمها انتشاراً نظراً لقدرته على احبال المناخات المتطرفة فهو يزرع وينتج في الدائرة القطبية الشمالية كما يزرع وينتج في بطنون الصحراء || انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم. منها نوع زراعي هو الشعير المعروف واخر تركيبي يسمى الشعير الاعفر وعشرة انواع برية اخرها ما ينتج.

## ١٥٤٠٠ - شَعِير إِبْلِس

H. murinum (S).  
شعير القنار

## ١٥٤٠١ - شَعِير أَغْفَر

H. secalinum (S).  
شعير المروج.

## ١٥٤٠٢ - شَعِير الكَثْبَان، أَلْبُوس الرمال

Elymus arenarius (S). Elyme des sables (F). Lyme grass, Mat-grass (E). Sandhaargras, Strandhafer (D). Elymo delle sabbie (I).  
نوع من الالبوس وهو نبات عشبي جندوبي معمر من فصيلة النجيليات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لاستقرارها وتثبيتها.

## ١٥٤٠٣ - شَعِير مَعْرُوف \*

Hordeum vulgare (S).  
Orge commune (F). Common barley (E). Saatgerste, Gerste (D). Orzo comune (I).  
النوع الزراعي من الشعير. وهو نبات حولي عديد



شعاع



شعير الكثبان



شعير معروف

1٥٤٠٦ - شَعَار (Désérénce (F). Escheat (E).  
هي صفة المواريث التي لا يرث فيها أحد قصود آل بيت المال أو الحكومة .

1٥٤٠٧ - شَعَارَة (Silex (F). Silex, Flint (E).  
حجر من الفلر قدسه يولد شرارة .

1٥٤٠٨ - شَعْرُور (Cyrtdandrus (S). Cyrtdandre (F).  
جنس نباتات عشبية وجبنيّة من فصيلة الشفروريات .  
أنواعه المروفة نحو ٦٠ معطنية بري وبعضها زراعي .  
تزييني ، مهدا المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية .

1٥٤٠٩ - شَعْرُورِيَّات (Cyrtdandraceae (S).  
Cyrtdandraceae (F). Cyrtdandraceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة القمالة .  
أجناسها وأنواعها كثيرة المدد تجمعها حبة أدواب . جميعها من نباتات المناطق الحارة والاسيوية || أورتهاها كاملة منتقة لا قياسا التريب ، ثمأها حقبة الشكل .

1٥٤١٠ - شَعْف ، شَعْفَان ، تَامُور ، نَجُث (Pélicard (F). Perlicardium (E).  
غلاف القلب .

1٥٤١١ - شَعْنَب ، شَعْنُوب (Pousse anticipée (F).  
هو الفصن الربط النضر الحولي العمر . ج شغانب وشغانيب .

1٥٤١٢ - شَعْوَاه (Aigle (F). Eagle (E).  
هي المقاب سميت بذلك لفضل مقامها الاعل على الاسفل .

1٥٤١٣ - شَعِيْرَة (Aiguille à enfler (F).  
مير جانس مستطيل ، مبطل النصل الحاد ، مدبب الطرف ، يستعمل في شك أوراق التبغ .

1٥٤١٤ - شَعَارَة الْمُتَوَسِّط \* (Cheillinus mediterraneus (S).  
Cheilline de la Méditerranée (F).  
Cheillinus mediterraneus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدييات شاذكات الزعانف .  
اصطادها معطر اقاليم البحر الابيض المتوسط || سمرحها المباحح وبماشب التقاف . قوتها النباتات البحرية والديدان والمواد الصموية || جسمها اهليقي الشكل ، مستدل التبطيط ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . حراشفها كبيرة .  
نومها الى التزقة السراء يملوها ملاح آخر يقب في الرأس والظهر ويدير ويبيض في البطن . زعانفها الى اربعة البحرية يملوها بتجمع مترنض اخر في الظهرية والشرجية والذيلية || رأسها مخروطي الشكل ، غليظ الشفة العليا المنطفعة .  
لحمها مستدل الانفرج . استانها قاطعة مثلبة الخد . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ماسحتان . زعانفها الظهرية والحوضية والشرجية تحوي بعض المناسخ الحادة . زعنفتها الذيلية محدبة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

1٥٤١٥ - شَقَارِي \* (Dipus gerboa (S).  
Gerboise gerboa (F).  
نوع من البرابيع الافريقية . يقال لها شأن البرابيع وزعلوا الليط وهي اسمها وافضلها . يكون في اذانها طول وعليا بعض الملب . اجسامها ربة المنة تطول نحو ٢٠ سم .  
اما اذانها فتطول نحو ٢٢ سم . اوتهاها الى الصبهة الربداء يملوها ملاح اسمر .

الضروب والاصرام ، شائع الزراعة ، معتدل الانتاج حبه يحوى ٦٠ ٪ من النشا يستعمل في غذاء الانسان والحيوان وفي صناعة الجمه (البيرا) وبورها من الصناعات الكحولية .  
ينبت في جميع اقاليم الحفنة ويفرقها قدرة على مقاومة الحر والقر . يرغب في التربة التي لا تنفتر الى الكلس ودو في التربة المتوسطة الاندماج ، المعيقة النور ، اوفر انتاجا واحسن منتفا . وفي حالة امتثال الدورة الزراعية يحصد عقب الحفنة والباطما والشندر والقطن ويخلط التقايات . ومن خصائصه انه لا يكثر من تخيل الغذاء الا في فترتين من دورته الحياتية . الفترة الاولى تستمر من الانشاء الى الاسبال والفترة الثانية من الانفرار الى النضج || ساقه جوفاء مستطيلة السلاحيات . اوراقه صغيرة الشكل ، اذنيّة الهند . مستطيلة النصل . سنبلته متوسطة القد ، ثلاثة الصف والسنيليات . زهره ثلاثية الاسباع ، رباعية الصيغات المقسوة الى جادتين وجشرتين || غروبها كثيرة المدد تقسم الى ثلاثة اقسام :  
- قسم الشير السداسي الحب وهو الذي تنطلع جمع ازارها فيتكون صف سنيلاته من ثلاث حبات يقابله صف مائل من ثلاث حبات .

- قسم الشير الرباعي الحب وهو الذي تقم فيه الزهرة الوسطى فيتكون صف سنيلاته من حيتين يقابله صف مائل من حيتين .  
- قسم الشير الثنائي الحب وهو الذي تنطلع وتغصب فيه الزهرة الوسطى دون غيرها فيتكون صف سنيلاته من حبة واحدة يقابله صف مائل وحيد الحبة .  
اشهر غروبها واعها زراعة ما يتبع .

الشير الاجرد ، شير سماوي (Hordeum coeleste (S).  
Orge céleste, O. nue (F).  
سداسي الصف ، اجرد الحبة يرغب في التربة الفنية والاقاليم الرطبة .

الشير الاسود (Hordeum nigrum (S). Orge noire (F).  
رباعي الصف . كبير الحبة ، اسود الحسكة . يحصد في جميع التربة المعتدلة الحصب . وهو من الانواع الوافرة الانتاج .

الشير الملس ، مبرعة (Hordeum hexastichum (S).  
Orge hexagonale, O. à six rangs (F).

سداسي الصف ، عديد الاصرام جميعها وافر الانتاج يرغب في التربة الخصبية التي لا تنقصها الرطوبة اللازمة .

الشير المروحي (Hordeum zeocritum (S).  
Orge en éventail (F).

رباعي الصف ، كبير الحبة ، عظم الانتاج في الاراضي المروية سيده في الزراعات الملية ، لكنه يرغب في التربة الخصبية المعيقة النور .

الشير النبوي (Hordeum tetrastichum (S).  
Orge à quatre rangs (F).

رباعي الصف ، متوسط الحبة ، مستدل الانتاج يحصد في جميع التربة الملية ومنها الخفيفة والقليلة النور .

1٥٤٠٤ - شَعِيرَات ، اَمِيلَاز (Amylase)  
خيرة منحلّة توجد في الرضاب وفي النبات ولذا تدعى خيرة الشير الناش . تلويب في الماء دون الكحول وتستعمل في تحويل النشا الى ملتوز .

1٥٤٠٥ - شَعَاء (Asymétrie (F). Asymmetry (E).  
هو عدم التناظر أو التبادل .



شَعَارَة لِلتَوَسِّط



شَقَارِي

١٥٤١٦ - شَفَاف Hyalin (F). Hyaline (E).

ما كانت ظواهره كالزجاج .

١٥٤١٧ - شَقَاف Coquette (F).

سمكة بحرية تدعى كيدمة ملونة ، اطلها .

١٥٤١٨ - شَقَان Vent froid (F). Cold wind (E).

الريح الباردة مهما كان مهبا .

١٥٤١٩ - شَفَكَة Labium, Labre, Lèvre

الشفة من الحيوان والاشفة : طبق له . وما شفتان عليا وسفل تستران الفم وما فيه .

١٥٤٢٠ - شَقْنَسَة Syngénésie (F). Syngenesia (E).

هي التبحام الاسدية بواسطة المآبر .

١٥٤٢١ - شَقْنَدَع Rainette

هو الشرغوف .

١٥٤٢٢ - شَقْر Lip of the vulve (F).

شرف الفرج من ناحيته الخارجية وما شفران .

١٥٤٢٣ - شَقْرِد Stachelina (S). Stachéline (F).

جنس شجيرات وجبات معمرة من فصيلة المركبات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد منهاها بعض مناطق حوض  
البحر الابيض المتوسط || بعضها منتصبه ترتفع من ٦٠  
الى ١٢٠ سم . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معققة ، سنائية  
النصال الحليقة البشرة ، الغضبية الصفحات السفلى  
انهارها عكوكي التجميع . انهارها صغيرة القند ، متباينة  
الالوان منها البنفسجي الوردى المواجه ومنها الابرجواني ||  
انهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٥٤٢٤ - شَقْرُوس أَصْفَر Ursinia lutea (S).

عشبة تزينة حولية ، من فصيلة المركبات . مهدا  
افريقية الجنوبية || ساقها فروع تملو نحو ٦٠ سم .  
اوراقها متعاقبة مفردة وسننة . رؤسها الزهرية الى  
الصفار الكبيرى الزاهي . جلبها ارجواني || انهارها يستمر  
من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٥ - شَقْرُوس أَثْنِي Ursinia pulchra (S).

عشبة تزينة حولية من فصيلة المركبات . ساقها فروع  
تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة مفردة شبيهة  
باوراق البابينج . انهارها طرفي . انهارها رؤسية .  
رؤسها يتقاليق اللسنان ، صفراء الطاباب ، معلوقة  
بالاسود || انهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٦ - شَقْرِيد Shepherdia (S).

جنس شجيرات حرجية وزينية من فصيلة الخلاقيات .  
انواعه المعروفة اربعة . تملو من متر الى ستة امتار .  
اوراقها كاملة ، متعاقبة ، عابلة . انهارها  
سنبل او مفردى التجميع . انهارها ثنائية المسكن ، صفراء  
اللون . ثمارها كروية الشكل ، يتقاليق اللون ، قمرها  
من ٤ الى ٨ سم . || اشهر انواعه ما يلي .

١٥٤٢٧ - شَقْرِيد فِصِي Shepherdia argentea (S).

شَقْرِيد فِصِي (S). Shepherdie argentea (F).  
نوع من الشفريد ، شجيرة تملو نحو ٥ امتار . اغصانها  
شائكة . اوراقها ضيقة ، سنائية ، مستطيلة ، نصلها  
سرخس البشرة الغضبية على صفحتيه . ثمارها حامزة مأكولة .  
تزرع للزينة .

١٥٤٢٨ - شَقْرِيد كَنَدَا Shepherdia canadensis (S).

شَقْرِيد كَنَدَا (S). Shépherdie du Canada (F).  
نوع من الشفريد ، جنبته تملو من متر الى ثلاثة امتار .  
اغصانها سرسة . اوراقها بيضية الشكل . نصلها اخضر  
الصفحة العليا ابيض السفلى بشرتها حرسية خلية . ثمارها  
تفحة . تزرع للزينة .

١٥٤٢٩ - شَقَشَش Umbre

جنس اسماك بحرية تعرف بالفلاذ ، اطلها .

١٥٤٣٠ - شَقَشَف Umbrina (S). Ombrine (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الباربات . انواعه المعروفة  
قليلة ، اقلها يمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر  
فالتوسط فالبحر الاطلسي الجنوبي || اشهر انواعه  
واعها الشغشف المبلول .

١٥٤٣١ - شَقَشَف مَبْدُول \* كَرْبَل Umbrina cirrhosa (S).

شَقَشَف مَبْدُول (S). Ombrine commune (F).  
نوع من الشغشف وهو سمكة مأكولة كبيرة القند ، اهليلجية  
الشكل ، ودية الفك الاسفل . مستطيلة الزعنفة الظهرية .  
ظهورها اصفر اللون ، ازرق التشيع . يبطئ الى الرعدة  
الغضبية . مرتها على حدود المياه الاقليمية . يقترب من  
المجاذح والشرابي في فصل الشتاء والربيع .

١٥٤٣٢ - شَقَشُوف هو الضمير ، اطله .

١٥٤٣٣ - شَقُع Pair (F). Even (E).

الزوج من العدد . ضده وتر .

١٥٤٣٤ - شَقْعَة Préemption (F). Preemption (E).

حق ينهله التآنن في شراء مال معين . راجع حق الشفعة .

١٥٤٣٥ - شَقْعِيَة التَرْكِيب Paripennée (F).

شَقْعِيَة التَرْكِيب (F). Paripinnate (E).  
نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المشتبه بورقتين  
متقابلتين .

١٥٤٣٦ - شَقَق Crépuscule (F). Twiligh (E).

هو الضوء الذي يشاهد بعد الغروب نتيجة لانكاس  
ضوء الشمس ويحت تحت الاقوى على السحب او ذرات الغبار  
المنتشرة في الجو . وقد تختلف فترة الشفق مع المكان فينبأ  
هي قصيرة جداً عند خط الاستواء اذ بها تمتد بنض  
ساعات عند القطبين .

١٥٤٣٧ - شَقَقِي ، شَقَقِي Crépusculaire (F).

شَقَقِي ، شَقَقِي (F). Crépuscular (E).  
نعت يطلق على ما هو متعلق بالشفق كقولك الشفق الشفق  
وحشرة شفقية المرتع اي انها ترتع في زمن الشفق .

١٥٤٣٨ - شَقَقَل ، مَشَقَقَله هي القانصة ، اطلها .



شفشفت مبلول

**1٥٤٤٦ - شَفْرُف** \* Aclaste (F). Aclast (E).  
نمت تعريفية يطلق على الاجسام التي تحفرها او تنفذ منها اشنة الثور دون ان تنكسر .  
**1٥٤٤٧ - شَفْرِيَّ** Labial  
ما كان له صلة بالشفة .

**1٥٤٤٨ - شَفْرِيَّات** Labiatae (S).  
Labiées (F). Labiatae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٢٦٠٠ تنتمي الى ١٤٠ جنساً تجسمها ستة اسباط . معظمها نباتات عشبية وبعضها جنبات مضطمة السوق . اوراقها زبده ، كاملة ، متقابلة ، جميعها عطري ومعلمها طلي .

**1٥٤٤٩ - شَفْرِيَّةُ الْأَحْثَاك** Chilognathes (F).  
رَبِيَّة دوبيات من كثرات الارجل تشمل خمس فصائل .  
جميعها اسطوانات الشكل ، مستطيلة . معظمها من الدوبيات القليلة الضرر العادة السم .

**1٥٤٥٠ - شَفْرِيَّةُ الْأَرْجُل** Chilopoda (S).  
Chilopods (F). Hundred-legged worms, Centipedes (E). Hundertfüßler (D).  
رَبِيَّة دوبيات من كثرات الارجل تشمل اربع فصائل ،  
جميع دوبياتها من الحشرات السامة المؤذية وقد يبلغ طول بعض اجناسها نحو ٣٠ سم .

**1٥٤٥١ - شَفِيرَة** Stérigmate (F). Sterigmate (E).  
زائدة قرنية التركيب تغلف الثوار لحايشته في بعض الحشرات .

**1٥٤٥٢ - شَفِيْعَة صَهْبَاء \* ، مَنَسَة \* ، مُهْفَايَا**  
فلاييدا Omphalia flavida,  
Stilbella flavida (S). Mancha, Viruela (F).  
فطر من الفاريفريات يتطفل في طوره الكندي على اوراق  
ثمّار ولواحي البين فيزيّيا || مظهره على الالوان بقع  
نسبة لا قياسية الشكل والحجم متسبب جفاف النصل  
وذبوله الباكر . وهو على الجار بقع مستديرة منخفضة  
هذبية الاطار الاجر . ويكون على النواحي فروج مستطيلة  
تسبب جفاف الحاء وانفلاته ويدهاس || يكاثف بانتضاع  
وجع وسرق الاعضاء المصابة وينضغ الاشجار بعد اعيالها  
بالسوائل التحاسية .

**1٥٤٥٣ - شَفِيْف**  
مطر يتخلله خشف او ينهر مع الخشف .

**1٥٤٥٤ - شَفِيْفَة ، شَرِيْفَة** Labelle (F).  
Labellum (E).  
هي البتلة العليا من توزيع السطحيات واشباهها . وهي  
ايضاً الطرف المغلوب في الاصداغ .

**1٥٤٥٥ - شَفِيك \*** Chavica (S). Chavique (F).  
جنس نباتات طيبة من فصيلة الفلفلات . انواعه عديدة  
جميعها عارشة معمرة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، سنائية  
الشكل متصبغة النصل . انزعارها قهه التجميع ، ليد  
التركيب . ابلي الارثكاز . ثمارها عنية ، يبيغ الشكل  
عطرية العرف || يتكاثر بالتغليل يرغب في الارربة  
القليلة الاندماج الربطة .

**1٥٤٢٩ - شَفَلَح** Section anguleuse (F).  
Angulous section (E).  
نمت تعريفية توصف به مقاطع سوق النباتات المضلمة .  
وقد شاع استاده الى السوق الرباعية الاحرف .  
**1٥٤٤٠ - شَفَلَح** هو الكرنقة ، اطلمها .

**1٥٤٤١ - شَفْنَة** Pousse nouvelle (F).  
New growth (E).  
هي الفصن الجديد الربط قبل بلوغ الحول . ج شفن .

**1٥٤٤٢ - شَفْنِيْن \*** Nicobar  
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . جمه  
شفاين . وهو مربوع الجثة : قوي المنقار ، معتدل الساق .  
مستطيل الجناح . قصير الذنب المستدير ، رجل الريش  
الكثيف || طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه الى الخضار الزاهي  
والعناق يطولو موج اسفح . عنقه ملتحف ببعض الريش  
الطويل الذهبي اللون . افيكيا ابيض . منقاره اسود . عيناه  
وقائمتاه بلون العقيق || يعيش على الارض كالحجل يرغم  
استقامة جناحيه . طيرانه بعلي\* وتقبل . يسبح في الماء .  
قوته الحبوب . يدق عشه في الحصوص بين الاعشاب او  
في الادلغال الكثيفة . انشاء تصنع يصفين تحضنها بمناوية  
الذكر نحو ١٧ يوماً .

**1٥٤٤٣ - شَفْنِيْن بِحْرِي \*** Raja (S).  
Raie (F). Ray, Skate (E).

جنس اسماك بحرية غضروفية من مرتبة السفنجيات وفصيلة  
الشفنجيات البحرية || انواعه المعروفة ٤٠ جميعها كبيرة  
القد مغلفة المقدم المربع الذي يشمل الرأس  
والصدر . اطولها تراوح من ٦٠ الى ٢٢٠ سم اقلها  
تختلف باختلاف الانواع . مرتها المادي في قاع الماء  
تلتصق الرمل بانتظار ما تفرس من القشريات والاسماك .  
وهي على سطح الماء سرية الحركة تنتقل بخفة الطير .  
لحمها مأكلة لكنها لا تخلو من طعم خاص يشبه  
الامويك || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

**شَفْنِيْن اَبُو مَهَاز ، اَبُو مَهَاز** Raja clavata (S).  
**شَفْنِيْن اَبُو مَهَاز** Raie bouclée (F). Thornback (E).

**شَفْنِيْن اَبُو مَهَاز** R. alba (S). Raie blanche (F).  
**شَفْنِيْن العمق** R. oxyrinchus (S).

**شَفْنِيْن العمق** Raie à bec pointu, Alène (F).  
**شَفْنِيْن رَعْدَا** R. torpeda (S).

**شَفْنِيْن رَعْدَا** Raie torpille (F). Torpedo ray (E).  
**شَفْنِيْن ساطع** R. marginata (S).

**شَفْنِيْن ساطع** Raie mirayot, Fumat (F).  
**شَفْنِيْن عجموز ، فَرْش** R. chagrinea (S).

**شَفْنِيْن عجموز ، فَرْش** Raie chagrinée, Flossade (F).  
**شَفْنِيْن مستدير** R. circularis (S). Raie ronde (F).

**شَفْنِيْن معروف ، شَفْنِيْن شام ، كَرْكَل** R. batis (S). Raie commune, R. cendrée, Colliart (F). Common ray (E).  
**شَفْنِيْن نَفَر ، رَهْمَة** R. radiata (S). Raie radée (F).

**1٥٤٤٤ - شَفْنِيْنِيَّاتُ بَحْرِيَّة** Rajidés (F).  
Rajidae (E).  
فصيلة اسماك من مرتبة السفنجيات ورَبِيَّة الاشلاق . تشمل  
الشفنين البحري والموريني وغيرهما .

**1٥٤٤٥ - شَفُور** Guêpe orientale (F).  
الشفور الزبور الشرقي . ج شفاينر .



شَفْنِيْن



شَفْنِيْن بَحْرِي



شَفِيْعَة صَهْبَاء



شَفِيك

flower (E). Gartenanemone, Kronenwüdröschchen (D). *Anemone coronaria*, *Anemone scempra* (I).

نوع من الشقار عديد الصروب والاصرام . يملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوريته سواد اللون . ساقه فناء . اوراقه قدية التفريص . ازهاره كبيرة القذ ، مستعرضة البتلات . لونها الابيض والاخر والازرق والبنفسجي والوردي والموشح . ازهاره يندوم طوال الربيع .



شقارة

**١٥٤٦٦ - شقار الجندة كويل** *Anemone rivularis* (S). *Anémone des ruisseaux* (F).

نوع من الشقار يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جذعه جني الشكل . اوراقه لاسقة . ازهاره خاسية البتلات الزرقاء اللون ، الصفراء الاسدية ، منته صغاف الانهر والجداول . ازهاره يندوم طوال شهر نيسان .



شقار اكليل

**١٥٤٦٧ - شقار الغاب \***

*Anemone nemorosa* (S). *Anémone des bois*, *Fleur du Vendre-Saint*, *Sylvie* (F).

نوع من الشقار يملو نحو ٢٥ سم . ساقه مدادة . اوراقه معتقة . ازهاره سداسية البتلات ، بيضاء اللون او حمراء ومنه صروب زرقاء اللون زاهية || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

**١٥٤٦٨ - شقار الصبح**

هو شقيق النيمان المبدل ، اطله .



شقار الغاب

**١٥٤٦٩ - شقار اليابان \*** *Anemone japonica* (S). *Anémone du Japon* (F).

نوع من الشقار المكبس يملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة ، خنيفة القصوص المسننة الحافة . ازهاره مكبسة ، كبيرة القذ ، كثيرة البتلات التي يراوح عددها من ١٨ الى ٢٤ . لونها الالبياض الثلجي او الالبياض الوردي للمواج || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

**١٥٤٧٠ - شقار بتري \*** *Anemone sylvestris* (S). *Anémone sauvage*, *A. sylvestre* (F). *Snowdrop anemone* (E). *Grosses wüdröschchen* (D). *Anemolo salvatico* (I).

نوع من الشقار يرغب في الاتربة الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقه فردية منتصبة . وسيدة الزهرة . اوراقه معتقة . ازهاره كبيرة القذ ، بيضاء اللون او وردية ، خلية البشرة . زياه الكرايل التي يتبو كندف القطن || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .



شقار اليابان

**١٥٤٧١ - شقار كزيمي الورق** *Anemone vitifolia* (S). *Anémone à feuilles de vigne* (F).

نوع من الشقار يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم . ساقه فناء . اوراقه قلبية الشكل ، خاسية التفصيص ، نصلها مشفاري الحافة ، خلي الصنفعة السفل . ازهاره كبيرة القذ ، ثمانية البتلات الالبيش شكلا ولونا || ازهاره يندوم طوال شهر ايلول .



شقار بري

**١٥٤٧٢ - شقار كوكبي** *Anemone hortensis* (S). *Anémone des jardins*, *A. étoilée*, *A. oeil de paon* (F). *Garden anemone*, *Star anemone* (E). *Sternwüdröschchen* (D). *Anemolo stellato* (I).

نوع من الشقار عديد الصروب والاصرام . يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه ثلاثية او خاسية التفريص ، مسنة الحافة . ازهاره نجمية الشكل ، خنيفة البتلات الغافضة المختلفة الالوان السواد الاسدية || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

Cheviot

**١٥٤٥٦ - شقيوت**

سلالة شأن مهدها البلاد البريطانية تتميز بقرارة صوفها وبيوتة صنفه .

**١٥٤٥٧ - شق \***

هو جلة الصفات الخلقية التي تكون الذكر او الانثى . وهو ايضا مجموعة الافراد من ذوات الاعضاء التناسلية المماثلة .

**١٥٤٥٨ - شقاق** هو الكبر ، اطله .

Pigment

**١٥٤٥٩ - شقاق ٥ ، خضاب**

كل مادة صباغية عضوية تلون النسيج . ج شقاقات وخضابات وشواقيع وخواشب .

**١٥٤٦٠ - شقاقة ٥ \*** *Pteropus* (S). *Roussette* (F).

جنس حيوان من فصيلة الوطاطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها ثائرة ، يرقاء ، كبيرة القذ ، مستطيلة القرطسية الذلقة المدبية . اثارها تختلف مع الانواع لكنها سوية الالوان وظهورها ابيض من اكنافها وامتاقها || اقليمها الهند وافريقية الشرقية وجزر المحيط الهادي حتى استراليا . اشهر انواعها ما يتبع .

**١٥٤٦١ - شقاقة الهند ٥** *Pteropus medius* (S). *Roussette de l'Inde* (F).

نوع من الشقاقات ، طولها نحو ٢٣ سم . رأسها الى الجوزة . جسمها خنثي اسمر يملو مواج . جوري يخفف السرة او زيكها || موطنها فسيح الارجاب بينه من الهند الى شط العرب ومن الهند الى سرنييب وبلقعه وانام . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ . تألف اسراج الخيور وغابات الخيزران تشتمل بقضبانها وفاندها طوال البهار . تسرح في طلب قوتها من القروب الى الشروق . قوتها البار عل اختلاف اجناسها وانواعها ما عاد البرتقال .

**١٥٤٦٢ - شقاقة مأكولة ٥** *Pteropus edulis* (S). *Roussette comestible* (F).

شقاقة كبيرة القذ طولها نحو ٤٥ سم . وبسطها نحو ١٦٠ جلدها ششن للممس . قرطوسها اسنخي الشكل . اذنها مستطيلة ذلقة . ثوبها الى الخنثي الاصفر عابق الظهر والرأس ، زاهر القم والصدر والبطن || موطنها الهند وصومرا وبنار وبلقعه . تعيش جماعات متفرقة يراوح عددها من ٥٠ الى ٢٠٠ . تألف الاسج القليلة . مرسها من اللسق الى الشجر . قوتها البار وبعض الحبوب . لا تقرب البرتقال . لحمها ما كوك يفاعرون به .

**١٥٤٦٣ - شقار**

هو البهار ، سمكة طويلة السنام من الشعلت .

**١٥٤٦٤ - شقار ، شقارتي ، شقر ، أليمون**

*Anémone* (F). *Anemone* (E).

جنس نباتات عشبية ، سرورية ، معمرة من سبل الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انواعه عديدة مسطها بري وبعضها زراعي زديي جميل الازهار المتددة الالوان || اشهر انواعه ما يتبع .

**١٥٤٦٥ - شقار اكليلي \*** *Anémone des fleuristes*, *A. à couronne* (F). *Crown anemone*, *Poppy wind*

حامية ، متكوية التجميع ، مستطيلة المالميق || يقال انه مروج لرغبة الجنسية لانه يثير المراكز النصبية المختصة بها . وهو مدر للثقل وقد يسقط الحمل في اوائله عهده . ويقال ان كثرة استعماله تسبب ردة فعل ناكسة ، مظهرها ومن شامل ويعطو عصبي مفسك .

#### ١٥٤٨٢ - شَكَال \* ، شَوَكَال

Prasium (S), Praslon (F), Great hedge nettle (E), Klippenlippe (D), Prassine, Praslon (I).

جنس نباتات جنينة برية من فصيلة الشفويات . انواعها قليلة ، مرقها فراءه . اوراقها متقابلة ، معتقة ، نصلها قلبي الشكل ، سنن الحافة ، عطري الرائحة . ازهارها عطرية العرف ، تاجية الانكازن . قالوا انها لا تخلو من المنافع الطبية دون ان يحدوها .

#### ١٥٤٨٣ - شَقَاقِلُ الثَّعَانِ

هو الحوزان الاسوي ، اطبله .

#### ١٥٤٨٤ - شَقَب

شجر جنات كالنبق ، واحفسته شقية . وهو شير له غصنة وورق . نبتته كالزمان وورقه كورق الصدر وجناته كالنبق وفيه نوى . (ابو حنيفة) .

#### ١٥٤٨٥ - شَقَب

مهواة ما بين كل جبلين . وقيل صلع في كهوف الجبال وصغورها الشارقة على الاودية يوكر فيه الطير . ج شقَاب وشقوب .

#### ١٥٤٨٦ - شَقَبَان \* ، شَقَبَان

Mégapode (F), Megapod, Mound-bird (E).

جنس طير من فصيلة الشقباتيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها من ٦٠ الى ٩٠ سم . رؤسها واعناقها صلعاء ملطاة . اجنتها مستديرة ضعيفة . ارساغها ومخالبها قوية . اثوابها الى السرة البوية المختلفة المراجع || تأتف الاحراج القريبة من الشواطئ . تعيش ذكراً وأنثى كالحمام . ارساها كثيرة العدد . قوتها الثار والحبوب والديدان والحشرات || اناثها لا تحضن البيض بل ترصفه في محضن خاص من الرمل والخش والورق تقيمه قرب الشاطئ على حدود مرمى الله . شكله كالقنصوة الكبيرة علوه نحو ٤ اتر وقطره من ٤٠ الى ٤٥ م . || والاثني تبض في موسمها من ١٢ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والاخرى ١٣ او ١٤ بيوا || اما البيضاء فتنتف بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط كاسي الريش يدر امر نفسه بدون عناء مستعنيا عن امه التي يجهلها .

#### ١٥٤٨٧ - شَقَبَاتِيَّات

Megapodidae (S), Megapodidae (F), Megapodidae (E).

فصيلة طير من رتبة التناجيات اجناسها اربعة . طيورها متوسطة القد او كبيرة . قوية المنار الاحسن . مخالبها مستطيلة . اطافرها كبيرة منقطة . اثوابها الى الالوان المايقة || اجناسها الشقبان والطيطاب والنبق والينتنج . طيورها تتميز بدم حفسها البيض وبالخاصن التي تقيها .

#### ١٥٤٨٨ - شَقَّة

Quartier (F), Quarter (E).

ربع الحيوان المذبوح .

#### ١٥٤٨٩ - شَقَق

شقق الجوزة : استخرج ما فيها .

#### ١٥٤٧٣ - شَقَار تَرْجَمِي \* ، شَقَار صِيَاي

Anemone narcissiflora (S), Anémone à fleur de narciss, A. en ombelle (F), Narcissus flowered anemone (E), Bergwindröschen, Narzissen-Anemone (D), Anemolo narciss (I).

نوع من الشقار يملو نحو ٤٠ سم . اوراقه ثلاثية او خماسية التفريض ، نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهاره صيوانية التجميع ، مستطيلة الامن ، يضاء اللون ، وردية الصفة الخارجية || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٥٤٧٤ - شَقَارِي

هو الشقار ، راجمه .

#### ١٥٤٧٥ - شَقَارِي \* ، شَقَارِي

Psammophis schokari (S), Couleuvre schokari, Schokari (F), Schokari sand snake (E).

الاسم النوبي العلمي والفرنسي والانكليزي مأخوذ من العربي . حية بيوض من البرواغيات وفصيلة الخشيات خلفيات الاغلايد || جسمها مستطيل الجسم يطلو نحو ٦٥ سم . ثوبها الى الربعة الخطية يملوها اربعة عطلوط يفيض جانبية مما يجعل مابنها تنحرف بالنسبة الى النور من الشقرة الصائبة الى الخطية . مدها اغبر اسمر . رأسها لوزي الشكل . عيناها صغيرتان فرتان . زاوية شفتها متوسطة الانفراج . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعل من اصلها اربعة عفاف ثابتة خلفية الانكازن || تأتف الرمال والبراري . قوتها كل ما دب وتمكث منه . تعتبر من الثعابين المؤذية .

#### ١٥٤٧٦ - شَقَارِيَّات

Anémonées (F).

سبط من فصيلة الشققيات ، اشهر اجناسه الشقار .

#### ١٥٤٧٧ - شَقَارِين

Anémone (F), Anemone (E).

مادة جصالية فعالة ، يضاء اللون ، لا عرف لها ، تستخرج من اوراق الشقار . وهي قليلة اللويان في الماء والكمول والاثير . تلوث وتنفل في السوائل القلوية فينجم عنها الحامض الشقاري .

#### ١٥٤٧٨ - شَقَابَاة

Partibilité (F), Partibility (E).

قابلية الانقسام .

#### ١٥٤٧٩ - شَقَاق

Javart (F), Ulcer on pastern (E).

نخر في النسيج اللبانية والتقرصية من الاجزاء السفلى في قوائم الخيل . والشقاق قد يكون :

شقاق جلدي .

شقاق غضروفي .

شقاق وتري .

#### ١٥٤٨٠ - شَقَاق

Ranchage (F), Dressing (E).

الشقاق او الفتح هو حرق الارض حرقا متباعدة الاتلام .

#### ١٥٤٨١ - شَقَاقِل \* ، سِيَسَاكُون حِشَقَال ، جَزَرُ اللَّيْطِي ، حَرْصُ اللَّيْلِ

Pastinaca schekakul (S), Sécauc (F), Rough parsnip, Secauc (E), Schekakul (D), Pastinaca (I).

نوع من السيسارون البري وهو نبات طبي عشبي معمر غليظ الجذر . ساقه اسطوانية فراءه تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة ، متعاقبة ، لاطئة الصلع . ازهاره



شَقَار جَرِي



شَقَارِي



شَقَال



شَقَال



شَقَال





1٥٥٢١ - شَقِيقَص Copropriétaire (F).  
Joint-propriétaire (E).  
شريك في ملك العقار . يقال هو شَقِيقَصِي في العقار .

1٥٥٢٢ - شَقِيقَصَة Rose des vents (F).  
هي الشصق ، اطلبه .

1٥٥٢٣ - شَقِيقِي أَحْمَر  
هو الخشخاش المشتر ، اطلبه .

1٥٥٢٤ - شَقِيقِي الْجَبَل  
هو الحوذان التني ، اطلبه .

1٥٥٢٥ - شَقِيقِي التَّعْنَان ، هَوَاكِيَة Pulsatilla (S).  
Pulsatille (F). Pulsatilla, Pasque-flower (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الشقاريات وفصيلة الشقاريات . انواعه قليلة العدد جميعها جمالية المادة الفعالة . سيروية ، تمشي في جميع المواقع والأرتبة . جلورها حزامية غليظة . أوراقها جذرية الانتشاب . أشهر أنواعه الثلاثة التالية .

1٥٥٢٦ - شَقِيقِي التَّعْنَان الْجَبَلِي Pulsatilla alpina (S). Pulsatille alpine (F). Mountain  
pulsatilla (E).

نوع من شقيق التنان ، يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ينمو في الاربة الربلية الجبلية ، أزهاره كبيرة القد ، بيضاء اللون ، زرقاء الموالج حل صفحتها الخارجية . أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٢٧ - شَقِيقِي التَّعْنَان الرَّبِيعِي \* Pulsatilla vernalis, Anemone vernalis (S). Pulsatille  
printanière (F).

نوع من شقيق التنان ، يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . مهد جبال البلاد المعتدلة . أوراقه ابيدة ، لائقة ، قدية التفرغ ، نصلها حلج البشرة . أزهاره متوسطة القد ، بيضاء اللون حل صفحتها الداخلية ، ليلكية الصفحات الخارجية || أزهاره يستمر من نيسان الى تموز .

1٥٥٢٨ - شَقِيقِي التَّعْنَانِ الْمَبْدُول \* ، شَقَارُ الْبَيْض Pulsatilla vulgaris, Anemone pulsatilla (S). Pulsatille  
commune, Fleur de Pâques, Herbe au vent (F). Pasque flower, Pass flower, Blue mony (E). Echte kuh-schelle, Küchenschnelle (D). Pulsatilla comune, Fiore di vento, Erba del vento (I).

نوع من شقيق التنان ، يعلو من ١٥ الى ٣٥ سم . ينمو بين الزروع وفي الأراضي البور . أوراقه نافضة تبدو بعد الازهار وتميل في أواخر الخريف . أزهاره كبيرة القد ، قمرزية اللون ، بنفسجية الموالج ، فضية الزغب || أزهاره يستمر من آذار الى ايار .

1٥٥٢٩ - شَقِيقِي النُّوْط

هو الحوذان الحريف ، اطلبه .

1٥٥٣٠ - شَقِيقِي حَقَلِي هو الحوذان الحقل ، اطلبه .

1٥٥٣١ - شَقِيقِي مَائِي هو الحوذان المائي ، اطلبه .

1٥٥٣٢ - شَقِيقَات Ranunculaceae (S).  
Ranunculacées, Renonculacées (F).  
Ranunculaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المروقة زهاء ١٢٠٠ ، اجناسها ٣٠ تجمعها عدة اسباط أشهرها

1٥٥٠٧ - شُقُرُق هو الشقراق ، اطلبه .

1٥٥٠٨ - شَقِيقَة هي فلاة الجير وهي شيء كالبلغة العظيمة المراكبة الجيوب يحجره البير من فيه اذا هاج .

1٥٥٠٩ - شَقِص Part, Portion (F).  
Share, Allowance (E).  
الشقص : النصيب والسهم والقطعة من الارض .

1٥٥١٠ - شَقِف هو الاقتنا السفينة ، اطلها .

1٥٥١١ - شَقِيقَة Pot, Vase (F).  
هي الايصيص أو المركان انا من خرف أو فخار أو غير ذلك يستعمل لزروع النباتات التزيينية البيتية .

1٥٥١٢ - شَقَل Pesée (F). Weighing (E).  
الشقل الوزنة والوزن . يقال اشقل في هذا الدنار اي ننه .

1٥٥١٣ - شَقِيل \* ، أصابع هَرَمِيس ، حَالِيزِ الْمُهَر Hermodactylus tuberosus, Iris tuberosa (S). Hermodactyle tubéreux (F). Finger of Hermes (E). Hermodatle (D). Hermodattilo, Iride vallutata (I).

نبات عشبي صفوي ري وزراعي من فصيلة السوسنيات . ينمو في المواقع الرطبة . عصارته طيبة تستعمل استعمال السورجان ويستخرج منها سادة الخربقين . ساقه شراعية مرققة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . تلتفي بزهره وحيدة عطرية الرائحة ، كبيرة القد ، لونها الى الصفار الخفي يعلو موالج بنفسجي . بتلاتها الخارجية اعلمجية الشكل مستديرة الطرف . بتلاتها الداخلية خفيفة النصل الذلق المذهب . ساقها جزلة ، خضراء اللون || أزهاره يدوم من آذار الى نيسان .

1٥٥١٤ - شَقَمَة Papillon chasma (F).  
هو القردوح الخزيري ، اطلبه .

1٥٥١٥ - شَقَن Herser (F). To harrow (E).  
شقن التربة : سلفها ومشطها .

1٥٥١٦ - شَقَوَاص هو اللادن الاسباني ، اطلبه .

1٥٥١٧ - شَقِي Sexué (F). Sexually (E).  
كل ما هو ذات شق يمكنه من التماسك ان ذكراً او أنثى .

1٥٥١٨ - شَقِيَة ، جِنْسِيَة Sexualité (F).  
Sexuality (E).  
مجسمة المناسر والفوارق الجنسية السكسية الخاصة بالذكور والاناث .

1٥٥١٩ - شَقِيَح Difforme (F). Deformed (E).  
نعت وصني يطلق على الحيوان القبيح الشكل .

1٥٥٢٠ - شَقِيَحَة Chromatophore (F).  
Chromatophore (E).

الشقيقة خلية ملونة بجيبات من الشفاح عديدة الالوان ، انتشاعها أو انتفاضها منوط بالحرمون . لذلك يفيض الرغويات تمانن الملقح الموجودة فيه بسرعة فائقة لانها تحوي بعض هذه الخلايا .



شَقِيل



شقيق التنان الربيعي



شقيق التنان المبدول



شكابة



شكب البحر



شكبة صغيرة



شكبة كبيرة



شكبة مبدولة

## Polymorphisme (F). ١٥٥٤٤ - شَكَابَة ٥

Polymorphism (E).

تعدد الاشكال في مادة واحدة ، أو تعدد اشكال مادة وحيدة تركيبتها الكيماوي لا تتبدل .

## ١٥٥٤٥ - شَكْب ، شَكْبَة ، بَكاسِين

Bécassine (F). Snipe (E).

جنس طير من دجاج الارض . انواعه ستة جميعها من القواطع . تتميز باجسامها الصغيرة القذ الحياء الشكل . اذواها الى السرة الخنطية المرطبة المرشقة . منقارها مسطيلة دقيقة . ارسافها حنجرة الجمة الانامية ، سرديّة الخلفية . اعرف انواعها واشهرها الشكبة الصغيرة والكبيرة والمبدولة ، اطالبها .

## ١٥٥٤٦ - شَكْب البَحْر \* Centriscus

Bécasse de mer, Poisson trompette (F). Trumpet-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شاكبات البحر . انواعه قليلة مرتوها مياه البحر المتوسط . جميعها صغيرة القذ طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تتميز بشاكباتها المستعربة وباعظامها الانبوبية الدقيقة الاطراف . اذواها وردية اللون ، ظهورها مذهبة الموج ، جوانبها صفعية ، بطونها فضية .

## ١٥٥٤٧ - شَكْبَة البَحْر المَجْنِيَة

Centriscus scolopax (S).

Centriscus bécasse, Bécasse de mer, Trompette de mer (F). Bellows-fish, Trumpet-fish (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة شكبات البحر وردية شاكبات الزعانف . اعظامها معظم اقلام البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك الغنق المتوسطة الغور || جسمها قريب الشبه بالشكبة الطائرة ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . ثوبها الى المرجاني الاحمر الموج تملوه مشعة ذهبية في الظهر ، فضية في الجانبين وفي البطن . حرافها الظهري جامدة صلبة ، مجنبة الشكل . رأسها مستدل الجرم ، غرورطي الخلع ، انبوبي الثلث الاخير ، فطيسي الطرف . لها ادم الانسان . عيناها مستديرتان رفيعتان . زعانفها متباينة الاشكال والتركيب منها الصلبة والينة والكبيرة والصغيرة والمستطيلة || لحما كامن الصنف قل " من يرغب فيه .

## ١٥٥٤٨ - شَكْبَة صَغِيرَة \*

Gallinago gallinula (S). Bécassine sourde, Petite bécassine, Bécot, Jaquet (F). Jack snipe (E).

طائر من الشكب صغير القذ طوله نحو ١٧ سم . ثوبه يشبه ثوب الشكبة المبدولة || يحب بلاد حوض البحر المتوسط ويتقدم شرقاً حتى القفقاس وروسيا .

## ١٥٥٤٩ - شَكْبَة كَبِيرَة \*

Gallinago major (S). Bécassine double, Grande bécassine (F). Great snipe, Solitary snipe (E).

طائر من الشكب طوله نحو ٣٢ سم . ثوبه الى الصهبة الخنطية يملوها موج اسود ورققة يضاء || مشتات منافع وضفاف بحيرات وانهار البلاد الحارة . مصيفه يمتد من سبيرة الى اودية التبالية .

## ١٥٥٥٠ - شَكْبَة مَبْدُولَة \*

Gallinago scolopacina (S). Bécassine ordinaire (F).

Common snipe (E).

طائر من الشكب طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه متراكب

الحذائيات والخربقيات والشغاريات والملمويات . جميعها نباتات عشبية او ذب ليفية ، منتشرة في معظم اصقاع العالم . منها نباتات جحالية واخرى طيبة وبعضها زراعي لا يتبي .

## ١٥٥٣٣ - شَك \* Prise (F). Setting (E).

الشك هو مقدار سرعة تمالك تمالك جيلة الامنت . فهو سريع اذا تمالك بين ١٠ و ٣٠ دقيقة || وهو متوسط اذا تمالك بين ٣٠ دقيقة وساعتين || وهو بطيء اذا تمالك بين ساعتين وسبع ساعات .

## ١٥٥٣٤ - شَك \* Enfiler, Enguirlander (F).

To string, To engarland (F).

ثقب نصال التبع بصلصوا وقد يتم ذلك بواسطة الشفرة التي تخترق الصلغ لتسهل مرور الحيط .

## ١٥٥٣٥ - شَكَابَة ٥ Diététique (F).

Dietetics (E).

علم يبحث في قيمة المواد الغذائية والعامل الناتجة من سوء الاندفاع مع تحديد الاشكاد اللازمة لكل مستهلك من حيوان او نبات .

## ١٥٥٣٦ - شَكَار \* Lignivore (F).

Lignivorous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او حشرة قوتها الشكر والحشب .

## ١٥٥٣٧ - شَكَابَة

كل قسم من ارض المزرعة خصص لزراعة معينة . يقال شكاركة قيع وشكاركة فويل الخ ... ج شكارث .

## ١٥٥٣٨ - شَكَابَة \* Fagonia (S). Fagonie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السبايات . انواعه ١٢ جميعها برية مهددة حوض البحر المتوسط . اوراقها متعاقبة ، مستنقة ، اذينية الزناد المستطيل . نصلها ثلاثي التفصيص ، ذات الطرف ، عايق الحفار . ازهارها فردية التجميع ، محورية الزنكاز ، خاسية البتلات ، لونها يختلف باختلاف الانواع ، فيها الاحمر ومشتقاته ثم البنفسجي ثم الاسفر .

## ١٥٥٣٩ - شَكَابَة اِكْرِيْتِيَة ، شَكَابَة عَرَبِيَّة ، شُوكَان ، عَاقِلُ الْغَرَال

Fagonia arabica, F. cretica (S). Fagonie de Crète, Trèfle épineux de Candie (F).

نوع من الشكابة منبها حوض البحر المتوسط . ازهارها قرزية اللون . قالوا انها طيبة دون ذكر منافعها .

## ١٥٥٤٠ - شَكَابَة سِينَة ، شُرَيْفَة

Fagonia sinatica (S). Fagonie de Sinaï (F).

نوع من الشكابة منبها صحراء سيناء وجوارها . ازهارها وردية اللون . يقال انها طيبة .

## ١٥٥٤١ - شَكَابَة Onoporde, Onopordon (F).

هي الاسون من النباتات الطبية ، اطالبها .

## ١٥٥٤٢ - شَكَاك Enguirlanderage (F).

Engarlanding (E).

هي عملية شك اوراق التبع بنظام وترتيب .

## ١٥٥٤٣ - شَكَاك Abot, Entrave (F).

Clog, Hobbie, Shackle (E).

وثاق تربط به يدا الفرس او احدى يديه باحدى رجله .

1٥٥٦٢ - شكوي، مُطالبَة  
Réclamation (F).  
Claim (E).  
هي مطالبة المره الاعتراف بحق مجملد له . او اقرار  
حقه في حالة كان يجب ان تكون له .

1٥٥٦٣ - شكيو  
Aubier (F).  
Alburnum, Sap-Wood (E).  
هو القسم من الهيكل الخشبي الكائن بين اللحاء والخشب  
الصلب .

1٥٥٦٤ - شكل  
Polymorphe (F).  
Polymorphic (E).  
متعدد الاشكال .

1٥٥٦٥ - شكمة  
Mors (F). Bit (E).  
حديدة اللجام المعرضة للتم .

1٥٥٦٦ - شجرة الفلفل الكاذب  
Schinus (S). Schine, Faux pölvrier (F). Pepper tree.  
Mastic tree (E). Mastixbaum (D). Albero da pepe (I).  
جنس اشجار وشجيرات برية وتربيتية من فصيلة البطيانيات.  
اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريشية . وريقاتها بيضيه  
الشكل ، نصلها سميك الصفحه . جيل الخفسار الاسمر  
المابق . ازهارها عتقودية التجميع ، حراء اللون او بيضاء .  
ثمراها غنية الشكل ، حمصية القد تبدو حراء اللون ثم  
تسمر || اوراقها وازهارها تتحمل برائحة الفلفل . يستخرج  
من اوراقها عطر شامع الاستعمال يدخل في عدة تركيب  
وستحضرات || انواعه المعروفة اثنان .

1٥٥٦٧ - شكينوس بُطيّني الورق  
Schinus terebinthifolia (S). Faux pölvrier du Brésil  
(F). Brazilian pepper tree (E). Brasilianische pfeffer-  
baum (D). Pepe del Brasile (I).  
نوع من الشكينوس شجيرة تملو من ٣ الى ٤ امتار .  
يزرع للزينة ويستعمل من اوراقه عطر الفلفل .  
يستخرج من ساقه صمغ رائحته يدخل في بعض المركبات .  
ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٦٨ - شكينوس ربيع  
Schinus molle (S).  
Faux pölvrier mollé, Pölvrier du Pérou (F). False  
pepper, Weeping pepper tree (E). Mollebaum,  
Amerikanische Pfefferbaum (D). Pepe del Peru,  
Falso pepe, Mole (I).  
نوع من الشكينوس ، شجيرة تملو من ٧ الى ١٠ امتار .  
وريقاته وتريه التجميع عددها يراوح من ١٥ الى ٢٧ .  
نصلها ساني الشكل مسن الحافة . ازهارها محورية الارتكاز  
بيضاء اللون . ثمارها حمصية الشكل والقد ، حراء اللون  
تبقى عالقة الى الشتاء || يستخرج من اوراقه عطر  
الفلفل ويستخرج من ساقه صمغ رائحته يدخل في بعض  
المعدة || ازهاره يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

1٥٥٦٩ - شيل  
Docynia (F).  
هو الدوسيني شجرة مشرة ، اطليا .

1٥٥٧٠ - شلاب  
Leersia (S). Léersie (F).  
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية ، مرغوبة من نصلية  
التجلبليات . انواعها المعروفة خمسة منهاها بعض مناطق  
البلاد الحارة من الشرق والغرب || سوقها شطاف . فزعا  
مصغها صيق مستطيل . ازهارها سبيل التجميع . سبيلاتها  
متراسة . ازهارها غشوية .

الصبهة والسرمة الحنطية المرفقة بالايض ، يسر ويميق  
في الظهر ، ينزفر الى الصبهة الشفراء في الصدر . عنقه  
وربطه الى البياض الاغبر ، مقاره مستطيل اسمر || اثناء  
تحمل الثوب عنه . يألف المتابع والمراعي والاراضي الرطبة .  
قوته الديدان والحشرات والرخويات . يدين اقصوصه فوق  
الورل التاشف بين الاعشاب المتعقبة . الاثني تيشين من  
٤ الى ٥ ييضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٧ يوما .

1٥٥٥١ - شكيات البحر  
Centrisidae (S). Centrisidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكلات الزعانف . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة || اعطائها  
معظم بحار البلاد الحارة وبعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة .  
سرحها الاغواط والتفاف || تتميز باجسامها الربعة التي  
تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . وباعظامها الخروطية الاثيوبية  
الافراط ، وبأذيها وبمجناتها الظهريه الصلبة ،  
وبالتناسخ القوية الحادة التي تتقدم الزعانف الظهرية ،  
وزعانفها الحويضية المتلاصقة || اثنائها تراوح من الوردي  
الى المرجاني الاسفع ومن الغصي الى الذهبي || اشهر  
اجناسها شكب البحر .

1٥٥٥٢ - شكدة  
Ration quotidienne (F).  
Daily allowance (E).  
ما يكتفي الدابة يوميا كاملا من الملف . ج اشكاد .

1٥٥٥٣ - شكدة الصيانة ، شكدة العيش  
Ration d'entretien (F). Maintenance allowance (E).  
الملف الذي يكتفي الحيوان يوميا لعيش بلا عمل .

1٥٥٥٤ - شكدة العمل ، شكدة الانتاج  
Ration de production (F). Production allowance (E).  
الملف الضروري للحيوان العامل او الذي يسمن او  
يدر الحليب .

1٥٥٥٥ - شكدة النشوء  
Ration de croissance (F). Growth allowance (E).  
الملف الذي يكتفي الحيوان لنشوء واتنوس .

1٥٥٥٦ - شكدي  
Diététique (F).  
Dietetic (E).

نعت تعريفي يوصف به ملجن الحمية او طريقة التشديد .

1٥٥٥٧ - شكدة  
الشكدة : اعتلاء الفرع من الحليب .

1٥٥٥٨ - شكع  
شكع الزرع : كثر حبه فهو شكع وشكع وشكوع .

1٥٥٥٩ - شكل  
Forme (F). Form, Shape (E).  
الهيئة الخارجية .

1٥٥٦٠ - شكمة ، بزمعة ، علفه  
Ration (F). علفه  
جزء من الشكدة وهو الدفعة الواحدة من الملف اليومي  
المترجس للحيوان .

1٥٥٦١ - شكوة ، مخي ، سقاء  
Baratte (F).  
Churn (E).  
وعاء مخفض فيه الكثرة لاستخراج الزبدة .



شكوة



شكينوس



شَلَح

Chalaze (F). Chalaza (E).

١٥٥٨٣ - شَلَحَز ٥

خيوط سريّة بيضاء .

Stillation, Egouttement (F).  
Dripping (E).

١٥٥٨٤ - شَلَحَلَة ٥

التقطر نقطة نقطة .

Prangos (S).

١٥٥٨٥ - شَلُطَة ٥

Prangos, Foin du Thibet (F). Prangos, Hay plant (E). Tibetanisches Heu (D) Prangos (I).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية معمرة من فصيلة الخبيثيات . جلونها عريضة ، سفها نخلة قليلة القروخ . اوراقها فارشة ، كبيرة القذ وعريضة . ازهارها صفراء اللون صتيرة || انواعها المعروفة قليلة اشهرها ما يلي .

١٥٥٨٦ - شَلُطَة الحَرْمُون (S). Prangos hermonis (S).  
Prangos de l'Hermon (F).

نوع من الشلطة منبها جبل الشيخ والحرمون . اوراقها صفيرة القذ ، خفيفة النصل . تستلحها الماشية ويسم عليها الحليب .

١٥٥٨٧ - شَلُطَة خَشْبَة ، قَرُش الضَّبَع ٥

Prangos asperula (S). Prangosière âpre (F).

نوع من الشلطة منبها الجبال اللبنانية السورية المعتدلة الارتفاع . اوراقها كبيرة ، مستنرة ، سميكة الصفحة الخشنة . لونها اال اخضر البحري الباهت .

١٥٥٨٨ - شَلُطَة \* ٥ ، غَرافوم ٥ Graphium

جنس فطور مجهرية من عصاة المذباتات وفصيلة الكحبيات . انواعها قليلة العدد ملونة الزرعات . منها الزرية التي تعيش على بعض الاشجار الحرجية اخصها الفراغار ومنها الطفيلية التي تتركب التار الخزونة كالتفاح والاجاص . اذا واقفها ونشطها عوامل البيئة .

١٥٥٨٩ - شَلُط ، شَلُط ، شَلُط ٥

Sélaciens (F). Selachil (E).

رتبة اسماك غضروفية الزعانف . فصائلها وابناسها كثيرة العدد جميعها متوسطة وكبيرة القذ . اشهر اجناسها القرش والكوسج والشار والياء والزعادة ، الخ .

١٥٥٩٠ - شَلُطَة ، شَلُطَة ٥

Eufs de lézard (F). Eggs of the lizard (E).

بيض الغطاء واشباها .

١٥٥٩١ - شَلُك Anguille (F). Eel (E).

الثلك وسمك الثلك والزلز هو الانقليس . اطلبه .

١٥٥٩٢ - شَلُك ، فَالِج Paralysis (F).

Paralysis (E).

عارض يسبب التهاب اللعماغ او النخاع الشوكي فينجم عنه الشلل .

١٥٥٩٣ - شَلُك وَرْدِي ، مُسَكَّرِين ٥

Muscardine

مرض خبيث معد لا علاج له يصيب دود القز سببه قطر مجهري من الطلوسيات يدعى طلورة باسبانا (Bassiana) غيراته ذرية تنقلها الريح وتدخل جسم الدود عن طريق الاكل فتقتضي على الدم بعد ان تحوله الى سوامف عضوية || مظهره الخارجي لمان في بشره الجلد يعمقه اصفرار وردي ثم ارتقاه في الجسم يزداد حتى الموت عند ذلك يتصلب الجسم ويسمر ثم تلوه ماجة صفراء اذا كان

١٥٥٧١ - شَلَح ٥

نبات يعرف بحبيشة البركة ، اطلها .

١٥٥٧٢ - شَلُط \* ٥

Sphaerites (S).

Sphérîte (F). Sphaerites (E).

جنس حشرات من فصيلة الشلاطيات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٦ الى ٧ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صتيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تأثيرها وفكوكها ضلعية . ملاسها كبيرة ، مسنة الحافة الداخلية . كواسلها مستنرة وصادة الاطراف الجانبية والامامية . امحادها لاحقة . قوائمها شديدة النشط . اثارها سوية اللون ، تكثر فيها الجؤرة السوداء المواج || تعيش على البراز والمواد الصغوية الخمطرة والمنحلة .

١٥٥٧٣ - شَلُطِيَّات ٥

Sphaeritidae (S).

Sphérîtides (F). Sphaeritidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صتيرة ، شبه بيضية الشكل . تطول من ٥ الى ٩ م . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها لانفطانية . ملاسها الفكية كبيرة وضلعية . قرونها الاستشعارية صولجانية . مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستنرة ، صادة الاطراف . امحادها لاحقة . قوائمها نشطة . ابراغها خماسية المقل || تعيش على البراز والمواد الصغوية والنباتية المنحلة || اشهر اجناسها الشلَط .

١٥٥٧٤ - شَلُك Cataracte, Chute d'eau (F).

Cataract, Waterfall (E).

منحدر مائي يعترض مجرى النهر .

١٥٥٧٥ - شَلَب ٥

Paddy

حب الرز غير المقشور ومتى زمت عنه جذباته فهو الرز . واحدته شلة .

١٥٥٧٦ - شَلَبَة \* ٥

Schilbe (S). Schilbè (F).

جنس اسماك نهريّة مأكولة من مفتوحات الماشاة وفصيلة السلوريات . انواعها عديدة جميعها من اسماك مياه البلاد الحسرة والاستوائية . اجسامها صفيرة القذ ، جلودها ماحة . رؤوسها مستنرة . رصها قصير ، الوها الى الربرة الكثيرة يملؤها تجنيج اسود || تصنيف طومها يأتي دون الوسط .

١٥٥٧٧ - شَلَبَة عَرَبِيَّة ٥

في الزريقة ، اطلها .

١٥٥٧٨ - شَلَجَم ٥

هو السليم ، اطلبه .

١٥٥٧٩ - شَلَجَم بَرِّي ٥

هو الاخناس ، اطلبه .

١٥٥٨٠ - شَلُج ٥

Sperme animal (F).

هو افراز اللغد التناسلية للذكورة عند الحيوان .

١٥٥٨١ - شَلُجِيَّة ٥

شَلُجِيَّة (F). Spermatologie (F).

شَلُجِيَّة (E). Spermatology (E).

الشلجية بحث الشلج اي الحي .

١٥٥٨٢ - شَلُر ٥

هو جلهم الحينة ، اطلبه .



شَلُفَة

انواعها المعروفة قليلة أعطائها الشرق الأوسط . سوقها فراء .  
اوراقها السفلى قشائرية التصل والعليا صغيرة مفردة أو  
مستنة . أزهارها صفراء اللون ، أرجوانية العروق . ثمارها  
خمرينية . بزورها فردية . أعرف أنواعها ما يلي .

- E. lyratus (S). شلوة قشائرية ، ابو قرن  
E. pterocarpus (S). شلوة مجنحة الثمر  
E. strangulatus (S). شلوة مخنقة  
E. arcuatus (S). شلوة مقوسة

**١٥٥٩٩ - شَلَوُف**  
هي البرمية النامية على الساق الأرضية في الحليون والعليق  
وما كان على شكلها من النبات .

**١٥٦٠٠ - شَلُوق ، شَمُوم**  
رعي لاهية مفضية مهمها أذرب الجنوب .

**١٥٦٠١ - شَلَوُكَات**  
هي المواد القولية الموجودة في نسج الحيوانات الحية ،  
وأحدتها شلوة .

**١٥٦٠٢ - شَم** راجع شامة .

**١٥٦٠٣ - شِمَاع ، شَفِيع**  
استمرار تقدم النمو التدريجي في مختلف أعضاء النبات .

**١٥٦٠٤ - شَمَادَة** هو الشاهد ، راجع .

**١٥٦٠٥ - شَمَادِيَّات**  
Theridillidae (S).  
Thériddiées (F). Theridillidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الريتلالات . اجناسها وأنواعها  
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة  
الحاررة . جميعها مفترسة . منها الصغيرة الحجم والمتوسطة  
والكبيرة . تتميز بطنها المتضخمة المؤنثة وبجرانها  
المستدقة الأطراف || شعما دقيقة الحيك تتسبها على  
النبات وبين الحجارة وفي شقوق الصخور || أشهر  
اجناسها الثياد والدماجة .

**١٥٦٠٦ - شَمَار ، شَمَرَة ، شُومَار ، وَزْبَانِج**  
Feniculum (S). Fenouil (F). Fennel (E). Fenekel (D).  
Finocchio (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الخيميات.  
انواعها عديدة . سوقها كثيرة الفروع خضراء اللون .  
اوراقها مركبة شديدة الخضار الباقي ، كثيفة المسام  
والندد البطرية ، فواصة العرف الذي || أشهر أنواعه  
للثمار الحلو .

**١٥٦٠٧ - شَمَار المَاء** Phellandrie aquatique (F).  
هو الشرطسط المنقي ، اعطيه .

**١٥٦٠٨ - شَمَار حُلُو**  
Feniculum officinale (S). Fenouil officinal, Aneth  
doux (F). Common fennel (E). Echter Fenchel (D).  
Finocchio officinale (I).

نوع من الشويار وهو من البقول المأكولة الأراقي .  
خواصه الصحية والطبية جزيلة التفع توجد في جذوره  
وأوراقه . وهو منه معوي يعرف أغاغاز ، يدر البول  
ويسكن التشنج . ادمان شره ينيه الفقد الجنسية .

الحل<sup>١</sup> جافاً ، أو خلة يضاء كالكلس اذا كان الحبل  
ربطاً || القاية منه تنحصر بالتطهير بالفرمول وبقروح  
الديدان المرصية فور اصابتها .

**١٥٥٩٤ - شَلَم ، فَلَاش** Flash  
ويصف نور موقوت يستعمل لتصوير في الفلام .

**١٥٥٩٥ - شِلَتُونُوس مُخْتَلِس**  
Chlaenius spoliatus (S). Chlaenle spoliateur (F).  
Chlaenius spoliatus (E).

حشرة واجمة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة عمديات  
الإلجنة . تألف المواق الرطبة وصفات مجاري الماء .  
انقراضها ويزيقاتها تعيش على المواد العضوية وعلى ما تستطيع  
اقتراض من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد يطول  
من ١٤ إلى ١٦ سم . ثوبها الى الخضار الجميل اللامع  
يكتنفه خط ماضي أصفر يطرق الظهران . رأسها متوسط  
الجرم . زباناها عظيم مستطيلان . عينها صغيرتان  
ناشرتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، تسامي  
الاعايد الهندية القاطبة . أرساغها خامية العقل || الأني  
أصفر قد من الذكر وفتح ثوبا منه واقتصر زبانا || لها  
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في مطلع  
حزيران وتمشي حتى أوائل ايلول . تسرح في النهار وتبيت  
في الليل || البرقة مردنية الشكل ، تطول عند تمام ادراكها  
نحو ٢٤ سم . جسمها غير اللون ، اسر الرأس والشرج  
والمدب || طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يوماً .

**١٥٥٩٦ - شِلَتُونُوس مَذْهَب الرَأْس**

Chlaenius chrysocephalus (S).  
Chlaenle à tête dorée (F).  
Chlaenius chrysocephalus (E).

حشرة واجمة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة عمديات  
الإلجنة . تألف بساتين السواحل . قوتها المواد العضوية  
وما تستطيع اقتراض من الحشرات الدنيا || جسمها صغير  
القد يطول من ٧ إلى ١٠ سم . ثوبها ثنائي اللون ، رأسها  
وكويلها الى الحرة النعاسية المنقعة المواج ، غداها الى  
الزرق السمر الخضار المواج . زباناها عظيماني دقيقان .  
عينها صغيرتان بارزتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع  
تسامي الاعايد الهندية القاطبة المتوازية الإبعاد . أرساغها  
خامية العقل || الأني أصفر قد من الذكر وفتح ثوبا  
منه واقتصر زبانا || لها جبل واحد في الحول . تظهر  
الحشرة الجملة في أواخر آذار وتمشي حتى أواخر حزيران .  
تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها  
تطول نحو ١٣ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسر  
الرأس ، اسود الرأس والشرج ، اغبر المدب .

**١٥٥٩٧ - شِلَتُونُوس** Anisochilus (S).  
Anisochèle, Anisochile (F). Anisochilus (E).

جنس نباتات طيبة برية حولية وبعمرة من فصيلة الشفويات.  
انواعها المعروفة قليلة العدد أعطائها الهند || الحولية منها  
عشبية اما الممرة فخشوية متصبية . اوراقها معتقة .  
متقابلة ، ثلاثية . نصالها بيضيه الشكل ، غيرا الخضار .  
أزهارها سنبل التجميع ، اسطواني الشكل ، طري الارتكاز  
انزعاجه صغيرة حمراء اللون || عصير اوراقها وزايعها  
شائع الاستعمال في معالجة النزلة الصدرية عند الاولاد .

**١٥٥٩٨ - شِلَوَكَة** Enarthrocarpus (S).  
Enarthrocarpe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .



شلونس غنلس



شلونس مذهب الرأس



شليس



شمار حلو



شام



شام اخضر



شام عجمي



شام مصري



شبن

## \* شَمَام عَجَمِي \*

Cucumis melo dudaim (S). Concombre dudaim (F). Apple cucumber, Queen Anne's melon (E). Apfel-melone (D). Cocomero melo (I).  
نوع من الشمام الزراعي الذي يزرع في بلاد الهند، صنفه اللد، جميعها حجم البرتقالة وهي نواحة الرائحة الذكية. قشورها ملساء البشرة، عادمة التضلع، لهايا قليل السكاكة كثير الالياف الغروية || يزرع للزينة.

## \* شَمَام مصري \*

Cucumis odoratissimus (S). Melon égyptien (F). Sweet melon (E). Egyptische melone (D). Popone, Poponcino d'Égypte (I).  
نوع من الشمام الاصفر المستطيل الشكل، مهد البلاد المصرية وقد اشتهر بتكته ولذة طعمه وقوة رائحته الذكية المستحبة || يزرع ويعامل كثير من الشمام وهو اجد صنفًا في الآثية غير المروية.

Chimpanzé (F). \* شَمْبَانِزِي \*  
جنس قنود كبيرة اللد من فصيلة الشمام الانسان، راجع بعامة.

1٥٦١٩ - شَمْبَانِيَا \*  
نوع من الحموض القوية الفاعلة. راجع خر شمانيا.

## \* شَمْبَق \*

Michelia champaca (S). Michélie champac, Champac, Sompac (F). Champaca, Champ wood (E). Schampakbaum (D). Champacs (I).  
نوع من الميثاليه من فصيلة اليفوليايت. وهو شجرة برية طيبة مهدها الهند الصينية، تحوي بعض الاصول المرة والطارية، تدخل في عدة تركيبات وقويات مغذية ويستخرج منها عطر الشيق المشهور.

1٥٦٢١ - شَمْبَق \* راجع شاخ.

1٥٦٢٢ - شَمْد \*  
الشمد: رفع الذئب فهو شامد وهو شامد.

Arbre support (F). \* شَمْدَة \*  
شجرة تقرب وتدس الى الكثرة لترتفع عليها.

Tordyle suave (F). \* شَمْرُ الجَيْسَل \*  
هو الشرعوب الحقل، اطليه.

Peucedane (F). \* شَمْرُ الحَنْتَارِي \*  
هو بنجر الاكراد، اطليه.

1٥٦٢٦ - شَمْرُ الكَلْب \*  
هو البابونج الثن، اطليه.

Hampe (F). \* شَمْرَاح \*  
Stem, Flower-stalk (E).  
عضو نباتي قزمي الانتساب منتصب الجالوس يحمل الازهار وقد ينوب عن الساق في بعض النبات.

Scapigère (F). \* شِمْرَاحِي \*  
Scapigerous (E).  
نعت تعريفية يطلق على كل نبات ساقه كالشمرانج او الزناد.

1٥٦٢٩ - شِمْرَاحِي الزَّهَر \*  
نعت تعريفية يطلق على كل نبات ازهاره شمراخية الارتكاز.

Scapiflore (F).

## \* شَمَاط \* Pygargues (F). Osprey (E).

جنس طير من العقبان وفصيلة البعقريات. انواعه عديدة اشهرها الشميطة الشائنة وشميطة الازهر والرخاء والسهج. تتميز بارسانها الكاسية حتى نصفها الاعلى. معظمها من الطواغ، تألف الشطوط البحرية وضفاف الانهار والبيارات. قتها الاسماك والمائية والطيور المائية والنباتات الصغيرة.

## 1٥٦١٠ - شَمَاطَة \*

جنس فطور مجهرية من عازة الطحانيات وفصيلة الكنتيات. يذيته بجنية الشكل، حلبي السطح، حلبي دقيق كثيف اسمى السطح، جره الكنتية متشعبة ممرسة، كنانته طرفية الارتكاز بيضية او مردنية الشكل. انواعه قليلة جميعها رمية تركيب المواد العضوية المنحلة.

## 1٥٦١١ - شَمَال، شِمَال \* Vent du Nord (F). North-wind (E).

هي الخنوء: الريح التي تهب من قبل الجبل بين مطلع الشمس وبنات تمش وقيل من مطلع الشمس الى مسقط النسر. ويكون اسما وصفة يقال هبت الشمال وريح شمال.

1٥٦١٢ - شَمَالِي \* Septentrional (F). Northern (E).  
نعت تعريفية يطلق على ما هو من الشمال او مركزه الشمال.

1٥٦١٣ - شَمَالِي \* Bordal (F). Boreal (E).  
نعت وصفي يطلق على ما هو خاص بالشمال القطبي.

## \* شَمَام \* Cucumis melo (S).

Melon commun (F). Melon, Musk-melon (E). Melone (D). Melone, Popone (I).  
ويدهي ايضا البطيخ الاصفر. نبات عجمي حولي زراعي من فصيلة القرعيات. ضروبه واصرامه عديدة. ساقه اسطوانية مدادة زياء البشرة خشنة للمس. اوراقه زنادية مختلفة الاشكال منها المستديرة والكلوية والمفصصة. نصلها مغزير الصفحة الخشنة، يامت الخضار البحري. ازهاره وحيدة المسكن، الذكري تظهر قبل الانثوية بهضمة ايام. ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها المستديرة والبيضية والاحليلجية والكبيرة والصغيرة، قشورها ناعمة المس، صفراء اللون، مضلعة. لهايا سميكة السويق، جاند المكسر، اصفر اللون، سكري الطعم، ذكي العرف. يزوه مستطيلة الشكل، تبينة اللون، كثيرة العدد || يجد في جميع الآثية الثنية بالمواد العضوية والناسر المعدنية بشرط ان لا تكون شديدة الاندماج. يزرع على مسافات تراوح ابعادها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. تشرع ساقه الرئيسية (الام) على وقتين. وتشرع ساقه الثانوية على ثلاث اوراق ثم تشرع ساقه التالية على خمس اوراق. كما وتعيشيه ضروريان، اما الارتكاز من ربه فقصر.

## 1٥٦١٥ - شَمَام اخضر، \* شَمَام كَنْتَلُو \*

Cucumis melo cantalupensis (S). Cantalupo, Melon galeux (F). Cantaloupe melon (E). Cantalupo, Beulen-melons, Rippen-Melons (D). Cantalupo, Melone cantalupo (I).  
نوع من الشمام الزراعي المأكول، اسرامه عديدة مختلفة الاحجام والاشكال تلب لها الاستدارة. قشوره مضلعة مبرطة بجمرة اللون حطيفة التآليل. لهايا سميكة السويق، لذية الطعم، متوسط الحلاوة، ذكي العرف، لونه الى الخضار الاحمر || معاملة الزراعية لا تختلف من معاملة الشمام.

### ١٥٦٣٧ - شَمَرْسَ لَدِيدٌ \* طُرْتَالِيَّةٌ لَذِيذَةٌ Tornelia deliciosa (S). Tornélie délicateuse (F).

نوع من الشمرس الشائع الاستعمال الزراعي المركزي. ساقه مدادة تقطو من ٦ إلى ٨ أمتار. أوراقه شبه قلبية الشكل عميقة التفريغ والتشريح، مستطيلة الزناد. نصلها مائل البشرة، جامد النسيج، شديد الخضار. ثماره اكراز غروبية طويلا نحو ٢٠ سم. وقطرها ٤، تبدو غصراء اللون ثم تتحول مع الإدراك إلى الالاحل فالاصفر. وهي سكرية المذاق لذيفة الطعم فواحة العرف الطري المستحب.

### ١٥٦٣٨ - شَمَرْهَاضُ Marsdenia (S). Marsdenie (F).

جنية معمرة جاحدة تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبه فراء. أوراقها معتقة، متقابلة، بيضيه الشكل، مقطوعة القاعدة، ذلقة الزام الاخير. نصلها جبل الخضار اللامع. أزهارها ضمية التجميع، عابجة اللون، عطرية، العرف الفواح المستحب || أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

### ١٥٦٣٩ - شَمَرْهَاضُ الْكَنْدُورُ Marsdenia condurango, Gonolobus condurango (S).

Marsdenie du condor, Gonolobe du condor (F). نوع من الشمرهاض. جنية معمرة طيبة من فصيلة السقليات. منتبها بعض مناطق أمريكا الجنوبية المتاخمة لحظ الاستواء. يكثر وجودها في البيرو وجبال الكورديليار على ارتفاع يراوح من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر || ساقها سريعة مدادة ومتسلقة تقطو طول أربعة أمتار. أوراقها متقابلة، معتقة، قصيرة الاثناق. نصلها احليجي الشكل، مدببة الاطراف. أزهارها نوردية التجميع، ابلي الارتكاز. أزهارها صغيرة، معتقة، خاسية البتلات، وردية اللون، مستحبة العرف الفواح || يستخرج من لحاء جذورها مواد مقوية مزة المذاق تدعى كنديريت وكنديروجنين تستعمل في معالجة الللل السرطانية.

### ١٥٦٤٠ - شَمَرْمَر \* Drymoea (S). Drymoea (E).

جنس طير من الجولام ضيات المناظر ينتمي إلى فصيلة الدخليات. انواعه المعروفة نحو ٧٠ اعطائها تمتد من افريقية الشرقية إلى الجزيرة العربية والشرق الاوسط واروبة الجنوبية. جميعها صغيرة الخلد، مستطيلة الشكل، قريية الشبه بالبعسل. اثوابها ثنائية اللون. ظهورها إلى الكهية أو الريدة الزيتونية المولج. بطونها إلى الصفرة أو البياض التي || معظمها من الطيور المهاجرة الضاربة، تدشن في الاجنار الزرقية وبين الصخور الناتئة. عشائها قدسية الشكل، متينة الرباط. اناثها تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً بتناوبة الذكور.

### ١٥٦٤١ - شَمَرْقِي بَكِيْس \* Thyaira batis (S). Thyatira batis (F). Thyatira batis (E).

حشرة من فصيلة الشمرقيات وردية سرغيات الانجسة. موطنها الاقاليم المتدلة الحارة من العالم القديم. فراشها جارية قوتها رحيق الانازار. سرقتها خالصة تموش على اوراق العوج والسرين || جسمها متوسط الشكل، غليظ نحو ١٧ م. بسطها نحو ٣٨ م. رأسها معتدل الجرم. عيناها

### ١٥٦٣٠ - شِمْرَاخِيَّةُ الشَّكْلِ Scapiforme (F). Scapiform (E).

نمت تعريفى يطلق على كل ساق نباتية شكلها كالشمرغ أو الزناد.

### ١٥٦٣١ - شَمْرَة Crithmum (S).

شَمْرَة بِحَرِيَّة \* Crithme, Fenouil marin, Perce-pierre, Passe-pierre (F). Samphire, Sea fennel, Peter's cress (E). Seebazilkrut, Meerfenchel (D). Erba corda, Finocchio marino, Baciglia (I).

نبات عشبي. بري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخسنيات ينبت على صخور الشواطئ البحرية. أوراقه سنائية لحسية ضيقة النصل البحري اللون نخل وتتمثل كسائر الحلات.

### ١٥٦٣٣ - شَمْرَة هَرَّة \* Thlaspi arvense (S). Thlaspi des champs, Herbe aux écus, Téraspic amer, Monnoyerre, Tabouret (F).

Mithridate mustard, Penny-cress, Wild-cress, Feldpfennigkraut (D). Tlaspi, Erba sterna, Milie flore (I).

نوع من الاندلسية من فصيلة الصليبيات، وهي من النباتات المشبية البرية التي تكثر في البور وتوجد في في الحقول المزروعة. أوراقها لحسية النصل الكامل. أزهارها علقية التجميع، ناجية الارتكاز، وردية اللون. يقال انها لا تملو من بعض المانغ الطبية.

### ١٥٦٣٤ - شَمْرَدَاس Metrosideros (S). Métrosidère (F).

جنس نباتات جنية برية معمرة من فصيلة الآسيات. انواعها المعروفة عديدة، مهدها يمتد من الهند إلى جزر الزايج || ساقها منتصبه، فراء. أوراقها متعاقبة، معتقة، بيضيه النصل الصغيرة الجامدة. أزهارها لاقياضية التجميع، محورية أو ابليية الانتشاب، طويلة الاثناق، خاسية البتلات الصفرة، مستطيلة الاسدية، مستحبة العرف.

### ١٥٦٣٥ - شَمْرَدِي Hymenocarpus circinatus (S). Hyménocarpe (F).

Hymenocarpus, Circular Medick (E). نبات عشبي، بري، حولي، وحيد الجنس والنوع من فصيلة القريقيات القرطائية. منته بعض اصناف سواحل البحر الابيض المتوسط اخصها الممتدة من انطاكية إلى غزة || ساقها فراءه زباد تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها خلية النصال، الصغل كاملة، ملقية الشكل، قرصية التجميع، اما العليا فركية، وقرية، خاسية الورديات أو قاسبتها. الوردية الانتهائية دائماً اكبر من رديقاتها || أزهارها ابليية الارتكاز، مستطيلة المالميق، صفراء اللون || تنويرها يستمر من آذار إلى ايار.

### ١٥٦٣٦ - شَمَرْسَ، طُرْتَالِيَّة Tornelia (S). Tornélie (F).

جنس نباتات سريعة مدادة معمرة من فصيلة القلقاسيات. انواعه المعروفة ١٢، ساقها اسطوانية متتابعة السلايات القصيرة، المنسبة، الجذرية المقد. أوراقها مستطيلة الزناد، كبركة النصل الفارار المزروع التصفيغ والتتابع التشريح. ثماره اكراز غصراء اللون، غروبية الشكل، مستطيلة، تركز على مالميق ابليية الانتشاب غليظة.



شَمْرَة بحرية



شَمْرَة هَرَّة



شَمْرَدَاس



شَمَرْمَر



شَمَرْقِي بَكِيْس



## ١٥٦٥٠ - شَمَشِيل رَوَّاح \*

*Trogophloeus riparius* (S). *Trogophléée rusée* (F).  
*Trogophloeus riparius* (E).

حشرة نائلة قانصة من فصيلة الدبابات ورتبة معدنات الاجنحة. تألف شفاه مجازي الماء. قوتها المواد العضوية والديدان || جسمها صغير القدر يطول من ٥ الى ٦ م. ثوبها اسود باستثناء الظفون والجرار والزيان فانها جوية. رأسها صغير الجسم قصير الخط. زباناها غيطاني. عينها كيرتان جاسقستان. ظهراها صغير القدر لا يلمس اكثر من خشي البطن. ارجلها خنثى القدر || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في نيسان وتمشي حتى آب. تسرح في النهار. تساق بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع. تمتع المكان في التربة تحت الجملة والعلل || البرقة عند بلوغها الكلال الجسدي تطول من ٨ الى ١٠ م. جسمها حديدي التركيب شبه اسطواني الشكل، حنطي اللون، اسمر المواجه، اسود الرأس والرواجب، نشيط التأثير || الطور الاكمامي يستمر نحو ستة اسابيع ويتقضي في التربة ضمن جراب من اللبن والمواد العضوية.



شمشيل رَوَّاح

١٥٦٥١ - شَمَطُط  
Coupage (F). Diluting (E).  
خلط بعض الخمر ببعضها لغرض ما.

١٥٦٥٢ - شَمْع عَسْكَي، عَسُو  
Cire (F).  
Beeswax (E).  
هو موم السمل مادة شمعية يفرزها النحل لبناء تخاريفه.

١٥٦٥٣ - شَمْعِدَان، مَالِلَة  
Candélabre (F).  
Candelabrum (E).  
شكل من اشكال التشذيب غاص بالانجار المستدة.

١٥٦٥٤ - شَمْعَكَة  
هي الاغراب، اطبله.

١٥٦٥٥ - شَمْعِيَّات  
Myricaceae (S).  
Myricacées, Myricacées (F). Myricaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. انواعها نحو ٣٠، يجمعها جنس واحد. نباتاتها اثمار ومجبريات فراء، اللوق. اوراقها صغيرة القدر، جامدة التصل، تفرز مادة شمعية تستخرج بعلل الاوراق في الماء.

١٥٦٥٦ - شَمْعِيَّة، شَجَرَة الشَّعْب  
Myrica (S). Myrica, Cirier, Arbre à la cire (F). Bayberry, Candle berry myrtle (E). Wachsgagel, Wachsmyrte (D). Mirica, Albero della cera (I).  
جنس اشجار ومجبريات من فصيلة الشمقيات. انواعها المعروفة ٣٠، جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. اوراقها ابيدة، شمعية، مستطيلة الشكل، صغيرة القدر. فصلها جامد الشجج، كثيف المام الشمعية. اثمارها سنبل التجميع، متراكب السيفليات. اثمارها صغيرة القدر خضراء اللون. ثمارها نوية لحية وصيدة العجبة. انجارها سريعة النمو ترطب في الاراضي الرطبة وتستعمل في اصلاح مناخات المناطق || اشهر انواعها الشمعية الثالثة والصينية والمطرقة والقلبية الورق.

١٥٦٥٧ - شَمْعِيَّة  
هي لبدة التين، اطبله.

١٥٦٥٨ - شَمْعِيَّة الحُمْفِيَّات

هي لبدة الحُمْفِيَّات الصيفية، اطبله.

كيرتان. زباناها غيطاني. مرشفا ملثف مستطيل. جوشها وبطها الى الحنطي ويملو بطها غط ليجي بني || روشنها الاماميان، عند الشقين، الى البني الاكلف يعلو خمس بنج ودية يتوسطها الحنطي. روشنها الخلفيان الى الحنطي الاخير تملو مشحة شفراء || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في الليل. تماطل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتص الممكن لطعاً مستطيلة تغلفها مادة غروية تلتصقها بالصفحات السفلى من نصال الاوراق || السفة تطول من ٣٥ الى ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، ماس الشثار. ثوبها الى الطحلة السمره تملوها سبة عطلوط معتزفة جانبية جوية. رأسها الى الجوزة. مدنها ورواجها الى السمرة || طور الاكمام الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي بين وقتين تضمها السرعة وتربطها بجيوط حريرية.

## ١٥٦٤٢ - شُرُوبِيَّات

Thyatiridae, Cymatophoridae (S).  
Thyatiridés, Cymatophoridés (F). Thyatiridae,  
Cymatophoridae (E).

فصيلة حشرات فراشية. من حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠ معظمها من حشرات الاقاليم المعتدلة الحارة للمنطقة نحو الباردة || اجسامها وشعية متوسطة القدر او صغيرة. رؤوسها صغيرة. عينها زنجية جرداء. قرننها الانشعابية خيطية او مشطية. ملاسها صغيرة مرطبة الاطراف. مارشفا مستطيلة. بطونها كثيفة الخدل والزغب. حذائنها جانبية الارتكاز تقع عند قاعدة البطن. رؤسها الانامية اطول من الخلفية واقل استدارة منها واكثر بقبجياً وزركمة. جرائنها رباعية المناخس. مكتبها مكور. اساربها عريضة. غادراتها تلتصق بنصال الاوراق التي يجمعها الى بعضها البعض يجيوط حريرية || اشهر اجناسها الشمروق والمروش والقيتل والهروسين.

١٥٦٤٣ - شَمْس  
Soleil (F). Sun (E).

الشمس جرم سماوي تدور الارض في فلكه على بعد ١٧١,٣١٠,٠٠٠ كيلومتر. والشمس التي تعتبر مصدر الحياة على الارض بما تبته من حرارة وضوء هي جسم ناري يقدر قطره بنحو ١,٦٠٠,٠٠٠ كيلومتر وتقدر حرارته البالغة بنحو اربعين مليون درجة وحرارته السطحية بنحو سبعة الاف درجة || ويمتد بعض الفلكيين ان مصدر هذه الحرارة الوعاجة اللافحة هو الطاقة الحرارية الناشئة من تحطيم جزيرات العناصر التي تتكون منها والتي توف بالكهرباء || اما مدة دورة الشمس حول محورها من الغرب الى الشرق فتتم في ٢٥ يوماً.

١٥٦٤٤ - شَمْسِيَّات  
Héliozoaires (F).

رتبة كائنات حيوانية مجهرية من الجفريات.

١٥٦٤٥ - شَمْسُفَاد هو اليقس، اطبله.

١٥٦٤٦ - شَمْسُفَاد الحُمْفَر

هو اليقس الدائم الحُمْفَر، اطبله.

١٥٦٤٧ - شَمَشِيل هو الفيل، اطبله.

١٥٦٤٨ - شَمَشِيم هو المختور البري، اطبله.

١٥٦٤٩ - شَمَشِير هو اليقس الدائم الحُمْفَر، اطبله.

ان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية . وهو في الزراعات الكبيرة يذغر مباشرة في التربة على خطوط متساوية الإبعاد . أما في الزراعات البستانية فيبدر في شتائل خاصة ثم ينقل الى مستقره عندما يبلغ ارتفاع شتوله (بوارشه) نحو ١٥ سم . اما معاملته الخاصة في الفترة القائمة بين الغرس وحبس الحصول فمادها عرق وتعيشب وري .

١٥٦٦٧ - شُمَيْدَلَر بَرِّي ، شَوْنَدَر بَرِّي  
Beta silvestris (S). Betterave sauvage (F). Wild beet (E). Wilder mangold (D). Bietola selvatica (I).  
هو الشوندر البري الذي يكثر في المناطق والأراضي الرطبة . وهو من النباتات الحولية ، جذوره صغيرة دقيقة تكاد تكون متفرعة . أوراقه القرصية ضيقة النصل المستطيل . ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم .

١٥٦٦٨ - شُمَيْدَاد  
Laminoir (F). Flattening-mill, Rolling-mill (E).  
الشهداء آلة لتصفيع المدن وتحميده .

١٥٦٦٩ - شُمَيْدَة  
Laminage (F). Laminating, Flattening (E).  
الشهداء تطريق المدن لتصفيعه او تحميده .

١٥٦٧٠ - شُمَوَا\* ، قَدَر ، قَادَر  
Rupicarpa tragus (S). Chamois (F). Chamois (E).  
حيوان من الظباء الحشرية ، وسيد الجبل والفرع شبيه بالمر والاروية يتميز بقرنيه المجولين اللينين اذفاء منتصبان . عتقه مستطيل . جرمزه ضخمة قوية . ذنبه شديد القصر . اثناء ثنائية الخلف . ثوبه يتغير مع فصول السنة والسن الا بطنه الدائم البياض || موطنه جبال اوروبا وآسية الصغرى . يألف الاماكن الوعرة ، يعيش على حدود الثلج . اثناء قتع جلدًا واحدًا ترصمه ٣ اشهر وتحفنه حولًا كادًا .

١٥٦٧١ - شُمُور  
Diamant (F). Diamond (E).  
هو الماس ، اطله .

١٥٦٧٢ - شُمُول  
Mûre (F). Mulberry (E).  
هو ثمرة التوت وما شاكلها من الثمار كاشليك ... اما ثمرة العليق واتباعه فتدعى مصعة .

١٥٦٧٣ - شُمَيْدَلَة أُسُوبِيَة\* ، اَلْوُفِيل\*  
Allophylus, Schmidella (S). Allophylus, Schmidella (F). Allophylus (E).  
جنس نباتات شجرية معمرة من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة حسة اعطائها البلاد الحارة من الماين القديم والجلد . جميعها اشجار صغيرة الحجم ، مظلية الشكل . أوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاتها بيضيه النصل المسنن الحافة . ازهارها ابطي الارتكاز ، سنبلي التجميع . ثمارها كروية الشكل واللقد ، مستحبة العلم ، سكرية المذاق || اشهر انواعها الزراعية الثلاثة التالية :

١٥٦٧٤ - شُمَيْدَلَة أُسُوبِيَة\* ، اَلْوُفِيل  
Allophylus cobbe, Schmidella serrata (S).  
مهدا البلاد الاسيوية الحارة . ثمارها برتقالية اللون ، مأكولة .

١٥٦٥٩ - شُمَيْتَة شَالَمَة\*  
Myrica communis (S). Cirier commun, Myrica commun (F).  
نوع من الشمية وهي شجيرة سبروتية تملو نحو ٤ امتار . ثمارها نورية صغيرة القصد ، باذنجانية اللون ، شمية الغشاء . أوراقها عطرية تستعمل في صناعة الحبر الاسود . اما ثمنها فيستعمل كالشمع الكاشع ويدخل في صناعة الصابون . يقال ان جذورها لا تخلو من المنافع الطبية .

١٥٦٦٠ - شُمَيْتَة صَيْتِيَة\*  
Myrica edulis (S). Myrica comestible, Cirier comestible (F).  
نوع من الشمية وهي شجيرة سبروتية تملو نحو ٥ امتار . مهدا البلاد الصينية ، ترغب في الموامق المتدلة الرطوبة . ثمارها مأكولة مستحبة العلم ، صمراء اللون او صفراء .

١٥٦٦١ - شُمَيْتَة عَطَرَة  
Myrica gale (S). Galé, Piment royal, P. aquatique, Myrte bâard (F).  
نوع من الشمية وهي شجيرة سبروتية كيرة القد تملو نحو عشرة امتار . أوراقها عطرية تستعمل في غسيل الثياب ولغظ الاثمة من حيث بعض الحشرات كالعث .

١٥٦٦٢ - شُمَيْتَة قَلْبِيَة اَلْوَرَقِ  
Myrica cordifolia (S). Myrica à feuilles en cœur (F).  
نوع من الشمية وهي شجيرة متوسطة القد تملو نحو ٨ امتار . أوراقها قليلة الشكل ، يستخلص منها شمع اخضر اللون يستعمل كالشمع المادي ويدخل في صناعة الصابون .

١٥٦٦٣ - شَمَقِ\*  
Biophylaxie (F). Biophylaxy (E).  
الشمق يبولوبيا مجموع وسائل المقاومة الممكن ان يجمعها الجهم لفصان عافية ونشاطه .

١٥٦٦٤ - شَمِيل\*  
ما يبيى في التخل بعد قفاه . ج شاميل . والتشاليل هي عروق النخل الباقية .

١٥٦٦٥ - شَمَائِلِي\*  
Paléarctique (F). Palearctic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالمنطقة الشمالية من العالم القديم ، أي من آسيا واروبية .

١٥٦٦٦ - شُمَيْدَلَر ، شَوْنَدَر ، شَمُوطَلَة  
Beta vulgaris rapa, B. rapa (S). Betterave (F). Beet-root (E). Echter Mangold, Rübe (D). Barbabietola (I).  
نبات عشبي زراعي محول من فصيلة السرمقيات . غرضه واصلره كيرة العدد تقسم الى ثلاث فئات . فئة الضروب البقلية التي تستعمل للاكل والمخللات وفئة الضروب السكرية التي تستعمل لاستخراج السكر والاشا وفئة الضروب الملحية التي تستعمل لذاد الماشية || جذوره ضخمة لبيانية مختلفة الاشكال والاحجام ، ساقه ليفية فروع تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه الجذعية قرصية الانتساب كيرة النصل ، غليظة الصلح الحمرء ، متعسجة النسيج ، مالة البشرة ، عابية الخضار . ازهاره خنثوية خاصة التركيب . ثماره حبوب مقرنة ، جافة ، شائكة ، تلتف بعض البزور الصغيرة القصد ، الكلولية الشكل ، السراء اللون . والشوندر يرغب في الارربة المتوسطة الانتداج والرطوبة الميعقة النور وهو ينحس الاثرية الجسدية والصلصالية المتلحجة وكل تربة جافة عادمة الاحتفاظ بالرطوبة . يزرع عادة في اول الدورة الزراعية مها كان قولها



شمية شائمة



شمية صمينة



شمندر



شمندر بري



شموالة



شميدة



شُبَيْكَةُ الْوَحْرِ

على غصاف الأنهر والبحيرات. يذفن وكته الذي يبلغ قطره نحو ٢٠٠ سم. على التربة وصل الصخور وفي قم الإيجار اليابسة. أثناء تبين من الربيعين إلى الثلاث فئات تحفنها بسدعا نحو ٥ أسياع.

Chen (S). Chen (F). ١٥٦٨٢ - شِين ٥

جنس طير من فتيات القدم وفصيلة الوزيات. انواحه المعروفة ثلاثة موطنها المناطق القطبية تجوبا كل عام وقد تقرب من المناطق الباردة والممتدة الحرارة لكنها لا تقيم فيها أكثر من أسبوعين أو ثلاثة // أسياعها كبيرة اللقد. إرساها أطول من إرساغ الور اليمادي. منايدها رقيقة الأطراف المحددة عرضاً. أنواها سوية اللون الأبيض تملوه بعض الزغارف التي تختلف باختلاف الأنواع // تدفن في أفاحين تحفنها بين صخور المحاجم. الانثى تضع في ١٠ إلى ١٢ بيضة تحفنها بمنواة الذكر نحو ٣٠ يوما. أشهر أنواعه شن الشمال الأقصى.

١٥٦٨٣ - شِنُ الشَّمَالِ الْأَقْصَى \*، وَرَّةُ

Chen hyperboreus (S). الدَّمِيكُ ٥  
Chen hyperboreus, Oie des neiges (F).  
Snow goose (E).

نوع من الشن وفصيلة الوزيات. أعطانه معظم مناطق القطب الشمالي، ملجئه الحيواني جاعي // جسمه كبير اللقد، أبيض اللون، أسود أطراف القوائم، أشهب الملية، أحر الالك الملوي من المنقاد، أبيض السفلى، أزرق اللقط أي الطرف. أحر الجفون. كسني الخدقة. أصفر الرنق والقدم.

١٥٦٨٤ - شَتَلُ Bartavelle, Perdrix bartavelle  
هو الحجل الروبي، الملبه.

١٥٦٨٥ - شَنَاشُ ٥، مَوَالِيدِي

Naturaliste (F). Naturalist (E).  
الشناش العالم بالطبيعات أو التاريخ الطبيعي أو بلم المواليد.



شِنُ الشَّمَالِ الْأَقْصَى

١٥٦٨٦ - شِنَاطَةُ ٥  
Polymérisation (F).  
Polymerization (E).  
هي انقسام أو امتزاج ذرات متشعبة في مركب تلج عنه خواص طبيعية وكأوية مختلفة.

١٥٦٨٧ - شَنَاقَةُ  
Pleurs (F). Tears (E).  
التلع الذي يقطر من الشجرة عند حزن ساقها أو تقليم أغصانها وقصباها. ويدعى أيضاً الدماغ.

١٥٦٨٨ - شَنَبَاةُ  
المرانة الأمليسية ليس لها نوى وأما هي ماء في قنر على خلقة الحب من غير عجم. (اللسان).

١٥٦٨٩ - شَنَبِيدُ  
Fleurs de colchique (F).  
Flowers of colchicum (E).  
هو زهر السوزيخان

١٥٦٩٠ - شُبُوتُ أُسُودِ الرَّأْسِ \*  
Amphimallus ater (S). Amphimallus noir (F).  
Amphimallus ater (E).  
حشرة غاشلة ضوئية المسرح من فصيلة الجمليات وريقة مفعمات الاجنحة. موطنها معظم اقالم البلاد الممتدة



شُبُوتُ أُسُودِ الرَّأْسِ

١٥٦٩٥ - شَمْبِيدَةُ أَفْرِيقِيَّةٌ ٥، أَلُوفِيلُ  
الْفَرِيقِيُّ ٥

Allophylus zeylanicus, Schmidella africana (S).  
مهدعا أفريقية الشرقية وسرندفله والمهند. ثمارها ارجوانية اللون مستحبة السلم.

١٥٦٩٦ - شَمْبِيدَةُ مَأْكُولَةٌ ٥، أَلُوفِيلُ  
مَأْكُولُ ٥

Allophylus edulis, Schmidella edulis (S).  
مهدعا البرازيل. ثمارها حراء اللون لذينة السلم.

١٥٦٩٧ - شَمْبِيَسَةُ، مِيكُرُومِيرِيَّةُ

Micromeria (S). Micromérie (F). Micromeria (E).  
Bartsaure (D). Micromeria (I).  
جنس نباتات عشبية برية وريديتين من فصيلة الشفويات اوراقها صغيرة اللقد متعاقبة. ازهارها معتدلة التجميع، ابطي الاركنكاز. ازهارها صغيرة الحجم، قصيرة المالحق، دقيقة الامن. فيها الابيض والاحمر والازرق والمزلف. أشهر أنواعه التريديتي ما يلي.

١٥٦٩٨ - شَمْبِيَسَةُ الْوَعَرُ \*

Micromeria rupestris (S). Micromérie rupestre (F).  
نوع من الشمية المصرة تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها قرعاء مزغيرة. اوراقها بيضيه التصل المقر القاعدة تطول نحو ٨ سم. ازهارها الى البيضاء المرفط بالازرق. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز وهي من النباتات التي ترفب في الاراضي الوعرة تعيش بين الحجارة والصخور وفي جميع الاماكن المعرضة للشمس.

١٥٦٩٩ - شَمْبِيَسَةُ كُرُوَابِيَّةُ

Micromeria croatica (S). Micromérie de Croatie (F).  
نوع من الشمية المصرة تملو نحو ٢٠ سم. ساقها قرعاء زباء. اوراقها قليلة الشكل، لاخته المتق، تطول نحو ١٠ سم. ازهارها حراء اللون او ودية، مستطيلة الامن الدقيقة // ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٦٩٠ - شَمْبِيَطَةُ الْأَنْهَرُ

Pygargus leucorhynchus (S). Pygargue leucorhynphe (F).  
Sea eagle (E).  
طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. موطنه الشرق يجوبه من تركيا الى الصين ومن الهند الى سيبيريا، طوله نحو المتر. الانثى أكبر حجماً من الذكر. ثوبه الى السمرة الصفراء، رأسه وذنبه الى البيضاء المالحق، بطنه متمش الريش بالابيض // يألف غصاف الأنهر والبحيرات. يذفن عنه في قم الإيجار اليابسة.

١٥٦٩١ - شَمْبِيَطَةُ شَائِكَةٌ \*، عَقَابُ الشَّطْرِ  
Haliaeetus albicilla (S). Pygargue vulgaire, P. à queue blanche (F). White tailed eagle (E).

طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. طوله نحو المتر. يخلتف مع البسر يرتكز على السمرة. بطنه متمش بالابيض ونسبة البيضاء في الريش تزداد حويلاً بعد كل تخمير. راسه وصقته الى السمرة البقاء. ذنبه ابيض، مغاره وغطاله صفر // موطنه فسح الاربايح يحوب البلاد الاسيوية والاروية والافريقية الشمالية والامريكية. يألف الصخور البحرية والارباح القائمة

مهددا وواي حوض البحر المتوسط . توجد في الاراضي المذسة . جذورها خضائية يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال البيولوجي والصناعي .

### ١٥٦٩٧ - شَجَرَاتٌ مَثَلَتْ الْأُرْكَانَ

*Onosma albo-roseum* (S). *Orcanette tricolore* (F). نوع من الشجيرات الزينة المعمر . ساقه يعلو نحو ٢٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل ، نعلها معطوم القاعدة اغبر اللون . ازهاره كبيرة القد تطول نحو ٥ سم . تبو يضاء اللون ثم تحترق الى الاحمر الدموي وتستقر على الازرق . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٥٦٩٨ - شَجَرَاتٌ حَجَمِيَّةٌ

*Onosma stellatum* (S). *Orcanette étoilée* (F). نوع من الشجيرات الزينة المعمر . ساقه فروع تطو نحو ٢٠ سم . اوراقه اعليجية ، مستطيلة ، ملتفة اختار . نعلها الى اخضر البحري الباهت تملو بقع من الزغب كالحلب نجمة الشكل . ازهاره الى الصفرة الكبرى يطولها موج اخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

### ١٥٦٩٩ - شَجَرَاتٌ هَرَمِيَّةٌ

*Onosma pyramidalis* (S). *Orcanette pyramidalis* (F). نوع من الشجيرات الزينة المعمر . هرمي الشكل ، فصي اللون ، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . ساقه فروع زياء اللحاء . اوراقه الجذعية سنائية النصل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٢٥ سم . ازهاره خلية البشرة تبو ارجوانية اللون ثم تحترق الى الليملي || ازهاره يستمر شهراً واحداً ينتهي في اوائل تشرين الاول .

### ١٥٧٠٠ - شَجَرَاتٌ ، أَنْجَبَا

*Lithospermum* (S). *Grémil* (F). جنس نباتات عشبية برية ويزينية معمرة من فصيلة الحمحميات . انواله ٣٠ جميعها اشباب فروع السوق . اوراقها متعاقبة ، صغيرة القد ، ضيقة النصل . ازهارها عقودية التجميع ، محورية وطريقة الارتكاز ، مختلفة الالوان . بزورها صلبة ، غبراء اللون ، لامة كالؤلؤ . اشهر انواله ما يتبع .

### ١٥٧٠١ - شَجَرَاتٌ أَبْيَضُ

*Lithospermum canescens* (S). *Grémil blanchâtre* (F). نوع من الشجيرات الزينة . ساقه وفروعها زياء اللحاء . تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقه لاطئة خيلطة مستطيلة . ازهاره الى الصفار النثبي . ثماره بيض || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

### ١٥٧٠٢ - شَجَرَاتٌ أَحْمَرُ ، حَمَلَمَة

*Lithospermum arvense* (S). *Grémil des champs*, *Lithosperme* (F). *Corn-gromwell*, *Bastard alkanet* (E). *Ackersteinsame*, *Korngift* (D). *Lithospermo*, *L. del camp*, *Strigolo selvatico* (I). نوع من الشجيرات البرية يعلو نحو ٥٠ سم . اوراقه لاطئة ضيقة ومستطيلة . ازهاره حمراء اللون . بزورها طرية . جلوره خضائية ، صباغها احمر اللون .

١٥٧٠٣ - شَجَرَاتٌ مَخْزَنِيَّةٌ ، حَبَّ الْقَلْبِ ، كَأَسَرِ الْحَجَرِ ، حَالُومٌ

*Lithospermum officinale* (S). *Grémil officinal*, *Herbe aux perles* (F). *Common gromwell*, *Pear Plant* (E). *Echter steinsame*, *Perlenkraut* (D). *Lithospermo officinale*, *Erba delle perle* (I). نوع من الشجيرات البرية يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه ضيقة النصل المزغير المقعقة . ازهاره ودية اللون ، خلية البشرة . بزورها لؤلؤية طرية تدر البول .

المحرة من الشرق الاوسط واروبة . تألف الحشاب والاراضي المذسة التي يطغى عليها عنصر الجص . خنافسها تميش على اوراق الاعشاب . يرقاتها تققم جلور التجليات وغيرها من النباتات العشبية || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها ثنائي اللون اسود الرأس والكولس واليلع ، بني الظهر والجرازم . رأسها صغير الجرم ، زباناها مرقيا التركيب ، عشاريا الفصص ، وقفا الاطراف . كرسها خلي الصلعة . ارساغها خضائية العنق ، محبة الحالب || الاثني اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واضمح بعلقاً واعلن سراً || لها جيل واحد في الحول . قطرها الجملانة في اواخر ايار ويبقى حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا قريبة الشبه بالعودة البيضاء . جسمها مقوس الشكل ، مستطيل الرأس اسمر ، متضخم الطرف ، ابيض اللون ، اغبر الموج ، صلح الفكين ، اسمر الرواسب الملهدة الاطراف || طور الاكمال يستمر نحو ثمانية اسابيع .

### ١٥٦٩١ - شَشْرَقَة ، شَشْرَقَة (Palmure (F).

*Web-footed* (E). هي الخياط مادة جلدية او غشروفية تجمع ما بين اصابع الطير وغيره من الحيوان . ج شتار .

### ١٥٦٩٢ - شَجَرَاتٌ

*Orcanette*, *Orcanète* (F). *Orcanet* (E). *Orcanette* (D). *Organetta* (I). جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الحمحميات . انواعه نحو ٢٠ ، ساقها فروع مهدية اللحاء . اوراقها متعاقبة . نعلها خلية البشرة او نجمة الزغب . ازهارها خلية التويجات مختلفة الالوان فيها الالبض والاحمر والوردي والازرق || اشهر انواعه المعروفة ما يلي .

### ١٥٦٩٣ - شَجَرَاتٌ أَرْمَنِيَّةٌ

*Onosma bourgais* (S). *Orcanette d'Arménie* (F). نوع من الشجيرات الزينة السبروتي . منته ارمينية يعلو نحو ٣٠ سم . ساقه فروع . اوراقه سنائية الشكل نعلها معطوم القاعدة ذلق الطرف . ازهاره ملوكة يضاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٥٦٩٤ - شَجَرَاتٌ بَرَّةٌ

*Aikanna tinctoriale* (F). هو الكهان الصباغي ، اطليه .

### ١٥٦٩٥ - شَجَرَاتٌ حَرِيرِيَّةٌ

*Onosma sericeum* (S). *Orcanette soyeuse* (F). نوع من الشجيرات البرية المعمر . ساقه مسطحة تطول نحو ٣٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل ، زياء النصل . ازهاره صفراء اللون ، خلية البشرة في جميع اعضائها || موطنه حشباب وسبال الشرق الاوسط ، يمتد من الاناضول الى جبال ايران || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٥٦٩٦ - شَجَرَاتٌ صَبَاغِيَّةٌ ، أَنْشُورَة صَبَاغِيَّةٌ ، يَرْطَلُن الصَّبَاغِيْن ، حَمَلَمَة الْغَزَلِ ، كَحَلَاء

*Onosma echinoides*, *O. tinctoria* (S). *Orcanette vipérine*, *O. tinctoriale*, *O. de Provence* (F). *Dyer's bugloss*, *Dyer's orcanet* (E). *Färbrochsenzunge* (D). *Organetta tinctoria* (I). نوع من الشجيرات البرية والزراعية المعمر . جلوره ليمية عشوية لها الى الجفوة . ساقه فروع تملو نحو ٤٠ سم . اوراقه صغيرة ، لسنة ، مقعقة القاعدة . ازهاره غطرية ابطية وتاجية الارتكاز يعلب فيها الاصفر الالبض الموج .



شجار صباغي



شجيرات مخزني

## ١٥٧١٢ - شُتْدَابْ جَبَّار

*Eryngium giganteum* (S). Panicaut géant, Grand chardon (F).

نوع من الشنداب، يعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقه خضراء متشعبة. أوراقه مفصصة وبغرضه، نصلها جامد الصلابة، متباعد التسنين، قوي الشوك. أزهاره كبيرة اللثة، ورؤسها قليلة التجميع، لوها إلى الأزقة الزاهية || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

## ١٥٧١٣ - شُتْدَابْ جَمَسِي، شَوْكَة زَرْقَاء

*Eryngium amethystinum* (S). Panicaut améthyste (F). نوع من الشنداب، يعلو نحو ١٠٠ سم. أوراقه خضراء التفريش، جامدة النصل البحري اللون، حثارة متباعد التسنين مستطيل الشوك. أزهاره ويولج أوراقه إلى الأزقة الجلسية || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.



شنداب

## ١٥٧١٤ - شُتْدَابْ عَاجِي

*Eryngium eburneum* (S). Panicaut ivoirien (F). نوع من الشنداب، يعلو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه طول نحو ١٠٠ سم. صفحتها العليا خلية لينة، عاجية اللون. أزهاره صغيرة الرؤيسات، كثيرة العدد، يضاء اللون || أزهاره يستمر طوال الصيف.

## ١٥٧١٥ - شُتْدَابْ مُنْبَسَطُ الْوَرَق

*Eryngium planum* (S). Panicaut à feuilles planes (F). نوع من الشنداب، يعلو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه يفضية الشكل جامدة النصل المنبسط الصلابة يعلو نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٧ حثارة لياقي التسنين، استانه قصيرة المذهب الشالك. - أجزاؤه إلى الأزقة الزاهية. || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

## ١٥٧١٦ - شُتْدَابْ مَتَقِي، شُتْدَابْ مَائِي

*Eryngium aquaticum* (S). Panicaut aquatique (F). نوع من الشنداب، يربغ في المنائق والمواقع الرطبة. يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه شرفانية مستقيمة القاعدة والطرف طول نحو ٧٥ سم. وتعرض نحو ٣. نصلها جامد الصلابة، عايق الخضر البحري، شالك الخضر المذهب. أزهاره يضاء اللون يملوها يولج أخضر || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

## ١٥٧١٧ - شُتْدَلْ

*Locustella* (S). *Locustella* (F). جنس طير من فصيلة البغليات. أنواعه المرفوقة ثمانية موطنها الشرق الأدنى وأروبه. أجسامها صغيرة اللثة، مناقبها غرزية الشكل. اجنبتها وذناؤها متوسطة الطول. تألف المراعي والمنائق وضفاف الأنهار. قوتها الحوام واليزود البرية. تدن في الأدغال وفي الأججار للندوة. أنثاها تقص من ٤ إلى ٥ يضايات تحفها بتناوب الكدور: أعرف أنواعه وأشهرها الشتل الأحمر.



شتدل أمر

١٥٧١٨ - شُتْدَلْ أَمْر \* *Locustella naevia* (S).

*Locustella tachtée* (F). Grasshopper warbler (E). نوع من الشتل. طوله نحو ١٤ سم. ثوبه متناقل الألوان. رأسه وظهوره وجناحاه وذنبه إلى السلحة الخطية الزرقية الموج تملوها رشفة سوداء. زوره وصدره إلى الصفار المخطئ. بطنه وراشكه إلى الصفار الباهت الأخضر الموج || تألف ضفاف الأنهار والحدائق والجائش والمراعي. ينش عشه في الأدغال. أثناء تقص أربع يضايات تحفها بتناوب الذكر من ١٤ إلى ١٥ يضايات.

## ١٥٧٠٤ - شُتَجِير مُسَطَّح

*Lithospermum prostratum*, *L. diffusum* (S). Grémil couché (F).

نوع من الشجيرات الزينية البروتي المعمر. يعلو من ١٠ إلى ٥٠ سم. ساقه خشوية، مسطحة، معوجة. أوراقه ضيقة، نصلها يمرض من ٢ إلى ٤ سم. أزهاره خلية الصلابة الخارجية، لوها إلى الأزقة البنفسجية. || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

## ١٥٧٠٥ - شُتَجِير مَلُون

*Lithospermum purpureo-coeruleum* (S). Grémil pourpre et bleu, Thé d'Europe, T. des bois (F).

نوع من الشجيرات الزينية البروتي المعمر، يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه ضيقة النصل طول نحو ٤ إلى ٨ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم. أزهاره تبدو قرمزية اللون ثم تتحول إلى الساجوني المايق. أوراقه تستعمل استعمال الشاي وهي مدرة للبول || يعيش في جميع الأريه وقد يجود في المواقع المعتدلة بالتعرض للشمس || أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

## ١٥٧٠٦ - شُتْعُوب

فقرة ظهر البير. *Vertèbre dorsal du dromadaire*.

١٥٧٠٧ - شُتْدَابْ \* *Eryngium* (S). Panicaut,

*Eryng*, *Eryngion*, *Chardon Roland* (F). *Eryngo* (E). *Manstreu* (D). *Eringo*, *Cardo stellaris*, *Socere* (I). جنس نباتات عشبية شائكة معمرة من فصيلة الخيليات. أنواعه كثيرة العدد. ساقها فراء متشعبة. أوراقها مفصصة شائكة شديدة الخضر. أزهارها رؤسية التجميع مختلفة الألوان فيها الأزرق والأبيض والأخضر || أعرف أنواعه وأشهرها مايلي.

١٥٧٠٨ - شُتْدَابْ إَكْرِينِي *Panicaut de Crète* (F).

هو القرمصة، اطلبها.

١٥٧٠٩ - شُتْدَابْ أَلْبِي *Eryngium alpinum* (S).

*Panicaut des Alpes* (F). نوع من الشنداب، يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه قليلة الشكل طول نحو ٢٥ سم. وتعرض ٢٠ سم. نصلها عايق الخضر، أزرق الموج، أشراك حصار دقيقة متباعدة. || أزهاره قليلة العدد زرقاء اللون || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

## ١٥٧١٠ - شُتْدَابْ أُنْتَاَسِي الْوَرَق

*Eryngium bromeliaefolium* (S). Panicaut à feuilles de broméliacées (F).

نوع من الشنداب، يعلو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقه غليظة ريانة الانتساب. أوراقه أنثاسية الشكل واللون، طول نحو ٥٠ سم. أزهاره إلى البيضاء يعلوها يولج أخضر || أزهاره يدم طوال شهر تموز.

## ١٥٧١١ - شُتْدَابْ بِحَرِي، لَحِيَة الْعَتَر

*Eryngium maritimum* (S). *Panicaut maritime* (F). نوع من الشنداب، يعيش على الشواطئ البحرية، يعلو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه معتقة، عجيقة التفريش، جامدة النصل المسن الشالك. لونه إلى الخضر البحري الأزرق الموج || أزهاره إلى الأزقة الساجونية الباهة. || أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول.

افنداها مزيلة ، محببة ، خلية البقاء ، يطولها بعض الحسف  
الثالث . أوراقها سنانية الشكل ، نصلها مسنة الحنار ،  
خلية البشرة . أزهارها ودية اللون متقلبة بالاضفر ||  
تتويره يستمر من حزيران إلى آب .

### ١٥٧٧٧ - شسنتوم كنفاني الورق

*Chaenostoma linifolium* (S).

*Chénostome à feuilles de lin* (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم .  
أوراقها قريبة الشبه بأوراق الكتان . أزهارها جريسية  
الشكل ، بيضاء اللون أو صفراء || تتويره يستمر من  
الصيف إلى الخريف .

### ١٥٧٧٨ - شسنتوم كثير الزهر

*Chaenostoma polyanthum* (S).

*Chénostome multiflore* (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو نحو ٣٠ سم . أوراقه  
مساوية الشكل . نصلها جرداء المسطحات العليا ، خلية  
السطح . أزهارها عتقودي التجميع . عناقيدها تطول من  
١٥ إلى ٢٠ سم . أزهارها إلى البيضاء اللون الوردية المواج ||  
تتويره يستمر من حزيران إلى ايلول .

### ١٥٧٧٩ - شسروخ

*Passerina* (S).

*Passerine* (F). Sparrow-wort (E). Spatzenzunge (D).  
*Passerina* (I).

جنس نباتات حنينة معمرة برية ورتبية من فصيلة  
المازرونيات . انواعه قليلة مهدها افريقية الجنوبية ،  
هينها تشبه الخنج . أوراقها صغيرة متقلبة . أزهارها  
سنبل التجميع ، تاجي الازتكاز . أزهارها صغيرة القد  
جيلة الشكل مختلفة الألوان ، يلبق فيها الازرق .

### ١٥٧٨٠ - ششيلة

*Chinchilla*

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الششليات .  
موطنها الاربعين والشملي وبوليفيا والبيرو || اجسامها  
متوسطة القد يراوح طولها من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وأذناها  
من ١٢ إلى ١٥ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . سبالها  
مبشرة الملب الاسود . عيونها مكحلة مستطيلة . آذانها  
كبيرة وعريفة . جرائنها الامامية قصيرة خلية الاسابع .  
اما الخلفية فستطيلة ورباعية الاسابع . برائنها قوية  
سادة . فرائرها قصيرة الور شديدة التنبوية فاخرة الصنف .  
الوثابا إلى الصحة اللؤلؤية يطولها مواج فضي تبقع مع  
اقترابها من شبح الظفر وزهر وتميل إلى البيضاء عند البطن .  
قوتها الاعشاب والجذور والطحالب . انثاها تحمل ٨  
اطباء وتضع من ٤ إلى ٦ ادراس على ثلاث مرات في  
السنة || وهي نوحان :

ششيلة صفوة *Ch. lanigera* (S). *Ch. lanigère* (F).

ششيلة قصيرة الذنب *Ch. brevicauda* (S).

*Ch. brevicauda* (F).

### ١٥٧٨١ - ششليات

*Chinchillidae* (S).

*Chinchillidés* (F). *Chinchillidae* (E).

فصيلة حيوانات لينة قاضية من مرتبة ششليات الثوزب  
وردية القواصم . اجناسها ثلاثة وانواعها خمسة . جميعها  
قريبة الشبه من الارانب تتنير بفرائها الناعمة الحريرية  
وباذنابها المستطيلة الجيلة || موطنها امريكا الجنوبية .  
تعيش جماعات كبيرة العدد ، اقلها المناطق المرتفعة  
اتجرها رداء عديدة الانفاق والتعايز المتشعبة تخلفها

*Nérine* (F). *Nerine* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة الارجسيات .  
انواعه عديدة ، أوراقها ضيقة مستطيلة . أزهارها بحيلة  
الشكل سيوائية التجميع تركز على شراخ مستطيل .  
اشهر انواعه ما يلي .

*Nerine undulata* (S).

*Nérine ondulée* (F).

نوع من الشس ، أوراقه دقيقة تطول نحو ٤٠ سم .  
وترس من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها إلى الخضار الزاهي .  
أزهارها لا قياسية الشكل ، يتلاتها مياوية جملة . اسديها  
واقلامها منحنية . لونها إلى الودي الزاهي . تمتد من ٨  
إلى ١٢ زهرة يجمعها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم .  
أزهارها غريبي .

*Nerine humilis* (S).

*Nérine humble* (F).

نوع من الشس . أوراقه تتأخر من أزهاره وهي ضيقة  
التصل التثالي الامتصاص ، الجليل الخضار الزاهي . طوله  
يراوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وعرضه نحو ١٠ سم . صيوانه  
الزهرى يمد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة يجمعها شراخ يملو من  
٣٠ إلى ٥٠ سم . لونها إلى الحمرة الوردية يطولها مواج  
اخضر || أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين الاول .

*Nerine pudica* (S).

*Nérine pudique* (F).

نوع من الشس . أوراقه تسبق أزهاره وهي خلية الشكل  
نصلها عائق الخضار يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو  
٦ سم . صيوانه الزهرى يمد من ٤ إلى ٦ أزهار يجمعها  
شراخ يملو نحو ٣٠ سم . لونها إلى البيضاء الناصع يملو  
تخطيط مستطيل احمر || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين .

### ١٥٧٨٢ - شس منحجن الورق

*Nerine curvifolia* (S). *Nérine à feuilles arquées* (F).

نوع من الشس . أوراقه مستطيلة محببة النصل البحري  
اللون . أزهاره ارجوانية تمتد من ٨ إلى ١٢ || اوان  
أزهاره يختلف باختلاف زين غربه . يفرس في المراكن  
ويجود في جميع الارضية الحوارة الغنية بالمواد المنصوية .

*Nerine flexuosa* (S).

*Nérine flexueuse* (F).

نوع من الشس . أوراقه تظفر مع أزهاره وهي ضيقة  
التصل تطول نحو ٣٠ سم . وترس من ١٠ إلى ٢٠ سم .  
ضروبه واصرامه عديدة ، صيوانها الزهرى يمد من ١٠  
إلى ٢٠ زهرة ارجوانية او قرنبية او موحية يجمعها شراخ  
يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . || أزهاره يستمر من ايلول  
إلى تشرين .

*Chaenostoma* (S).

*Chénostome* (F). *Chaenostoma* (E).

جنس نباتات عشبية وعشوشية معمرة من فصيلة المازريات .  
منها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . سوبها  
تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها متقلبة ، مسنة الحنار .  
أزهارها ملونة ، خامية الفلق المتساوية || انواعها المعروفة  
قليلة العدد ، اشهرها التالية :

*Chaenostoma hispidum* (S).

*Chénostome hispide* (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم .



شسروخ



ششيلة

والاجسام . جميعها مستطيلة القوامات الفرجية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الشك وهو من الاصداف المقدسة عند بعض جماعات الهند .

على اعماق تراوح بين ٥٠ و ١٠٠ سم . قربها الاعشاب والجنذور . اما اجناسها الثلاثة فهي الشئيلة والليديوم وللغتم .

### ١٥٧٣٧ - شصّصّر

Ratel de l'Inde (F).

هو الراتل ابر كيم . حيوان راسم بشار قريب الشبه بالزربز يتخذ لنفسه نفقاً في الارض يخرج منه ، في طلب القوت ، بعد الغروب ويعد الى الصباح الباكر .

### ١٥٧٣٣ - شطّطق

Bruyère (F). Heath (E).

هو الخلع ، اطليه .

### ١٥٧٣٤ - شئغوب ، شئطوف

ما بقي على الساق من الفصن بعد قطعه .

### ١٥٧٣٥ - شئف الديك

هي دلبرجيه شئف الديك ، فجرة حرجية غشبا اجر اللون فاخر الصف ، اطلبا .

### ١٥٧٣٦ - شئغب هو الشك ، اطلبه .

### ١٥٧٣٧ - شئقار ، شئقور هو السفر ، اطلبه .

### ١٥٧٣٨ - شئقل \* Hydrobates asiatica (S).

Cincle de Pallas (F). Asiatic water-ouzel (E).

طائر من دجاج الماء وفصيلة التفلقيات ، يعيش قرب المياه العذبة يسبح ويغوص ويصطاد الحشرات والحوام .

### ١٥٧٣٩ - شئك \* Turbinella (S).

Turbinelle, Schanck (F). Shanck (E).

جنس اصداف حلزونية كبيرة القد من الرغويات المسمى . انواعه كثيرة العدد تعيش في مجار الاقاليم الحارة . اشهرها الشك الهندي المعروف بصدف الهندوس المقدس .

### ١٥٧٤٠ - شئكله \* Tribidium (S).

Triblide (F). Tribidium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة القمعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة وانحسار المحيط الهادي . تعيش على حضور المالح والشعوط || اصدافها رشيحة المصاريح ، محدبة السطح ، ناشرة القن ، متباينة الاشكال يكثر فيها التقدير الحثاري ورسابة الاصول . اغشيها الداخلة للؤلؤة . قشارها الخارجي كلتي للمادة || اجسامها رشيحة الاربدة التي يراوح قطرها من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، ثنائية القوامس اغشوية الشكل ، المعزقة القواعد الخارجية . عيائنها اربع مجموعات متعاقبة تطوق الجسم ومجموعة خامسة مشطية الشكل مركزها قرب الرأس وين يحته || جميع انواعها مأكولة مرغوب فيها .

### ١٥٧٤١ - شئكيات \* Turbinellidae (S).

Turbinellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مجار المناطق الاستوائية ومنها الهند || اصدافها عتيقة الشكل او يرمعية ، متفاوتة البسكة



شئقل



شك



شئكيس



شئم



شئول الصين

### ١٥٧٤٢ - شئكيس \* Polyptron chinquis (S).

Chinquis, Paon du Thibet (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة التفرجيات . موطنه التبت . قريب الشبه بالطاوس والتفرج لكنه اصفر جسماً واقل روعة وجمالاً . ثوبه مراكب الالوان المزركشة الزاهية . ذيله فلي التثيم .

### ١٥٧٤٣ - شئم \* Polyptron (S). Polyptré (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشئيات . انواعه قليلة العدد جميعها من اسماك الانهر الافريقية . اجسامها مستطيلة القد ، اسطوانية الشكل ، متتابعة الزعانف الظهرية المفرسة كالمنشار . تعيش في غث واصلح الانهر . دفنها تموجي ككف الحيات .

### ١٥٧٤٤ - شئمُول Chaenomele (F).

جنس شجيرات مشرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد فيها السرعة والشائكة . سوقها قصيرة الجلع . اوراقها بسيطة متعاقبة ، قصيرة العنق . ثمارها كروية تشبه السفرجل . لياها جامد المكسر حازم العلم || اشهر انواعه الزراعية ما يلي .

### ١٥٧٤٥ - شئمُول الصين \* سقرجكل الصين

Chaenomeles sinensis (S). Chaenomele de Chine, Cognassier de Chine (F).

نوع من الشئول يجزته تملو من ٤ الى ٥ م . ساقها سرسة . اوراقها اهليجية الشكل ، قليلة القامة تطول من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . نصلها ازغب الصفحة السفلى ، منشاري الحافة . ازهارها فردية ، كبيرة القد ، وردية اللون ، فواصة البرق . ثمارها كروية ، قطرها نحو ١١ سم . لياها متوسط الصلابة ظاهر المقوصة ، حازم العلم .

### ١٥٧٤٦ - شئمُول اليابان \* سقرجكل اليابان

Chaenomeles japonica (S). Chaenomele du Japon, Cognassier du Japon (F).

نوع من الشئول يجزته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقه واغصانه شائكة . اوراقه سنائية الشكل تطول من ٧ الى ١١ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . نصلها منشاري الحافة ، غلي البشرة على الصفحة السفلى . ازهارها فردية ، شعية التجميع ، متوسطة القد ، لونها الى الازرقاني || ثمارها كروية ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الخضار الاصفر . لياها جامد المكسر ، متوسط الصلابة ، ظاهر المقوصة وسامز العلم .

### ١٥٧٤٧ - شئمَيَات Polyptridae (S).

Polyptéridés (F). Polyptéridae (E).

فصيلة اسماك من اللامعات كثيرات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في اللث والاسمال .

### ١٥٧٤٨ - شئوس ، قئوس Lutodeira salmonus (S).

Chanos salmoné (F).

سمكة بحرية من مفتوحات المثانات وفصيلة الصابونيات اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي

## ١٥٧٥٧ - شَهَادَةُ التَّسْجِيلِ

Certificat de transcription (F). Certificate of transcription (E).

شهادة التّيد التي يمررها أمين المكتب العقاري موضحاً فيها تاريخ تسجيل العقد ورقه الخ.

## ١٥٧٥٨ - شَهَادَةُ التَّفْرِيعِ

Certificat de décharge (F). Unloading certificate (E).

هي الشهادة التي تعطى لاثبات وصول البضائع وتفريدها .

## ١٥٧٥٩ - شَهَادَةُ الْعَادَةِ

Parère (F). Opinion (E).

شهادة تدفعها الزفزة التجارية لاثبات عادة تجارية معينة .

## ١٥٧٦٠ - شَهَادَةُ الْعَمَلِ

Certificat de travail (F). Labour certificate (E).

هي الشهادة التي يجوز للمال أن يطلب باعطائها له حين انقطاع العمل عنه . فلا يثبت فيها إلا نوع العمل الذي كان يقوم به وتاريخ دخوله وانفصاله .

## ١٥٧٦١ - شَهَادَةُ الْكَفَاءَةِ

Brevet de capacité (F). Capacity brevet (E).

راجع برامة .

## ١٥٧٦٢ - شَهَادَةُ الْمَصْدَرِ

Certificat d'origine (F). Certificate of origin (E).

شهادة يمررها المصدر وتثبت السلطة صحتها تفيد عن منشأ البضاعة موضوع الشهادة .

## ١٥٧٦٣ - شَهَادَةُ وَحِيدٍ

Script

تحرير يقدمه المسافرين والشركات الى احد الدائنين او احد حلة العقارات الذي لم يقض كل الفوائد الى رأس المال المسدد والمستحق له وبهذه الشهادة يقدم مستندته ليقض باقي المستحق له .

## ١٥٧٦٤ - شَهَادَةُ عَقْدَارِيَّةٍ

Certificat hypothécaire (F). Mortgage certificate (E).

هي التي يمررها أمين المكتب العقاري ليثبت وجود او عدم وجود رهن او حق عيني آخر على عقار معين .

## ١٥٧٦٥ - شَهَادَةُ قَبْدٍ

Certificat d'inscription (F). Certificate of inscription (E).

شهادة تثبت فيها السلطة المختصة كل ما سجل على الصحيفة العقارية .

## ١٥٧٦٦ - شَهَادَةُ مَحَوِّ الرُّهْنِ

Certificat de radiation (F). Irradiation certificate (E).

هي الشهادة المفروضة للدلالة على محو قيد الرهن كله او بشفه .

## ١٥٧٦٧ - شَهَان

Orang-Outan

هو السلالة ، أطلها .

## ١٥٧٦٨ - شَهَبَانْ

Clivia (S). Clivie (F). Caffre lily, Natal lily (E). Rlemenblatt (D). Clivia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة ابينة جذمورية لا يصلية من فصيلة التّرجسيات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متعاقبة قديمة ، مستطيلة ، ثنائية التّصنيف نصلها عايق الخضار اللامع . ازهارها كبيرة القند حراء اللون او برتقالية ؛ صيوانية الاوتكار يجمعها شراخ منتصب مستطيل . ثمارها كرزوية الشكل قمرزية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

الشكل . يطول نحو ٣٦ سم . رأسها صغير الجرم . عيناها كيرتان ، ماسحتان . خطمها صغير الشّدق . فكها عادم الانسان . زعنفتها الظهريّة شراعية الشكل تقابل الحوضيّة . زعنفتها البطنيّة قوسية متقابلان كالكلّاية . ثوبها الى الرّيدة النّفسية يمتد في الرّأس والظهر الى لحمها جيد الصّفن ، مرفوق به .

## ١٥٧٤٩ - شَيْطِمْ

Polymère (F). Polymer (E).

متعدد الاجزاء ، متضمن جملة اصول . اصطلاح يطلق على كل مركب كيميائي تدل ظواهره على النشاط .

## ١٥٧٥٠ - شَيْطِمْ

Cuilleron (F). Winglet (E).

صفحة قرنية صغيرة القند ، نصف دائرية الشكل ، توجد عند قاعدة الرّزان في الحشرات من ذوات الجناحين .

## ١٥٧٥١ - شَيْطِمْ

Sphaceloma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرّفنيات . انواعها المؤذية قليلة تركب الاوراق والانان والبارر تنطليها || يتميز بمرفولته التي تنشأ محضونة في الطبقة الايديّة ثم ترقى حتى البشرة فتصدها وتقرّشها . جرابه الكندي قصير القند ، بسيط التركيب . كئالده يفسية الشكل شغافة || اعرف انواعها وأشهرها شئمة الورد .

## ١٥٧٥٢ - شَيْطِمْ الْوَرْدِ

Sphaceloma rosarum (S). Anthracnose du rosier (F).

فطر مجهرية يصيب الورد في اوراقه وقضبانها || مظهره الخارجي ، على الاوراق ، يقع مستديرة او مستطيلة تركب النصل فيبدو لونها الى الغيرة ثم ينحرف الى الجفوة يطولو موجر رصاصي ، يقضي على النسيج المتحارة فيذبلها ويجهتا || وهو على القضبان طلع قرنية مستديرة قطرها نحو ٢ سم . تملط اللحاء وتثور فيها حتى الشكر || يكافح باستعمال المركبات المركزة على الكبريت والنحاس .

## ١٥٧٥٣ - شَيْنِيُوم

Chennium (S).

Chennium (F). Chennium (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسلاقيات ورّبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة اعطائها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، تقطو نحو ٣ سم . رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . صيوانها بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تكثيرها وتكوكها قياسية . ملابسها مستطيلة . كواسلها خفيفة . بطونها مستعرضة مغلطلة . اغمارها غمدّة ، قصيرة ، تلمف نصف البطن . قوائمها نسيطة . انوابها وحيدة اللون يكثر فيها الجفوي والاسود الضمعي || مسرحها جبوي . تمشي في الجفالة وفي قري النسل . قوتها ما تستطيع قنصه او ما يتوفر لها من مواد صغوية .

## ١٥٧٥٤ - شَهْ

الشه : طائر يشبه الشاهين يأخذ الحمام (اللسان) .

## ١٥٧٥٥ - شَهَادَةُ

Attestation

راجع اشداد .

## ١٥٧٥٦ - شَهَادَةُ

Certificat (F). Certificate (E).

عبارة اقرار يمررها احد الافراد او المؤسسات يثبت فيها امراً معلوماً عنه .



شئمة الورد



شَيْطِمْ



شَهَان



١٥٧٨٦ - شَوَارِب عَنَطَر هو القرم البري ، اطله .

١٥٧٨٣ - شَوَاس \* Pavetta (S). Pavetta, Baconie (F). Pavetta (E). Pavetta (D). Pavetta (I).

جس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الفويات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زينة . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلها جامد الصفمة ، لام البشرة الزاهية الخضر . ازهارها عنقودي التجميع ، ابيض وتساوي الزنكاز . ازهارها رباعية البتلات والاسدية ، مستطيلة المياس ، يضاء اللون او غصراء ، فواحة المرف الطري || اشهر انواعه الثواس الهندي الذي الرائحة الطرية . يزرع للزينة وهو من النباتات الطبية اوراقه مدرة ليل .



شهران

١٥٧٨٤ - شَوَاسِيَّات Erubies (F).

سبط من الفويات اجناسه تقارب المئة وانواعه زهاء الف .

١٥٧٨٥ - شَوَاطِب Anomours (F).

الشواطب مرتبة دويبات من القشريات عشاريات الارجل . تتميز بتكوص بعض اغصان اجسامها من الحالة المثل الى حالة ادنى .



شواس

١٥٧٨٦ - شَوَاطِلَة ٥ ، فلويس Phlox (S). Phlox (F).

جس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة البقياس انواعها عديدة معظمها زينة . اوراقها كاتلة . ازهارها طرفية الزنكاز ، متكوية التجميع او حلقة || اشهر انواعه ما يلي .

١٥٧٨٧ - شَوَاطِلَة بِشْفِيَّة الْوَرَق ٥ Phlox ovata (S). Phlox à feuilles ovales (F).

نوع من الشواطلة وهي عشبية زينة معمرة تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل . ازهارها وردية اللون متجمعة البتلات مستعرضة القصل || ازهارها يستمر من حزيران الى آب وهو متكولي التجميع ، مبسر الزينات القليلة .



شواطلة سرحة

١٥٧٨٨ - شَوَاطِلَة دَرُومَنْد ٥ Phlox Drummondii (S). Phlox de Drummond (F).

نوع من الشواطلة وهي عشبية سرية زينة حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها منتصبه فروع مزينة البهاء . اوراقها لائحة متعاقبة . نصلها قلبي الشكل ، خلى الصفمة السفلى . ازهارها تختلف باختلاف الفروغ منها المادية والكنسية ومنها الحمراء والبيضاء والوردية والاراجوانية والصفراء الخنطية الموجز || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٥٧٨٩ - شَوَاطِلَة سَرَحَة ٥ Phlox glaberrima (S). Phlox glabre (F).

نوع من الشواطلة وهي عشبية سرية زينة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سائبة ذلقة تملو نحو ١٢ سم . نصلها خلى البشرة . ازهارها حمر اللون او وردية ، نصلها خيفة ويملو || ازهارها متكولي التجميع قليل الكثافة ، يستمر من حزيران الى آب .



شواطلة عنكوية

١٥٧٩٠ - شَوَاطِلَة عُنْكَوِيَّة ٥ Phlox paniculata (S). Phlox paniculé (F).

نوع عديد الفروغ والاصرام جميعها معمرة زينة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة ، متعاقبة ، سنانية

Grise, Erinose ١٥٧٦٩ - شَهَبَة

وصم يصيب بعض النباتات سببه حشرة تدعى ارينوز ، راجع ارينوز .

١٥٧٧٠ - شَهْد ، شَهْد Rayon de miel (F).

هو الحسل لا يزال في تخاريب اقراصه . Honeycomb (E).

١٥٧٧١ - شَهْدَانِج ، قُنْبُر Chênevis (F).

هو بذر القنب . Hemp-seed (E).

١٥٧٧٢ - شَهْرَة التَجَر Achalandage' (F).

هي اشجار سمة المتجر بين الحرقاء والزبائن . Custom (E).

١٥٧٧٣ - شَهْرَمَان \* Tadors (S).

Tadorne (F). Sheldrake (E).

جس طير من فصيلة البطيات ، انواعه قليلة المد جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . اجسامها رشيقة القوام . اطيها متراكبة الاالوان الجميلة العاقبة . روسها سيد او غفر . غاطها قصيرة ، مبطلة ، جوية اللون || تألت المحيطات والشطوط البحرية عند مصبات الانهر . قوتها الاعشاب المائية والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة || تنز اقاصيصها في الاجمار والابيرة المهجورة . انائها تقمع من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع .

١٥٧٧٤ - شَهْوَة الطين Pica, Picage (F).

زيغان في اللوق يقود بعض الحيوانات الداجنة كالحمل والبقر والغنم الى اكل التراب والصوف والجلود والريش وما اشبه . سببه المقدور نقص في الجسم وافتقاره الى بعض المواد الغذائية الثانوية .

١٥٧٧٥ - شَهِيْق Inspiration (F). Inhaling (E).

حركة من حركتي التنفس قولها ادخال الهواء الى الرئتين . وقد يحدث ذلك بالتوسع تجويف الصدر من اهل الى اسفل ومن الزواء الى الامام فتضمد الرئتان وتغشيان بالهواء حتى يصل الى الحويصلات الرئوية فتأخذ منه الاكسجين وتخلص من ثاني اكسيد الكربون .

١٥٧٧٦ - شَوَاة ، شَوَى Péricrâne (F).

غلاف القحف اي سمحاق الجمجمة . Pericranium (E).

١٥٧٧٧ - شَوَادِن Intempéries (F).

تختلف العوامل الجوية غير المألوفة او غير العادية . Indemency (E).

١٥٧٧٨ - شَوَار Entraineur (F). Trainer (E).

من تعامل ترويض خيل السباق .

١٥٧٧٩ - شَوَار أُنْثَوِي Organe femelle (F).

هي الاعضاء التناسلية الانثوية في الحشرة . Female organ (E).

١٥٧٨٠ - شَوَار ذَكَرِي Organe mlie (F).

هي الاعضاء التناسلية الذكرية في الحشرة . Male organ (E).

١٥٧٨١ - شَوَارِب الْقَطْ هو الجلبان الإفاق ، اطله .

١٥٧٩٦ - شَوَاعِيَّات ٥  
Eresidae (S).  
Eresidae (F). Eresidae (E).  
فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد. أعطتها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من المالين القديم والجديد || اجسامها متباينة القد ذكورها اصغر من أنثاها بما لا يقل عن ثلاثة اضعاف || جميعها رباعية الراوي والمشتان تتميز بخلو بطونها من الصفائح البيئية التي تتخلل المشتان || الواوابع مختلفة الاوان والراكن || تعيش تحت الحجارة وعلى الادغال والجنات البرية. عكادب الاجناس الارضية اياش تحضرها في التربة تحت الحجارة وبطنها يفلت من النواس انبوي الشكل. عكادب الاجناس الشجرة صليبية الشكل تنسجها بين قضبان النبات || اشهر اجناسها الشواع.

١٥٧٩٧ - شَوَاق  
Nyctage (F).  
هو شب الليل، نبات عشبي ترابي معمر، اطله .  
١٥٧٩٨ - شَوَاقِيَّات  
هي الشيات فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

١٥٧٩٩ - شَوَالَة  
Pitchou  
طائر من الدخل، اطلب دخلة شواله .

١٥٨٠٠ - شَوَان  
Grainier (F). Seedsman (E).  
خازن القلة وباتها .

١٥٨٠١ - شَوْت ٥  
Schotie (F).  
شجرة بيرة وتزيينية من القرنيات المتدمات . مهذا افرقية الجنوبية. ساقها بطيئة النمو فروع . فروعها صلبة الالوان والخشب . اوراقها مركبة ريشية وتري التجميع . وريقاتها بيضية الشكل ، مجنحة النصل الجليل الخصار اللامع . ازهارها ضمية حمر اللون تنشق في الفروع القديمة التي يفوق عمرها الحول . ثمارها حبات مبطلة متوسطة الطول كستية اللون . بزورها احادية الصف ، كلوية الشكل سمره اللون .

١٥٨٠٢ - شَوْح  
هو الثوب الاناضولي ، اطله .

١٥٨٠٣ - شَوْحَة  
هي الرخمة ، اطله .

١٥٨٠٤ - شَوْحَط

الشوط ، شجر تنخل منه القسي وقيل نوع من التبغ وقيل هما والشرايين واحد ويختلف الاسم بحسب كرم منابها فا كان في قلة الجبل فتبع وفي سفحه فشرى وفي الحضيض فشوط . وادنته شوشة (اللسان) .

١٥٨٠٥ - شَوْحَلَةٌ قَرَقَاءَ الذَّئْبِ ٥

Cerura furcula, Harpyia furcula (S).  
Harpye fourchue, Petite queue fourchue (F).  
Cerura furcula (E).  
حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حرشفات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطتها نحو ٣٥ سم . رأسها معتدل الحجم . عيناها كبيرتان . زباناها شطيانا عنة الاثنى || مختلفين مزودجان عنه الذكر . جوشها الى الريدة تتوسط بقعة

الشكل ، مزينة النصل . ازهارها عديدة الاوان مستطيلة النصل المدية الاطراف || ازهارها عشكولي التجميع كبير القد يستمر من آب الى ايلول .

١٥٧٩١ - شَوَاعَلَة لَطِيفَة ٥  
Phlox amana (S).  
Phlox gracieux (F).

نوع من الشواطة وهي بجلة سبروتية ترابيية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها املجية تطول من ٢ الى ٦ سم . السفل منها مقطوعة اما العليا ذلقة . ازهارها وردية او بيضاء اللون . فصلها مهدبة تنفذية الشكل || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٥٧٩٢ - شَوَاعَلَة مَدَاكَة ٥  
Phlox reptans (S).  
Phlox rampant (F).

نوع من الشواطة وهي عشبة ركوبية مدادة معمرة . اوراقها املجية مغنقولة الطرف . ازهارها حمر اللون او وردية او بنفسجية . بتلاتها بيضية الشكل . فصلها خروطية مدية الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٧٩٣ - شَوَاعَلَة مُزَعَبَة ٥  
Phlox pilosa (S).  
Phlox polli (F).

نوع من الشواطة وهي بجلة سبروتية ترابيية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها وفروعها مزينة . اوراقها ضيقة النصل تطول من ٣ الى ٨ سم . وتعرض من ٣ الى ٨ سم . ازهارها بيضاء اللون او حمر او وردية . بتلاتها خلية البشرة دقة . فصلها عجزية الشكل || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٥٧٩٤ - شَوَاعَلَة مُطَلَّحَة ٥  
Phlox maculata (S).  
Phlox maculé (F).

نوع من الشواطة وهي عشبة سبروتية ترابيية معمرة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متعاقبة سنانية الشكل . فصلها ماس الصفحة المطلحة يختلف للماجات الخضر . ازهارها عطرية الرائحة لونها الى الحمره او البياض . ازهارها قنوي التجميع . يستمر من تموز الى آب .

١٥٧٩٥ - شَوَاعَة سَوْدَاء ٥

Eresus niger, Er. cinnabarinus (S).  
Erèse noire (F). Eresus niger (E).

دودية من العناكب الساعية القانصة رباعية الراوي والمشتان من فصيلة الشواويات || جسمها يتميز بفاقة القد الكبير بين الذكر والانثى . الذكر يطول نحو ١٠ سم . ثوبه الى الصبهة الحمره ويلوحها بتجميع ابيض واسود . الانثى تطول نحو ٢٧ سم . ثوبها الى السواد الباقي يملو خل الحول وتهديب في الاطراف ويملو صفحة بطنها كشة رباعية الطافات سفراء اللون || صدراسها كبير القد ، مقطوم الطرف . عيناها زهيتان . شيفها صغيران ذريان . فكهاا حجتا الاطراف ، كليلها الحلب . جزامها قوية . بطنها بيضي الشكل ، مبطط الجرم || تألف البراري . سمرها جدوي . قوتها الاشرار والذباب والحوام || عكبتها يشي اسطواني الشكل ، عمودي الارزكاز ، بعيد الفور تحضرها في التربة تحت الحجارة || يباتها الشوي يستمر نحو اربعة اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . ملتهاا الحياتي لا يختلف من ملجن غيرها من العناكب || تعتبر من الدوبيات النافعة اللاؤدية .



شَوَاعَة سَوْدَاء



شَوَت



شَوْحَلَة قَرَقَاءَ الذَّئْبِ

منقطة خاسية الاخضبة المتنامية التناثية او الثلاثية السام للباسية || اشهر انواعها واضرها شول الورد وشول الفرمبواز .

#### ١٥٨١٠ - شَوَدَلُ الفَرَمبَازِ

*Phragmidium rubi-idae*, *Uredo rubi-idae*, *Caecomyces* (S). Rouille du framboisier (F).

فطر مجهرى يتطفل على الاوراق فينبها ويصيب سقوفها الياركي || مظهره الخارجى بنور قرحية لا يقياسه الشكل تركيب الوراق على صفحاتها العليا . تبدو صفراء اللون ثم تتحرف نحو البرتقالى فتصب جفافا التسبيج وذبول الاوراق وسقوطها الياركي || اغراضها زبيدة لا تستوجب المكافحة وان كان لا بد منها فاستعمال اخضر النحاس على دفعة او دفتين كان لقصاه عليه .



شور

#### ١٥٨١١ - شَوَدَلُ الْوَرْدِ

*Phragmidium subcorticium* (S). Rouille de rosier (F).

فطر مجهرى يتطفل على معظم الزورد المزروعة . مظهره الخارجى يقع صغيرة لا يقياسه الشكل لونها الى الصفرة البرتقالى ، تركيب الوراق على صفحاتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بنور سمر مبرقة بدون انتظام تذكر قرب العروق || وقد يصيب معاليق الانعار وكوسها فيسقطها ويوشح على اللبس ببقايا اللون || يكافح باخضر النحاس او بالاكسيكلورير .



شول الفرمبواز

#### ١٥٨١٢ - شَوَدَلُكَ ، مُمَاتَمَةُ Mimétisme (F). Mimésis, Mimicry (E).

خاصة كائمة في بعض الحيوانات والحشرات تحكما من التشابه بالاشياء التي تحيط بها .

#### ١٥٨١٣ - شَوَرٌ

هو اجتناء السمل او السمل المشور اي المستغفر من الوقية .



شول الورد

#### ١٥٨١٤ - شَوَرِبٌ هو غاطف الذباب ، اطليه .

#### ١٥٨١٥ - شَوَرَكَةٌ Ruche (F). Bee-hive (E).

هي مآوى النحل كالحلية والقفير ، الخ .

#### ١٥٨١٦ - شَوَرَدٌ Cystopteris (S). Cystopérède (F). Cystopteris (E).

جنس نباتات خشاوية ، برية ، معمرة من السرايس . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم والجديد || اوراقها مركبة تتكون من ٢٥ الى ٤٠ سم . وريقاتها شبه المثلجية لتصل . راجعها ورشقة البشرة . زكاتها عريانة يطبقها حار كثيف الزغب ، تبي اللون .



شورى

#### ١٥٨١٧ - شَوَرِيٌ Avicennia officinalis (S). Palétuvier (F). White mangrove (E). Salsbaum (D). Avicennia (I).

شجيرة سرجية متعمرة من فصيلة ربي الحام مهدها البلاد الاستوائية . قشورها حامزة طيبة يقال انها تلبد المعدة . لوراقها وزاهارها صباغية .

#### ١٥٨١٨ - شَوَرِيَّةٌ ، قَالَفَةٌ Morphologie interne (F). Internal morphology (E).

درس هيئة الاجسام الحية وتركيبها في الحيوان والنبات .

جوزية . بطنها جوزي اللون ، اربد اللاتي السكبكية || رواشتها عند التفتين الى البياض المايجي تملو في الزوج الاماي زخارف جوزية وسماء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن مباحيا على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السركة تظل من ٢٨ الى ٣٠ م . جسمها ماس التشار ، اكهب اللون ، مستظلل الرأس ، مستضيق البطن ، مستدق الموضع الذي ينتهي بقرنين منمقين اسودين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٤ يوما ينقضي ضمن صلحية مهدلة التسبيج تحكما السركة بين شقوق غلاف الحور والصفحات .

#### ١٥٨١٦ - شَوَحِيَّاتٌ

*Ceruridae*, *Notodontidae* (S). *Ceruridés*, *Notodontidés* (F). *Ceruridae*, *Pro-mnents* (E). *Zahnspinner* (D).

فصيلة حشرات فراشية من حرشيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم || تسرح في الليل . طيرانها طويل الشوط . اجسامها منتسقة القد . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها كبيرة . قرونها الاستعارية مشطية مزودة عن الذكور ، غطية او مشطية عند الاناث . ملاسها صغيرة ونحيلة . مرافئها خاضرة فلما تجاور الجعدة . بطنها كيفية الحمل والزحف . سكبها الشرجية معقوفة بأطر من الهلب المستطيل . حلقاتها تقع على جانبي الجرش . رواشتها كبيرة ، جلوفية الانسزال عند الراحة ، الامامية منها مزعوفة ، الخلفية وحيدة اللون . جرامها تامة النمو . غنايبها الخلفية ثنائية المتناسخ او رباعيتها || اساريها عريانة او مبرقة الهلب الصغير . اجسامها ثنائية الاجسام والاشكال المستفيدة . سكبها الشرجية تثني بقرن صغيرة || غادراتها لطيفة او ملحقة ببالع مهدلة التسبيج || اشهر اجناسها الشول والسمروية والغنيط والقاريرا والفيجرة والديكرانور .

#### ١٥٨١٧ - شَوَحْمٌ Aeschynanthus (S).

جنس نباتات مفادة من فصيلة الشروريات . مهدها البلاد الحارة . سورها نحيلة ، ملتوية ، مفادة وصارية . اوراقها لحية متعاقبة . ازهارها: فردى التسبيج ، محورية او هامي الانكاز . ازهارها كبيرة القد ، مستطيلة ، ثنائية اللون ، زاهية الحمرة .

#### ١٥٨١٨ - شَوَدُخٌ Physospermum (S).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الحميميات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من ثبوت الشرق الادنى واروبة || سورها رقيقة قليلة الفروع . اوراقها مثالية مركبة ، صغيرة الوريات الدقيقة . ازهارها صيوانية التسبيج ، هامي الانكاز . ازهارها صغيرة يضاء اللون . تنويرها صيفي .

#### ١٥٨١٩ - شَوَدَلٌ Phragmidium

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحابيات . انواعها نحو ٥٠ تتطفل على نباتات الفصيلة الوردية || يتميز بانياته الغائرة التي تركيب نواحي النبات وأغصانها || نكاته صقية الشكل مستقيمة الانكاز يملوها دحامة مفردة

## ١٥٨٢٦ - شَوْشَبَة مُدْهَبَة ٥ Lonchaea aurea (S).

Lonchée dorée (F).

نوع من الشرب، طولها من ٢ الى ٣ م. رأسها ورطبها سود، جسمها زبرجدي اللون، مذهب المراج. رقباتها تمشي على الثآليل الناضجة الساقطة من أي نوع كانت.

## ١٥٨٢٧ - شَوْشَبَات ٥ Loncheidae (S).

Lonchéidés (F). Loncheidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ٢ الى ٦ م. أظفارها تخلفه الألوان ونبغ فيها الأزرق والاصفر. معظمها من الحشرات الناتئة الخلفية. رقباتها تمشي على المواد العضوية في الثآليل الناضجة وفي التزليل وتحت لحاء الاشجار.

## ١٥٨٢٨ - شَوْشَة ٥ Enteromorpha (S).

Entéromorphe (F).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضرة. أنواعها المعروفة نحو عشرة. أعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها لافطانية أو دوفسية القواعد قصيرة الكلب. غبيلة أو قدية الإدراك المستطيلة، ثولولية المراج.

## ١٥٨٢٩ - شَوْشَمَة Amome (F).

في المال، اطليه.

## ١٥٨٣٠ - شَوْصَر هو الشعر، اطليه.

## ١٥٨٣١ - شَوُوط Course (F). Ride (E).

هو الجري مرة الى الناية.

## ١٥٨٣٢ - شَوْطَس ٥ Anomia (S).

Anomie (F). Anomia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة المحاريات. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الجهورية السفلى. اما الانواع المعاصرة فنثرت في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها لانظامية الشكل، يغلب فيها الاهليجي. مصاريها لامتماوية، دائمة الانفراج، قليلة الشغانة، شبه شفافة، ثلولوية الداخل. ومصاريها السفلية أي اليسارية متقوية قرب الرباط ومن هذه الطبقة تمتد الفضلات التي تمكن الحيوان من الالتصاق بالاجسام الخارجية || لحومها مأكولة جيدة الصفت، مرغوب فيها.

## ١٥٨٣٣ - شَوْع Ben oléifère

هو شجر البان واسمته شوعة ويقال لشرة حب البان وزيتيه دهن البان ويطر منثم.

## ١٥٨٣٤ - شَوْف Sarcloir (F). Hoe (E).

الشوف: الحجر تسوى به الارض المحروقة (القاموس).

## ١٥٨٣٥ - شَوْفَان ٥

هو الحرفال، اطليه. وهو بري وسقلي وزراعي وعريان.

## ١٥٨٣٦ - شَوْفَال هو الشقال، اطليه.

## ١٥٨٣٧ - شَوْكَة Choucas

في غراب الزرع، اطليه.

## ١٥٨١٩ - شَوَّزَر مَرْغَب ٥

Cryptophagus pilosus (S). Cryptophage poilu (F). Cryptophagus pilosus (E).

حشرة دائمة ونجحة من فصيلة الشوزريات ورتبة ممدقات الاجنحة. تألف الاقنية والمغاور والساككن الارضية. خنفساها ويرقاتها تمشي تحت القش والجثالة على المواد العضوية والنباتية المتحللة || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ م. ثوبها الى الصخرة الشفراء المراج. عينها كيرتان. زباناها صغيانان. رأسها مستنقظ الجرم. ظهرها مستدير الطرف الاثنت، كيتف الحمل والزغب. ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتمشي حتى اوائل الشتاء. تسرح في الليل. تنجح المكن مباحداً وتلقي بين القش والميل || البرقة عند بلوغها الإدراك التام تطول نحو ٤ م. جسمها اسطواني الشكل سداسي الرواجب، تنهي اللون، اسمر الرأس ينتهي، في مؤخر شرجها، بكلأيتين قريبتا الشبه بكلأيتين البهك.

## ١٥٨٢٠ - شَوَّزَرِيَّات ٥ Cryptophagidae (S).

Cryptophagidés (F). Cryptophagidae (E).

فصيلة حشرات خفاصة ودائمة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تألف المواقع الرطبة والاماكن الظليلة والاقنية والمغاور والكهوف. قوتها المواد الخافصة والدائمة || جميعها صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ٤ م. اجسامها خلية القشار. مستعزجة الرؤوس، مستنقطة الزباني الصوبانية الاطراف المركبة من ١١ فصلة || اعمادها لاحقة. جرائزها نشطة. ارساغها خماسية المقل || اشهر اجناسها الشوزور والاتيواريه.

## ١٥٨٢١ - شَوَّزَن ٥ Gabari, Gabarit (F).

Mould, Full-sized model (E).

عشط الشيء بقاييه التسمية الصحيحة.

## ١٥٨٢٢ - شَوْش ٥ Zanzclis (S). Zancle (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات. انواعها عديدة جميعها صغيرة القد، مستديرة الشكل، مغلطحة الجسم، لائمة الاوران. تكثر في بحار البلاد الحارة. وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف.

## ١٥٨٢٣ - شَوْشَبَة ٥ Lonchaea (S). Lonchée (F).

الشوشبة. شوب، جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الشوشبات. انواعها عديدة جميعها نائلة وعشائية تمشي على مختلف المواد العضوية الحيوانية والنباتية || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

## ١٥٨٢٤ - شَوْشَبَة الْيَنْكَة ٥ ١٥٨٢٤ Lonchaea chorea (S). Lonchée sociale (F).

نوع من الشرب. طولها من ٢ الى ٥ م. رأسها حنطلي، ارتجلها سود، جسمها ازرق لامع. رقباتها تمشي تحت سلف لحاء الانجار.

## ١٥٨٢٥ - شَوْشَبَة عَقْرَاء ٥ ١٥٨٢٥ Lonchaea aristella (S). Lonchée verte (F).

نوع من الشرب. طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الخضف المايق يطو مواج اسود. رقباتها تركب ثمار الثين فتضلعها.



شوزر مرغب



شوش



شوشة الفلة



شوشة خفراء



شوطس

١٥٨٤٦ - شَوْك الصَّبَّ هو الاثنا السفلى، اطلبا .

١٥٨٤٧ - شَوْك العَلَك هو الاخيض، اطلبا .

١٥٨٤٨ - شَوْك القَمَم هو ابو تيلون ابن سيناب، اطلبا .

١٥٨٤٩ - شَوْك التَّار \* ، زَعْرُورٌ هُوَمِي ، زَعْرُورٌ  
Pyrantha coccinea (S).  
سِينَتَا



شوك الجال

Bulson ardente Aclariate, Pyrantha, Arbre de Moise (F). Fire thorn, Firebush (E). Echter Fendern (D). Rovo ardente, Spina ardente (I).

شجيرة شائكة فراء من فصيلة الورديات . تملو من مَرَيْن الى خمسة امتار . فروعها كثيفة الشوك الحاد . اوراقها مسقة اذينية . ازهارها حلقة التجميع ، بيضاء اللون . ثمارها عنبة الشكل ، اريدوانية اللون ، ناعسة السودق الرقيق .

١٥٨٥٠ - شَوْك اليَهُود هو الاثنا الرحلة ، اطلبا .

١٥٨٥١ - شَوْك عَقَرَبَاتِي هو القرصنة ، اطلبا .



شوك الخلب

١٥٨٥٢ - شَوْك فَرِيَس ، لِسَان الصَّبَّ

Carduus pycnocephalus (S). Chardon à têtes pl-  
quantes (F). Slender thistle (E). Slander distel (D).  
Cardo del campi (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات ينبت في المواتع الرطبة وحل جوانب الطرقات . ساقه تملو نحو ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة كثيرة التفريغ والتشريح وللشوك اكاراه الزهرية شائكة الحراشف المثراسة . ازهاره بنفسجية اللون يملوها تشيع ابيض .

١٥٨٥٣ - شَوْك فُصِي \* ، شَوْك عَنَقَر

Carduus argentatus (S). Chardon argenté (F). Silver-  
ed thistle (E). Silber distel (D). Cardo argenteo (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يتميز بكثافة حل اوراقه وسوق الذي يوضعها جليلاب اغبر اللون ، فصي المخرج . ساقه تملو نحو ٨٠ سم . اوراقه مستطيلة ، متجاذبة التفريغ ، متراكبة التجميع والتعارج ، كثيرة الشوك . ازهاره بنفسجية القاعدة ، زرق الجسم ، يفيض الاطراف .



شوك النار

١٥٨٥٤ - شَوْك مَسْكِي

Carduus nutans (S). Chardon penché (F). Musk thistle (E). Nickdistel (D). Cardo rosso (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات ساقه فراء ، تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه الجذعية سانية التصلب الشديد . اوراقه القرعية صغيرة اللد ، لا قياسية التفريغ ، كثيرة الشوك . اكاراه الزهرية افقية الارتفاع وبضها مسدل ساقه وازهاره ويولدو مسكية العرف .



شوك فصي

١٥٨٥٥ - شَوْكَارِي \*  
Graucalus (S).  
Choucar (F).

جنس طير من الجوارث سنابات المناظر وفصيلة التريجات انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطائها فصيلة الاربابا تحت من الهند الى جزر الزايج واستراليا . تألف النابات والاحراج وتسلق الاشجار عتقة . قوتها الارابع والدبدان وبعض الثمار البنية ا اجسامها متوسطة اللد تملو من ٢٢ الى ٢٨ سم . اجنتها رتاجية ، مستطيلة ، لافحة . امتناها معتدلة الطول مستديرة الاطراف . مناقيقها ضليعة مسنة الغاطم العليا . قوائمها معتدلة الطول . اصابعها نشيطة . غالبها كثيرة حادة الاطراف . انواها متداخلة الاالوان

١٥٨٣٨ - شَوْكَة شَرِيَّة ٥

Cenonympha pamphilus, Chortobius pamphilus (S). Procris (F). Procris (E).

حشرة من فصيلة الحمايات ورتبة حرشيفيات الاجنسة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرتها تعيش على عصاف النجيليات ا جسمها صغير اللد يملو نحو ١١ مم . يسقطها نحو ٢٨ مم . راسها صغير الحجم . عيناها كيرتان . زياتانا صولياتان . مرشفاها ثنائي البورة . جوشنها وبعثها الى الخنطلي الكسني المولج ا رواشها ، عند التقين ، الى الصخرة الصغراء يملوها حمار امير ويملوها في الزوج الاسامي بقعة عديدة السرة ، غير الالام ، طرية الارتكاز ا لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز . تعالول بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتد الممكن لطعاً مربة الشكل على نصال عصاف النجيليات ا السرقة تطلو نحو ٢٠ مم . ثوباها الى الخضار الاغبر الزيتي المولج يملو خط ثبجي وخيطان جانبيان وعشرة اطواق جميعها كسنية اللون . قشارها مائل البشرة راسها والطلق الذي يليه الى الجذوة . مدتها ورواجها الى السرة ا طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو خمسة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

١٥٨٣٩ - شَوْك، فَهْشَاء (E). Thistle (F). Chardon

اسم شامل يطلق على عدة نباتات مختلفة من فصيلة المركبات وغيرها يجسمها شبه في شكل الاوراق وسا يملوها من ابر دقيقة حادة .

١٥٨٤٠ - شَوْك أَجَر هو الحرض ، اطلبا .

١٥٨٤١ - شَوْك الجَمَل \*  
Cardus dipsacus (S).  
Cardère, Chardon (F). Thistle (E). Distel (D).  
Cardo degli asini (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول المزروعة وحل الطرقات . ساقه مضلعة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه كبيرة اللد مفردة التصلب المنسج الصفحة الشائك الحافة . ازهاره تاجية الارتكاز لونها الى الالبيك المايح ا ينبت من النباتات البرية الفسارة خاصة بالزرع . اما الايل فتلتهه بشموه .

١٥٨٤٢ - شَوْك الجَمَل

هو الاقتسا السورية وهو رضي الايل ، اطلبا .

١٥٨٤٣ - شَوْك الخَلِيب \* ، شَوْك الحَمِير

Galactice (S). Galactice, Chardon laiteux (F). Milk  
pea, Milk thistle (E). Milchdistel (D). Galactice,  
Scarline (I).

نبات عشبي بري شالك من فصيلة المركبات . ساقه اسطوانية تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . صبارتها لينية بيضاء اللون . يقال انها طيبة نقيد الصدر . اوراقه كبيرة اللد ، مفردة ، متجمعة . نصلها اخضر الصفحة البحرية المولج يملوها يتجبع ابيض ، حمارها متراكب التعارج ، شالك الحافة ا ازهاره تاجية ، بنفسجية اللون ، يمجها شيء من الاحمر والازرق .

١٥٨٤٤ - شَوْك الدُرُج هو مسط الاراعي ، اطلبا .

١٥٨٤٥ - شَوْك الدَمَسَن هو الحرف البري ، اطلبا .

ساقه قوية فراءه ترتفع نحو ١٠٠ سم. بشرتها منشفة رقيقة ارجوانية جوية لا قياسية الانتظام. اوراقه مركبة تشبه اوراق البقدونس، نصلها شديد الخضار العابق نسيجه غزير اللادة الجحالية الفعالة. ازهاره صغيرة القذ، يفضا اللون. ثماره كروية صغيرة || منبته المناطق المعتدلة الحرارة يرغب في الاراضي البور المتوسطة الرطوبة. يكثر قرب السباحات وجوانب الاقنية. وهو في البلاد الكثيرة الاشعاع الشمسي اغزر مادة وادش فاعلية. وهو من النباتات الطبية الجزلة النبع يستخرج من عصارته مادة الشوكارين التي تدخل في عدة تركيبات ومستحضرات ناعمة || كان قائم الاستعمال في العصور الغابرة لتسميم الناس وقد امر سقراط بشرب نقيته فات.

١٥٨٦٦ - شوكران سام\* ، شوكران مثنين، قاتل البقر

Cicuta virosa (S). Cicutaire, Ciguë vireuse, C. des marais (F). Cow-bane, Water hemlock (E). Echter wasserschierling, Wütherick (D). Cicuta, Finocchio acquatico, Cicutarria (I).

نبات عشبي بري طلي جحالي من فصيلة الحيميات. يكثر في المنطق وصل صفات مجاري الماء. جلوده لحمية غليظة. ساقه فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه مركبة، متقابلة، وتريه التجميع. وريقاته لينة، حادة العقصة. نصلها عابق الخضار اللامع، مسنن الحافة. ازهاره صغيرة القذ تليق اللون، خضره المواج. رائحة ازهاره واوراقه منتنة. عصارته غزيرة للمادة الجحالية الفعالة الحمية، تستعمل في الطب استعمال الشوكران.

١٥٨٦٧ - شوكران صغير\* ، شوكران البساتين بقذونس كاذب

Aethusa cynapium (S). Aethuse, Petite ciguë, Ciguë des jardins, Ache des chiens, Faux-persil (F). Asse's parsley, Fool's parsley, Lesser hemlock (E). Hundsgleisse, Hund's Petersilie (D). Piccola cicuta, Prezemulo basterdo (I).

عشبة برية جميلة طيبة من فصيلة الحيميات تكثر في الاراضي المزدرة المتوسطة الرطوبة، ساقها تملو نحو ٥٠ سم. فروصها اقية الانتشاب. اوراقها تشبه البقدونس. عصارته جحالية مينة.

١٥٨٦٨ - شوكروت ورق الملفوف المحفوظ المملح.

١٥٨٦٩ - شوكرين

١٥٨٧٠ - شوكل هو البويع. واحدته شوكله وثمرته شمول.

١٥٨٧١ - شوكي

١٥٨٧٢ - شوكرات

الشوكيات قسم من الحيوانات البحرية. رتبها وفصلاتها وانجاسها وانواعها عدة آلاف تبعها حمة صفوف ||

يكثر فيها الاسود والاشهب || اعرف انواعه واشهرها شوكراري الهند.

١٥٨٥٦ - شوكراري الهند

Graculus indicus (S). Choucarri des Indes (F). نوع من الشوكاري. موطن الهند. يألف الغابات والاحراج قوة الاسارع واللباد ينقب الاجمار في طليها ان لم يجدها سارحة || جسمه متوسط القذ يطول نحو ٢٨ سم. ثوبه العلوي متراكب الاسود والاشهب. عيناه مغطتان بالاسود القاسم زووه وصدره ويطل الى الفرة. منقاد اسود. قائمتا واصابه الى السرة العابقة. جناحه رتاجي، ذلق، لاحت. ذنبه معتدل الطول ضيق الطرف المستدير || يدين عشه في الاجمار الدامية. الانثى تحضن بمتابوة الذكر من ثلاث الى خمس بويضات مرة واحدة في الحول.

١٥٨٥٧ - شوكران هو الشكاكة، اطليا.

١٥٨٥٨ - شوكة

عصو خشبي صلب الجسم حاد الطرف يحمل من تحول ورقه او برمة او زعمة او اذنة. والشوكه تكون دائمة الاتصال بغشب الحية.

١٥٨٥٩ - شوكة الصباغين

هي نبق الصباغين، اطليا.

١٥٨٦٠ - شوكة حادة

هي الزعرور الشائك، اطليا.

١٥٨٦١ - شوكة زرقاء

هي الشنداب الجسبي، اطليا.

١٥٨٦٢ - شوكة صفراء\* ، سقوليئس، قرونون

Scolymus (S). Scolyme, Epine jaune (F). Spotted golden thistle (E). Labdogkorn (D). Scardiacione, Spina gialla (I). نبات عشبي بري وزراعي من فصيلة المركبات. ساقه مضلمة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القذ، كثيرة التفريغ والتشريح والتشريح، قليلة الشوك، نائقة الازرة الطويلة الصفراء اللون || اكوازه الزهرية كوية القاعدة، ازهاره بنسجية الانتشاب زرق ازام الثاني والثالث، ليلكية الزام الاخير || يزرع لجلودها المأكولة السكرية العلم.

١٥٨٦٣ - شوكة قبطية

هي السنت العربي، اطليا.

١٥٨٦٤ - شوكة مباركة\*

Cnicus benedictus (S). Chardon béni (F). Blessed thistle (E). Benediken distel (D). Cardo benedictus (I). نبات عشبي بري سولي من فصيلة المركبات. ساقه مضلمة فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه الجعية كبيرة القذ منتنة، نصلها ثنائي التفريغ، اخضر اللون، اصفر المواج، ابيض المروج، غليظ الشوكه الطويلة. اوراقه الفرية لاطنة، مستطيلة، مفرصة، مسنة الحافة، شاككة. اكوازه الزهرية صغيرة القذ مستطيلة. ازهاره صفراء اللون، طيبة، تستعمل كقوية ومبرقة وداملة للجرح ومقبلة للاكل.

١٥٨٦٥ - شوكران\* ، طحما، بسنيس

Conium maculatum (S). Ciguë, C. tachetée, Grande ciguë (F). Hemlock, Polson hemlock, Herb bennet (E). Echter schierling (D). Cicuta, Erba grande (I). نبات عشبي بري طلي جحالي يحول من فصيلة الحيميات.



شوكراري الهند



شوكة صفراء



شوكة مباركة



شوكران



شوكران سام



شوكران صغير

عل الشايل\* باتجاه الجنوب || له نعان اعرفها الشونس الايبس .

١٥٨٨٣ - شَوْلِسْ اُنْيِصْ \* Chionis alba (S). Chionis blanc, Pigeon antarctique (F).

نوع من الشونس طوله نحو ٣٦ سم. ثوبه الى البياض الناصع. منقاده اخضر الجسم اسود الطرف. عينه الى الزرقه يحوقها اطراف اخر. رسه قصير القند ، جوي اللون ، سردي الجلد . شتره اسابعه ضيقة مستطيلة .



شولط

١٥٨٨٤ - شَوْلِسِيَّاتْ \* Chionidae (S). Chionides (F). Chionidae (E).

فصيلة طير وسيده الجنس من رية طولان افريقيا انواعها المروفة قليلة العدد . اشكالها تجمع بين اشكال الزنراق والنورس والتفلق . تتميز باجسامها الربيه وبمناقيدها المغلفة بغاد محضها من القاعدة الى طرف المنقش . موطنها العالم . تكثر في البلاد الامريكيه . تألف الشولط الصخرية . قوتها الحشرات والقشريات والاسماك .



شونس ايبس

١٥٨٨٥ - شَوْلِيْز ، شَيْشِيْزْ \* Nigella (S). Nigelle (F). شيشيز

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الشقيقيات . انواعه ٢٠ . مهدا البلاد المتدلة الحارة اوراقها مركبة غطية . ازهارها فردية ، تاجية ، بخلفة الالوان . مجارها جراء صغيرة اسطوانية الشكل ، يزورها دقيقة مستطيلة سداه اللون || اشهر انواعها ما يتبع .

١٥٨٨٦ - شَوْلِيْز اِسْبَانِي Nigella hispanica (S). Nigelle d'Espagne (F).

نوع من الشوليز البري الحولي يكثر في الاراضي الكلسية واصرامه عديدة تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهارها كبيرة القند ، عادية القناب ، عديدة الالوان ، يعلب فيها الازرقاني والازرق والليالي والموشح || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٨٨٧ - شَوْلِيْز الحقل Nigella arvensis (S). Nigelle des champs (F).

نوع من الشوليز البري الحولي يكثر في الاراضي الكلسية وهو من نباتاتها الطرية . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره متوسطة القند ، زرقاء اللون . كما بره غروية الشكل مقطعية الطرف || ازهاره ربيعي .

١٥٨٨٨ - شَوْلِيْز دَمْشَقِيْ \* Nigella damascena (S). Nigelle de Damas (F).

نوع من الشوليز الزراعي التريسي الحولي . فروبه واصرامه عديدة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ازهارها متوسطة الحجم ، زرقاء اللون او بيضاء ، قنابها عديد الاسم

المستطيلة الضيقة المتركبة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٨٨٩ - شَوْلِيْز زِرَاعِي \* Nigella sativa (S). Nigelle cultivée, N. romaine, Cumin noir (F). Common fennel flower, Black cumin (E). Echter Schwarzkümmel (D). Nigella, Cuminella (I).

نوع من الشوليز وهو نبات عشبي حولي زراعي يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ساقه فراء . اوراقه مركبة . ازهاره كبيرة القند ، زرقاء اللون . مجار جراء مستطيلة عديدة البؤر || يزهره تسمى حبة البركة والحب السداه وهي صغيرة القند ، مستطيلة الشكل ، سداه اللون يستخرج منها زيت طيب يفيد في الصدريه ويسكن المعال العصبي . حبة البركة يستعمل كالتوابل والبهارات وهو مقو مرموق ينه الهضم ويذر اللاب والبول .



شوليز زراعي

بينها شعاعية . جهازها الهضمي وجهازها الدوري مستقلان . هيكلها الانسيكلي الترتيب مجهز ، غالبا ، بانوك مفصيلة متحركة . ثقبوب دروعها تسمح بمرور الوايس التي تستعملها اما للانتقال او للتثبت . افواهاها مجهزة باعدات حلبة تحكها من المنع . امامها ثنائية التلافيف || اما صفيحتها الخمسة فهي : زنايق البحر ، النجويات ، الكراعاتيات ، الاقويوات ، قنابات البحر .

١٥٨٧٣ - شَوْلَة

الشولة منزل من منازل القمر البانية . وهما كوكبان نيران متقاربان يكادان يمسان ذنب العقرب . ويقال لها حمة العقرب || رقيب الشولة يدعى الحمة .

١٥٨٧٤ - شَوْلَة Dard du scorpion (F). Sting of the scorpion (E).

هي حمة العقرب .

١٥٨٧٥ - شَوْلَة بَيْضَاء \* Macrorhamphus

١٥٨٧٦ - شَوْلَط \* Macrorhamphus taczanowskii (S). Macrorhamphus taczanowskii (F). طائر من طولان الساق الصوروب وفصيلة الزنراقيات . اصغانه الشرق الاقصى . يآلف المناطق الباردة في الصيف والدافئة في الشتاء . ملجئه الحياتي جماعي . جماعته في الزين العادي لا تتجاوز ١٠ ازواج وتتجاوز الخمسة الاف عند الرحيل . قوته الحشرات ويرقاتها والديدان ودعبل السفاد ... || جسمه متوسط القند ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسه صغير الجرم . منقاده مستطيل جالس . جناحاه لثقان لاحقان . ذنبه قصير مقطوع الطرف . ثوبه متركب الالوان ، رأسه وزوره ورداؤه وجناحاه الى الكهية السوداء ، صدره وبعنه الى القبرية المنمشة بالبردة . جناحاه مرقان بالبرة . يلدن عشه من اعشاب واسل المناطق في المواقع الرطبة غير المنمورة بالماء . الاثنى تحفن وحدها اربع بيضيات بينها الذكر يقين لها الغذاء .

١٥٨٧٧ - شَوْلَمْ هو الشيلم ، اطليه .

١٥٨٧٨ - شَوْلَمَار هو الشمار ، اطليه .

١٥٨٧٩ - شَوْلَمْع Cephalanthera (S). Céphalanthère (F).

جنس نباتات جذمورية برية معمرة من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد || يوجد منها في لبنان الشومخ الحسامي (C. ensifolia). ينبت من ارتفاع ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر . اوراقه سنانية الاتصال مستطيلة الخلسام . ازهاره بيضاء اللون ، شرفاتها ملطخة بالاصفر .

١٥٨٨٠ - شَوْلَة هي الانبار ، اطليه .

١٥٨٨١ - شَوْلَدَر هو الشمندر ، اطليه .

١٥٨٨٢ - شَوْلِسْ Chionis

جنس طير من فصيلة الشونيات . موطنه شاولي\* البلاد الباردة . وهو قريب الشبه بالهام يتميز ببناتلته منقاده المثلث المحرطي الشكل ، باستطالة اسابعه وضيق شترتها وبذنبه المقنطر المربع الشكل || قوته الاعشاب والحشرات ويض اللق والطروس . انتاه تثن في انخوس تديره



**Dysdera erythrina (S). Dysdère érythrine (F).  
Dysdera erythrina (E).**

نوع من التناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا سداسية  
لمشاقن تنتمي الى فصيلة الشياحيات || جسمها متوسط  
القد يطول نحو ١٢ مم. عند الذكر ونحو ١٨ مم. عند  
الانثى. صدراها مزوايا الشكل ، مغمض الصفة العليا ،



شَيْخَاحَة حَمْرَاء





شبح حولي



شبح البحر



شبح اليهودية

الركبات الانبوبية الزهر . انواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم منها البرية والعلبية والصناعية والتربوية . فروصها نخلة خشوية . اوراقها متعاقبة زباء التصل . ازهارها دقيقة ، وريسية ، يبلب فيها اللون الاصفر الموشع بالاصفر || اعرف انواعه واشهرها الانستين والقيصوم والشرويل والميثران ، جميعها من النباتات الطبية التي تقطع البلم وتخرج البثورات والقيح والدمامل . يقال ان تقع ازهارها واوراقها يقيد البول السكري . رباحها مع اي دهن كان زيل داء الثعلب واخراز . حريق اوراقها في المنازل يطهرها ويطرد الشاين والحشرات والحولم . ماذها الفعالة تسمى ستينتين .

### ١٥٩١٥ - شبح ابيض الزهر

*Artemisia lactiflora* (S). Armoise à fleurs blanches (F). نوع من الشبح وهو جنية معمرة برسوية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وفروصها ملحة للحاء ، بحر اللون . اوراقها سنانية التصل ، خلية الصفعة العليا عريضة الزائفة . ازهارها متفرعة تجمرها النحل . قباياتها وسراشيفها يبيض كالخليب || ازهارها يستمر طول الحريف .

*Artemisia pontica* (S). شبح ارميني  
*Armoise pontique*, A. du Pont, Petite absinthe (F).  
*Roman wormwood* (E). *Römischer Belfuss* (D).  
*Asenzio pontico*, *Piccolo asenzio* (I).  
نوع من الشبح وهو بجلة معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروصها زياء للحاء ، قلنية الشكل . اوراقها قاعة الخضار ، ثلاثية الانقسام ، ضعيفة العرف . ازهارها عشقودية ، مستدقة ، متدلية || ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

*Artemisia atrata* (S). شبح اسمر  
*Armoise brune* (F).  
نوع من الشبح وهو نبات بري وزراعي معمر يرغب في المواق الجبلية . يملو نحو ٢٠ سم . اوراقه ثنائية الانقسام ، خضراء اللون ، عادمة العرف . ازهارها عشقودية التجميع ، وريساتها الزهرية كروية الشكل ، متدلية ، قباياتها زياء البشرة مير الحنار || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

### ١٥٩١٨ - شبح البحر \*

*Ascophyllum nodosum* (S).  
*Ascophyllum noueux* (F).  
نوع من الفوقس . اصطناعه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليه صغيرة . ساقه مبطلة فقاء . اوراقه خلية . مرجحة شبه يفسية الشكل . لونه الى السمرة .

### ١٥٩١٩ - شبح اليهودية \* ، شبحان ، حبيشون

*Artemisia judaica* (S).  
*Armoise de Judée*, *Absinthe de Judée*, *Semen contra* (F). *Judean wormwood* (E). *Wermut aus Judäa* (D). *Seme santo* (I).  
نوع من الشبح وهو بجلة برية طيبة معمرة تملو نحو ١٢٠ سم . مهدا البلاد الفلسطينية . اوراقها وازهارها تتصل بصفات سائر انواع الشبح الا انها غزيرة المادة الفعالة . يستخرج منها اصل الستونين .

*Artemisia annua* (S). شبح حولي  
*Armoise annuelle* (F).  
نوع من الشبح وهو نبات حولي فواح العرف الطري

Décembre (F).

١٥٩١٥ - شبيكان

هو شهر كانون الاول .

١٥٩١٦ - شبيكة هي ذن الشبح ، اطبله .

١٥٩١٧ - شبيكة العجوز هي حزاز الصخر ، اطبله .

١٥٩١٨ - شبيث  
*Scutigera* (S). *Scutigères* (F). *Spinnenasseln* (D).  
*House centipedes* (E).

جنس دويبات من السعداغيات الزحائف . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها مفترسة ، دجوية المسرح ، تدخل المنازل اغصها الارضية تقضي على الكثير من الحشرات المجنة وغير المجنة وسبا الذباب على اختلاف اجناسه .

### ١٥٩١٩ - شبيث عكبوتي \*

*Scutigera araneoides*, *S. Coleoptera* (S).  
*Scutigère arandide* (F).

دويبة مفترسة من الشبيث وفضيلة السعداغيات شفوية الاصل . تألف المواق الرطبة والاقبية والكهوف . تسرح في الليل وتقتل المآكل الارضية وتقضي على الكثير من الحشرات اغصها المجنة وغذيات الجناح والذباب || جسمها سكي ، الركيب ، مبط ، مستطيل ، كثير الجرامز الدقيقة التي يبلغ عددها ١٥ زوجاً . الذكر اصفر من الانثى ، يملو نحو ١٦ سم . والاني ٢٤ سم . رأسها صغير . شيفها لافلان . عينها مركبتان ، ثلاثية الزقارم . زباناها نحيلان . الزوج الاخير من جرامزا بالغ الطول الذي يفوق طول الجسم || تبخر من الدويبات الشائعة .

١٥٩٢٠ - شبة  
*Particularité* (F). *Particularity* (E).  
هو كل لون يتألف اللون الشامل ان في الخيل او في الايقار . فائرة والتسجيل والتخديم من الشيات .

١٥٩١١ - شبة العيجان  
*Ecusson* (zoet.) (F). *Ecutcheon* (E).

علامة في البقر الحلوب تبتدئ في اواسط او اعالي مؤخر الصعر وتنتهي عند شافر الفرج او في محيطه . يستدل منها ، بالنسبة الى شكلها وسحبها وانفراجها ، من قابلية البقر في البقرة .

١٥٩١٢ - شبيثين ، دُرعة  
*Chitine* (F). *Chitin* (E).  
هي المادة الصغوية التي يتركب منها جلد الحشرات وأصعها وهي ياسة شديدة المقاومة لاحتوائها على بعض المواد الجيرية .

١٥٩١٣ - شبيث  
*Gymnogramma* (S). *Gymnogramma* (F). *Gymnogramma* (E).

جنس نباتات خشارية ، برية ، معمرة ، من فصيلة البسباسيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منها بعض اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || اوراقها كبيرة ، مركبة ، وتزينة التجميع ، جميلة الخضار الزاهي . مراجه خلية . زكاتها شبه ملحوسة باصصا التصل || منها انواع قزوينية تزور في المراكب .

١٥٩١٤ - شبح ، ارميسيا  
*Artemisia* (S). *Armoise* (F). *Wormwood* (E). *Belfuss* (D).  
*Artemisia* (I).  
جنس نباتات عشبية خشوية برية وزراعية من فصيلة

السمره الطحلله يعلوها موج اسود . يطله الى البياض المائج . ايطلاء مرقشتان بالاسمر الاسود || الاثني اصفر قداً من الذكر . طولها يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . تمنع جرراً واحداً ترضعه نحو ستة اشهر ويقتى بمعيها من ٢٠ الى ٢٢ شهراً .

١٥٩٢٩ - شَيْخُ الرَّبِيع هو الاريفارون ، اطلبه .

١٥٩٣٠ - شَيْخُ السَّيْرَج هو السيرج ، اطلبه .

١٥٩٣١ - شَيْخُورُ (F). Antilope thibétaine

الشيوخ حيوان لبون مجترٌ يدعى ظبي التبت ، اطلبه .

١٥٩٣٢ - شَيْخَوَاءٌ ، جَنْبَيْسَتْ (S). Genista

جنس نباتات جنبية وبجيلة معمرة من فصيلة القرنيات

الفرشانية . انواعها المرفوعة قليلة المدد اصطلحها بعض مناطق

البلاد المعتدلة الحارة || سيقانها فروعها متباينة

الاشكال ونسبها الشاكك . اوراقها بسيطة او ثنائية التركيب ،

صغيرة المتصل الجامدة . ازهارها عنقودي التجميع او

فردية ابلي الاذكار . ازهارها صفراء اللون .

اشهر انواعها :

G. cassia (S). شيزاء اُرومية

G. libanotica (S). شيزاء لبنانية

G. lydia (S). شيزاء ليدية

G. acanthoclada (S). شيزاء شوكية

١٥٩٣٣ - شَيْخُوكْبَسَا Schizocapsa

جنس نباتات عشبية عسقرية من فصيلة التكتيات .

انواعها قليلة ، منها بلاد الحارة ، ترعرع للزيت .

ازهارها كثيرة القد بجيلة المنظر مختلفة الالوان الزاهية .

١٥٩٣٤ - شَيْخُزَيْلَةٌ Schizonella

جنس فلور مجهرية من فصيلة الراهوويات تتميز بطلسانها

القنسي الشكل ثم يفيها الكثيف ، القسي التجميع

وبويضاها الشفوية الثنائية التركيب || يصيب السمديات

على اختلاف انواعها .

١٥٩٣٥ - شَيْخُورِي هو العرعر ، اطلبه .

١٥٩٣٦ - شَيْبَتْ ، مُتَهَمٌ ، شَسْ (F). Schiste

فسار حجر صفيحي التركيب احابه غسخت شديد في

اعماق الارض . يرجع عهده الى ما قبل الاراضي الطباشيرية

في الحقبة الثانونية .

١٥٩٣٧ - شَيْبَسَف (E). Chélicère (F). Chelicer

شيفسا الحشرة او الدويبة ها كلابتا مقمشة الشفوي .

١٥٩٣٨ - شَيْبَسَكِيَّات (F). Chélicérates

فئة من المفصليات حيواناتها عادمة الزباني تستعصى منها

بزوج من الشيفاسف . بعضها غشوي التنفس كما في

صف المرتعويات ، والبعض الآخر رئوي او قصبي

التنفس كما في صف المتكويئات .

يعلمون ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه خلية المتصل ، مستعرضة

التشريح . قناباته شفاقة ، عروقها خضراء اللون || ازهاره

يستمر من تموز الى آب .

١٥٩٢١ - شَيْخُ خُرَّاسَانِي ، قَيْشُومُ طَبِي

Artemisia santonicum (S). Armoise santonici (F).

Holy wormwood (E). Helliger Belfuss (D). Santonico (I).

نوع من الشج وهو بجلة برية طيبة معمرة تملو من ٤٠

الى ٨٠ سم . ساقها وفروعها زباه اللحاء . اوراقها مفصصة

الصفحة ، متصلها خلي البشرة عاكب الخضار ، قوي العرف .

ازهارها منفردة ، كثيفة التجميع ، فواحة الشذا . اوراقها

وازارها طيبة وتستخرج منها مادة الستونين .

١٥٩٢٢ - شَيْخُ رُؤْمِي هو الابنبت ، اطلبه .

١٥٩٢٣ - شَيْخُ سَبُرُونِي Artemisia frigida (S).

Armoise rustique (F).

نوع من الشج وهو بجلة صغيرة معمرة تملو نحو ٥٠ سم .

ساقها وفروعها مزفرية اللحاء ، كثيفة الزغب التيبي اللون .

اوراقها وحيدة القدر ، ثنائية التشريح ، خلية المتصل ،

عامة العرف || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٥٩٢٤ - شَيْخُ لَفِي ، عَيْشُرَّانُ ابْيَضْ

Artemisia argentea (S). Armoise argentée (F). Sil-

very wormwood (E). Silber Wermut (D). Asenzio

argenteo (I).

نوع من الشج وهو جنبية معمرة تملون ١٠٠ الى ١٧٠ سم .

ساقها وفروعها كثيفة الزغب الفضي اللون . ازهارها متدلية

عامة العرف ، قناباتها مزفرية البشرة ، زغبها ابيض اللون ،

ففي المراج || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٩٢٥ - شَيْخُ كَالْفُورِي

Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée (F).

نوع من الشج وهو نبات معمر فروع العرف الكافوري

يعلمون ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه معتقة المتصل ، غنية

الصفحة الحولية البشرة . ازهارها عنقودية التجميع ، رطلة .

ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٥٩٢٦ - شَيْخُ مَكَانِسِي

Artemisia scoparia (S). Armoise à balais (F).

نوع من الشج وهو نبات محول يعلمون ٣٠ الى ١٠٠ سم .

ساقه وفروعها طحلله اللون ، سمراء الزغب . اوراقه لمساء

البشرة . قنابات ازهاره جؤوية اللون ، شفاقة الختار

اللائع || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

١٥٩٢٧ - شَيْخَان Armoise de Judée (F).

هو شيخ اليهودية ، اطلبه .

١٥٩٢٨ - شَيْخُ الْبَحْرِ ، شَيْخُ الْيَهُودِ ، أَبُو

مُرَيْشَكْ Leptonyx monachus (S).

Leptonix, Phoque moine, Moine (F). Leptonix,

Monk-seal (E).

حيوان بحري لبون من زعفيات الاقدام وفصيلة القنقيات .

موطنه البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود . ملجته

الحياتي جماعي ، جماعته قليلة العدد . قوته الاسماك

والقشريات والرخويات || جسمه معتدل الطول عنه

الذكر من ٢٤٠ الى ٢٦٠ سم . رأسه متوسط الحجم يتميز

بكثافته سباله . ذيله سنائي الشكل . ثوبه الملوي الى



شيخ فني



شيخ البحر

الرقابة تركّز على اجتنباط بطونة التربة وكثافة الأشجار .  
ثم استعمال الائمة الموزونة التركيب والصفية واجتنباط  
نقص الادوية في الاوقات الحارة .



شيش

#### ١٥٩٤٥ - شَيْشَس \* Marginella (S). Marginelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرعويات مديات الاربل  
وفصيلة الشيطيات . انواعها المروفة نحو ٣٠٠ ربما  
من متحجرات الاسحاب الثالثة والياتي منتشر في معظم  
بحار البلاد الحارة . بعض انواعه يعيش على رمال الشطوط  
المغمورة والبعض الآخر على حشائط الجبال || اصدافها  
مائلة متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل  
البصري " ثم الخدوني " فهاذا مستطيلة ، ضيقة .  
اريفاتها اليسرى ملتوية الى الداخل اما اليمنى فال خارج ||  
اجسامها كبيرة . رؤوسها واضحة ، ثنائية اللراس المعبوة  
اغصانها صغيرة . اردتها فضفاضة . اردلها عادمة الغطاء .  
اشهر انواعه الشيلج السرديني (Marginella sarda) الذي  
يشبه السردين شكلاً وحجماً والذي يكثر وجوده في البحر  
الايض المتوسط .

#### ١٥٩٤٦ - شَيْشَسِيَّات \* Marginellidae (S). Marginellidés (F). Marginellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات مديات الاربل .  
اجناسها وانواعها المروفة عديدة ، بعضها من متحجرات  
الاسحاب الثالثة والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم  
بحار البلاد الحارة والممتدة الحارة || افرغ اجناسها  
واشهرها الشيلج .



شيلج

#### ١٥٩٤٧ - شَيْشَرَج \* Gonapteryx citron, Citron (F).

حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة جرشفيات الانجسة .  
اصطفاها حصاب وجبال الشرق الادنى وارودية وافريقية  
الشالية . فراشها واضحة قوتها منفر الاثمار . سرتها تعيش  
على براعم النقيبات وتولمها || جسمها بطول نحو ١٩ م .  
سقطها نحو ٥٦ م . راسها معتدل الحجم . اجر اللون .  
عينها كبيرتان . زباناها صولطانيان جوشها كثيف الحمل  
احمل اللون . بطها اريد اللون عند الذكر ، احملته عند  
الانثى . ووشناها الاماميان الى الصفار البيوتي عند الذكر  
والى الحصار الباهت الازرق الملاج عند الانثى . وتعلوها  
نقطة برتقالية في كل ووشن وبعض نقط حاشية قمعية  
اللون . الزوج الخلفي بلون الاسمي وتتلوه عند الشقين  
نقطة برتقالية كبيرة واربع نقط صغيرة قمعية اللون ،  
حاشية || لها جيل واحد في الحول . الانثى تمتع الممكن  
زوجاً زوجاً على زيمات الزفرين والتبق والتاب || السوفة  
الخضراء يعلوها غطان جانيبان اسفران وتسعة غطوط  
كستنية يحدها اطار اسود . راسها اسود مدنها ورواجها  
الى الطلعة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥  
يوماً ويتقضي ضمن غشاء عضوي المادة رباطه غيل  
حريري تمسده الحصيفة .



شيش زفرين

#### ١٥٩٣٩ - شَيْشَس \* Romulea (S). Romulée (F). Romulea (E).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السونيات . منبتها  
ساحل حوض البحر الايض المتوسط . انواعها المروفة  
سنة . سوقها غمرائية ، قرصية الانتشاب ، لاقياسية الافراج  
منها الوحيدة ومنها القمية . اوراقها متماقية غشقة اتصال  
المستطيلة . ازهارها فردية ، طرية الازكاز . الوانها تختلف  
من نوع الى نوع ، منها البنفسجي والوردي والاصفر  
والبيكلي والمزلق .

#### ١٥٩٤٠ - شَيْشَبَان \* Fourmi mâle (F). Ant male (F).

هو ذكر النمل .  
١٥٩٤١ - شَيْشَس \*  
Lonchoptera (S).  
Lonchoptère (F). Lonchoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الشيمريات ورتبة ذوات  
الجناحين . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق  
البلاد الممتدة الحارة || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول  
من ٢ الى ٥ م . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عينها كبيرة ،  
ناشرة ، فاقية عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ،  
ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اغصانها فسيحة .  
ملاسها وحيدة العقلة . كواسلها وبطونها متساوية المرض .  
روافئها شبه شفافة . قوائمها ميمرة الحلب الشالك .  
اولها ملونة || تألف الغابات وفضاف مجاري الماء .  
جسمها واضحة ، قوتها رسيق الازهار وطلها . يرقاتها تعيش  
على المواد النباتية الجزئية الاخلال في الجلالة وفي كل  
مكان آخر .

#### ١٥٩٤٢ - شَيْشَسِيَّات \* Lonchopteridae (S). Lonchoptéridés (F). Lonchopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
المروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع العالم .  
تألف الحراج والغابات وبعضها يعيش قرب مجاري الماء ||  
اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٣ الى ٥ م . رؤوسها  
كبيرة . عينها فاقية عند الشقين . قرونها الاستشعارية  
قصيرة ، ثلاثية الفصل . اغصانها فسيحة تتدرج في  
التجويف الفكي . شفاهها السفلى لافعة . تأكلها غمامرة .  
روافئها شبه متباينة الشكل . قوائمها نيفطة ، ميمرة الحلب ||  
يرقاتها مبطلة تعيش في المواقع الرطبة على المواد النباتية  
الجزئية الاخلال || اشهر اجناسها الشيصر .

#### ١٥٩٤٣ - شَيْط \* Brûlure (F). Scald (E).

احترق النبات من الصقيع . يقال شَيْط الصقيع النبات .

#### ١٥٩٤٤ - شَيْطُ البَشَرَة ، شَيْطُ التَّيَار \* Rouissement de l'épiderme, Rouissement des fruits (F).

الشيط تشويه عايط يحل بملها الادة فيقصي عليها ويجب  
استبدالها بمادة فلفية . اسبابه عديدة اصحها :  
١ - العوامل الجوية اللاذوائية كالبرد والرطوبة وتدفئ  
الحارة التي تعقب القمد وتستمر نحو ٤ اسابيع .  
٢ - الاختلال في توازن الغذاء .  
٣ - اهش الحائض عن استعمال بعض الادوية الكاوية .  
٤ - الازماد الباك اذا اعترى الثابر قبل الاوراق او  
ركب الاوراق والثابر في آن واحد .

## ١٥٩٥٨ - شَيْطَسٌ \* ، أُبُرْ هَرَيْشَكَة Muræna (S).

Murène (F). Moray (E).  
جنس سمك بحرية مفترسة نهم من فصيلة الشبقيات .  
أنواعه عديدة جميعها من سمك بحار المناطق الحارة يكثر  
وجودها في بحر القارم والمتوسط . تتميز بجلدها العامد  
الحراشف . شكلها يشبه الانكليس طولها يراوح من ٨٠  
الى ٣٠٠ سم . تألف المياه الاقليمية واغوار الأنهر .

## ١٥٩٥٩ - شَيْطَكَة Chenalopex (S).

Chenalopex, Ole-renard (F).  
جنس طير من فصيلة الوزيات . أنواعه قليلة العدد جميعها  
رشيقة القوام ، مستطيلة العنق والريش ، كبيرة الجناح  
الذلق ، قصيرة الذنب ، قوية الدائرة الحادة . غاطسها  
صفحية متوسطة الطول . أذناها العليا شافية . أثوابها  
مترابكة الألوان المختلفة من الياض الى الاسود يملوها  
تجديد وتضليل وتبييض || موطنها فصح الاجزاء يمتد من  
الهند الى افريقية الشرقية وأروبة . تألف البحيرات  
والأنهر والمناقع . تنش في الاجتار القتال على مقربة من  
الماء . انثاه تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها  
نحو ٤ اسابيع || اشهر أنواعها شيطكة النيل وشيطكة الهند .

## ١٥٩٦٠ - شَيْطَكَة النيل \* ، أَوْرَة مَصْرِقَة

Chenalopex aegyptiaca (S). Chenalopex d'Egypte,  
Oie du Nil. Oie d'Egypte (F). Egyptian goose (E).  
نوع من الشيطكة موطنها شواطئ النيل والبحيرات . تتميز  
باستبدادها ونفورها وشراسة اخلاقتها .

## ١٥٩٦١ - شَيْطَكَة الهند Chenalopex melanonotus (S).

Chenalopex des Indes (F). Indian goose (E).  
نوع من الشيطكة موطنها الهند والبراق . تتميز بكبر جثتها  
وبرعها ثوبها .

## ١٥٩٦٢ - شَيْطَقِيَّات ، مَرَشِيَّات Muraenidae (S).

Muraenidae (F). Muraenidae, Muraenidae (E).  
فصيلة سمك من رتبة مفتحات المثانة المجلكتيات . اجناسها  
عديدة اشهرها الشيق والانقليس .

## ١٥٩٦٣ - شَيْطَكَة Spicaria

جنس فطور مجهرية من اللتيخيات وفصيلة اللتيخيات .  
جرباه الكتيدي جالس القاعدة ، منتصب القوام ، لا  
قياسي الشكل . كنانها سحبية التجميع || أنواعها  
قليلة العدد والاذى لا تستوجب عناية خاصة .

## ١٥٩٦٤ - شَيْكُو Chicot (F).

شجرة حرجية من التندميات تدعى طميلة ، اطلبها .  
١٥٩٦٥ - شَيْكُوْرِيَة هي الهندباء . اطلبها .

## ١٥٩٦٦ - شَيْكُل ، كَيْلوس Chyle

مادة سائلة بيضاء اللون تحضنها الغاشية الغاطية المموية  
اثنا الحضم فتضهرها وتنقلها بواسطة المروق الشيلوية الى  
جداري البورة الدموية .

## ١٥٩٦٧ - شَيْكَلِك ، فَرِيْز ، قَرَاوَلَة ، ثُوْت الأرض

Fragaria (S). Fraisier (F). Strawberry (E).  
جنس نباتات عشبية رقيقة زخافة معمرة من فصيلة  
الورديات . انواعه سبعة اما غروبها واصرامها فكثيرة

## ١٥٩٦٩ - شَيْطَسٌ كَلْبِيَاوَرَه Gonepteryx Cleopatra (S).

Gonepteryx Cléopâtre, Citron de Provence (F).  
حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة حرشفيات الالجنة .  
موطنها بعض مضارب وبيال حوض البحر الايبي المتوسط ||  
فراشتها وراشعة قوتها رقيق الازهار . سرقتها غاشلة تعيش  
على زينات عوائلها من النقيات || جسمها يطول نحو  
٢٠ م . بسطها نحو ٥٨ م . رأسها ارجواني اللون . عينها  
كبريتان . زباناها صولجانيان . جوشنها جوي الحلقه  
الصدرية الاول ، اربعة الثانية والثالثة . بطنها احمر اللون ،  
اشجع المراج عند الذكر ، اسمر عند الانثى || روشنها  
الاسمان ، عند الذكر ، الى الصفار الليموني تتوسطه  
بقعة ارجوانية الخمار ، جزؤية المركز . وما عند الانثى  
الى الخضار الباهت تتوسطه نقطة جزؤية صفيرة . روشنها  
الغليظان ينش اللون تملوها لطحنة برتقالية كبيرة عند  
الذكر ، صفيرة ورمية عند الانثى || لها جيل واحد في  
الحول . الانثى تبيض المكن زوجا زوجا على نواحي النبق  
والمداب || السرعة تقارب نحو ٣٦ م . جسمها اسطواني .  
ثوبها الى الخضار الالبي يملوها غطان جانبيين احمران  
وغضن ليجي جزوي اللون ، اسود الخمار ، وقسمه اطواق  
سود يتوسطها تنقيط اصفر . رأسها اسود . منها ورواجها  
الى السمرة .

## ١٥٩٧٠ - شَيْطَكَة Flambement (F).

Buckling (E).  
منشع طبيعي قوامه ان الاجسام المستطيلة تتأثر بالضغط  
فتتشوه شوهتها الجانبي .

## ١٥٩٧١ - شَيْطَمٌ هو الشهم المبدول ، اطلبه .

## ١٥٩٧٢ - شَيْع Lionceau (F). Young lion (E).

ولد الاسد قبل ان يكون شيل .

## ١٥٩٧٣ - شَيْعَة

شجرة لها نور اسفر من الياسين احمر طيب تعبق به  
التياب . والتحل تجمرها ويطيح عليها صعلها (السان) .

## ١٥٩٧٤ - شَيْعٌ \* ضَاهِبٌ Imperméable à l'air (F). Air-tight (E).

نعت تعريبي يطلق على كل مادة لا ينفذها الهواء .

## ١٥٩٧٥ - شَيْفٌ هو الشوك المبرسد في مؤخر عيب النخل .

## ١٥٩٧٦ - شَيْفَرَة \* Carinaria (S).

Carinaire (F). Carinaria (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدنيات الاربيل  
وفصيلة المرانبات . انواعه المروفة ثمانية منتشرة في جميع  
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها صفيرة ،  
وحيدة المساريح ، دقيقة ، شفافة ، غروبية الشكل ،  
محلزة الاقطاب ، تجمع في داخلها القلب والاشعاء ||  
اجسامها مستطيلة ، هلامية ، شفافة ، تنتهي بزوائد  
جانبية الشكل . رؤوسها غطمية ، متدقة ، مقنوية ،  
ثنائية اللواس والعيون || اعرف انواعه واشهرها شيفرة  
المتوسط (Carinaria mediterranea) .

## ١٥٩٧٧ - شَيْقٌ Crin (F). Coarse hair (E).

هو السيب شرذوب الدابة .



شيفر



شيق



شيطكة النيل



شَيْك بَرِّي

تَمَّ بطريقتين اما باليد او بالرواكب . فاليد يكون في مشاتل خاصة توافرت فيها جميع اسباب الانتاش والنمو بسرعة ثم تنقل الشتل الى مسقرا || اما الرواكب تنفصل عن اماتها وتقرن في مسقرا وبهم من نقلها الى محضن تقيم فيه من ٤ الى ٥ اسابيع قبل ان يفرغوا في مسقرا || زراعة الشيكل تستمر عدة سنوات متتالية لكنه يحسن تجديدها كل سنتين لان كثرة رواكبها تستنزف التربة من جميع عناصرها الغذائية .

١٥٩٧٢ - شَيْكِيَات  
Potentillées (F).  
سيط من فصيلة الورديات ويدعى أيضاً فراوليات .

١٥٩٧٣ - شَيْكَم \* ، سَلْتُ ، شَوْتَم  
Secale cereale (S). Seigle (F). Common rye (E). Roggen, Saatroggen (D). Segala, Segale (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة النجيليات . غروبه وأصرامه عديدة تصنيفها يرتكز على مدى مؤلفاتها الاقليمية ومجال مسلاتها الى مختلف انواع الآرتة وازمنة البذار . ساقه دقيقة ، جوفاء ، مستطيلة السلايات . عصفه خفيف النصل ، يلهت الخضار ، امر المواج . سبلته مستطيلة الشكل سيلياته ثلاثية الصف ، عقبة الزهرة الوسطى ، سفوية المصيفات العليا . حبه قريب الشبه من البرر الا انه اذق وطول وتعلوه مشعة مملوءة اللون ، غصراء المواج . زرع لحدود على حبه المأكول ، دقيقه امر اللون ، يميز العلم والعرف . يستعمل في معظم الميعونات . قش صناعي شائع الاستعمال || وهو من النباتات التي تنمو وتجود في اقلر الآرتة الربلية والربلية المسالسية والربلية الجسية . ومن خصائصه المميزة انه يقدد بؤرة الانبات بسرعة فسويته الحولية جميعها سالحة لانبات واستعما تصيح محولة بنيت منها نحو ٦٠ ٪ / اذا كاثت من محاصيل ثلاث سنوات خلث فلا ينبت منها الاكثر من ٢٠ ٪ .

١٥٩٧٤ - شَيْكَم البرر  
Arrhenatherum avenaceum (S). Arrhénathère, Faux seigle (F). False oat grass, French rye grass (E). Knolliges Franzosengras (D). Saggina cannaloia (I).  
نبات عشبي بري حولي من الحراليات وفصيلته النجيليات يتميز بازهاره المنكولي الرمل . يكثر بين الزروع ويملوونه ويوجد في الارض البور || كثرته في الحقل مضرة لانه يهيب التربة . يكافح باستعمال بعض الموشايب القعالة التي تقضي عليه وتنظف التربة من بذاره .

١٥٩٧٥ - شَيْكَلُو  
Chilo  
جنس حشرات من فصيلة الناريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، رفاقها نهمة تميل على جلود وسوق بعض النباتات اخصها المتقية والمالية || اشهر انواعه واغمرها شيلو القصب .

١٥٩٧٦ - شَيْكَلُو الْقَصَب \* ، دُوْدَة الْقَصَب  
الصغيرة ، حَقَّار الرِّزِّ الشرقي  
Chilo simplex, C. phragmitellus (S). Chilo des roseaux (F).

قراشة من فصيلة الناريات ، صغيرة القد ، اسطوانية الجسم . اجنحتها مهادية الامطار . طول الاجن ١٢ سم . والذكر ١٠ ، رأسها وجوشها وينجاسها الى الاماميين والصفرة اللقاقة ، بطنها وينجاسها الحلقين الى اليمين واللفي || اجيالها الحولية بين خمسة والسبعة . تضع الاثنى نحو ٤٠٠ مكنة تحتمها على نصل الاوراق بشكل



شَيْكَلُو الْقَصَب

المدد . اوراقها مركبة ثلاثية وبضها خاسي . وريقاتها بيضيه او اهليلجية الشكل ، مديبة الزام الاخير . نصلها كثير العروق ، خشن للمس ، منشاري الحافة ، عايق الخضار . ازهارها معلقة خاسية الثلاث عديدة الاسدية ، ثمارها شمولية ، قلبية ، بيضيه او غدروية الشكل ، مأكولة للنبات العلم ، ذكية العرف || انواعه السبعة المعروفة هي .

الشيك البري F. silvestris (S). Fraisier des bois (F).  
الشيك الشيلي F. chilensis (S). Fraisier de Chili (F).  
الشيك الفرجيسي F. virginiana (S).  
Fraisier de Virginie (F).  
الشيك الكبير الزهر F. grandiflora (S).  
Fraisier ananas (F).

الشيك الكروي F. collina (S). Fraisier étoilé (F).  
الشيك المائل F. vesca (S). Fraisier commun (F).  
الشيك المسكت F. elatior (S). Fraisier capron (F).  
اما انواعه المشهورة فهي ما يتبع .

١٥٩٦٨ - شَيْكَل بَرِّي \*  
Fragaria silvestris (S).  
Fraisier des bois (F). Wood strawberry (E). Wilde erdbeere (D). Fragola salvatica (I).  
نوع من الشيك البري مهدد جميع البلاد الممتدة الحارة يكثر في المواقع الظليلة من القابات والتياض . ثماره صغيرة القد ارجوانية اللون ، مردنية الشكل مأكولة تتميز بنكهة غامضة متعبة .

١٥٩٦٩ - شَيْكَل فِرْجِينِي  
Fragaria virginiana (S). Fraisier de Virginie, F. du Canada, F. écarlate (F). Wild strawberry (E). Scharlachbeere (D). Fragola della Virginia (I).  
نوع من الشيك الامريكي المهد ، اوراقه ثلاثية ، نصلها مائل البنية ، خلي العروق على الصفحة السفلى . ثماره متوسطة الحجم ، كروية الشكل ، ارجوانية اللون . غروبه وأصرامه المهجنة الزراعية عديدة جميعها مأكولة الثار للنبات العلم .

١٥٩٧٠ - شَيْكَل كَثِير الزَّهْر  
Fragaria grandiflora (S). Fraisier ananas, F. de la Caroline (F). Pine-apple strawberry (E). Ananas-erdbeere, Grosse Erdbeere (D). Fragola ananasso (I).  
نوع من الشيك كبير الثار قليلا ؛ استخدم في تهجين معظم الانواع الاخرى تفحدرت منه ضروب واصرام عديدة عمت زراعتها جميع البلاد || يتيز بكثر ثماره القليلة الشكل الجامدة اللباب المسحب العلم . لوها الى الوردي تعلو مشعة صفراء زاوية المواج .

١٥٩٧١ - شَيْكَل مَبْدُول \* ، شَيْكَل مَعْرُوف  
Fragaria vesca (S). Fraisier commun (F). Common strawberry (E). Erdbeere, Walderdbeere (D). Fragola commune, Fravola (I).

هو النوع الزراعي المشهور ، غروبه وأصرامه التي تحدرت بالتهجين مع الانواع الاخرى كثيرة المدد ويستمر ازديادها عاما بعد عام . اوراقه ثلاثية مستطيلة الزناد . نصلها خشن للمس جميل الخضار . ازهاره عديدة ، طويلة المالحق . ثماره متوسطة القد اوكبرية ، لا قياسية الشكل ينظف فيها البرمي . لوها الى الحمرة زهره ويصيح وتكمد مشتمها من مختلف الضروب والاصرام || يعين في جميع الاقاليم المعتدلة لكنه رغب في الآرتة القليلة الانسجام الغنية بالمواد المضوية والعناصر الغذائية المدنية || زراعت

من الذيلية الى السرة الخلفية يطبقها حصار اسود . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شفتها متوسط الانفرج . فكها متعادلان . اسناتها متراصة وحيدة الصف في الفكين . عيناها مستديرتان ، ناثرتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحها وديك ، ابيض اللون ، مستحب العلم .

### ١٥٩٨١ - شيم طرخوري\* ، طرخورة

Trachurus trachurus (S). Saurel, Chinchard (F).  
Scad, Horse-mackerel (E).

سمكة بحرية بيضاء من الشبديات الاسقرديات ثنائيات الزعانف . اعطائها جميع بحار البلاد المحتلة الحارة من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جسمها اهليجي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الربعة الزرقاء بخضر ويسمر عند الظهر ويبر عند البطن . رأسها مخروطي الشكل معتدل الحنج . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . تتميز باستطالة زعانفها الظهرية والشرجية . زعنفتها الذيلية فارقة . حراشفها عظامها الجانبي جنانتي الشكل تملأها مناس متعقبة تتجسم وتكثر مع الاقتراب من الذنب || لحها متوسط الصنف ، مأكول .

### ١٥٩٨٢ - شيم قراب\* ، قراب

Caranx korab (S). Caranx korab (F).  
Caranx korab (E).

سمكة بحرية بيضاء من الشم . اعطائها جميع اقالم البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الثقاف واليم || جسمها اهليجي الشكل ، معتدل التبيط ، يطول من ٤٠ الى ٥٥ سم . ثوبها الى الشبهة النفضية المراج . ظهرها الى الزرق . زعانفها الصدرية والخصوية الى الشبهة . الظهرية الى الخضر البحري ، الشرجية شتاعة يطوقها حصار اصفر . الفلقة العليا من الذيلية الى الزرقه الخضر المراج ، الفلقة السفلى الى الصفار الباهت || لها في ظهرها زعنفتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحها جيد الصنف ، مغروب فيه .

### ١٥٩٨٣ - شيمييات

Carangidae (S).  
Carangides (F). Carangidae (E).

عارة اسماك من الاسقرديات الشائكات الزعانف .  
Caractérologie (F).  
Characterology (E).

الشمية قسم من السيكلوجية يبحث في الطباع الخلقية .

### ١٥٩٨٥ - شيشيز ، هو الشونيز ، احلبه .

### ١٥٩٨٦ - شيهم

Hystrix (S).  
Porc-épic (F). Porcupine (E).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الشبديات انواعه ستة ، جميعها غليظة الاجسام الشفنة الصمورة . رؤوسها مكرمة . مقاضها مقنونة . خنثاها مستعرضة . عيونها واذانها صنية . اعناقها قصيرة . جرابها معتدلة اللد قوية . اخافوها مقنونة حادة . اذنانها جداد بارزة . لها كثيف التبيج قصير القد يتخلله شوك كالسائل متباين الطول والتلفظ يملو الجسم من قد الرأس الى طرف الذنب || اعرف انواعه الشيم المبذل والشيم الابيض الذنب . قال فيه الجاسط : « من شأنه انه يسند قائما واذا رأى ما يكبره انتفض وتنفص فيخرج منه شوك كالسائل يبرح من اصابعه » .

ككل مستطيلة . الكتلة تشمل من ٢٤ الى ٣٦ مكنة تنقف بعد منها بحسة او سمة ايام نسبة الى عوائل الطقس من رفات صغيرة هبة تنقف على الاوراق وتحفر السوق وتبلغ كامل نموها البرقي بنحو ثلاثة اشايح ثم تتحول الى عذارى ونها الى حشرات كاملة . طويها المذري يدوم الى الربيع والصيف من ٤ الى ٦ ايام || اما البرقة الكاملة فطويها نحو ٢٠ م . لونها الى الجزرة الخلفية يطبقها خمسة خطوط ارجوانية مستطيلة كتكتنف الظهر والجانين || عوائلها عديدة اهمها قصب السكر والارز والذرة الصغراء والبيضاء والذخن والتبيل || اغمرها شديدة الوق لها تحفر السور وتقضي على النواحي .

### ١٥٩٧٧ - شيلينة\* ، Chilina (S). Chilina (F). Chilina (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات مبديات الارجل وفضيلة الشبديات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها ابر وينابيع امريكة الجنوبية . قوتها النباتات المائية || اصداها نصف كروية الشكل ، قصيرة الارب ، كبيرة القوة المستطيلة . اجسامها مستطيلة . رؤوسها قليلة الوضوح مطلة . لواسها مزوانية الشكل . ارجلها وحيدة ، مستعرضة ، عادمة السقاط .

### ١٥٩٧٨ - شيم\* ، صيم

Caranx (S).  
Caranx, Carangue (F). Scad, Cavalry, Horse-mackerel (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقرديات . انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من الاسماك المأكولة . كبيرة القد طويها يراوح من ٤٠ الى ٧٠ سم . تتميز بخط جانبي من الحراشف الى الحلية الشكل ، السراء اللون ، يقطعها من العنق الى الشرج .

### ١٥٩٧٩ - شيم أزبد\* ، Caranx glaucus (S).

Caranx glauque (F). Glaucous scad (E).

سمكة بحرية بيضاء من فصيلة الشبديات ورية ثنائيات الزعانف . اعطائها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي ... تعتبر من الاسماك البنية || جسمها اهليجي الشكل ، معتدل التبيط ، يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الربعة يطوقها مراج ازرق يتخلله الاخضر البحري يمتد في الظهر ويبر في البطن ويملو جميع فصي عند قاعدة الزعنفة الظهرية الثانية والزعنفة الشرجية . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شفتها واسع الانفرج . فكها متعادلان . اسناتها صغيرة وحيدة الصف في الفكين . عيناها صغرتان ، مستديرتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحها وديك ، ابيض اللون ، مستحب العلم .

### ١٥٩٨٠ - شيم صتون\* ، صتون

Caranx sanson (S). Caranx sanson (F).  
Caranx sanson (E).

سمكة بحرية من الشم . اعطائها جميع اقالم البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الثقاف واليم || لمنجها الحياتي جاعي بعد الادراك || جسمها اهليجي الشكل يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . ثوبها الى الشبهة النفضية الماعمة الدس . زعانفها الصدرية والخصوية غبراء اللون . زعنفتها الشرجية والفلقة السفلى من الذيلية الى الصفار الخفي المراج . زعانفها الظهرية والفلقة العليا



شيلة



شم اريد



شم صتون



شيم طرخوري



شم قراب

ورقية القوام. اجناسها وأنواعها عديدة تتميز بأجسامها الصلبة المنقضية. رؤوسها غليظة. مقامها مقنونة. أذنانها قصيرة أو طويلة اخاذة. جرابها متساوية الطول رباعية أو خماسية الأصابع. انقلعها قوية ذرية. جلودها حسية التركيب يعلوها طب دقيق وشوك كالمسك متباين الغلط والعلول || موطنها المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد. وهي بطيئة الحركة تسرح في الليل قوتها تختلف المواد النباتية والظواهر والوزع والأفاقي.

تقسم هذه الفصيلة إلى فئتين :

— فئة الشياهم الشاجرة المتسلقة وهي تشمل ثلاثة اجناس الأورسوم والقنوس والشطوس .

— وفئة الشياهم الأرضية وهي مؤلفة من جنتين الشيهم والاطرور .



شيهم ميلول

#### ١٥٩٩١ - شبههميات الشوزب ٥

*Hystricomorphes* (F).  
مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القوارض تشمل أربع فصائل الشيهميات والأفاقيات والشنفيليات والشرديفات .

١٥٩٩٢ - شيوط ٥  
*Chayote* (F).  
هو السكويوم نبات زراعي من القرعيات ، اطلبه .

#### ١٥٩٩٣ - شيوخ ، ملكية شائعة

*Indivision* (Jur.) (F). Joint-possession (E).  
حالة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره في مال أو عقار لم يقسم بين مالكه ويكون كل مشتاع شريكاً بقدر نصيبه في كل جزء من أجزاء المال المملوك على الشيوخ ويكون نصيبه معنوياً يبر عنه بالأرقام كالتصنيف والرابع والتين في حين يبقى المال الذي ينصب عليه هذا الحق شائعاً .

١٥٩٩٤ - شيونودكسة  
*Chionodoxe* (F).  
هي الثرفث ، اطلبه .

١٥٩٨٧ - شبههم أبيض الذئب ، شوهب ، مدكع  
*Hystrix leucura* (S). *Porc-épic à queue blanche* (F).  
نوع من الشيهم كبير الجثة غليظها بطني الحركة ، طوله يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم. وذنبه من ٧ الى ١٠ سم. ثوبه إلى الصهية السوداء . عليه ابلق اللون وشوكه كلك . ذنبه ابيض الحلب والشوك || موطنه الهند ويران والمراق حتى ضفاف بحر قزوين . يألف المناطق القريبة من العمران . جمره دعة فسيحة مستديرة يحفرها على عمق ٧٠ سم. يأوي إليها في النهار. يسرح في الليل . قوته الجلود والمساقل والاشباب || اثناء تضع من ٢ الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٨٨ - شبههم بحري  
*Hérission de mer* (F). *Porcupine fish, Sea hedgehog* (E).  
هو قنفذة البحر من الفصليات ، اطلها .

١٥٩٨٩ - شبههم ميدون \* ، شيطم ، دكلك ، تيش  
*Hystrix cristata* (S).  
*Porc-épic commun, Porc-épic à crête* (F).

نوع من الشيهم غليظ الجثة الزينة الصمورة . بطني الحركة . طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم. وذنبه ١٦ . شوك فقرته وسنقه دقيق مستطيل منطوف الزام الاخير . طوله نحو ٣٢ سم. شوك ظهره كثيف التجميع مستقيم الشكل غليظ القذ ذرب الاطراف يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ينفسه الحيوان للدفاع عن النفس فينفذ ويؤدي حيث يفرز || موطنه فسيح الارباب يعم كامل حوض البحر المتوسط || يألف الاحراج والمغصبات والاماكن البعيدة عن العمران . جمره دعة فسيحة يحفرها في التربة على عمق ٦٠ او ٧٠ سم. مدغلها ويخرجها تفق واحد طوله نحو ٥ امتار || يسرح في الليل . قوته الاشباب والجلود وجميع انواع الشوك والصفهيات وبعض الحشرات والديدان والوزع والظواهر والأفاقي || اثناء تضع من درسين الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٩٠ - شبههميات  
*Hystriidae* (S). *Hystriidae* (F). *Hystriidae* (E).  
فصيلة حيوانات لبونة قاضية من مرتبة شبههميات الشوزب



ص

#### ١٥٩٩٩ - صَابُونِيَّاتٌ ، قُرْبُسِيَّاتٌ

*Clupeidae* (S), *Clupeidae* (S), *Clupeidae* (S).  
فصيلة أسماك عديدة الإجناس والانواع، متفاوتة القد وقدّر  
الأسراب. أشهر أجناسها الصابونية والشابل والسردن  
والرلكة الخ.

١٦٠٠٠ - صَابُونُ  
Savon (F), Soap (E).  
مادة صناعية تستعمل للتنظيف تتكون من تفاعل بعض  
المواد الدهنية مع بعض المواد القلوية .

١٦٠٠١ - صَابُونِيَّاتٌ  
Sapindacées (F).  
هي فصيلة السبنديات ، اطلبها .

١٦٠٠٢ - صَابُونِيَّةٌ  
Saponaria (S).  
Saponaria (F), Saponaria (E).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنفلية .  
أنواعها نحو ٢٠٠ جميعها منقطة . أوراقها كاملة متعاقبة .  
أزهارها ثورية التجميع . تاجية الارتكاز ، زاعية الألوان  
التي تختلف بأخلاف الأنواع || أعرف أنواعها وأشهرها  
سابل .

#### ١٦٠٠٣ - صَابُونِيَّةٌ دَائِقَةٌ

Saponaria glutinosa (S), Saponaria visqueuse (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة سبوتية محولة تملو من ٢٥  
الى ٥٠ سم. ساقها فراء مزغبة . أوراقها كبيرة القد ،  
تصلها ثلاثي أو خاسي العروق ، أزغب البشرة ، دابق  
المسام . أزهارها هربي الشكل . أزهارها قرمزية اللون ،  
صغيرة البتلات الجزلة .

#### ١٦٠٠٤ - صَابُونِيَّةٌ رِيحَانِيَّةٌ \*

Saponaria ocimoides (S), Saponaria faux-basilic (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة سبوتية معمرة تملو من ٢٠  
الى ٤٠ سم. ساقها فراء . أوراقها معتقة ، أهليجية ،

١٥٩٩٥ - صَاوَةٌ  
Délivre (F), After-birth (E).  
ما يخرج من رحم أنثى الحيوان من القذى بعد الوضع .  
يقال أقت البقرة صاتها .

#### ١٥٩٩٦ - صَابَةٌ ، مَسْكِيَلَا

Hippomane manchinella (S), Mancenillier, Arbre  
poison, A. de mort (F), Manchinel tree (E), Man-  
cinenbaum (D), Mancanilla, Mancinella, Noce  
velenoso (I).  
شجرة من فصيلة السوسيات تملو من ٥ الى ٧ أمتار ،  
شكلها على هيئة الجوز . ساقها سرعة صهبوية . أوراقها  
معتقة ، متعاقبة ، قلبية ، مستطيلة . فصلها شديد الخضار ،  
متنمغ الصفحة ، سميك النسيج . أزهارها وسيدة المسكن ؛  
الذكورية قدية الشكل ، فمية التجميع ، والأنثوية فردية .  
ثمارها كالتفاح الصغير شكلاً وحجماً وهي مأكولة ، لذيدة  
العلم . والشجرة تفرز شائنة أي عصارة لينة حريفة ،  
كاوية ، سامة . ومنهم من قال إن كل من نام في ظلها  
كان نصيبه الموت . ج صاب .



صَابَةٌ



صَابُونَةٌ

١٥٩٩٧ - صَابُونَةٌ \*  
Alosa finta (S).  
Alose, Feinte (F), Shad (E).

سمكة من الصابونيات كبيرة القد ، تطلو نحو ١٠٠ سم .  
تكثر في المتوسط وعلى شواطئ الأطلسي . تدخل الأغوار  
وتعصد الأنهار في زمن السرم ثم تعود إلى البحر في أواخر  
الصيف || لحمها لذية الطعم غير أنه كثير الحسك .

١٥٩٩٨ - صَابُونَةٌ النِيل  
Clupea nilotica (S).  
Alose du Nil (F), Nile Shad (E).

سمكة بحرية ونبوية من الشابلات الصابونيات ، موطنها  
المتوسط . يكثر وجودها في النيل من أذار إلى تموز وهي  
كبيرة القد ، كثيرة الحسك ، مأكولة .



صَابُونَةٌ رِيحَانِيَّةٌ



- مقلوبة القاعدية ، نصلها دابق المسام ، اذهب البشرة .  
انهارها يفضاء اللين او ودية ، كاسها متراكب الحراشف  
الحطية || انهارها يستمر من تموز الى آب .
- ١٦٠٠٥ - **صابونية شرقية**  
Saponaria orientalis (F). Saponaire orientale (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة حولية سرولية تملو ١٥ سم.  
ساقها زيار . اوراقها معتقة صغيرة القد ، اهليجية الشكل .  
نصلها مائل البشرة وحيد المرق . انهارها ودية اللون  
او حراء ، كاسها اسطوانية الشكل ، خلية البشرة || انهارها  
يستمر من ايار الى تموز .
- ١٦٠٠٦ - **صابونية صفراء**  
Saponaria lutea (S). Saponaire jaune (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة معمرة ترغب في الاربة  
المجسية وهي من نباتاتها الطوعية . تملو نحو ١٠ سم.  
ساقها عادمة الفروع ، قليلة الاوراق المتباعدة . نورثا  
الزهرية هامة الاككار . كاس الزهرة زيفاء البشرة ،  
بتلاتها صفراء اللون منمشة بالاسود || انهارها يستمر  
من تموز الى آب .
- ١٦٠٠٧ - **صابونية قزمية**  
Saponaria pumila (S). Saponaire naine (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة برية جبلية معمرة . ساقها  
جذمة وحيدة الزهرة تملو نحو ٥ سم . اوراقها خبيقة النصل  
للمستطيل المائل . زهرتها ودية البتلات . كاسها خلية  
البشرة ، حراء اللون .
- ١٦٠٠٨ - **صابونية مخزنية \*** ، عرق الحلاوة  
Saponaria officinalis (S). Saponaire officinale, Savon-  
nière, Herbe à foulon (F). Soapwort, Hedge pink,  
Fuller's herb (E). Echtes seifenkraut (D). Saponaria  
officinalis, Saponella, Condisi (I).  
نوع من الصابونية وهو نبات عشبي طبي وصناعي معم .  
ساقه ليفية ممددة تملو نحو ٨٠ سم . اوراقه كبيرة القد  
تملو نحو ١٥ سم . وتعرض ٥ سم . انهارها عطرية كبيرة ،  
حراء اللون او ودية . انهاره يستمر من حزيران الى  
ايلول || جلوره وسوقه واوراقه وانهاره طيبة تدخل في  
تركيب عدة مستحضرات تقيد الجلد واوباح المفاسل  
ويقال انها تنفع السفلس || سوقه صناعية تستعمل في  
تنظيف الثياب وهي ترغي في الماء كالمصابون .
- ١٦٠٠٩ - **صابونية**  
Saponine (F). Saponin (E).  
مادة صابونية تستخرج من عرق الحلاوة وغيره . تستعمل  
في التنظيف .
- ١٦٠١٠ - **صافية**  
Vent du Sud-Ouest (F). South-West wind (E).  
هي الريح الجنوبية الغربية ، ديج مهجا بين الجنوب  
والغرب وجهها بين الشرق والشمال .
- ١٦٠١١ - **صادات الريح**  
Brise-vent (F). Wind-screen (E).  
صف او عدة صفوف من الاشجار اللينة الكثيفة الاثنان  
تزرع لصد الريح ووقاية المزروعات من هبوب المذي  
الضار .
- ١٦٠١٢ - **صادير**  
Efférent (F). Efférent (E).  
١٦٠١٣ - **صادل**  
Prolétaire (F). Proletarian (E).  
الصادل والمبدل تمت ترميزي يطلق على كل شخص لا  
يستطيع الاتزاق الا بشغله .
- ١٦٠١٤ - **صادور**  
Echalis (F). Vine-prop (E).  
الصادور ما يعرض عليه الكر .
- ١٦٠١٥ - **صاكرة**  
Empaqueuse (F).  
جهاز آلي يسر تلقائياً ما جعل بمثابة من الاشياء .
- ١٦٠١٦ - **صاكفة**  
Shunt  
سلك ينصرف اليه قسم من التيار الكهربائي فيضف .
- ١٦٠١٧ - **صاروج** ، **صراج**  
Pisolith, Pisolite  
تربة جصية حبيباتها خفية اللؤل قدقها يراوح من حجم  
بزة الطرول الى الحصة .
- ١٦٠١٨ - **صاوخ**  
Fusée (F). Spindleful (E).  
سهم شديد الانفجار رشق به بعض السحب فيحول جلدا  
الى ماء يسقط على الارض مطراً بدلاً من البرد .
- ١٦٠١٩ - **صاواة**  
Coulure (F). Falling off, Dropping off (E).  
سقوط الزهر بعد التاثير والاخصاب ، راجع تحشف .
- ١٦٠٢٠ - **صاقل**  
هو الاشراس ، اطليه .
- ١٦٠٢١ - **صاقل الحشش**  
هو اشراس الحشش ، اطليه .
- ١٦٠٢٢ - **صاقل عيشية**  
هو الاشراس الاسابي ، اطليه .
- ١٦٠٢٣ - **صاعده** ، **مصحاحيد**  
Ascendant (F).  
صاعده ج . صاعده : رواسب كلسية متحجرة ناعمة تملو  
اوقش الفلور وبيوتانيا .
- ١٦٠٢٥ - **صاعقة**  
Foudre (F). Lightning, Thunderbolt (E).  
افراخ كهربائي جوي بين حماية مكهربة والارض او  
بين محابطين . والصاعقة يصحبها برق ورعد .
- ١٦٠٢٦ - **صاف**  
صاف الكر : بدت نوايه بعد الصرام .
- ١٦٠٢٧ - **صاف**  
Clair, Limpide (F). Thin, Limpid, Clear (E).  
ما كان لا دس فيه .
- ١٦٠٢٨ - **صافير**  
الصابفر : كل ما لا يصيد من الطير . والفسر يسفر .  
وفي الثقل : اجبن من صافر واصفر من لبيل .
- ١٦٠٢٩ - **صافرة**  
Couleuvre-chapelet (F).  
الصابورة اسم ثمان للثمان المرقط ، اطليه .
- ١٦٠٣٠ - **صافقة**  
Evénement (F).  
راجع حادث .
- ١٦٠٣١ - **صافن**  
Saphène (F). Saphens (E).  
ويسمى السافن والوريد الصافن . هو الوريد الذي يؤين  
نقل الدم الى اطراف الجسم السفل .
- ١٦٠٣٢ - **صافي**  
Net (F). Clean, Clear (E).  
هو ما يبقى بعد حذر الكلفة .



صابونية مخزنية

**Opuntia ovata (S). صَبَّار بَيْضِي**  
**Raquette ovoïde (F).**  
 زرع للزئين ، غيله يملو نحو ١٢ سم. ساقه وحيدة  
 اللوح البيضي الشكل المبط. سداثره رافعة ، مضفرة ،  
 صفراء اللون ، حاتها مستقلة مفصلة || ازهاره جؤوية ،  
 جيلة ، كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم.

**Opuntia inermis (S). صَبَّار مَرَح**  
**Raquette sans épines (F).**  
 زرع للزئين ولثاره المأكولة . مهدد بلاد الايتل ولوروما  
 غيله يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. الواحه اهليجية الشكل ،  
 بحرية اللون تطلو نحو ٢٠ سم. سداثره قليلة مبصرة سمراء  
 اللون ، عادمة الشوك || ازهاره كبيرة القد ، قطرها نحو  
 ٧ سم. لوها الى الصفرة الباعثة . ثماره يرتقالية الشكل  
 متوسطة الحجم ، سكرية اللب ، حمره البزور المرصاة .

**Opuntia stanleyi (S). صَبَّار سَطْنِي**  
**Raquette de Stanley (F).**  
 زرع للزئين ، غيله يملو نحو ٣٥ سم. ساقه مفصلة .  
 الواحه صفية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. سداثره رافعة  
 مخددة بيضاء اللون . حاتها كثيفة التجميع مشربة السرة  
 تطلو من ٣ الى ٦ سم || ازهاره كبريتية الصفار ، زاهية  
 اللوح ، قطرها نحو ٥ سم.

**١٦٠٤٩ - صَبَّار قَنْطَدِي \* ، كاكوس شوكي**  
**Echinocactus (S). Echinocact (F). Spine cactus (E).**  
**Igelkaktus (D). Echinocacto (I).**  
 جنس نباتات زربية شاككة مسمرة من فصيلة الصباريات.  
 انواعه عديدة مهددا البلاد الامريكية الرطلى . سقها  
 لحسية واسيدة القطعة ، يرتقالية الشكل مخددة الجسم ،  
 مقبولة الرأس والمقب . سداثرها كثيرة العدد ، منتظمة  
 الابعاد ، حنطية اللون ، ترتكز على فئج الاغادية .  
 حاتها ، قوية صلبة ، منسطة ، متشاككة || ازهارها  
 هامة ، كبيرة القد ، جيلة اللون الوردية . زرع في  
 المراكب لانها تخشى البرد .

**١٦٠٥٠ - صَبَّار مَعْرُوف \* ، صَبَّار تِين شوكي**  
**Opuntia vulgaris (S). Raquette commune, Figulier de Barbarie (F). Barbary fig (E). Gewöhnlicher Felgenkaktus (D). Fico di Barberia (I).**  
 نبات سبروتي شائع الاستعمال يزود لتجميع ولثاره  
 المأكولة . غيله كثيف التجميع يملو نحو ٢٠٠ سم.  
 الواحه كبيرة القد ، بحرية اللون . سداثره حنطية شاككة ،  
 حاتها غليظة حادة || ازهاره كبيرة القد ، زاهية الصفار  
 الجليل . ثماره مأكولة ، بيضيه الشكل مقبولة الرأس  
 والمقب . قشورها الى الخضار الاصفر تملو عند الادراك  
 مشمة حمره . وهي منتظمة السداثر الشاككة . شوكها  
 كثيف التجميع شديد الصلابة والدفق . لياها سكري العلم  
 مرصوف البزور ، يقال انه لا يخلو من بعض العناصر  
 الغذائية المفيدة وبها الحامض التسريفي الجزيل النفع .  
 يعيش في جميع الارربة من الريلية القاحلة الى الحضية  
 المنديجة . يتكاثر بفرس الواحه او بجزء منها .

**١٦٠٥١ - صَبَّار مَعْضَن**  
**Opuntia tunicata (S). Raquette à tunique (F).**  
 زرع للزئين . غيله يملو نحو ٣٠ سم. ساقه وفروها  
 اسطوانية ، مرصاة ، قليلة التبطيط ، تطلو نحو ٥ سم.  
 الواحه صفيرة القد ، بحرية اللون . سداثره حنطية سميرة ،  
 حاتها قوية تبقية اللون تطلو نحو ٤ سم . || ازهاره الى  
 الخضار الاصفر الزاهي الماوج .

**١٦٠٣٣ - صَبَّارِي الحَسَب**  
**Décompte (F). Deduction, Allowance (E).**  
 هو تمين رسيد الحساب المطلوب .

**١٦٠٣٤ - صَافُور**  
**Eplurreur (F). Cleanser (E).**  
 الصافور او المذن آلة تقلع الحجارة من الارض ويجمها .

**١٦٠٣٥ - صَافُورَة**  
**Fosse cérébelleuse (F). Cerebellar fossa (E).**

الصانورة : باطن القحف المشرف على الدماغ .

**١٦٠٣٦ - صَال**  
 الصال : الحمار الرشي الحاد الصوت ، ج. صالة .

**١٦٠٣٧ - صَامِع ، لَتِي**  
**Gommeux (F). Gummous (E).**  
 ما كان معني المادة او ما كانت تملو مادة صمغية .

**١٦٠٣٨ - صَامِل ، صَمِيل**  
**Sec, Desséché (F). Dry, Withered (E).**

**١٦٠٣٩ - صَامُور**  
 هو الشهبان ، نبات شاكك من النبقيات ، اطلبه .

**١٦٠٤٠ - صَالِرَة**  
 هي الئن ، اطلبه .

**١٦٠٤١ - صَبَا**  
**Vent de l'Est (F). Easterly wind (E).**  
 هي الريح الشرقية مهبها من مطلع الثريا الى نبات نش .  
 يقابلها اللبور .

**١٦٠٤٢ - صَبَّار**  
 هو التمر المحتدي ، اطلبه .

**١٦٠٤٣ - صَبَّار**  
**Opuntia (S). Raquette, Opone (F).**  
 جنس نباتات لحسية من فصيلة الصباريات . انواعه عديدة  
 معظمها بري وبعضها زراعي وزربية . يتميز بسقوه  
 وفروه المركبة من عدة الواح متتابة ومتشعبة . بيضيه  
 الشكل ، صمكة التصل ، بحرية اللون تملوها بعض السداثر  
 الشاككة الانطوائية الارتكاز . وهذه الالواح تظهر وتتمو  
 مبطة ، عادمة الصلابة ، غزيرة المادة القروية ثم تتصلب  
 وتشتد بانها مع كر الزين فتجهد وتنصرف نحو الشكل  
 الاسطواني || ازهاره كبيرة القد ، زاهية الالوان المختلفة .  
 ثماره متتابة الاحجام ، شاككة القشور ، نذرة اللب ، كثيفة  
 البثور اللبسية الشكل ، الصغيرة القد ، الشديدة الصلابة  
 والسمرة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

**١٦٠٤٤ - صَبَّار الضَّرُوع**  
 هو الضرمية ، اطلها .

**١٦٠٤٥ - صَبَّار الهِنْدِي \* ، صَبَّار هِنْدِي ، تِين**  
**الهِنْدِي**  
**Opuntia ficus indica (S).**

**Raquette des Indes, Figulier d'Inde, Nojâl (F). Indian fig, Prickly-pear (E). Indischer Felgenkaktus (D). Fico d'India, Fichidindia, Pero pungente (I).**  
 نبات سبروتي شائع الاستعمال . مأكول الثار . غيله يملو  
 من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. الواحه الحولية بيضيه الشكل  
 تطلو من ٣ الى ٤ سم. وتمرض من ٢٠ الى ٢٥ ،  
 تصلها بحري الخضار يسلك نحو ٤ سم. سداثره مبصرة  
 بدون انتظام ، شوكها خفيف مستقد || ازهاره كبيرة القد ،  
 صفراء اللون . ثماره كثار الصير الا انها اقل استدارة  
 وشوكا . لياها سكري العلم مستحب المذاق ، زروها  
 كثيفة التجميع ، سمراء اللون || زراعتها شائعة الاستعمال .  
 الواحه الحولية معلقة تأكلها الابل والابقار ويربون عليها  
 نوع من الكوشيل قزمي الخضاب .



صبار المند



صبار قنطدي



صبار معروف

صغير القند ، جميل الازهار المتتابعة الثلاث المرجانية اللون . لا ينحس سوى كثرة الازوت والرطوبة المستحكة .

١٦٠٦٦ - صَبَّوَيْن هو الفشاغ الحزني ، اطلبه .

١٦٠٦٧ - صَبَّوَيْن \* Saprinus (S). Saprina (F).  
جلس حشرات مقنعة من فصيلة الحسيرييات . انواحه المعروفة نحو ٣٠٠ جميعها صغيرة القند بيشية الشكل طويلا براوح من ٣ الى ٧ م . انواحيها مختلفة الالوان منها الاسود المنقط بالاحمر ومنها الازرق الاخضر المواج ومنها الاخضر الالامس الاسفل المواج || يرقاتها واجهة وقائصة .

١٦٠٦٨ - صَبَّغَاء

نبات قريب الشبه من البام ، ابيض الثمر ، يألف الرمال وتألفه الطيلاء .

١٦٠٦٩ - صَبَّج \* Sepiols (S).

Sépiols (F). Sepiols (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الابليل ثنائيات الحياشيم ، عشاريات الجرامز وقبضية الصبرجيات . انواحه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل مستديرة الاقواب . زعانفها خلفية مستديرة . جرامزها حاشية ، عادمة الهامج ، منها ثمانية متساوية الطول واثنان مستطيلتان || اشهر انواحه الصبوج المبلول (Sopiola vulgaris) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . لحمه مأكول جيد الصنف .

١٦٠٧٠ - صَبَّجِيَّات \* Sepidiidae (S).

Sépidiidae (F). Sepidiidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الابليل ، ثنائيات الحياشيم ، عشاريات الجرامز || اجسامها صغيرة القند جرابية الشكل او اسطوانية . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها الصبوج الذي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اما الاجناس الاخرى فاعطائها بحار المناطق الشمالية .

١٦٠٧١ - صَبَّوَرَة Barillius (S).

جنس اسماك ثورية من الشياطين . انواحه المعروفة ٧ جميعها من اسماك المناطق الحارة وفي منطقة القند او صغيرة . اشهرها صبورة الازدن المعروفة بالاشري وصبورة النيل وصبورة القرات .

١٦٠٧٢ - صَبَّيْب ، تَجَج ، تَجُر Débit (F).

Gauging (E).  
كية الماء المنفعة التي تنصب من هر ونبع وقناة وقطل وغيرها في ثانية أو دقيقة او ساعة .  
١٦٠٧٣ - صَبَّيْدَج هو الحجار ، اطلبه .

١٦٠٧٤ - صَبَّيْر ، هَبَّيْب Cumulus

نوع من النجوم الكثيفة التجميع المعلقة للمراكبة المستديرة الاطراف المتوسطة الارتفاع القزيرة المطر .

١٦٠٧٥ - صَبَّيْر هو الصبار المروث ، اطلبه .

١٦٠٧٦ - صَبَّيْر Figue de Barbarie (F).

Barbary fig (E).  
ثمرة الصبير المأكولة .

١٦٠٧٧ - صَبَّامَة Pétrographie (F).

هي علم الصخور .

١٦٠٥٢ - صَبَّار وَرَقِي هو الفيلوكاكتوس ، اطلبه .

١٦٠٥٣ - صَبَّارَة

اسم شائع الاستعمال يطلق على الصبار والالوة والبصرة .

١٦٠٥٤ - صَبَّارِيَّات Cactaceae (S).

Cactacées (F). Cactaceae (E).

ومنهم من قال شوكلات . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العائلات منخفضة اليبس || اجناسها ١٣ تشمل زهاء ٢٠٠٠ نوع ، مهددا البلاد الحارة ، معظمها امريكي المئتب .

١٦٠٥٥ - صَبَّاغ Colorant (F). Colouring (E).  
كل مادة ملونة تستعمل في التصفيب .

١٦٠٥٦ - صَبَّاب Nutation (F). Nutation (E).

الصَبَّاب ، فلكتاب ، التآيل المملوط في قطب الارض . دورته الكاملة في المدار الشمسي تستغرق نحو ١٨ سنة ٧ اشهر || والصَبَّاب ، نباتيا ، الانحراف الظاهر الذي يطرأ على اوراق بعض النباتات او ازهارها في اوقات معينة من النهار او في ظروف خاصة من الاشعاع .

١٦٠٥٧ - صَبَّاب Proclivité (F). Slope, incline (E).

الصَبَّاب حالة التلي المنحدر او المائل الى الامام .

١٦٠٥٨ - صَبَّاب Troupeau de 20 à 40 bêtes (F).

قطع من الشاء والخر ما بين العشرين الى الاربعين .

١٦٠٥٩ - صَبَّار هو الآلوة ، اطلبه .

١٦٠٦٠ - صَبَّار Diète (F). Diet (E).

هو احتباس الطبيعة بلا علف بعض الوقت في سبيل صحتها . والصبر هو الجهد ، اطلبه .

١٦٠٦١ - صَبَّار لَفْظِي ، لَدَى لَفْظِي ، مَلَّاح Givre (F). Hoar-frost, Rime (E).

طبقة خفيفة من الجليد تتكون في سمس الاجسام الصلبة بتجمد نقطيات ماء الغياب .

١٦٠٦٢ - صَبَّارَة Sabéra (F).

هو الجلمل المختلط ، اطلبه .

١٦٠٦٣ - صَبَّارَة ، كَاكْتُوس Cactus (S). Cactus, Cactier (F). Cactus, Torch thistle (E). Kaktus (D). Cacto (I).

جنس نباتات لحية برية وتربينية من فصيلة الصباريات . انواحه عديدة مهددا البلاد الحارة . معظمها صغير القند ، شائك الصل || تزرع في المراكب والمصارى . مجموعاتها نفيسة غالبا التي تنمو يقوم بها بعض الهواة .

١٦٠٦٤ - صَبَّارَة الْقَرْمُز \* Cactus coccinellifera (S). Cactus à cochenille (F).

Cochineal bearing opuncia (E). Nopal (D). Cacto da cocciniglie, Nopal del giardino (I).

نوع من الصبورة الزراعية الصناعية منبها البلاد الحارة . يزدهنوا ويربون عليها مودة القرمز الصبغية .

١٦٠٦٥ - صَبَّارَة الْمَرْجَان \* Epiphyllum truncatum (S). Epiphyll (F). Christmas cactus, Winter cactus (E). Blattkaktus (D). Epifilio (I).

نوع من الصبورة وهو نبات تربيني ، مركبي ، معمّر ،



صبرة القزوز



صبرة المرجان



صبرين



صَبَّج

١٦٠٧٣ - صحيف Surface de la terre (F).  
هو الاديم ، اطلبه .

١٦٠٧٤ - صحيفه \* Placuna (S).  
Placuna (F). Placuna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة المحاريات . انواعها الماصرة المعروفة خمسة ،  
اصلاها تمتد من شرق الى الغرب الى الهند والصين ||  
اصداها كبيرة لانظامية الشكل ، لاقسيية المصاريع ،  
مصاريعها ثلاثة الاضلاع ، رقيقة الاصداف الشبه شفافة ،  
نزلوية الغشاء الداخلي || اصفاها شائعة الاستعمال الصناعي .

١٦٠٩٥ - صحيفه عقاريه Feuillet foncier (F).  
Landed leaf (E).  
شهادة يجرها امين المكتب العقاري موثقا فيها كل  
ما له علاقة بقمار معين كالساحة والمحدود والمشتلات  
والارتفاق واللين والرين .

١٦٠٩٦ - صحيفتي Lamellée, Lamellaire (F).  
Lamellar, Scaly (E).  
شكل من الزباني ينتهي بفواصل صفيحية رقيقة مستطيلة .

١٦٠٩٧ - صغاد Bombycilla (S).  
Jaseur (F). Waxwing (E).  
جنس طير من فصيلة الصغاديات ورقية الجوانم غروريات  
المناقير . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها متوسطة القد ،  
رمية الجسم . مناقيرها قصيرة غرورية الشكل ، مسننة  
الانفك العليا ، غانسة السفلى . اجنحتها ذلقة . اذنانها  
متوسطة الطول ، مقلوبة . اسرارها قوية . رؤوسها متوتجة  
طرير من الريش الناعم المسترسل الى الوراء . اشهر  
انواعها الصغاد الاروبي والاسيوي والامريكي .

١٦٠٩٨ - صغاد اوروبي \* Bombycilla garrula (S).  
Jaseur d'Europe, J. de Bohême (F). European Waxwing (E).

نوع من الصغاد . موطنه يشمل جميع مناطق اوروبية المعتدلة  
والحرارة وبعض مناطق الشرق الاقصى || جسمه ريع القامة  
يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الريدة الصنابية تبقع عند  
الظهر والجيشن وزهر عند البطن . زوره وبجهته الى السمره  
السوداء . جناحه اسود اللون مجنح بالابيض والاصفر  
والاخر . ذنبه اسود اللون ، اصفر الطرف المقنطوم ||  
وهو من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف  
والشتى . يالفت الفايات والكروم . قوته الحشرات على  
اختلاف انواعها وفصائلها والثمار البائنة ومنها العنب ||  
يدفن عشه في الاشجار الدائسة على ارتفاع قليل لا يتجاوز  
عشرة اقدام من سطح الارض . الاثنى تضع من ٦ الى ٧  
بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوما .

١٦٠٩٩ - صغاديات \* Bombycillidae (S).  
Bombycillidae (F). Bombycillidae (E).

فصيلة طير من الجوانم غروريات المناقير . اجناسها  
وانواعها المعروفة عديدة . موطنها تمتد من البلاد الاسيوية  
الى الاوربية والامريكية || تتميز باجسامها الربعة  
وبطورها المسترسلة الى الوراء وبنقايعها الغرورية المسننة  
الانفك العليا || اشهر اجناسها الصغاد .

١٦٠٧٨ - صنع هو حار الرشح ، اطلبه .

١٦٠٧٩ - صتمة Roche dure (F). Tough rock (E).  
الصتمة والصنينة هي الصخرة الصلبة .

١٦٠٨٠ - صمغ Sueur (F). Sweat (E).  
هو عرق الجسم وفي التخصص عرق الخيل وقيل حياها .

١٦٠٨١ - صمغ Santé (F). Health (E).  
حالة الجسم السليم من المرض .

١٦٠٨٢ - صمغ العقد Validité (F). Validity (E).  
هي ان لا يكون مشوبا بسبب من اسباب البطلان .

١٦٠٨٣ - صمغ Désert (F). Desert, Waste (E).  
سهول تراسية الاطراف شاسعة المدى تتميز بجفاف مناخها  
وبالندام الحية النباتية والحيوانية فيها الا في بعض الواحات  
والاوادي حيث تنضج وتقبل بعض العيون .

١٦٠٨٤ - صمغوكي Désertique (F).  
Pertaining to (E).  
لغت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالصمغ  
كفوكي ثوب صمغوي ومناطق صمغوية .

١٦٠٨٥ - صمغ \* طحلب المتاع Spaghnum (S). Sphagnum (F). Bog moss, Gold heath  
Tarfmoos (D). Sphagno, Muschio di palude (I).

جنس طحالب من فصيلة الصمغيات تعيش في المناطق  
والماء الرائدة الصافية . انواعها قليلة العدد . سوقها نجيلية  
تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . فروصها دقيقة منبسطة رباعية  
متعابلة الانتشاب تكسوها اوراق حشوية مدبة مرصوفة .

١٦٠٨٦ - صمغيات \* سفانيات Sphagnaceae (S). Sphagnaceae (F).  
F. Sphagnaceae (E).  
فصيلة نباتية من الطحالب اجناسها وانواعها قليلة العدد  
جميعها اعشاب ممرمة متغذية تكثر في التراب وتمده باعضائها  
المنسلخة .

١٦٠٨٧ - صمغاه الصمغاه بقلة (السان) .

١٦٠٨٨ - صمغ Jaune terne (F).

١٦٠٨٩ - صمغيات Leptotrichae (S).  
Leptotrichae (F). Leptotrichae (E).  
فصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الاسطواني المستطيل .  
خلاياها مغلقة ، وسيدة الانحاء ، عمودية الانقسام .  
اجناسها وانواعها عديدة لكن علاقتها بالاقتصاد الزراعي  
لا تتجاوز بعض الامرار التابعة .

١٦٠٩٠ - صمغ Sole  
هي الصمغية القرنية الباطنية السفلى من الحافرة عند الخيل  
والبغال والحدير .

١٦٠٩١ - صمغ الحرققة Cavité coxale (F).  
Coxal cavity (E).  
هو موضع اتصال المرققة بالجوز .

١٦٠٩٢ - صمغ صمغ ، صمغ Tympan (F). Tympanum, Ear-drum (E).

تجويف الاذن حيث نصب ووتر الغشاء الطمان المعروف  
بالغشاء الطبل .



صمغ



صمغ



صغاد اوروبي

## ١٦١٠٠ - صَخْرَة ٥

Lithogénésie (F).

Lithogenesy (E).

الصخرة علم يبحث في الملل والموجبات التي هيئت على تكوين الصخور .

## ١٦١٠١ - صَخْرَة : الصوت : صوت الحمام والصد

Roche (F). Rock (E).

كلية خضراء وحيدة اللون من الحجر . والصخر في العرف العامي يطلق على كل مادة صلبة تدخل في تكوين التلاصق الأرضي . إما في العرف الجيولوجي أي الحفلي الذي لا يتميز الصلابة شرطا لازما ، فالصخر يطلق على المرو والحجر الجص والزليل والصلصالي || وقد تقسم الصخور حسبها ونسبة إلى تكوينها الطبيعي إلى ثلاثة أقسام : (١) الصخور النارية وهي الأصلية أو المتبلورة التي تكونت من مواد معدنية منصهرة تصلبت بالبرودة كالنفس (الزلت) .

(٢) الصخور الرسوبية وهي الثانوية التي نتجت عن تراكم وتماسك فائت وذرات الصخور الأصلية مع مختلف المواد الحيوانية والنباتية كالحجارة الجصية .

(٣) الصخور المتحولة وهي التي كانت في أول أمرها إما نارية أو رسوبية ثم تحولت بتأثير عوامل طبيعية خاصة إلى حالة نيزية جديدة كالرخام .

## ١٦١٠٢ - صَخْرَة ، صَفَاة

Rocher (F).

Steep, Crag (E).

كتلة من الصخر . ج صخر وصخور وصفوات .

## ١٦١٠٤ - صَخْرَة

Pétreux (F).

Stonelike, Petrosal (E).

نمت ترعني يطلق على ما هو من الصخور أو يشبهها .

## ١٦١٠٥ - صَخْرَات

Empetraceae (S).

Empetraceae (F). Empetraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملقحين، أجناسها ثلاثة وأنواعها خمسة . نباتاتها جنبات وأشباب معمرة . تنبت بين الصخور وفي الأماكن القاحلة .

## ١٦١٠٦ - صَخْرَة ٥ ، صَخْرَة ، عَنَب الغُرَاب

Empetrum nigrum (S). Empêtre, Camarine, Camarine (F). Crowberry, Black-berried heath (E). Echte krahenebeere, Ranchebeere (D). Empetro, Erica bacifera nera (I).

بجلة برية طيبة معمرة وحيدة الجنس والزوج من فصيلة الصخرات ، منبها جبال البلاد الممتدة المنحرفة نحو البرد . ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم . أوراقها أبيضه ، غنية ، صغيرة القعد ، خفيفة النصل || أزهارها حمر اللون . ثمارها مأكولة نورية الشكل ، عابقة السواد ، حازمة الطعم ، مفاداة لداء الحفر ، تدر البول وتفتح في علاج بعض الحميات .

## ١٦١٠٧ - صَخْرَة

Brûler (soleil) (F).

Roches-mères (F).

١٦١٠٨ - صَخْرَة أم

Basic-rocks (E).

هي الصخور الأساسية الأولى .

## ١٦١٠٩ - صَدَأ

Rouille (F). Rust (E).

مادة ميكروية القرات جوزية اللون سمر الموالج تتكون على سطح الحديد من جراء تعرضه لرطوبة الهواء حيث يتعد الأكسجين والماء مع الحديد .

## ١٦١١٠ - صَدَأ ، صَدَأ

هو شقران الزرع من الفطور الجهرية الشقرانية التي تتركب الزروع .

## ١٦١١١ - صَدَأ

Chant des oileaux, Gazouillement (F). Chirping, Warbling, Twittering (E).

صوت الطائر . صلح الطائر : صلح وفرد وزرقق .

## ١٦١١٢ - صَدَأ حَات

Bec-fins (F). Warblers (E).

وتدعى الطيور الصداحة . طيور مفيدة من الجوارم وفصيلة الدغليات .

## ١٦١١٣ - صَدَأ حَة الغَاب

Lusciniole à moustaches (F).

طائر من الجوارج يدعى نداءه ، الطلها .

## ١٦١١٤ - صَدَأ

Tokal

هو الوزفة ، الطلها . ج صدائه .

## ١٦١١٥ - صَدَأ حَة

Prolétariat (F).

Proletariate, Proletarianism (E).

حالة الذين لا يستطيعون الاثرانق إلا بواسطة علمهم .

## ١٦١١٦ - صَدَح

« شجرة ثمرتها أشد حرة من العنب » . (اللسان) .

## ١٦١١٧ - صَدَر ، جَوْش ، جَوْشَن

Poirtrine, Thorax (F). Chest, Thorax (E).

جزء من الهيكل العظمي يحضن القلب والرئتان يقع بين العنق وعضل الصدر . وهو قفص عظمي غوريبي الشكل يتكون من عدة خلوع مقوسة ملتصقة الأطراف .

## ١٦١١٨ - صَدُر

الصدر نجم ثير من كوكبة الدجاجة .

## ١٦١١٩ - صَدْرَاس ٥

Céphalothorax (F).

Cephalothorax (E).

الصدراش التام الصدر بالرأس في جزء واحد كما هي الحال عند بعض الدويبات كالنشاب .

## ١٦١٢٠ - صَدْرِي

نمت وصني يطلق على كل ما له صلة بصدر الحيوان .

## ١٦١٢١ - صَدْع

Faille (F). Fautes (E).

## ١٦١٢٢ - صَدْع

Tempe (F). Temple (E).

ما هو من الرأس ما بين العينين ولاذن وهما صدغان .

## ١٦١٢٣ - صَدَف ، صَدَف

Coquillage, Mollusque testacé (F). Shell-fish, Testaceous mollusc (E).

حيوانات في البحر من القشريات الحشرية . ج أصداف وأصداف .

## ١٦١٢٤ - صَدَقَة ٥

Conque, Coquille (F).

Conch, Shell (E).

ج صدغان . غطاء عضوي ثلاثي الطبقات صلب المادة يلفظ أجسام بعض الرخويات . مادته مركبة من كربونات الكلسيوم ، أما طبقاته الثلاث تنصرف بالخاصية المزغرة



صخرية



صدقة

الجزر فيضيه ويؤذي || مظهره الخارجي يشو بصغيرة مستديرة متتامة متراصة حلالية التجميع تقريبا اللون ثم تنحرف نحو الجلوة تركب السوق والاوراق والماليق الزهرية || يكافح بتطهير التربة وتجديد البذار وباجتناب تكرار الزراعة في الموقع نفسه .

#### ١٦١٣٥ - صَدَفِيَّة الجِيرَانِيوم \*

*Uromyces geranii* (S). Rouille du géranium (F). فطر مجهرى يصيب اوراق الجيرانيوم فيضها. مظهره الخارجي يقع صغيرة قليلة الاستدارة والكثافة تركب الاوراق، لها الى الشفرة المائقة يملوها موانج احمر يشو الاوراق بتفجير بشره نصلها ثم يقودها الى الذبول. يكافح بانتزاع الشتل الموصوة وتطهير التربة بالكلس والكبريت بمعدل ١ الى ٢ .

#### ١٦١٣٦ - صَدَفِيَّة الحِمَص \*

*Uromyces rumicis* (S). Rouille des rumex (F). فطر مجهرى يصيب اوراق الحامض فيضها ويجعلها غير صالحة للاستعمال || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة تبدو حنطية اللون ثم تنحرف نحو الكستاني تركب ذسل الاوراق على صفحتها || اضراره قائمة على مدى انتشاره لان الاوراق الموصوة لا قيمة لها || يكافح حين ظهوره بسائل بودور الحلو ١ % .

#### ١٦١٣٧ - صَدَفِيَّة الحِمَص \*

*Uromyces pisi, Aecidium euphorbiae* (S). Rouille du pois (F). فطر مجهرى يصيب الحمص والقريرين || مظهره الخارجي على الحمص يقع صغيرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحته السفلى. تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو الخيطي فالاحمر ويوقع منها اذ ذاك رائحة كريهة يبعثها انفجار البشرة ذبول النسيج والنصل وسقوط الاوراق. وهو على القريرين يقع صغيرة ميمرة بدون انتظام تركب الاثنان قسب فيها الازهار والشملة مع قصر الاوراق وبماكة النصل. وهو على الاوراق اوضح شكلا واكثر توشيحاً، يركب النصل على صفحته وقد يفضل العليا. يوقع منه عند كمال دورته الحياتية، اي عند تفجير الجيوب البقية، رائحة حنطية مستحبة لا تتحمل الحمص وان حصرت فسدت وانقلبت الى كرية || يكافح بالكلس التربة وبسمدها مع الاكثار من عنصر الازوت.

#### ١٦١٣٨ - صَدَفِيَّة الدَكْسِيل \*

*Uromyces dactylidis* (S). Rouille du dactyle (F). فطر مجهرى يصيب جميع انواع وضروب الدكيل فيؤذي الاوراق ويحيها || مظهره الخارجي يشو صغيرة مستديرة لونها الى للفة ميمرة بدون انتظام او مرصوفة بتتابع وتناسق تركب فصل الاوراق قسب يبيها بعد احملا غصيب. يكافح بالقتلح النباتات الموصوة وتطهير التربة قبل اعادة بلزها أو غرسها .

#### ١٦١٣٩ - صَدَفِيَّة الشَّوْندَر \*

*Uromyces betae, Aecidium betae* (S). Rouille de la betterave (F). فطر مجهرى فيض الشيع يركب اوراق الشوندر فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة تحمل بالاوراق السفلى وتنتشر على صفحة النصل السفلى ميمرة بدون انتظام. لونها الى الجلوة || اضراره قليلة لانها محصورة بتفجير ذبول الاوراق السفلى التي تضال نشاطها الحيوي .

والنصل الاساسية ثم الداخلية الصدفية البراقة المساء . والصدفات على نوعين : الصدفات ذات المصراعين كما في الخار يعني يفضية الشكل، مربوطة المصراعين، رباطها غشروي التكون يلفل صفرا مائلا يضي القلباء وظيفته افراز المادة الصدفية || والنوع الثاني يشمل الصدفات الحلقونية التي تتميز بخطوطها واخاذيدها المتنازلة المعروفة بخطوط واخاذيد النمو .

#### ١٦١٣٥ - صَدَفِيّ

*Ostracé (F). Oysterous (E).* نعت تعريفي يطلق على ما هو صدفى التركيب او الشكل .

#### ١٦١٣٦ - صَدَفِيّ الجِلْد

*Ostracoderme (F).* نعت تعريفي يطلق على كل حيوان جلده صدفى المادة .

#### ١٦١٣٧ - صَدَفِيَّات

*Ostracodes* رتبة من القشريات الخريات الصف .

#### ١٦١٣٨ - صَدَفِيَّات الجِلْد

*Ostracodermes (F).* فئة من الاسماك المتحجرة ظهرت في الحقبة السيلورية وانقرضت في الحقبة الكربونية .

#### ١٦١٣٩ - صَدَفِيَّة

*Impénétrabilité (F). Impenetrability (E).* عدم قابلية التداخل .

#### ١٦١٤٠ - صَدُوع، شَقُوق، كَلَع

*Crevasses (F). Chaps (E).* حواضر وشوالب تحصل في جلد اسراغ الدواب والطير وفي لحاء سواق النبات قسب انصداعها وتشققها .

#### ١٦١٤١ - صَدَفِيَّة

*Uromyces* جنس فطور مجهرية من فصيلة السحابيات يتميز ببعاماته الوحيدة الحالية || انواعه عديدة تركب النباتات المختلفة المائلة الى القرينات والقرنليات والتيجليات والسرديات والزنبقيات والبسبابيات والسلديات .

#### ١٦١٣٧ - صَدَفِيَّة الإِسْخِيل \*

*Uromyces scillarum* (S). Rouille des scilles (F). فطر مجهرى يصيب بعض نباتات الفصيلة الزنبقية اعصا الاشقل والحصل || مظهره الخارجي طلع قذبة لا قياسية الشكل والحجم، تملو الاوراق والانفساط الخارجية. تبدو حنطية ثم تنحرف نحو الجلوة وتنتهي بالسمرة عند انفجار بشره النسيج || يكافح بتطهير التربة بالكبريت والكلس او الفرمول بعد اقتلاع وحرق النباتات الموصوة .

#### ١٦١٣٣ - صَدَفِيَّة الثَّوْم \*

*Uromyces ambigus* (S). Rouille de l'ail (F). فطر مجهرى يصيب الثوم باروافة وزياده الزهري. مظهره الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم، تركب الاوراق فتلوها بعد ان تقضي على الحفصيص فيصير النصل عادم اللون || وهو على الزناد يقع قرنية كستنائية يحيطها اطار، تقلص غصيبه، لونه كالتين . يتحسن اجتناب تكرار الزراعة في ذات المكان الموبوء .

#### ١٦١٣٤ - صَدَفِيَّة الحَمَز \*

*Uromyces lineolatus, U. scirpi* (S). Rouille de la carotte (F). فطر مجهرى يصيب بعض نباتات الفصيلة الحميمية اعصاها



صدفية الاشقل



صدفية الثوم



صدفية الجزر



صدفية الجيرانيوم



صدفية الحامض



صدفية الحمص



صدفية الشوندر



صدئية الموز

١٦١٤٥ - صدئية الموز \* *Uromyces musae* (S).  
Rouille du bananier (F).  
فطر مجهري يصيب الموز في أوراقه || مظهره الخارجي  
يشور عسية الشكل والحجم، تركب النصل على صفحته  
السفل. تبدو حطية اللون ثم تتحول نحو الجؤالة السوداء.  
أخضره زرة لا تستوجب الحفاطة.

## ١٦١٤٦ - صدئية التفل

*Uromyces trifolii*, *Aecidium trifolii-repentis* (S).  
Rouille des trèfles (F).  
فطر مجهري يركب جميع أنواع التفل الزراعي والبري.  
مظهره الخارجي بقع صغيرة قليلة مبعثرة على صفحة النصل  
العليا. تبدو صفراء اللون ثم تتحول نحو البني الكستنائي.  
وهو وسم لا يستوجب الحفاطة لانه ينشط النبات على  
التنو وازدياد المحصول الورقي ولكنه يذني نسبة الكربتون  
نحو ٢٠٪ مما يؤدي الى انخفاض عيق الفيتامين A١.



صدئية التفل

١٦١٤٧ - صدئية  
الصدي كوكب مرتقي سيار اكتشفه «فروغن» عام  
١٨٦٠.



صدئية القرينات

١٦١٤٨ - صدئية  
هو الصوت الناتج من انكماش صوت اصلي على سطح  
عاكس.



صدئية الورد

١٦١٤٩ - صدئية  
جاء في تحديدها: سمكة طويلة سواد (السان).

١٦١٥٠ - صدئية \* أم السهر، أم قورق  
*Athene noctua*, *Carine noctua* (S). *Chevêche*, *Che-*  
*vêche commune* (F). *Little owl* (E).

طائر من البوم وعمره الفداديات. روج اللجة صفراء.  
طوله نحو ٢٣ سم. منسره قوي الانعقاد، حاد البعرة.  
سقطاه وذنيه قصيرة مستديرة. أرساغه كاسية || نحاله  
مدينة حادة، ثوبه الى الريدة المنشدة الا بعد || موطه  
فسيح الاجزاء يسم جميع البلاد الممتدة الحارة. يأنف  
الاجراخ ويلش في صنوع الاجتار الصوانية وفي الحرايب  
والاطلال. اثناء قنصه نحو ه يضاغ تحضنها ١٦  
الى ١٨ يومًا || وهو من الرواس يلمس قوته من  
الغروب الى الفجر، يصيد الحرد والقار والزاب والجلان  
والجراد.



صدئية الموز

١٦١٥١ - صدئية  
هو قيق الفروح والجبب السارة الى الاعحال المعوي.



صدئية النفل

١٦١٥٢ - صدئية  
حليب وضع فبر فمكة النوية وهي القشرة الرقيقة على  
وجهه.

١٦١٥٣ - صدئية، قليح \*  
تمت حال توصف به الاشياء المغلفة او القابلة للانصاع  
والنفل من تأثير فعل الصقيع فيها.

١٦١٥٤ - صدئية \*  
جنس حيوانات بحرية من الغرغوات مبديات الاربل  
امانيات الحياض الجبلية وقبيلة الصدئيات. انواعها



صدئي

يكتنح بقطع ولطر الاوراق المصابة وباجنبان اخذ  
البلار من الامهات الموصية.

١٦١٤٠ - صدئية الفسق  
وسم فطري يحترق الفسق (اطلب ايرويس).

## ١٦١٤١ - صدئية الفول

*Uromyces fabae*, *Aecidium album* (S). Rouille de  
la fève (F).  
فطر مجهري يصيب عدة نباتات من الفصيلة القرنية،  
اخصها الفول وسبا البقية والجلبان والبلصة والكرسة.  
مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مبعثرة على صفحة  
النصل السفلي تبدو صفراء اللون ثم تتحول نحو الشفرة  
السراء، وقد يصيب السوق والماليق بذات المراض.  
يكتنح عند ظهورها اما باسعمال سائل بورود المحلول ١٪  
او غيره من الفوطيل الفعالة اللاكوية.

## ١٦١٤٢ - صدئية القزقش

*Uromyces caryophyllinus* (S). Rouille de l'œillet (F).  
فطر مجهري يصيب القزقش في جميع فصل السنة فيملط  
الاوراق ويؤخر التنو ويؤذي الانزهار والازهار.  
مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضة الشكل بنية اللون  
تركب نصل الاوراق على صفحتها العليا تقسيب تعجير  
بشرة النسيج وتقرعل الدورة التنسية ان لم تحول دون انجازها  
وسرها الطبيعي.  
يكتنح اولاً: باجنبان ريش الماء على الاوراق لان الماء  
يلقي نشاط الفطر ويسبب انتشار الوسم.  
ثانياً: بتأخر سرق الاوراق الدالة والياينة مس  
التحلل الفلورية.  
ثالثاً: بنسج النباتات المصابة بسائل بورود المحلول  
١٪ او بحلول برسمات البواس او غيره من املاح النحاس.

## ١٦١٤٣ - صدئية القرنيات

*Uromyces anthyllidis* (S). Rouille des légumi-  
neuses (F).  
فطر مجهري يصيب بعض النباتات القرنية سبا القورقة  
والترمس والقصة والخندقوق والحلبة واللؤلؤس والامروس.  
مظهره الخارجي بقع مستديرة صغيرة تركب نصل الاوراق  
على صفحتها العليا تبدو مبعثرة بدون انتظام، لونها  
الى الشبهه ثم يتحول تدريجياً نحو الكستنائي || اغمره  
زديدة. يكثر ويبدو في بلاد حوض البحر المتوسط وفي  
اروبة الشرقية والشمالية.

## ١٦١٤٤ - صدئية اللوباء

*Uromyces appendiculatus*, *U. phaseoli*, *Aecidium*  
*phaseoli* (S). Rouille du haricot (F).  
فطر مجهري يصيب معظم انواع وضروب اللوباء.  
مظهره الخارجي بقع لا تباينة الشكل والحجم تملو نصل  
الاوراق فتؤخرها برقة لا متجانسة الكثافة تبدو تلبية  
اللون ثم حطية لفسراء، تؤذي الاوراق تقسيب جفافها  
وسقوطها بالاكبر || وهو على القرون بقع قرنية تظلب  
فيها الاسدرة تقضي على الانسجة اللبكية دون ان تصل  
الى الحب || بروفاته بيضيه الشكل طولها يراوح من  
٢٢ الى ٢٥ مي. عرضها من ٢٠ الى ٢٣ مي. || يكتنح  
باسعمال اوكسيكلوربر النحاس تعجيراً على النبات بعد  
العصر عندما تحف وطاة اشعة الشمس.

١٦١٦٥ - صِرَادِي ٥  
Orographique (F).  
Orographical (E).  
نمت تمرني يطلق على ما له علاقة بالصرادة أي وصف الجبال.

١٦١٦٦ - صَرَّار  
Achète (F).  
اسم يطلق على جمع الحشرات الصرارية اخصها الجديد والزيز.

١٦١٦٧ - صَرَّار اللَّيْلِ هو الجديد، الملهب.

١٦١٦٨ - صَرَّارَةٌ  
Circaetus (S).  
Circaète (F). Serpent eagle (E).  
جنس طير من عمارة السقاوات وفصيلة الصقريات .  
أنواعه ١٢ ، موطنها جميع المناطق المعتدلة من العالم القديم .  
اجسامها رشيقة متوسطة القند تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم .  
ويسطها تراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . رؤوسها كبيرة ،  
اعتناقها قصيرة ، مناسرها قوية البهرة اللونية الحادة .  
ارسافها سرسة ، مخالبها دقيقة الاطراف الحادة || اثوابها  
كدراء اللون يملوها نوتش لطيف حايق ، صدورها وبطنها  
افتح وازعي من ظهورها وسوقها || تألف الجبال  
والأحراج ويجاري الماء والادغال والبروج والقباني . قوتها  
الزحافات من العظام الى الاناعي والضفادع والاسماك  
والصائير والحشرات || تدنن اوكارها الى التجار  
والادغال . اناثها تضع من رفنتين الى ثلاث رفنات  
تحضنها بمناوبة الاكور نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعه  
صرارة المتوسط .

١٦١٦٩ - صَرَّارَةُ الْمُتَوَسِّطِ \* ، أَبُو صَوِي  
Circaetus gallicus (S). Circaète Jean-le-Blanc (F).  
Short-toed eagle (E).  
نوع من الصرارة كبيرة الجثة طولها نحو ٧٠ سم . ويسطها  
١٨٠ سم . ثوبها الى الريدة السماء تعلوها نمشة عاقبة .  
زورها وبطنها ونحواتها الى البياض الاخر يملو تهيج  
اسمر . منسرها الى الزرقعة السوداء . عينها الى الصفرة  
اللامعة . رسفاها واصابها بنية اللون ، مخالب سود .  
ومي من الطيور القواطع تجوب البلاد وتروح فوق الماء .  
تألف الجبال والاحراج والمناطق ويجاري الماء . والسهول  
والشواطئ || قوتها الاناعي والعظام والضفادع والاسماك  
والصائير.

١٦١٧٠ - صَرَّارَعِيد ٥  
Sauropodes (F).  
Sauropoda (E).  
الصرارعية رتيبة من الزحافات المنقرضة ، الدناصير ،  
جميع اجناسها وانواعها جبارة ، رباعية القوائم ، عاشة ||  
ظهورها يمدد الى الحقبة الترياسية . وقد بلغت اوج انتشارها  
في الحقبة الجوروية . وانقرضت في الطباشيرية || اشهرها  
الصرعود الجبلي (Atlantosaurs) الذي كان طول  
جسمه لا يقل عن ٤٠ مترًا ، ثم الصرعود الصخري الرأس  
(Brontosaurus) الذي كان طوله من ٢٠ الى ٢٢ مترًا .

١٦١٧١ - صَرَّام ، صَرَّام  
Cueillette (F).  
Gathering (E).  
هو جني الثمر في اوان أدراكه .

١٦١٧٢ - صَرَّان ، حَكْد  
Serranus (S).  
Serran (F). Serranus (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات ورتبة شاكيات

المعروفة قليلة العدد . اعطائها معظم بحار العالم تمثيل على  
صخور المحاجد || اصنافها شبه قيمة الشكل مصنوعة القمعة .  
وصدورها التي تسمح بمرور الماء اللازم للتنفس ، تسمح  
ايضاً بخروج البراز . اجسامها مستطيلة الشكل . رؤوسها  
مقطوعة المقدم . عينها تتمركز عند قواعد الواوس الخروطية ||  
عنايبها مشطية في القسم العلوي . اوديتها فضفاضة  
تتمتد خارج الاصداف . ارجلها وسيدة مستعززة وميكة .

١٦١٥٥ - صَدْبِيَّاتٌ ٥  
Fissurellidae (S).  
Fissurellidés (F). Fissurellidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل  
اماميات الخياشيم الحقيقية . اجناسها وانواعها المعروفة  
عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثانوية والثالثة  
والبعض الآخر من عظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||  
اصنافها وحيدة المصارع بيضية اللون او مستديرة ،  
متعددة الاصداف ، مصنوعة القطن ، يكثر في صدورها  
الشكل المسطيل || اشهر اجناسها المعاصرة الصديعة  
والمرجيتولة .

١٦١٥٦ - صَرَّ  
Empaquetage (F). Packing (E).  
جمع الشيء وشده وتقليله .

١٦١٥٧ - صَرَّ  
Tichodroma (S). Tichodrome (F).  
جنس طير من فصيلة الخفلات . انواعه قليلة تتميز  
بامتطالة المنقار ودقته ، بذلاقة الجوانح ، بقصر الارباع  
وبنحافة ومنسر الخالب الحادة . اثوابه عديدة تختلف مع  
الانواع وفصل السنة . يألف المناطق الصخرية الجبلية .  
ينقر من الانحار . قوته الحشرات والعناكب . ينش عشه  
في صدوع الصخور . اناته تحضن وحدها من ٥ الى ٧  
بيضات نحو اسبوعين وذلك في شهر ايار . اعرف انواعه  
واشهرها صر الصخور .

١٦١٥٨ - صَرَّ الصُّخُورِ \*  
Tichodroma muraria (S). Tichodrome de murailles,  
Echelette (F).  
نوع من الصر . ثوبه متراكب الالوان المنمقة المنضدة  
الجبلية . طوله نحو ١٧ سم . ويسطه ٣٠ || يألف الجبال  
الصخرية الجرداء . يكثر في صرود لبنان مشاء الاديبة  
السيفية والمغناط الصخرية .

١٦١٥٩ - صَرَّاب  
الزعر يندر في الخريف بعد اول مطر .

١٦١٦٠ - صُرَّاح  
Pur (F). Nest (E).  
الحاصل من كل دنس او غش ، يقال خر صرّاح وزيت  
زيتون صرّاح .

١٦١٦١ - صُرَّاح  
الصرّاح طائر يؤكل (يحيط المحيط).

١٦١٦٢ - صُرَّارَعِيَّة  
هي الدجاجة تستعمل لحفظ الحمر .

١٦١٦٣ - صُرَّاد  
صحاب باردة ندي ليس فيه ماء .

١٦١٦٤ - صِرَادَكَة ٥  
Orographie (F).  
Orography (E).  
علم يبحث في وصف الجبال وتجليتها .



صديعة



صرّ الصخور



صرّارة المتوسط



١٦١٧٨ - صُرْب ، صُرْب (F). Lat caillé (F).  
اللبن الرائب إذا اشددت حوته . Curdled milk (E).

١٦١٧٩ - صُرْب (F). Gomme d'acacia, G. rouge (F).  
صمغ القزط والطلع والعرفط يفي حر كأبها سبائك  
تكسر بالمجبارة .

١٦١٨٠ - صُرْبَة هي الثيرة ، اطلها .



صران كاتب

١٦١٨١ - صُرْبِيْت ٥ Sorbita  
مادة غذائية لا طعم لها تراقق السكر لكنها عادمة للقنود  
التحليل . وفي توحيد في معظم الثمار المأكولة ونسبتها تراوح  
من ٥ الى ١٢٠ غرام في الكيلو .

١٦١٨٢ - صِرْجَانَة \* Serjania (S).  
Serjanie (F). Serjanie (E).

جنس جلبات سرعية عارضة من فصيلة السانديات . أنواعها  
المعروفة نحو ١٠٠ معظمها من نبات امريكا الاستوائية  
والبيض الآخر ينبت في جزر المحيط الهادي وميشل والهند ||  
سوقها سرعية . اوراقها متعاقبة ، مركبة ثلاثية التجميع .  
نصلها مسننة الحراشي ، غائرة الفلوق والورق . ازهارها  
ابيض الازرناز ، عفودي التجميع . ثمارها جناحية ،  
ثلاثية التركيب .

١٦١٨٣ - صُرْحَب ٥ Bryum (S).  
Bryon (F). Bryum (E).

جنس طحالب معمرة من فصيلة السرخسيات . أنواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || تعيش  
على الصخور وفي التربة . اكياسها البورية حقبة الشكل  
طرفية الازرناز .



صرجانة

١٦١٨٤ - صُرْحِيَّيَات ٥ Bryaceae (S).  
Bryaceae (F). Bryaceae (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبخيات .

١٦١٨٥ - صُرْد ، صُرْد (F). Cold (grand) (F).  
Cold (extreme) (E).

هو البرد الشديد .  
١٦١٨٦ - صُرْد ، صُرْد (F). To ear (E).  
صد القمح واللحم : طلع سداما .

١٦١٨٧ - صُرْد ، صُرْب Lanius (S).  
Pie-grièche, Piegriche (F). Shrike (E).

ج صردان . جنس طير من الجوارم وفصيلة الصرديات .  
أنواعه ١٨ ، موطنها بلاد الشام القديمة . جميعها يقام  
الثوب . خضرة الرأس . مناقيرها غليظة مسننة الحطام  
المعوية . سواقلها متصلة الطول مجذعة . اذانها رتاجية  
الريش . ارسافها جصيفة الجلد . غنابله حادة || لا ترى  
الا في سفة او شجرة وهي شرسة الطباع ، قلقة شديدة  
التنور . قوتها الحشرات والديدان والافان واليسافير .  
تنش في الانجار الفناء . اناثها تنقع من ٤ الى ٧ بيضات  
تحضنها وحدها نحو اسبوعين .



صرد ارد

١٦١٨٨ - صُرْد أُرْدِي \* ، صُرْد الْبَادِيَة  
Lanius excubitor (S). Pie-grièche grise (grande),  
Boiselleire (F). Great grey shrike (E).

نوع من الصرد الابد الشائع . ينشر من الطيور الفارة .  
طوله يراوح من ٢٣ الى ٢٤ سم . نوبه الى الربة الضللا .

الزناغت . انواعه المعروفة نحو ١٢٠ معظمها من املاك  
بحار المناطق الحارة || اجسامها اعليجية الشكل ، متوسطة  
القد او صغيرة . اوتابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر  
الاجر الطول يعلود تجذيع متفرق لياقسي الانتظام والالوان  
سهبها مبراني الشكل . زناغتها الظهيرة شاذكة في الجزء  
الامامي ، سرعة في الجزء الخلفي || بعضها يدير اغوار  
الانهار ويسير في المياه العذبة || لحوها بين المتوسط  
الصنف والجميدة || اشهر انواعه الصران الكاتب والصران  
المبجج .

١٦١٧٢ - صُرَّان جَبَّار Serran géant (F).  
سمكة بحرية بيوض تدعى لقس جبار ، اطلها .

١٦١٧٤ - صُرَّان كَاتِب \* ، حَدَد مَرَّخَرَف  
Serranus scriba (S). Serran écriture, Serran  
scribe (F). Serranus scriba (E).

نوع من الصران . سمكة بحرية بيوض . اطلها خيلجان  
واضواض واغوار البحر الابيض المتوسط || جسمها  
اعليجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يعطون من ٢٥ الى  
٢٠ سم . نوبها متراكب الالوان يرتكز على الاصفر  
الحطلي . رأسها وظهورها مجعدان بالاسمر . جانبها مشعان  
بالازرق والكتشي . زناغتها مزرقرة بالاجر . رأسها يرمي  
الشكل قصير الخط . شدقاها قليل الرحابة . عينها صيرثان  
زناغتها متباينة الاشكال . الظهيرة مستطيلة ، شاذكة  
النصف الاول ، سرعة النصف الثاني . الشرجية تقابل  
النصف السرح من الظهيرة . الذيلية مقوسة الطرف المنحذوب ||  
لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٥ - صُرَّان مَبْجَج ، حَدَد مَبْجَج  
Serranus hepatus (S). Serran maculé (F).  
Serranus hepatus (E).

سمكة بحرية بيوض من الصران . اطلها اضواض وخيلجان  
البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ، اعليجي  
الشكل ، معتدل التبطيط يعطون من ١٨ الى ٢٢ سم . نوبها  
يرتكز على الاصفر الاخر الحطلي الموج . رأسها وظهورها  
مبججان بالكتشي العابق . جانبها مجعدان وفسلمان بالاجر  
والازرق . زناغتها مضلعة وبقيعية وينتقطة . رأسها غزوي  
الشكل ، ذلق الخط . شدقاها قليل الرحابة . عينها كيرثان ||  
زناغتها متباينة الاشكال كما في الصران الكاتب || لحمها  
متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٦ - صُرَّانِيَّات ٥ Serranidae (S).  
Serranidés (F). Serranidae (E).

فصيلة املاك بحرية من رتبة شاذكات الزناغت . اجسامها  
وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها من املاك بحار المناطق  
الحارة والمعتدلة الحرارة . تتميز بمجودة المعج وبقلة اضعادها  
عن المهاج والمخلجان والاضواض || اجسامها اعليجية  
الشكل ، لاقسيمة الطول الذي يراوح من ١٥ الى ٢٠٠ سم .  
حراشها مبراشية عسنة متأسكة الاطراف ، زناغتها  
الموضعية سداسية الاشمة الرقمية باستثناء شعاع واحد جامد  
ثالث . اسنانها الفكية واخنيكية منتظمة الصفوف المتتابعة ||  
اشهر اجناسها الصران والكتاس والقش والققاب .

١٦١٧٧ - صُرْبَاكَة المخلط اذا اصفر .

## ١٦١٩٧ - صَرَّر

الصرر: الزرع قصبت سوقه واكتسبت سناوله دون حبه .  
الواحدة صررة .

Coq (F). Cock (E).

## ١٦١٩٨ - صَرَصَر

هو الديك ، اطلبه .

Scymnus litchi (S).

## ١٦١٩٩ - صَرَصَرَان

Liche, Gatta (F).

سمكة بحرية وسيدة الجنس والنوع من السفنقات ، تطلو نحو ثلاثة أمتار . جنبها اسطوانية الشكل ، دقيقة المخز ، كبيرة الزعيفة الشرجية . ثوبها الى السمرة الزرقاء المواج يملوها تجذيع اسود . جلدها عادم الفلوس شائع الاستعمال الصناعي . لحمها مأكول .

Cri du milan (F).

## ١٦٢٠٠ - صَرَصَرَة

Cry of the kite (E).

صوت البازي .

## ١٦٢٠١ - صَرَصُور

حشرة ملبولة تعرف ببيلت وردان ، اطلبها . منها امريكية والجرمانية والشرقية .

Epilepsy (F). Epilepsy (E).

## ١٦٢٠٢ - صَرْع

علسة غيبية في الجهاز العصبي تصيب الحيل . تعرف من حصول القيوية والسقوط على الارض والتشنج في الفشل .

Chrysobothris affinis (S). \* صَرْعَانَة

Chrysobothris complice (F). Chrysobothris affinis (E).

حشرة غاصلة ناعمة من فصيلة الزقنويات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاجراج والنايات والحدائق . خنافسها تعيش على اوراق الاشجار . يرقاتها مرقاة تعيش على الاشجار الحمرية تقسردب الساء ولها تعطب الشكير الى السمرة متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها النقر ، خضراء اللون عند الذكر ، صفراء اللون عند الانثى . رأسها مستدل الهرم . عينها كبيرتان ، ناشزتان . زياناها عيطيان ، منشاري التركيب . ظفوها شبه جلوني الشكل ، ذلق المخز ، مقطوع الطرف . غمداه متتابعتا التحيز الخفيف . ارسافها خاسية المقلل الا انثى اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً من واقصر زبائناً من جيلها ثنائي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اوائل آب . تسرح في النهار ويبيت في الليل الى البرقة بعلقة النمو تطلو عند الادراك انتام نحو ٣٠ م . جسمها مستطيل المقدم والرأس ، مستدق المخز . ثوبها الى الطلعة .

Agio, Change (F). صَرْف ، اصْفِرَاف

Agio, Premium, Exchange (E).

الفرق بين سعر النقد الاسمي وسعره المعلن .

## ١٦٢٠٥ - صَرْقَة

الصرقة منزل من منازل القمر الشامية ينزل في الليلة الثانية عشرة . وهو نجم واحد نير تلقاه الزيرة عماط بكواكب صفار طمس . وميت صرقة لانصراف الحر والبرد بطولهما . ومن الحر ان يسمي الصرقة قلب الاسد الى رقيب الصرقة فرح الدلو المقدم .

ظهور هايك المواج الاسمر . يطله الى البياض الاخير . سقطاه الى السمرة الحاككة المبقعة بالابيض التاسع . ذنبه اسود الوسط ، ابيض القاعدة والطرف . . يتقاروه وساقاه سود . يألف الرياض والاحراج القريبة من المروج والمراعي .

## ١٦١٩٩ - صُرَدُ الْجُنُوبِ \*

Lanius meridionalis (S). Pie-grièche méridionale (F).

نوع من الصرد ، موطنه افريقية الشمالية وشمالى المتوسط طوله نحو ٢٥ سم . ظهره احمر اللون . سقطاه الى السمرة . ذنبه ابيض الاطراف ، اسمر الوسط . صدره وبعطه الى البياض الوردى المواج . عيناه مكشفتان بالاسود الى الفات الغاب والمغضاب المذخاة والشواطي الصخرية .

## ١٦١٩٠ - صُرَدُ الْمُتَوَسِّطِ \* دَقَنَاش شَامِي

Lanius senator, L. rufus (S). Pie-grièche rousse (F). Woodchat shrike (E).

نوع من الصرد الجوال يحوي معظم مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٩ سم . ثوبه ابيض اللون يكثر فيه الصبغة . يألف الادغال والحدائق والمروج . قوته المعطاء والورع والضفادع ويختلف الحشرات الى ين في الجنيات الفتاة القليلة الارتفاع عن التربة .

## ١٦١٩١ - صُرَدُ امْعَر \* نُهَس

Lanius collurio (S). Pie-grièche écorcheuse, Pie-grièche grise (F). Red-backed shrike, Butcher bird (E).

نوع من الصرد الجوال يحوي اكثر مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٧ سم . ثوبه امغر اللون يبق عند الظهر ويبيض عند الزور والصدر . عسراه الى السمرة القائمة . سقطاه الى السمرة الطحلاء الخطيئة المواج . ذنبه ابيض الاطراف الى يألف الاحراج ويجاري الماء والحدائق والمراعي . وهو شرس الطبع ، شيق الخلق . قوته الحشرات على اختلافيها والدويبات والصافير .

## ١٦١٩٢ - صُرَدُ وَرْدِي \* دَقَنَاش

Lanius minor (S). Pie-grièche à poitrine rose, Pie-grièche d'Italie (F). Lesser grey shrike (E).

نوع من الصرد الابد ، موطنه يمتد من بلاد فارس الى اطراف اروبى الجنوبية . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الصبغة الطحلاء . رأسه اسود اللون . صدره وردي اللون . سقطاه الى الصبغة الخطيئة المابقة الى يألف الادغال ويجاري الماء ، قوته الحشرات والدويبات .

Terre meuble (F).

## ١٦١٩٣ - صَرْدَاك

الصرداد والبرداد والرسادة هي التربة اللينة .

١٦١٩٤ - صَرْفَح ، صَرْدَحَة

Terre délaissée (F). Abandoned ground (E).

الارض الزراعية المهملة المتروكة لا تبت لها .

١٦١٩٥ - صَرْدَحِي \*

Edaphique (F). Edaphic (E). المنسوب الى الصردح ، اي التربة ، باعتباره عاملاً من عوامل البيئة .

١٦١٩٦ - صُرْدِيَّات

Lanidae (S). Lanidae (F). Lanidae (E).

فصيلة طيور من الجوائم المشرومات المتناثر . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بمناظرها الغليظة ، القوة الجالبة ، المسنة الخفاف العليا ، اجنحتها متصلة اللد الى قوتها ما تقتضيه من حشرات ودويبات وصافير .



صُرَدُ الْجُنُوبِ



صُرَدُ الْمُتَوَسِّطِ



صُرَدُ امْعَر



صُرَدُ وَرْدِي



صُرْدَاك



صَرْعَانَة

روشتا الخلفيان مبقجان بالازرق ويحدهما بالبرتقالي .  
الانثى سمراء اللون ، روشتها الانثى يحمل بقعة غروية  
الشكل مثلها اللون . روشتها الخالي يحمل من نقطتين الى  
ثلاث نقط صفر || ريقته تعيش على ورق الزعرور  
والخوخ البري .



صرمون ابيض

### ١٦٢١٤ - صِرْمُونُ السِنْدِيَان \* Strymon ilicis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم .  
الذكر اصفر قدام الانثى ثوبه الى السمرة الكستنية المواج .  
رواشته مسنجة بالابيض والاحمر . الانثى سوية الثوب  
الاحمر المايق تحمل في طرف كل ريش من روشتها  
الخلفيتين نقطة صهباء اللون || ريقته تعيش على ورق  
السنديان .



صرمون الخوخ

### ١٦٢١٥ - صِرْمُونُ السَطَط \* Strymon acacis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٧ سم .  
الذكر  
حطلي الثوب المحلل الروشن . رواشته زرق للانتشاب  
يلومها تسليح معترض ابيض وتيقع طرفي اصعب . الانثى  
سمراء اللون كستنية المواج || ريقته تظهر من نيسان الى  
ايار تعيش على اوراق السطط .



صرمون الزعرور

### ١٦٢١٦ - صِرْمَوَة \* ، ذَكَب الصَّب Saururus (S).

Saururus (S). Saururus (F). Lizard's tail, Swamp  
lily (E). Molchschnitz (D). Saurura (I).  
جنس نباتات عشبية جذمورية مدادة معمرة من فصيلة  
الصرويات . انواعها عديدة جميعها متغية سبروتية .  
سوقها نخيلة حولية تملو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها  
معققة ، متعاقبة ، تصلها قلبية الشكل ، متواجبة الصغمة ،  
خلي البشرة . ازهارها غشوية ، سفلية التجميع || ازهارها  
يستمر من آب الى تشرين .



صرمون السنديان

### ١٦٢١٧ - صِرْمُولِيَّة زَمَادِيَّة Strymon tache (F).

في الوحة الفراء ، اطليا .  
١٦٢١٨ - صِرْمُونَات Saururaceae (S).  
Saururacées (F). Saururaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . نباتاتها  
عشبية معمرة . ازهارها غشوية . ثمارها جرداء غنطلة  
الاشكال .



صرمون السطط

### ١٦٢١٩ - صِرْمَب هو الصرب ، راجمه .

١٦٢٢٠ - صِرْمَب ، صَبِيح ، عَتِيق ، كَرِيم ، اَصِيل Pur-sang (F). Thoroughbred (E).  
نعت يطلق على كل حيوان اعلى من سلاله صافية النسب  
منتخبة .



صرمون

### ١٦٢٢١ - صِرْمِيد Glacé (F). Ice (E).

هو الجليد ، اطليا .

### ١٦٢٢٢ - صِرْم هو الحصاد ، اطليا .

١٦٢٢٣ - صِرْمِيَّة Palmeria (F). Date-Garden (E).  
الحائش المجتمع من النخل في الرمال .

### ١٦٢٢٤ - صِرْمِيَّة الجدي ، سَلْطَان الجِلَل Loncera (S).

جنس نباتات معمرة برية وتربيتية من فصيلة الهاليات .  
Strymon lyneus (S).  
نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٣ سم .  
الذكر  
اصفر اللون ، حطلي الروشن المستنبة بخط معترض ابيض .

### ١٦٢١٦ - صِرْم ، صِرْمَة Sous-variété, Cultivar (F).

Subvariety, Cultivar (E).  
الصرم ج . اسرام هي افراد من صرم واحد تميزت بصفات  
معينة خاصة مثلها صرم التفاح الساتركن ريش ريد .

### ١٦٢١٧ - صِرْمَة \* Sauromatum (S).

Sauromate (F). Sauromatum (E).  
جنس نباتات عشبية عسقلية معمرة من فصيلة القلقاسيات .  
متنبها بعض مناطق البلاد الحارة الممتدة من الهند والافغان  
الى شط العرب || عسقلها كبيرة الجرم تطول نحو ١٥ سم .  
وتعرض نحو ١٠ سم . ازهارها يستيق الاوراق وله رائحة  
كرمية . شرعافها بطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وهو ضيق  
غشيتا غروية الشكل . اوراقها مستطيلة الممايق الخضر  
التي تطول نحو ٥٠ سم . نصلها قلبية الشكل تطول نحو  
٢٥ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . || تزود لتزين لكنها  
تختفي المواعيد الباردة || اعرف انواعها واشهرها التالية :

### ١٦٢١٨ - صِرْمَة صِرْمَاء المَرْوُوق \* Sauromatum venosum (S).

Sauromate à nervures jaunes (F).  
نبات سبروتي شائع الاستعمال التزييني ضمن البيوت .  
عسقلها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحجابية التي  
تلعب بالتحب .

### ١٦٢١٩ - صِرْمَة مَبْصِجَة \* Sauromatum guttatum (S).

Sauromate tacheté (F).  
نبات سبروتي شائع الاستعمال التزييني ضمن البيوت وفي  
حدائق المناطق الحارة .

### ١٦٢١٠ - صِرْمُون \* Strymon (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة الفلقيات . انواعها عديدة  
منتشرة في معظم اقطار العالم . ذكورها واناثها مختلفة  
الالوان . نكتها كروي الشكل ، ريقاتها صغيرة القد  
منخفضة الرؤوس ، مذبذبة الاطراف . تعيش على النباتات  
الشجرية || اشهر انواعها ما يلي .

### ١٦٢١١ - صِرْمُون اَبْيَس \* Strymon album (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٣٣ سم . ثوبها  
الى السمرة السوداء . رواشن الذكر حطلي اللون يلموا  
تسليح ابيض معترض وتيقع برتقالي طرفي يحده اطراف  
اسود وخضر نقط سم . رواشن الانثى سوية اللون الاحمر  
الداكن || يالفت الجناان والحفاان والقفايات . يسرح  
من سزيان الى تموز || ريقته تعيش على ورق الدردار .

### ١٦٢١٢ - صِرْمُون الخوخ \* Strymon pruni (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٣٤ سم . الذكر  
حطلي الثوب ، رواشته الى الصهبه يلموا تيقع وتشيخ  
وتسليح براوح من الابيض الى الاصفر والاحمر والاسمر .  
الانثى سوية الثوب الكستني المتفاوت الاحرام || ريقته  
تظهر في ايار تركب اوراق الخوخ .

### ١٦٢١٣ - صِرْمُون الزُعرُور \* Strymon lyneus (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٣ سم .  
الذكر  
اصفر اللون ، حطلي الروشن المستنبة بخط معترض ابيض .

الاخير يعلو وتشيخ اصفر. ثمارها صغيرة القند حراء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || عطارة ثمارها مرّة الطعم مسهلة تدخل في عدة مستحضرات طبية معوية .

#### ١٦٢٣١ - صِرْمَة الجدي الزرقاء التّمّر

*Lonicera corulea* (S). Chèvrefeuille à fruits bleus (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتشية فراء. فروعها زياء اللحاء ، يبيض المكاك . ازهارها ثؤالية الانتشاب . تويجها محدوب الانبوب الاكروش . لونها الى البياض الاصفر تملو خلة ذهبية . اوراقها بيضيه ، مقطوعة القاعدة ، زياء مائل الصفرة السفلى . ثمارها حصية القند لونها الى الزرقاء المائقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٦٢٣٢ - صِرْمَة الجدي الشائكة ، يّاسمين

*Lonicera caprifolium* (S). عرّالي  
*Chèvrefeuille des jardins*, C. commun (F).  
جنية معمرة عارشة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء . فروعها عارمة المكاك . اوراقها عابطة بيضيه الشكل ، مقطوعة القاعدة . نصلها مائل البشرة ، اخضر الصفرة العليا ، بجري السفلى . ازهارها كبيرة القند فواحة العرف العطرى . لونها ارجواني الخارج اصفر الداخلى || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٢٣٣ - صِرْمَة الجدي الشائكة

*Lonicera spinosa* (S). Chèvrefeuille épineux (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتشية فراء . فروعها نخيلة متدلية ، مكاكها ابيض اللون . اوراقها خطية مستطيلة مسنة القاعدة . ازهارها ثؤالية الانتشاب ، انبوبية التويج ، ضيقة القنابات الطويلة ، وردية اللون ، ثمارها الى الحمرة الزرقاء المولج يعلوها طيمل اغبر . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٢٣٤ - صِرْمَة الجدي الشرقية

*Lonicera orientalis* (S). Chèvrefeuille d'Orient (F).  
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها منتشية فراء . فروعها منتشية يبيض المكاك . اوراقها صغيرة القند ، نصلها اغبر البشرة على صفحتها . ازهارها وردية اللون يعلوها تويج بنفسجي . ثمارها الى السرة السوداء اللامعة || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

#### ١٦٢٣٥ - صِرْمَة الجدي القتامية

*Lonicera myrtillus* (S). Chèvrefeuille-myrtille (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتشية . مكاك فروعها ابيض اللون . اوراقها اهليجية صغيرة القند . نصلها عاق الحصار خلى الصفحة السفلى . ازهارها ثؤالية الانتشاب ، انبوبية التويج ، جرسية الاطراف ، ضيقة القنابات المستطيلة . لونها الى البياض التبي . ثمارها مزدوجة ، لاصقة ، ثنائية الحدر ، حراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٢٣٦ - صِرْمَة الجدي القضمية

*Lonicera pileata* (S). Chèvrefeuille à cupule (F).  
جنية معمرة صغيرة القند تملو نحو ٦٠ سم. ساقها منتشية فتاء . افنانها زياء اللحاء . اوراقها ابيدة بقية الشكل . ازهارها صغيرة الحجم ، قمية القاعدة يضاء اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

انواع نحو ١٥٠ تتميز بعدم نظاميتها . ساقها منتشية او عارشة . اوراقها متعابطة الارتكاز ، ابيدة او عابطة النصل . ازهارها لا قياسية الاصمام ، رقيقة الشكل ، عطرية الرائحة || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

#### ١٦٢٣٥ - صِرْمَة الجدي الأبيدة

*Lonicera sempervirens* (S). Chèvrefeuille toujours vert, C. de Virginie (F).  
جنية معمرة عارشة تملو ٥ الى ٨ امتار . ساقها منتسقة . فروعها عارمة المكاك . اوراقها ابيدة بيضيه الشكل . نصلها خلى البشرة بجري اللون . ازهارها مثلية التجميع تاجية الارتكاز عطرية الرائحة ، لونها الى الارجواني الاصفر المولج || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

#### ١٦٢٣٦ - صِرْمَة الجدي التّبّة

*Lonicera thibetica* (S). Chèvrefeuille du Thibet (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها منتسبة فراء . مكاك فروعها ابيض اللون . اوراقها صغيرة القند ، نصلها اغبر الصفرة العليا ، احمل السفلى الكثيفة الزغب . ازهارها ثؤالية الانتشاب ، انبوبية التويج ، عطرية الرائحة ، ليكية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٢٣٧ - صِرْمَة الجدي القزقرية

*Lonicera tartarica* (S). Chèvrefeuille de Tartarie, Chamécisier, Camértsier (F).  
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها وارسلها الزينية عديدة ، ساقها فراء . فروعها القتيية سمر المكاك اما احولية فبؤاء . اوراقها صغيرة القند ، قلبية الشكل مقطوعة القاعدة . نصلها عادم الحمل ، اغبر اللون . ازهارها تختلف مع القروب فيها الابيض والوردي والاجر ، كؤوسها خماسية التركيب . ثمارها صفر او حر ، كروية الشكل ، مستطيلة الاذن . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٦٢٣٨ - صِرْمَة الجدي الجبليّة

*Lonicera alpigens* (S). Chèvrefeuille alpestre (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء ، فروعها فائقة يبيض المكاك . اوراقها كبيرة القند اهليجية النصل المذهب . ازهارها جؤوية اللون تويجها مزدوجة الفصوص . ثمارها الى الحمرة القزقرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٦٢٣٩ - صِرْمَة الجدي الحرجية \*

*Lonicera periclymenum* (S). Chèvrefeuille des bois (F).  
جنية معمرة عارشة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء . فروعها عارمة المكاك . اوراقها بيضيه الشكل ، ذلفة الزايم الاخير ، نصلها مائل الصفرة العليا الحضرار ، خلى السفلى المحلاو . ازهارها فواصة العرف الذكي ، لونها الى الصفرة الجبيلة يعلوها مولج ارجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

#### ١٦٢٤٠ - صِرْمَة الجدي الدخليّة

*Lonicera xylosteum* (S). Chèvrefeuille des haies, C. des buissons (F).  
جنية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها منتسبة فروعها فتاء . فروعها جوف ، افنانها سمر المكاك . اوراقها بيضيه مقطوعة القاعدة خلية النصل . ازهارها الى البياض



صِرْمَة الجدي الحرجية

## ١٦٣٣٧ - صِرْمَة الجدي النجيلية

*Loncera syringantha* (S). Chèvrefeuille-Ilas (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها منتصبة فراءه .  
مككاً فرووها ابيض اللون . اوراقها ابلجنية صغرة القد .  
نصلها مائل البشرة جبل الخضار . ازهارها تؤابية الانتشاب ،  
انبوبية التويج ، ضيقة القنابات ، عطرية الرائحة ،  
وردية اللون . ثمارها حصى القد ، حراء اللون ، ثلاثية  
الحفر || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٦٣٣٨ - صِرْمَة الجدي اليابانية

*Loncera japonica* (S). Chèvrefeuille du Japon (F).  
جنية معمرة عارشة تملو نحو عشرة امتار . ساقها متسلقة  
فروها متباعدة ، عادمة المكك . اوراقها ابيدة ، يضيئة  
الشكل ، مدبة الزام الاخضر . نصلها خالي الصفة السفل .  
ازهارها تؤابية التجميع ، كبيرة القد ، عريضة الرائحة ،  
لونها الى البياض الموشح بالاحمر || ازهارها يستمر من  
حزيران الى تشرين .

## ١٦٣٣٩ - صَعَب

*Quelea* (S).  
*Quéléa, Dioch, Travailleur* (F).  
جنس طير من فصيلة التوتليات . انواعه الممرقة ثلاثة  
موطنها افريقية الشرقية من شواطئ بحر القلزم الى ما  
وراء الحبشة . اجسامها صغرة الحجم طولها يراوح من  
١٢ الى ١٥ سم . اوراقها قليلة الاختلاف عن بعضها بكثر  
فيها الاحمر الغامقي . رؤوسها واعناقها واجنحتها سود .  
حثار قوادها واباءرها صفر . مناقيرها سود او حر .  
ايضاها الى السرة الحظلية || قوتها الحبوب والبرور  
والحوام . تدنث في الاندغال . عشائها بحوكة النش ،  
كروية الشكل ، مقلوبة المدخل . اناثها تضع من ٥  
الى ٧ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور نحو اسبوعين .  
ج صماب .

## ١٦٦٤٠ - صَعْبَر ، صَعْبَر

*Berchemia* (S).  
*Bérchemie* (F).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة البنيقيات . انواعه قليلة .  
سوقها عارشة تطول من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها عابلة يضيئة  
الشكل ، مقلوبة القاعدة . نصلها عديد العروق ، بحري  
اللون . ازهارها صغرة القد ، غصراء اللون ، عنقودية  
التجميع ، ثمارها زيتونية الشكل واللقد واللون ، تسود  
عند الادلاك . ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

## ١٦٦٤١ - صَعْتَر

*Frai* (F). Spawning (E).  
سرء السمك قبل ان يخرج من الانظام وهو الذي يحضر  
فصيح من المأكك المقلوبة المثينة المعروفة بالبطرخ  
والجباري || انواعه عديدة تختلف باختلاف مصادره  
وسيم السرة ولونه وطريقة تحضيره .

## ١٦٦٤٢ - صَعْتَر هو السمر ، اطلبه .

## ١٦٦٤٣ - صَعْتَر أَزْهَب \* ، زَيْعَر

*Origanum hirtum* (S). Origan hérissé, Marjolaine  
hérissée (F). Hairy Marjoram (E). Kretischer Dosten  
(D). Origan di Creta (I).  
نبات عشبي بري عطري معمّر من فصيلة الشفويات .  
يكثر في الاراضي الجبلية المصحّة . ساقه فرواه تملو نحو  
٤٠ سم . فروعه دقيقة ، عشوية ، منتصبة ، زغبية اللحاء .  
اوراقه متعقة ، متبايلة ، يضيئة الشكل ، نصلها خالي  
البشرة . كيف الجيوب المطرية ، مسن الحافة ، يطول

نحو ٢ سم . ازهاره وردية اللون . عشكولة التجميع .  
يستخرج من اوراقه وزعمه دهن السمر الشائع الاستعمال .  
١٦٦٤٤ - صَعْتَر البر هو الدغ ، اطلبه .

## ١٦٦٤٥ - صَعْتَر الجبل هو ندغ الجبل ، اطلبه .

## ١٦٦٤٦ - صَعْتَر افر هو الطوريون الكوري ، اطلبه .

## ١٦٦٤٧ - صَعْتَر بَرْي هو سمر البر ، اطلبه .

## ١٦٦٤٨ - صَعْتَر البراي \* ، فُودَنْج

*Origanum vulgare* (S). Origan commun, Marjolaine  
bâtarde, Fausse marjolaine (F). Wild marjoram,  
Organy (E). Echter St. Wilder Marjoran (D).  
Origano, Regamo (I).  
نبات عشبي عطري معمّر من فصيلة الشفويات . ساقه  
فرواه عشوية تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه متعقة ،  
متقابلة ، يضيئة الشكل ، نصلها خالي البشرة ، ميسر  
الجيوب المطرية . ازهاره وردية اللون ، حر القنابات .  
عشكولة الزهري غيمي الشكل || يستخرج من اوراقه  
عطر الصمّر .

١٦٦٤٩ - صَعْدَة . *Tige dressée* (E). Erect stem (E).

هي كل ساق تمكثها اليافها القاسية من الانتصاب دون  
وسيط او تنقيف .

## ١٦٦٥٠ - صُمرُورَة ، عَقيرة ، قُصُورَة

*Boule de scarabée* (F). Ball of beetle (E).  
الصمرورة او المفرة او القمصورة حشريّة من ذيل  
ولتين تصعلنها بعض اناث الخنافس ، اخصها الجمل لترز  
المكن في داخلها .

## ١٦٦٥١ - صَعَف \*

*Ictinia* (S). Ictinie (F).  
جنس طير من عماره الحدأ وفصيلة الصقريات . انواعه  
قليلة جميعها من القواطع الكبيرة الجفّة . اوراقها الى الصهبة  
الرصاصية يطولها موج ازرق . رؤوسها زاهية . سواقها  
واذنانها عابقة . صيرها حر اللون ، سود الاطار والاهداب .  
مناسرها الى السواد الازرق ، ارساغها جؤوية || قوتها  
الغذاء وللدواب والحشرات على اختلافها . تدنث في الاشجار  
الباسقة . اناثها تضع من رقتين الى ثلاث رفات تحضنها  
بمنابرة ذكورها نحو اربعة اسابيع .

## ١٦٦٥٢ - صَعَف

*Rotor*  
نعت ترميني يطلق على القسم المتحرك الدوار من المحركات  
الآلية .

١٦٦٥٣ - صَعَف \* *Oxylophus glandarius* (S).

*Oxylophus-Geal* (F).  
طائر من عماره البوقليات وفصيلة القيقويات . اصلاها  
نسجمة الاربعاء تشمل الشرق الاوسط والجزيرة العربية  
وافريقية الشرقية والشيالة || وهو من الصقور التي يحب  
البلاد في طلب الرزق . جسمه متوسط القد ، يطول نحو  
٤٠ سم . ثوبه متباين اللونان . رأسه الى الوردية . جوشنه  
وزوره وعلاطه عتق الى الصهبة الصفراء . بطنه الى البياض .  
ظهوره الى الوردية الحظلية الموج . ريش قوادمه وسناكه  
واباره وذنبه الى السرة الحظلية باسنتها الاعراف البياض .  
مقاده احر القاعدة ، اسود اللالط . قناتمه الى السرة



صمّر ازغب



صمّر البراي



صَعَف



صَعَف

ظهراتها اربعة تزاويق متقابلة صفراء اللون . رأسها كبير الجرم . عينها كبيرتان جاحظتان . زباناها خطيان دقيقان || ظهراتها فارقة اللون ليلتحف السكة الشرجية . عندها متباعدة التحزير الخفيف . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واطول سرماً منه واقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوغها الادراك الجسموي تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . جسمها حيدى التركيب ، عادم الرواج ، اصفر اللون ، اسمر الرأس والشرج ، مبعثر الهلب القصير الدقيق || طول الاكمام الذي يستمر من ٤٠ الى ٥٠ يوماً ينتقص في آخر نفق تحفره البرقة قرب سطح الجلع او الفسح الذي تقيم فيه .

## ١٦٢٦٠ - صَعْتَبَر

هو الصبر نبات عارش من النبقيات ، اطلبه .

١٦٢٦١ - صَعَوَة ، دَعْوَيْتَة  
Regulus (S). Roitelet (F). Wren, Kinglet (E).

ج صعو . جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه ٦ جميعها من العصافير الصغيرة القد . رؤوسها مطوّقة . مناقيرها دقيقة مستقيمة . اثوابها متباينة الالوان وعلب فيها الازهار والاصفر الزيتوني . اجنحتها متوسطة القد . اذناها مقعرة الريش قصيرة || قوتها الحشرات والحوام . تألف الادغال والارحاج والسباحات . تدنّ في الاجمار الكفء . اناها تبيض مرتين في العام . المرة الاولى في ايار والثانية في تموز . حضنها يستمر نحو اسبوعين تقوم به الانثى دون الذكر .

## ١٦٢٦٢ - صَعَوَة الحَطَب هي الارطلان ، اطلبه .

١٦٢٦٣ - صَعَوَة حَمْرَاء الرأس \*  
Regulus ignicapillus (S). Roitelet à tête rouge (F). Fire crest, Fire crested wren (E).

نوع من الصعوة تألف الادغال والسباحات والحدائق . طولها نحو ١١ سم . رأسها الى الحمرة الصنائية . محسرها الى الصفرة . ثوبها الى الوردية زهو في الصدر والبطن ، يقيق في الظهر ويلولو مواج اخضر زهبي في الجناحين .

١٦٢٦٤ - صَعَوَة قَبْرِيَّة \*  
Regulus cristatus, R. regulus (S). Roitelet huppé (F).

نوع من الصعوة تألف الصنوبر والادغال . طولها نحو ١٠ سم . رأسها يرتقالي الريش المستطيل ، اسود الطوق ، اصفر الحسرين ، ظهرها الى الخضار الزيتوني . جناحها الى السرة البلقاء . صدرها وبطنها الى الوردية المخلدة . تدنّ في الصنوبر والتنوب .

١٦٢٦٥ - صَعَوَة مُجَدَّعَة \*  
Regulus atricapillus (S). Roitelet triple bandeau (F).

نوع من الصعوة طولها نحو ٩ سم . رأسها اسمر اللون اسود الطوق . محسرها مجذعان بالابيض . سائر ثوبها كالصعوة القنبرية . تأم الجبل في اوائل ايار فتقيم حتى ايلول ثم ترسل الى الشواطئ هرباً من البرد .

١٦٢٦٦ - صَعُول \*  
Acrocephale (F). Acrocephalic, Acrocephalous (E).

الصعول من كان رأسه ضيق القمة .

الخضراء || قوته الحشرات والاسرار . انشاء كائى الوقواق لا تخمن البيض بل تقسمه في عشاش غيرها من الطير اعصها عشاش الزاغ . ج صمف .

١٦٢٥٤ - صَعْفَر  
Fral (F). Spawning (E).  
الصعْفَر سره السمك ويدعى صَعْمَتَر ، اطلبه .١٦٢٥٥ - صَعْفَرِيَّات  
Chytridiaceae

فصيلة ظهور مجهرية من مرتبة السريات ورتبة البصليات . اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها من الوجهة الاقتصادية الزراعية : النش والوزم والرمحة .

١٦٢٥٦ - صَعَلَة  
السعلة : نخلة فيها عوج واصول صفها جرداء .١٦٢٥٧ - صَعْلَل \*  
Galerina marginata (S). Galerine marginée (F).

نظر كاعن الصنف لاما كولى من فصيلة الفاريقونيات . اعطاه اقليم الصنوبريات حيث يعيش مجموعات على القشور والاشخاب النخرة . مجموعاته لاقباسية العدد الذي يراوح من ٦ الى ٢٠ بوجه الى البياض الاخير . ساقه معتدلة الطول تنية اللون ، طوقها الى المظلمة . اروسه شبه مبيوابة الشكل ععدة الحاشية ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الى السرة يعلوها مواج اصفر . اطرافه معتدلة الكثافة بنية اللون . رائحته عند المس قريبة الشبه من رائحة الدقيق .

## ١٦٢٥٨ - صَعْلَل اَرْغَب \* ، كليثس اَرْغَب

Clytus pilosus (S). Clytus poltu (F). Clytus pilosus (E).

حشرة خاضعة خاشبة من فصيلة القرنيبات ورتبة مفدمات الاجسمة . تألف الجناث وكروم التين . غنائها تعيش على اوراق الاشجار . يرقاتها تسردب الجلود اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى الصفار الزيتي الاخضر المواج يعلوها في الظهران ست نقط سود . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها خطيان ، دقيقان . فكاهما ذريبان . ظهراتها غراسي الشكل لا يلمتحف السكة الشرجية . عندها كيتفا الخمل والزغب . ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واطول سرماً منه واقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها الكمال الجسموي تطول نحو ٢٢ سم . جسمها حيدى التركيب قليل التفوقس ، عادم الرواج ، حنطى اللون ، اخضر المواج ، اسود الرأس ، مبعثر الهلب الدقيق .

## ١٦٢٥٩ - صَعْلَل اَهْيَت \* ، كليثس اَهْيَت

Clytus arcuatus (S). Clytus étroit (F). Clytus arcuatus (E).

حشرة خاضعة خاشبة من فصيلة القرنيبات ورتبة مفدمات الاجسمة . تألف اراجح الصنوبر والتنوب والشربين . غنائها تعيش على : ازال الشفويات والصيونيات . يرقاتها تسردب الجلود والاصغان اليابسة || جسمها متوسط القد اهيت الشكل يطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى السرة السوداء يعلوها في كوسلها اربع بقع صفر ويعلموها في



صعل



صعول ازغب



صعول اهيت



صعوة حمراء الرأس



صعوة قنبرية



صعوة مجذعة



صُرُور

1٦٢٧٥ - **صَفَنَج** \*  
 Emberiza citrinella (S).  
 Bruant jaune, Verdrière (F). Yellow hammer (E).  
 عصفور من الشراشير . طوله نحو ١٧ سم . نوه الى الصفرة الخضراء المازج . رأسه و عنقه وصدره و بطنه سفري . ظهوره و جناحاه و ذنبه الى الصبغة الصفراء يطولها توشيح خطي . ابطاء مؤنثة بالجزوي . عيناه عسلتان ، متقاربات . ازرقت . رساء الى الصفرة الوردية . الاثنى اصفر قنأ . واقل تزويجاً من الذكر || قوته الحشرات والديدان والحجرب البرية . يألف الادغال والكروم والحدائق والسباحات . يطن شته في الارض او على ارتقاع قليل منها في الادغال الكثيفة || اثناء تحضن من المزيين الى الثلاث مرات في العام تحضنها تراوح من ٤ الى ٥ يبيضات .

1٦٢٧٦ - **صَفَن** \*  
 Classe (F). Class (E).  
 هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم ويقل المائقة . راجع تصنيف .

1٦٢٧٧ - **صَفَاة** \*  
 Polyèdre (F). Polyhedral (E).  
 جرم صلب متعدد الصفحات او الوجوه .

1٦٢٧٨ - **صَفَايَة** \* ، **صَفْرَايَة** ، **صَفْرَة** ، **ثُبُش** \*  
 Oriolus (S). Loriot (F). Oriole (E).  
 جنس طير . من التبشريات الفردوسيات . انواعه ٢٤ جميعها من القواطع ، موطنها العالم . اجناسها ريشة متوسطة القد . طولها يراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم . مناقيرها قوية مستطيلة . اجنحتها ذلقة . اذنانها متوسطة الطول فضفاضة . ارساها جعيفة الجلد قوية . اثنوبها الى الصفرة اللحية الجميلة . ازانها واجنحتها واذنانها سود . عيونها الى الحرة الزاغية . مناقيرها جعيفة ، ارساها ريشية صافية || قوتها الحشرات والثمار . تنف في الاجنار الرقيقة ، اناتها تضع من ٤ الى ٥ يبيضات تحضنها وحدها .



صَفَنَج

1٦٢٨٠ - **صَفَاة** \*  
 Caténation (F).  
 ترتيب سيمي الشكل موحد الاطراف او طليقها يحصل عندما تكون التماس في طور الميوزة .

1٦٢٨١ - **صَفَانِي** \*  
 Epicrane (F). Epicranium (E).  
 غشاء الهجمة وهو في الحشرات الخشن .

1٦٢٨٢ - **صَفَاة** \*  
 Péloémie (F).  
 ثغانة الجلد .

1٦٢٨٣ - **صِفَة** \*  
 Titre (F). Title, Qualification (E).  
 هي الاساس القانوني للحق كقولك مقد بصفة بزع .

1٦٢٨٤ - **صِفَة** \*  
 Qualité (F). Quality, Capacity (E).  
 هي الميزة التي تحدد بالمر الى التدخل في مقد قانوني او قضية ما وذلك بصفته وارثاً او رسمياً . الخ .

1٦٢٨٥ - **صِفَة** \*  
 Caractère (F). Character (E).  
 الصفة جمهاً اوصاف وصفات هي الميزة الجسورية الخاصة .

1٦٢٨٦ - **صِفَة غَالِيَة** ، **صِفَة مُتَكَوِّلَة** \*  
 Caractère dominant (F). Dominant character (E).  
 هي في الدقة الصفة الشوزية التي لا يمكن طسها فتظهر دائماً .



صَفَايَة

1٦٢١٧ - **صُورَة** \*  
 Acrocéphale (F).  
 Acrocephaly (E).  
 تشويه خلقي يحصل للرأس فيبدو ضيق القمة . الصولة لا تتم ضعف القوى المغلية .

1٦٢٦٨ - **صَصِيد** \*  
 الصيد هو وجه الارض الطيبة ويقل هو المرتفع من الارض .

1٦٢٦٩ - **صُغَب** \*  
 Lentes (F). Nits (E).  
 الصب : يصف القلة ونحوها . الواحدة صببة .

1٦٢٧٠ - **صُغَبَانِيَّات** \*  
 Sphaerosidales (F).  
 مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويجات تتميز بكتلتها المجمعة المحصورة ضمن بوفة مغلقة (بكثيفة) || فصلاتها اربع وهي اللاميات والصفنيات والمناتيات والحدكيات .

1٦٢٧١ - **صُغَبِيَة** \*  
 Sphaeropsis  
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفنيات . انواعه عديدة نحو ٢٠٠ منها ردية ومنها طفيلية . بكثيفاتها محصورة المنشأ سطحية الانتشار . فصلاتها خفية او متصلة . جوفها خطي عابق يعلو من ثاني دقيق . شفراتها هندية . بوفاتها يضيئة حنطية او صهباء اللون .

1٦٢٧٢ - **صُغَبَانِيَّات** \*  
 Sphaerioidaceae (F). Sphaerioidaceae (E).  
 فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الصفنيات ورتبة الزويجات تتميز بكتلتها الضخم ، المحصور السق ، التي السمة ، السليم الجبل ، العابق اللون . بوفاتها لا قياسية التركيب والشكل والتجميع . فهي وحيدة الخلية او ثنائياتها ، ورتبة او شعبة الاخوية ، خيطية او قديمة الشكل ، فردية او ردية التجميع ، مستطيلة او متفرعة الزويرة المثلثة || اعرف اجناسها الاقتصادية المؤذية نحو ٣٢ ، نوردها بالتسلسل الابداعي كما جاءت في الموصوفة . استرومه ، اسكوشيا ، اسنجة ، اسنجة ، اكرانية ، بيلنوس ، تريكوستوريه ، درلوقه ، دكرانية ، دندروفومه ، دويورلا ، ديبيلويته ، ديولوسبوره ، ريلوسبوره ، زقار ، سبتوريه ، صحية ، سفرونيه ، ستندارية ، سبتوسبورينه ، دويديه ، صنية ، فوه ، فوموبيس ، كرساه ، كونيوتير يوم ، لزيوستوره ، لصف ، ملق ، مكروفوه ، هندرسوله ، هندرسويه .

1٦٢٧٣ - **صُغُرُور** \*  
 Ptilium (S).  
 Ptilium (F). Ptilium (E).  
 جنس حشرات من فصيلة الصفوريات ورتبة غديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلحها البلاد المتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها شديدة الصغر ، يضيئة الشكل ، تغلب نحو ١ م . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة ، ماحتة . تأكلها وفكوكها ولاسها قياسية . قوتها الاستعمارية مستطيلة ، صوطانية الشكل . كراسها عمدة ، مستعرضة . رواشها مهدبة . احمادها لاحة . قواها نشطة . اثنابها وحيدة اللون منها الافتح والاصهب والاسمر || تعيش في الجفلة والدردي النباتي . قوتها بوز الغليات .

1٦٢٧٤ - **صُغُرُورِيَّات** \*  
 Ptilidae (S).  
 فصيلة حشرات من غديات الاجنحة تدعى ايضاً اصفرليات ، اطلبا .

## ١٦٣٠٢ - صُفْرِيَّة الشَّعِير السُّورِيَّة

Bruant de Syrie (F).

طائر من الشرائير يدعى دُرَّة ربداء ، اطلها .

## ١٦٣٠٣ - صُفْرِيَّة الشَّعِير سَوْدَاء الرّأس

Emberlér à capuchon (F).

طائر من الدُّرّس يدعى دُرَّة سَوْداء الرّأس ، اطلها .

## ١٦٣٠٤ - صُفْرَة

Aubère, Obère (F).

With a white and chestnut coat (E).

من الثَّوَاب الخليل وهو اختلاط شعرات بيض بأخرى

ضاربة إلى حمرة .

## ١٦٣٠٥ - صُفْرَة \* ، سَلَوَى

Crex pratensis (S).

Crex des prés, Râle des genêts, R. terrestre, Roi

des Cailles (F). Corncrake, Landrail (E).

نوع من التُّفْلُق وهو طائر من القُطُوط يشبه السَّابِي وَيَأْتِي

معها في زمن واحد . طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه إلى الصُّبْهَة

السَّوَاد تملأها رُفَّة حنطية عابئة . ظهره أغبر المَواج

المايق . صدره وبطنه إلى البُطْلَة البيضاء ، جناحاه

مُوحَّان بالأحمر الصَّانِي . منقاره جَوْرِي الخُطْم العلوي

يُتْبِي السَّفْلِي || قُوَّة الحشرات والديدان والحُبوب .

يُفْن في التُّرْبَة بين الإغشاب . أثناء قُصْع نحو ٧ يَضُفَات

تُحْضِنها وسدحا ثلاثة أسابيع || يُقال أنه جبان يَفْزَع

من الصُّعُودَة وفي المثل « أجبن من صُفْرَة » وقد قال الشاعر :

« تراه كَالْيَتِّ لَدَى امته

وفي الوُضَى أجبن من صُفْرَة »

## ١٦٣٠٦ - صُفْرِيَّة

الصُّفْرِيَّة ثبات يَنْتِث في أوائل الخريف (السان) .

## ١٦٣٠٧ - صُفْرِيَّات

Chalcididae (S).

Chalcididae (F). Chalcid Wasps (E). Zehrwespen,

Erzwespen (D).

فَصِيلَة حشرات من رُتْبَة غُشَايَات الإجنحة المَحْصُورَة .

اجناسها وأنواعها عديدةٌ جميعها نافعةٌ تتغفل على مختلف

الحشرات الضارة اغصها ذوات الجناسين وحشرغيات الإجنحة .

## ١٦٣٠٨ - صُفْرِيَّة انْتَرُشِيَّات \*

Chalcis stipes (S). Chalcide (F).

حشرة من الصُّفْرِيَّات ، طُولها نحو ٨ م . جسمها أسود

اللون ، ارجلها حر . خصرها أثوبي الشكل مستطيل .

يرقاتها تتغفل على جميع أنواع الخُرُشِيَّات .

## ١٦٣٠٩ - صُفْرِيَّة الدُّود \*

Brachymeria femorata (S). Brachymère (F).

حشرة صغيرة من الصُّفْرِيَّات ، طُولها نحو ٤ م . ثوبها

إلى السَّوَد ، زباناها وقوائمها إلى الصُّفْرَة . رقاتها تتغفل

على مختلف ديدان حشرغيات الإجنحة .

## ١٦٣١٠ - صُفْرِيَّة المُتَوَسِّط \*

Phasgonophora conica (S). Phasgonophore (F).

حشرة من الصُّفْرِيَّات ، طُولها نحو ٨ م . رأسها وسدحها

وعصرها سود ، بطنها أحر . قوائمها الأمامية سود . ارجلها

الحلقية حر . مرزها غليظ مستطيل . رقاتها تتغفل على

عدة حشرات اغصها ذات الجناسين .

## ١٦٢٨٧ - صِفَة مُتَّحِيَّة

Caractère récessif

Recessive character (E).

هي الصفة القادرة الملموسة الممكن أن تُمَد إلى الظهور .

## ١٦٢٨٨ - صُفْرَة ، سَقِيَّة

Hangar (F).

Outhouse, Shed (E).

بناء زراعي مكشوف الجوانب أو بعضها تحفظ فيه

الألات الزراعية والفلوات فيقها من الشمس والمطر .

## ١٦٢٨٩ - صَفَد

هو الصدف من حيوانات البحر ، اطله .

## ١٦٢٩٠ - صَفَدِي

Testacé (F). Testaceous (E).

نعت تعريفي توصف به الاغشية الكلسية المادة التي تلحف

الاصداف البحرية .

## ١٦٢٩١ - صُفْر

Zéro (F). Zero, Naught (E).

علامة عديدة تعبر عن انعدام القيمة . والصفر عند وجوده

عن يمين عدد دل على ضربه بمشرة .

## ١٦٢٩٢ - صُفْر ، أَسْكِرِيْد ، أَسْكِرِيْس

Ascaride, Ascaris (F).

جنس ديدان مَظْلِيَّة من رُتْبَة السَّلَكِيَّات . انواعه عديدة

جميعها من الديدان الخيطية المعوية المؤذية . يقضى عليها

بإستعمال بعض المسملات النباتية اغصها البِجْرَتان .

## ١٦٢٩٣ - صُفْر الخَيْل \*

Ascaris megalocephale (S). Ascaride mégalocephale,

A. du cheval (F). Thread-worms horse (E).

نوع من الصُفْر يصيب الخيل والجدير والبقال . يعيش

في الفُصْع وقد يسبب أَرْجَاعًا يَضم الحيوان .

## ١٦٢٩٤ - صُفْر الكلاب

Ascaris mystax (S).

Ascaride mystax, A. du chien (F). Thread-worms

dog (E).

يصيب الكلاب والسانير يعيش في المني الدقيق .

## ١٦٢٩٥ - صُفْرَاة

« الصُفْرَاة من نبات السهل والربل وقد تنبت بالجله » .

قال أبو حنيفة : « الصُفْرَاة ثيت من العشب تسعل على

الأرض وكان ورقها ورق الخس ، تأكلها الأبل الأسا

شديداً » . (السان)

## ١٦٢٩٦ - صُفْرَاة

Bile

عصارَة تفرزها الكبد تتميز بلونها الأصفر الداكن

وشدة مرارتها . وهي قلوية التفاعل تحوي بعض الايلاح

المضوية والمعدنية والمواد الملونة || وظائفها الجسدية

عديدة اهمها : تنشيط عمل البنكرياس وبث حركات

الامعاء اليلينية وترسيب المواد المهضومة إلى أن يتم

انهاضها مع قوائمها من الاغيار والمُغْن .

## ١٦٢٩٧ - صُفْرَاة العُرُوق

هي الكسنثوزيا ، اطلها .

## ١٦٢٩٨ - صُفْرَاة الثُّرُوق

هي الكسنثوزيا ، اطلها .

## ١٦٢٩٩ - صُفْرَتَان

هو الزفران ، اطله .

## ١٦٣٠٠ - صُفْرِيَّة ، صُفْرَة

هي الصفارية ، اطلها .

## ١٦٣٠١ - صُفْرِيَّة الشَّعِير

Verdière (F).

طائر من الشرائير يدعى صُفْرَة ، اطله .



صُفْر الخيل



صُفْر



صُفْرِيَّة الخُرُشِيَّات



صُفْرِيَّة الدُّود



صُفْرِيَّة المُتَوَسِّط





صَفَاف ابيض



صَفَاف ارجواني



صَفَاف اريد



صَفَاف السلاين



صَفَاف الماعز



صَفَاف فاجر

الاطراف . اسديتها ثنائية . ثمارها زياه القشور مستدة  
الامن الشديدة القصر || يعيش على الماء . زراعتها منتشرة  
في جميع الاصقاع . قصبانها لينة صناعية شائعة الاستعمال .

١٦٣١٧ - **صَفَاف الماعز \***  
Salix caprea (S).  
Saule des chèvres, S. Marsault, Boursade (F).  
Goat willow, Sallow (E). Salweide (D). Salico caprea, Caprareccio (I).  
شجرة سرىوية متوسطة القد ، تملو نحو عشرة امتار .  
قصبانها واثنائها هدية اللحاء . اوراقها منقطة ، بيضية ،  
صغيرة اللقد تطلو نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ . نصلها  
خشن للملحس ، ازغب الصفعة اللؤل . حراشف شبارقها  
سود . اسديتها ثنائية || يعيش في جميع الارضية والمواقع  
الرطبة . اغشاهها صناعية . لحاء سوقه تصلح للديانة .

### ١٦٣١٨ - صَفَاف قَلْبِي الْقَلَم

Salix acutifolia (S). Saule à feuilles aiguës (F).  
شجرة متوسطة القد ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . فروصها  
نخلة منبسطة خلية اللحاء . اوراقها خفيفة ، نصلها يطول  
نحو ١٢ سم . ويعرض نحو ٢ . حراشف شبارقها لاسفة  
خلية . اسديتها ازهارها ثنائية التجميع || يعيش في الودن ،  
يزرع في الكشبان لتثبيت رمالها المتحركة .

### ١٦٣١٩ - صَفَاف قَاصِر \*

Salix magnifica (S).  
Saule magnifique (F).  
جنبة سرىوية جميلة الشكل ، تملو نحو ٢٥ م .  
قصبانها ارجوانية اللحاء . اوراقها بيضية تطلو من ٢٥  
الى ٢٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٥ سم . نصلها جامد  
التسجج ، جميل الخضار الزاهي . شبارقها الذكرية تطلو  
١٥ سم . والانتوية ٢٥ سم . حراشفها جزوية اللون ،  
اسديتها شغيفة || يزرع للزينة يجود في جميع الارضية  
والمواقع المتوسطة الرطوبة .

### ١٦٣٢٠ - صَفَاف قَرَم

Salix herbacea (S).  
Saule nain, S. argente (F). Dwarf willow, Arctic willow (E). Krautweide (D). Salico nano (I).  
بجلة جبلية ترغب في المواقع الرطبة الباردة . تملو من ٦٥  
الى ١٥٠ سم . فروصها وقصبانها زياه اللحاء . اوراقها  
صغيرة اللقد تطلو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف  
شبارقها خلية فضية . اسديتها ثنائية .

### ١٦٣٢١ - صَفَاف قَصِم

Salix fragilis (S).  
Saule fragile (F).  
شجرة فراء ، تملو من ١٥ الى ١٥ م . فروصها متدلية ،  
عامة الحمل الازرق ، سريمة القصر . اوراقها سانية ،  
مدببة ، تطلو نحو ١٦ سم . حراشف شبارقها صفر .  
اسديتها ازهارها ثنائية التجميع ، مطاها الاقلام || يزرع  
لاغشاهها وقصبانها الصناعية ، يرغب في المواقع المستمرة  
الرطوبة .

### ١٦٣٢٢ - صَفَاف قَلْبِي الْوَرَق

Salix cordata (S). Saule à feuilles en coeur (F).  
شجرة فراء منتصبة الاغصان ، تملو من ٢٥ الى ٤٥ م .  
س . اوراقها قلبية الشكل ، نصلها مالى البشرة ذات الزام  
الاخضر المنشاري الحافة . حراشف شبارقها صفر . اسديتها  
ازهارها ثنائية التجميع مطاها الاقلام || يزرع للزينة  
يرغب في المواقع الرطبة والارضية العميقة الغور .

### ١٦٣١١ - صَفَاف سَوَحَر

Salix (S).  
Saule, Osier (F). Willow (E). Weide (D). Salice, Salico, Salicco (I).  
جنس اشجار وشجيرات وجنبات حرجية وريزية من فصيلة  
الصفصافيات . ازهاره نحو ١٢٥ منتشرة في جميع الاصقاع .  
اوراقها جالبة منقطة متعاقبة تطلب فيها الاستغالة ، نصلها  
ازغب الصفعة السفلى . ازهارها ثنائية المسكن ، شريفة ،  
وحيدة الشئ || جميع انواعه ترغب في الاراضي الرطبة .  
اغشاهها خفيفة لينة سهلة التصنيع لا تتقلق . لحاء سوقها  
تصلح للديانة . قصبانها تتسمل في صناعة السلال .  
اشهر انواعه ما يتبع .

### ١٦٣١٢ - صَفَاف اَبْيَض \*

Salix alba (S). Saule blanc, Osier blanc (F). White willow, Swallow tailed willow (E). Silberweide (D). Salice bianco, Silcastro (I).  
شجرة كبيرة القد ، تملو زياه ٢٥ م . فروصها متوسطة  
الانقباض ، قصبانها واثنائها منتصبة ، لونها الى الخضار الزرني  
يعملوا زغب ابيض . اوراقها سانية الشكل ، مدببة الطرف  
تطلو نحو ١٢ سم . وتعرض ٢ . نصلها منشاري الحافة ،  
خلى البشرة التي تبدو غبراء اللون . حراشف شبارقها صفر .  
اسديتها ثنائية || زراعتها شائعة ، يرغب في المواقع الرطبة  
اغشاهها طرية وصناعية . لحاء سوقه وفروعه دبانجية .

### ١٦٣١٣ - صَفَاف اَرْجَوَانِي \*

Salix purpurea (S). Saule pourpre, Osier rouge (F).  
شجرة صغيرة القد ، تملو من مترين الى خمسة امتار .  
فروصها جزوية اللحاء . اوراقها سانية تطلو نحو ١١ سم .  
وتعرض ١٥ سم . نصلها مالى الصفعة العليا ازغب السفلى ،  
مسن حافة الزام الاخضر . حراشف شبارقها قلبية الازغب .  
اسديتها ازهارها فردية ، مآبرها ارجوانية || يزرع للزينة .

### ١٦٣١٤ - صَفَاف اَرْمَد \*

Salix cinerea (S).  
Saule cendré, S. gris (F).  
شجرة صغيرة القد ، سرىوية ، جميلة الشكل . تملو من ٨  
الى ٦ امتار . شكير ساقها اجوف التثخيد العمودي .  
اوراقها تطلو من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ .  
نصلها خلى الصفعة ، مدبب المقصعة المنقرفة . حراشف  
شبارقها قلبية الازغب الازرق الازرق اللون || يكثر في الاقاليم  
المحتلة قرب مجاري الماء .

### ١٦٣١٥ - صَفَاف اَسْوَد

Salix nigra (S).  
Saule noir (F).  
شجرة كبيرة القد دائمة تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها  
منقطة ، اطليجية ، خفيفة ، تطلو من ٨ الى ١٥ سم .  
وتعرض من ١٥ الى ١٦ م . نصلها مالى البشرة ، خلى  
المروق ، حاق الخضار القاتم . حراشف شبارقها سود .  
اسديتها وريزة التجميع ثلاثية او خلسية او سباعية .  
اقلها مرط . ثمارها طليسة القشور ، مستطيلة الاذن .  
يرغب في المواقع الرطبة وفي الارضية العميقة الغور .

### ١٦٣١٦ - صَفَاف السَّكَلِين \*

Salix viminalis (S). Saule viminal, Osier vert, S. des vanniers (F). Basket willow, Osier willow (E). Kobweide (D). Salico verice, Vinco, Stropa (I).  
شجرة متوسطة القد ، تملو من ٤ الى ١٥ امتار . ساقها  
فراء ، عديدة القصبان الدقيقة المستطيلة . اوراقها سانية  
خفيفة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . ويعرض ١٢ م .  
صفحة السفلى فضية الحمل . حراشف شبارقها سود

## ١٦٣٣١ - صَفَافٌ طَوِيلُ الذَّكَبِ \*

Orthotomus longicauda (S). Orthotome à longue queue, Fauvette couturière (F).

طائر من الصفصاف. أعضائه تمتد من مايليزيه الى الهند وإيران والعراق || ثوبه جميل الالوان الزاهية. ظهوره الى الخضر الزرقى اللامع. عينه بيضاء وبطنه الى الياض الاخضر الموشى باللحم. عزالان ذنبه مستطيلان || قوته الحشرات والحمنة والديدان والنمل. يألف الحدائق والقباض والمتاع وضفاف مجاري الماء || الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوما.

## ١٦٣٣٢ - صَفَّةٌ \* ، سَيْسَكُ

Saccotomus (S). Saccotome (F).

جنس حيوانات قاضية جامة من القاربات. انواعه ٤ موطنها البلاد الافريقية. جميعها رتبة الحقة ، صفرة القد. الثوب الى السرة تسود مع اقترابها من الظهر والرأس وتبيض عند البطن. قوائمها قصيرة. اطرافها ذرية. رؤوسها مخروطية. اذنانها كبيرة مستديرة. اذنانها دقيقة، قصيرة، كاسية || قوتها الجذور وجميع المواد الصبوية والحشرات. تألف الادغال الكثيفة وضفاف الانهار والمروج المرتفعة والاراضي المساحة. مجارحها انفاق مستطيلة تتخللها رداء فسيحة.

## ١٦٣٣٣ - صَفَّةٌ ، بَاكَّة

Manoche (F).

Hand, Plug (E).

الضمة من اوراق التبغ المجاعة المروسة، مبسطة كانت او غير مبسطة.

## ١٦٣٣٤ - صَفِيدٌ \*

Lethrinus (S).

Léthrin (F). Lethrinus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلته الاسبوريات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اعرف انواعه واشهرها الصفمد المأكول وصفمد الاطلسي.

## ١٦٣٣٥ - صَفِيدٌ مَأْكُولٌ \*

Lethrinus esculentus (S). Léthrin mangeable (F). Esculent lethrinus (E).

نوع من الصفمد، سمكة بحرية بيضاء. أعضائه تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || جسمه اهليجي الشكل، عضور المؤخر، متدل التطيط، يطول من ١٦ الى ١٨ سم. رأسه كبير الجرم، مخروطي الشكل. شدة متدل الانفراج. عيانه متقاربان ناشرتان. زعنفته الظهرية مستطيلة، شائكة القسم الامامي. اما الشريفة ثلاثية المناسخ القرية. والدالية فارقة. ثوبه الى الخضار الفضي الموج. رأسه اصفر. زعانفه حر. وتعلو بقية جوفية في اواسط الاطلس من الجانبين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

## ١٦٣٣٦ - صَفَقٌ ، تَصْفِيقٌ ، صَفَاقٌ

Décantage, Décantation, Soutirage (F). Decantation Drawing off (E).

نقل الخمر وسائر السوائل من آنية الى اخرى لفصلها عن رواسبها.

## ١٦٣٣٧ - صَفَّةٌ

Marché (F). Market (E).

اتفاق يتخذ على تسليم بضاعة.

## ١٦٣٣٨ - صَفَافٌ مُسْنَحٌ \* ، صَفَافٌ رُومِيٌّ ، شَعَرُ الْبَنْتِ ، أُمُ الشُّعُورِ

Salix babylonica (S). Saule pleureur, S. de Babylone (F). Weeping willow, Mourning willow (E). Trauer weide, Babylonische Weide (D). Salice piangente, Salico di Babilonia (I).

شجرة متوسطة الكبر، تملو نحو عشرة امتار فروعها منتسبة. قصباتها وانفائها دقيقة متدلية. اوراقها سنانية، ضيقة، قصيرة العنق، نصلها يطول نحو ١٧ سم. ويعرض ٢٥ م. وهو مالى الصفقة العليا ازغب السفل وزينه اطلل اللون. حراشف شاربته حنطية. اسديتها ثنائية. زراثة شائعة، يرغب في المواع الكثرية الماء، قصبانه صناعية، خشبه متوسط اللينة.

## ١٦٣٣٩ - صَفَافٌ نَهْرِيٌّ

Salix fluviatilis (S).

Saule fluvial (F).

شجرة سرورية، تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. فروعها منفرجة الزوايا. قصباتها شبه منتسبة. اوراقها ضيقة تطول من ٦ الى ١٠ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ م. نصلها مشار الى الحافة، خلي البشرة على صفحته. حراشف شاربها وردية اللون. اسديتها ثنائية. اقلامها خلية، ثمارها زغبية القشور || يعيش على مجاري الماء وفي الحصباء وبين الصخور.

## ١٦٣٤٠ - صَفَافٌ يَابَانِيٌّ

Salix elegantissima (S).

Saule pleureur du japon, S. élégant (F).

شجرة متوسطة القد، تملو نحو عشرة امتار. اغصانها افقية الانتساب. قصباتها وانفائها متدلية، زباء للحاء. اوراقها ضيقة تطول نحو ١٥ سم. وتعرض ٢ م. نصلها بارز الروق المهدبة. حراشف شاربها مستطيلة، وردية اللون. اسديتها ثنائية. ثمارها خلية القشور، قصيرة الامن. يزرق للزئين، يرغب في الارربة الرطبة المتوسطة الانتماج.

## ١٦٣٤١ - صَفَافَاتٌ ، سَالِيَلَاتٌ

Salicylate

اسد املاح الحامض الصفصافي أي الخلتني.

## ١٦٣٤٢ - صَفَافِيَّاتٌ

Salicaceae (S). Salicinées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عادمة القعالات تشمل الصفصاف والحوجر.

## ١٦٣٤٣ - صَفَافِيَّةٌ

Ité (F).

هي الاتيه نبات من الفلقيات، اطليا.

## ١٦٣٤٤ - صَفَافِيْنٌ ، سَالِيْسِيْنٌ

Salicine (F).

Salicin (E).

غلو كوزيد يستخلص من قشور واوراق الصفصاف والحوجر وهو مقو نافع ويستعمل في معالجة داء المفاصل.

## ١٦٣٤٥ - صَفَصُفٌ \*

Orthotomus (S).

Orthotome (F). Orthotomus (E).

جنس طير من فصيلة النخليات ورتبة الجواثم. انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الاسيوية || تتميز بانفائها الزاهية وبطريقة صنع اعشاشها الجرابية الشكل المولفة من ورقتين تجمعهما وتحميها بحيط من القطن او التيل الناعم تحسده وتفتله قبل الاستعمال بمقارعه الذي يقوم مقام المنرك والابرة واليه || اعرف انواعه واشهرها الصفصاف الطويل الذنب.



صَفَافٌ مُسْنَحٌ



صَفَصِفٌ طَوِيلُ الذَّكَبِ



صَفَصِفَةٌ



صَفَصِفٌ مَأْكُولٌ

## ١٦٣٤٨ - صَفِيحِيَّاتِ الْقُرُونِ

Lamellicornes (F). Lamellicornes (E).

نعت تمريرى يطلق على الخنافس التابعة لفصيلة الجمليات وذلك لان قرونها الاستشعارية الورقية الشكل تفتح وتنطبق كصفحات الكتاب .

## ١٦٣٤٩ - صَفِيحِيَّاتِ الْمَتَائِفِ Lamelliroses (F).

رَبِيَّة طير من كليات السقدم تتميز بمنقبتها المبطلة الصفيحية الشكل ، من فصائلها البطيئات والوزيات والنحاميات ، الخ .

Glatissement (F).

## ١٦٣٥٠ - صَفِير

صوت النسر .

## ١٦٣٥١ - صَفِير

هو المدن جنبه من النطليات ، اطلبه .

Sophora (S).

## ١٦٣٥٢ - صَفِيرَاءُ

Sophora (F). Sophora (E). Sophora (D). Sofora (I). جنس نباتات معمرة برية تزينة من فصيلة القرنيات الغراشية انواعها عديدة منها الانجار والشجيرات والجنابات والاشعاب . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها عتفوية التجميع يكثر فيها اللون الاسفر ، وهي مثمرة تجرهما النحل || اشهر انواعها ما يتبع .

## ١٦٣٥٣ - صَفِيرَاءُ الْمَكْسِيكِ

Sophora secundiflora (S). Sophora du Mexique (F).

شجرة متوسطة الحجم ، تملو نحو ١١ م . ساقها سرسة . اوراقها ابيدة . وريقاتها تد من ٧ الى ٩ ، نصلها ملس البشرة جبل الخفسار ، عناقيدها الزهرية ابطية وحسية الاوتكانز . ازهارها بنفسجية اللون ، فواحة العرف . ازهارها يستمر طوال الصيف .

## ١٦٣٥٤ - صَفِيرَاءُ الْيَابَانِ \*

Sophora japonica (S). Sophora du Japon (F). Japanese pagoda tree, Sophora Japanese (E). Japonische Sophore (D). Sofora del Giappone (I).

شجرة سروية كبيرة القد ، تملو من ١٥ الى ٢٠ م . غرونها المشهورة اريمة . ساقها سرسة . اوراقها عابلة تملو نحو ٢٥ م . وهي مؤلفة من نحو ١٥ ورقة نصلها باحت الخفسار . عناقيدها الزهرية محورية الاوتكانز ، هربية الشكل تملو من ٣٠ الى ٤٥ م . ازهارها خافتة العرف للمستحب لونها الى الصفرة البيضاء المراج . ثمارها قرنية يستخرج منها غصاب اسفر اللون كبير الشأن يستعمل في صباغ ثياب ملوك الشمس || اعشابها صناعية ناعمة الوجة جيدة الصفت || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

## ١٦٣٥٥ - صَفِيرَاءُ امْرِيكِيَّةُ Sophora affinis (S).

Sophora affine, S. d'Amérique (F).

شجرة تملو نحو ١٢ اثار . ساقها سرسة . اوراقها عابلة كبيرة مركبة من نحو ١٧ ورقة نصلها ملس البشرة جبل الخفسار . عناقيدها الزهرية ابطية الاوتكانز . ازهارها الى البياض الموشع بالوردي || ازهارها يستمر طوال الصيف .

## ١٦٣٥٦ - صَفِيرَاءُ يَتِيَّةُ الزَّوْق

Sophora viciifolia (S). Sophora à feuilles de vesce (F).

جنس شجرة سروية معمرة ، تملو من متر الى مترين . ساقها شاككة . اوراقها عابلة صفيرة . وريقاتها مستدقة يرلوح

## ١٦٣٣٨ - صَفَن Guépier (F). Wasps'nest (E).

مباة الزناير . بيت تنفذه الزناير ونحوها لما ولقراها .

## ١٦٣٣٩ - صَفَن Bourse, Scrotum (F). Scrotum (E).

الجراب الجلدي الذي يغلف الخصيتان للظاخرتان عند الحيوان .

## ١٦٣٤٠ - صَفُورَةٌ ٥ ، زُونِيَّتْ ٥ \*

Zonitis immaculata (S). Zonite immaculé (F).

Zonitis immaculata (E).

حشرة طيبة واثمة غاضلة وانجة من فصيلة اللويديات ورية معمدات الاجنحة . موطنها الاقالم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبية . غناقصها تعيش على بتلات الازهار ونواحي النبات وهي تفرز عند لسها مادة صفراء اللون كرية الرائحة ونحوي في شوارها وفي جهازها الهضمي مادة نافقة تهيج بشرة الجلد وتثير الباه . يرقاتها مقترنة || جسمها متوسط القد يملو من ١٢ الى ١٥ م . قواها الى الصفار الاكثف ، رأسها وجرامها سود . عيناها كيرتان يارتتان . زباناها عيطان مستطيلان . ظفرانها سنانى الاطراف الفارقة اللاحقة || لها جبل واحد في الحلق . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد في حزيران وتحتس المكان في كل مكان يقون له الخفاء || البقرة عند بلوغها الادراك التام تملو نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، عاجي الصفنة العليا ، اسفر الحواشي الترتبية ، اغبر الملب ، سداسي الراجب ، بني الرأس . قليل الملب المجرش على الجانبين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما يقتضي في التربة .

## ١٦٣٤١ - صَفِي

نعت يطلق على كل حيوان اعلى صريع السلالة الصافية المتنبية . راجع صريع .

## ١٦٣٤٢ - صَفِيحَةٌ في الصل ، اطلبه .

Lamelliforme (F).

Lamelliform (E).

## ١٦٣٤٣ - صَفِيحِيَّ

ما كان كالصفيحة شكلا .

## ١٦٣٤٤ - صَفِيحِيَّاتِ الْأَحْتَاكِ Mysticates (F).

مرتبة حيوانات بحرية لبونة . راجع ريشيات الاحناك .

## ١٦٣٤٥ - صَفِيحِيَّاتِ الْأَرْجُلِ Pélicypodes (F).

صف حيوانات من الرخويات يعرف ايضاً بصفيحيات الخياشيم وبلوات المعرايين .

## ١٦٣٤٦ - صَفِيحِيَّاتِ الْجُلُودِ Placodermes (F).

Placodermata (E).

مرتبة من الاسماك المتحجرة ظهرت في اواخر الحقبة السيلورية وانقرضت في الكربونية . تميزت بهياكلها الغضروفية المادة الملوقة بصفائح عظمية التركيب .

## ١٦٣٤٧ - صَفِيحِيَّاتِ الْخَيْبَانِ

Lamellibranches (F). Lamellibranchiataes (E).

صف حيوانات من الرخويات يسمونها ايضاً ذات الخياشيم أو الصدفين (Bivalves) .



صفورة



صفياء اليابان

منسوبة القوام، سرية الطيران، حادة المزاج وقوية الشكينة. ترميها : الصقر وصقر العجم وصقر المروج وصقر الهند والحرّ والسودق والشاهين والشرق || اما كنيته فأبو شجاع وأبو الأصمخ وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عون .

١٦٣٦٩ - صَفَرَاءُ \* أَجْدَلُ ، جَدَلُ ، قُطَامِي  
Falco sacer (S). Faucon sacre, Sacre (F).

طائر من الكواسر تنسب اليه عارة الصقور وفضيلة الصقريات . وهو ابيض الجفّة ، حسن الشكل، مجدول الدين ، طويل السطحين والذنب ، عاري الساقين ، حاد الخالب . منسره قصير القد، اعقت الهرة ، منسرخمطين . وهو اهدأ من البازي واقنع منه واربء مزاجاً واهد اقداماً واكثر لفة || موطنه البلاد المعتدلة الحارة من آسيا واروپة الشرقية || يأوى الاحراج والغابات الكثيفة والجبال الجرداء عل السواء . قوته الطير من المصقور الى البط . يثن وكفه في صدوع الصخور النائية او في اعالي الاشجار الباسقة . اثناء تنصع من ٣ الى ٤ فترات تحفضها وحدها نحو اربعة اسابيع .

١٦٣٧٠ - صَفَرَاءُ الْأَرْتَبُ هو العقاب السعاء، اطلمها .

١٦٣٧١ - صَفَرَاءُ الْبَطِّ هو السودق ، اطلمه .

١٦٣٧٢ - صَفَرَاءُ الْجُرَادِ هو الويسق، طائر من الصقريات ، اطلمه .

١٦٣٧٣ - صَفَرَاءُ الْعَجَمِ \*  
Falco orientalis (S). Faucon de Barbarie, Tartaret (F).

نوع من الصقر . اعطاه تيمت من العراق الى التبت . وهو اصغر قدّاً من الشاهين والابجل لكنه اشرس خلقاً وأليس مزاجاً واهد بطلاً .

١٦٣٧٤ - صَفَرَاءُ الْفَرَكَالِ هو الشرق ، اطلمه .

١٦٣٧٥ - صَفَرَاءُ الْفَيْرَانِ هو مرزّة الدجاج ، اطلمها .

١٦٣٧٦ - صَفَرَاءُ الْمُرُوجِ  
Falco mexicanus (S). Faucon des prairies (F).

نوع من الصقر . اعطاه البيلاد الامريكية كثر في المكسيك . يألف المناطق الداخلية بعيداً عن الشواطئ قوته المصافير والقروان والحشرات .

١٦٣٧٧ - صَفَرَاءُ الْهِنْدِ \*  
Falco calidus (S). Faucon des Indes (F).

نوع من الصقر ، متوسط القد ، جميل التوشيم الزاهي ، سريع الحركة والانقضاض . موطنه الهند وهو من طيورها الابدّة .

١٦٣٧٨ - صَفَرَاءُ يَزْ هو البازي ، اطلمه .

١٦٣٧٩ - صَفَرَاءُ جَرَّاعِ هو السقاوة ، اطلمها .

١٦٣٨٠ - صَفَرَاءُ حَوَامِ هو السقاوة الثامنة ، اطلمها .

١٦٣٨١ - صَفَرَاءُ بَزْ هو الجرودة ، اطلمها .

١٦٣٨٢ - صَفَرَاءُ هِ  
Cychramus (S). Cychramus (E).

جنس حشرات واشعة من مخفيات الاجنحة وفضيلة

وعدها من ١١ الى ١٥ . نسلها مالى البشرة ، بحري الصفة السفل . عتاقدها الزهرية رملة تنصع من ٦ الى ١٢ زهرة لنها الى الياض الموشع بالازرق || ازهارها يستمر طولك شهر حزيران .

١٦٣٥٧ - صَفَرَاءُ مُدَهَّبَةٌ

Sophora chrysophylla (S). Sophora doré (F).

جنية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها قليلة الشوك . اوراقها مستطيلة ، وريقاتها خفيفة النصل ، خلية البشرة ، عيدها يراوح بين ١٧ و ٢١ . عتاقدها الزهرية لينة . ازهارها الى الصفرة اللامعة الزاهية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٥٨ - صَفَرَاءُ الصنغيع هو الزرع المفرك .

١٦٣٥٩ - صَفَرَاءُ الْجُلُودِ  
Pachydermes (F). Pachydermatous (E).

هي الجليات ، اطلمها .  
١٦٣٦٠ - صَفَرَاءُ  
Méricarpe (F). Mericarp (E).

كل غباء من اخبية الثمرة الناضجة التي لا تنفلق عن بزورها .

١٦٣٦١ - صَفَرَاءُ هي الابل نوع من العرعر ، اطلمه .

١٦٣٦٢ - صَفَرَاءُ  
Scathare (F).

سكة بحرية تدعى سقار . اطلمها .

١٦٣٦٣ - صَفَرَاءُ هِ  
Egrisé, Egrisé (F).

Bort, Diamond-powder (E).

الصقال مسحوق ناعم من الماس يستعمل في مقل الحجارة الكريمة ومنها الماس .

١٦٣٦٤ - صَفَرَاءُ  
Cri des oiseaux (F).

صوت الطائر: Cry of the birds (E).

١٦٣٦٥ - صَفَرَاءُ هِ  
Cicadula (S). Cicadule (F).

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الوزيديات. انواعها عديدة . اطلمها العالم . مرتها الصفصاف والراوة ومظم النباتات المنغية والمائية . اجسامها اهليجية الشكل تطول من ٦ الى ٦ م . اثنائها تخلفه الالوان عادمة الزركمة منها الاصفر والاعضر والخضلي والبناني ، الخ .

١٦٣٦٦ - صَفَرَاءُ  
Sucré (F). Sugared (E).

١٦٣٦٧ - صَفَرَاءُ  
Substance sucrée (F).

Sugary substance (E).

ج سقار . كل مادة سكرية .

١٦٣٦٨ - صَفَرَاءُ  
Faucon (F). Falcon, Hawk (E).

الصقر يجمع مقور وصقار وصقارة والافني مقرة . والصقر بالرف المادي كل طائر يصيد ما خلا العقاب والنسر . فالصقر يشمل البازي والشاهين والشرق والحر والباشق والبيدق والسقاوة والزررق واليزريق... والصقور عند البزادة فشان : الصقور والبزاة . فالصقور سود العينين محدة الرؤوس طوال الاجنحة قصار الارجل . والبزاة صفر العينين مدورة الرؤوس قصار الاجنحة طوال الارجل || اما الصقر بالرف العلمي فهو جنس طير من عارة الصقور وفضيلة الصقريات . انواعه ثمانية منتشرة في جميع اقطار العالم جميعها حسنة الشكل والمتنم،



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ

## ١٦٣٨٧ - صَقْلَابُ سُورِي \* سِتْكُرُوزَا، شَجَرَةٌ

## الحوري

*Asclepias syriaca*, *A. cornuti* (S). *Asclépiade* de Syrie, *A. à ouate* (F). Silk cotton, Wild cotton (E). *Echte Soelenpflanze* (D). *Asclepiade* di Siria, *Falso cotone* (I).

جَنَّةٌ تَعْلُو مِنْ ١٠٠ أَلِ ١٥٠ سَم. أَوْرَقَاتُهَا مُتَقَابِلَةٌ وَرُصَّةٌ التَّجَمُّعِ. نَاصِلُهَا أَهْلِييُّ الشَّكْلِ يَطُولُ مِنْ ١٠ أَلِ ٢٢ سَم. وَيُضْرَعُ مِنْ ٥ أَلِ ١٢. أَزْهَارُهَا أَلِ الصَّفْرَةِ الْخَفِيرَاءُ الزَّاهِيَةُ يَطُولُ مَوْجٍ أَحْمَرٍ. مُنَابِرُهَا كَمَاكِبَرٌ أَهْلِييَّةِ الشَّكْلِ، مَدْرَعةُ الْبَشْرَةِ، فَسْتِيْقَةُ اللَّيْلِ، تَبْلُهَا حَرَرِيٌّ أَيْضًا. بِزُورِهَا صَغِيرَةٌ مُسْتَقِيلَةٌ مَغْلُطَحَةٌ سُودَاءُ اللَّيْلِ.

## ١٦٣٨٨ - صَقْلَابُ عُسْقُولِي \* حَسْبِيَشَةُ ذَاتِ الْجَنْبِ

*Asclepias tuberosa* (S). *Asclépiade* tubéreuse (F). Butterfly weed, Tuber root (E). *Echtes mudarplantze* (D). *Asclepiade tuberosa* (I).

بَجَلَةٌ مَعْمَرَةٌ تَعْلُو مِنْ ٨٠ أَلِ ١٢٠ سَم. أَرْوَقَاتُهَا صَقْلَوِيَّةٌ. سَاقُهَا زَيْبَاءُ اللَّسَاءِ عَادِمَةُ الْمَصَارَةِ الْبَلْبِيَّةِ. أَوْرَقَاتُهَا لَاطَتَةٌ، أَهْلِيَّةٌ، مُسْتَقِيلَةٌ. أَزْهَارُهَا هَامِيَّةٌ، تَوَجَّاهَا رَتَقَالِيَّةٌ وَتَبْلَاهَا صَفَرٌ. أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ تَمُوزَ إِلَى أَيْلُولٍ. يَسْتَخْرِجُ مِنْ عَاقِلَتِهَا مَادَّةٌ جَوْهَرِيَّةٌ مُعَالَةً تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّبِّ. وَيَقَالُ أَنَّ أَوْرَقَاتُهَا وَأَزْهَارُهَا تُغَيِّدُ الْمَصَابِ بِذَاتِ الْجَنْبِ.

## ١٦٣٨٩ - صَقْلَابُ نَحْرِي صَقْلَابُ عُسْقُولِي

*Asclépiade officinale*

هُوَ الْفَلَقَةُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ الطَّيْبَةِ، أَمَّا هِيَ.

## ١٦٣٩٠ - صَقْلَابُ مَدْمَتِي \* زَهْرَةُ الدَّمِّ

*Asclepias curassavica* (S). *Asclépiade* de Curaçao, *Ipecia sauvage*, *Herbe à sang* (F). Blood flower, Wild *Ipecacuanha* (E). *Bastard Ipecacuanha* (D). *Ipecacuanha delle Antille* (I).

بَجَلَةٌ مَعْمَرَةٌ تَعْلُو مِنْ ٤٠ أَلِ ٧٠ سَم. أَوْرَقَاتُهَا سَنَانِيَّةٌ النَّصْلُ تَطُولُ مِنْ ٥ أَلِ ١٠ سَم. وَتُضْرَعُ مِنْ ٢ أَلِ ٤. أَزْهَارُهَا صَوَانِيَّةُ التَّجَمُّعِ، هَامِيَّةُ الْإِرْتِكَازِ، وَرْدِيَّةُ اللَّيْلِ أَوْ حُمْرَاءُ. أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزِيرَانَ إِلَى تَشْرِينَ.

## ١٦٣٩١ - صَقْلَابِيَّات

*Asclepiadaceae* (S). *Asclépiadées* (F). *Asclepiadaceae* (E).

فَصِيلَةٌ نَبَاتِيَّةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْفَلَقَتَيْنِ تُشَمَلُ الصَقْلَابُ وَالْبَلَخُ وَالشَّرُّ وَالشَّقْدَةُ وَالشَّرْمَاغُصُ وَالْمَيْدِيَّةُ الْخ.

## ١٦٣٩٢ - صَقْلَابُ \* Cyclops (S).

*Cyclope* (F). *Cyclops* (E).

جَنَسٌ دَوِيَّاتٌ مَائِيَّةٌ مِنَ الْقَشْرِيَّاتِ الدُّنْيَا جُذَائِفَاتِ الْأَجْرَلِ وَفَصِيلَةُ الصَقْلَوِيَّاتِ. أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ عِدَّةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي عَظِيمٍ مَنَاطِقٍ وَفِدَارِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَالْمُتَحَدَّةِ الْحَرَارَةِ. أَجْسَامُهَا سَكْمِيَّةٌ التَّرَكِيبُ تَطُولُ مِنْ ٤ أَلِ ٧ م. زُورُهَا مُلْتَصِمَةٌ بِالْحَلَقَةِ السَّادِسَةِ الْأَوَّلَى. عِيُونُهَا مُتَلَاصِقَةٌ فَيُظَاهِرُ الْبَهِيمَاءَ عَيْنًا وَاحِدَةً. يَطْلُوها جَرَائِيَّةُ الشَّكْلِ. قَوَائِمُهَا ثَلَاثِيَّةُ الْمَادَفِ بِاسْتِثْنَاءِ الرَّبْعِيْنِ الْأَوَّلِ وَالسَّادِسِ. الْأَوْبَاءُ تَرَاوَحُ مِنَ الثَّبَرَةِ الْفَقِيَّةِ إِلَى الشَّجَرَةِ وَالْحَلَقَةِ الْبَحْرِيَّةِ الْمَوْجِ.

## ١٦٣٩٣ - صَقْلَوِيَّات Cyclopidae (S).

*Cyclopidae* (F). *Cyclopidae* (E).

فَصِيلَةٌ دَوِيَّاتٌ مَائِيَّةٌ مِنَ الْقَشْرِيَّاتِ الدُّنْيَا جُذَائِفَاتِ الْأَجْرَلِ.

الْبُؤْيُحِيَّاتِ. أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ سِتَّةُ أَصْنَافِهَا الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ. تَأْتَفُ الْحَرَارِجُ. قَوَائِمُهَا الْأَوَّلَى ثُمَّ الْفُطُورُ. أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ الْقَدِّ، شَبِيهَةٌ بِبُؤْيُحَةِ الشَّكْلِ، زَيْبَاءُ الْفُطُورِ دَبِيئِيَّةُ الزَيْبَانِ. الْأَوْبَاءُ سَوِيَّةُ الْأَلْوَانِ الزَّاهِيَةِ يَطْلُوها فِي كَوَالِهَا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَانِ مِنَ النَّقْطِ السَّوْدِ.

## ١٦٣٨٣ - صَقْرِيَّات Falconidae (S).

*Falconides* (F). *Falconidae* (E).

فَصِيلَةٌ طَيْرٌ مِنْ قِسْمِ الصَّقُورِ تُنْتَسِبُ إِلَى فِئَةِ كَوَاسِرِ الْبَهَارِ وَرَدِّيَّةِ الْحَوَارِجِ. تُقَدَّرُ عَلَى عِمَارَاتٍ وَزَهْرَاءَ ٢٠٠ جَنَسٍ وَنَوْعٍ. تُمَيِّزُ بِأَجْسَامِهَا الْرَبِيْعَةِ الْمَسْجُودَةِ التَّجَنُّاسِ الشَّكْلِ. رُؤُوسُهَا مُتَوَسِّطَةٌ الْحَجْمِ كَأَسِيَّةِ الرَّيْشِ. عِيُونُهَا نَاطِقَةٌ، شَهْلَةٌ، مَحْبَرَةٌ دَاخِلُ أَوْرَقَاتِهَا الْبَارِزَةُ الْحَبِجَاءِ. أَمَّا نَاقَتُهَا صَغِيرَةٌ. سَوَاقُهَا كَبِيرَةٌ وَأَرَقَةٌ. مَنَابِرُهَا صَغِيرَةٌ تُمَيِّزُ بِمَخَابِلِهَا الطَّوِيَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْأَطْرَافِ. بِهَارِهَا شَدِيدَةُ الْإِنْعِافِ، حَادَةُ الْحَاجِزِ. أَرِصَاتُهَا مُتَوَسِّطَةُ الطَّوْلِ تَغْلِبُ فِيهَا السَّرْوَةُ وَمِنْهَا عَارِيَّةٌ. مَخَابِلُهَا ذَرِيَّةٌ قَوِيَّةٌ مُتَضَبِّبَةٌ. أَنْتَاهَا فِي عَظِيمٍ الْأَجْنَاسِ أَكْبَرُ قَدًّا مِنْ ذِكُورِهَا. تَقْتَنِصُ الصَّيْدَ وَتَقْتَلُهُ حَرَكَتِهَا بِمَخَابِلِهَا. تُمَيِّزُ أَزْوَاجًا أَوْ أَفْرَادًا لَا يَجْمَعُهَا سِوَى فَطْرَةِ الْإِنْعِافِ إِلَى الرَّيْشِ فِي الْأَنْوَاعِ الْقَوَالِغِ. وَجْعِي تَشْمَلُ، بِدُونِ رَيْبٍ، أَجْسِرَ الْبُيُورِ وَأَنْبِلَهَا عُلْفًا وَأَقْوَلَهَا شَكِيمَةً وَأَصْلَهَا عَوْدًا. أَمَّا عِمَارَاتُهَا السَّتْ فَبِهِ: الْعُتْبَانُ وَالْهَادِءُ وَالصَّقُورُ وَالْبَزَائِدَةُ وَالسَّقَاوَاتُ وَالْمَرْزِيَّاتُ.

## ١٦٣٨٤ - صَقْلَابُ \* Scatops (S).

*Scatops* (F). *Scatops* (E).

جَنَسٌ حَشَرَاتٍ مِنْ فَصِيلَةِ الصَقْلَوِيَّاتِ وَرَدِّيَّةِ ذَوَاتِ الْجَنَاحَيْنِ. أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ عِدَّةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي عَظِيمٍ أَقْطَارِ الْعَالَمِ. أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ تَطُولُ مِنْ ٢ أَلِ ٥ م. زُورُهَا صَغِيرَةٌ مُزَوَالِيَّةُ الشَّكْلِ. عِيُونُهَا فَارِقَةٌ عَنْ الشَّقَيْنِ. مَرَاثِفُهَا قَصِيرَةٌ. مَلَابِسُهَا وَبِيدَةُ الْعَقَلَةِ. قَرْنُهَا الْإِسْتِمَارِيَّةُ تَحْمِلَةُ وَقَصِيرَةٌ. كَوَالِهَا أَهْلِيَّةٌ يَطْلُوها خَلٌّ قَصِيرٌ. يَطْلُوها مُسْتَضْمِنَةٌ الْمُخَرَّجُ، مُسْتَقِيلَةُ الطَّرْفِ الْمُسْتَدِيرِ. وَرَافَتُهَا كَبِيرَةٌ، قَسْطَانِيَّةُ التَّخْفِيفِ. قَوَائِمُهَا مُسْتَقِيلَةٌ، عَادِمَةُ الْحَلْبِ وَالْمَنَاسِخِ. مَلْجَمَتُهَا الْحَرَائِيَّةُ كَرَسِيٌّ. تَأْتَفُ الْأَوْبَاءُ الرَبِيْعَةِ. يَكْثُرُ وَيُجِدُّهَا عَلَى الْأَعْشَابِ وَالْأَزْهَارِ. أَسَارِيْهَا نَاطِلَةٌ أَوْ دَامِتَةٌ.

## ١٦٣٨٥ - صَقْلَوِيَّات Scatopsidae (S).

*Scatopsidae* (F). *Scatopsidae* (E).

فَصِيلَةٌ حَشَرَاتٍ مِنْ رَدِّيَّةِ ذَوَاتِ الْجَنَاحَيْنِ. أَجْسَامُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ عِدَّةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي عَظِيمٍ أَقْطَارِ الْعَالَمِ. جَمِيعُهَا دَامِتَةٌ أَوْ نَاطِلَةٌ. تَأْتَفُ الْبَلَخَاتُ وَالْحَرَارِجُ وَالْخَدَائِقُ وَالْمَوَاقِفُ الْرَبِيْعَةُ أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ، تَطُولُ مِنْ ١ أَلِ ٦ م. زُورُهَا مَغْلُطَحَةٌ. عِيُونُهَا كَلَوِيَّةُ الشَّكْلِ. مَرَاثِفُهَا وَبِلَاسُهَا قَصِيرَةٌ. قَرْنُهَا الْإِسْتِمَارِيَّةُ تَحْمِلَةُ صَغِيرَةٌ. كَوَالِهَا أَهْلِيَّةٌ. يَطْلُوها شَبِيهٌ مَرْدَنِيَّةُ الشَّكْلِ. وَرَافَتُهَا قَسْطَانِيَّةُ التَّخْفِيفِ. قَوَائِمُهَا مُسْتَقِيلَةٌ. يَرَقَاتُهَا دَامِتَةٌ أَوْ نَاطِلَةٌ. أَشْهُرُ أَجْنَاسُهَا الصَقْلَابُ.

## ١٦٣٨٦ - صَقْلَابُ Asclepias (S).

*Asclépiade* (F).

جَنَسٌ نَبَاتَاتٌ بَرِيَّةٌ وَرَدِّيَّةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الصَقْلَوِيَّاتِ. أَنْوَاعُهَا عِدَّةٌ جَمِيعُهَا جَنَانِيَّةٌ وَبِلَاجَاتُ وَأَعْشَابُ مُتَقَابِلَةُ الْأَوْرَاقِ الْكَائِلَةِ. أَزْهَارُهَا طَلِيْقَةُ التَّجَمُّعِ أَهْلِيَّةٌ أَوْ هَامِيَّةُ الْإِرْتِكَازِ. بِزُورِهَا مَغْلُفَةٌ زَيْبٌ نَامٌ التَّلِيَّةُ صَغِيرُهَا شَبِيهٌ الْحَرِيرِ. أَشْهُرُ أَنْوَاعُهَا مَا يَتَّبِعُ.



صَقْلَابُ سُورِي



صَقْلَابُ عُسْقُولِي



صَقْلَابُ مَدْمَتِي



صَقْلَابُ

**١٦٤٠١ - صِكَاكُم** (F). **Détriticolle, Détritiphage** (E).

صفة الحشرة التي تعيش على النفايات العضوية من أي مصدر كانت .

**١٦٤٠٢ - صِيلٌ ، نَجَا ، كَوِيرَا** (S). **Naja** (S). **Naja, Cobra** (F). **Cobra** (E).

جنس حيات خبيثة من امبيات الإخايد . انواعه المعروفة عشرة ، سبعة منها أفريقية المهد وثلاثة آسيوية ، اثوابها الى الشقعة يطولها تحطيط اسمر ويحذيق اصفر . اجسامها عادية الشكل طولها يختلف مع النوع وهو يراوح ما بين ٨٠ و ٤٥٠ سم . تتميز بأعناقها المهيطة المستعرجة التي تنتفخ عند اللفظ || جميعها سامة لدغتها يمتد لا تنفع فيها الرقية لانها سريعة الطب والتفشي || أشهر انواعه ما يتبع .

**١٦٤٠٣ - صِيلٌ أَسْوَدُ الْعَيْنِ ، رَحْمَة** (F). **Naja nigricollis** (S). **Naja à cou noir** (F).

نوع من الصل يكثر في بعض مناطق افريقية الشرقية اغصها اريتريا والصومال . ثوبه الى الشقعة المهيطة بالاصفر والاسمر . عنقه اسود ، رأسه اغبر اسمر . لسعة يمتد .

**١٦٤٠٤ - صِيلٌ الصَّحْرَاءُ** (S). **Naja melanoleuca** (S). **Naja du désert** (F).

نوع من الصل موطنه الصحراء الكبرى و افريقية الاستوائية . ثوبه الى الصبهة الخفيفة بتجذبه اصفر . لسعة قتالة .

**١٦٤٠٥ - صِيلٌ النُّوبَة** (S). **Naja flava** (S). **Naja du Nubie** (F).

نوع من الصل يكثر في النوبة والسودان ثوبه الى الصبهة النابية يطول تجذبه اسمر . لسعة يمتد .

**١٦٤٠٦ - صِيلٌ مَضْرِي ، قَاشِر** (F). **Naja halli** (S).

نوع من الصل يكثر في البلاد المصرية . لسعة يمتد . وقد اجمع المحققون على ان هذا النوع من الصل هو الحية التي كان يقدها قدام المصريين وهو الحية التي اختارتها كليوباترة للقضاء على سياها .

**١٦٤٠٧ - صِيلٌ هِنْدِي ، قَاشِرَان** (S). **Naja tripudians** (S). **Naja à lunettes, Serpent à lunettes, Cobra indien** (F). **Indian cobra** (E).

نوع من الصل يكثر في الهند . لسعة قتالة . يقال ان معدل ضحاياه الهندية السنوية ، مع الصل الحثي ، لا يقل عن ٢٥٠٠٠ نسمة معظمها من الأولاد والاساء .

**١٦٤٠٨ - صِيلٌ حَتَّى ، صِيلٌ الْعَاب ، صِيلٌ قَارِصِي** (S). **Naja bungarus, N. hannah, N. morgani** (S). **Naja de Persé** (F). **Persian cobra** (E).

نوع من الصل موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس . يألف المناطق الحارة الرطبة . يطول نحو ٤٥٠ سم . قوته الاناعي والظفاد والضفادع . ثوبه الى الشقعة للنسبة بالاسمر يطولها بعض التفرخ الصفر . سمه شديد القابلية سريعا . لسعة تقضي على الثور بطرف ثلاث دقائق .

**١٦٤٠٩ - صِلَادَة** (F). **Dureté** (F). **Hardness** (E).

خاصية مقاومة الصخر للشدش .

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في مياه البلاد الباردة والمعتدلة || اجسامها شديدة الصفر ، سكية التركيب . الزوج الاناسي من قوائم الذكور ، عند جميع الانواع ، بيضي الشوزن ، أعاذ || أصراف اجناسها واشهرها الصلورب .

**١٦٣٩٤ - صُقُود** (F). **Cinclodes** (S).

جنس طير من الطيور ربيقات المناظر وفصيلة الطوليات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار امريكا الجنوبية || اجسامها رشيقة تتلون من ٢٠ الى ٢٤ سم . مناقبها مستطيلة دقيقة . اذنانها مستديرة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان ، جميعها مكحلة العين ، شبه مطوقة الاعناق ، مرقوشة الصدور || قوتها الحشرات والديدان والتل .

**١٦٣٩٥ - صُفُور** (F). **Falconiens, Faucons** (F). **Falcons** (E).

عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل سبعة اجناس : الصقر والسفر والكنيع والماسوق والزلزير والكمك واليوسي . اما انواعها فكثيرة العدد جميعها ربة الجثث المتوسطة القد . اعناقها قصيرة . سواقلها كبيرة مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية مسنة المخاطم ، بهارها شديدة الانمغاف . ارباعها متوسطة الطول . غالبها عارة ذرية . مهدا الماء تجويه او تلد في بعض اصقاعه . وهي من افضل طير الصقريات . تطير بسرعة فائقة تحلق في الاجواء الرقيقة وتنفذ كالهم . تصيد مع الصباح وعند الغروب . قوتها الطير واللوييات وسائر الحيوانات التي تتسكن بها .

**١٦٣٩٦ - صُقُورِين** (S). **Sacculina** (S). **Sacculina** (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات الدنيا جلدومويات الرؤوس || انواعه المعروفة قليلة العدد تنطفل على السرطان وغيره من القشريات .

**١٦٣٩٧ - صُقِي** (F). **Massue** (F). **Club** (E).

نمت وصني يطلق على ما كان شكله كالصق .

**١٦٣٩٨ - صُقِيح** (F). **Froidure** (F). **Coldness** (E).

هو البرد البني الذي يسببه خاصة صرد الهواء .

**١٦٣٩٩ - صُقِيْقَة** (S). **Parscaryum** (S). **Parscarya** (F).

جنس نباتات عشبية معمرة زياه من فصيلة الحمصيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها تمتد من الشرق الاوسط الى الهند || سورها كيفية الخمل والزغب تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها الجلدية قلبية الشكل ، سنانية الاطراف . اوراقها الجلدية بيضية الشوزن . ازهارها متباين الاشكال من المتدوية والشكولي . ازهارها عديدة الالوان يكثر فيها الاحمر والارزق || أصراف انواعها واشهرها الصقيقة السننوية المتدوية الازهار الزرقاء اللون والصقيقة الكشميرية المتكوية الازهار الازرقوانية || تنويرها صيفي يستمر من حزيران الى تموز .

**١٦٤٠٠ - صُقِيل** (F). **Llophyle** (F).

نمت تعريفية يطلق على كل نبات اوراقه مالة النصال .



صُقُود



صل مصري



صل هندي



صلص



صلب



صلبانية بحرية



صلبانية مرودية



صلبة



صلصل الحبشة

## ١٦٤١٨ - صَلْبَانِيَّة مَرُودِيَّة \* ، صَلْبِيَّة مَرُودِيَّة ، حَبِيَّة الصَّلْبِيَّة المَرُودِيَّة

Cruciella stylosa (S). Cruciella à long style, C. stylosa, Croissette (F). Crosswort (E). Kreuzblatt, Kreuzkraut (D). Barbatella, Pittimbrosia (I).

عشبة معمرة تعيش بين الصخور تعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فروع خالية. أوراقها غمية النجم، متناية النصل. غشبا مؤلفة من ٨ أوراق متصالبة. أزهارها وريدية اللون ثوبية الرائحة || أزهارها يستمر من أيار الى آب.

١٦٤١٩ - صَلْبِيَّة Sclerotic (F). Sclerotic (E).

هي يياض المين.

## ١٦٤٢٠ - صَلَّة ، حَاصِل ، عِلَاقَة

Rapport, Relation (F). Connexion, Product, Relation (E).

تفصيل نسب ونتائج البيان المروص.

## ١٦٤٢١ - صَلْبَجَة \* ، قَبْلَجَة ، شَرْكَة

Cocon (F). Cocoon (E).

غشاء واق يحكم البدن الحريري للمادة لتجبه بعض الاساريع كدودة القز ليياها وتحولها الى غادرة.

١٦٤٢٢ - صَلْمُخُود \* Corbicula (S).

Corbicule (F). Corbicula (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحات الخياشيم والأرجل ومن فصيلة السيرينيات. أنواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها نهري والبعض الآخر يألف الاغوار في جميع مناطق البلاد الحارة || اصدافه معتلة الخضر او صفرة، شبه قمية الشكل، مقعرة القن، متناية الألوان، مغطاة بالاغصن او البني. مشابها ثنائية طليقة معتلة الطول || تعيش مغفونة في الاسمال.

١٦٤٢٣ - صَلَصَل ، طَقَل ، طِين Argile (F). Clay (E).

الصلصال الصفوف، صخر طيني مركب من سيليكات الالومنيوم، حبيباته دقيقة متجانسة، يتميز بشدة لزوجه عند البزل وبجاسك وصلابة ذراته. وهو اذا كثرت لونه في التراب صيره متدججا صلبا || يوجد في الطبيعة موزجا باكسيد الحديد واكسيد المنجنيز وغيرها || يستخدم في صناعة الآواني الخزفية. ومنه الصلصال الترابي الخالي من المواد القلوية والجيرية يستعمل في تبطين الافران الكهربية لانه يتحمل الكثير من درجات الحرارة العالية.

١٦٤٢٤ - صَلَصَلْ أَيْشَن Calamite

نوع من الصلصال يتميز بيباض لونه وبقلة المواد الغريبة التي يحويها وهو دقيق الذرات اللزجة المتكاسكة. يستخدم في صناعة الآنية الخزفية.

١٦٤٢٥ - صَلَصَلِي Argileux (F). Argillaceous (E).

من التراب ما حوى النسبة الكيفية من الصلصال.

١٦٤٢٦ - صَلَصَلْ الحَبَشَة Phalacroteron

abyssinica (S). Colombar d'Abyssinie (F).

نبتة من الصلصال وفصيلة الحماميات. اشياء تسمى صلصلة. طولها نحو ٣٣ سم. ظهروا اغصن زيتوني، بطنها اصفر، ورأسها وعنته ورصده الى الخضار الرمادي، جناها الى السواد الاصفر الاطراف. اتيكها اسود الانتشاب والزام الالول والثاني، فضي الثالث والرابع || موطنه الحبشة

Colombars (F).

جنس طير من الحماميات. انواعه اربعة تتميز باجسامها الربعة ويشغل طيراتها. اثنائها مختلفة الألوان الزاوية، يتكثر فيها الاغصن الانفع المراج || أشهر أنواعه صلصل الحبشة، اطليه.

Eau trouble (F).

Amande (F). Kernel (E).

Sphaerium (F).

Sphaerium (E).

جنس حيوانات مائية سرلولة من الرخويات صفيحات الخياشيم والأرجل ومن فصيلة السيرينيات. أنواعه المعروفة نحو ٩٠ اصلاها نهر وبحيرات واغوار المناطق الحارة والمعتلة الحارة || اصداها متناية الاحجام والاشكال يتكرر فيها الاحليلجي الثاني القن. جميعها متساوية الصلصال. مشابها ثنائية، طليقة، صفرة او معتلة الطول || تعيش متغفونة في الاسمال. لونها كامة الصفن.

Chaptia (S).

Chaptia (F). Chaptia (E).

جنس طير من الجوامث متنايات المتأقير وفصيلة الذكوريات انواعه المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق الهند وفموتة || مسرعا الغابات. ملجها الحياتي زويي. قوتها الحشرات والديدان || اجسامها تفلو من ٣٠ الى ٣٢ سم. اثنائها الى السواد الانفع الترتيقي المراج او الى السواد المشوب بالاغصن. رؤوسها عادمة التنازع، خفيفة السبال. اثنائها مستطيلة فاقرة || تدثن اصلاها في الانجار الورقة الطل. الاثنى تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يوطن لها الغذاء والحماية || أشهر أنواعه الصلبال الاصفر الذي يتكرر وجوده في الهند (Chaptia acnea).

Saupe (F).

١٦٤١٥ - صَلْبَان صكة بحرية تدعى بَقَّة غشبية، اطليه.

١٦٤١٦ - صَلْبَانِيَّة ، صَلْبِيَّة ، حَبِيَّة الصَّلْبِيَّة

Cruciella (S). Cruciella (F).

جنس نباتات عشبية ليغية برية من فصيلة الفويات. انواعه المعروفة ٢٦ منها حوض البحر المتوسط واروبة الغربية. | اثنائها غمية متصالبة. | ازهارها حلقة النجم، تويجها خامة الفصوص، راحتها تشبه النجم || يقال ان لبعض انواعه منافع صلبة جليظة، تفيد الامعاء وتقلل الحضم || اعرف انواعه ما يلي.

١٦٤١٧ - صَلْبَانِيَّة بَحْرِيَّة \* ، صَلْبِيَّة بَحْرِيَّة

Cruciella maritima (S). Cruciella maritima (F).

Seaside crosswort (E). Färbewurz, Seeröte (D).

Robbia delle sabbie (I).

عشبة معمرة تكثر بين الصخور قرب الشاطئ البحرية. ساقها فروع متضبة، فروجها اقنية الانتشاب، خلية الصلصال. اثنائها غمية متصالبة، متناية الشكل، متفرقة الطول، تصلها غشش الملمس، بحري اللون، ازهارها ارجوانية، ثوبية الرائحة || ازهارها يستمر من أيار الى تموز.

بعدة البصر يقال انها تبصر البعوضة على بعد عدة متر .  
قوتها الذباب والبعوض والحوام والندل المنح ومعظم الحشرات  
الصفيرة || تقيم وكثاتها في اقواب الصخور الطليقة .  
ركيزتها الرقيق الذي تفرزه يلفسك بالصخر ويجعد بسرعة .  
وكثاتها شبه حلالية الشكل . اناثها تضع من بيضتين الى  
ثلاث بيضات تحضنها نحو اسبوعين || اعرف انواعه  
واشهرها الصلجان البذول .

### ١٦٤٣٤ - صَلْتَجَان مَبْدُول \*

Colocallia nidifica (S). Salangane commune (F).  
Common salangane (E).

طائر من الصلجان . موطنه جزر الزايج وبعض مناطق  
آسية الجنوبية . يألف الحورار والحيادح الثانية || جسمه  
صغير القد ايض القوام ، يطول نحو ١٣ سم . بسطه  
نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الطحلة يسمر في الرأس والظهر  
ويغبر في الصدر والبطن والزيكي . جناحه وذنبه رقة رأسه  
الى السمرة السوداء . ذنبه فارق الطرف . عيناه كبيرتان .  
حنقه عينه سوداء اللون . سباله مستدلة الكثافة والطول .  
منقاره شديد القصر ، مستعرض الشدق ، اعقب الهرة  
كا في الطيور الجارحة . رصفه قصيرة ، عارية ، حمراء  
اللون || طيرانه فائق السرعة . قوته الحشرات الصغيرة  
والذباب والبعوض والحوام || يقيم وكه في اقواب الصخور  
الطليقة . وكه حلالي الشكل والتقصير يشبهه بالرقيق  
الممزوج بالطحالب البحرية والفوقس والاشنة . الاثني  
تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها وسدها نحو  
١٤ يوما بينما الذكر يزين لها الغذاء . وفي الصين ويجزر  
الزايج يتاقنن على اكل وكثات الصلجان ، مطبوخة  
او مسلوقة ، لانها شايقة لا مؤذية .

### ١٦٤٣٥ - صَلْتَج \* Pack (F). Pack (E).

الصلحج كتلة ضخمة من الجليد العائم المتراكم المالح الهائم  
قرب القطب الشمالي .

### ١٦٤٣٦ - صَلْدُور \* هو السلور ، اطلبه .

### ١٦٤٣٧ - صَلْبِي الْبَحْر \* هو كوكب البحر ، اطلبه .

### ١٦٤٣٨ - صَلْبِي الْجَنُوب ، نَعَم \* la Croix du Sud (F). the Southern Cross (E).

صلب الجنوب ونجم اسمان لكونية نجوم واحدة مركزها  
الجنوب فيها اربعة نجوم مزدوجة وضامة ونجم مثلث من  
المرتبة الثانية يدعى « ثير نيم » .

### ١٦٤٣٩ - صَلْبِي الشَّال \* Croix du Nord (F). Northern Cross (E).

صلب الشمال مجموعة من ستة انجم تلاصق كوكبة الدجاجة .

### ١٦٤٤٠ - صَلْبِيَّة \* Sclérite (F). Sclerite (E).

الصلبية ثعلبة جامدة في هيكل الحشرات .

### ١٦٤٤١ - صَلْبِيَّ \* Crucial, Cruciforme (F).

Cross-shaped, Crucial, Cruciform (E).  
على شكل صليب .

وسائر افريقية الشرقية والوسطى . يعيش اسراباً صغيرة  
راوح عددها من ٢٠ الى ٣٠ . يألف الغابات والاحراج .  
قوته الثار والحبوب . يذثن عشه في تجاويف الاجحار .

### ١٦٤٤٢ - صَلْفَاة \* Cirrote: this (S). Cirrocenthis (F). Cirrotenchis (E).

حيوان بحري مفترس وحيد الجنس والنوع من الرضويات  
وفصيلة الصلفاحيات . اعطاه بحار البلاد الباردة اخصها  
بحار الشمال || جسمه بيضي الشكل . زصافه ضيقة  
مستديرة الاطراف . رأسه مستعظم الجرم يعمل ثمانية  
جرامز محطبة ، متساوية الطول ، مجزأة بصف واحد من  
الحاجم . جرامزه واحطتها عنه انتشارها تشكل قمماً كبيراً  
قاعته الغم .



صلفا

### ١٦٤٤٨ - صَلْفَاحِيَّات \* Cirrotenchidae (S). Cirrotenchidés (F). Cirrotenchidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات رأسيات الارجل  
مزدوجات الخوضم . ثمانية الجرامز || لها جنس واحد  
معروف حتى الآن يدعى صلفا .

### ١٦٤٤٩ - صَلْقُوم \* Glycymeris (S). Glycymère (F). Glycymeris (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم  
وفصيلة الصلقوميات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها  
كبيرة مستطيلة المنحابع . عتية الامدادات المنفجرة من  
الطرفين . امدانها شبه بيضيه الشكل ، مستديرة التحزير  
الخفيف || تعيش منفعة في الرمال قرب الشطوط ||  
لحمها مأكولة .



صلقوم

### ١٦٤٥٠ - صَلْقُومِيَّات \* Glycymeridae (S). Glycymeridés (F). Glycymeridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم .  
اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة  
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || تتميز بمشاعها  
المستطيلة وبامدادها الصلبة المنفجرة من الطرفين || اعرف  
اجناسها واشهرها الصلقوم والسكبيك .

### ١٦٤٥١ - صَلْقِين \* هو الخلعة من النباتات الطليقة ، اطلها .

### ١٦٤٥٢ - صَلْبَنَاج ، صَلْبَنَاج \* هو الاقنيلس ، اطلبه .

### ١٦٤٥٣ - صَلْتَجَان \* Colocallia (S). Salangane (F). Salangane (E).

جنس طير من فصيلة الباميات . انواعه المعروفة قليلة  
العدد جميعها من طيور الصين والهند وجزر الزايج . تألف  
الموارع الرقيقة الكثيرة الامات والصدور || اجسامها  
صغيرة القد ، ريشة القوام هيفاء . اجنحتها ذلقة خارقة  
الطول ، اطول قوادعها الثانية . اذناها فارقة الطرف  
عشارية الرقال . عينها كبيرة . سبالها مستدلة الكثافة  
والطول . مناقيرها بالغة القصر ، مستعرضة الاشداق التي  
تحمل في وسطها . تحت رباط اللسان ، جيياً وسيماً  
يستوعب كبة من الحشرات والحوام . ارسافها قصيرة ،  
عارية ، حمراء اللون . اصابعها نليظة . غالبها متقبضة ،  
مقبضة ، حادة الاطراف || طيراتها فائق السرعة . وتتميز



صلتجان مبذول



## ١٦٤٥٠ - صَلْبِيَّة \* Alepocephalus (S).

Alépocéphale (F). Alepocephalus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصليبيات. انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الممتدة الحارة. جميعها لينة تعيش في الاعماق التي يراوح غورها من ٦٠٠ الى ٣٥٠٠ م. تحت سطح الماء || اجسامها مستطيلة ضيقة. تتميز بزوجها المرافقة الممادة الحراشف. اشهر انواعها صليبة المتوسط (Alepocephalus rostratus).



صليبة

## ١٦٤٥١ - صَلْبِيَّات \* Alepocephalidae (F).

Alépocéphalidés (F). Alepocephalidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة. اجناسها المروقة خسة اما انواعها فمديدة. جميعها لينة تعيش في الاعماق البعيدة القور ولا تقترب من السطح الا في نين التسرة || جميع اجناسها مستطيلة الاجسام مستطيلة الرؤوس الممادة الحراشف.

## ١٦٤٥٢ - صَلْبِيَّات \* Cyanocorax chrysops (F).

Cyanocorax à capuchon, Cyanurus à capuchon (F). Cyanocorax chrysops (E).

طائر من فصيلة الغربان. اعطاه معظم مناطق امريكا الجنوبية. يألف الغابات والاحراج الممتدة الانجار. قوته الحشرات والثمار والحبوب || جسمه معتدل القد يعطو نحو ٤٠ سم. رأسه مع القفص والزور الى السواد المائل يفتن حته مع العين الازرق. ظهره وجناحه وذنبه الى الزرقه الجميلة المبلقة بالابيض. جوشه وبطنه وفتحه الى اليباض الناصع || يدن عته في الانجار الزرقه. الاثن تحسن من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يؤن لها الغذاء.



صليبا

## ١٦٤٥٣ - صَلْبِيَّات Céryle-pie (F).

هو الزفران الشائع، اطبا.

## ١٦٤٥٤ - صَلْبِيَّة \* Lathridius (F).

Lathridie (F). Lathridius (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبيات ورتبة غدييات الاجنحة. انواعها المروقة نحو ١٥٠ اعطائها تحت من الشرق الاقصى الى اطراف اروب || اجسامها صغيرة، تقطو من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها صغيرة، ناشزة. قرونها الاستشعارية قلادية. تأثيرها نظامية. ملاسها مستطيلة. كولها وبطنها واعهادها فضلة. اعهادها لافحة. غنية القدم والمؤخر. اولها متباينة الالوان والماجات || جميعها دامتة تعيش في الجفافة والدردي التباي وعل الطحالب والفطور وتحت القشور والحاء.

## ١٦٤٥٥ - صَلْبِيَّات \* Lathridiidae (S).

Lathridiids (F). Lathridiidae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها شديدة الصغر تقطو من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها بارزة. تأثيرها نظامية. ملاسها مستطيلة. قرونها الاستشعارية بالغة الطول و مهدبة و مركبة ١١ فضلة. كولها مضملة. اعهادها لافحة. قرونها شديدة. ارسافها ثلاثية السفل || جميعها دامتة تعيش في الجفافة والدردي التباي وعل الطحالب والفطور || اشهر اجناسها الصليمة والدور.



صليبة

## ١٦٤٥٤ - صَلْبِيَّات Cruciferae (S).

Crucifères (F). Cruciferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفلقات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. معظمها عشبي. اوراقها متناحية. ازهارها نظامية رباعية الفصل والبتلات المنصالية. اسديها سداسية، مفاتها ثنائية الكرايل، ثمارها خربينية. بزورها دقيقة زيتية المادة || وهي تشل الكثير من النباتات البقيلة المشهورة بخواصها المضادة للحفر كالفقون والحدود والبقيل والرشاد والقررة والجرجير.

## ١٦٤٥٣ - صَلْبِيَّة

هي الصليانية، نبات من الفويات، اطبا.

## ١٦٤٤٤ - صَلْبِيَّة \* Sollya (S).

Sollya (F). Sollya (E).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الحليبيات. مهدا بعض مناطق استرالية. سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، متناحية، كاملة، ستانية النصال الجلمدة. ازهارها عشودية التجميع، حاح. ازهارها صغيرة القد، مستطيلة الحمايق النحيلة || لها نوعان معروفان الصلية الحاتكة والصليبة الصغيرة الزهر.

## ١٦٤٤٥ - صَلْبِيَّة صَغِيرَة الزَّهْر

Sollya parviflora (S). Sollya à petites fleurs (F).

نوع من الصلية. ساقها ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها متناطقة، صتيرة النصال، جملة الحصار الاسمع المالح. ازهارها شديدة الصغر و تبني اللون || تنويرها صيفي.

## ١٦٤٤٦ - صَلْبِيَّة هَاتِكَة

Sollya heterophylla (S). Sollya hétérophylle (F).

نوع من الصلية. ساقها ترتفع نحو ٢٠٠ سم. اوراقها جملة الحصار الاسمع المالح، فصالحا هاتكة تقطو من ٣ الى ٧ سم. وتعرض من ٥ الى ١٥ م. ازهارها مستطيلة الحمايق، صتيرة القد، يفضاء اللون || تنويرها صيفي يستمر طوال شهر تموز.

## ١٦٤٤٧ - صَلْبِيَّة، صَوْبَكَة Argent pur (F).

Naked silver (E).

الفضة المصفاة الخامسة.

## ١٦٤٤٨ - صَلْبِيَّة \* Cardilla (S).

Cardille (F). Cardilla (E).

جنس حيوانات بحرية من الرعنويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الصليبيات. انواعها الماصرة المروقة قليلة العدد اعطائها مجامع البحر الاحمر والمحيط الهندي. اسديها شبه قمية الشكل مخدبة، ملعوية اللون المكورة || تعيش لاصقة بالصخور الثقيلة المسق. لينها كثيف المادة قليها.

## ١٦٤٤٩ - صَلْبِيَّات Cardillidae (S).

Cardillids (F). Cardillidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعنويات صفيحيات الخياشيم وانواعها الماصرة المروقة قليلة العدد جميعها جنس واحد. اسديها شبه قمية الشكل، مكورة اللون الدقيقة. اجسامها صغيرة وطاقها كلك. متجمراتها كثيرة الاراضي المائية.

Mesodesma (S). ١٦٤٦٧ - صُمُورٌ \*

Mésodesme (F). Mesodesma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الصمريات. أنواعها المماصرة المرفقة نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة مقسرة المصاب. أصدافها محجمة الشونز أو بيضية. تعيش لاسقة بالصخور القريبة من السطوط.

Mesodesmatidae (S). ١٦٤٦٨ - صُمُورِيَّاتٌ \*

Mésodesmatidés (F). Mesodesmatidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم أجسامها المماصرة المرفقة قليلة المدد جميعها صغيرة القد، بيضية الشونز أو محجمة. تتميز بقصر شاعها وبصغر أرجلها الشديدة التطيل || أشهر أجناسها الصمور.

١٦٤٦٩ - صُمُورٌ \*

Haplocerus montanus, Oreamnus montanus\* (S).

Haplocère montagnard, Oreamne montagnard (F).

Oreamnus of Kennedy (E).

حيوان لبون عاشب مجتر ووحيد الجنس والنوع من ذوات الأضلاع، عجوزات القرون. موطنه الجبال الريفية النائية وبعض الأصقاع الثلجية ومنها أسكا || جسمه صغير القد وبمئة يطول نحو ٨٥ سم. ويرتفع نحو ٥٥ سم. قرنه يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رأسه مع العينين والأذنين والقرنين كراس الطي. جسمه كبير الماعز. أذناه مستطيل الأطراف. عيانه وقرناه إلى السواد الحالك. شعره مستطيل يكتسي كامل الجسم. لونه إلى البياض الناصع. فرع الانثى ثنائي الخلف. يحملها يدم نحو ستة أشهر تضع عنه ثمانية صغيراً واحداً || أجله قليل العدد إلى فصل الشتاء الذي يستمر من تشرين الثاني إلى أواخر آذار.

Gomme (F). Gum (E).

١٦٤٧٠ - صَمُغٌ

مادة لزجة دابقة عادمة الطعم والرائحة تفرزها بعض النباتات إيا طينياً أو بتأثير حالة مرضية. لذلك الصمغ عديد الأشكال، مختلفة التركيب وهي تقسم عادة إلى قسمين: قسم الصمغ القابلة للذوبان في الماء. وقسم الصمغ التي تنحصر الماء. أشهرها الصمغ العربي الذي يستخرج من السنط وهو شائع الاستعمال ويدخل في معظم المستحضرات الطبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.

١٦٤٧١ - صَمُغُ الدُّبَابِ

هو الطلوك الآخر. اعلم به.

Durrir (F). To harden (E). ١٦٤٧٢ - صَمَلٌ

صمل الشجر: لم يجد رياً فحش.

Sphinx (F). ١٦٤٧٣ - صَمَلٌ، أَبُو الْهَوَلِ

Hawk-moth (E).

جنس حشرات من فصيلة الموليات، أنواعه نحو ٦٠ منتشرة في جميع الأصقاع المالئة. معظمها من الفراشات الدجوية المتوسطة الحجم أو الكبيرة. أجسامها مدونة الشكل. وراشها كبيرة مزخرفة. قرونها الاستشعارية قلاوية. برقاتها كبيرة القد، مرطاه الجسم. عذارياتها عارية || أشهر أنواعه الاقتصادية التي تركب النبات ما يتبع.

Sphinx ocellata (S). ١٦٤٧٤ - صَمَلُ الْحَدَائِقِ \*

Sphinx demi-paon (F).

فراشة كبيرة القد غليظة الجسم، تطول نحو ٤ سم. ثوبها

Conduit auditif (F). ١٦٤٥٦ - صِمَاخُ الْأَذُنِ

Cavity of the ear (E).

قناة الاذن التي تشكل صلة الوصل بين القسم الخارجي والداخلي.

Héliotropisme (F). ١٦٤٥٧ - صِمَارَةٌ \*

Héliotropism (E).

أثر اتجاه الضوء في انتهاء النمو النباتي. لذلك فهو يدعى إيجابياً عندما يكون النمو باتجاه الضوء وسلباً عندما يكون في الحالة الماكسة.

١٦٤٥٨ - صِمَارِيَّةٌ، صِمِرِيَّةٌ مَبْدُولَةٌ

Picaret commun, Gerret (F).

مخكة بحرية تدعى شذامة مبدولة، اعلم بها.

١٦٤٥٩ - صِمَامٌ

Soupage (F). Valve (E).

١٦٤٦٠ - صِمَانٌ  
راق من التراب صلب الحبيكة نشطت بعض المواد العضوية أو أكسيدات السيليسيوم أو كربونات الكلسيوم أو هيدروكسيدات الحديد.

١٦٤٦١ - صِمَّةٌ

Sous-espèce (F). Sub-species (E).  
تأتي الصمة في تصنيف الاحياء بين النوع والغرب وقد تشمل عدة غريب كان ان النوع يشمل بعض الصم.

١٦٤٦٢ - صِمِرَاعٌ \*

Lutraria (S).

Lutraire (F). Lutraria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المقتربات. أنواعها المماصرة المرفقة نحو ٣٠ معظمها من علم البحر الأبيض المتوسط || أصدافها الحلجيلة الشونز، متساوية المصارع لانساقوية الاضلع، مخددة الصقعة البيضاء الملوحة بالانحصر والاحمر || تعيش منفردة في البرمال المنفردة بالما. يكثر وجودها قرب مصبات الانهر.

١٦٤٦٣ - صِمِرَانٌ

Peneae (S). Pénée (F).

جنس نباتات جنينية برية من فصيلة الصمريات. أنواعه قليلة، منها البلاد الحارة جميعها باقية يستخرج من حن لحاء سوقها عصارة صمغية طرية تستعمل في العلاجات الخارجية أعصها الجروح. ويقال انها تشد الجلد وتزيل جميعه.

١٦٤٦٤ - صِمِرَالِيَّاتٌ

Peneaceae (S).

Pénéacées (F). Peneaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الثلقين قديمة القعالات مرتفعة البيض. أشهر أجناسها الصمران.

١٦٤٦٥ - صِمِرِيَّصٌ

مخكة بحرية تدعى شذامة، اعلم بها.

١٦٤٦٦ - صِمَعَاءٌ

Aotus (S). Aote (F).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البذراريات وفصيلة القرنيات الفرشية. أنواعه قليلة جميعها جنبات قرها شاذكة قليلة الأوراق الملطية الشكل الصغيرة القصد. ازهارها عتقية تاجية صفراء اللون، ويقال انها تغيد الجروح وتقي على عملها.



صم



صمور



صمل الحداثق

اسود.. حبيبتها وردية المراج يعلوها حصار بني يتنهي عند الرأس. رواشها موشغة وبجدة || رقبها مستطيلة الشكل سمراء اللون تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول. تركب اهاب جميع الصنوبريات.



صمل الحور

١٦٤٨١ - صَمَلُ الْقَرْبِيِّينَ هو صمل التبرعم، الحلب.

١٦٤٨٢ - صَمَلُ الْكَرْمَةِ\*، أَبُو الْهَوَلِ الْأَغْبَرِ *Pergesa elpenor*, *Chaerocampa celerio* (S). *Sphinx de la vigne* (F). White-lined sphynx (E).

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٢ سم. جسمها مردني الشكل، ثوبها الى الصبغة الصانبة السدء المراج. رواشها موشغة بالاسمر والوردي الليلكي. توضعها قلمي مفرغ. رواشها الاماميان مهديان باطار فضي || رقبها مستطيلة الشكل، شديدة الخضار تحمل على جانبي رقبها البنية بقما سود يحويها اطار اصفر. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول. تركب اوراق الكرمة فتؤذيها.



صمل الكرمة



صمل الزيتون

١٦٤٨٣ - صَمَلُ الْكَرْمَةِ الْمُحَطَّطِ\*، دَلِيلْفِيلَة

*Dallephila livornica* (S). *Dalléphila de la vigne* (F). فراشة عجولة طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصبغة السمر، يقطب بطنها اربعة خطوط متوازية سيد ويبض. رواشها موشغة يختلف الالوان يكثر فيها الاحمر || رقبها كبيرة القد خضراء اللون. تبيج ظهرها احر الخط يكتنفه من كل جانبيه غطان اصفران يتخللها بقع سود نظامية تملئ جميع التراج. تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اواخر آب. تركب اوراق الكرمة تصطبها وقد تعمرى الكرمة من اوراقها اذا كثر عددها.



صمل السديان

١٦٤٨٤ - صَمَلُ اللَّيْلَابِ\*، أَبُو الْهَوَلِ الْأَفْنَعِ

*Sphinx convolvuli*, *Hersa convolvuli*, *Protoparce convolvuli* (S). *Sphinx du liseron* (F). فراشة عجولة تجوب البلاد. طولها نحو ٤ سم. ثوبها الغالب ربادي اللون. رقبها غططة وبجدة بالاسود، ملتقى تجديفها يكون رقم ٨ || تركب اوراق الليلاب والبطاطا وغيرها.



صمل الصنوبر

١٦٤٨٥ - صَمَلُ النَّحْلِ Gallieria (S). Gallérie (F).

جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفصيلة التاربات. انواعه عديدة بعضها يتسمل على خلايا النحل فيدخلها ويمنع تكثره ايتها استطاع يفتنق عن مبركات دقيقة تحفر سراديبها وانفاقها في التخاروب تصلف الرصع وتبريق السمل || اشهر انواعه المزدية اثنان: صمل النحل الصغير وصمل النحل الكبير.



صمل الكرمة

١٦٤٨٦ - صَمَلُ النَّحْلِ الصَّغِيرِ\*، نَارِيَّةِ الشَّمْعِ

الصغيرة *Galleria alvearia*, *G. grisella*, *Meliphora grisella* (S). *Alveicole*, *Taigne de la cire* (F).

فراشة من فصيلة التاربات صغيرة القد، وكيفية الحراشف طويلة الرواشن، ربادية الثوب تقضم نخلات وتلايا النحل حيث تحتج مكها على التخاروب يفتنق عن رقات نمة تفكك بالشمع وتغني على الرصع والسمل.



صمل الكرمة الخطط

١٦٤٨٧ - صَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِيرِ\*، نَارِيَّةِ الشَّمْعِ

الكبيرة *Galleria cerella*, *G. mellonella* (S). *Gallérie de la cire*, *Fausse-taigne* (F).

فراشة من فصيلة التاربات كبيرة القد، كثيفة الحراشف



صمل الليلاب

الى الصبغة الصانبة يعلوها تجديف، ارد اللون. جناثها حنطية. رواشها الاماميان مزخرفان وموشحان. رواشها الخلفيان موشحان بالحمرة وتعلو كل واحد منها بقعة بيضية الشكل، سمراء اللون، يفضاء الحمار الداخلى، سوداء الحمار الخارجى المتعرض || رقبها خضراء اللون، سوداء المتجدد تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اواسط تشرين الاول. تركب اوراق جميع الانجار المثمرة، وقد شوهت على الصفصاف والحور.

١٦٤٧٥ - صَمَلُ الْحَوَرِ\*، أَبُو الْهَوَلِ الْمُوَشَّحِ

*Amorpha populi* (S). *Sphinx du peuplier* (F). فراشة متوسطة القد، طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الطحلة الغبراء. رواشها موشغة ومزخرفة بالاسمر والحنطي والوردي والالايف || رقبها غبراء اللون، خضراء المراج، تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول. تركب اوراق الحور والصفصاف والبتولا.

١٦٤٧٦ - صَمَلُ الدَّقْنِي\*، أَبُو الْهَوَلِ الْمُبَجَّجِ

*Daphnis nerii* (S). *Sphinx du laurier-rose* (F). فراشة عجولة تجوب البلاد. كبيرة القد، موزنية الشكل طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة الصانبة المراج يعلوها تبيج وتوشع وزخرفة وتزيين وتجديف. جملة الاشكال والالوان يقطب فيها الاخضر || رقبها كبيرة القد خضراء اللون سمراء الظهر والمذب تظهر في اواخر تموز وتبقى حتى اوائل تشرين الاول. تركب اوراق الدقل.

١٦٤٧٧ - صَمَلُ الزَّيْتُونِ\*، أَبُو الْهَوَلِ الْمُبَسَّعِ

*Mimas eilliae* (S). *Sphinx du tilleul* (F). فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الصبغة الحنطية. رواشها مبسفة ومزخرفة بالايخضر والاسمر. رقبها صغيرة القد سمراء اللون مجعدة بالاسود. تظهر في تموز وتبقى الى ايلول. تركب اوراق الزيتون والدرادر.

١٦٤٧٨ - صَمَلُ السَّمْسَمِ\*، أَبُو الْهَوَلِ الْأَسْمَرِ

*Acherontia atropos* (S). *Sphinx tête de mort* (F). *Death's head moth* (E). *Totenkopf* (D).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبغة البنية يعلوها تجديف مفرغ. حبيبتها سمراء اللون يتوسطها شبه هيكل تملو جمجمة. رواشها غططة وبجدة ومزخرفة بشي الالوان || رقبها في اطوارها الاول تكون خضراء اللون ثم تتحور نحو الزرق. تتميز بطن اسودين يركبان الرأس من جانبيه. طولها عند اكتمال نموها يبلغ ١٥ سم. خادتها تطول نحو ٥ سم. لونها الى البني المايق || الحشرة الكاملة تقضم المناسل الضعيفة تفقد التخاروب وتلق السمل. اما القتره تركب اوراق السمس والبرتيت والبطاطا ومعظم نباتات الفصيلة الباذنجانية. تظهر عادة في تموز وتبقى حتى تشرين الاول.

١٦٤٧٩ - صَمَلُ السَّنْدِيَّانِ\* *Marumba quercus* (S). *Sphinx du chêne* (F).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصفار التبي. رواشها موشغة بالاسمر والوردي || رقبها مستطيلة الشكل حنطية اللون. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول. تركب اوراق السنديان على اختلاف انواعه.

١٦٤٨٠ - صَمَلُ الصَّنَوْبَرِ\*، أَبُو الْهَوَلِ الْهَوَسِيِّ

*Hylocius pinastri* (S). *Sphinx du pin* (F). فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. جسمها صتالي اللون يعتمره تجديف كستي ويقطبه غط حنطي يتوسطه سلك



صَمَلُ النَحْلِ الْكَبِيرِ



صَمَلُ الْيَاسَم



صَمَلَةٌ



صَمِيلَةٌ



صَمِيلَةٌ

## ١٦٤٩٥ - صَمُوح

Bulbille (F).  
Bulbil, Bulblet (E).

اسم تعريفي يطلق على الزمرة الهوائية المحرقة الصلبة التي تظهر غالباً في أبط الورقة والتي يفصلها عن النبات الأم وبزهرها في التربة تنمو وتنمو.

١٦٤٩٦ - صَمُوحَةٌ شَهْبَاءَ (F).  
Punalea grisea (S).  
Punalea grisea (F).

حشرة من فصيلة القاسيات. جسمها صغير القد، مفلطح، بجني الشون، بطول نحو ٨ مم. ثوبها الى الصفار الشبيبي تملوه شحمة ارجوانية وبشبر اسمر ما يجعلها اشبه المواج. رأسها غروطي. خطمها معتدل الطول. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كسولها قوي الشون. حقيقتها مدببة الطرف. ظهرها اغبر اللون. قشرها شفاف. يعلو الى الشبهة يعلو في حثارة تجلج اسود || مرمتها اوراق الاشجار الحرجية والزراعية باستثناء السنوبريات || رأتها كريمة.

١٦٤٩٧ - صَمِيدَةٌ (F).  
Somide

تعريف عام يطلق على كل جسم مادي مركزه ضمن الخلية يتأثر بعامل الجين السببي.

١٦٤٩٨ - صَمِيل (F).  
Scarieux (F). Scarious (E).

نمت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل ما هو رقيق، جفيف وشبه شفاف أو منفش.

١٦٤٩٩ - صَمِيلَةٌ (F).  
Amphisil (F). Amphisil (E).

سمكة بحرية بيوض من شالكات الزعانف وفصيلة الزراقيات. موطنها يمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي فالهادي || جسمها مستطيل الشكل، قليل المرض، بطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الخضار البحري تملوه مابة فضية. رأسها صغير الحجم. مستطيل الخط الاسفيبي الشكل. زعنفتها الظهرية ذيلية الارزكاز، مستطيلة المنخفض الطرفي. الحاد || من مزاتها انها تنفخ بطنها، الانبوبي الطرفي، ككل الهوام الحامئة فوق سطح الماء لتنعق فيه فتفترسها || لها متوسط الصنف مأكول.

١٦٥٠٠ - صَمِيلَةٌ (F).  
Thyris (F). Thyris (E).

حشرة من فصيلة الصمليات ورتبة حشرقيات الاجنحة. اطاحتها تشمل بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف الموائع التي تكثر فيها المعلومات || جسمها صغير القد، شبه اسطواني الشكل. بسطها نحو ١٦ مم. رأسها مكور. عينها صغيرتان. زباناها مشطيان. خطمها معتدل القد. ملابسها مستطيلة. اجنحتها مبقعة وبديعة. بطونها متكاثفة السهف الدقيق. ظنايبها الخلفية رباعية المناسخ || سرقتها كثيفة، لائحة، تميش على وزن النصال وقد تحول النصال الى لغافات شبيهة بالابواق.

١٦٥٠١ - صَمِيلَات (F).  
Thyrididae (F). Thyrididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠٠ منتشرة باكثريتها في المناطق الاستوائية من المالين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، صلبة، شبه اسطوانية الشكل. بسطها تراوح من ١٥

للبدية، مستطيلة الراوش المزركشة. ثوبها بني اللون تملوه رشفة سمراء. تقتسم قفاران النحل وتضع مكبا على التخراب فينتفخ عن رقات حاجية دقيقة لا تلبث ان تكبر فيفسر لونها ويبلغ طولها نحو ٣ سم. وهي تميش كامل حياتها العريقة على شمع التخراب تنفضي عليه.

١٦٤٩٨ - صَمَلُ الْيَاسَم\*، أَبُو الْهَوَلُ الْمَجْدَعُ  
Sphinx ligustri (S). Sphinx du trône (F).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الوردية يمتزجه بتجميع اسود ويقلبه خط حطلي يملوه سلك اسود. حجبها حطلية اللون تملوها جناة سمراء يحرقها حثار اسود. رواشها مزرقعة ومجذعة || رقتها كبيرة القد غليظة، ثوبها الى الصفرة الخضراء يمتزجها تجلج ابيض ونقط حر || تظهر في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران. تركب اوراق الياسم والليلك والازديخت.

١٦٤٩٩ - صَمَلُ الْيَتُوع، صَمَلُ الْقَرِيْبُون، أَبُو الْهَوَلُ الْمَحْطَطُ  
Celerio euphorbiae, Dellephila euphorbiae (S).  
Sphinx de l'euphorbe (F).

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الوردية السمراء. رواشها بجيلة التخطيط والتجيج والازخارف البيض والخضر || رقتها سوداء اللون، يبيض النشة الدقيقة، صفراء النقط الرجعية، حراء الخط التجبي القاطب، صفراء الخط البطني الجانبي، سوداء الملب. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول، تركب اوراق اليتوع.

١٦٤٩٠ - صَمَلُ غُيُور (F).  
Sphinx impressé (F).

فراشة من حشرقيات الاجنحة تدعى ابو الهول المبول، اطلبها.

١٦٤٩١ - صَمَلَاخ (F).  
هو "الآن"، اطلبه.
١٦٤٩٢ - صَمَلَةٌ (F).  
Amphidesma (F). Amphidesma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات انجاشيم وفصيلة المتحريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. اصداها شبه مستديرة الشكل، قليلة الالوان، ثنائية الصاربع، وحيدة اوثائية الانسان الصغيرة. تميش لاصقة يصخور المجاحد المغمورة بالماء. لفتها قليل المادة والكتافة.

١٦٤٩٣ - صَمِيلَات، هَوَلِيَّات (F).  
Sphingidae (F). Sphingidae, Sphinx moths, Hawk moths (E). Schwärmer (D).

فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة المختلفة الزايف. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ معظمها من الفراشات الدبوية المسرح. اشهر اجناسها الفصل.

١٦٤٩٤ - صَمِيل (F).  
Myosotidium nobile (S).  
Myosotidium remarquable (F).

نبات عشبي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحمحما. ساقه متعصبة زياة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه لحمية كبيرة شبه قلبية الشكل تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. نصلها بجيلة الخضار الزاهر. ازهاره عنقودي التجميع المتكاثف. ازهاره صغيرة الحجم، زرقاء اللون، عادمة العرف || تنويره ربيعي.

### ١٦٥٠٧ - صِنَاء التَّبَع\* ، تَسْنَة التَّبَع ، مِلْدِيُو التَّبَع ، عَفْلَوْنَة زَرْقَاء

*Peronospora tabacina* (S). Mildiou du tabac (F). Blue-mold (E).



صمباء

وصم فثاك سريع الانتشار يركب التبغ فيفشي عليه وقد يصيب جميع التبروغ البرية والأزبينية والفيلقية || سببه فطر مجهري من الصناء بونه كروي الشكل، فطره راوح بين ٢٧ و٤٦ م. يتفله الريح على أبعاد شامة فينكأثر حيث يستطيع التطفل وحيث تلامسه البيئة || مظهره الخارجي على التبغ يقع خلية ليدة لا نظامية التشتيت تملأ بشره الساق وصمغة النصل السفلي فتغير مزاج لونها من الأخضر الى الاصفر فالوردي فالصنابي فالبنفسجي وهو يعطب التسح والخلايا ويسبب ذبوا وييسها || نشأته يزودج في البيئة الرطبة المتفاوتة المراتين القصوى والدينا. وهو اذا أصاب النبات في المراحل الأولى وأما الشتلات. وإذا أصاب الشتلات للمروسة في الحقل شوه أرقاها واذلها وحال دون النمو الطبيعي وقد يفضي عليه فيا اذا استحك كامل الأوراق.

صناء الاسبانغ



صناء البصل



صناء التبغ



صناء الشوندَر

- ١ - بتغير مركز الماشال التي ظهر فيها الصناء او بتغير تربة الاكواد ان حراريا او كيمياويا .
- ٢ - يتطهر زور التبغ بمحلول سلفات النحاس المركز ١٠ ٪ قبل استعمالها بمدة وبميرة .
- ٣ - باجتنب البذار الكثيف وذلك باستعمال غرام واحد من البذر لكل متر مربع من الاكواد المشتل .
- ٤ - باجتنب الزراعة في الاماكن الرطبة او الظليلة .
- ٥ - بتخفيف كثافة الزراعة اي عدد الشتلات بالمتر المربع .
- ٦ - باستعمال الفوطير الوقائية التي تمنع انتشار الروم او تحول دون انتشاره . نخس منها بالاكور المائب والزيتاب والبوليرام على اختلاف اشكاله ولائذنا كولي .
- ٧ - بتلف شتلات الاكواد المصابة عنه تعشي الروم .
- ٨ - بتلف جميع الشتلات ان سلبية او معابة فور الانتباه من قطاف الأوراق .

### ١٦٥٠٨ - صِنَاء الخَشْفَخَش ، مِلْدِيُو الخَشْفَخَش

*Peronospora arborescens, Botrytis arborescens* (S). Mildiou des papavérées (F).

وصم فطري يصيب الخشخاش في جميع اصفاته المواتية وفي جميع اطوار نموه من الايداب والحلب الى الانزهار والاعمار || يركب الاوراق فيشوها بعد ان يمجمها ثم يحول اخضرها الى المصبة باعثة تملأها عمرات الفلعل الحلبية، الحللاء اللون، البنفسجية الملوح || وهو على السوق يقع مستطيلة لا قياسية الحجم تقرح البشرة بعد ان تشفيها بهرساته الحلبية الرابدية اللون || يكافح باستعمال احد مركبات البوليرام او غيره من الفوطير القمالة .

### ١٦٥٠٩ - صِنَاء الشَوْتَدَر\* ، مِلْدِيُو الشَوْتَدَر

*Peronospora schachtii* (S). Mildiou de la betterave (F). Downy mildew of beet (E). Falscher Mehltau der Rübe (D).

وصم يصيب مشر الشوندَر وأوراقه الفتية فيمنعها عن متابعه نموها او يحول دونه فتبوه الاوراق المصابة سفيرة . لقد ، مشوهة الشكل ، بنفسجية اللون ، سريفة العطب . سببه فطر مجهري من الصناء مظهره الخارجي يقع لا قياسية

الى ٢٠ م. رؤوسها شبه مكورة . عيرتها سفيرة . قرونها الاستشمارية غيطية . ملاسها مستطيلة . اعطاشها كبيرة . بطونها متراكبة السهف الدقيق . مرزاتها مستطيلة . اجنحتها مشرشرة الخثار ، عادمة التهديد . اقولها منزوعة || اساريها كتيبة ، غاشلة ، تموش ضمن لغافات من الورق بوقية الشكل || اشهر اجناسها الصيلة .

### ١٦٥٠٢ - صُمَيْمَاء\* ، Adnóstome (F).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الورديات . انواعها المهرقة قليلة العدد . سوقها فرعاء . اوراقها خسية التجميع ، شديدة الصغر ، عصفية الشكل . ازهارها عقودي . ازهارها مستطيلة الكلوس ، خماسية البتلات ، خافتة العرف المستحب ، يصفاه اللون او صفراء .

### ١٦٥٠٣ - صِنَاء ، Peronospora (S).

جنس فطور مجهري من عمارة الوصنيات وفصيلة الصناليات. انواعه عديدة تتميز بحيطوها البوقية المتشعبة المتشعبة الانفصال . اطرافها شفعية ، ثنائية ، لا متساوية . منجيبها عديد المراتش المتشعبة . تكاثرها غيطي بوني . اشهر انواعه واضرها ما يلي .

### ١٦٥٠٤ - صِنَاء الإسْبَانْغ\* ، مِلْدِيُو الإسْبَانْغ

*Peronospora spinaciae, P. effusa* (S). Mildiou de l'épinard (F).

وصم فطري يصيب اوراق الاسبانغ فيعطلها وقد ييبب تسببها || سببه فطر مجهري من الصناء مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ، منها المستدرة والبشبية . فطرها رراوح بين ١٠ و ٢٠ م. تركب النصل في رته او بجذاه مرققة فتبدو على الصفة العليا تيجع مرتفع عادم اللون يقابله على الصفة السفلى تجويث خلي البشرة ، احمل اللون ، بنفسي المواج || يكافح باستعمال احد الفوطير القمالة اخضرها مركبات البوليرام || ومن اتبع طرق الوقاية اجتناب الكثافة . والرطوبة .

### ١٦٥٠٥ - صِنَاء الزَرْبَاء ، صِنَاء الحَبَلْبَان

*Peronospora viciae* (S). Mildiou des pois (F). Downy mildew of peas (E). Falscher mehltau der erbsen (D).

وصم فطري يصيب اوراق النباتات البقرية اخضرها الجلبان والزرباء والبيقية والفول والحصص || سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية حملاء اللون ثم تبيل الى السرة تحلب الاوراق وتسبب يلسها . يكافح باستعمال مركبات البوليرام والزيتاب .

### ١٦٥٠٦ - صِنَاء البَصَل\* ، Peronospora schleideni, P. destructor (S). Mildiou de l'oignon (F). Blight of onions (E). Falscher mehltau der Zwiebel (D).

وصم فطري يصيب البصل في اوراقه الفتية وفي شرايحه الزهرية فيعطلها || مظهره الخارجي يقع بيشية الشكل لا قياسية الحجم ، صفراء اللون ، خلية الخثار البنفسجي المواج ، تركب الاوراق قسيب ذبوا الباكور وتركب الشرايخ فتقرحها ومنعها من ايصال التسح الى الزعام فتصلن || يكافح باستعمال المركبات التحمية الخففة او مركبات البوليرام والزرنياب .

١٦٥١٨ - صِنَاءَجَة ، مَامُوث ، مَعْمُود Elephas primigenius (S), Mammouth (F), Mammoth (E).

نوع من القيلة البائدة التي عاشت الانسان في احياله الفاضلة العائدة الى ما قبل التاريخ . وجدوا بعض جثثها واقفة على قوائمها محفوظة من عيب الزمن في مناجل سيرية وفيها من بلاد الشرق .

١٦٥١٩ - صِنَاءَجَة Séplon (F).

الصناع صدفة داخلية موجودة عند بعض الرخويات كالخيار . وهو جسم بيضي الشكل المستطيل ، محدد الصفحة العليا ، ابيض اللون ، يتكون من مواد عضوية مزوية بكريونات الكلس . وهو شديد الخفة اي قليل الوزن النسبي لانه كثير الفجوات التي يجتمع فيها الازوت والحامض الكربوني .

١٦٥٢٠ - صِنَاءَر Platan d'Orient (F).

هو الدلب الشرقي ، اطلبه .

١٦٥٢١ - صِنَاءَرَة

هي الشمس ، تستعمل لصيد السك .

١٦٥٢٢ - صِنَاعَات زَرَاعِيَّة

Industries agricoles (F), Agricultural industry (E).  
الصناعات التي تصالغ المواد الالوية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والبطور والزيوت .

١٦٥٢٣ - صِنَاءَعَة ، كَيْش ، رَقْلَبَة Fascine (F), Faggot (E).

اغصاب ورغصان وما اشبه توضع في وجه الماء لتحويل قس منه الى مجرى آخر .

١٦٥٢٤ - صِنَاءَعَة التَّخْمِير Zymotechnie (F), Zymotechnics (E).

١٦٥٢٥ - صِنَاءَعَة الخَمْر Vinification  
علم صنع الخمر وحفظها وتجويدها .

١٦٥٢٦ - صِنَاءَعَة السِّال Vannerie (F), Basket-making (E).

تشمل كل ما يصنع بقصبان الصفصاف والخيزران والاسل وغيرها من سلال ومناسف ، الخ .

١٦٥٢٧ - صِنَاءِكَة Totalité (F), Totality (E).

١٦٥٢٨ - صِنَاءَر مَبْدُول \*

Crioccephalus rusticus (S), Crioccephalus rusticus (F), Crioccephalus rusticus (E).  
حشرة خاشبة من فصيلة القرنيبات ورتبة مفدمات الاجنحة . اعطائها معظم مناطق الصنوبر || انثا اكبر قداً من ذكرها فتطول من ١٨ الى ٢٥ م . اما ذكرها فتطول من ١٢ الى ١٧ م . ثوبها الى اسرة الخنطية الحفره الموج . سرسها دجوي يستقر من الغروب الى الشرق || تظفر في اوائل حزيران ويشتد حتى اواسط تموز . تمتع مكها في شرق لحاء الاجبار القائمة والمقطوعة فينتفع من يرقاات دقيقة صغيرة تتطور وتكبر بسرعة وتندبر للواء والشكير الى ان يحل زين الاكمال حيث تتحول الى حوريات ونها الى حشرات جلجلة تهر السرايدب في

الشكل لونها الى الطحلة ثم ينحرف ويستقر على السرة . يكافح باستمال الفواطير المركزة على النحاس .

١٦٥١٠ - صِنَاء الصَّلِيَّات \*

Peronospora brassicae, P. parasitica (S), Mildiou des crucifères (F), Downy mildew of crucifers (E), Falscher Mehltau der Kreuzblütler (D).

وصم فطري يصيب سوق وفروع واوراق وازهار نباتات الفصيلة الصليبية اغصنها اللث والكربز والملفوف . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية غبراء اللون ثم تتحرف الى السرة تشبه الفروع والاوراق والازهار || يكافح بكثيره من الصناء باستمال مركبات النحاس .

١٦٥١١ - صِنَاء القَنْب

Peronospora cannabina (S).  
وصم يصيب اوراق القنب سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية صفراء اللون ثم تحنطية تعطب نسيج الاوراق وتصب يباسها .

١٦٥١٢ - صِنَاء النَّقْل

Peronospora triflorum (S), Mildiou des trèfles et luzernes (F), Downy mildew of alfalfa and clover (E), Falscher Mehltau der Luzerne (D).

وصم يصيب اوراق النفل والقمصة والوطس . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية لا قياسية الشكل والترتيب لونها الى الطحلة يملوها موج بنفسجي تركب فصل الاوراق وتصب يباسها || يستحسن حتى النباتات المعالجة عند ظهور المرض وان تصادر الخش لسبب جوهري فلا مانع من استمال الفواطير النحاسية شرط الانتعاش عن الخش قبل مرور ١٥ يوم على المكافحة .

١٦٥١٣ - صِنَاء الِوَرْد ، مِيلْدِيُو الِوَرْد

Peronospora sparsa (S), Mildiou du rosier (F).  
وصم فطري يصري الورد في اغصانه المراهية اغصنها الاوراق فيؤذيها وقد يشوهها دون ان يقضي عليها بكاملها . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع صغيرة القد ، مزوانية الشكل ، جزوية اللون ، بنفسجية الموج ، تركب حنار الاوراق واسنانها ولحاء الانداد الفتية وممايج الازهار فتفترسها وتصلبها || يكافح باستمال الفواطير النحاسية او غيرها من الفواطير المركبة الحديثة .

١٦٥١٤ - صِنَاءِيَّات Peronosporaceae (S), Peronosporaceae (F), Peronosporaceae (E).

فصيلة الفطور العنائية من مرتبة التشنيات ورتبة اليغيات || تشمل ثلاث عمارات : الخمصيات والنباتيات والوئصيات . اما اجناسها وانواعها فعديدة منها التسة والخصيف والصناء والمصيل واللغة والنباغ .

١٦٥١٥ - صِنَاءَب Cardamina (S), Cardamine (F).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه نحو ٦٠ منها الحولية والخلولة والعمرة . اوراقتها مركبة متعاقبة حريفة المذاق . ازهارها بيض او وردية .

١٦٥١٦ - صِنَاءَب الماء Cardamine des prés (F).  
هو حرف الحقل ، اطلبه .

١٦٥١٧ - صِنَاءَب يَتْرِي هو حرف السطوح ، اطلبه .



صناء الصليبيات



صناء الورد



صناء



صنابر مبدول

## ١٦٥٣٥ - صَنْجِيَّةٌ \* ، أَفْتُونُ ، ذَاتُ الْأَجْرَاسِ ذَاتُ الصَّلَاحِلِ ، كِرَوَاتِل

Crotalus (S). Crotale, Serpent à sonnettes (F). Rattlesnake (E).



صنّاط

جنس حيات غيضة من فصيلة الصنجيات لها في أذنانها ما يشبه الحراشف تحدث ما تحرك أو تلتصق الشيء صرًا كصوت الصنج || يكثر وجودها في البلاد الأمريكية . يقطن عليها في الأماكن الموبوءة بترية الخنازير لأن الخنزير يقتل عنها ويقتلها ولا تستطيع إليه سبلًا لأن سمومها لا تسري في جلده .

١٦٥٣٦ - صَنْجَابٌ ، صَنْخِر  
هو الجمل الصّخّم الثّنين : (F). Chameau gros et gras

١٦٥٣٧ - صَنْخَةٌ ٥ طَرْشِيلِيَا ٥ Tranzschelia (S).

جنس فطور مجهرية قريبة الشبه من الصنادية . تتميز بغطائها البويي المردى الشكل الدقيق الانتشاب والغليظ اللّفة . مساهمها السّلمية عديدة استوائية الإرتكاز . ذنبها كثيرة الدعامات الرّزمية التجميع . دعاماتها مؤلفة من خليتين لا متجانستين السّفل أسطوانية الشكل والعليا كروية . أغصينها منفصلة || أنواعها الاقتصادية قليلة أشهرها صنخة الخوخ .

## ١٦٥٣٨ - صَنْخَةُ الْخَوْخِ ٥

Tranzschelia pruni-spinosae, Puccinia pruni-spinosae, Accidium punctatum (S). Rouille du prunier (F). فطر مجهرى يتطفل على معظم اللوزيات أصعبها الخوخ والمشمش والدراقن واللوز فيعطب الأوراق ويضعف الأشجار ويؤذيها || مظهره الخارجي يشور صغرة جزئية اللون لا قياسية التجميع تركيب النصل على صفحتي السّفل بين المروق والفصل تفجر البشرة بد أن تعطب التسج . نائبا ينفع الأشجار التي كان ظهر على أوراقها الرسم واحد القوامير الفعالة الشديدة الانحياض والانصاق تروا بعد الإزهار .

١٦٥٣٩ - صَنْدَرَةٌ ٥  
Luciopeca sandra (S). Sandre (F).

سمكة نهريّة من القرعيات شائكات الزعانف . أعضائها قسيمة الأجزاء تشتمل معظم أهر البلاد المتخلة الحارّة المتحرقة نحو الباردة || طولها بأرّاح من ٨٠ إلى ١٠٠ سم . ثوبها إلى الخضار الزّيتي يبلعها من جانبها توضح أسير يزداد إسمرازا مع اقترابه من شبح الظّهر || لحمها جيد الصّنف مرغوب فيه .



صنخة الخوخ

١٦٥٤٠ - صَنْدَلُ  
مجموعة من خيوط البتج الجاف يراوح عدد مشاكبيها ما بين ٣ و ٥ ح . صندل .

١٦٥٤١ - صَنْدَلُ هو أرقية الصنوبر ، الطلها .

١٦٥٤٢ - صَنْدَلُ Santalum (S). Santal (F). Sandalwood (E).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية صناعية من فصيلة السندليات . أنواعها ثمانية منهاها الشرق الأقصى جميعها جنبات وأشجار صغرة القد ، أوراقها معقمة متعاقبة . إزهارها اعتقدي التجميع . إبطي وقاقي الإرتكاز . إزهارها خثوية . ثمارها نوية . بذورها سود . تزرع لأخشابها الصفراء اللّون ، الفاخرة الصّنف . أخشابها



صندل

طلب الحرية والكرم وتعيد سيرتها الأولى مع حلول شهر حزيران || إضرابها شديدة الرّيق لانها تعطب الأشجار الفاعمة وقد تسبب بيباسا .

١٦٥٣٩ - صَنْبَاطُ Cænobita (S). Cénobite (F). Cænobita (E).

جنس دوبيبات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل بوليات الذليل وفصيلة الباغوريات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة قرب شواطئ البلاد الاستوائية والمنحرفة نحوها || أجسامها مستطيلة الشكل ، صدرها قصير المتك . تتميز باختبارها في الإصداق المهجورة ولا تخفي سوى بطونها عند الانتقال || أشهر أنواعها الصنباط الحشن (C. rugosa) الذي يكثر وجوده قرب شطوط المحيط الهندي والبحر الأحمر .

١٦٥٣٠ - صَنْبُوبُ ٥ Psila (S). Psille (F). Psila (E).

جنس حشرات من فصيلة الصنبوبيات ورثية ذوات الجناسين . أنواعها المعروفة عديدة أعطائها معظم أقطار العالم || أجسامها متوسطة الحجم تطول من ٨ إلى ١٠ م . رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، نحيلة . ملابسها صغيرة . أعطائها متوسطة الحجم . كواسلها مستطيلة ، ثنائية التصديق ، مبعثرة الحلب . بطونها اهليلجية . رواشتها كبيرة . قوائمها نشيطة . أوتابها عديدة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة واضحة تألف المروج والغابات . البرقة نهمة تخلج الجلود والسوق فتؤدي النبات الذي تركه .

١٦٥٣١ - صَنْبُوبِيَّاتُ ٥ Psillidae (S). Psilidés (F). Psillidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناسين . أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم . تألف المروج والغابات ، ترغب في المروج الرطبة || أجسامها هيأة تطويل فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية عيطية متفارقة الطول . ملابسها صغيرة أو ضامرة . كواسلها مستطيلة . بطونها اهليلجية . رواشتها كبيرة . قوائمها نشيطة . أوتابها باهتة || الحشرة الجملانة تعيش على طلع الأزهار ورحيقها . البرقة تعيش في جذور النباتات المختلفة ومنها الجزر واللفت والمكفوف || أشهر أجناسها الصنبوب .

١٦٥٣٢ - صَنْبُورُ النخلة دقت من أسفلها وانجدر كرها يقل حلها . والنخلة تخرج من أصل النخلة الاخرى من غير أن تفرس .

١٦٥٣٣ - صَنْبُورٌ ، حَنْكِيَّة Robinet (F). Cock, Tap (E).

جهاز يسمح للسوائل المخضوة ، من ماء وغيره ، بالمروق أو بالمحيز عند الطلب .

١٦٥٣٤ - صَنْجِيَّاتٌ ، أَفْتُونِيَّاتُ Crotalidae (S). Crotallidae, Rattlesnakes (E).

فصيلة حيات سامة من أوتوبيات الأفاعيد . أجسامها وأنواعها عديدة جميعها خبيثة سامة تتميز برؤوسها اللطيفة واعتناقها الدقيقة وبوجود نقرة واضحة جلدية بين الانف والعين .

Caranx sansun (F). - **صَنْدَلْ أَيْبَسْ** ١٦٥٥٠  
سمكة بحرية تسمى شيم صمنون، اطليها .

Maltage (F). - **صَنْعُ الْمَلْتِ، مَلْتَاَج** ١٦٥٥١  
Malting (E).  
عملية تحويل الشعير وغيره من الحبوب الى ملت أي حبوب  
ناشئة (نايلة) .

Qualité (F). Quality (E). - **صَنْف** ١٦٥٥٢  
خاصة الشيء القيمة .

Hampe de la plume (F). - **صَنْمَكَة** ١٦٥٥٣  
Staff of the feather (E).  
قبعة الريش استندت او غلظت .

Critère, Critérium (F). - **صَنْهَج** ١٦٥٥٤  
Criterion (E).  
هو طابع الحقيقة الحاسم الذي يمكن من التقدير والقصل .  
ج. صناع .

Pinus (S). Pin (F). Pine-tree (E). - **صَنْوِير** ١٦٥٥٥  
جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الصنوبريات .  
انواعه عديدة . سورها منتصب . تشورها سلفة . اغصانها  
منفرجة . خراصها ضمية الاوتكاز . اوراقها ابيدة هدية  
مختلفة التجميع . ثمارها اكراز ريمية الشكل او مردنية .  
جميعها من الاشجار المفيدة الشائعة الاستعمال ويستخرج  
من بعضها مادة راتنجية لها استعمالها الصناعي المشهور .  
اعرف واشيع انواعها المزروعة ما يتبع .

Pin blanc (F). - **صَنْوِيرْ أَيْبَسْ** ١٦٥٥٦  
هو صنوبر ويموت ، اطليه .

Pinus resinosa (S). - **صَنْوِيرْ أَحْمَر** ١٦٥٥٧  
Pin rouge (F). Red-pine (E).  
شجرة سبروتية مهددة أمريكية الثالية . خشبها احمر اللون  
غزير المادة الراتنجية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اغصانها  
فارشة . خراصها جزوية حادة الحمل . نباتها غليظة  
قصيرة حراء اللون . اهدابها شفعية ، ثنائية التجميع ، نصلها  
عظيمي الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ويرمض نحو  
١ م . وهو مسنن الحافة عاين الخضار . اكرازها مخروطية ،  
صغيرة ، طولها نحو ٥ سم . وقطر قاعدتها ٣ سم . جرهاها  
صاحبة الشئوز لونها الى الجفوة الزرقاء المالحج || يعيش  
ويوجد في جميع المناطق المعتدلة والاربية الصعبة البور .

Pinus armandi (S). - **صَنْوِيرْ أَرْمَنْدِي** ١٦٥٥٨  
Pin Armand (F). Armand-pine (E).  
شجرة سبروتية رتيبية سرمة النمو مهددة الشرق الاقصى  
تكثر في الصين واليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها  
افقية الاوتكاز . خراصها ونباتها حادة المادة الشحمية  
الزجة . براصها بيضيه ، صغيرة ، دقة ومديبة . اهدابها  
وربية ، خاسية التجميع ، نصلها جامد الصفة المنطقلة .  
امتطاه مرقق الشكل يتم في حدود الزام الاول . اكرازها  
مخروطية طولها براوح بين ١٠ و ٢٠ سم . ويرمضها  
٤ الى ٨ م . لونها الى الخضرة النحاسية اللامعة . جرهاها  
مثلثة الزوايا ، منبسطة القتره الدائرة الحمار || يعيش  
في جميع اقالم الصنوبر دون ان يتأثر كثيراً بنوع التربة .

ناعمة الرقمة ، شديدة الصلابة ، عطرية العرف لا تقربها  
حشرة ولا يفسدها الزمن .

Santalum album (S). - **صَنْدَلْ أَيْبَسْ** \* ١٦٥٤٣  
Santal blanc (F). White sandalwood (E). Weisser  
sandelbaum (D). Sandalo bianco (I).  
نوع من الصندل الزراعي المشهور باخشابه الصناعية  
الفاخرة وبعمود الطبي الشائع الاستعمال || يرغب في  
المواقع الحارة ذات الارربة الخصبة . يتكاثر بالبزور  
ويبدل في مستواه دون الجفوة الى المائل لانه لا يقوى  
على الثقل || شجرته تملو من ٦ الى ٨ امتار . خشبها  
غزير المادة العطرية يحوى نحو ٥ ٪ .

١٦٥٤٤ - **صَنْدَلْ مَرْجَانِي** \*  
Adenanthera (S). Adénanthere, Bois de corail,  
Crête de paon (F). Red sandalwood tree, Coral  
pea tree (E). Korallenbaum, Phänekamm (D).  
Pavoncia, Semi di corallo (I).  
شجرة حرجية طيبة صناعية وقمر يبين في فصيلة القرنيات  
الفرافشة . مهددة البلاد الاستوائية . تملو نحو ١٢ م .  
ساقها سرسة ، اوراقها متعاقبة مركبة ريشية . ازهارها  
ستيل التجميع ، مرقق الشكل ، ابطى الاوتكاز . ازهارها  
خشوية صغيرة الحجم ، حرشية الكأس والتويجات ، ضمية  
الاسدية الوردية . ثمارها قرون ليطية خفيفة مستطيلة مهيمنة .  
بزورها بيضيه الشكل شديدة الصلابة تستعمل في صناعة  
السبحات . اخشابها مرجانية اللون صناعية . جلورها  
طيبة مقية .

١٦٥٤٥ - **صَنْدَلْ لَان**  
Pterocarpus santal (F).  
هو التوز الصندل ، اطليه .

١٦٥٤٦ - **صَنْدَلْ لَيْتَان**  
Santalaceae (S).  
Santalacées (F). Santalacées (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها  
واحدوا عديدة تجمع الى ثلاثة اسياس . نباتاتها امشاب  
وبشبات وبشبات ومسطها يعيش طويلاً يرغ الحلية وعمل  
وطيفته الخفضية .

١٦٥٤٧ - **صَنْدَلْ الدَّخَار**  
Caisse de prévoyance (F). Foresight chest (E).  
مشاة خاصة في بعض المصارف والشركات تنظم لاجل  
تحسين حالة المستعدين والمال باقسطاع نسبة مئوية من  
اجورهم وادخارها لم يضاف اليها مثلاً من رب العمل  
او اصحاب الشركة . واشهر ثرونها لا تنفع الى  
اصحابها الا عند مغادرة العمل .

١٦٥٤٨ - **صَنْدَلْ التَّوْفِير**  
Caisse d'épargne (F).  
Savings-bank (E).  
نظام تنبته بعض الحكومات والمصارف قوائم التشجيع  
على التوفير وعمل الناس على الاقتصاد . فكل من يرغب  
في الادخار يطلب دفترًا يحجزه باسمه فيود يقتضاه مبلغاً  
لا يقل عن كمية محدودة متى شاء ذلك . ويحسب له ربح  
على ودائعته . وله ان يسحب ما يرغب في سحبه على ان لا  
يتجاوز مبلغاً معيناً في يوم واحد .

١٦٥٤٩ - **صَنْدَلْ الرِّزْم** ، **هَنْدَلْ**  
Caisse de manipulation (F). Manipulation chest (E).  
صندوق سبكل الجوانب لا قمر له ترزم فيه نباتات التبغ  
عند تقصينها صفيقاً متتابعة مراكبة الى ان تبلغ الارتفاع  
المطلوب .



صندل ايبس



صندل مرجاني



## ١٦٥٦٤ - صَوْنَرُ بُنْج Pin de Bunge (F).

هو الصنوبر الصيني، أطلبه.

## ١٦٥٦٥ - صَوْنَرُ جُرْدِي \* Pinus montana (S).

Pin. à crochet, P. mugo, P. de montagne (F). Swiss mountain pine (E). Krummkiefer, Mugokiefer (D). Pino mugo, P. alpino (I).  
شجرة سروية تملو من ١٠ م. ٢٥ م. أغصانها مفترجة. قنبا غروطية الشكل، أهدابها شفعية ثنائية التجميع. نصلها إلى الخضار المايق. أكارها مستطيلة عادمة التناسق. جرهاتها جزئية اللون، بارزة القتره المنثقة السن || يعيش في جميع الأثرية الجبلية وبين الصخور، يتحمل البرد المستمر ولا يخشاه.



صنوبر اسود

## ١٦٥٦٦ - صَوْنَرُ حَلْبِي \* Pinus halepensis (S).

Pin d'Alep, P. de Jérusalem (F). Aleppo pine tree, Jerusalem pine (E). Aleppokiefer, Aleppoichte (D). Pino d'Aleppo, P. di Gerusalemme (I).  
شجرة سروية تملو من ١٥ م. ٢٥ م. أغصانها مفترجة. خراصها سطحة اللون. نباتها دقيقة. براعمها يفيضية الشكل، أهدابها شفعية، ثنائية التجميع، نصلها غيطي الشكل زاهر الخضار يطول نحو ٨ سم. ويعرض من ١ م. ٢ م. أكارها مدنية طويلا نحو ١٢ سم. وقطر قاعدتها ٤ سم. جرهاتها شارقة القتره المنبسطة لونها إلى الجوزة الصفراء المالح || يأنث الأثرية الجبسية ويجود فيها تماماً.



صنوبر بحري

## ١٦٥٦٧ - صَوْنَرُ حَمَلَا Pinus excelsa (S).

Pin pleureur de l'Himalaya (F).  
شجرة جادة صناعية وزيينية سريعة النمو تملو من ٣٠ م. ٥٠ م. أغصانها أفقية فاشرة. نباتها غليظة الاطراف المتدلية. براعمها يفيضية، مقطوعة، عادمة الترائنج والمادة الصفية. أهدابها وريية، خاسية التجميع. نصلها جامد الصمغية الخيطية الشديدة الاغترار. أكارها غروطية طويلا يراوح من ١٥ م. ٢٥ م. وعرضها من ٤ م. ٧ م. لونها إلى السمرة الخيطية الصفراء المالح. جرهاتها قمية القتره المستديرة البارزة || يربب في الاقاليم والمواقع الرطبة.



صنوبر برّي

## ١٦٥٦٨ - صَوْنَرُ صَمْبُرُو Pinus cembra (S).

Pin cembro, Alvier, Arolla, Auvier (F).  
شجرة سروية تملو من ٨ م. ٢٥ م. ساقها منتصبة متناوبة الاوصاج. أغصانها خضمة. خراصها ونباتها غليظة، كثيفة الزغب المستطيل. براعمها يفيضية الشكل مدبسة الاطراف. أهدابها وريية، خاسية التجميع، نصلها جامد الصمغية يطول نحو ٧ م. لونها إلى الحمرة الزرقاء. أكارها غروطية، مقطوعة القواعد. طويلا نحو ١٥ سم. وقطر قاعدتها ٦ سم. جرهاتها نافذة القتره القميّة الخفدة، لونها إلى السمرة البنفسجية.



صنوبر جردى

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ صِينِي، صَوْنَرُ بُنْج Pinus bungeana (S).

Pin de Bunge (F).  
شجرة كبيرة القد منها الصين. ساقها منتصبة تملو من ٢٠ م. ٢٥ م. قنبا اجاسية الشكل. ثشورها سلفة مستطيلة الصفائح. أغصانها أفقية الجلبوس. أهدابها وريية، ثلاثية التجميع، نصلها جامد النسيج، باعت الخضار، يطول نحو ٩ سم. أكارها مدنية القدره الخفدة، الشكل، تطول نحو ٦ سم. جرهاتها بارزة القتره الخفدة، لونها إلى الخيطي الاسمر المالح || يزود انتشابه الحياة الصنف لكنه يعتبر من الانواع الجادة التي لا تجود الا في مواقع خاصة ضمن اقلهم معين.



صنوبر حلبي

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ أُسُود \*، صَوْنَرُ لَرِسِيُو Pinus laricio (S).

Pin. laricio (S). Pin noir, P. laricio, P. de Corse, P. d'Autriche (F). Corsican pine, Austrian pine, Larch pine (E). Schwarzkiefer, Korihscheichte (D). Pino laricio, P. di Corsica (I).  
شجرة خضمة دائمة. ساقها تملو من ٣٠ م. ٥٠ م. قنبا هريية الشكل. أغصانها مفترجة شارقة. خراصها ونباتها غليظة الجسم خيطية اللون. براعمها يفيضية مدببة الاطراف. خراصها كثيفة متراكبة ذرية. أهدابها شفعية، ثنائية التجميع. نصلها جامد الصمغية، سنن الحافة، بحري اللون. أكارها خذرية تطول نحو ٧ سم، وتعرض نحو ٣. جرهاتها بارزة نافذة، قنبا متصالية التخذيد لونها إلى الخيطي الاسمر يطول موج اصفر || يرغب في المواقع الرطبة يعمر من الاجبار السريعة النمو.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ الْبَحْرُو Pinus taeda (S).

Pin à l'encens (F).  
شجرة سروية خضمة تملو من ٣٠ م. ٥٠ م. أغصانها مفترجة فاشرة. خراصها ونباتها كثيفة التجميع خيطية اللون. براعمها خذرية، جزوية المرافش الممزقة. أهدابها وريية، ثلاثية التجميع، نصلها جامد الصمغية بحري اللون يطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ٢ م. أكارها غروطية الشكل تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٤ سم. لونها إلى السمرة الصفراء مبيضة القتره النافذة القليلة التخذيد || يعتبر من الاشجار السريعة النمو التي تجود في جميع المواقع والأثرية المتوسطة الرطوبة. خشبه غزير المادة الراتنجية البخورية المعروف.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ الْكُثْبَان Pinastre (F).

هو الصنوبر البحري، أطلبه.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَحْرِي \*، صَوْنَرُ الْكُثْبَان Pinus pinaster (S).

Pin maritime, P. de Bordeaux, Pinastre (F). Swamp pine, Sea-side pine, Cluster-pine, Pinaster (E). Sternkiefer, Seekiefer, Bordeaux-kiefer (D). Pino marittimo, P. pinastro, P. di Bardo, Pinastro (I).  
شجرة سروية كبيرة خضمة. ساقها تملو من ٣٠ م. ٤٠ م. قشورها صلبة مستطيلة التصلب لونها إلى الحمرة البنفسجية. أغصانها غليظة متوسطة الانفرج. خراصها جزوية اللون. براعمها خذرية الشكل كثيفة المرافش المتراكبة. أهدابها شفعية، ثنائية التجميع، نصلها جامد النسيج، ذاكن الخضار، يطول نحو ٢٠ سم. أكارها مدنية الشكل متدلية تطول نحو ٢٠ سم. لونها إلى الجوزة المايقة اللامعة. جرهاتها بارزة، قمية الشكل عمدة القتره || يعيش في جميع الأثرية. اقليمه المناطق الساحلية اعصها الاماكن الرملية حيث لا يصلح غيره.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَرْي \*، بَرْي Pinus sylvestris (S).

Pin sylvestris, Pinasse, Pin de Norvège, P. d'Ecosse (F). Scotch pine, Birk apple (E). Nordische Kiefer (D). Pino sylvestre, P. silvatico, P. comune (I).  
شجرة سروية تملو من ٢٠ م. ٤٠ م. أغصانها قليلة الانفرج. خراصها شفعية متقابلة. نباتها غروطية الشكل سراسفها مدببة. أهدابها شفعية ثنائية التجميع، نصلها إلى الخضر الازرق. أكارها مدنية طويلا نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٣ سم. جرهاتها غائرة الخدار. بزوها دقيقة مجنحة || ترغب في الأثرية الرملية.

الحراشف والحمل. اهداباً وريّة، ثلاثيّة أو خماسيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة الخيطيّة، لونها الى الزرقة البحرية. اكارنزا غرويطيّة، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٥ سم. لونها الى الصفرة المائلة للالامّة. بزورها لوزيّة الشكل مأكولة اللباب. البوها بيضي الشكل يطول نحو ١٠ مم. ويعرض من ٧ الى ٨ مم. وهو مستحب العلم غرير المادة الدنيّة.

١٦٥٧٦ - صَوْبَر مُصَمَّر \*  
Pinus pinea (S).  
Pin pignon, P. pinier, P. parasol, P. bon, P. d'Italie (F). Italian stone pine (E). Steinkiefer, Italienischekiefer (D). Pino pinea, P. da pinocchi, P. gentile, Pignolo (I).

شجرة سبروتية تكثر زراعتها في لبنان وفي مختلف ناهم وهضاب المتوسط من فلسطين الى ايطاليا والاندلس. ساقها جالسة منتصبّة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م. قشورها مقلمة، صلفه، ممرّسة الطبقات. اغصانها غليظة فارشة. قنبها منطليّة الشكل. غراعيها حنطية اللون، صفراء المواج. بناتها مستنقة. راعها اسطوانية. سراقها جالسة الكوكب ناشزة. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة، عاتق الحصار، يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويعرض نحو ٢ مم. اكارنزا بيضيّة الشكل مقلمة القاعدة، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. وعرض قطرها من ٦ الى ٨ سم. جرهاها شارفة ناشزة، لونها الى الجوزة الصنابية السغام المواج || يعيش ويجمود في جميع الارربة الا انه بطيء النمو. بزور ثماره مأكولة وتستخدم في الطعام والحلويات.

١٦٥٧٧ - صَوْبَر متفحمي  
Pinus palustris (S).  
Pin palustre (F). Pitch-pin (E).  
شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. ساقها جالسة منتصبّة كالشعنة. اغصانها صغيرة اقلية الارتكاز، غراعيها وبناتها كثيرة العدد ممرّكة. راعها بيضيّة الشكل، قطنية الحراشف اللبنة. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. ويعرض نحو ٢ مم. اكارنزا غرويطيّة تقول من ١٥ الى ٢٥ مم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. جرهاها حنطية اللون يملوها مواج احر || يرغب في المواق الربطية العميقة النور. اشخاصه لبدة، جيدة الصنف، شائعة الاستعمال المنزلي والصناعي.

١٦٥٧٨ - صَوْبَر مَتَّى  
Pinus lambertiana (S).  
Pin à sucre (F).  
شجرة سبروتية جبارة بطيئة النمو تملو من ٥٠ الى ١٠٠ م. مهادها البلاد الاسريكية. تحب في الاقاليم الربطية والارربة العميقة الدور. غصنها ثقيل الوزن، اصفر اللون. احر الصلب. اغصانها خضّة فارشة. راعها غرويطيّة الشكل، ممرّكة الحراشف الجوزية اللون. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها شديد الانغصار، جامد الصفحة المظلمة الزوايا، يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٢ مم. اكارنزا غرويطيّة كبيرة اللد طولها يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. وعرضها من ٨ الى ١٢ سم || وهو يتنيز بما تفرزه بناتها وراعهم من مادة سكرية تشبه المنيث.

١٦٥٧٩ - صَوْبَر وَيَمُوت \*، صَوْبَر ابيض  
Pinus strobus (S). Pin weymouth, P. blanc, P. du Lord (F). White pine, Weymouth pine (E). Weymouthskiefer, Gemeine Weimutskiefer (D). Pino di weymouth, Pino bianco (I).

شجرة كبيرة الحجم تملو من ٣٠ الى ٥٠ م. اغصانها

١٦٥٧٠ - صَوْبَر كَثِيف الزَّهَر، صَوْبَر ياباني  
Pinus densiflora (S). Pin densiflora (F).  
شجرة سبروتية مهادها اليابان تملو من ٣٠ الى ٣٥ م. شكلها شكل الصنوبر المحلي. اغصانها منفرجة. غراعيها حنطية اللون. بناتها غليظة. راعها غرويطيّة منفرجة الحراشف. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها الى الحصار الازرق يطول من ٨ الى ١٢ سم. ويعرض نحو ١ مم. ازدهارها كيفية ممرّكة. اكارنزا ريمية صغيرة اللد، جرهاها منبسطة متوسطة التشو لونها الى الحمرة الطحال المواج || يعيش في جميع الارربة والمواق المعتدلة وهو في الاقاليم الربطية اسرع نمواً واقل مادة راتنجية.

١٦٥٧١ - صَوْبَر كَلْبَرِيّة  
Pinus brutia (S).  
Pin de Calabre (F). Calabrian cluster pine (E). Kalabrischiekiefer (D). Pino calabrese (I).  
شجرة سبروتية تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اغصانها منفرجة. غراعيها حنطية اللون. بناتها غليظة. راعها غرويطيّة. اهدابها خضّة، ثنائيّة التجميع، نصلها خيطي الشكل، باحت الحصار، يطول من ١٤ الى ٢٠ سم. ويعرض ٢ الى ٣ مم. اكارنزا ريمية، طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٥ سم. جرهاها خندة القترّة القليلة التشو. لونها الى السمرة الصنابية السغام المواج || يعيش في جميع الارربة والمواق المعتدلة.

١٦٥٧٢ - صَوْبَر كَنَارِيّة  
Pinus canariensis (S).  
Pin des Canaries (F).  
شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. ساقها فراء. فروها خضّة صغيرة اللد. غراعيها نمجة. بناتها وراعها صنف الحراشف المجلالة الاطراف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. ويعرض نحو ١ مم. اكارنزا غرويطيّة مستطيلة، لونها الى الجوزة اللامدة، متوسط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ٥ سم. جرهاها معينية القترّة البارزة الخندة || يعتبر من الانواع الازرقية المتوسطية المعتدلة النمو.

١٦٥٧٣ - صَوْبَر كُورِيّة  
Pinus koraiensis (S).  
Pin de Corée (F).  
شجرة دائمة تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها خضّة كبيرة. غراعيها وبناتها غليظة خضيّة اللون. راعها غرويطيّة، قطنية الحراشف. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها مقنط الصفحة، سنن الحافة، يطول نحو ١٢ سم. اكارنزا غرويطيّة غليظة، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. وعرضها من ٥ الى ٧ سم. جرهاها مظلمة الزوايا، ناشزة القترّة، لونها الى السمرة الصفراء || يعتبر من الانماج السبروتية الازرقية السريعة النمو التي تجود في جميع الاقاليم والمواق المعتدلة الربطية.

١٦٥٧٤ - صَوْبَر لَرِيْسِيُو  
Pin Laricio (F).  
هو الصنوبر الاسود، اعليه.

١٦٥٧٥ - صَوْبَر لَوْرِي  
Pinus edulis (S).  
Pin à amandes (F).  
شجرة سبروتية زراعية متوسطة الحجم مهادها بلاد المكسيك وجوارها. تملو من ٣ الى ٦ امتار. قنبها هرمية الشكل. اغصانها منتشرة الانفرج. غراعيها وبناتها غليظة الاطراف. راعها غرويطيّة، حنطية اللون، غصنها



صنوبر مشر



صنوبر وي موت

١٦٥٩٣ - صَوَادِي

الصوادي : التخلط اللؤلؤ وقد تكون بمعنى التي لا تحرب .

١٦٥٩٤ - صَوَار ، صَوَار  
Troupeau de gros bétail (F). Drove of cattle (E).  
هو قطعان البقر والجواميس .

١٦٥٩٥ - صَوَار هو الصفور الذي يجب اذا دعي .

١٦٥٩٦ - صَوَان ، ظِرْ  
Silex, Silice (F).  
Silica (E).  
هو السيليس .

١٦٥٩٧ - صَوَانَّة هي السيليكات ، اطبا .

١٦٥٩٨ - صَوَانِي  
Granitique (F). Granitic (E).  
ما كان تركيبه من الصوان .

١٦٥٩٩ - صَوَاي ، زَاي ، زَاوْ  
Mareca (S).  
Maréca, Maréque, Canard siffleur (F). Widgeon (E).  
جنس طير من البطيات انواعه ثلاثة واحد اسوي وثلاث  
امريكيان . جميعها كبيرة الجثة ، حادة الزنبرك ، تتميز  
بمقننيتها المفلطحة التي لا يعادل طولها طول الرأس . مناقشها  
صغيرة متباعدة ، اجنحتها متوسطة القذ زلقة ، تقضم ،  
الاصابع كالوزن ويتجنب غمر الماء والامساك كما يفعل  
البط || اما انواعها الثلاثة فهي :

صَوَاي امريكية

M. americana (S).

صَوَاي الشرق

Maréque américaine (F).

صَوَاي مجلان

M. penelope (S).

صَوَاي الشرق \*

Maréque pénélope, Vingeon (F). Widgeon (E).

طائر من الصواري ربع الجثة طوله نحو ٥٥ سم . نويسه

مترابك الالوان ، جيل التزاوي والزركمة . فيه الابيض

والاصفر والاخير والصناني والرمادي والاسمر والاسود .

عيناه حنطيتان . متقاربه الى الزرقه الحمراء . ساقاه وماديتان .

وهو من القواطع يحوب الشرق والغرب ، يألف البسرات

وجاري الاخر . قوته الاصابع ومسطر اللدويات المائية .

يشن عشه في العشب على غصن الماء . انشاء تبيض وتحضن

من ٨ الى ١٠ بيضات . يألف الدفن اذا اخذ صغيراً

لكنه يتطلب الكثير من الماء وما يتبع الماء من القشريات

والخشرات || سره متفاوت القدر بعد من ٢٠ الى ٨٠

واكثر .

١٦٦٠١ - صَوْب

نقطة الاتجاه .

Point de direction (F).  
Point of the direction (E).

١٦٦٠٢ - صَوْب

الصوب : زول المطر . صاب المطر صوباً وانصاب :

انصب وعطل وانهر .

١٦٦٠٣ - صَوْبَة

الكوبية من الحبوب على اختلافها .

Tas de graines (F).  
Heap of seeds (E).

١٦٦٠٤ - صَوْن

الصوت هو حركة اهتزازية تحدث من اضطراب الاجسام

المادية كالقواض فيصل اثرها الى الاذن || ويطلق الصوت

على الاحساس السمي نفسه || ولكي يكون الصوت

خضمة فاشة . خراسيها وبناتها غليظة ، قطنية الزغب .  
براعمها بيضيه الشكل مدببة الاطراف . حراشفها قطنية  
اللون يبيض اخار الكليف الزغب . اهدابها وريية ، خلسية  
التصبيح ، تفصلها ثلاثي الزوايا ، جامد الصلصة ، بحري  
اللون . اكرانها مردنية الشكل تطول نحو ٢٠ سم . وتعرض  
٤ سم . جرهاتها منخفضة الحافة ، متباعدة الفترة المتساوية  
الصلصة . لها الى السرة الخنطية || يرغب في الازرية  
الزلية والمواقع المعتدلة الرطوية وهو فيها سريع التنو .

١٦٥٨٠ - صَوْنَر يَابَانِي

هو الصونبر الكليف الزهر ، اطليه .

Pin densiflore (F).

١٦٥٨١ - صَوْنَرَة ، صَوْنَرِيَّة ، كَرَزْ

Cône, Pomme de pin (F). Pine-cone, Fir-cone, Fir-nut (E).

شكل من اشكال الباز . وهي ايضا ثمرة الصونبر والارز  
والتنوب ونفرا من اجار فصيلة الصونريات . تحليتها  
العلمية : محور وصفت عليه قنابات ليفية جامدة تدعى  
جرهات تعمل كل منها غشاء ويزوتين مجنبتين .

١٦٥٨٢ - صَوْنَرِيَّات ، صَوْنَرِيَّات

Coniferae (S). Conifères (F).

فصيلة نباتية من باديات الزهر عريانة البزور تشمل

ثلاثة اسباط : التنويات والسرويات والطقوسيات .

اجنحتها وانواعها كثيرة العدد معظمها اجار راتنجية صناعية

شائعة الاستعمال .

١٦٥٨٣ - صِهَاء

Sources d'eau (F). Springs (E).

الصهائ : منابع الماء .

١٦٥٨٤ - صِهَارَة

Magma (F). Magma (E).

الصهارة وتدعى مفا كل مادة رخوة شائعة كالزجاج

المصهور او كالفلح الذي يغلظ به البركان منه ثوراته .

١٦٥٨٥ - صِهَارَة

Moelle (F). Marrow, Mechella (E).

هي النخاع الشوكي وهي المكك .

١٦٥٨٦ - صِهَبَاء

Vin blanc (F).

الخمير البيضاء .

Colourless wine (E).

١٦٥٨٧ - صِهْبَة

Enologie (F). Enology (E).

علم صناعة الخمر يشمل كل ما يتعلق بصنعها وتحليتها

وحفظها الخ .

١٦٥٨٨ - صِهْرِيح

Citerne (F). Cistern (E).

وعاء يحكم السد كثير الاستعمال يستعمل لنقل السوائل .

١٦٥٨٩ - صِهْيَل

Hennissement (F). Nelghing (E).

صوت الخيل عامة .

١٦٥٩٠ - صَوْ

هي الجبارى الصغيرة ، اطلبها .

١٦٥٩١ - صَوَايَة

Rationalism (F).

١٦٥٩٢ - صَوَاح

Pollen

غبار ال الصغرة مكون من جذرات الطلع ينشأ في المبر

اي في الجزء الاعلى من السداة وذلك في باديات الزهر .



صواري الشرق

صوت الظلم	المرار	مسموعاً يجب ان لا تقل ذبذباته في الثانية عن ٣٠ اهتزازة
صوت الضج	المشير	ولا تزيد عن ٣٠٠٠ اما سرعته في الهواء فمعدلها ٣٣٠
صوت المفق	المنفعة	متراً بالثانية وهي تتأثر بشفته وبالوسط الذي ينتقل فيه.
صوت التعليب	التندلة	اما سرعته في الماء فتبلغ ١٤٣٥ متراً    والصوت اسماء
صوت الذئب	المواء	كثيرة عند الحيوان والطيور ، ذلك لان الاصوات تختلف
صوت الثور عند الذعر	المنفعة	مع اختلاف مصادرها    وقد وضعنا في الجدول التالي ،
صوت البلبل	القتل	الذي نوردده ايجدياً ، كل ما تيسر من هذه الاسماء :
صوت الحية من فيها	الفحيح	صوت المزمى
صوت الجندب	الفصيص	صوت البيط
صوت الخنزير	القباع	صوت الظبية
صوت الفحل من الابل	القبعية	صوت ثقب الخيل عند عدوها
صوت الفحل من الابل	القرقرة	صوت المكاء
صوت الفصيح الاتقي	القشاع	صوت المصفور
صوت القطا	القططة	صوت الغم
صوت العقاب	القمعة	صوت الفسان
صوت البير	القلغ	صوت البقرة
صوت الدب	القهقاع	صوت الحام
صوت الدجاج	القهقعة	صوت الحيطان
صوت الدجاجة	الفرقاء	صوت اللدواب عند طلبها العلف
صوت الابل	الكت	صوت الحرة في نعاسها
صوت الجباري والسرکه	الكتكتة	صوت الخيل من بطونها
صوت الابل	الكش	صوت الخيل عند طلبها العلف
صوت الحية من جلدها	الكشيش	صوت البقر
صوت الفأرة	الكحيس	صوت الناقة المرضع
صوت الفراخ المجهود	الكيد	صوت ذوات الخف
صوت القفلق	القلقة	صوت البيط والاوز
صوت الهر	المواء	صوت الفراخ
صوت الكلب	النباح	صوت الفحل من الابل
صوت التيس	التيب	صوت البوه
صوت الظبي	الزرب	صوت القرد
صوت الفراخ (بالين)	التيب	صوت المصفور
صوت الفراخ (بالخير)	التقيق	صوت النعامة
صوت الدجاجة	التنققة	صوت الاسد
صوت الضفدع	التقيق	صوت القمري
صوت الاسود	التهيت	صوت البغل
صوت الحدير	التهيق	صوت البغل
صوت القيل واليوم	التيم	صوت الكيش والتيس
صوت الخدع	المخدعة	صوت الحمار
صوت الايل	المخدير	صوت العرد
صوت الحام	المخيل	صوت البزاة
صوت الضان	المهررة	صوت الجراد
صوت الكلب عند الاستنكار	المهرير	صوت النسر
صوت الورشان	الوت	صوت الديك
صوت صفار العصافير	الوصيح	صياح الطائر
صوت الذئب وابن آوى	الوصوعة	صوت الخيل
صوت العرد	الوق	صوت القيل
صوت الخيل من بطونها	الوقيب	صوت الديك خاصة والطيور عامة
صوت الابل	اليچار	صوت التعلب

١٦٦٠ - صوجان ٥

Helminthosporium, Ophiobolus (S). Helminthosporiose (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . يتميز باصان ضخمة ، متفصمة ، ظاهرة المقي وببوغ وييري الخلية ، غطبي الشكل ، متوازي الترتيب . نجمه تكات مستطيلة || انواعه المبرورة اربعة تحديدها ما يلي .

صوت نفس الخيل عند عدوها  
صوت القرد  
صوت الكلب عند الجرع  
صوت الازرع  
صوت القدوع  
صوت التيس عند الهياج

الصج  
الضحك  
الضغاب  
الضغاب  
الضغاب  
الضغاب



صوجان ايلج



صوجان الارز



صوجان الحب



صوجان الزروع



صوجه



صوجان

اقليلها افسح من اقليم القاصوليا لانها اضع منها على احوال  
الحر والقر || تيلز عادة في ايار بمعدل ٥ او ٥ كيلو  
لادم الواحد الذي يراوح معدل انتاجه العادي ٢٠٠  
٣٠٠ كيلو من الحب ويحو ٣٠٠٠ كيلو من الكلاء  
الاخضر || اما المواد الغذائية التي تتركب منها الصوصه  
فهي ، بالنسبة الى الخلطة والحم ، ما يلي :

النوع	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد هيدروكربونية
صوصه	١٧,٥٠ %	١٢,٥٠ %	٦٥,٥٠ %
خلطة	١٢,٥٠ %	٥,٥٠ %	٦١,٥٠ %
لحم بقرة	٢٣,٥٠ %	٢,٥٠ %	-

ومن الالطباء من ينصح باستعمال دقيقها عوضاً من  
الخلطة وذلك لمن كان مصاباً بداء السكري || ويستخرج  
من صوجوا مادة دهنية غالية ثائلة الاستعمال ، اما كسبها  
فيقيد الحليب ويزيد فيه نسبة اليهيد || اما علفها فتاج  
في جميع الماشي (راجع جدول المواد الغذائية).

١٦٦١١ - Dessiché (F). Dried (E).  
صوج صوجح البقل ، ثم ييس ، يقال صوصه الربع .  
اليسته . وتصورح من البرد . ييس .

١٦٦١٢ - Barraide (S). Barraide (F).  
الواحدة صوصة || جلس الحجار وشجيرات برية وزراعية  
تزيينية من فصيلة القرماي . انواعها المعروفة عديدة منها  
المناطق الحارة والاشتالية من القارتين الاسيوية والافريقية ||  
صوجها فراءه . افانها متقابلة . اوراقها متقابلة ، منفقة ،  
سنانية لتصال الجاندة . ازهارها عشوية ، سمية التجميع ،  
محورية الارتكاز . ثمارها كروية ، مكللة باسنان  
التويج || اوراقها فصصة الملاق ، طرية ، تستعمل في  
معالجة اللباج والتباب غلاطية الفم .

١٦٦١٣ - Soude (F). Soda, Kall (E).  
الصودا كايواي مركب من الصوديوم والاكسجين اما  
تجارياً فهي مركب من كربونات الصوديوم المتعادل .

١٦٦١٤ - Sodium  
فلز ابيض فضي اللواح ، شديد اللزوجة ، اسادي التكاثر .  
رذو (ص-ص) ، وزنه الذري ٢٣ ، ثقله الذري ٩٦,٠١ .  
يتصهر في ٩٦ بسخ || وهو يورح الصاء في الهواء  
الطلق ولا يوبد منفرداً في الطبيعة بل متحداً بعناصر  
اخرى يثلف معها مختلف المركبات ، اهمها : كلوريد  
الصوديوم او ملح الطعام ، ونيترات الصوديوم او ملح  
البارود ، وكربونات الصوديوم او التطرون ، ويكربونات  
الصوديوم . وكبريتات الصوديوم او سلفات الصودا .

١٦٦١٥ - Palmerale (F). Palm-grove (E).  
الصور هو الخس من النخل في اي تربة كان .

١٦٦١٦ - Fictif (F). Feigned (E).  
نمت تجريني يطلق على كل عقيد ليس له وجود قانوني على  
الرف من مظاهره وشكله كالخبص السوري مثلاً .

١٦٦١٧ - صوص ، قوب ، كَنَكُوت  
صغير الدجاج من يوم نفعه من البيضة الى حين تزويجه .  
Poussin (F). Chick (E).

١٦٦١٨ - صوصلاء  
هي الانراس ، اطلية .

## ١٦٦٠٦ - صُوجَانُ أَيْلُج \*

Ophiobolus harpocrichus (S). Pletin (F).

فطر مجهري يصيب بعض التبيليات اخضها الخلطة .  
مظهره الخارجي يقع بحر تركب الساق من عتقها وصامداً  
تضمخها بعد ان تثل فيها الحركة التنسية || اضراره  
تختلف باختلاف نشاطه وما يرافقه من عوامل مشجبة او  
قاسمة . وان ربه الرياح في الارض قبل ادخال الحب نفخ  
ونحوي .

## ١٦٦٠٧ - صُوجَانُ الْأُرْز \*

Helminthosporium oryzae, Ophiobolus myliabeanus  
(S). Helminthosporiose du riz, Bursone (F). Stripe  
disease of barley (E).

فطر مجهري ركب الارز فيعطيه || مظهره الخارجي  
يقع صغرة فضية اللون تمتد وتنتشر ويتم كامل تصل  
الشرايف قسب اسمراره واصفراره وذيله . وقد يوليه  
صعفات الحب فيشها بنكات سود تعطى الشلب وتحدد.  
يكافح بظهور البذار باحتجاب الموالع المويودة .

## ١٦٦٠٨ - صُوجَانُ الْحَبِ \*

Helminthosporium sativum, H. sorokinianum,  
Ophiobolus sativus (S). Helminthosporiose des  
grains (F). Spot blotch of barley (E).

فطر مجهري يصيب الخلطة والشير والشلح وبعض  
التبيليات البرية ومنها التيل || مظهره الخارجي يقع  
لاقياسية الحزم تركب تصل الصف . اما الفطر فيراق  
حبة البذار من يوم انتاشها وتكون جلودها حتى  
اسياها وتحميها حيث يطب الحب فيلور مرطاً وغداً .  
اضراره محدودة لانه لا ينتشر الا بطروف خاصة من  
الحارة والرطوبة .

## ١٦٦٠٩ - صُوجَانُ الزُّرُوء \*

Ophiobolus graminis, O. cariceti, Sphaeria cariceti,  
Raphidophora graminis (S). Pletin des céréales  
(F). Take-all of wheat (E). Schwarzbeinigkeit (D).

فطر مجهري يصيب الزروع اخضها الخلطة فيؤذيها وقد  
يمتعا من ادخال الحب || مظهره الخارجي يقع حطية  
عاقبة تركب سلايات القصب من الباطن والآخرج قتل  
التبادل التنسي وتسبب اسمرار العصف وذيله تلبه الجلود  
والسوق || اضراره جسيمة لانه يحول دون ادخال الحب  
فتبدو للسنايل يفضاه اللون فارغة .

## ١٦٦١٠ - صُوجَة ، صُوءَة \*

Glycine hispida, G. soja, Soja hispida (S). Soja, Soya,  
Haricot soja (F). Soja bean, Soya bean (E). Soja,  
Sojabohne (D). Soja, Sola, Fava soja (I).

نبات عشبي زراعي صناعي وكلائي من فصيلة القرنيات  
الفراشية . مهد الشرع الاقصى وقد عمت زراعته معظم  
اصقاع العالم نظراً لفوائده الاقتصادية ولارتفاع نسبة ما  
يحويه حبه من المواد الازوتية والدعنية || اسمها الصيني  
« تيو » والياباني « دذرو » وهي عشبة حولية فراءه تملو  
نحو ١٥٠ سم . فروعها عديدة متعابلة . اوراقها مركبة  
طويلة الزناد ، ثلاثية الوريقات السنانية الذلقة . ازهارها  
عنفودي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها يتنفسج  
اللون او صفراء . ثمارها قرون صغرة القند ، قليلة  
التجميع ، حلية القشور ، تغلف من حبتين الى خمس حبات .  
اصرارها المشهورة بنحو ١٦ تختلف بالوان حبا وما تحويه  
من مواد دهنية وسلاحيها واللائم والرتة .... لذلك فهي  
تجود في جميع الاربة الحسبة والتوصلة الحسب والاندياس .

## ١٦٦٢٦ - صَوَقَان حَلَقِي \*، حَافِرِيَّة حَلَقِيَّة

Ungulina annosa, Fomes annosus, Polyporus annosus, Trametes radiciperda (S). Polypore annelé, Maladie du rond des pins (F).

فطر من السميات يركب التنوب والصنوبر والياض والعصر والأجل والبتولا والصنوبر || يصيب الجذور قبيضي على جرادتها ويبتها ويصيب السخ يقضي على اللحاء والشكير دون أن يمتدخ الخشب لأن الراتنج يحول دون انتشاره. يبدو على الجردة والشكير أطراف حلقة متناوبة بأذغانية اللون تنحرف الى السرة عندما يبدأ حيف المشج بعمله الانحلاقي في الاجزاء والمواد اللبنيَّة || اما القطر فلا يملو سطح التربة وهو صغير القدر حافري الشكل، قطر قاعدته راوح بين ٣ و ١٠ سم. ثوبه الى الصلابة الحظيئة. لباه اغبر اللون، لني التركيب او فلفي || بويغاته بيضية قياسها ٤x٦ ميكرون.

## ١٦٦٢٧ - صَوَقَان كاذب \*، فِلَيْنِس مِلْهَاب،

Phellinus ignarius (S). إسكَا  
Faux-amadouvier, Apoplexie, Esca (F).

فطر من السميات موطنه البلاد المعتدلة الحارة والباردة. يركب علة نباتات حرجية أعصها الاسفندان، البتولا، الجزء، الحور، الدردار، الشرم، الصفصاف، الفاسول، الغيرة، القرونوس، الخش ... ويركب من النباتات الرطبة الفتح والزيتون والكرمة || مشيبه اغبر اللون يدخل من الجروح اليابسة فيعطب في الاشجار الحرجية طبقاتها الخشبية حتى القلب ويغطب الشكير في الجوز والستديان. وقد يدوم عدة سنوات لانه يطوي النمو والانتشار. ويكون الخشب الموصوم شديد السرة او زاهي الصفرة عدم الحيوية سريع الانتحات || وهو في الكرمه رسم ونم الملقاة لانه يقضي على الحفة بسرعة بعد ان يعطب اللحاء والياض والساق والجهاز الوعائي الذي يؤمن نقل النسغ وتبادلده || يكافح باقتلاع الاجفان الموصومة وينضخ الكرمه بعد تقليمها بأسبوع ببعض المظهرات السائلة المرتكزة على مادة الزرونيخ || اما القطر فتوسط القد، قبي الشكل، قطر قاعدته راوح بين ١٠ و ٢٠ سم. اثناده قليلة سمكية، عمودية، صهبا اللون او قزينة، زباد السطح غبراء الخمل || لباه حنطي اللون جامد المقطع الناعم. وهو من الفطور التي تمرر من ٥٠ الى ٦٠ سنة.

## ١٦٦٢٨ - صَوَقِيَّاتٌ \*، Coniopterygidae (S).

Coniopterygidae (F). Coniopterygidae (S).

فصيلة حشرات \* من رتبة شرافات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحارة. تألف الغابات. حشرات الاجلانة تعيش على تنسج الاشجار. يرقاتها مفرقة تعيش حاملة على الارق والحلقيات || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم. سطحتها تراوح من ٥ الى ١٠ سم. ثشارها مغلول بمادة طيسلية كالنقيق. وهي مجهزة بنقد خاصة مبردة في جميع احاء الجسم، تفرز مادة شمعية واقية. قرونها الاستشعارية مهددة عند الاجلانة والبرقة. عيونها صغيرة. اجنسها لامتناهية القد بين الزوج الاسامي والخلفي || يرقاتها صغيرة، مردنية الشكل، ضلعية التأشير، مقترنة || اشهر اجناسها الصوق والسدال.

## ١٦٦٢٩ - صَوَقِيَّة مِي الشونفر، اطباء.

Semblable (F). صَوَقِيَّة  
Similar (E).

Phylum (F). Phylum (E).

كل متوالية تسلسلية، حيوانية او نباتية، تشتغل على انواع متعددة من بعضها البعض تدعى صوفة.

## ١٦٦٢٢ - صَوَف

Laine (F). Wool (E).  
الصفوف بالعرف العام مجموعة من الشعر تؤلف اللحاء الذي يغطي اجسام بعض الحيوانات المجترية كالنم والماعز والابل الخ || اما شرة الصفوف فتتكون من ثلاثة اجزاء: البصلة وما فيها من مادة نشوية وملونة ثم الطبقة المغصية البليغة التي تفرر الخاتنة والمرونة ويلها الطبقة الحشوية القرنية السطحية التي تمد خاصية التلبيل.

## ١٦٦٢٣ - صَوَقَان \*، حَافِرِيَّة

Ungulina fomentaria, Polyporus fomentarius (S). Amadouvier (F).

فطر من السميات يركب الزان والبتولا والقيقب والحور والخوخ والستديان. وقد شوه صدقة على الثوب والتفاح. وهو من اكبر فطور السميات واغفلها. شكله شكل حافر الحصان. متوسط قطر قاعدته نحو ٢٠ سم. وقد يبلغ في ظروف خاصة ٤٠ و ٥٠ سم. بيتا راوح ارتفاع قمته بين ١٠ و ٢٠ سم. || ثوبه في اول عهده اريد اللون بني الملاج ثم ينحرف الى الخنطي وينتهي بالجوزي. لباه فلفي ندف، لونه الى الصهبة الخنطية. بويغاته مستطيلة مقبولة الاطراف قياسها ١٤x٥ ميكرون || يمتري المخلوع ويدخل الى قلوبها من جروحها اليابسة. بعد ان يعطب الشكير والخشب الذي يلفقه باللون والمرس على كميات سماكة تحاكي الطبقة الخشبية المنحارة || مشيبه اغبر اللون يكتنف الكميات ويسبب انحلال موادها الخشبية.

## ١٦٦٢٤ - صَوَقَان أَشَقَق \*، فِلَيْنِس

Phellinus pomaceus, Polyporus fulvus (S). Phellinus (F).

فطر من السميات يركب التفاحيات والوزيات في سورها وأغصانها. يدخل من جروح التشذيب التي اهل ملاؤها بالمسبك ويرق حتى يفسد فيسبب انحلال المواد اللبنيَّة والخشبية || وهو حافري الشكل صغير القد حجه من ٣ الى ٦ سم. سطحه خلي للمس قرني اللون. لباه صلب المقطع فلفي التركيب، اسمر اللون || يكافح بانتزاع الفطر وتصغير الجرح وعلاجه بالمسبك بعد تنظيفه من المشج والخشب المتطوع.

## ١٦٦٢٥ - صَوَقَان السنديان، فِلَيْنِس السنديان

Phellinus dryadens (S).

فطر من السميات يركبه جنود السنديان وقد يصيب الكسكتا || مظهره الخارجي قيمة مستديرة، عمودية، فارشة الحافة، قطر قاعدتها راوح من ١٠ الى ٢٠ سم. غلافها الخارجي العلوي رقيق البشرة الرخوة، لونه الى البياض الاغبر، يرشح بعض النقط الخنطية اللون || لباه حنطي عايق، جامد المقطع الفلفي. بويغاته شفاقة او تينية اللون، مردنية الشكل، طولها نحو ٩ ميكرون وقطر قاعدتها ٣ ميكرون || وهو من الفطور السريعة النمو يظهر في اواخر تموز. مشيبه يسبب الغفن الخنطي بعد ان يجوب الاوعية ويغطها.



صَوَقَان



صَوَقَان أَشَقَق



صَوَقَان حَلَقِي



صَوَقَان كاذب

خليفة الصفة. ازهارها طرفي، فردي التجميع، تحوة  
نسة من الاوراق المستعرضة.



صوبل الشام

### ١٦٦٣٧ - صَوَمَرَة \* Acharia (S). Acharie (F).

الصورة ج صوير. نبات لبني عارض معمر من فصيلة  
الصوبريات يكثر في التيفاس وعلى سفوح مجاري الماء.  
يزرع القرنين. يتبين بكثرة فروسه الشفافة البسيطة،  
بقلة اوراقه المميعة، بدمج جبال ازهاره وبغرابه ثماره  
وزبروه المجذورة المستهجنة الشكل.



صولة

### ١٦٦٣٨ - صَوَمَرَة الْبَقُول \* Miselia oleracea, Mamestra oleracea, Polla oleracea (S). Misélie potagère, Noctuelle potagère (F). Bright-line brown-eye (E).

حشرة مؤذية من الفسقيات حرشفيات الاجنحة. موطنها  
يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اديوة. فراشها جارية  
قوتها مغتر الازهار. سرقها تميش على اوراق الصليبيات  
البرية والزرعاعية وعلى البقول. جسمها متوسط الطول  
نحو ١٥ م. بسطها نحو ٣٨ م. رأسها مثل الجرم  
جوزي اللون. عيناها كبيرتان، زباناها غطيتان.  
جوشنها الى الجوزة. بطنها الى الخفي الامس يملو غط  
ثجي من النقطة السود. روشناها الاماميان الى الجوزة  
تلعبا بقية مستديرة واخرى مربعة لوها الى الخفي  
الاصفر، ويملوا تسنين طرفي تبي اللون. روشناها  
الخلطيان الى الكلبة. اهدابها الى الطحلة النغية. لها  
جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في حزيران  
وتظهر فراشة الجيل الثاني في ايلول. تسرح في الليل.  
تعاقل بدم ظهورها بنحو خمسة ايام وتحتج الممكن لطفاً  
على الصفحات السفلى من نصال النبات اكمالاً الى السرعة  
تطول نحو ٣٥ م. جسمها مائل القشار. ثوبها الى  
الخضار الامس يملو غط ثجي قاطب جوزي اللون يحده  
من البين واليسار خطان اخضران واربع نقط سود في كل  
سكة. ويملو ايضاً خطان جانبيين اسفران. رأسها الى  
الجوزة. مدها الى الشبهة السمر المالح. رواجها سود.  
طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة.



صوبلية



صورة

### ١٦٦٣٩ - صَوَمَرَة الْقَرْنَفَل \* Miselia compta (S). Misélie parée, Noctuelle des dianthées (F). Miselia compta (E).

حشرة من الفسقيات حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض  
اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها واثمة قوتها  
رقيق الازهار. سرقها نائمة تلتهم اوراق القرنفليات  
وتتقبب الكبابير وتلتهم الزهور قبل التفتح. جسمها  
متوسط الطول نحو ١٤ م. بسطها نحو ٣١ م. رأسها  
خادوي الشكل اصعب اللون. عيناها كبيرتان، زباناها  
غطيتان. جوشنها وبطنها الى الصخرة السوداء المالح  
روشناها الاماميان الى الصخرة السمراء يملوا جميع اجز  
وتفجج ابيض وزرقة خفيفة وتنفذ اسود. روشناها  
الخلطيان الى الصخرة السمراء السوية اللون. اهدابها الى  
الطحلة النغية. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة  
في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تعاقل بدم  
ظهورها بنحو ستة اسابيع وتحتج الممكن لطفاً على الصفحات  
السفلى من نصال الاوراق الى السرعة تقارب نحو ٣٠ م.  
جسمها اسطواني الشكل، مشدود القشار. ثوبها الى  
الطحلة الخضراء يسمّر في الظهر ويثير في الجانبين. رأسها  
جوزي اللون. مدها الى الركبة. رواجها سود الى طول



صورة البقول



صورة القرنفل

### ١٦٦٣٩ - صَوَلَك Sperme des équidés (F).

### Sperm of the equidae (E).

هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الدواب من غيل  
وجير.

### ١٦٦٣٠ - صَوَلَك \* Corynespora كورينيسپوره

جنس فطور مجهرية من الريدانبات وفصيلة الطليات.  
جره الكينيدي سمره اللون، اسطوانية الشكل، غليظة  
المفاصل العقدية، فردية او نسبية التجميع. كنانده  
سبحية الترتيب، نحلة الفواصل الشفافة. انواعه قليلة  
العدد، اعرفها صوبل الشام.

### ١٦٦٣١ - صَوَلَك الشَّام \* Corynespora melonis (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الشام والقرع والخيار  
والكوس. مظهره الخارجي يقع لاقبسية الشكل والحجم،  
لونها الى السمره الطحلاء، اطارها حالي عابق اللون، تركب  
نصل الاوراق فتسبب ذبوا وبياها. يكاثف عند  
ظهوره باستهلاك المركبات النحالية المركزة ١٪.

### ١٦٦٣٢ - صَوَلَك \* Aschyromenia (S). Aschyromène, Sola, Neltite (F). Sola, Bastard sensitive plant, Pith-hat plant (E). Schampflanze, Sinnpflanze (D). Pianta modesta bastarda (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنيات القراضية.  
انواعه المعروفة سبعة مدها البلاد الحارة تكثر في الصين  
والهند. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها مختلفة الالوان  
الزاهية تميز بكثرة اسديتها التي يبلغ عددها عشرة. وهو  
نوعان.

### الصولة الصينية Aes. paludosa (S).

### Aschyromène de Chine (F).

ساقها مستطيلة، ليفية، لينة، تستعمل في صناعة الورق  
القاسر المعروف بورق الرز.

### الصولة الهندية Aes. cannabica (S).

### Aschyromène de l'Inde (F).

جنية ليفية مستطيلة الساق الغليظة. انها غزلية متينة  
تستعمل في عدة صناعات منزلية وغيرها.

### ١٦٦٣٣ - صَوَلَك Argent pur (F).

### Pure silver (E).

### ١٦٦٣٤ - صَوَلَكِيَّانِي Calviforme (F). Calviform (E).

شكل من الزباني يشبه الصولجان.

### ١٦٦٣٥ - صَوَلَكِيَّانِي الْقُرُون Rhopaloceres (F).

### Rhopaloceres (E).

مرتبة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. فصائلها  
عديدة تتميز بقرنها الاستشعارية الصولجانية الشكل.  
خادراتها عارية لا يملها، في بياتها، شيء. مكها يربيل  
الشكل، فردي الوصف، لا نظامي الترتيب.

### ١٦٦٣٦ - صَوَلَجِيَّانِي \* Leucadendron argenteum (S). Leucadendron argenté, Arbre d'argent (F).

مجهرية زينة سبروتية من فصيلة الفصليات. ساقها  
منتصبه فراءه. اوراقها تطول من ١٠ الى ١٦ م. وتعرض  
من ١٢ الى ١٦ م. نصلها جامد النسيج، خلي البشرة  
الفضية اللون. ازهارها انبوية، ضيقة، رباعية التشرم،

العارضة المصرة منها برية موطنها الغياض والادغال الرطبة وسبها زراعية تزيينية . اشهرها الصور .

١٦٦٤٣ - صَوْهَلَة Solenanthus (S). Solénanche (F).  
الصولة ج صول. نبات عشبي يحول من فصيلة الجسميات.  
انواعه قليلة موطنها جبال الشرق الاوسط . سوقها زباء  
الهداء ، عادمة الفروع ، تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها  
معتقة ، اهلبيجية ، ذلقة الزام الاخير . نصلها خفي البشرة  
اغبر اللون . ازهارها عنقودي التجميع ، ابطي الارتكاز .  
ازهارها انبوية الشكل تبدو حمراء اللون ثم تتحول الى  
الاريجاني الازرق || ازهارها يستمر من نيسان الى  
حزيران .

١٦٦٤٤ - صَوْعِيَّات Protoblattoptères (F).  
Protoblattoptera (E).  
رَبَّة حشرات من طبقة الوردانيات . احافيرها  
تعود الى الحقيقتين الكربونية والبرمية من الاباج الاول ||  
الاسم العلمي يرمز اليها من اسلاف الوردانيات .  
تزينها البروش واحد اما مقدم جوشنها فلا يسلف للرأس  
وكانت تعيش على الاشجار غلافاً لنبات وردان الدالة .

١٦٦٤٥ - صَوْيَة هي الصوعة ، اطبا .

١٦٦٤٦ - صَشَصَة Ergot (F). Spur (E).  
غلب الديك في ساقه .

١٦٦٤٧ - صَشَصَاء ، مُمْرَاط ، مَشْشَار Coulard (F).  
هو كل نبات معرض لآصاء أي لسقوط الزهر او  
لانتعاش الثمر بعد القد .

١٦٦٤٨ - صَيَاد السَمَك Cérýle (F).  
هو الزراف ، اطبا .

١٦٦٤٩ - صَيَادَة الْأَوْق Hippodamia (S).  
Hippodamie (F).  
جنس حشرات مفيدة من فصيلة الدعاسيق ورَبَّة معدنات  
الاجنحة .  
١٦٦٥٠ - صَيَاك القطيع من البقر .

١٦٦٥١ - صَيَاغَة Formulation (F).  
Formulation (E).  
الصياغة وضع الصيغة وتوضيحها .

١٦٦٥٢ - صَيَاكَة Entretien (F). Keeping (E).  
هي مجمل الاعمال المتوَجَّهة للحفاظ على الشيء سليماً من  
التراشيب .

١٦٦٥٣ - صَيَاخُور Roc (F). Rock (E).  
الصخرة الصلبة الباقية في مكانها .

١٦٦٥٤ - صَيَد ، إِصْطِيَاد ، لَصِيْد ، إِقْتِنَاص Chasse (F). Hunting (E).  
هو اقتناص الطير والحواشي . ويملك الصائد قصصه  
بالاستيلاء .

١٦٦٥٥ - صَيْد Gibier (F). Game (E).  
الصيد هو كل ما صيد من حيوان ينتج بوقاه أو جناحيه .

الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي ضمن جلاباب  
من العين تلتحف السرفة بعد ان تنتمن في التربة على عمق  
٤ او ٥ سم .

١٦٦٥٠ - صَوْهْرَة الْهَنْدَبَاء Misella dysodea (S). Misélie dysode, Noctuelle  
des chcorées (F). Misella dysodea (E).  
حشرة مستهجنة الرائحة من فصيلة الفسقيات ورَبَّة حشرغيات  
الاجنحة . موطنها يشمل معظم انحاء حوض البحر الابيض  
المتوسط . فراشتها واثمة منثر الانزعاج . سرقبتها تمش  
على اوراق وايزار المركبات واخصها الهندباء || جسمها  
متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣١ سم . رأسها  
مخروطي الشكل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان .  
سرقبتها معتدل الحجم والطول . جوشنها وبعثها الى الرَبَّة  
السراء المواج || روشنها الاساميان الى الرَبَّة الخنطية  
المواج يطولها يتبعج اسمر تتخلله نقط سود . روشنها  
الحلقيان الى الرَبَّة الخنطية الزاهرة تسمر قرب الاطراف ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار ويقتى حتى  
تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة  
اسباب وتفتح الممكن لعلها على الصفحات السفلى من نصال  
الارزاق || السرفة تطول نحو ٣٠ سم . جسمها اسطواني  
الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الخنطية السراء يطولها  
خط لبيجي قاطب اسود اللون ، ابيض الخنار من اليمين  
واليسار . جانبها معتقان بالاسود والاصفر . رأسها احمر .  
مدنها الى الرَبَّة . وواجبها الى السرة || طور الاكمال  
الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن  
جلاباب من العين .

١٦٦٤١ - صَوْهْرَة رَحَالَة Misella peregrina (S). Misélie pélerine (F).  
Misella peregrina (E).  
حشرة من الفسقيات حشرغيات الاجنحة . موطنها مجاذع  
وتنام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها واثمة قوتها  
منثر الانزعاج تتميز بخامة الاضلاع من بقعة الى بقعة .  
سرقبتها تمش على اوراق السرق والحرض والقطف والاشنان  
والرث || جسمها متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم . رأسها  
معتدل الحجم ، اود اللون . عيناها كبيرتان . زباناها  
عيطيان . جوشنها وبعثها الى الرَبَّة الخنطية المواج ||  
روشنها الاساميان الى الرَبَّة الخنطية تملوها رقة وزوزقة  
تلوح من الشقعة الى الصبهة والشبهة . روشنها الحلقيان  
الى الرَبَّة البيضاء المواج تملوها جدة مفرقة تسبق الخنار  
الخارجي || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول  
في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل .  
تماثل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتفتح الممكن لعلها  
على الصفحات السفلى من نصال اوراق النباتات المائل ||  
السرفة تطول نحو ٣١ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ،  
مالس القشار ، عادم الحلب والنقط السود . ثوبها الى  
الخضار الزيتي تملوها ثلاثة خطوط قاطبة جزوية . رأسها  
الى الحفرة المرحانية . مدنها وواجبها الى السرة السوداء ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة  
ضمن جلاباب من العين .

١٦٦٤٢ - صَوْهْرِيَّات Achariaceae (S).  
Achariacées (F). Achariaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . انواعها  
كثيرة معظمها افريقي المنبت . جميعها من النباتات الليفية



صورة الهندباء



صورة رحالة



١٦٦٥٦ - صَيْدُ السَّمَك (Fishing) (F).  
هو البحث عن السمك وإخذه بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لمصاد بحق الاستيلاء .



صيداء

١٦٦٦٦ - صَيْدُ السَّمَك \*  
Sarcophaga carnaria (S). Mouche à damiers, M. de la viande (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٧ و ٢٠ م. ثوبها أغرض اللون يعلوه خطوط متصالبة تشكل مربعات تشبه رقعة الشطرنج . يكثر وجودها من أيار إلى تشرين الثاني . تسرح في كل مكان . مكها ينقث في جرحها التريسي فتضخم رقات صغيرة دقيقة على اللحم والجيف والافتقار .



صيدان أبيض الرأس

١٦٦٦٧ - صَيْدُ كَتَانِي Tamia

هو الثامية ، الحظباء . أما صيدنايا فن وضع الفريخ إلى الكنور أمين الملعوف .



صيد أزرق

١٦٦٦٨ - صَيْدُ كَيْتَات ، لَقَاعِيَّات Calliphoridae (S). Calliphoridés (F).

فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات أجنات . أجناسها وأنواعها نحو ٥٠٠ معظمها صغير القند وبعضها متوسط وكثير . أنثاها مختلفة يغلب فيها الرصاصي . أرجلها زياد . ذكورها كأنثاها لا تفرق بينها سوى عندة البك الملونة الظاهرة في مؤخر الحلقة الطويلة عند الذكر . قوتها منثر الإزهار وإفرازاتها ، والعلماء ، وأكثر المواد الضوية والبراز || رقاتها هواكة وأجحة ومنها خاضعة ونائلة وبعضها لاسع يركب الحيوان فيؤذي .



صيد الجراد

١٦٦٦٩ - صَيْدِي Cynétique (F). Hunting are (E).

ما له علاقة بفن الصيد .

١٦٦٧٠ - صَيْز

اسم شامل يطلق على البلم الملح وصل بعض صفار السمك كالقشقرش والمفت والرفال الخ .



صيد الحسم

١٦٦٧١ - صَيْرَة Bercall (F). Fold (E).

الصيرة والسيارة . حظيرة البقر والنم والزمز .

١٦٦٧٢ - صَيْرَم \* Inoceramus (S).

Inocerame (F). Inoceramus (E).

جنس حيوانات من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادمات المثاب وفضيلة الاطريات . أنواعه المعروفة عديدة جميعها من مستحبات الأراضي الطليانية || أصدافها شبيه غروبية الشكل بالثة التخديد الطولي .

١٦٦٧٣ - صِيض هو السامة ، الحظباء .

١٦٦٧٤ - صِيصَاء

حب الطيخ والمخلط والقيام وما أشبه الذي ليس في جوفه لب .



صيرم

١٦٦٧٥ - صَيْغُورُ قَلَق \* Seisura inqueta (S).

Seisura inquet (F).

طائر من الجوارح سنيات المنقير ينتمي إلى فصيلة الذبابيات . يألف الغابات وصفات مجاري الماء . لبعته الحياتي جامعي . جناحاته قليلة العدد . قوته الذباب والحمام والديدان || جنسه صغير القند يطول نحو ١٦ سم . مقاربه غرزي الشكل ،



صيصور قلق

صغير الحجم . سباله كثيف وقصير . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، مقطوم الطرف . ثوبه البدرى إلى الخضار اللامس الأسفح الموج . زوره وصدره وبطنه إلى

Pêche (F). Fishing (E).  
هو البحث عن السمك وإخذه بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لمصاد بحق الاستيلاء .

١٦٦٥٧ - صَيْدَاء \* Callionymus (S).

Callionyme, Chiqueux, Dragonnet (F).  
جنس اسماك بحرية من شالكاكات الزنائف . أنوعها عديدة منها واحد يقم في البحر الأبيض المتوسط . وهو صغير القند ، مستطيل الشكل ، كبير الرأس ، مزرقف الثوب ، متباين الزنائف المجلدة والملدجة بمختلف الألوان .

١٦٦٥٨ - صَيْدَاء

هي الأرض الحمراء التربة الغليظة الحجارة المستوية السطح

١٦٦٥٩ - صَيْدَح Hibou (mâle) (F).

Owl (male) (E).

ذكر البومة .

١٦٦٦٠ - صَيْدَكَة Pharmacopée (F).

Pharmacopoeia (E).

بحث تركيب الادوية وطرق استخدامها المعالجة .

١٦٦٦١ - صَيْدَن ، زَيْتَار Sarcophaga (S).

Sarcophage (F).

جنس ذباب بيوض ولود لحاس من فصيلة الصيدين . أنواعه عديدة جميعها وأجحة ونائلة يكثر وجودها في الصيف . أشهر أنواعها وأجحة الاربعة التالية .

١٦٦٦٢ - صَيْدَن أَيْضُ الرَأْس \* Chrysomya albiceps (S).

Mouche à tête blanche (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح من ٥ إلى ٧ م. لونها إلى الزرق . رأسها أبيض . زباناها سوداوان . رقاتها غبراء اللون ، زياد الجسم تمشي على الجيف .

١٦٦٦٣ - صَيْدَن أَخْشَن Pollenia rudis (S).

Pollénie rude (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفضيلة الصيدينات . جسمها متوسط القند يطول من ٨ إلى ١٠ م. عليها متكاثف غشن . طيراتها غتيف الحركة سريعة . رأسها كبير الحجم . غطها ذرب . زباناها صغيران . عينها كبيرتان . صدورها أريد اللون ، غتلي الموج . بطنها إلى الزرقة . أسود الزركفة . رشاها كيربان ، شفافان ، يملؤها شفح غتلي . قوتها إلى السرة || يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الثاني . ترب في المواقع المعروفة لاشعة الشمس || قوتها منثر الإزهار والإفرازات النباتية وقد تقتحم المنازل الريفية في طلب القوت || رقاتها وأجحة وتضلل على الخراطيم فتقتفي عليها .

١٦٦٦٤ - صَيْدَن أَزْرَق \* Calliphora erythrocephala (S).

Mouche bleue (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٨ و ١٢ م. ثوبها إلى الزرقاة اللامعة . يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الاول . مسرجها كل مكان شمس . لا تدخل المساكن الا لتتبع مكها على اللحم والجبن والخضار والبقول الذابلة . رقاتها دقيقة غبراء اللون ، سمرار الرأس ، مبيضة الحلب .

١٦٦٦٥ - صَيْدَن الْجِرَاد \* Stomorhina lunata (S).

Mouche des sauterelles (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٥ و ٧ م. ثوبها مجذع وضطط بالأسود والاذغير . يكثر وجودها من سيزران

Rostellaria (S).

Rostellaire (F). Rostellaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الدلائيات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط || اصداؤها مردنية الشكل، متباينة القد، تطول من ٤ الى ١٢ سم. جميعها محزنة حتى الاقارب. فروعها مستطيلة، دقيقة: الاطراف الميزابية، مفرصة الجواض || اجسامها محزنة، مستظلة الرؤوس المنتهية باعظام مفلوطة. لوانها ثنائية، مفلوطة، مميونة. ارجلها مشطورة الى فلتين، الخلفية مجهزة بسقاط قرني المادة ظلي الشكل.

Détrition (F).

Detrition, Wearing away (E).

الصيكة الانقراض بالاحتكاك او الملك.

Détritique (F).

Detrital (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع التكوينات الرسوبية المتأثرة من تفتت الصخور ميكانيكياً.

Sclerostomum (S).

Sclérostome (F). Sclerostoma (E).

جنس دود من السلديات. انواعه عديدة جميعها طفيلية. بعضها يتطفل على الدواجن اغصها الخيل.

\* صَيْلَمُ اغْتِيلُ

Sclerostomum equinum (S). Sclérostome du cheval, Strongle armé (F).

نوع من الصيلم يعيش طفيلياً في مساريق وارباج الخيل فيضيمها بما يسببه من مفس مؤلم.

\* صَيْهَبُ

الصيهب: شدة الحر. يوم صهب وصهب: شديد الحر.

Deserticole (F).

Deserticole (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يألف الصحراء.

Lisse (F). Smooth (E).

\* صَيْهَوُجُ

الصيهوج هو الاملس اللحاء من النباتات.

\* صِيَوَاتِيَات هي فصيلة الخبيسات، اطها.

البياض التاسع || يدثر عشه في الانجار الرقيقة. الاثني تحضن بمنابذة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات.

Formule (F). Formule (E).

تمير مجازي او رقمي يدل على كيات المواد التي يتألف منها تركيب معين ما مع نسبة عناصره وعدد وحداته الغذائية.

Eté (F). Summer (E).

\* صَيْفُ

احد فصول السنة الاربعة مدته ثلاثة اشهر تبدأ في نصف الكرة الشمالي في ٢١ حزيران وتنتهي في ٢٠ ايلول. وهو يتميز بشدة حرارته وبطول نهاره وذلك لانه يبدأ عندما تكون الشمس في السمست عمودية على مدار السرطان.

\* صَيْفِي، صَيْفَة

Poussière suspendue dans l'air (F).

الصيق والسيقة: الغبار الجائل في الهواء.

Loxia (S).

Loxie, Bec-croisé (F). Crossbill (E).

جنس عصافير من فصيلة الشرشوريات. انواعه سبعة جميعها من مصافير المناطق المعتدلة. طولها يراوح بين ١٤ و ٢٠ سم. انواها عديدة الالوان فيها المجزوي والاصفر والاسمر والاسود والرمادي والابيض والمنش. مناقيرها غليظة، قوية، متصالية. اذناها فارقة || يألف الاحراج اغصها اسراج السنور والتوب والسرور. قوته حب السنور ويختلف البزور البرية والزراعية وبعض الحشرات والحوام || يدثر في الانجار الكثيفة. اناته تحضن وحدها ٤ بيضات على مرتين في السنة بينا ذكروها قوين الغذاء وتغرد.

Codex

\* صَيْفِيَان، كودكس

المجموعة الرسمية التي تبحث في الادوية وبركاتها وطرق تحقيقها.

Smerinthus (S). Smérinthe (F).

جنس حشرات من فصيلة المولييات انواعه اربعة او خمسة جميعها دجوية تسرح في الليل. اجسامها متوسطة القد طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم. انواها الى الفرة الخنطية. حفيفاتها متبقية بالاسود. رواشها كبيرة، مزركفة وبونجة. قرونها الاستشعارية قنادية الشكل || يرقاتها مرطاة الجسم يكثر فيها اللون الاخضر القاتم. وهي خاضلة قلمهم اوراق بعض الاشجار اغصها السنديان والرزقون.



صَيْفِي



صَيْفِي



صَيْفِي



صَيْلَمُ الْخَيْلِ



ض



ضابطان احمر الشريط



ضارية

مرة من ٤ الى ٦ بيضات ترخها بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً :

١٦٦٩٣ - ضابطة التغير Entropie (F).  
Entropy (E).  
طريقة تسمح بتحديد انحطاط جهد القوة الحرارية .

١٦٦٩٤ - ضابطة بيطرية Police sanitaire vétérinaire (F).  
جام القوانين والانظمة المرجعية الاجراء الهادفة الى مقاومة انتشار الامراض السارية والمعدية في اللواجن .

١٦٦٩٥ - ضابحة Embouchure, Delta (F).  
هي دلتا النهر وغوره او صبه .

١٦٦٩٦ - ضائر Carnassier (F). Feline animal (E).  
الحيلوان المفترس . م ضارية . ج ضوار .

١٦٦٩٧ - ضارب Erratique (F). Erratic (E).  
نعت تعريفى يطلق على كل طائر ليس يابئ او قاطع بل يحوب البلاد من منطقة الى اخرى في طلب الرزق . ج ضوارب .

١٦٦٩٨ - ضارب Multipliant (F). Multiplying (E).

١٦٦٩٩ - ضاروة \* Procrustes (S). Procruste (F).  
جنس خنافس مفيدة من فصيلة البرماتيات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعها عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح بين ٣٠ و ٤٠ م . اثنائها الى السواد النحى . تسرح في الليل وتفتسر الكثير من الحشرات والهوم الضارة .

١٦٧٠٠ - ضاس - ضاس النبات : باشر بالفئس والفئس اول الحجج .

١٦٦٩١ - ضابطان Agelais (S).  
Troupiale (F). Bobolink (E).

جنس طير من فصيلة الكاربونيات . انواعه المعروفة اربعة . جميعها من قواطع القارة الامريكية تحصى فصل الشتاء والبرد في الاقاليم الحارة من امريكة الوسطى والجنوبية وفصل الصيف في امريكة الشمالية . نطاشها الحياتي جماعي . اسرابها وافر العدد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٤ الى ٢٦ سم . مناقيدها مخروطية ، مستدقة الاطراف . اجنحتها مستطيلة . اذناها مستديرة الاطراف . ارساغها معتدلة الارتفاع . اثنائها سوداء اللون او كستنية . اكشافها ، اي لواحظ اجنحتها ، صفراء اللون او حمراء . اثنائها اصفر قدماً من ذكورها وابهت اثنائها منها || تألف الاجسام والمستنقعات ويجاري الماء . قوتها الحشرات والحبوب والبلودور . تقسم حقول الحنطة والارز والنقم .. فتوقع بها اشد الاندى || اعرف انواعه واشهرها ضابطان احمر الشريط .

١٦٦٩٢ - ضابطان احمر الشريط \* Agelais phoeniceus (S).  
Troupiale à épaulettes rouges (F).

طائر من الضابطان القواطع يحوب امريكة الوسطى والشمالية في طلب الحصيد والمشي . يأنف الاجام ويجاري الماء والمستنقعات . سريره وافر العدد || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . ثوب الذكر الى السواد الاحمر الاسفع . لواحظ منكبها الى الحمرة الازرقاوية . حلقه عينه كستينية اللون . مناقده وساقاه الى السواد الازرق الموج . الاثنى اصغر قدماً من الذكر ، تطول نحو ٢٢ سم . ثوبها الى الكهبة تعلوها في صدرها وبعظها رقعة سوداء || اخلاقه مرحة ، فرحة ، آتسة . قوته الحشرات والحبوب ويطن ديش عشه في الاشجار الشارقة على الماء . عشه قدسي الشكل رقيق الجانب . الاثنى تحفن مرتين في الحول وتضع في كل

## ١٦٧١٣ - ضَبَار Oxypetalum (S). Oxypétale (F).

جنس نباتات برية وتريينية من فصيلة السكليات. أنواعه قليلة، سوقها منتصب. أوراقها متقابلة، ممتعة، اهليلجية النصل، قلبية القاعدة، ازهارها مستطيلة التويجات القارضة. الواحدة ضبابرة || اشهر انواعه التريينية ما يلي.

## ١٦٧١٤ - ضَبَارِ اَزْرَق Oxypetalum corœuleum (S). Oxypétale bleu (F).

نوع من الضبار وهي عشية حولية تلون نحو ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها ليفية فراء. أوراقها زياء النصل على صفحتيه. ازهارها تبدو زرقاء اللون ثم يتفحسج || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

## ١٦٧١٥ - ضَبَار كثير الزهر Oxypetalum solanoides, Tweedia floribunda (S). Oxypétale faux-solanum (F).

نوع من الضبار وهي جنبة معمرة تملو نحو ١٨٠ سم. ساقها خشبية فراء. أوراقها زياء النصل على صفحتيه. ازهارها زرقاء اللون يملوها بتيجج وردي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

## ١٦٧١٦ - ضَبَاب

الضباب مجموعة كواكب كثيرة العدد اسفل من بنات نعل.

## ١٦٧١٧ - ضَبَابَك \* Nivenia (S). Nivénie (F).

جنس نباتات جنبة تريينية من فصيلة السونيات. مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية. جلودها درية، سوقها مبطلة، منتصبة، قليلة الفروع ترتفع نحو ٦٠ سم. أوراقها ستانية مشيرة النصل. ازهارها علقي التجميع. ازهارها الى الزرة الساجينية. ثنائيات بنية اللون || انواعه المعروفة اثنتان لافارق بينهما سوى شكل الازهار وعدد الازهار ولونها || تنويره يستمر من الربيع الى الخريف.

## ١٦٧١٨ - ضَبَّة Spadice (F). Spadix (E).

الطلمة قبل ان تنفلق عن الفريش.

## ١٦٧١٩ - ضَبَّع ، لَئِيم Cri du hibou (F).

صوت البوم.

## ١٦٧٢٠ - ضَبَّح Cendre brune (F).

هو الرماد الاسمر اللون.

## ١٦٧٢١ - ضَبَّر ، ضَبَّر هو شجرة جوز بوا.

## ١٦٧٢٢ - ضَبَّر \* Dendromecon (S).

جنبة معمرة من فصيلة المصغيات. ساقها فراء تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها اهليلجية النصل، بحرية الخضار، ثلاثية البروق، تملو من ١٢ الى ١٥ سم. ازهارها صفراء اللون، قمرها يراوح من ٣ الى ٧ سم. || تزدد لثزين. تنويرها يستمر من اواخر آذار الى اواخر حزيران.

## ١٦٧٢٣ - ضَبَّطَاب \* Galacantha (S).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفضيلة الضاعيات. انواعه المعروفة خمسة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

## ١٦٧٠١ - ضَبَاغِن

الضباغن من الخيل الذي لا يعطي ما عنده من الجري الا بالضرر.

## ١٦٧٠٢ - ضَبَال \* ، عَضَاب بَرِّي ، سِدْرُ الْجِرْ

Zizyphus lotus, Rhamnus lotus (S). Jujubier sauvage, j. des lotophages, Lotus des ashiens (F). Lotus tree, L. Jujube, Wild jujube (E). Lotosbaum (D). Giuggiolo salvatico, Loto dei lotofagi (I). شجرة حرجية شائكة من فصيلة التوتيات. كانوا يقسمونها في الزمان العابر ويمزون الى ثمارها عدة فضائل نفسانية وصحية. ثمارها صلبة القد، عنابية الشكل واللون، لذينة الطعم. نعيمها يفيد الصدر ويقويه.

## ١٦٧٠٣ - ضَبَامَ Connectif (F). Connective (E).

نمت تمرين يطلق على بعض النسيج الحيواني المتحددة المنصبة.

## ١٦٧٠٤ - ضَبَان \* Ovis aries (S).

Mouton, Ovin (F). Sheep, Ovis (E).

جنس حيوانات داجنة مجترمة من فصيلة الغنميات ثرى لقصابة والصوف والجلب. الواحد ضبان الذكر وضبانة لاثني. والذكر الفحل يدعى كيشا والاثني نمجة وشاة. انواعه معروفة كثيرة العدد لا مجال للذكرها وتعليلها في هذه الموسوعة.

## ١٦٧٠٥ - ضَبَان أَلْيَان \* Ovis aries steatopygia (S).

Mouton à queue grasse (F).

ضبان ذو آلية وهو من السلالات المعروفة في الشرق الاوسط واطلس آسية.

## ١٦٧٠٦ - ضَبَابِيَّات Ovinés (F). Ovines (E).

الضبابيات او الضبابية احد قسمي فصيلة الغنميات.

## ١٦٧٠٧ - ضَبَابِيْم Imperméable à l'air (F).

هو ما كان لا يتنفذ الهواء. راجع شيف.

## ١٦٧٠٨ - ضَبَّة \* Uromastix, Uromastyx

حيوان من الزحافات يشبه الورل. موطنه البلاد الحارة يكثر في الجزيرة. يطول نحو ٤١ سم. وهو قبيح الهيئة والشكل، صغير الرأس، قصير العنق، مستطيل الذنب الاحمر المفقّر المقعد. لونه الى الصخرة وهي غيرة مشربة سواداً. واذا حين اصفر صدره. ينفق يشبه في الريل فيتنفس بعد وضعه باربعين يوماً || قوته الجنادب والدباب والعشب. والغرب يحرسون على صيده واكله. كنيته ابو حل. اثناء كدسي فيه وجمعه ضباب واغضب وضباب.

## ١٦٧٠٩ - ضَبَاب Brouillard, Brume (F).

Fog, Haze (E).

بخار ماء كالتني سريع الانتشار يتكاثف قرب سطح الارض فيتشيا ويصحب البروية. اسبابه عديدة ارجسها: مرور رياح دافئة رطبة فوق سطح بارد او اختلاط رياح حارة رطبة بفترها ابرد منها.

## ١٦٧١٠ - ضَبَابِيَّات هي السقيات، اطبا.

## ١٦٧١١ - ضَبَاب Griffe de lion (F).

Claw of lion (E).

الضباب والضبط والضبط والمضاب: برأى الاسد.

## ١٦٧١٢ - ضَبَاب Glapissement du renard (F).

Yelping of the fox (E).

هو عواء الضبط.



## ١٦٧٣٠ - صُفْبَة عَشْرَاء \* عَشْرَاء

*Hyasena brunnea* (S). *Hyène brune* (F). Brown hyasena (E).

نوع من الصُفْبَة طوله نحو ١٠٥ سم. وذنبها ٤٢. ثوبها مستطيل الشعر الخشن الحلي الشكل. لها إلى السرة المابئة الحلقية المواج، يملؤها تجذيع أصهب يعترض الظهر ورقشة غبراء تكتنف الرأس والصدر والسيقان || موطنها التهام الافريقية الجنوبية المشترقة على البحر.

## ١٦٧٣١ - صُفْبَة مُجَدَّعَة \* عَرَقَاء

*Hyasena striata* (S). *Hyène striée* (F). Striped hyasena (E).

نوع من الصُفْبَة طوله نحو ١٠٧ سم. وذنبها ٤٥. ثوبها إلى الريدة الصفراء المواج يملؤها تجذيع أسود. عرفها حلي الشعر، أسود اللون، يمتد من نقرة الرأس إلى الذنب. رأسها غليظ القد. مخروطي الشكل، أسود الخسر وما يليه من العنق. أذناها كبيرتان ذلتان، ذنبها جتل الصوف. موطنها يمتد من الهند إلى تركيا ومن البلاد المراكشية إلى شواطئ افريقية الشرقية.

## ١٦٧٣٢ - صُفْبَعَان

*Hyène mâle* (F).

*Hyasena male* (E).

الصُفْبَعَان ذكر الصُفْبَة وإذا ثبتت قلت صيغتين. والآخر صيغتان وألجس صُفْبَعَان وصُفْبَعَانات.

## ١٦٧٣٣ - صُفْبَعِيَّات

*Hyenidae* (S).

*Hyénidés* (F). *Hyenidae* (E).

فصيلة الصُفْبَع من رتبة اللوام تشمل الصُفْبَة والسيار.

## ١٦٧٣٤ - صُفْبِين

*Aisselle* (F).

الصُفْبِين والصُفْبِين هو الايط، أعظم.

## ١٦٧٣٥ - صُفْبِيَّة، صُفْبِيَّة

*Famille* (F).

*Family* (E).

مجموعة أفراد العائلة الواحدة من الحيوان.

## ١٦٧٣٦ - صُفْبِيَّة الْكُرْمَة \*

*Lopus albomarginatus*, *L. sulcatus*, *Calocoris albomarginatus* (S). *Lope laboureur*, *Grisette*, *Margotte* (F).

حشرة من الصُفْبِيَّات صغيرة القد مستطيلة الجسم الرغو. طولها نحو ٧ م. ثوبها إلى السرة للونحة بخطوط صفراء وحطية. الذكر كبير الاجنحة. اما اجنحة الانثى فصغيرة الحجم لا تملكها من الطيران. تركب الكرمة فتؤذي البرعمة الزهرية والزهرية والحية به التآير || برمتها دقيقة الجسم تبسو عند تقفها مرجانية اللون، رنادية الارجل تنحرف إلى الصفرية الملبدة بالاياف وقد يكون ذلك عند بلوغها الانسلاخ الاخير فبرواح، اذ ذلك، طولها بين ٢ و ٣ م.

## ١٦٧٣٧ - صُفْبِيَّة مُخَطَّطَة \*

*Calocoris striatus* (S). *Calocoris strié* (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الصُفْبِيَّات. جسمها مستطيل التبطيط، يطول من ١٠ إلى ١٢ م. رأسها صغير، مزواني الشكل. غطها مستطيل اللون. صيغتها صُفْبِيَّاتَان، ناضراتان. زبائنها مستطيلة. كسولها شبه يرمي الشكل. حجبها عرصة صغيرة. ظفرها شقيق، لاصف. جنتيها مستطيلة || ثوبها إلى الخضار الاصفر المواج، يملؤها في رأسها مشمة سمر، وفي كسولها وحجبها تنقيط

اجسامها مبطلة متوسطة القد تطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. تتميز بكثر السراس الذي يتوسطه منخس صلب حاد، وبندقة القرون الاستشارية الشديدة الطول || لحومها مأكولة جيدة السنت.

## ١٦٧٣٨ - صُفْبِيَّيَّة

*Heliosperma* (S).

*Héliosperme* (F). *Heliosperma* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الترفليات. مهدا بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. سيقانها نحلة. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء اللون. تزرع للزينة بين الصخور. ترطب في الارربة الكلسية || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

## ١٦٧٣٩ - صُفْبِيَّيَّة جَبَلِيَّة

*Heliosperma montana* (S).

*Héliosperme de montagne* (F).

نوع من الصُفْبِيَّيَّة. عشبية معمرة. ساقها نحلة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها عصفية الشكل تطول نحو ٤ م. وترعرع نحو ٨ م.

## ١٦٧٤٠ - صُفْبِيَّيَّة رُبَاعِيَّة الفلج \*

*Heliosperma quadrifidum* (S).

*Héliosperme à 4 lobes* (F).

نوع من الصُفْبِيَّيَّة. عشبة مخضرة معمرة. ساقها غليظة تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. اوراقها عديدة، دقيقة الجرم، تطول نحو ٢ م. وترعرع نحو ١ م.

## ١٦٧٤١ - صُفْبَة

*Rut*

الصُفْبَة هو طلب الاثنى للذكر في الحيوانات المجرة اغصها الايل. صُفْبَت وأصُفْبَت الناقة: ارادت الفحل.

## ١٦٧٤٢ - صُفْبَة، صُفْبِيَّة

*Hyasena* (S).

*Hyène* (F). *Hyasena* (E).

جنس حيوانات مفترسة من فصيلة الصُفْبِيَّات ورتبة اللوام. انواعها ثلاث موطنها العالم القديم. تتميز بجشها القوي الشبه من جش الكلاب الكبيرة. شعورها وأذناها وقصيرة، ورونها مخروطية الشكل غليظة. امتانها متوسطة القد. قوائمها الامامية ارفع من الخلفية فتبدو كأن ظهروا مستندة إلى الزواء || وهي من الراس التي تسرح في الليل. قوتها الجيف وعظامها التي تسحقها بها بلفت تحاشها. صيغها يشبه الضفدع ويدعى الشعر || والصُفْبَة مؤنثة ج أصعب وصُفْبَع وضع وضع وصُفْبَعات. ولا يقال صُفْبَة للاثني بل صُفْبَعات. وتُصَغَّر الصُفْبَة أصُفْبِيَّة || ومن اسماء الصُفْبَة الجليل والجبار والحفصة والحزبل والخضار. ومن كنهها أم خنود وأم عامر وأم طريق وأم نوزل وأم القويو وأم ربل وأم حلف وأم دهبك وأم روم وأم جمار. والذكر ايو غائر وأيو كلد وأيو المختبر وأيو غنفل.

## ١٦٧٤٣ - صُفْبَة رُقْطَاء \* دُبْع

*Hyasena crocata* (S). *Hyène tachetée* (F). Spotted hyasena (E).

نوع من الصُفْبَة وهي اكبرها جثة، طولها نحو ١٥٠ سم. وذنبها ٣٥ سم. ثوبها إلى الصبغة الرمضاء المرقطة بالاسمر. فارق العلو بين قاتميتها الاماميتين والخلفيتين لا يتعدى ١٥ م. أذناها صغيرتان مستديرتان. ذنبها قليل الشعر || موطنها فسح الارباء بم ثلاثة اخماس افريقية.



صُفْبَة رُبَاعِيَّة الفلج



صُفْبَة رُقْطَاء



صُفْبَة جَلْعَة



صُفْبَة الْكُرْمَة

كثرة الازوت وقلة الفسفور . ثنائيا كثرة الرطوبة الجوية والحاررة . ثالها الظل . التبغ .

#### ١٦٧٤٧ - ضُبُوبَة \* Patersonia (S).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسيات . مهدا استراليا . سورها جذمورية قصيرة . اوراقها خفيفة النصال الجامدة . شاربها ماسة . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها ملوقة بقنابات كبيرة زرقاء اللون تتألف من اثوب دقيق وثلاث بتلات خاربية كبيرة الحجم فافرة وثلاث بتلات داخلية دقيقة صغيرة منتصبة || تزوج الزرين ضمن البيوت وفي الحادق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة الخصب || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :

#### ١٦٧٤٨ - ضُبُوبَة نَاعَة \* Patersonia sericea (S). Patersonia soyeuse (F).

نوع من الضبوبة . شمراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . اوراقها مزغبة الخفاف تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . ازهارها الى الزرقاء البنفسجية المواج . قناباتها الزهرية مستطيلة الزغب الناعم || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٦٧٤٩ - ضُبُوبَة هَزِيلَة \* Patersonia fragilis (S). Patersonia fragile (F).

نوع من الضبوبة . شمراخها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . ازهارها الى الزرقاء الجميلة . قناباتها الزهرية مرطاة . بتلاتها الخارجية اهليجية الشكل تطول نحو ١٠ سم . بتلاتها الداخلية تطول نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

#### ١٦٧٥٠ - ضُبُوبَة \* Malaptera (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الكنشيئات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اصداؤها صغيرة القد وشعيرة مخزنة . قناباتها معتدلة الانفراج وباعية الفلق الانسلاوية التي تبدو كاربيل الاورث شككا وحطابا .

#### ١٦٧٥١ - ضِبْج Insolation, Luminosité (F).

Sun-stroke, Luminosity (E). الضبح سوء الشمس على الارض وهو نقيض الظل .

#### ١٦٧٥٢ - ضُبَاعَة \* Rhagonyque (F).

حشرة من الدّراحيات تدعى رغبقي ، اطلبها .

#### ١٦٧٥٣ - ضَبَلَك Cri du singe (F).

Cry of the ape (E). صوت القرد .

#### ١٦٧٥٤ - ضَبَل Etiaque (F).

Low-water mark, Lowest water level (E). هو البروض ، المستوى الادنى للمياه بحر او نبع . وهو المياه القليلة السق بها كان مصدرها .

اسود . ظهرائها الى الطحلة الرمادية . روشها عشائي ، قسطنطي اللون عند الانتشار . بطنها وبذها الى السمرة || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها السنديان .

#### ١٦٧٣٨ - ضُبُوب

الائى الضيقة الاحليل ، الصعبة الوضع من البقر والتمز والمماز .

#### ١٦٧٣٩ - ضُبُوبَة كَرِيْفِيَّة \* Lecocchia cretica (S). Lecocchia de Crète (F).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخيميات . منته جزيرة اكريت وجبال لبنان من ارتفاع ١٠٠٠ الى ١٨٠٠ متر عن سطح البحر || ساقه منتصبة فراء ، اوراقه مركبة ، وريشية ، السفلى مستطيلة اما العليا فقصيرة . ازهاره صيواني التجميع ، تاجي . الاوتكاز . ازهاره صغيرة ثينة اللون . ثماره بيضية الشكل ، حسكية القشار ، ثنائية الفلق || تنويره ربيعي .

#### ١٦٧٤٠ - ضُبُوبَة \* Unicites (S).

Unicite (F). Unicites (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة التقيديات || انواعها المعروفة عديدة مجيها من متحجرات الطبقة الارضية الاولى .

#### ١٦٧٤١ - ضَبَع \* Brachycaulus (S).

Brachycaule, Brachycole (F). جنس حشرات من فصيلة الضمحيات ، انواعها المعروفة اربعة مجيها صغيرة القد بنية اللون الخلع والموشم بالاسمر والاغبر . رفاقها حشلية اللون ، مراء المواج || تركب مع رفاقها معظم التيجليات البرية اخصها التيجيل والتجبر والاراء ختمص عصارة الارواق وتلويها .

#### ١٦٧٤٢ - ضَبَع مُحَرَّمَة \* Brachycaulus triangularis (S).

Brachycaule triangulaire (F). حشرة خاملة من فصيلة الضمحيات . جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م . رأسها مستعرض القفن ، محرم ، بني اللون . غططها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقتان . اصمرا . كويلها بني اللون ، اسود الطوق . حجبها صغيرة سوداء . ظهرائها لاحف . اربد اللون . بطنها الى السمرة السوداء . قنابها سود الانفاج والارماغ ، بنية الفلتايب || تألف البراري حيث تكثر نباتات فصيلة المركبات اخصها الضفهاء .

#### ١٦٧٤٣ - ضَبَجَاج Ivoire (F). Ivory (E).

هو الماچ ، اطلبه .

#### ١٦٧٤٤ - ضِبْجَاج

الضبج : صمغ يؤكل . وكل شجرة يسم بها الطير وقيل السباع .

#### ١٦٧٤٥ - ضَبْجَاج

« نبات كالفضفايس الا انه اغلظ مربع القصبان يصعر ماؤه في الين الرائب فيطيب » (السان) .

#### ١٦٧٤٦ - ضَبْجَاج ، شَمَل Verse (F).

Beaten down (E). عارض يصيب الزرع فيستلي على الارض . اسبابه عديدة اهمها عدم اتران العناصر الغذائية في التربة اخصها



ضِبْج



ضَبَع



ضبوبة هزيله

## Contributions (F).

Tax or rate (E).

في الاموال التي يجب على كل مكلف دفعها ساهبة  
ليسام في النفقات العامة . وقد تكون ضريبة وعقارية .

## ١٦٧٦٩ - ضرائب غير مباشرة

Contributions indirectes (F). Indirect taxes or  
excise (E).

في الضرائب غير المقررة التي تدفع بمناسبة عمل معين .

## ١٦٧٧٠ - ضرائب مباشرة، ضرائب مقررة،

Contributions directes (F).

Direct or assessed taxes (E).

في العائدات الثابتة أي الضرائب المتصفة بصفة الاستقرار .

## Multiplication

## ١٦٧٧١ - ضرب

ضرب عدد في غيره .

## Variété (F). Varieté (E).

الضرب ج ضرب في افراد حيوانية أو نباتية من نوع  
واحد تميزت بصفات خاصة فيزيولوجية وشكلية مثالا  
ضرب التفاح الساتركن .

## ١٦٧٧٣ - ضرب

هو الصدء ، اطلبه .

## ١٦٧٧٤ - ضرب دم ، سكتة ، حنطة

Apoplexie, Coup de sang (F). Apoplexy (E).

اسم شامل يطلق على مختلف الاعراض التي تسبب عدم  
الادراك القلبي . وضربة الدم قد تكون اما زف او رشع  
او انسكاب دموي في انسجة المخ او غيره .

## ١٦٧٧٥ - ضرب نخس في الرن ، اطلبه .

## Mamelle (F). Breast (E).

## ١٦٧٧٦ - ضرة

الضرة هي اصل الثدي وهي ايضا الضرع كله .

## Dommage (F). Damage (E).

## ١٦٧٧٧ - ضرر

هو الاذى المادي والادبي الذي يقع على النفس او على  
المال .

## ١٦٧٧٨ - ضرس ، قاجل

Molaire, Mâchelière (F). Molar, Grinder (E).

احد اقسام الانسان الثلاثة وهي القواطع والانياب والاعراس  
وتعرف الاعراس بالانواج لانها تنجب الطعام قبل ارساله  
الى المعدة ، اما عددها فيختلف مع فصيلة الحيوان ونسبه .  
وهي في اول عهدها تدعى لينة ثم تزول لتحل محلها الثانية  
التي تتميز بسطورها المحدودة المحددة .

## ١٦٧٧٩ - ضرس العجوز

هو الحسك ، اطلبه .

## Nycteria (S).

## ١٦٧٨٠ - مُرْسَمَة

Nyctérie (F). Nycteria (E).

جنس حشرات راشنة من فصيلة الفرسميات ورتبة ذوات  
الجناحين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد  
الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،  
مبطلة طول نحو ٣ م . رؤوسها صغيرة ، مزواية الشكل ،  
قليلة التشويز . عيونها شديدة الصغر اعطائها ثلثة ،  
ماسة . وهي عديمة الجناح والزران . قوائمها نشيطة .  
اجسامها وقوائمها مجهزة ببعض الحب ، المتجانس الطول ||  
تتطفل على الولايط والحفايفش .

## ١٦٧٥٥ - مُرْسَمَة

Lepturus (S). Lepture (F).

جنس نباتات عشبية برية ، مرعوية ، حولية او معمرة  
من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في  
جميع المناطق الحارة من السالين القديم والجديد || جميعها  
شلبية ، صغيرة ، متكاثفة العصف ترتطمها الماشية فيجود  
دوما وتسن عليها .

## Orthogoriscus (S).

## ١٦٧٥٦ - مُرْسَمَة

Orthogorisque, Môle, Molidé (F). Sun-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الضحيات . اعطائها مياه  
بحار المناطق الحارة . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة  
الشكل تبدو كأنها مغطوية المؤخر . اجسامها غليظة  
مفلطحة طول من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . زعانفها الظهرية  
والبطنية مسطيلة تلاصق للشرجية القصيرة المرفوعة .  
اقربها الى الصهبة الضفلاء . بطونها فضية ، زعانفها حمراء  
لونها مأكولة عادة ومنهم من اعتبرها دون المادي .

## Molidae,

## ١٦٧٥٧ - مُرْسَمَات

Orthogoriscidae (S). Molidés, Orthogoriscidés (F).

Molidae, Orthogoriscidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من عرايات الانسان ورتبة ملحويات  
الفك . اجناسها ثلاثة . اعطائها مياه بحار المناطق الحارة .  
جميعها غليظة الشكل ، ضمة ، مبطلة ، مغطوية المؤخر .  
أشهر اجناسها الضحة .

## Photopériodisme (F).

## ١٦٧٥٨ - مُرْسَمَة

Photoperiodism (E).

تأثير الضياء والاعتام في شياخ النبات ومدى انفعال النبات  
من استطالة النهار أو الليل .

## Macrocéphale (F).

## ١٦٧٥٩ - مُرْسَمَة الرأس

Macrocephalous (E).

ذو رأس أكبر واخضر من المعتاد . رأس .

## Crassilobé (F).

## ١٦٧٦٠ - مُرْسَمَة الكلفة

نمت وصفي يطلق على كل نبات مستنقش الفلقة .

## ١٦٧٦١ - مُرْسَمَة

هو الدلب اللبقي ، اطلبه .

## Lutte (F).

## ١٦٧٦٢ - مُرْسَمَة

زمن النزاع أو الاستنفاد عند القتال والملازم .

## Monte (F). Serving (E).

## ١٦٧٦٣ - مُرْسَمَة

نزو الذكر على الانثى في الحيوانات الدواجن .

## ١٦٧٦٤ - مُرْسَمَة

هو التدريب ، اطلبه .

## Brindille (F). Sprig, Twig (E).

## ١٦٧٦٥ - مُرْسَمَة

هو دقيق الحطب وقيل ما ضعف ولان من الحطب الذي  
يسرع اشتعال النار فيه وقيل ما لا جبر له وما له جبر  
فهو جزل .

## Pyrométrie (F). Pyrometry (E).

## ١٦٧٦٦ - مُرْسَمَة

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

## ١٦٧٦٧ - مُرْسَمَة

في العلم ، اطلبه .



ضمة

Mamelle, Pis (F).  
Breast, Udder, Dug (E).

### ١٦٧٨٨ - حُرْسُومَاتْ

هو مدرّ اللبن عند البقرة والشاة والماعز .

### ١٦٧٨٩ - حُرْسُومَاتْ ، حُرْسُومَاتْ

هي العظمية الفرج من البقر والشاة والماعز وغيرها .

Mammaire (F), Mammary (E). حُرْسُومَاتْ

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالفرج .

### ١٦٧٩١ - حُرْسُومَاتْ ، حُرْسُومَاتْ ، حُرْسُومَاتْ

Mammifères (F), Mammifères (E).

أحد صفوف الحيوان الخمسة . تتميز بالثداء أثنائها المرضعة ، بوضع الأولاد أسفله وبجهازها التنفسي الذي لا يخلو من الرئة . لذلك فهي تحتل مركز الصدارة بين الحيوانات الفقيرة || رتبها ١٤ تنتمي إلى شصتين المشيميات واللامشيميات .

### ١٦٧٩٢ - حُرْسُومَاتْ \* ، حُرْسُومَاتْ

Mamillaria (S), Mamillare (F), Mamillary (E).

جنس نباتات لحية معمرة من فصيلة الصباريات . أنواعها المعروفة زهاء ١٥٠ منبتها البلاد الأمريكية . معظمها زينة يزرع لفراة أشكاله وحسن ازهاره ورونتها وزجلها .

### ١٦٧٩٣ - حُرْسُومَاتْ ، حُرْسُومَاتْ

هو أذريون الماء ، اطليه .

Codium (S). حُرْسُومَاتْ \*

Codile (F), Codium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . أنواعها المعروفة قليلة العدد . أعطائها بجوار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها اسفنجية التركيب ، مخاطية ، عديمة الاوراق .

### ١٦٧٩٥ - حُرْسُومَاتْ

\* حُرْسُومَاتْ في عظمه ورقه وله ثمر ابيض مدور مقطعل ككتين الحماط الصغار يفسر \* (اللسان) .

Gourde (F). حُرْسُومَاتْ

هو القرع الطويل ، اطليه .

Querrellet (F). حُرْسُومَاتْ

الضرم هي الخوازي البحرية ، نبات طبي طيب الرائحة ازهاره مذنبة يجربها النحل .

Aiglon (F), Eaglet (E). حُرْسُومَاتْ

هو فرخ العقاب .

Acidanthra (S). حُرْسُومَاتْ

Acidanthra (F), Acidanthras (E).

جنس نباتات عشبية دوقسية من فصيلة السوسنيات . منبتها بعض المناطق الافريقية . سوقها دقيقة ترتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها عصفية النصال معتدلة الطول ، بحرية الخضار . ازهارها عقودية التجميع . ازهارها مستطيلة الاثنايب ، سداسية البتلات الملونة || انواعها المعروفة ثلاثة ، اشهرها التالية :

### ١٦٨٠٠ - حُرْسُومَاتْ أَصْفَر

Acidanthra lutea (S), Acidanthra jaune (F).

نوع من الضرموم . ساقه دقيقة ترتفع نحو ٣٠ سم . اوراقه عصفية النصال البحرية الخضار . ازهاره كبيرة القد ،

Nycteriblidæ (S). حُرْسُومَاتْ

Nycteriblidæ (F), Nycteriblidæ (E).

فصيلة حشرات راشنة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٩٥ منتشرة في معظم مناطق العالم انحصارها الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة معتدلة الطول من ٢ الى ٤ سم . رؤوسها مزوانية الشكل ، شبه ملموسة . عينها شديدة الصغر . قوائمها نشيطة . جميعها عادمة الابجنة والزران || جميع انواعها راشنة تعيش على الاوراق والخفافيش || اشهر اجناسها الفرسمة .

Geissorhiza (S). حُرْسُومَاتْ

Geissorhiza (F), Geissorhiza (E).

جنس نباتات عشبية دوقسية من فصيلة السوسنيات . مهدا بعض مناطق افريقية الجنوبية . اوراقها ضيقة النصال السيفية الشكل او الخيطية . ازهارها سنبل التجميع يرتكز على سراج قصير . ازهارها قمية الشكل ، متساوية البتلات الملونة || انواعها المعروفة عديدة معظمها برقي وبعضها زراعي تزييني ، اشهرها التالية :

### ١٦٧٨٣ - حُرْسُومَاتْ بِحُشِيَّةِ الْوَرَق

Geissorhiza ovata (S), Geissorhiza à feuilles ovales (F).

نوع من الضرموم الزينة . اوراقها بيضية الشكل قليلة العدد الذي لا يتجاوز ٤ نصالها عايقة الخضار المنقط بالاسود . سراجها يرتفع نحو ١٥ سم . وينتهي بسنبلة ودلة عديدة الازهار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢٠ مم . || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

### ١٦٧٨٤ - حُرْسُومَاتْ كَسْبِيَّة

Geissorhiza secunda (S).

Geissorhiza monotrope (F).

نوع من الضرموم الزينة . اوراقها خيطية . سراجها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي بمجموعة الازهار السيفية الترتيب . ازهارها بنفسجية اللون ، متوسطة الحجم ، قطرها يراوح من ٢٥ الى ٣٠ مم . || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

### ١٦٧٨٥ - حُرْسُومَاتْ مَتَوَاضِعَة

Geissorhiza humilis (S).

Geissorhiza modesta (F).

نوع من الضرموم الزراعي الزينة . اوراقها خيطية . سراجها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي ببعض الازهار النماقية ، المتوسطة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الصفار الكريمي المشيز بالاحمر || تنويرها يستمر من سزيان الى تموز .

### ١٦٧٨٦ - حُرْسُومَاتْ نَشِيْطَة

Geissorhiza grandis (S).

Geissorhiza robuste (F).

نوع من الضرموم الزينة . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة سراجها ثخين ضليح مورق يرتفع من ٢٥ الى ٣٥ سم . ازهارها الى الصفار الباهت التني الملوّح بملو تشيز وسطي احمر || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

### ١٦٧٨٧ - حُرْسُومَاتْ

\* دابة بين الكلب والذئب او بين الكلب والسنور (م.)



حُرْسُومَاتْ



حُرْسُومَاتْ



Portulacaria (S). ١٦٨٠٨ - **ضَرْبَسَة** \*

Portulacarie, Pourpier en arbre (F).

شجيرة من فصيلة الربليات. مهدا بعض المناطق الإفريقية المعتدلة الحرارة. ساقها منتصبه تملو نحو أربعة أمتار. أوراقها إبيدة، متعابلة، لاهطة، سمكية الاتصال المائلة، جميلة الخفسار اللامع. ازهارها خاسية اليتلات، سداسية أو سباعية الالامسة، وردية اللون، قطرها نحو ٣ سم. || زروع التزيين.

Trochillidae (S). ١٦٨٠٩ - **ضَرْبَسِيَّات** \*

Trochillidés (F). Trochillidae (E).

فصيلة طير من الجولام مشقوقات المناقير. انواعها المعروفة عديدة، زهاء ٤٠٠ موطها معظم اصقاع العالم باستثناء القطبية. اكثر انواعها، نحو ٩٠٪ أمريكية المهد || جميع انواعها صغيرة الحجم، جميلة الالوان المتراكبة والزخارف والزوايق || اشهر اجناسها القريس والبطون والقبيل.

١٦٨١٠ - **ضَرْبِع** الجملدة على ألظم تحت اللم .

Varech, Varec (F).

Varec, Sea-wrack, Sea-weed (E).

هو القوس نبات اخضر خفيف يرمي به البحر .

Vautour mâle (F).

Vulture male (E).

١٦٨١٢ - **ضَرْيَك** هو البسر الذكر .

Calorification (F).

Calorification (E).

١٦٨١٣ - **ضَرْيَم** القرم اعتاق بعض الحرارة من الجسم لان كل عمل يقوم به الجهاز المعصوي يولد بعض الحرارة .

Gommose (F).

١٦٨١٤ - **ضَرْيَم** وسم يصيب الأشجار المثمرة ويغيرها يعرف بالتصمغ ، اطلبه .

Endogamie (F). Inbreeding (E). ١٦٨١٥ - **ضُغَالَة** \*

التصالح بين اقارب من اصل واحد أو بين انسال قفو واحد .

Echinopsis (S).

Echinopse, Echinopsis (F). Echinops (E).

١٦٨١٦ - **ضُغَة** \* جنس نباتات زينة شائكة معمرة من فصيلة الصباريات انواعها عديدة سيقانها اسطوانية ، مضلعة ، لحية ، غزوة الشائنة . سدائرها شائكة تركز على ثيب الاضلع . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل والالوان تقوم على شاربخ مستطيلة تكسوها الحارشف المرسوقة المراكبة . زروع في المراكب لانها تخشى البرد .

Multiple

١٦٨١٧ - **ضُغَف** الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

١٦٨١٨ - **ضُغَل** هو في اللواجن اصطفا الاقارب فافسدا ذلك لاصح النسل أو تحسبه أو تثبت بعض الصفات الخاصة .

Cri du lapin (F).

Cry of the rabbit (E).

١٦٨١٩ - **ضُغَاب** صوت الارنب اذا اخذت .

سداسية اليتلات التي تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي. يملو تمشج برتقالي ناري المواج || تنويرها يشتر طول شهر حزيران .

١٦٨٠١ - **ضَرْو** هو البطم الشرقي ، اطلبه .

١٦٨٠٢ - **ضَرْو** Limier (F). Bloodhound (E).

الانثى ضروة ج ضرء . والضرو كلب كبير الجفة شديد المراس يستخدم في سيد الوشوش .

١٦٨٠٣ - **ضَرْوَع** الضروع : الصغير من كل شيء

١٦٨٠٤ - **ضَرْي** \* Polygame (F). Polygamist (E).

صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة اناث . وصفة كل نبات يجعل ازهارا خثوية وذكرية والثوية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - **ضَرْيَة** Impôt (F). Imposit, Tax (E).

الضربية هي حصمة اشراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي كل اسلوب تتبين به التكاليف العامة على المكلفين . والضرائب عديدة تخص منها :

Impôt indiciaire

ضريبة استدلالية

ضريبة الارباح الاستثنائية

Impôt sur les bénéfices exceptionnels

ضريبة البلدية

Impôt municipal

ضريبة التراكات

Impôt de succession

ضريبة التمتع

Patente

ضريبة الدخل

Impôt sur les salaires

ضريبة التعلل العام ، ضريبة الربع

Impôt général sur le revenu

ضريبة الطرق ، بدل الطريق

Prestation

ضريبة التلم المتقولة

Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers

ضريبة النصاب

Impôt de quotité

ضريبة تصاعدية

Impôt progressif

ضريبة تنازلية ، ضريبة التحدارية

Impôt dégressif

ضريبة توزيعية

Impôt de répartition

ضريبة جزائية

Impôt forfaitaire

ضريبة شخصية ، بدل

Impôt personnel

ضريبة عقارية ، خراج

Impôt foncier

ضريبة عينية

Impôt réel

ضريبة غير مباشرة

Impôt indirect

ضريبة مباشرة ، مقرة

Impôt direct

ضريبة نسبية

Impôt proportionnel

ضريبة نوية

Impôt cédulaire

١٦٨٠٦ - **ضَرْيَر** ، **شُغْشُوف**

Aristida (S). Aristide (F). Triple-awned grass (E).

Dreygrannen (D). Aristide (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة

التريجات . منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . انواعها كثيرة

المدد جميعها زغبة المصنف المسن الحافة . سنابلها لينة

زباء . تكثر في المروج والمراعي الطبيعية وبين الزروع .

١٦٨٠٧ - **ضَرْيَس**

Colibri (F).

هو الطرغولوس . اطلبه .



ضمة

١٦٨٣١ - **صَفْط دَمَوِي** (F). Tension artérielle (F).  
Blood pressure (E).  
الضغط الدموي أو التوتر الشرياني هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين بفعل حركة القلب .

١٦٨٣٢ - **صَفِيب** (F). Glapissement du lapin (F).  
Yelping of the rabbit (E).  
صوت الأرنب .

١٦٨٣٣ - **صَفِيْفَة** (F). Luxuriante (F). Luxuriant (E).  
هي الروضة الخضرة الريانة وقيل الصفيغة من بقل وعشب .

١٦٨٣٤ - **صَفِيْفَة** (F). Cristatella (S). Cristatelle (F).  
جنس حيوانات طحلبية من طاهرات الشرج تعيش في المياه العذبة . أمثالها متحركة .

١٦٨٣٥ - **صَفْ** (F).  
هي نارية الحنطة فراشة صغيرة القند سمراء اللون إذا لمست شري الجلد من لسمها ودقيق حراشفها . ج صفقة .

١٦٨٣٦ - **صَفْجَاح** (F). Discoglossus (S). Discoglosse (F). Discoglossus (E).  
جنس صفادع من فصيلة الصفجائيات . أنواعه المعروفة خمسة ، أعطائها تمتد من الهند الصينية إلى الشرق الأوسط ووسط البحر المتوسط . أجسامها صغيرة الحجم تقوّل من ٥ إلى ٨ سم . رؤوسها متوسطة القند . عيونها كبيرة ناضرة . السنها مستديرة الشكل . قليلة الحركة . أصابع قوائمها الخلفية قصيرة الحطاب الذي لا يتجاوز الزايم الأمامي . جلودها عادمة الثآليل والتموّل ، شديدة اللمعة . أنوثها إلى السمرة الخفيفة يملؤها تبيّج اسمر حادق وخط أصفر الحمل يمتد من الرأس إلى العجز . وتعلنان اسمران عاقلان يمتدان من العينين إلى طرف الحنط . بطونها سوية الألوان الباهتة يغلب فيها الحنطي الاغبر . تعيش في المناطق ومجاري الماء . تسرح في الليل . قوتها الحشرات والديدان . الإناث تقرأ دعبها في الماء ضمن شلتين كل شلة تحوي من ٢٠ إلى ٣٠ دعبلة تنقث بعد الترسلة بنحو ثلاثة أسابيع .

١٦٨٣٧ - **صَفْجَاح مَلُون** (F). Discoglossus pictus (S). Discoglossus peint (F). Discoglossus pictus (E).  
نوع من الصفادع ينتمي إلى فصيلة الصفجائيات التي تحمل اسمه . جسمه صغير القند يطول نحو ٦ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الأنثى . رأسه متوسط الحجم . عيناه كبيرتان جاحظتان . حنكه واسع الشفق . مسن الفك العلوي . قاتمته الاماميتين ورابعيته الاصابع الطويلة . قاتمته الخلفيتين خاضية الاصابع المقيدة بخطاب قصير . جلده قليل الثآليل ، شديد اللسان . ثوبه إلى السمرة الخفيفة يملؤها تبيّج اسمر وخط أصفر الحمل يمتد من مقدم الرأس إلى طرف العجز وجذاتان كستيتان يمتدان من العينين إلى طرف الحنط . بطنه إلى الحنطي الاغبر . يألف المنائق والتندران . يسرح في الليل . قوته الحشرات والديدان والذباب والحوام . بيانه الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . يعتبر من الصفادع النافعة .

١٦٨٣٨ - **صَفْجَاجِيَّات** (F). Discoglossidae (S). Discoglossidae (F). Discoglossidae (E).  
فصيلة حيوانات درداء قازبة من لة القويّيات ومزربة

١٦٨٣٩ - **صَفْجَاح** (F). Euryceros (S). Eurycéros (F).  
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم سنّيات المناقير ونصيلة الزرزوريات . موطنه جزيرة مدفسكر . جسمه محتدل القند شبه السمنة . ثوبه إلى السواد اللامع . رذائو وأباهره إلى السمرة الطلوانية . منقاده أزرق اللون شبه مخروطي الشكل ، كبير وظليل يغلف مقدم الرأس كالكامية . جناحاه ذربا الاطراف . ذنبه مستدير الرفال . قوته الحبوب والثمار والحشرات .

١٦٨٤٠ - **صَفْجَاح** (F). Euryceros (S). Eurycéros (F).  
هو الحليّن المعروف ، اطلبه .

١٦٨٤١ - **صَفْجَاح** (F). Renardeau (F). Fox-cub (E).  
هو ولد الثملة أي أنثى الثعلب .

١٦٨٤٢ - **صَفْجَاح** (F). Polgnée d'herbes (F). Wisp of herbs (E).  
الضفت : قبضة من حشيش غنظلة الربب باليابس . وكل ما ملأ الكف من النبات فهو صفت . وضفت النبات : جعله اسفاناً .

١٦٨٤٣ - **صَفْجَاح** (F). Roscoea (S). Roscoée (F). Roscoea (E).  
نبات عشبي ينحلي الارومة من فصيلة الزنجبيليات . مهدها بعض مناطق الهند والافغان . ساقها موقرة ترتفع نحو ٥٠ سم . أوراقها لاطعة متعاقبة سنائية النصل بحرية الخضار انزراعها سبيل التسجيع . انزاعها صغيرة القند زرقاء اللون . تزور للزبين في الحدائق التي لا تحشى شدة القند .

١٦٨٤٤ - **صَفْجَاح** (F). Poule (F). Hen (E).  
هي الدجاجة ج . صفادع .

١٦٨٤٥ - **صَفْجَاح** (F). Poussée (F). Thrust (E).  
هو الدفع الاقني على جدار ما من جراء ككل التراب او الماء .

١٦٨٤٦ - **صَفْجَاح** (F). Pression (F). Pressure (E).  
تension de la vapeur (F). ضغط البخار (F). Vapour pressure (E).  
هو قوة امتداد البخار .

١٦٨٤٧ - **صَفْجَاح** (F). Pression atmosphérique (F). Atmospheric pressure (E).  
الضغط الجوي هو مقدار وزن الهواء في أي نقطة كانت معينة فوق سطح الأرض . وهو يقدر عند سطح البحر بما يعادل ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه نحو ٧٦ سم . لذلك فالارتفاع عن سطح البحر ينقص كمية الضغط كما هو الحال في الجبال حيث تقل كثافة الهواء التي تقرر الضغط . ويتأثر الضغط أيضاً بعامل الحرارة والرطوبة إذ كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء ونفث وزنه وكما زاد بخار الماء بنفث وزنه كذلك . وهذا الضغط الجوي يقاس بواسطة جهاز خاص يدعى المرواز (البأريومتر) .

١٦٨٤٨ - **صَفْجَاح** (F). Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).  
اثبت العلم على ان محتويات الحبيرات النباتية بعد ان تأخذ كثافة معينة من الحلول الملحي الغدائي تنفك عن النشاء الذي يحيط بها وتتقلص . فهذه البادرة الطبيعية الحيوية تمنى الضغط الحلولي أو الانسلاسل .

١٦٨٤٩ - **صَفْجَاح** (F). Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).  
اثبت العلم على ان محتويات الحبيرات النباتية بعد ان تأخذ كثافة معينة من الحلول الملحي الغدائي تنفك عن النشاء الذي يحيط بها وتتقلص . فهذه البادرة الطبيعية الحيوية تمنى الضغط الحلولي أو الانسلاسل .



صَفْجَاح



صفقة



صَفْجَاح مَلُون



## ١٦٨٥٣ - ضفدع جبّار \* ، عُدْمُول جبّار

Rana goliath (S). Grenouille géante (F).

Goliath frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الدموليات . مهد بلاد الكامرون من اعمال افريقية الاستوائية || اكتشف في اوائل القرن الحالي ويعتبر اكبر انواع الضفادع المعروفة وأغلظها وأبطئها . الذكر يطول من ٣٢ الى ٣٧ سم . والانثى تطول من ٤٥ الى ٥٢ سم . || يعيش قرب المنابع ويجاري الماء ولكنه لا يرتاد الماء الا في زين الترسه . نقيقه قريب الشبه بصيحه الثور . قوته الحشرات والجوارح والمظاء والوزغ والفئران وكل ما دب ويمكن منه .

## ١٦٨٥٤ - ضفدع تشيط \* ، عُدْمُول تشيط

Rana agilis (S). Grenouille agile (F).

Agile frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الدموليات . اعطاه تيمتد من الشرق الاقصى الى اربوة الجنوبية الشرقية والشمالية || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٦ الى ٧ سم . والانثى تطول من ٨ الى ٩ سم . ثورته قريب الشبه بصوت الضفدع الاخر الا انه يتميز باستطالة القامتين الخلفيتين ما يجعل جمال قفزه نحو مرتين . وهو مستعرض الشدق . عاده الانسان في الفك السفلي . عينا صغيرتان مستطيلتان . اصابعه طليقة في القامتين الاماميتين وبقيده في الخلفيتين بحظاظ متوسط الامتداد لا يتجاوز نصف الاصابع . جلده مالمس البشرة ، قليل التبول الدقيقة المتباعدة المبيضة || ثوبه يمان البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشقعة الخنثية تملوها رشفة سمراء في الظهر والقوائم وسداتان كستيتان تمتدان من مقدم الحلق الى مستوى الكتف . بطنه ورشاه الى البياض الاخر || يعيش معظم حياته في تلول نحو ١٠ سنوات في البراري والغابات . يسرح في الليل ويبقي في النهار ولا يقترب من الماء الا في زين السفاد والقرقة وعتما يكره برد الشتاء على هجر الماء الاضي الى الماء . قوته الحشرات والديدان . ذكوره عادمة البيلة الصويقة || الانثى تسرا ابتداء من اواخر نيسان من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ ديلة في حبل هلامي المادة تفرسه في المياه الفسلة فيفوس ويستقر في مكانه حتى التفت الذي يتم عادة قرب اواخر تموز .

## ١٦٨٥٥ - ضفدع عيات \* ، ضفدع عيات

Amphibia (S).

Amphibiens, Batraciens (F). Batrachia (E).

صف حيوانات من الفقاريات الحليدية التنفس . صفتها واجناسه واتواعه كثيرة الدم تجمعها ثلاث رتب : عدييات الدن ومدييات الارجل والسرفويات .

## ١٦٨٥٦ - ضفدور \* ، ضفدور

Odontophorus (S).

Odontophore, Capucine (F).

جنس طير من فصيلة الطيوريات . انواعه المعروفة نحو ١٧ اصلها من معظم المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية . ملجها الحياتي جامعي . جماعاتها قليلة العدد . تألف البراري والارحاج الدلة . قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والانواع وبعض الاعشاب والبرور والبزور البرية || اجسامها ربة تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم . رؤوسها صغيرة متوسعة بقنازع قصيرة عريفة الشكل تمتد من قواعد المناقيد الى الاقنية . مناقبها صغيرة مخليبة الشكل ، مسنة الاثاق السفلي . عيونها صغيرة ، حثارها عادم الريش مخضب بالاحمر او الاصفر او الاصفر . سواقلها مستديرة ، لاسفة . اذناها

تمثل معظم البلاد الاسيوية والشرق الاوسط واروبه || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٦ الى ٧ سم . والانثى تطول من ٨ الى ١٠ سم . رأسه متوسط القد . خطمه مستعرض الشدق . فكاه الاسنان . عينا كبيرتان جاحظتان . اصابعه طليقة في القامتين الاماميتين وبقيده في الخلفيتين بحظاظ متوسط الامتداد . جلده مالمس البشرة عادم التبول . قوته الشقعة الخنثية الخلاج يقيم في الاطليل ويبر في البطن وتعلو رشفة سمراء متفرعة في القوائم وبيدة كستية عند مؤخر كل عين || بعدا الضفدع الذي يمان الى حد ما البيئة التي يعيش فيها يشقر ويسمر ويتلون ، بعض الشيء ، بالوان يحيطه || يعيش معظم حياته التي تطول نحو ١٢ سنة قرب المنابع ويجاري الماء والديدان . يسرح في الليل ويحجب في النهار اما في الماء او بين الحجارة وتحتها وفي كل مكان يؤين له الانتشار والسكنية || قوته الحشرات والجوارح والمظاء والوزغ والديدان || الانثى تسرا في اوائل الربيع من ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ ديلة . قطر الواحد نحو ٢ سم . في شلة من الخيال غشائية المادة تموم على سطح الماء . التفت يحصل بمد التمررة بوسيون ولها يتجاوز ثلاثة اصابع . والطور البلوطي ينتهي في اواسط الصيف .

## ١٦٨٤٩ - ضفدع الجبل ، ضفدع السم ، ضفدع

Crapaud (F). Toad (E).

هو الملجوم ، اطلم .

## ١٦٨٥٠ - ضفدع الحقل ، عُدْمُول الحقل

Rana arvalis (S). Grenouille oxyrhine (F).

Arvalis frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الدموليات . اعطاه تيمتد من الشرق الاوسط الى اربوة الوسطى || جسمه صغير القد . الذكر يطول من ٥ الى ٦ سم . والانثى تطول من ٧ الى ٨ سم . ثورته شوزن الضفدع الاخضر وهو مستعرض الشدق . عادم الانسان في الفك السفلي . عينا كبيرتان جاحظتان . اصابعه طليقة في القامتين الاماميتين وبقيده في الخلفيتين بحظاظ شيق لا يتجاوز الزام الاول . جلده مالمس البشرة قليل التبول الدقيقة المبيضة . ثوبه يمان البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشقعة الصناعية تملوها ماجة حنثية وتبيج اسمر ورقشة بنية || يعيش معظم حياته التي تطول نحو ١٢ سنة في الحقول والمراعي والنباض القريب من الماء . يسرح في الليل ويحجب في النهار بين النبات وتحت الحجارة والتعلل وفي كل موضع يؤين له الانتشار . قوته الحشرات والديدان || الانثى تسرا نحو ٢٠٠٠ ديلة في شلة حلمية المادة تفرسها في المياه الفسلة فيفوس ويستقر في مكانها حتى التفت الذي لا يتجاوز مدته ثلاثة اصابع .

## ١٦٨٥١ - ضفدع كان

الصفدع الثاني نجم نير من كوكبة قيطس مركزه على الشعبة الجنوبية من الدنوب .

## ١٦٨٥٢ - ضفدع ثوري ، ضفدع

Rana muglens (S).

Rana muglens (F).

نوع من الضفادع موطنه امريكة الشمالية . كبير الجثة طول نحو ٥٠ سم . نقيقه يشبه صيحه البقر .



ضفدع الحقل



ضفدع جبّار



ضفدع تشيط



ضفدور



ضفوع

١٦٨٦٦ - ضَفِيْلَةٌ °  
Cypella (S). Cypelle (F).  
Cypella (E).  
جنس نباتات عشبية دونسية من فصيلة السوسنيات، مهدبا  
بعض مناطق أمريكا الجنوبية. سوقها زمرجادية موزقة .  
أوراقها صغيرة ، سنانية النصل . أزهارها متباينة للتخصيب .  
تزرع للترتين ضمن البيوت وفي الحدائق . تزهر في الأترية  
الخفيفة التي يكثر فيها عنصر الرمل || أنواعها المعروفة  
قليلة العدد ، أشهرها التالية :

#### ١٦٨٦٧ - ضَفِيْلَةٌ رَمَاصِيَّةُ الْوَلْن °

Cypella plumbea (S).  
Cypelle couleur de plomb (F).  
نوع من الضفيلة . منبتها البرازيل . ساقها عقدية ، كثيرة  
الأوراق الصغيرة ، ترتفع من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . زهرها  
كبيرة الحجم ، وحيدة ، لونها الأزرق الرصاصي المزاج  
يطولها بقبة مستديرة وردية اللون || تنويرها يستمر نحو  
ثلاثة أسابيع ويكون في شهر آب .

#### ١٦٨٦٨ - ضَفِيْلَةٌ هَرْبِرْت °

Cypella Herberti (S). Cypelle de Herbert (F).  
نوع من الضفيلة . منبتها فزويلا . ساقها موزقة ، عامدة  
العقد ، ترتفع من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها صغيرة بحرية  
اللون . أزهارها عديدة صفراء اللون مغلفة بالاردواطي  
والبنفسجي || تنويرها يستمر من آب إلى ايلول .

١٦٨٦٩ - ضَفِغ °  
Côté (F). Side (E).  
كل غط من الخطوط التي تؤلف حلود الشكل .



ضفون عائق الزغب

١٦٨٧٠ - ضَفِغ ، ضَفِز °  
Nervure médiane, Côte (F). Median nerve, Rib,  
Costa (E).

هي في الورقة عرقها الفيلز الذي يصل بالعماء والذي  
تنشعب منه سائر العروق . وهي التي تغل النسج إلى نسج  
النصل فتورده بأعلى وتصدره كسلأ .

١٦٨٧١ - ضَفِغ الْبَكْرَة ° هو الخلاب ، اطبه .

١٦٨٧٢ - ضَفِغ الْمَثَث °  
Côté du triangle (F). Triangle side (E).

١٦٨٧٣ - ضَفِغ الْمُثَلَّغ °  
Côté du polygone (F). Polygon side (E).

١٦٨٧٤ - ضَفِلَمَة °  
سكة صغيرة خضراء قصيرة الفم (السان) .

١٦٨٧٥ - ضَفِلَعِي °  
Costal

١٦٨٧٦ - ضَمَّ ، إِحْطَاق °  
Annexion (F). Annexion (E).  
هو اتباع شيء بأخر .

١٦٨٧٧ - ضَمَّ الْأَرَاكِيزِيَّةِ ، جَمَلٌ ،  
إِجْتِمَال °  
Remembrement (F). Reconstitution (E).

هو توحيد القطع في الأرض المجرأة أو ضم الأراضي الزراعية  
إلى بعضها بعض حتى يتسع الملك وييسل استثاره .



ضفون ملتق الأطراف

١٦٨٧٨ - ضَمَّ الْمُتَمَعُّة إِلَى الْمُلْكِيَّةِ °  
Consolidation de l'usufruit (F). Funding of usufruct (E).

هو إحدى وسائل زوال الانتفاع بأحد حق الملكية وسن  
المنفعة في مالك واحد .

جذاع مخروطية الشكل . قوائمها وإصابعها شديدة النشط .  
أولها تختلف مع الأنواع ، تكثر فيها الشقعة السمراء  
المروشة بالأسود في الرءاء والجناح . اعتناقها ملطوقة بقلادة  
بيضاء اللون سود الحمار || تدفن أعشاشها في الفاحيص  
تقيها في التربة بين الأدغال المستحصية أو بين فصيل  
الحشيش الرفيع الكثيف || أنثاها تبيض وتخصن من ١٤ إلى  
٢٠ بيضة . التزخم يستمر نحو ثلاثة أسابيع تقوم به  
الاناث دون الذكور التي تؤلف لها الحماية والغذاء .

#### ١٦٨٥٧ - ضَفَر °

Maçonnerie en pierres sèches sans liant (F).  
الصفر البناء بجماعة بغير ملين ولا كلس .

١٦٨٥٨ - ضَفْع °  
Excrément de l'éléphant (F). Elephant excrement (E).  
الصفع : نجو الفيل .

١٦٨٥٩ - ضَفَن °  
Parasitisme (F). Parasitism (E).  
الصفن هو الرشنة ، أطليا .

#### ١٦٨٦٠ - ضَفُوع °

Nyctinomes (S). Nyctinome (F).  
جنس خفافيش من عارة الميعرات . موطنه المناطق  
الاستوائية الآسيوية والأفريقية والأمريكية . أنواعه  
عديدة ، أجسامها صغيرة القد . رؤوسها مغلطمة تبيسة .  
آذانها شبه مستديرة . فرائسها خزيرية . شفاهها منفصلة .  
يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح كامل الليل . قوته  
الحشرات على اختلاف أنواعها . يألف الأشجار المرجية  
البدائعية .

#### ١٦٨٦١ - ضَفُون °

Paxillus (S). Paxille (F).  
جنس فطور من فصيلة السميات . أنواعه المعروفة قليلة  
العدد أعطاهنا بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش  
على اللدبال والمواد النباتية المتحللة والأرويات المنفردة . تتميز  
بكر نكاحها وبقرس سوقها وبالولائها المايقة || أعرف  
أنواعه وأشهرها الضفون المايق الزغب والضفون الملتف  
الأطراف .

#### ١٦٨٦٢ - ضَفُون عَائِقِ الزَّغَب °

Paxillus atrotomentosus (S). Paxille à tomentum foncé (F).  
نوع من الضفون . يعيش على أرويات الأشجار المروية  
اغصنها السديان . ساقه ضخمة ، قصيرة ، كستية اللون .  
نكهته كبيرة ، عمودية ، مزغبة السطوح ، قطرها نحو  
١٢ سم . لونها إلى الصبغة السمراء يطولها موج كسني ||  
لحميته مأكولة لذيدة العلم .

#### ١٦٨٦٣ - ضَفُونُ مَلْتَقِ الْأَطْرَاف °

Paxillus involutus (S). Paxille enroulé (F).  
نوع من الضفون . يعيش على المواد النباتية المتحللة . ساقه  
مستدلة الانتفاخ والغلاظة . نكهته كبيرة ، مقمرة ، ملطقة  
الأطراف ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها إلى الصبغة الشبهاء  
يطولها موج نحاسي اسفغ || لحميته مأكولة ، لذيدة العلم .

١٦٨٦٤ - ضَفِيرَة °  
Plexus  
جموعة عصيات خضيلة .

#### ١٦٨٦٥ - ضَفِيرَةُ الْأَسَد °

Aldafara  
ضفيرة الأسد نجم نير من كوكبة الأسد الاصفر .

اسمر المرقوق . يعلنها اسمر الصفحة العليا ، اسود السفلى .  
قواتمها الى الشقعة السرام || مسرها البراري والنايات  
حيث تكثر الاشباب النجيلية . قوتها صنف النجيليات .

### ١٦٨٨٨ - ضُبَيْرَة مَرْقُوشَة

Miridius punctulatus (S). Miris punctu (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الضمبيات . جسمها صغير  
القد ، يطول نحو ٥ م . رأسها صغير ، محرم ، حنطلي  
اللون . خطمها مستدل الطول . عينها صغيرتان ، ناشرتان .  
زباناها حنطلي اللون . كوسلها حنطلي مرقوش بالاسمر .  
حجبتها صغيرة . حنجبتها ظهرانها مستطيلتان ، حنطلتان  
تعلوها رقشة سمراء وتيقج اسود واصفر . ظهرانها لاحف .  
يعلنها الى السمرة السوداء حثارة اصفر بني . قواتمها سمراء ||  
تألف البراري والمواقع الدفلة مرتفعها الاشباب البرية .

### ١٦٨٨٩ - ضُمْبِيَّات

Capsidae, Miridae (S). Capsidae, Miridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجتمعة . اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد . بعضها سار . جميعها ضبيرة اللد ،  
مستطيلة الشكل . اوثابها مختلفة الالوان يعلف فيها الاصفر  
ثم الاخضر والبي . قرونها الاستشارية رباعية الفواصل .  
استحكاكها ثلاثية الاجزاء . اسرارها ثنائية القل . تمتع  
مكبها داخل الانسجة النباتية وتركب عدة نباتات تمتص  
نفسها .

### ١٦٨٩٠ - ضُمْد - تَضْمِيد

Pansement (F). Dressing (E).

حياة الجرح والملاج والضماد تسهيلا لاندما .

### ١٦٨٩١ - ضُمْرَان

Tetracentron (S). Tétracentre (F).

شجرة حرجية وزراعية تربيتية من فصيلة المفلوئية .  
ساقها منتصبه فناء ، تعلو نحو ٣٠ م . اوراقها عابلة  
بيضية ، تعلو نحو ١٢ م . وتعرض نحو ٧ م . تصافا  
الى الخضار الزاهي ، عروقها خرام اللون ، عددا من  
ازواج ال ٧ . انهارها صغيرة اللد ، صفراء اللون ،  
رباعية الفصل ، ثلاثية البلات ، رباعية الاسدية .

### ١٦٨٩٢ - ضُمْرُوك

Bosquet (F). Grove, Arbour (E).

هي الآلة الضبيرة الخاضعة ج . فسوز .

### ١٦٨٩٣ - ضُمْنِي

Atrophie (F).

١٦٨٩٤ - ضُمُور ، هُزَال

Atrophy, Atrophia (E).

### ١٦٨٩٥ - ضُمْبِيَّات الخُطَّابِيَم

Protobranches (F). Protobranch (E).

رتبة من الرغويات صفيحات الخياشيم تتميز بنحاشيها  
الخطوية البسيطة المنتصبة ، غير الملتوية ، تعلقها ببعضها  
او تجمعها الى بعضها نزع من الملب الدقيق القصير .

### ١٦٨٩٦ - ضُمْبِيرُوك

Turgia (S).

Turgia (F). Turgia (E).

جنس نباتات عشبية سولية برية من فصيلة الخياشيم .  
انواعها المرفوعة قليلة العدد منتبها بعض مناطق حوض  
البحر الابيض المتوسط اخضها سورية ولبنان وفلسطين ||  
صقها مثلمة ، غشنة ، زب ، قليلة الفروع ولااشمام .

Garantie (F).

### ١٦٨٩٧ - ضَمَان

Guaranty, Warranty (E).

الضمان هو حاية شخص من ضرر يهدده او تمويله من  
ضرر وقع عليه . لذلك فصيفة عديدة تخص منها بالذكر :

ضمان اليوبوب

Garantie des vices (F).

ضمان القفل الشخصي

Garantie du fait personnel (F).

ضمان فعل

Garantie de fait (F).

ضمان ملوك

Garantie d'éviction (F).

### ١٦٨٩٨ - ضَمَان زُرْكَامِي هو التامين الزراعي ، الحليه .

١٦٨٩٩ - ضُمْبَة ، ضَمْبَقَة

Bouquet, Gerbe de fleurs (F). Bouquet, Bunch of the flowers (E).

### ١٦٨٩٢ - ضُمْبَجَة الجُنْبُجُل \*

Capsus vandilicus (S). Capsus du houblon (F).

حشرة من الضمبيات ثوبها الى الصفرة الباعة . طولها  
نحو ٦ م . ومرضها ٢ || تركب اوراق الجنبجل تمتص  
صارتها وتؤذيها .

### ١٦٨٩٣ - ضُمْبَجَة الحُرُور \*

Phytocoris populi (S). Phytocoris du peuplier (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الضمبيات . جسمها صغير القد  
يطول نحو ٧ م . ثوبها الى البياض الاخير يملو تيقج  
اسمر يشمل جميع الاعضاء بما فيها الزباني والقوائم || رأسها  
صغير . خطمها مستدل الطول . عينها كبيرتان ناشرتان .  
زباناها مستطيلتان . كوسلها قمي الشكل ، مقطوم الطرف .  
حجبتها محرمية . حنجبتها ظهرانها مستطيلتان . قواتمها  
مبعثرة الملب || تركب اوراق الحسور والصفصاف  
والزيتون .

### ١٦٨٩٤ - ضُمْبَجَة السَّيْسَارُون \*

Capsus pastinacae (S). Capsus du panais (F).

حشرة من الضمبيات ثوبها الى الزرقعة يعلوها موج اخضر .  
طولها نحو ٤ م || تركب مع ريقاتها اوراق وزفصار  
السيارون والجزر .

### ١٦٨٩٥ - ضُمْبَجَة العَرْن \*

Capsus cervinus (S).

Capsus du sainfoin (E).

حشرة من الضمبيات طولها نحو ٤ م . ثوبها الى الصفرة  
الزاهية . ارجلها خضر . زباناها الى الايبوية || تركب  
الرن على اختلاف انواعه فتؤذي الاوراق وتذبلها .

### ١٦٨٩٦ - ضُمْبَجَة المَلْفُوف \*

Capsus bipunctatus (S). Capsus du chou (F).

حشرة من الضمبيات ثوبها فستى اللون . طولها نحو ٨ م .  
ومرضها نحو ٢ || ريقها دقيقة الجسم خضراء اللون تنقف  
وتعيش على الملفوف وتعمل فعل الحشرة الكاملة بالمتصاص  
عصاره الورق .

### ١٦٨٩٧ - ضُمْبَجَة سَوْدَاء \*

Capsus ater (S).

Capsus noir (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الضمبيات . جسمها صغير القد  
يطول نحو ٦ م . رأسها مستعرض القفن ، اسود اللون .  
خطمها مستدل الجرم . عينها صغيرتان ، ناشرتان . زباناها  
شديدة السمرة . كوسلها اسود . حجبتها صغيرة محرمية  
سوداء . حنجبتها ظهرانها مستطيلتان . ظهرانها اغير اللون ،



نمجة الجنجل



نمجة السيارون



نمجة العرن



نمجة الملفوف

من زمن البلوغ والتجوير || يكافح باستعمال احد الفطائر الغدالة المركزة عل النحاس أولاً بعد الانزعاج او عند ظهور عوارض الفطر .

#### \* صَهْر \* ١٦٩٠٢

*Sternotherus (S). Sternotherè (F).*

جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاشيات . انواعه المروفة ثلاثة . اعطائها بعض مناطق افريقية الشرقية والخليج حتى الهند ، تألف الاثر والبحيرات والمناقع || ذيلها متوسطه الطول من ٤٥ الى ٩٠ سم . ذيلها قليلة الابدواب ، شبه بيضة اللون . ثوبها الى السرة المتباينة الماجات ، فيها الجوزي والاخضر والاسم والبي والصنابي . زعانها منبسطة ملحوة بمجد الذبال . رؤوسها مكسرة . اعناقها متوسطة الطول والغلظة . اذنانها قصيرة . قوائمها شديدة النشط ، خاصة الخالب في الزويين .

*Début maturité (F).*

#### \* صَهْل \* ١٦٩٠٣

الصهل والاضهال هو اول الفصج المعروف بالادراك .

*Cyon (S).*

#### \* صَهْل \* ١٦٩٠٤

*Dohle (F). Dohles (E).*

جنس كلاب متوحشة مقررة موطنها سيرير وموطن مناطق آسية الوسطى والبرية . له ثوبان صهل الشال واهل الجنوب . يألف النباتات والبراري الجبلية . لحمه الحياتي جامي . جماعته تعد من حة الى عشرة ازواج . لا يقتصر فرسته منفرداً منها كانت الحال . افضل طرائده الغطاء والشوادن || شكله الخارجي منسجم التقاطع شبه بالكلب الاهل اما راحته العاطفة فرائحة آين آوى . ومن ميزات جنسه ان عدد اطياف الاناث هو ١٢ و ١٤ في حين ان لكلية ١٠ اطياف فقط .

*Cyon javanicus (S). صَهْلُ الْجَنْتُوب \* ١٦٩٠٥*  
*Dohle méridional, Buansu (F).*

نوع من الصهل . موطنه يمتد من جبال حلايا الى جزر الزابج وجبال بورنيو . يألف الحشاب والجبال . جماعته تعد من ٤ الى ٥ ازواج يقودها ذكر سن . يقتصر جمع الحيوانات الضفيرة والاوز والبط ... يصرح في الليل وفي النهار || جسمه اهيف الشكل يطول نحو ٩٥ سم . ذيله نحو ٢٠ سم . ارتفاعه ٥٠ سم . ثوبه الى الشقة السمرم يزداد اسمراراً في الصيف ويحف في الشتاء || وهو سهل المراس يألف حياة الاسر ويدجن بدون عتاء اذا أخذ صغيراً لكنه مضى أن بعض الكلاب الاحلية تحدث منه ، ثم تحقق فيما بعد ان النظرية خاطئة لان الماداة السنية تعد الكلب تقل ٤٢ سنّاً في حين انها لا تشمل سوى ٤٠ سنّاً عند الصهل .

#### \* صَهْلُ الشَّال \* ١٦٩٠٦ ، قَبُونُ الْجَبَل

*Cyon alpinus (S).*

*Dohle septentrional, Cuon de montagne (F).*

نوع من الصهل . موطنه يمتد من سيرير الى التركستان والتبت . يألف المناطق الجبلية الكثيرة الغابات والاراج . جماعته تعد من ٥ الى ٧ ازواج يقودها ذكر سن . يقتصر الغطاء والاراء والمراغور والبقول ... جسمه منسجم اهيف يطول نحو ١٠٣ سم . ذيله ٤٨ سم . ارتفاعه ٥٢ سم . ثوبه الصفي الى الشقة كسمر في الرأس والظهر وتبيض

اوراقها معتقة ، خاصة ، متعاقبة ، مركبة ، وثرية التجميع . ورقاقها متوسطة النصال المنشارة التفريض . ازهارها صفيرة ، صيوانية التجميع ، بيضاء اللون أو ارجوانية . ثمارها جب دقيق ، مستطيل ، إبري الشكل المتباين الطول || تنويرها ربيعي || اعرف انواعها واشهرها الصميرة المريفة الورق (*T. latifolia*) .

#### \* صَمِيك \* ١٦٨٩٧ - *Benincasa cerifera (S). Bénincase (F).*

نبات زراعي حولي مداد وحيد الجنس والودع من فصيلة القرعيات . هذه الشرق الاقصى . زراعته واسعة الانتشار يستعمل كالكمبوس في الطبخ وكاليفلين في المربيات || ساقه مدادة طول نحو ٢٠٠ سم . حوائطه متشعبة . اوراقه معتقة ، كلية النصل المتجمع المزئير ، خاصة الغصص او سابعيتها . ازهارها فردية ، محورية ، كبيرة القد ، خاصة البتلات ، صفراء اللون . ثماره مستطيلة شبه اسطوانية الشكل ، طول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وقطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . لونها الى الخضار الباهت يعلو توشع اسمر . قشور الثار في اول عهدها كثيفة الزغب الحملي الاطراف ثم يتقلص الزغب لينشأها مادة شمعية تكتمل مع الادراك . لياها جامد المكسر ، ابيض اللون ، خافت العرف المسكي ، من المذاق .

#### \* صَمَجِيل \* ١٦٨٩٨ - *Dangila (S). Dangile (F) Dangila (E).*

سمكة نهريه من مفتوحات المائنة وفصيلة البشويات . موطنها جميع اشر الهند والبلاد المجاورة || جسمها اهليجي الشكل ، عذب الظهر ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى الخضار الاخضر يمتد في الظهر وينتهي في البطن . رأسها معتدل الجرم ، يرمي الشكل . غطها ثنائي العذبات النقيقة . شفتها قليل الانفرج . زعنفتها الظهرية كبيرة القد ، حلالية التقعر . زعنفتها الذيلية فارقة || عنها متوسط الصنف ، مأكول .

#### \* صَهَب \* ١٦٨٩٩ - *Dissymétrie (F). Dissymetry (E).*

الصفب عدم التناسق في التركيب الاعصامي والجسموري .

#### \* صَهْبَة \* ١٦٩٠٠ - *Cummsiella (S).*

جنس فطور مجهرية قريبة الشبه من الصدية . تتميز بيغها البوغي المردي الشكل ، العقيق الانتساب والتلطيظ القد . ذميتها عديدة الدعامات الرزية التجميع . دعاماتها مؤلفة من خليتين لا متجانستين الغل اسطوانية الشكل والديا كروية . اغنيها متصلة المسام الثنائية || انواعها الاقتصادية قليلة اعرفها صهبة الماهونه .

#### \* صَهْبَة الْمَاهُونَة \* ١٦٩٠١ - *Cummsiella sanguinea, Uropyxis sanguinea, Puccinia mirabilissima, Uromyces sanguines (S). Rouille du mahonia (F).*

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وثمار الماهونه فيؤذيها ويعملها || مظهره الخارجي بثور عسبة مبرشة لاقطية التجميع تركب الاوراق والثار الفتية . تبدو طحلا اللون فضفيسية الخلقة فتتجم النصل وترفعه ثم تنصرف الى الجزوة فالسرة حيث تنفجر عن بوغها الفزري اللون || وهو على البُار وأنها بثور صفيرة مستدرة رافعة مبرشة او متراسة تبدو طحلا اللون ثم يحيل الى السرة مع اقترابها



صميك



صنجبل



صهبة الماهونه



صهر



صهل

الضفديات. مهدا البلاد الحارة. اجسامها دودية مستطيلة، حلقاتها حشرية التركيب، غسقة، متباعدة من الرأس الى طرف الذنب. وروسها وتدية. عيونها دقيقة مغلقة. قوتها الحشرات. تعيش بين الحجارة وتحبها وفي انفاق تشربها كالحيات.

١٦٩١٧ - ضَوْكِيَّات *Caeciliidae* (S).  
١٦٩١٨ - ضَوْكِيَّات *Caeciliidae, Céciliidae* (F).  
فصيلة حيوانات عادمة الارجل من صف الضفديات اجناسها وانواعها عديدة مهدا البلاد الاستوائية والحارة. قوتها الحشرات والحوام والمواد العضوية المنحلة.

١٦٩١٨ - ضَوْج *Sinus*  
هو التيجوفيل المقعر في نصل النبات ج. اضواج.

١٦٩١٩ - ضَوْح *ضَوْح*  
ضَوْح اللبن : مزجته بماء ووضحه كذلك.

١٦٩٢٠ - ضَوْكَة \* *Enkanythus* (S).  
١٦٩٢١ - ضَوْكَة *Enkanythus* (E).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الزهرة الفسحة ». جنس اشجار وجنات حرجية وتزيينية من فصيلة الخنثنيات. منبتها يمتد من الشرق الاوسط الى اليابان. سوقها ترتفع من متر الى عشرة امتار. اوراقها متناحية، مسندقة القواعد والاطراف. ازهارها عذبة التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها ملونة، عشارية الاسدية، مغرقة المتكاثرة || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

١٦٩٢١ - ضَوْكَة جَرْمِيَّيَّة \* *Enkanythus campanulatus* (S).  
١٦٩٢٢ - ضَوْكَة *Enkanythus en cloche* (F).  
نوع من الضفوة. مهدا الشرق الاقصى. ساقها فروع تملو نحو عشرة امتار. اغصانها فارشة اقية الامتداد. اوراقها تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. نصالها مهدبة، ذوبة الانسان الحادة. ازهارها كبيرة متدلية جرمية الشكل صفراء تملوها مشعة وردية || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

١٦٩٢٢ - ضَوْكَة هِنْدِيَّة \* *Enkanythus deflexus* (S). *Enkanythus des Indes* (F).  
نوع من الضفوة. مهدا جبال الهند، اغصانها حلايا. ساقها متدلة الفسحة تملو من ٣ الى ٧ امتار. اغصانها واقناعها متراكبة. اوراقها لحيانية الشكل منها السنانية والاهليجية، تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها قصيرة الانسان اختارية. ازهارها حراء اللون، مشيرة بالوردي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٦٩٢٣ - ضَوْكَة يَابَانِيَّة \* *Enkanythus japonicus* (S). *Enkanythus du Japon* (F).  
نوع من الضفوة. ساقها فروع متراكبة الاندفاع والاغصان تملو من متر الى مترين. اوراقها اهليجية تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها مسندة الحنار. ازهارها يستيق الاوراق. ازهارها بيضاء اللون، جلجلية التويجات الخاصة الحداث || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

١٦٩٢٤ - ضُور *Rut des bovidés* (F).  
*Rut of the bovids* (E).  
هو استرحام البقر وسبها وراء الثيران.

في الايطاليين والبلن. ثوبه الشوي الى البياض الاصفر || ثباجه يتخلل من ثباح الكلب وعواء الذئب وضباح الثعلب || يسرح في الليل وفي النهار. قويلته البوية لا تتجاوز خمس ساعات.

١٦٩٠٧ - ضَهْرَة \* *Abajous* (F). *Cheek-pouch* (E).  
الضهوة جراب في باطن الخلد تتميز به بعض الحيوانات اغصانها القرد تستعمله لجمع الطعام من حبوب وغيرها. وما ضهوتان يعني ويسرى. ج. اضواء.

١٦٩٠٨ - ضَهْل *الضهل*  
الضهل : البقرة والشاة والمز والناقة التي قل لبنها. وهي البئر القليلة الماء.

١٦٩٠٩ - ضَهْيَاء *Chardon* (F). *Thistle* (E).  
الضهياء الشوك على اختلاف انواعه. والضهياء كل اتي لا تحبس.

١٦٩١٠ - ضَهْوَة، نُور *Lumière* (F). *Light* (E).  
النور هو المؤثر الطبيعي الذي يسبب الابصار. مصادره مختلفة منها طبيعية كالشمس ومنها صناعية كالمصابيح الكهربائية وغيرها.

١٦٩١١ - ضَوَاة *ضوة*  
هنة تخرج من حياء الناقة والبقرة والشاة قبل خروج الولد.

١٦٩١٢ - ضَوْكَة شَرَسَة \* *Staurotypus triporcatus* (S).  
*Staurotype agresive* (F).  
نوع من الضفوات. سلفها من فصيلة الحياتيات. موطنها يشمل معظم مناطق امريكا الوسطى. تألفت المناق والتغذيان والازواج ويجاري الماء || اغصانها شرسه ثورية، تهاجم كل من يقترب منها || جسمها متوسط القدر. ذيلها بيضي اللون، قليل الاسدياب، يطول نحو ٤٠ سم. زعنفاها منبسطة بالصفحة صليبية الشكل. رأسها معتدل الجرم، شارف الفك الاعلى. حنكها ثنائي الزوائد القرنية. عتقها غليظ قصير وذنبها قصير. قوائمها معتدلة القد، نشيطة || قوتها الفصاقد والاسماك والمظاء والثعابين.

١٦٩١٣ - ضَوْكَة *Haliotinelles* (S).  
*Haliotinelles* (F). *Haliotinelles* (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الحياشيم وفصيلة الكتيحات. انواعها المعروفة قليلة العدد، اطرافها البحر الاحمر والخليج. تعيش لاصقة بالصخور المنصورة القرية من السطوط || اصداؤها صغيرة، داخلية، رقيقة تلمع الظهور. اجسامها اهليجية الشكل، مستطيلة المقدم للمدب. اريدنيسا فضفاضة. غشايها يمينية الارتكاز. نظائية الترتيب الصغي. افواها عظمية معتدلة الطول. لولاسها انبوية مقلوبة السطوح الخارجية.

١٦٩١٤ - ضَوَارِب *Erratiques* (F).  
هي الطيور التي تطلب الرزق.

١٦٩١٥ - ضَوْرِيَّات *ضواريات*  
السين الشديد من الجبال.

١٦٩١٦ - ضَوْرَع \* *Caecilia* (S). *Cécilie* (F).  
جنس حيوانات عمياء، دجوبة، دودية الشكل من فصيلة



ضَوْع



ضَوْعَة



Callette (F). Rennet (E).

١٦٩٢٢ - ضَوْؤُ

١٦٩٢٥ - ضَوْؤُ هو الشراق ، اطلبه .

هو المنخة ، اطلبها .

Rayonnement diurne,

١٦٩٢٣ - ضِيَاءُ

Radiation diurne (F). Diurnal radianse, Diurnal radiation (E).  
هو الاشعاع الضوئي النهاري .

Thalamiflore (F).

١٦٩٢٤ - ضِيَاكُ ٥

Thalamifloral (E).  
نمت ترموني يطلق على النباتات المزججة الغلاف الزهري من ثنائيات الفلقة .

١٦٩٢٥ - ضَيْفَبُ ، ضَيْفَبُ

قال الدميري عن ابن سيده « الضيف شي من دواب البحر على هيئة الكلب وخلقت . »

Miel (F). Honey (E).

١٦٩٢٦ - ضَيْحُ

الفصح هو السمل فصل عن شهده .

Caranx sanson - ضَيْرَاكُ ، أَبُو ضَعْمُونُ

سمكة كبيرة مأكولة تكثر في البحر الاحمر والمتوسط . وهي نوع من السمك تطلق نحو ٦٠ سم . ثوبها الة الريدة القفصية زهو ويشقر عند البلوغ ويقع مع اقترابه من ثيج الثلهر .

Poulie (F). Filly (E).

١٦٩٢٨ - ضَيْرَانُ

فرس لم يقطن الاثان ولم ينز قط (السان) .

Hétérogame (F).

١٦٩٢٩ - ضَيْرَانُ ، غَيْثَانُ

Heterogamous (E).  
نمت ترموني يطلق على النباتات المزججة التي تحمل ازهاراً ذكورية وانثوية في زغير واحد .

Hétérogamie (F).

١٦٩٣٠ - ضَيْرَانَةُ ٥

Heterogamy (E).  
الضيرة جسوريا حيوانياً هي تعاقب تواله بكري مع تواله كوي صحيح || وهي عدايق حالة تباين الغامات الوراثية من حيث الابداء المركزية او التكوين || وهي شوزيباً حالة وجود ازهار مختلفة الشق في تنوير واحد .

Icticyon venaticus (S).

١٦٩٣١ - ضَيْفَبُ ٥

Icticyon (F). Icticyon (E).  
حيوان لاحم مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكلبيات . موطنه بعض اصقاع امريكة الجنوبية اخصها البرازيل . يألت اطراف الغابات والاحراج الممتدة الاضجار قوته ككل ما استطاع قتصه واقتراه من حيوان وطير . ملجته الحيائي جماعي ، جماعته تمد من ٥ الى ١٢ زوجاً || جسسه مستدل قليل الارتفاع يطول نحو ٩٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٢ سم . رأسه مستفخم الشكل عريض الجبهة والخلف . اذناه صغيرتان . ثوبه الى الشقة السوداء يمين في الرأس والظهر ويمين في البطن . وبره قصير ليد . الاثني اصفر قدام من الذكر واهت ثوباً من . عدد اطليهاها ١٢ . مجلها يستمر نحو تسمة اسابيع تقصع في تمامه من ٦ الى ٨ جراه طامسة لا تبصر النور قبل مضي سبعة ايام .

Parasite

١٦٩٣٢ - ضَيْفَنُ

هو الطفيلي ، اطلبه . ومن اسمائه بالني دون الاختصاص ليش .



ضوع



ضوة



ضيف

Coraciidae (S).

١٦٩٢٦ - ضَوْضِيَّاتُ

Coraciidae (F). Coraciidae (E).  
فصيلة طير من الجوارم تدعى ايضاً شقراقيات ، اطلبها .

Speotzto cunicularia (S).

١٦٩٢٧ - ضَوْعُ \*

Hilboux des terriers (F).

من اسمائه ضوع الوجار

H. des cavernes (F).

ضوع الكهوف

H. des lapins (F).

ضوع الارانب

H. des prairies (F).

ضوع المراعي

H. des marais (F).

ضوع المناقع

طائر من البويات ورمارة الغداديات يحوي البلاد في طلب الرزق ولا يقم في مكان اكثر من شهرين . يعيش جماعات كبيرة ، سره يبعد من ٢٠ الى ١٠٠ طائر || وهو من الطيور النافعة الواجب حمايتها . يألت المروج والمراعي والاراضي والناقع يفتن قوته في النهار . يصيد الجرذ والثأر والذباب والعظاء والحيات والمقارب || يدن عشه في سدود الصخور والكهوف والوجار وفي اصول وفروع الاشجار اليابسة . اثناء تقصع اربع بيضات تحضب ثلاثة اسابيع .

١٦٩٢٨ - ضَوْعَةُ \* ، سَيْبُ مَطْوُونُ

Engoulevent à collier (F). Fern-owl (E).

طائر من السبب الرواس طوله نحو ٢٧ سم . وهو امدأ الريش الاغبر الموشى بخطوط سود ورم . رأسه مفلطح الشكل . منقاره صغير اللد واسع الشدين يحمل حولها بعض الريش التقيق الملبسي التركيب . عنقه مطوق بقلادتين عاجيتين . ساقاه مستطيلتان ذلفان . ساقاه مسرولتان . ذنبه متوسط الطول || وهو من قواطع حوض البحر المتوسط . اثناء تقصع في اقموس تدبره وسط الادغال تحضن فيه اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوماً .

Saillie (F). Cover (E).

١٦٩٢٩ - ضَوْكُ

نزا ذكر الحيوان مل الاثني . ضاك الجواد الحجر : زوا عليها .

١٦٩٣٠ - ضَوْمَرُ ، ضَوْمَرَانُ

Moschosma (S).

Moschosme (F).

جنس نباتات حولية وبمرة من فصيلة الشفويات اناؤه قليلة العدد جميعا من الرياسين . سوقها دقيقة مربعة الزوايا تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها معتقة ، متناقبة ، فضية الشكل نصلها سبك النسيج ، منشاري الحافة ، خلى البشرة على صفحته . ازهارها مثلبي التجميع . ازهارها صغيرة اللد ، ضمية ، متناقبة ، لونها يراوح بين الالبيض والالخضر الباهت || ازهارها يستمر من كانون الاول الى شباط ارم من تموز الى آب || اوراقها وازهارها مسكية العرف البطري .

Lioplax (S).

١٦٩٣١ - ضَوْمَرَةُ

Lioplax (F). Lioplax (E).

جنس حيوانات مائية سرلودة من الرغويات بمديات الاربل وفصيلة البليدنيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلحنا بعض مناطق البلاد المتدلة الحرارة ونها امريكة الشمالية || اسمائها اعطليجية ، بطينة ، متباينة الاحجام ، رقيقة الفشاء الكلسي ، ملونة وزعرقة .

## ١٦٩٤٨ - صَيِّكَلَة سَاطِعَة \*

*Masdevallia ignea* (S). *Masdevallie flamboyante* (F).  
نوع من الصيكة. ساقها تملو نحو ١٥ سم. أوراقها  
حرفشقة. زهرتها جراء ساطعة يملوها موج قرمزي يتخلله  
البنفسجي. فصلتها العليا مستطيلة منقطة على الزهرة ||  
تنويرها ربيعي.

## ١٦٩٤٩ - صَيِّكَلَة قَرْمِزِيَّة \*

*Masdevallia coccinea* (S). *Masdevallie écarlate* (F).  
نوع من الصيكة. ساقها تملو نحو ٢٥ سم. أوراقها  
بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم. زهرتها بنفسجية يملوها  
مواج قرمزي اسفم || تنويرها يستمر عدة اسابيع ، من  
اواخر آذار الى اوائل حزيران.

## ١٦٩٥٠ - صَيِّكَلَة نَپُوتِسْمَة

*Népotisme* (F). *Nepotism* (E).  
الضيعة تجاوز مغاير للانظمة او الشرع يقوم به من  
يبدد السلطة في سبيل مصلحة قريبه او صديقه.

## ١٦٩٥١ - صَيِّكَلَة رُكَّان

هو نعن الماء ، اطليه .

١٦٩٥٢ - صَيَّون  
Matou (F). Tom-cat (E).  
هو القط الذكر ج. ضيان .

Parasitologie (F).  
Parasitologie (E).

Encastelure (F).

Contraction of the hoof (E).

عارض يصيب رجل الفرس سببه ضيق الدائرة في الحافر .

Paraphimosis

١٦٩٤٥ - ضَيِّقُ الْقُتْب  
سوء تركيب طبيعي في القتب يمنع بروز الحشفة الى  
الخارج وهو شائع عند الكلاب نادر عند الجياد .

١٦٩٤٦ - صَيِّكَل \* ، جَانُوس

*Janus* (S). *Janus* (F). *Janus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل  
وفصيلة الحرشويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها  
بحال البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها عريضة مستطيلة  
مغطاة بلواس متكاثفة ورقية الاطراف || اعرف انواعها  
واشهرها الصيكل القنتراني (*Janus cristatus*) الذي  
يكثر وجوده في المناطق الشمالية من البحر الابيض المتوسط .

*Masdevallia* (S).

*Masdevallie* (F). *Masdevallia* (E).

١٦٩٤٧ - صَيِّكَلَة  
جنس نباتات اعمية من فصيلة السحليات . جذورها  
لحية قليلة الانشعاب . سوقها شبه اسطوانية الشكل .  
اوراقها حرفشقة . ازهارها وسيدة ، كبيرة ، ملونة ||  
انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :



صَيِّكَل



صَيِّكَلَة سَاطِعَة

ط



طابية



طارسة

منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها شبه يضيئة الشوزن ، كبيرة الفالج المصراعي القاطب ، مألوسة الصفحة المزخرفة بالالوان الزاهية ، عادة الحلزونة || اجسامها اعليجلية . فلق ارجلها تلحف الاصداف . رؤوسها قليلة الوضوح ، عادة اللواس .

١٦٩٥٨ - طَاحُونٌ ، طَاحُونَةٌ ، مطَحُونَةٌ Moulin (F). Mili (E). الرشي تحسق الحب قصيره دقيقاً . والطاحون يعني ايضاً البيت المد للطحن . ح طراحين .

١٦٩٥٩ - طَاخِرٌ ، طَاخِرَةٌ ، طَخْرُورٌ Nimbostratus (S). ضرب من القيوم وهو محاب مراكب لبد اكهب اللون او اسمر يحجب الشمس .

١٦٩٦٠ - طَادَةٌ الطادة ضرب من السمك (السان) .

١٦٩٦١ - طَارِجَةٌ \* Pissette, Pipette اداة غبرية تستعمل في القاء السوائل المقتنة .

١٦٩٦٢ - طَارِقٌ الطارق نجم يقال له كوكب الصبح .

١٦٩٦٣ - طَارِيٌّ ، طَارِيَّةٌ ، طَارِيَّةٌ Adventif (F). Adventicous (E). نعت تمريني يطلق على بعض اعضاء النبات كالبرام وغيرها التي تظهر عرضاً في مواضع من النبات لم تألفها قبلاً .

١٦٩٦٤ - طَارِيٌّ Accident راجع اصابة .

١٦٩٥٣ - طَاطِيعٌ ، صِفَةٌ Caractère (F). Character (E).

١٦٩٥٤ - طَاطِيقٌ Etage (F). Stor, Floor (E).

١٦٩٥٥ - طَاطُورَةٌ Tapura (S). Tapura (F). Tapura (E).

جنس نباتات برية جنبية معمرة من فصيلة الجوزيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اطلاتها المناطق الحارة الاسيوية || جنباتها فراء تعلو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها معنقة ، متناقية ، نصالحا سنانية متموجة . ازهارها عتقودي التجميع . ازهارها صفيرة متباعدة الالوان يكثر فيها الاصفر الاخضر المواج ، ثوبانها متحدة البتلات ، اكاسها جزلة . ثمارها نصف مغلفة السوذك . عجبتها آحية .

١٦٩٥٦ - طَاطِيَّاتٌ Bullidae (S). Bullidés (F). Bullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية . اجناسها وانواعها عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة (الحارة || اصداها تراوح بين الاستدارة والاستطالة وقد يغلب فيها الصفرة والارقة وفي كثيرها ما تكون مغلفة بالرداء او بالرجل . غياشيمها مجموعة في تجاويف خاصة مركزها عند مؤخر الظهر يغلفها الرداء . رؤوسها قليلة الوضوح عادة اللواس || اعرف اجناسها واشهرها الطابية والجمبية والمهنية والخيزوب والكوارية .

١٦٩٥٧ - طَاطِيَّةٌ \* Bullaea (S). Bullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الطابيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ،

١٦٩٧٢ - طاعون الدُّبُّوت \*  
Tubercinia gladioli, Urocystis gladioli (S). Charbon du glaïeul (F).

فطر مجهري يركب الدُّبُّوت في أوراقه || مظهره الخارجي جيوب قدية تصيب النصل في نسيجه، لوها إلى الخضار المايق ثم يتحول إلى الجؤرة فيصل البشرة التي تنفجر عن غيار فمعي ادق من الهباب || اضراؤه لا تتوسب المكافئة لانها زبدية وقليلة الاذى .

١٦٩٧٣ - طاعون الدُّوْمِيَّات \*  
Tubercinia primulae, Ginanniella primulae (S). Charbon des primevères (F).

فطر مجهري واسع الانتشار قليل الاضرار يصيب الدويكيات فيؤذي بعض ازهارها || مظهره الخارجي غيار كالدقيق ابد اللون يكتنف قباب الزهر ثم يفصل بينا يتكون في قمر الكأس جراب من البوغ حشو هباب اسود لا يضم الزهرة ولكنه يطب البذور || لا يستلزم المكافئة لانه محدود الاذى .

١٦٩٧٤ - طاعون الشُّقَار \*  
Tubercinia anemones, Urocystis anemones (S). Charbon des anémones (F).

فطر مجهري يصيب الشقار في أوراقه وازهاره || مظهره الخارجي بقع حنطية لاقامية مجتره رافعة يحيطها اطار احمر اللون، تسبب تجمع الاوراق ثم انفجار بشرة النصل . وهو على اعتناق الاوراق وأمن الازهار وكؤوسها بقع قرصية عاطة || يكافئ باقتلاع وسرق النباتات المسابة وبطهير التربة بالكبريت والكلس الحراق بنسبة ٢ كبريت الى ١ كلس .

١٦٩٧٥ - طاعون الشَّيْم \*  
Tubercinia occulta, Urocystis occulta (S). Charbon des feuilles du seigle (F). Rye smut (E). Stengelbrand des roggens (D).

فطر مجهري يصيب الشيلم في عصفه فيؤذي وقد يمتدحه من الاسبال || مظهره الخارجي خطوط منتظمة التمرجج لوها إلى الزرقه عرضها من ١ الى ٢ م. تبدو داخل النصل وتعد من الغمد الى اوائل الزام الثالث من المصفه . وعند اكمال دوره الحياتي يتضخم في الحطوط فيفجر بشرة النسيج وينتظر كيمار الفم الاسود || يكافئ اولاً باستمال البؤرة الزراعية التي تحيل دون تكرار الزرع في الموقع الواحد على سنتين متواليتين . ثانياً بتغطيس البذار مدة ٢٠ دقيقة في محلول الفورول التجاري المركز ٢٥ ٪

١٦٩٧٦ - طاعون السَّجِل \*  
Tubercinia agropyri, Urocystis agropyri (S). Charbon des feuilles de blé (F). Wheat smut (E).

فطر مجهري يصيب السجل في ورقه فيجبه ويذويه . مظهره الخارجي خطوط متشعبة في نصل الاوراق تبدو سمراء اللون ثم تنفجر عن غيار اسود || اضراؤه جسيمة لانه يطب الاوراق ويسبب يساها وتلف الفساري التي كان السجل خضرها || يكافئ باقتلاع النباتات المسابة وبحرق او الهاب مواضعها ثم تعجيد زرعها .

١٦٩٧٧ - طاعون الخنزير  
Pestis suum (S). Peste porcine, P. du porc (F).

وباء سريع الانتشار شديد الوق يستلزم الطباية البيطرية .

Géophage (F).  
Geophagous (E).

١٦٩٦٥ - طاعيل  
هو التارب ، الطلبه .

Thalassicole (F).

١٦٩٦٦ - طاعيس  
نعت تعريبي يطلق على كل حيوان او نبات يعيش ببدأ عن الشواطئ البحرية وقد لا يعيش عند الاقتراب منها .

Tubercinia (S).

١٦٩٦٧ - طاعول \*  
جنس فطور مجهرية من فصيلة التنفجيات، يوفه توري الارتكاز لاقايي الحجم يحمل في وسط محوره بويئات خصبه مشبه الجسم الفليظ ويحمل في اطرافه بويئات حاقرة شفافه الجسم النحيل || طياله كثيفة التجميع تمش على نسج الاوراق وقد تركب جنور بعض التجليات واغمار الريبيات || انواعه عديدة اشيعها ما يتبع .

١٦٩٦٨ - طاعول البصل \*  
Tubercinia cepulae, Urocystis cepulae (S). Charbon des feuilles d'ognon (F). Onion smut (E). Zwiebelbrand (D).

فطر مجهري يصيب اوراق البصل والقوم والكراث فيؤذيها وقد يسبب ذبولاً || مظهره الخارجي خطوط فضية اللون تملو الاوراق باستطالها وتركب الاسفاط وقلب التامية القرصية فتؤذيها منذ نشأتها || يكافئ بتطهير التربة الموبوءة بواسطة الكبريت والكلس بمعدل ١٢ كيلوكبريت نام و ٦٠ كيلوكلس حراق للدم الواحد اي لالف متر مربع .

١٦٩٦٩ - طاعول البنفسج \*  
Tubercinia violae, Urocystis violae (S). Charbon des violettes (F).

فطر مجهري يصيب البنفسج في أوراقه فيؤذي ويميتها . مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب النصل على صفته السفلى فتصلب النسيج وتغضب بشرة الصفحة العليا ولوها الاحمر البنفسجي الذي ينحرف تدريجياً الى الاملح الرصاصي . ويركب اعتناق الاوراق فيقرحها ويميتها . يكافئ باجتنب الكثافة وبالابتعاد عن المواقع الدائمة الرطوبه .

١٦٩٧٠ - طاعول الحنطة \*  
Tubercinia tritici, Urocystis tritici (S). Charbon des feuilles du blé (F). Wheat smut (E).

فطر مجهري يصيب الحنطة في عصفها واغادها وسوقها وستايلها || مظهره الخارجي خطوط متوازية مع عروق النصل تملو الصفحة العليا فتسبب تفجير البشرة وانتفاخ الشتراف الى عدة اقسام . واذا ركب كامل عصف الزرع منع النمو والاسبال . يكافئ : اولاً : بزرع القصبوب الموصقة بمناعتها . ثانياً : باستمال البؤرة الزراعية الثلاثية او الرابعة . ثالثاً : بحرق الجذامة في ارضها وهو على مفيد . رابعاً : بتطهير البذار قبل الزرع .

١٦٩٧١ - طاعول الحنظل \*  
Tubercinia ranunculi, Urocystis ranunculi (S). Charbon des renoncules (F).

فطر مجهري كثير الشيع يصيب الحنظل في اوراقه فيؤذيها || مظهره الخارجي دمال لاقامية الشكل والحجم تصيب النصل يفرقه فتسبب جيوباً رافعة لا تلبث أن تنفجر عن غيار فمعي داكن السواد || يكافئ باقتلاع وسرق النباتات المسابة وبطهير التربة بالكبريت والكلس الحراق بنسبة ٢ كبريت الى ١ كلس .



طاعول البصل



طاعول البنفسج



طاعول الحنطة



طاعول الدلبوت



طاعول النجيل



طائان

١٦٩٨٩ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، مَرَضُ الْخَيْلِ الْأَفْرِيقِي،

Force cryptique (F).  
Pestis equorum (S).  
Peste equine, P. du cheval (F).  
وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وسائر الدواب فيصيبها أن لم تعالج وقائياً .

١٦٩٩٠ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Energie potentielle, Potentiel (F). Potential energy, Potential (E).  
وتدعى الطاقة المخزنة أو المقدور الكامن .

١٦٩٩١ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Énergétique (F).  
Energetic (E).  
ما هو منوط بالآلة .

١٦٩٩٢ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Budorcas taxicolor (S).  
Takang, Takin (F). Takang (E).  
حيوان لبون عاشب يجتر من ذات الاخلاف . موطنه يمتد من الاسباط الى التبت على حدود التلج الدائم . ملجئة الحيواني جماعي . قطعانه صغيرة متفرقة لا يجتمع الا عند الرحيل من مقاطعة الى اخرى فيبلغ عدد الاجل، اذ ذلك، نحو ٥٠٠ نفر . جسمه ديمية ، مستطيل الشكل ، فيه من الثور والكبش والظبي . يطول نحو ٢١٥ سم . ويبلغ نحو ١١٥ سم . ويزن عند بلوغه الكلال الجسموي من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو . قرن الذكر يطول نحو ٥٠ سم . وقرن الانثى نحو ٢٠ سم . رأسه مستفخم الجرم ، محدد قصبة الانف . عيناه صغيرتان لوزيتان . اذناه صغيرتان مستعرضتان . قرناه ضليمان يتوجان الجهة . عنقه معتدل القد ، كثيف الوبر المستطيل . صدره عريض القفص عادم القنب . كفه مقوس الطرف المنحدر . قوائمها غليظة ، شديدة النشاط . ثوبه الى الشبهة الزرقاء المالح يغير ويشرق صفحي المتى وينحرف الى الشبهة في البطن . فخرع الانثى ثنائي الخلف . قوته الاعشاب الخضراء والخلشاش اليابسة .

طاعة

١٦٩٩٣ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Table de pointage (F).  
جدول قياسي يتحدد فيه قيمة الجزء من الشيء بالنسبة الى كماله .

١٦٩٩٤ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Tan  
الطان هو المادة الفعالة في مسحوق لحاء الفصص وغيره من انواع السنيان واللكسنة الخ . يستعمل في تحضير الجلود .

١٦٩٩٥ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Indigeste (F). Undigested (E).  
ما تغلظ الهضام على المعدة .

١٦٩٩٦ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

le Paon (F). Pavo (E).  
الطاووس كوكبة نجوم جنوبية الموضع . ذكرها بين العرب الفلكي والثلث والثلثين . عدد نجومها تسعة مراتها ثارواح من الخامسة الى الثامنة .

طاكان

١٦٩٩٧ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Pavo (S).  
Paon (F). Peacock (E).  
جنس طير من فصيلة التدرجيات . مشهور بمجال ريشه والزهر ونمسه والخيلاء . كنيته ابو الحسن وابو الوشي . انواعه قليلة . جميعها كبيرة الوجة مستطيلة ريش القوادم والزنجي ، قصيرة ريش الانثى . رؤوسها صغيرة القد متوترة . مناقيرها غليظة . ارسافها طاولوة . غالبها صغيرة . اثنائها متراكبة الالوان الالهية يعلوها تشويع جميل ومشة

١٦٩٧٨ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، مَرَضُ الْخَيْلِ الْأَفْرِيقِي،

Pestis equorum (S).  
Peste equine, P. du cheval (F).  
وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وسائر الدواب فيصيبها أن لم تعالج وقائياً .

١٦٩٧٩ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Pestis avium (S). Peste aviaire (F).  
شُرْطَةُ . وباء خبيث سريع الانتشار يقتل بالطيور الداجنة انحصا الدجاج . يعالج وقائياً .

١٦٩٨٠ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Febris catarrhals x nervosa  
بو سنوز .  
canum (S). Maladie de Carré, Morbus carre (F).  
وباء خبيث يصيب الكلاب فيصيبها أن لم يعالج وقائياً .

١٦٩٨١ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Pestis bovina (S).  
Peste bovine (F). Cattle-plague, Rinderpest (E).  
وباء شديد الوباء سريع الانتشار يصيب البقر والغنم والماعز والجاموس فيصيبها أن لم تعالج وقائياً .

١٦٩٨٢ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Imperméable à l'eau (F).  
Waterproof (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا ينفذها الماء .

١٦٩٨٣ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Mutant (F).  
فرد او جزء من فرد ظهرت فيه طفرة اي شرد .

١٦٩٨٤ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Pteromys petaurista (S).  
Pteromys petaurista, Taguan, Oral (F).  
نوع من البطارييس وهو حيوان قاض من السنجابيات موطنه الهند وبنديب . طوله نحو ٥٠ سم . وذنبه ٥٥ سم . جسمه مستطيل الشكل . جوارحه قصيرة ، اطرافه صغيرة مدنية . ثوبه الى الصبغة السوداء تليق مع اقاربها من النهر والرأس والصدر . يله الى الفرة الموحدة بالابيض . رافله الجناحية المجلدية كاسية . يأنث الاجراع الكثيفة ويقرب من الاماكن الالهة . قوته البار والقشور والحشرات والديدان .

١٦٩٨٥ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Boopis (S). Boopide (F).  
الاسم العلمي معناه « عين الثور » والاسم العربي الماعا الى شكل جميع الارواق والازهار . جنس نباتات معمرة برية وتربينية من فصيلة الكليرييات . منبتها الطوسي بعض مناطق امريكا الجنوبية المعتدلة الحرارة . انواعها المعروفة عشرة ، اما ضروبها التربينية فكثيرة العدد . سورها غشوشية ، قليلة الفروع التي تنتهي بطاقات من الارواق والازهار . تنويرها يستمر من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .

١٦٩٨٦ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Energie (F). Energy (E).  
صفة كل جسم يستطیع القيام بعمل .

١٦٩٨٧ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Energie cinétique (F).  
Kinetic energy (E).  
طاقة الحركة .

١٦٩٨٨ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ،

Dynamisme (F).  
Dynamism (E).  
طاقة الحركة .

Paradisea minor (S). طائر الفردوس الصغير  
Paradisier petit émeraude (F).  
Paradisea apoda (S). طائر الفردوس الكبير  
Paradisier apode, Paradisier grand émeraude (F).

1٧٠٠٧ - طابير القيقارة \*  
Oiseau-lyre (F). طائر من الجوامئ لاقتات التمل يدعى مانور ، اطلبه .

1٧٠٠٨ - طابير القيقارة الأنيق \*  
Oiseau-lyre superbe (F). طائر من الجوامئ لاقتات التمل وفصيلة المانوريات يدعى مانور مبزل أو انيق ، اطلبه .

1٧٠٠٩ - طابير المقالب \*  
Oiseau des tropiques (F). طائر من كفيات القدم وفصيلة القيقوتيات يدعى قيقوت ، اطلبه .

1٧٠١٠ - طابفة \*  
Sous-classe (F). Sub-class (E). الطابفة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الصف وقبل الشعبة .

1٧٠١١ - طبّ أنجيل \*  
Hippiatrie (F). Hippiatry, Veterinary art (E). علم يبحث في امراض الخيل ومداولها .

1٧٠١٢ - طبّ بيطري \*  
Médecine vétérinaire (F). Veterinary medicine (E). هو طب الحيوان او طب الحيوانات الداجنة .

1٧٠١٣ - طيباب ، ديسك \*  
Disque (F). Discus, Disk (E). شكل قرصي الهيئة مسطح السفحة اوردعها او مقعرها .

1٧٠١٤ - طباج \*  
Lagria (S). Lagrie (F). Lagria (E).

جنس حشرات غاصلة من غديات الاجنحة وفصيلة الطابجيات . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تغزل من ٧ الى ٨ م . رؤوسها شبه مخروطية . متكاثر ضليمة . عيونها كبيرة نازحة . قرنبيها الاستشعارية خيطية . كواسلها ضيقة مستطيلة . بطونها اهلجية مقلعة . اتحادها عذبة ، لاحقة ، خلية القشار ، مهدية الاطراف . قوائمها مستطيلة || تألفت المواقع الدفلة . قوتها الاوراق والازهار . يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية المنحلة في الجثاة ونحت القشور والحاء .

1٧٠١٥ - طابجيات \*  
Lagriidae (S). Lagridés (F). Lagriidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء . اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة . جميعها غاصلة قوتها المواد النباتية . يرقاتها تعيش في الجثاة ونحت القشور || اجسامها صغيرة تغزل من ١٢ م . رؤوسها مخروطية . كواسلها ضيقة مستطيلة . اتحادها جالسة القاعدة ، مستديرة الاطراف اللاحقة . قرنبيها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة . ارساغها مختلفة الاجزاء || اشهر اجناسها واعما انتشاراً الطياج .

خلافة . ذنابها رتبة القد ، مروحية النثر || موطنه الهند وجوارها وسرنديب . يألف الغابات والفياض والمروج الدفلة . يعيش اسراباً صغيرة براوح عددها بين ٦ و ٢٠ . قوته البار والجوب والاشباح والتواهي والحشرات والوزغ والافاعي || مجده الاشجار المنطشة الاغصان . اناثه تقص نحو ١٠ بيفات تحضبا وحدها في افحوص تدثه في البرية بين الاذغال والاشباح || اشهر انواعه ما يتبع .

1٦٩٩٨ - طاووس أسود \*  
Pavo nigripennis (S). Black peacock (E). طاووس من الطاووس موطنه الشرق الاقصى . يتميز باسوداد ريشه وبامتداده فلوس ذنابها وبالنشأة الغضبية المواج التي تملو ريش صدره .

1٦٩٩٩ - طاووس التبت \*  
Paon du Thibet هو التشكيس طاووس من التبتيات ، اطلبه .

1٧٠٠٠ - طاووس سُنْبِي \*  
Pavo muticus (S). Paon spicifère (F). طاووس من الطاووس . موطنه الهند . كبير الجفة رائج الجمال . رأسه وقترته وصغته الى الاخضر العابق الازرق المواج . صدره الى الاخضر الازرق المذهب المواج . بطنه شديد الخضار الازرق . ظهره اسفغ لاصع يتخلله الاخضر والاصهب . قولده الى الصهبة . اياهره الى السواد الازرق المواج . كلاء الى الخضار العابق . ذيله اكبر من ذيل الطاووس المعادي واذاي لوناً وابهى رونقاً .

1٧٠٠١ - طاووس عادي \*  
Pavo cristatus (S). Paon vulgaire, P. commun (F). Common peacock (E).

طاووس من الطاووس رأسه وصغته وصدره وبطنه الى الزرق العافية ، الجلية ، الخضراء المواج . قة رأسه سوداء . بحره موشع بالابيض . ريش ظهره اخضر اسفغ ، اسود الحافة . قولده الى الصهبة العافية . اياهره الى السواد الازرق المواج . ذيله اخضر اسفغ تملوه فلوس سود يحرقها الاخضر الزاهي .

1٧٠٠٢ - طاووس \*  
Paonne (F). Peahen (E). انثى الطاووس .

1٧٠٠٣ - طابير البوق \*  
Thalassidrome (F). طابير من كفيات القدم مشهور باسم تدروم ، اطلبه .

1٧٠٠٤ - طابير الزوايع \*  
Oiseau de pluie (F). طابير من كفيات القيقوتيات يعرف باسم قفراق ، اطلبه .

1٧٠٠٥ - طابير الغيث \*  
Paradisea (S). طابير من فصيلة القيقوتيات ورتبة الجوامئ المشروبات

المنانير . انواعه قليلة مهدا جزر المحيط الهادي . تتميز بزهاء اثنائها الخارقة الجمال . اجسامها متوسطة القد . طولها براوح بين ٣٠ و ٣٥ سم . رؤوسها معتدلة ، منقارها مستطيلة ، عذبة ، ذرية . مناقشها قاعدية الارتكاز منشأة بالزغب . اجنتبها متوسطة القد ، ذلقة . اذنانها قصيرة . ارباش افئتيها الجانبية مقوسة الشكل متناهية في القوة والنعومة || اعرف واشهرها الثلاثة التالية .

1٧٠٠٦ - طابير الفردوس \*  
Paradisier rouge (F). طائر الفردوس الاحمر



طاووس سنبي



طاووس عادي



طاووس



طياج



طباب

## Gutta-Percha

١٧٠٢٥ - طَبَّرَحَى

مادة حليابية تستخرج من بعض الشجار الفصيلة السبوتية . تستعمل كأداة عازلة في غنطل الصناعات لأنها لا تنقل الكهرباء ولا تنوب بالهاليفس أما تنوب بالكولورومر وسلفور الكربون والبنزين .

١٧٠٢٦ - طَبَّرَزْد هو الأبلج ، الطبله .

١٧٠٢٧ - طَبَّرَزْن (F). Sugar-loaf (E).

هو السكر الأبيض المألود المقلوب ويدعى الطبرزز والطبرلز .

١٧٠٢٨ - طَبَّرُوسَة مُسْتَحَبَة ٥

Tetragnatha fuvia (S). Tétragnathe agréable (F).

دويبة من التناكب الساعية القانصة من ثنائيات الرأيا دسائيات المشاتن وفصيلة الشياحيات . موطنها معظم أقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمها شبه مرزني الشكل يطول عند العنكب نحو ١٨ سم . وعند العنكة نحو ٣٠ سم . صدرها بلنسي الشكل اسمر اللون . عيناها مركبتان زخيمتان . شيفعا فديقان ذريان . فكاه مجنات . جرازمها مستطيلة ، نشطة ، مستدة الاطراف . نوبها الى الصحرة الجميلة يملؤها فتاويق قائمة || قوتها الحشرات اغصنها الذباب والحمام .



طبر

Cyprinidae (S).

١٧٠٢٩ - طَبَّرِيَّات ٥

Cyprinidés (F). Cyprinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات سفيجيات الخياشيم والارجل . اجناسها وانواعها المروفة كثيرة العدد . متحجراتها تظهر في الطبقة الطباشيرية . انواعها منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها سمكة الاسفاد متباينة الاشكال والاحجام . تتميز بنجاشيها الانساروية الذئ ، يثاعبها الطليقة ، القصبية وبارجلها المستطلة الخددة الصفحات السفلى || اعرف انواعها واشهرها الطبرية والوطيب واليوت .



طبروسة مستحبة

Cyprina (S).

١٧٠٣٠ - طَبَّرِيَّة ٥

Cyprine (F). Cyprina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفيجيات الخياشيم والارجل من فصيلة الطبريات . انواعها المروفة عديدة اصطانها مصبات انهر المناطق الشالية || اصداؤها شبه غروولية الشكل خاسية الاطراف و سباعية ، سمكة الصفحة المشنة ، مالة الحمار . غيرا اللون غالبا || تعيش بين الرمال والحصى . لحومها كاتعة المصنف .



طبرية

١٧٠٣١ - طَبَّر

هو الفالج ، أبلد ذو السنامين ، الطبله .

١٧٠٣٢ - طَبَّرَسُون هو الدمان السوري ، الطبله .

١٧٠٣٣ - طَبَّطَاب ٥

Megacephalon (S).

Mégacéphale (F).

جنس طير من فصيلة الشبانيات . انواعه قليلة تتميز باستدال اجسامها . رؤوسها صلغ تعلوها خوذ قوتية التركيب . اذناها كبيرة القد . طاهر التواها الى السمرة العابقة يملؤها مولج زيتوني . باطن التواها ويطونها واذناها الى السمرة الوردية . اجنسها مستدرة الشكل ، مستطلة الحجم . اذناها صغيرة فرقة . اراسها قوية لونها الى السواد || تألفت الاسراج القريبة من التواطلي . تعيش



طيطاب

١٧٠١٦ - طَبَّارَة ، تَبَّسَة شَتَوِيَّة (F). Figue d'or (F). ثمرة الطبار وهي متوسطة الصنف كبيرة التذ نخل الكن . والطبار غرب من التين الشتوي يعيش في البلاد المعتدلة الحارة .

Crale (F). Chalk (E).

١٧٠١٧ - طَبَّاشِير

سحابة جيرية ناعمة البياض ، قليلة الصلابة ، حثينة الاثر ، مكوثة من ذرات الجير تخالطها بقايا عارية صدفية حوطا مرور الزين بالضغط والترسيب || اما اصابع الطباشير التي تستخد في الكتابة على اللوح السدي فهي مزيج مركب من الجير مع كربونات الكلسيوم او كربونات الكلسيوم .

Crétacé (F).

١٧٠١٨ - طَبَّاشِيرِي

Cretaceous, Chalky (E).

نعت ترميني يطلق على الحقبة الثالثة من الاباج الاوسط اي الثاني . ويقال العصر الطباشيري والاراضي الطباشيرية || تتميز هذه الحقبة بتطور تضداد القشرة الارضية وابتقسامها الى بعض القارات . وبتمتعة امتياب المناطق المناعية ، وبكثرة انتشار الرغويات ونها معديات الارجل ومزويجات المصارع ، و بانتشار الزخافات الكبيرة والجليدة ويطور التلييات الصغيرة لقد القريبة شبه بالثلييات الحالية .

١٧٠١٩ - طَبَّاق ٥ ، طَبَّيْن ، رَاسَن دَبَّيْ

Inula viscosa (S). Aunée visqueuse, Inule visqueuse, Conyze visqueux (F). Rock flea-bane (E). Alpenflöhkraut (D). Enula viscosa (I).

نوع من الراسن وهو نبات عشبي ري معمر من فصيلة المركبات الانزوية الزهر . ساقه قزواء ، زياء الحاء ، تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه صغيرة القد ، احليلجية ، ذرية . نصلها ازغب البشرة المزجة على صفحتها . وقد جاء عنه في اللسان : « الطبايق ثمر مناته جبال مكة كثير المنافع » .

١٧٠٢٠ - طَبَّاق البراغيث هو البرنوف ، الطبله .

Disque solaire (F).

١٧٠٢١ - طَبَّاب

Solar discus (E).

شعاع الشمس وهي الطرائق التي ترى فيها عند طلوعها .

١٧٠٢٢ - طَبَّيَّة

كل قطعة من الارض مستطيلة الشكل ، خيفة العرض كثر ثباتها او قل تدعى طبة .

١٧٠٢٣ - طَبَّر ٥ ، عَنَدَرُمَة ٥

فطر من السميات ركب الجلعوق اليابسة في السديان واغور والاكاسيا والزائن والينق فيسب انفلاقها الطولي ثم عنها وانتفاها البقي || مشبه ابيض اللون كثيف الحيف . فطره ملين الشكل ، شمعج السطح ، جل الاطار ، نام البشرة الزياء الحليلة للمس ، لونه اسهب اغبر ، يطق عند منتصف خط الاطار . اما الاطار فابيض والصفحة السفلى بنية || لياه قرني اللون ، جامد المنقط ، ندي التركيب . سماكه من ١ الى ٣ سم || يورقاته قعية الشكل طولها نحو ٨ ميكرون وقطر عاتدها ٥ ميكرون .

Pilastr (F). Pilastr (E).

١٧٠٢٤ - طَبَّر

Tétine, Tétin (F).  
Teat, Nipple (E).

حلمات المرع التي من تحت وظلف وحافر وسبع وأكثر ما يكون الطبي السباح . ج. أمهات .

### ١٧٠٤٦ - طَبِيقُ الْكَلْبَةِ

هو الخلاف التقيس الورق ، امهات .

### ١٧٠٤٧ - طَبِيبٌ يَبْطِرِي

Vétérinaire, Médecin vétérinaire (F). Veterinary, Veterinary surgeon (E).

هو الطبيب المختص بمعالجة الحيوان .

### ١٧٠٤٨ - طَبِيشًا

هي الجليسا ، امهات .

Gasteropelecus (S).  
Gastéropélaque (F).

جنس اسماك نهري بحرية من مفتوحات المثانة وفضيلة السلموثيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مبنولة عند مصبات الانهر || اجسامها صغيرة ، مبططة ، طرية الشكل ، تقول من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها واعظامها متوسطة الحجم . اشداقها شبه عويدي الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الارتكاز صغيرة . الصدرية جناحية الشكل . الخوضية شديدة الصغر . الشريكة مستطيلة والذيلية فائقة . جميعها تتميز ببطونها النصف دائرية الشكل . اثنائها الى الخصار الغشي الموج .

### ١٧٠٥٠ - طَبِيشٌ

هو لب الطلعة .

Nature

### ١٧٠٥١ - طَبِيشَةٌ

Physique, Matériel, مَادِّي  
Naturel (F). Physical, Material, Natural (E).

١٧٠٥٣ - طَبِيشٌ \*

Coronule (F).  
جنس حيوانات بحرية من القشريات اصفاها طبقية الشكل ، مسننة الاضلع ، صغيرة القد تعيش على غثفل اجناس الحيتان .

١٧٠٥٤ - طَبِيشٌ

Hymenocallis (S).  
Hyménocallide (F). Hymenocallis (E).  
جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة الترجيبات . موطنها بعض اقاليم امريكا الجنوبية . اوراقها اهليلجية الشكل . ازهارها عطرية العرف ، صيوانية التجميع ، قواعد خيوط اسديتها مستعرضة مندغة قدسية الشكل || تزورع للزئين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترطب في الاتربة القليلة الاندماج المنسوبة التركيب العنصري الوفيرة المواد الغذائية || انواعها قليلة العدد ، اشهرها الثلاثة التالية .

### ١٧٠٥٥ - طَبِيشٌ أَهْيَفٌ

Hymenocallis speciosa (S).  
Hyménocallide élégante (F).

نوع من الطبيق . عشبة دوفسية سبروتية . خراغها ثنائي الصلوع المزوانية ، يرتفع من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقها اهليلجية مستطيلة ، نصلها بجبل الخصار الزاهي . ازهارها صيوانية التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، تقول نحو ١٠ سم . تاجها اي قدسها سداسي الفلق المشدغة الطحلاء الخصار || تنويرها خريفي .

ذكرًا واثني كالحمام . اسراها تعد من ٧ الى ١٥ زوجاً . قوتها الجيوب على اختلافها . اثنائها تبيض في افحوس كبير القد قطره يراوح بين ١٢٠ و ١٥٠ سم . وعقه من ٣٠ الى ٦٠ سم . تحفره مع ذكورها ورفيقاتها من السرب الواحد في رمال الشاطئ على حدود مرسى المد . وهي لا تحسن يعضها بل تقضمه في الافحوس وتغليه ببطيعة من الرمل سماكتها نحو ٢ سم . فينفق بعد اسبوعين . وهي تبيض في مومها من ٨ الى ١٠ بيضات تقضمها بالتتابع حيث يتقضي بين الواحدة واثني ثلثها من ١٢ الى ١٤ يوما . والبيضة كبيرة القد مستطيلة الشكل تبدو عند وضعها قريديئة اللون ثم تتحرف الى الصفرة وتستقر على البياض . الفرج ينفق كاسياً فثيلاً مستغنيا عن حضانة امه التي يجهلها ولا تعرفه .

١٧٠٣٤ - طَبْجَان

Argile grasse (F).  
Clay, Greasy, Rich (E).

١٧٠٣٥ - طَبْجِي

Vertèbre animale (F).  
Animal vertebra (E).

١٧٠٣٦ - طَبْجِي \* ، كَتَبٌ ، أَبُو طَبْجِي ، أَبُو قُرْصُ

Holacanthus (S). Holacanth (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ موطنها بحار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد مقطعة مستديرة طولها يراوح بين ١٥ و ٢٠ سم . اثنائها زاهية الالوان الجميلة المجدبة بالاسفر والبرتقالي والوردي .

١٧٠٣٧ - طَبْجِيَّة

Srate, Stratum, Couche (F).  
Stratum (E).

١٧٠٣٨ - طَبْجِيَّة

Superordre (F). Superorder (E).  
باب في تصنيف الاحياء يأتي بعد الشبة وقبل الرتبة .

### ١٧٠٣٩ - طَبْجِيَّةٌ مُؤَلَّدَةٌ

هي القلب اي الكيسوم ، امهات .

١٧٠٤٠ - طَبْجِيَّة

Tympan (F).

هي الصحناء ، راجع اذن .

١٧٠٤١ - طَبْجِيَّةُ الْاَذُن

Tambour de l'oreille (F).  
Ear drum (E).

١٧٠٤٢ - طَبْجِيَّة

Tympanique (F). Tympanic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة ببطيعة الاذن .

١٧٠٤٣ - طَبْجِيْن ، طَبْجِيْن

Pâture de charogne (F).  
Food of carrion (E).

الجيفة توضع فيصاد عليها التسور والسباع .

### ١٧٠٤٤ - طَبْجِيْعٌ \* ، قَمَلُ الْعَانَةِ

Phitirus pubis (S). Morphon, Pou du pubis (F). Crab-louse (E).

نوع من اللفرصيات صغير الجسم مستعرض الشكل طولها يراوح بين مليمتر واربعة خطوط ومليمتر وسبعة خطوط . ارجله دقيقة ، ارسافه تتنبي بمقالم خادسة سادة . يعيش بين الشعر الخشن كشمر العانة والابط والحاجب .



طَبِيقٌ



طَبِيقٌ



طَبِيقٌ



طَبِيقٌ



## \* ١٧٠٦٣ - طشرة الكرمة \*

*Pyrrhocoris apterus* (S). Punaise tête de mort, Diabie (F).

حشرة من الطيريات صغيرة القد طولها نحو ٦ م. ثوبها ابيض اللون. اجنتها قصيرة. مجذاتها جملة || تركيب برام الكرية فتؤذيها.



طشرة البطاطا

*Fourmis* (F). Ants (E).

## \* طشرة \*

هو النمل واحدة طرحة.

## \* ١٧٠٦٥ - طشرينات و طشغيات \*

*Lygaeidae* (S). *Lygaeids* (F). *Lygaeidae*, Chinch bugs (E). Lang wazzen (D).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنته. اجنتاسها وانواعها كثيرة المدد جميعها خاضعة او خائفة، صغيرة القد او متوسطة. تتميز بجلودها من غدد فرز السوائل الكرية الرائحة. عيونها جارية. قرونها الاستمارة مستطيلة، مقوسة، ثلاثة المفاصل. ارجاسها ثلاثة المقل. مجاذيفها خاسية العروق القاطبة الطويلة.



طشرة الزرد

## \* ١٧٠٦٦ - طشجة \*

« ثيرة تسو نحو القامة مشوكة من اسفلها الى اعلاها شوكلها غالب لونها ورقها صغار ولها نورة يضاء يحرسها النمل. ج طي » (السان).

## \* ١٧٠٦٧ - طحارة \*

*Etudes des nuages* (F).

هي الايلا ن درس تكوين السحب وتحركاتها.

## \* ١٧٠٦٨ - طحاف، طحاف، طحاف \*

*Cirrus* غريب من الغيوم وهو يتحاب مرتفع رقيق يرى الساء من خلاله.



طشرة القطن

## \* ١٧٠٦٩ - طحافة مرقطة \*

*Tropideres sepicola* (S). *Tropidère moucheté* (F). *Tropideres sepicola* (E).

حشرة خاضعة خاشية دامت من فصيلة القاطليات ورتبة مفدمات الاجنته. تألف اجراج السندان. غناصها تعيش على الاوراق. يرقاتها تعيش على الجذوع والاضقان اليابسة فتسودها بالبول والعرض || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ م. ثوبها الى السواد القمعي الاصعب المالج يطولو ترقيط اطحل وبعض التزاويق الكستنية. راسها مستدل الجرم، عظمها متكي رقيق الطرف. عيناها صغيرتان. زياناها صقرا. ظلوها مستدير المنحصر الاحف. غمداها شديتا الصلاة، كنيها النمل. ارجاسها ثلاثة المقل || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز. تسرح في التبار. تساد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع. تمتع المكان في شقق الاغصان اليابسة او تحت قشورها || البرقة عند بلوغها الكال الجسموي تطول نحو ٨ م. جسمها مستطال الرأس والمقد، سداسي الراجاب الصغيرة. ثوبها الى التني الاصفر المالج. راسها اسود. فكها ضلعان ذريان || طور الاكامل الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في السرداب الريقي ضمن غشاء مزيل.



طشرة الكرية

*Rate* (F). *Spleen* (E).

## \* طيحال \*

عضو بطني في الجسم يوجد في تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. وظيفته الدفاع من جسم ضد الميكروبات لذلك فهو يحترن الكثير من كريات الدم احمر يستخدمها عند الحاجة اليها. ج عسل والطحلة وطحالات.



طحانة مرقطة

## \* ١٧٠٥٦ - طشيق كبير الناج \*

*Hymenocallis calathina* (S). *Hyménocallide à grande couronne* (F).

نوع من الطليق. عشية دوفسية سرورية. شراخها ثنائي الضلوع المزواية يطلو من ٤٥ الى ٨٠ سم. اوراقها قدية الشكل، مستطلة الطرف الذق، تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ م. ازهارها صيواني التجميع. ازهارها يضاء اللون، كشي القد تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. تاجها اي قدسها سداسي الفلق المدغمة الباجعة الخضار || ثنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

## \* ١٧٠٥٧ - طشيق متواج \*

*Hymenocallis undulata* (S). *Hyménocallide ondulée* (F).

نوع من الطليق. عشية دوفسية سرورية. شراخها عادم التضلع يرتفع نحو ٦٠ سم. اوراقها سانية الشكل، رقيقة التصل الماروج، تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٢ سم. ازهارها صيواني التجميع. ازهارها عاجية اللون، كبيرة القد، تطول من ١٥ الى ١٨ سم. تاجها سداسي الفلق المدغمة، زنيي اللون || ثنويرها ديبوي او غريفي.

## \* ١٧٠٥٨ - طين \*

*Cryptocère* (F).

*Cryptoceros* (E).

نمت تعريفها يطلق على كل حشرة غفية الزباني.

## \* ١٧٠٥٩ - طشرة البطاطا \*

*Lygaeus solani* (S). حشرة من الطيريات صغيرة القد طولها نحو ٦ م. ثوبها الى الخضرة. اطرافها صفراء اللون تتميز بكسولها القليل الضخم ورأسها الكبير الممتعرض || تركيب اوراق البطاطا فتؤذيها.

## \* ١٧٠٦٠ - طشرة الزرع \*

*Blissus leucopterus* (S). حشرة من الطيريات صغيرة القد طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السرة الباقية. مجذاتها مستطيلة مزركشان وينمشان. ارجلها صغر. يرقها تبو صفراء اللون عند التفت ثم تنمرق الى الحمرة ويزداد احمرارها بعد كل انسلخ الى ان يستقر على الجوزة || تركيب الحطة والشعير والشيلم والشوفان والذعن والذرة والارز.

## \* ١٧٠٦١ - طشرة السندان \*

*Lygaeus equestris* (S). *Lygée équestre* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطيريات ورتبة مختلفات الاجنته جسمها مبطل الجرم يطولو نحو ١٢ م. || راسها احمر اللون، اسود اطحل المستدل الطول. عيناها صغيرتان، ناشارتان. زياناها مستطيلان، اسودان. كسولها احمر اللون، اسود القسم الذي يتاج الرأس. بطنها ومبدا الى الحمرة. سجنها مزواية، سوداء. ظلوها احمر المجداف، اسود الطرف والتيجع ويملوه طرفه الاسود تجليج ابيض وتنتظي. قشرانها شفاف. قوائمها الى السرة || مرتها السندان.

## \* ١٧٠٦٢ - طشرة القطن \*

*Oxycarenus hyalinipennis* (S).

حشرة من الطيريات صغيرة القد طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السرة السوداء. مجذاتها بلون الفضة اللامعة || تركيب برام القطن الزرعية وتوقع بها اشد الاذى.

\* ١٧٠٨٠ - طَحْرُوب السِّنْدِيَان \*  
Pleurotus dryinus (S). Pleurote du chêne (F).

نوع من الطحروب . يعيش على جذوع السنديان وأغصانه . مجموعته شبيهة العدد الذي يتألف من وحدتين أو أربع وحدات . ساقه شديدة القصر . نكتته مفروطة ، محتلة اللحم ، مكفوفة الأطراف ، مزققة السطح ، لونها إلى الطحلة الصفراء المواج يعلوها تنبتش اسمر . اطراسها إلى الصفرة السمره المواج || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

\* ١٧٠٨١ - طَحْرُوب مَحَارِي \*  
Pleurotus ostreatus (S). Pleurote en huître (F).

نوع من الطحروب يعيش على جذوع السنوبريات . مجموعته تعد من ٦ إلى ١٢ وحدة . ساقه قصيرة شبيهة اللون . نكتته محارية الشكل لونها إلى الكهية السمره ، اطراسها إلى اليلكي العابق || لحيتها ما مكولة ، لذينة العلم .

١٧٠٨٢ - طَحْرُور ، طَحْرُورَة \*  
Nuage (F). Cloud (E).

الطحرور والطررورة : السحاب . والطحارير قطع السحاب المتفرقة .

١٧٠٨٣ - طَحْلَاب \*  
Muscicole (F). Muscicolous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على النباتات الطحلبية .

١٧٠٨٤ - طَحْلَب ، طَحْلَب ، طَحْلَب \*  
Mousse (F). Moss (E).

اسم شامل يطلق على مختلف النباتات الطحلبية دون تمييز رتبة أو فصيلة أو جنس . والطحلب من النباتات المادمة الاضرار والجذور الحقيقية لتتس الغذاء بمراحش خيطية تنبت في التربة وعلى الشجر والصخور .

١٧٠٨٥ - طَحْلَب السَّمَك \*  
Mousse (F).

مرض سار يفتك بأماك المياه العذبة . مظهره الخارجي نواس خلل التجميع ، قطني اللون يعلو أجسام السمك . شبه فطر مجهرى يدعى سبرولونية (Saprolognia) يعيش في المياه الملوثة القذرة .

١٧٠٨٦ - طَحْلَب المتاعق \*  
Sphagne (F).

هو الصلطب ، اطلبه .

١٧٠٨٧ - طَحْلَبِيَّات \*  
Bryophytes, Muscinées (F). Bryophytes, Muscina (E).

قسم من المملكة النباتية يتميز بخلو نباتاته من الجذور والأزهار . اجناسه وأنواعه كثيرة العدد تجمعها ثنائي فصائل تنتمي إلى أربع رتب وصفين .

١٧٠٨٨ - طَحْبَاء \*  
Mouture (F). Grinding (E).

جمل البر وسائر الحبوب دقيقاً .

١٧٠٩٠ - طَحْرِب \*  
Olivella (S). Olivelle (F). Olivella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات . مديئات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه الماصرة المرفوعة نحو ٣٠

١٧٠٧١ - طَحْلَاب \*  
Mousses (F). Moss (E).

صف من قسم الطحليات انواعه واجناسه عديدة جميعها اربع فصائل تنتمي إلى مرتبتين : السبخيات والسفانات . اما فصائلها فهي : الروكيات والسفانيات والثرنيشيات والصرغيات .

١٧٠٧٢ - طَحْلَبِيَّ \*  
Splénique (F). Splenic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالطحال .

١٧٠٧٣ - طَحْنَان \*  
Meunier (F). Millier (E).

هو من تعالي مهنة الطحن من صانع الطحين وبائمه .

١٧٠٧٤ - طَحْنَانَة \*  
Meunerie (F). Miller's trade (E).

حرفة الطحنان وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً .

١٧٠٧٥ - طَحْرِب \*  
Olivancillaria (S). Olivancillaire (F). Olivancillaria (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مديئات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه الماصرة المرفوعة عديدة موطنها بدار امريكية الجنوبية || اصداؤها شبيهة باصداث الطحرب الا انها ازلق منها وجوانسها مقوسة الشكل . صفحاتها ناعمة ، جميلة الالوان والزخرفة .

١٧٠٧٦ - طَحْرُب \*  
Oliva, Dactylus (S). Olive (F).

الواحدة طحربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديئات الارجل وفصيلة الطحربيات . انواعه المرفوعة نحو ٦٠ جميعها مفترسة . موطنها بدار البلاد الحارة . تعيش على السطوط الرملية المشورة || اصداؤها مألوسة شبيه زيتونية الشكل . متوسطة الحجم ، جميلة الالوان والزخرفة . بعض انواعها يفرز مادة صابغية لونها وقرنها كالارجل || اشهر انواعه واكثرها ثناء وايضاها ارجوانيا الطحرب الرقي (Dactylus utriculus) لونه إلى الشقعة الزخرفة بالكهية . موطنه المحيط الهندي .

١٧٠٧٧ - طَحْرِبِيَّات \*  
Olividae (S).

Olividés, Dactylidés (F). Olividae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مديئات الارجل . اجناسها وانواعها الماصرة المرفوعة عديدة موطنها بدار البلاد الحارة || اصداؤها شبيه اطليلية ، زيتونية اللون ، متفارقة الاجسام ، جميلة الالوان . مستطيلة القنوتات الضيقة الناعمة . ارجلها كبيرة ، ثنائية القلق || اعرف اجناسها واشهرها الطحرب والطحربيات والروط والعاجية .

١٧٠٧٨ - طَحْرَة \*  
Tégument (F). Tegument (E).

الغشاء الناعم الذي يلف التواء والبرزة وما اشبه .

١٧٠٧٩ - طَحْرُوب \*  
Pleurotus (S). Pleurote (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفارغيتيات . انواعه المرفوعة قليلة العدد اصطلها غابات وسراج جبال المناطق المعتدلة الحرارة . تعيش على جذوع الاشجار واغصانها دون ان تؤذيها . تتميز بسوقها القصيرة وبكعناها القمية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الطحروب المحاري وطحروب السنديان .



طحرب



طحروب السنديان



طحروب محاري



طحرب

المروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || مستمراتها تبدو كمنافذ ملونة قطانية أخضاب || تنمو في الماء توجهها ملابسها المنيمة وما ينشأ فيها من الياض راشتة مستطيلة عجيبة الاطراف .



خفوف

١٧١٠٤ - طَرَّافِيَّات ٥ Phosphoridae (S).  
Phosphorides (F). Phosphorides (E).

فصيلة من الفصائيات المنثيات البحرية . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || اشهر اجناسها الطرارة .

Type ١٧١٠٥ - طَرَّاز

١٧١٠٦ - طَرَّاز بُرْتَقَالِي \* ٥ Rupicola crocea (S).  
Rupicole orangé (F).

طائر من فصيلة الطرازيات . موطنه بعض المناطق الجبلية من النوربان والبرازيل . يألف المواق الصخرية والاراضي الوعرة باستثناء فصل الشتاء حيث يأوي الى الغابات . سره يمد بعض المئات || جسمه كرم الشكل يطول نحو ٣٠ سم . عند الذكر نحو ٢٧ سم . عند الانثى . ثوب الذكر الى الصفار البرتقالي . حنجرته الى الازرقاني العايق . لواحش قوامه واباهره الى الجؤوة . وقال ذنبه جؤوية اللون صفراء الاطراف . حذقة عينه برتقالية اللون . منقاده وساقه الى الصفار الخشبي . ثوب الانثى الى الصفار العناني تملوه مابة حمراء الى الازرقاني والذنب الى طيرانه خفيف الحركة سريعها طويل السوط . قوته الثار المختلفة والبدور || يشيد وكته في تخاليف الصخور . عسل طريقة السنوز ، بالطين المزوج بالالياف النباتية . الانثى تحضن ثلاث مرات في الحول . حضنتها تتألف من يفتين . الترخم يستمر نحو اسبوعين تقوم به الانثى بينا الذكر يؤن لها الغذاء .



طرارة

١٧١٠٧ - طَرَّازِيَّات ٥ Rupicolidae (S).  
Rupicolidae (F).

فصيلة طير من الجوائم سنيات المناظر . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى اخصها النوربان . تألف البور والمواق الصخرية التي لا تبعد كثيرا عن شلالات الماء || اجسامها علة مكرمة مستطيلة الاجنحة قصيرة الازذاب والارياغ . صغيرة المناقيد ، كبيرة الفتازع التي تمتد من المناق الى الاقنية . اثارها تختلف مع النوع والائق || نظامها الحياتي جماعي . اسرارها تد بعض المئات . قوتها الثار والبدور || اعرف انواعها واشهرها الطراز البرتقالي .



طرّاز بترقالي

١٧١٠٨ - طَرَّافَة البتج ٥ Terapha hysciami (S).  
Punaiste des Jussuquames (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الكوربيات وربة تخلفات الاجنحة . جسمها بجثر الحلب ، معتدل البسيط ، يطول نحو ١٠ سم . رأسها مستطيل ، محرم . عظمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان || ثوبها الى الحمرة الصفراء الموج يعلونها يتيج اسدي في الكرول والحيفة وحنجبي الظهران . ظهرها اريد اللون . قشراتها شفاف . بطنها الى الحمرة يعلونها يتيج اسدي . قوائمها متكافئة الحلب || تركب العديد من النباتات واعصها الباذنجانيات ومنها البتج .

١٧٠٩١ - طحين Farine (F). Flour (E).  
هو الدقيق ، مسروق ناعم يحصل من طمن حبوب القمح والذرة الصفراء ويغريها من الحبوب .

١٧٠٩٢ - طَخَاف Cirrus (S).  
ويدعى الطحاف ، بحباب مرتفع رقيق .

١٧٠٩٣ - طَخَرُور ٥ Nimbostratus (S).  
هو الطائر شرب من النجوم ، اطلبه .

١٧٠٩٤ - طَخَرُور \* ٥ Languria (S).  
Langurie (F). Langurie (E).

جنس حشرات من غديات الاجنحة ديوسيات القرن وفصيلة العرطليات . انواعها المروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم انظار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، ضيقة الشكل ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . رؤوسها عسمة . عيونها نازرة . قرونبا الاستعمارية خيطية ، ديوسية الاطراف . كراسلها شبه مكورة . بطونها اسطوانية . اغمادها ضيقة ، لاسفة . قوائمها دقيقة . اثارها ثنائية اللون ، يكثر فيها الاحمر والبرتقالي . اغمادها زرقاء او خضراء او كستنية او صنائية مذبة الموج || منظر انواعها يعيش على التطور والبض الآخر تحت قشور النباتات الذابل . يرقاتها دامت .

١٧٠٩٥ - طَخَفَاء الاثنان السوداء الاثف .

١٧٠٩٦ - طَخَمَة Troupeau de chèvres (F).  
Flock of goats (E).  
تطبع المز .

١٧٠٩٧ - طَخْمِيل Coq (F). Cock (E).  
هو البك الممر .

١٧٠٩٨ - طَخِيم Takang (F).  
حيوان لبون عاشب مجرّ يدعى طاكأن ، اطلبه .

١٧٠٩٩ - طَرّ Duvet (F). Down (E).  
الطر : ما طلع من الور بعد النسل . وطر النبات : رطل او كبح .

١٧١٠٠ - طَرَّاخُور ٥  
هو الاسقمري . نوع من السك ، اطلبه .

١٧١٠١ - طَرَّاخُور شائع Maquereau commun (F).  
سمكة بحرية تدعى اسقمري معروف ، اطلبه .

١٧١٠٢ - طَرَّاخُور كَلْبِيَّاس Maquereau collas (F).  
سمكة بحرية تدعى اسقمري كلباس ، اطلبه .

١٧١٠٣ - طَرَّافَة \* ٥ Phosphora (S).  
Phosphore (F). Phosphora (E).  
جنس فضاء من المنثيات وفصيلة الطرازيات . انواعها

## ١٧١١٨ - طُرْتُث \*

Balanophorus (S).

Balanophore (F).

جنس نباتات لحية فطرية الشكل معمرة من فصيلة الطرثوثيات. أنواعه المشهورة ثلاثة تصقل على جذور نخيل النخلة أو سيقانها صغرة القند غليظة الجسم. أوراقها حشرفية متراكبة. أزهارها صفراء أو بيضاء أو حمراء. عصاره اغاليجه شديدة التركيب شائعة الاستعمال.

## ١٧١١٩ - طُرْتُوث \*، مَصْرُور، زُبُّ الأرض، إِبْرُ الحَقِيش، إِبْرُ الذَّئْب

Cynomorium coccineum (S). Cynomoir, Cynomorion écarlate, Champignon de Malte (F). Maltese mushroom, Scarlet synomorium (E). Malteser Pilz, Schwammvon Malta (D). Fungo di Malta (I).

نبات طفيل يربط الجنس والنوع من سبط المصرورات وفصيلة الطرثوثيات. منته حوض البير المتوسط. اغاليجه مأكولة قابضة وهو لا يغلو من بعض الحواص الطبية الصحية المقوية النافعة، كما يستعمل لقطع النزف.

## ١٧١٢٠ - طُرْتُوث أَحْمَر \*، هَالُوكْ شَرَقِي

Phelypaea coccinea (S). Phéliepée écarlate, Clandestine du Levant (F). Red showy broom rape (E). Clandestino di Levante (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفغليات يكثُر في بعض مناطق الشرق الأدنى. اغاليجه ينفسج الفول، أزهاره أرجوانية، حمر المالح. وهو شديد البقع والضرر، يؤذي النباتات التي يربكها.

## ١٧١٢١ - طُرْتُوث حَلَو

هو الاغاريقون المرئي، اطليه.

## ١٧١٢٢ - طُرْتُوث مَصْرِي \*، هَالُوكْ رَجَبِي

Phelypaea aegyptiaca (S). Phéliepée d'Egypte (F). Sweet scented broom rape (E). Nelkensommerwurz (D). Succicamele piccolo (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفغليات يربك أكثر الزروع الصيفية ويقوع بها اشد الاذى.

## ١٧١٢٣ - طُرْتُوثِيَّات

Balanophoraceae (S).

Balanophoracées (F). Balanophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الغلغتين. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بغلاطة سويها اللحمية. أوراقها حشرفية متراكبة. أزهارها وحيدة أو ثنائية المسكن، صغرة القند، هامة الاوزكاز، قرصية التجميع، لبد، متتابة.

## ١٧١٢٤ - طَرْح

Soustraction (F), Subtraction (E).

Régime de banane (F).

Bunch, Stem (E).

هو القوط يتألف من عدة اشامط متتابة ترتكز على شمرخ لني التركيب، متين الحيك، غزير العصاره اللدقية.

## ١٧١٢٦ - طَرْح في المَزَايِدَة

Mise aux enchères (F). Bidding (E).

هو طرح مال منقول أو ثابت للبيع بطريق المزاد العلني ليشتره من يعرض اعمل على فيه.

## ١٧١٢٧ - طَرْحُوم

Eau altérée (F).

Corrupt water (E).

هو الماء الاجبن.

## ١٧١٢٨ - طَرْخ، طَرْخَة

Puisard (F). Cesspool (E).

شبه حوض كبير عند خرج القناة يجمع فيه الماء.

## ١٧١٠٩ - طَرَائِقُ الإِسْتَاد

Méthodes de reproduction (F). Methods of reproduction (E).

طرائق الاسفاد في الحيوانات الدواجن تأتي بالنسبة الى الغاية المتوخاة على حدة الشكال: الاسفاد والتجيين والانفال والتخليط والانتخاب. وارجعها في مواضعها.

## Tourbe (F). Peat (E).

## ١٧١١٠ - طَرْب

هو الترب، اطليه.

## Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E).

## ١٧١١١ - طَرْبَاء

هي التراب، اطليه.

## ١٧١١٢ - طَرْبَال مَطْرُوقِي \*، دُرْسَة الْقَصَب

## المَطْرُوقَة

Cynchramus schoenoides, Emberiza schoenoides (S). Cynchrame schoenicole, Bruant des roseaux (F). Dalmatian Reed Bunting (E).

عائتر من الدرس وفصيلة الشروديات. موطنه اوروبا الجنوبية ويقع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر. يعتبر من الضوارب التي تقيم في لبنان من شهر ابريل الى شهر ايار. جسمه ريع القامة يطول نحو ١٥ سم. وتبلغ بسلته نحو ١٨ سم. ثوبه الى الطحلة البنية يملوها توشيح كستني. رأسه وزوره الى السرة. ويمتد من قاعدي الشفتين غشائ ابيضاض فاصلان بين الحسرين والزرور ثم يتصلان بقلادة يبيضاض تطوق الرأس. ويملو الرداء والظهر والعجز غطوط كستنية يتخللها الاسود. ذنبه معتدل القند، فارق الطرف. صدره وبلته الى البنية البيضاض. ابطاءه ومشاه بالبي. حلقه عينه كستنية. منقاده سموري اللون الى الاني اصفر قدما من الذكر وثوبها قريب البنية بثوبه الى البلف المنطق والاجام وصفاف مجاري الماء. يدخن منه على الارض بين الاعشاب الكثيفة. الانثى تحضن مرة واحدة في العام. حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات ترجها بتناوبة الذكر من ١٣ الى ١٤ يوما. يغير من المنصافير النافعة القليلة الاذى.

## ١٧١١٣ - طَرْبَان \*٥

Equus asiaticus (S).

Tarpan (F).

غرب من الخيل موطنه فياني آسية الشمالية. علماء الحيوان لا يتعرفون بالظربان كنوع مستقل بل يقول انه غريب من الخيل توشح بعد ان كان داجنا. جسمه اصغر من جسم الفرس العربي. ثوبه كستني اللون يمتد في الشتاء ويزهر في الربيع والصيف. يتميز بالصلاب والرشاش وبغلاطة الرأس وباستطالة العنق والاضلع القصير العرف، ويصغر الحافر وبزخات شعر الذنب الذي يمتد حتى اواخر الظهر.

## ١٧١١٤ - طَرْبُوش الْعَرَابِ هو لبلاب الحقول، اطليه.

## ١٧١١٥ - طَرْوَة الطرة هي التلة الواحدة.

## ١٧١١٦ - طَرْوَة

Bord (F). Edge, Margin (E).

طرة كل شيء: حرفة. وطرة الورقة حرفها أو حناها. ج طرد وطرار وطرات وطرار.

## ١٧١١٧ - طَرْوَة

Huppe (F). Crest, Tufted (E).

شكل من اشكال القنزعة.



طربال مَطْرُوقِي



طربان



طرثوث



طرثوث



طربوش آخر



طربوش مصري



طرخون



طردوس



طرب



طرسوج اسمر



طرسوج دلي



طرسوج صخري

الغابات . ملجته الخياقي زوجي . مسرحة دجوي . قوته الحشرات والذباب والثار وريحق الانزاع يرتفعه بلسانه اللصيق المالح || جسمه صغير القدد بطول نحو ١٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٠ سم . رأسه مخروطي الشكل ، دقيق القمم . عيناه صغيرتان . اذناه مستديرتان . قوامه قصيرة . اياهه تقابل اسبابه . وبه كيت وقصير . ثوبه الى الشهية يملعوا موالج اشنع في الرأس والظهر وموالج اصفر في الصدر والبطن ، ويملعوا ايضا غمد ثوبي اسود قاطب يمتد من القف الى قاعدة الذنب . يحمره الى الشقعة الصنابية || الاثني تحمل بنفس الثوب وهو جراب في اسفل البطن تقم في الرضيع حتى الطعام .

### ١٧١٣٩ - طَرَسُجُون ، سُلْطَان ابراهيم

Mullus (S). Mulle, Rouget (F). Mullet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الطرسوجيات انواعه ثلاثة مولها شواطي المتوسط والاوسط . جميعها صغيرة القدد طولها يراوح بين ١٠ و ٣٥ سم . اجسامها اهلجية الشكل خياف . اوتابها زاعية الالوان المزاجية المتداخلة بين الربادي والوردي والبرتقالي والاخر والبني والاسمر . رؤوسها صغيرة . مخاطمها قصيرة . طبانها ثنائية مستطيلة . زعانفها الشرجية فارقة || انواعه الثلاثة مأكولة ومستحبة اما متفوقة الصف .

### ١٧١٤٠ - طَرَسُجُون اسْمَر \* ، قَرَفُورَة

Mullus fuscatus (S). Mulle brun (F). Dark mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الفسوج والتبوت البحرية الرملية والصخرية . يكثر في البحر المتوسط . طوله عند اكمال بلوته يقارب ٣٥ سم . ملمسه اهلجي الشكل . ثوبه متركب الالوان الزاعية يدخل فيها القفي والرادي والوردي والاخر الصنابي الموالج . ظهره اسبق لونا من جنبه . رأسه صغير القدد . خملته متوسط البروز . طبانها غليظتان . عيناه عقيقتان . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة الحجم ، لينة . قلوبه صغيرة ودقيقة || يعتبر من اجود الاسماك المأكولة وسهم من مائه ان لم يفسله على الطرسوج الصخري .

### ١٧١٤١ - طَرَسُجُون رَمْلِي \* ، سُلْطَان ابراهيم

الرْمْلِي ، بَرْبُونِي صغير

Mullus barbatus (S). Mulle rouget, Rouget-barbet, Petit Barbarin (F). Red mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته التبوت الريلية البحرية . طوله يراوح بين ١٠ الى ٢٠ سم . ملمسه جالس الظهر . ثوبه متركب الالوان الزاعية يدخل فيها القفي والرادي والاراجواني . رأسه صغير القدد . خملته قليل البروز قصير . عيناه دقيقتان مستطيلتان . عيناه فضيتان . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة القدد لينة . زعنفة الشرجية فارقة . قلوبه مستدقة رقيقة || يعتبر من اجود الاسماك المأكولة الا انه يأتي بمد الطرسوج الصخري . وهو مفضل على الشواطي الليتانية السورية .

### ١٧١٤٢ - طَرَسُجُون صَخْرِي \* ، سُلْطَان ابراهيم

الصَخْرِي ، بَرْبُونِي

Mullus surmuletus (S). Mulle surmulet, Surmulet, Barbarin (F). Surmullet (E).

نوع من الطرسوج قوته التبوت الصخرية المائية . طوله يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم . ملمحه مردني الشكل . ثوبه متركب الالوان الزاعية يغلب فيها الرادي والوردي

١٧١٣٩ - طَرَسُجُون هو الخندب البري ، اهلبي .

### ١٧١٣٠ - طَرَسُجُونَة

Saurel (F).

سمكة بحرية تدعى شم طرخوري ، اهلبي .

### ١٧١٣١ - طَرَسُجُون \*

Artemisia dracunculus (S). Estragon, Armoise petit dragon, Dragone, Fargon, Tragon, Serpentine (F). Estragon, Tarragon (E). Estragon, Tragenbulfus (D). Dragonea, Dragoncello, Targone (I).

بقلة زراعية ممرنة من فصيلة المركبات الابوية الزهر . ساقه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة خفيفة النصل . انهاره سفلية التجميع ، رؤسية الشكل ، بحورية الارتكاز || وهو من التوابل الشائعة الاستعمال . اوراقه ونواحيه مأكولة . جميع اجزائه عطرية . ينهش الشهوة ويهني المدة || يتكاثر بالبزور والتفصيح . يجد في جميع الاربة الزراعية لكنه يخشى الرطوبة والصقيع .

### ١٧١٣٢ - طَرْدَة ، طَرْد

Essaim (F). Swarm (E).

هو فرق النحل . ج طرد .

### ١٧١٣٣ - طَرْدَة كَان

هو السيوان السوري . اهلبي .

### ١٧١٣٤ - طَرْدُوس \*

Onychoteuthis (S).

Onychoteuthis (F).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، تنتهي بزعانف مزوانية كبيرة القدد . رؤوسها معتدلة الحجم . حيوتها كبيرة ماصة . جرابها ملابطة ، ثمانية منها محجمة متساوية الطول واثنان لقيقتان مستطيلتان تنثيان برسي ستانية الشكل مجهزة بكتلاب حادة || اشهر انواعه الطردوس القوي (On. robusta) الذي يكثر وجوده في بعض مناطق المحيط الهادي والذي يطول من ١٠ الى ١٢ متراً .

### ١٧١٣٥ - طَرْدُوسِيَّات \*

Onychoteuthidae (F). Onychoteuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز . اجناسها واتواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة والباردة || اعرف اجناسها واشهرها الطردوس والوراس والنساس والغواس .

### ١٧١٣٦ - طَرَسْ

Feuille (F). Leaf (E).

جزء وري الشكل من صفحة بعض الفطور . ج الحراس وطروس . والاطراس تبلو كاتها اطراف اوراق مرصوة متناصبة .

### ١٧١٣٧ - طَرَسَام \*

Exuviable (F). Exuviable (E).

نمت ترفيقي يطلق على كل طائر يتحمر او حيوان يتجدد قشاره او جلده .

### ١٧١٣٨ - طَرَسَب \*

Tarsipes rostratus (S).

Tarsipède rostré (F).

حيوان حاشر ثامر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفلنجرجات . موطنه بعض مناطق استراليا الشمالية . يأنف

الرفيمة . الاناث تبيض من ٤ الى ٥ بيضات والذكور تاتوب الاناث في الحفن .

١٧١٥٠ - طَرُوبِيَّاتٌ (S): Pteroptochidae  
١٧١٥١ - طَرُوبِيَّاتٌ (F): Pteroptochidae (E).

فصيلة طير من الجوارم نباتات المناظر . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق الشرق الاقصى وامريكا الجنوبية . تألفت البراري والمراعي قوتها الحشرات والحوام والزرور البرية || اجسامها صغيرة . اوتواها بعمامة التخفيف الزاهر . اعرف اجناسها واشهرها الطرطام والرماز .

١٧١٥١ - طَرُوبٌ

هو الفرع الضخم الطويل المسترخي . ويقال لطويلة الفرع من الحيوان طرطبة .

١٧١٥٢ - طَرُوبَانِيَّةٌ

الطرطانية من المزم الطويلة شطري الفرع .

١٧١٥٣ - طَرُوبِيَّاتٌ (F): Vanneau huppé

طائر يدعى ابو طيط متوج ، اطلبه .

١٧١٥٤ - طَرُوبٌ (F): Petite centauree

هو القنطريون الصغير او مرارة الحفن .

١٧١٥٥ - طَرُوبَةٌ (F): Tartrage

هي معالجة الحمر بحامض الطرطريك سدا لموز في نسبة حوضها .

١٧١٥٦ - طَرُوبٌ (S): Clinus argentatus  
١٧١٥٦ - طَرُوبٌ (F): Clinus, Crested blenny (E).

سكة بحرية بيوض من فصيلة الجيتريات شاككات الزعانف . اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبا الى الخضار البحري القفي المواج يطلو بمخضع مقعر اسمر يمتد من الزعنفة الظهرية الى البطن . رأسها صغير الخطر الذلق يطلو في وسط الجبهة رعة صغيرة تحيلة غفروية المادة . زعنفتها الظهرية وبيضة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٥٧ - طَرُوبٌ هو البرازية ، اطلبها .

١٧١٥٨ - طَرُوبٌ البَاشَا

هو الكبوين الكبير ، اطلبه .

١٧١٥٩ - طَرُوبٌ (F): Topinambour

هو عباد الشمس السقولي ، اطلبه .

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

١٧١٦٠ - طَرُوبٌ مُحَرَّرٌ ، كَبُرُوبِيَّاتٌ

والاجواني الصنابي المواج . رأسه صغير القد . خطمه ذلق بارز . عذبه مستطيلتان . عيناه ارجوانيتان . زعافته الظهرية والصدرية كبيرة القد لينة . زعنفته الشرجية فارقة مستطيلة || يتبر من اخر الاسماك واجودها صنفًا . وهو مبدول عل الشواطئ اللبنانية السورية .

١٧١٤٣ - طَرُوبِيَّاتٌ (S): Mullidae

١٧١٤٣ - طَرُوبِيَّاتٌ (F): Mullidae, Goatfishes (E).

فصيلة اسماك من الطليات الشاككات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مأكولة مستحبة العلم . اجسامها رفيقة متوسطة القد او صغيرة . اوتواها زاهية الالوان الجميلة . اشهر اجناسها الطرنتوج .

١٧١٤٤ - طَرُوبٌ (E): Exuvie

الطرسم ما يتخل عنه الجسم الحيواني عند التحسیر او الانسلاخ او الاكمال .

١٧١٤٥ - طَرُوبَةٌ (F): Exuviabilité

١٧١٤٥ - طَرُوبَةٌ (F): Exuviabilité (E).

الطرسة خاصة التحسیر او الانسلاخ او ابدال القشار التي تنتج بها الطير والحشرات وبعض الحيوانات .

١٧١٤٦ - طَرُوبٌ (S): Aptenodytes

١٧١٤٦ - طَرُوبٌ (F): Manchoit

جنس طيور بحرية من عدييات الريش وكفيات القدم . تتميز باجسامها الغليظة المستطيلة . طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . اجنتها بمخافة الشكل ، حشفة الريش . اعناقها ومنافقها مستطيلة ، ورؤوسها صغيرة . اذناها جداد كاسية || قوتها الاسماك والقشريات . تدن اوكارها في تخاليف المسخور فوق الماء . اناتها تبيض وتحفن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع .

١٧١٤٧ - طَرُوبِيَّاتٌ (S): Aptenodytidae

١٧١٤٧ - طَرُوبِيَّاتٌ (F): Aptenodytidae (E).

فصيلة طيور بحرية من عدييات الريش وكفيات القدم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبه غروية الشكل . رؤوسها صغيرة منافقها جالسة ، معتدلة الطول ، مخددة الاناك العليا الباترة السطام الحاد . اعناقها مستطيلة . اجنتها بمخافة الشكل ، حشفة الريش . اذناها جداد كاسية . ارساغها متوسطة الحجم ، رباعية الاصابع ، كاملة الحظاظ || اشهر اجناسها الطروس والفلقات .

١٧١٤٨ - طَرُوبٌ (F): Agrodrome champêtre

١٧١٤٨ - طَرُوبٌ (F): Agrodrome champêtre (E).

طائر من فصيلة الذعريات يدعى جشة الحقل . اطلبه .

١٧١٤٩ - طَرُوبٌ (S): Pteroptochos

١٧١٤٩ - طَرُوبٌ (F): Pteroptochos (E).

جنس طير من فصيلة الطرطليات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية . تألفت المرج والنباتات وضفاف مجاري الماء . قوتها الحوام والحشرات والديدان والزرور البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٤ الى ١٦ سم . اجنتها قصيرة . اذناها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . اوتواها تراوح من الشقة الى السمرة والصفرة والشهبة . صدورها وبطنها من البياض الى العبرة الموشة بالاسود || تدن اعشاشها في الاجار



طروس



طروس



طروس



طرعوب عرّز

١٧١٦٦ - طَرْفُونِيَّات \* Trogonidae (S).  
Trogonidés (F). Trogonidae (E).  
فصيلة طير من المتسلقات. اجناسها وانواعها عديدة اعطائها البلاد الاستوائية. تتميز باستمالة اذنائها وبجمال ألوانها والوانها الزاهية. اشهر اجناسها الطرفون

## ١٧١٦٧ - طَرْف

الطرف او الطرفان منزل من منازل القمر الشامية. وما نجان من برج الاسد يتقسمان الجهة. سيما بذلك لاعتبارها كمنى الاسد || رقيب الطرف يدعى سعد بلع.



طرفة

١٧١٦٨ - طَرْف Racé, Pur sang (F).  
Thoroughbred (E).  
نعت تحريفي يطلق على كل حيوان صريع النسب الاصيل اي كريم الطرفين طرف الاب وطرف الام.

١٧١٦٩ - طَرْف Partie (F). Part (E).  
هو من اشترك في عقد قانوني مع غيره.

١٧١٧٠ - طَرْفُ المَعَادَلَة Membres de l'équation (F). Members (sides) of equation (E).

١٧١٧١ - طَرْفَاء هي الأثل، اطليه.

١٧١٧٢ - طَرْفَاء المَن هي اثل المَن، اطليه.

١٧١٧٣ - طَرْفَالِيَّات وتدعى الائليات. فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القلمات. راسع الليات.



طرفة

١٧١٧٤ - طَرْفَة الطريقة نجم نير من كوكبة برج السرطان مركزه على قائمة السرطان المؤخرة.

١٧١٧٥ - طَرْقِ Couvrir (F).  
طرق القفل الاثني. تما عليها (السحاح).

١٧١٧٦ - طَرْقِ Ecrouir (F). To hard-hammer (E).  
طرق المدن. مدده.

١٧١٧٧ - طَرْقَة Rangée de dattiers (F).  
Range of date-trees (E).  
صف النخل مهابا طال وايضا زرع.

١٧١٧٨ - طَرْفُون \* Trygon (S).  
Pastenague (F). Whip-tailed sting ray (E).

جنس اسماك مذنب بحرية من فصيلة الطرفونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ويكثر وجودها قرب الاغوار حيث تلتصق بالبرال والاسماك بانتظار ما تفتقره || اجسامها مبطة شبه مستديرة الشكل تطلو من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما في الذناب المستطيلة كالسياط تحمها ناعس حادة شديدة الصلابة جروها مؤذية سامة وقد نكتبت ميتة. اذنابها تطلو من ٨٥ الى ١٠٠ سم. ألوانها تختلف مع الانواع. اعرف انواعه المذبل والبنيجي



طرفون

١٧١٧٩ - طَرْفُون بَنَسْجِي \* Trygon violacea (S). Pastenague violette (F).  
نوع من الطرفون. يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط. طوله بما فيه الذنب نحو ١٩٠ سم. ثوبه الملوي الى

بشرج عريض. ارساغها خماسية العقل || لها جليل واحد في الحبل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتميش حتى اواسط آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل داخل انفاق مستطيلة تحفرها في التربة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطلو من ١٠ الى ١٢ م. ثوبها الى السرة الكستنية. حلقاها الصدرية مستطيلة الجرم. رأسها معتدل القد اسود اللون. فكها قشيشان. رواجها وشرسها الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اشابيع يتقضي في التربة ضمن جراب من الطين ولمواد العضوية.

١٧١٦١ - طَرْطَب \* Cephalopterus (S).  
Céphaloptère (F). Cephalopterus (E).

جنس طير من الجالوم سنيات المناقير وفصيلة القطنجيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق امريكا الاستوائية. تألف الغابات. قوتها الثار البرية. ملجئها الحايي جماعي. افواجا قليلة العدد من ٤ الى ١٠ ازواج || اجسامها متوسطة القد شبيهة بالزروباب. رؤوسها منجزة كبيرة الطور. اعناقها مقفلة باغباب مستمرة الریش. مناقيدها ضليعة بحمرة || اشهر انواعه الطرب المزين Ceph. ornatus (S). الذي يكثر وجوده على ضفاف نهر الامازون. قوته الى السواد الاسفع الازرق المواج.

١٧١٦٢ - طَرْطَبَة \* Columbella (S).  
Colombelle (F). Columbella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطرغلديات. انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ معظما يعيش على شواطئ بحار المناطق الاستوائية || اصداؤها متساكسة شبه بيضية، غفيرة مجازنة، قصيرة الارب، مبقعة ومجعدة بالالوان الزاهية. رؤوسها صغيرة مبطة، ثنائية القواس المعوية المخروطية الشكل. افواجا ملحقة بالرؤوس، مستطيلة الاضمام الانبوبية. ارجلها مستطيلة. ضيقة مجعزة باسقاط قرنية للمادة.

١٧١٦٣ - طَرْطَبُونْدُس \* ، طَرْطَبُونْدُس \* Trochilus (S). Colibri, Oiseau-mouche (F). Humming-bird (E).

طرفةون وسفريس عن الجاحظ. صفور صغير القد طوله نحو ١٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الزاهية الجميلة فيه الرمادي والاخر والاصفر والاسمر وفي جناحيه وريشة ذهبية. ذنبه متوازي التقط البيض النقيفة. منقاره رقيق مستطيل. قوته الذباب والحلوم ودرقيق الازهار || يدس عشه في الاشجار الغناء فوق مجاري الماء || اثناء تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنتها لا تتعلم اربع بيضات.

١٧١٦٤ - طَرْطَبِيَّات \* Columbellidae (S).  
Columbellidés (F). Columbellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مثلطيات الحاييس. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداؤها صغيرة القد متباينة الاشكال منها البيضية والمخروطية والوشية، جميعها متساكسة الصفعة المزخرفة بالالوان الزاهية || اشهر اجناسها الطرغلة.

١٧١٦٥ - طَرْطَبُون \* Trogon  
جنس طير من الطرغونيات للمتسلقات. انواعه عديدة جميعها من الحشرات الثامرات تألف غابات واحراج البلاد الحارة الاستوائية.

السديان . ساقه رفيعة ، منتصبة ، معتدلة الجرم ، غيراه اللون . نكته فارسة ، مستديرة ، قطرها نحو ١٠ سم .  
لونها الى الصهية السمراد الصفاد الموج . اطرافها الى الصهية الوردية الموج || لحميته جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

١٧١٨٩ - طَرَفُونِس Mouton engraisé (F).  
Fatten sheep (E). هو الخروف السمين .

١٧١٩٠ - طَرَفُونِس المَرُوج Longitarsus pratensis (S).  
Longitarse des prés (F). Longitarsus pratensis (E).

حشرة من فصيلة التنصاريات . موطنها بمض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . تألف المروج والمارعي وضفاف مجاري الماء . غناصها تعيش على اوراق النباتات التابعة لفصليتي الفريويويات والحمصيات ولا تمتع عن السروق والحوخ . يرقاتها تعيش في التربة على جذور النبات المائل || جسمها صغير القدد ، شبه بيضي الشكل ، يطول من ٢ الى ٣ سم . فورها الى الجذوة يطولها موج اشجع . رأسها مستعرض الجرم ، اسفني الخيط . زباناها خيطيان مقوسان || لها جيلان في الحول . تخرج الحشرة الجبلانة من مكمنها في اواخر نيسان . تصاف بعد ظهورها ياسوسيين وتياشر متع المنك بعد الكوم يوسيين ، تنتمن في التربة وترز المنك قرب اسناخ ويحور النباتات المائل || اليرقة منذ تغفها تنجده نحو جذور النبات فتنتقب الادمة وتلج الى الداخل ، قوتها المصاراة والحلايا النباتية . وتبقى حتى اكمال طورها اليرقي اي نحو ٣٠ يوما ثم تنسحب الى التربة وتبدل في طور الاكمال . واليرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٥ سم . جسمها حنطي اللون ، اسطواني الشكل ، رأسها اسود || اما خنافس الجيل الثاني فيناتها الشوي يستمر حتى يمين زمن النشاط ويكون ذلك في اواخر نيسان .

١٧١٩١ - طَرَفُون Vespertilion (F).  
هو الخفاش ، اطليه .

١٧١٩٢ - طَرَفُونِس \* ، طَرَفُونِس \* Torymus (S). Toryme (F). Torymus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطريديات . انواعها المعروفة نحو ٣٥ اصنافها الاقاليم الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها ناقمة تتطفل على الحشرات الفسارة اغصها الاآرات || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها مخروطية الشكل ، كواهلها معتدلة . بطولها بيضية . مرزاتها دقيقة ، مستعيلة . اولها مختلفة الالوان ، لامة .

١٧١٩٣ - طَرَفُونِس يات Torymidae (S).  
Torymidés (F). Torymidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المضمورة . انواعها عديدة . اصنافها الاقاليم الحارة والمعتدلة الحارة . جميعها ناقمة تتطفل على الحشرات الفسارة || حشراتها صغيرة القدد ومتوسطة تطول من ٢ الى ٧ سم . اجسامها نحيلة ملونة . رؤوسها مستعرضة . زباناها صرطانية . قواهلها طويلة . مرزاتها لاقسية الجرم منها القصيرة ومنها الحارقة الطول || اشهر انواعها الطريد والديمور والجمبودية .

١٧١٩٤ - طَرَفَالِيَّة Tornelle (F).  
هي الشرس نبات من القلقاسيات ، اطليه .

البفسجي المايق تملوه ماجات تراوح من الازرق الى الاسود . ثوبه السفلي الى الخيطي الاسمر . منخه الذليل كبير القدد طوله نحو ١٨ سم . || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٨٠ - طَرَفُونِس مَبْدُول \*

Tryphon pastinaca (S). Pastenague commune (F).  
نوع من الطرقون يكثر وجوده في المحيط الاطلسي . طوله بما فيه الذنب نحو ٢٠٠ سم . ثوبه العلوي الى الشقة السمراد القاتمة . ثوبه السفلي الى الخيطي الاسمر . منخه الذليل كبير القدد ، حاد الطرف ، طوله نحو ٢٠ سم . || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٨١ - طَرَفُونِسَات \* Trygonidae (S).  
Trygonidés (F). Trygonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفقيات الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مفترسة وليدة . مرتها الارواح واغراض الشوط || اعرف اجناسها واشهرها الطرقون .

١٧١٨٢ - طَرَم ، طَرَم Rayon de miel (F).  
Honey comb (E). الطرم والطرهم هو الشهد من السمل .

١٧١٨٣ - طَرَم ، طَرَم Rayon (F). Ray (E).  
هو شعاع الجذور والجذوع .

١٧١٨٤ - طَرَم مَكَكِي Rayon médullaire (F).  
Medullary ray (E).

صفائح برنشمية شعاعية الشكل تنطلق من محور الساق او الجذر الى المكالك والخشب والكثير .

١٧١٨٥ - طَرَمَاز Ommatostrephus (S).  
نمت تعريفي يطلق على القرس الكريم الرائع .

١٧١٨٦ - طَرَمِع \* Ommatostrephus (F).  
الواحدة طرمعة . جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات

وفصيلة الطرمجيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها كبيرة القدد وشمية الشكل تنتهي بزمانف رحية . رؤوسها مستعيلة . عيونها كبيرة ، جاسحة . رقيقة النقرة . ثمانية من جرامزا بحجة متساوية اللون ولثانان مستعيلتان تنتهيان برسى سنانية الشكل || تتميز بشدة البأس والنشاط وبالغفر فوق سطح الماء حتى ان بعضها يقع على سطوح الطروا (Omm. Coindetti) . اشهر انواعها طرمعة كولنديتي (Omm. Coindetti) التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط .

١٧١٨٧ - طَرَمِعِيَّات \* Ommatostrephidae (S).  
Ommatostrephidés (F). Omnatostrephidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الارجل ، مزدوجات الحياشيم ، عشاريات الجرامز . اجناسها المعروفة قليلة العدد اما انواعها فكثيرة جميعها يمية لا تقترب الطروا . ملجنها الحياتي جماعي ، اسراها تمد بعض المئات || اعرف اجناسها واشهرها الطرمع .

١٧١٨٨ - طَرَمُون \* Pluteus cervinus (S).  
Plutée couleur de cerf (F).

فطر مأكول من فصيلة الفاريفقيات . يكثر وجوده في النباتات الجبلية . يعيش على اريومات الانحجار المروا اغصها



طرقون مبدول



طرمع



طرمون



طرموش المروج



طرميد



Trigla milvus (S).  
Trigle milan (F).

نوع من الطريرج يطول من ٥٥ إلى ٦٥ سم. ثوبه إلى الشببة القفصية يملأ موج وردي يتخلله شيء من الأصفر والأخضر.



طريرشول الصباغين

Trigla gurnardus (S). Trigle gurnard, Grondin gris (F). Gournard, Gurnard (E).

نوع من الطريرج يربط في جميع البحار أما يكثر في المتوسط وعلى الشواطئ الاطلسية الاوروبية والافريقية || يطول نحو ٦٠ سم. ثوبه إلى الوردية القفصية يعقب مع اقترابه من ثوب الظفر ويبيض عند البطن.

Trigla aspera (S).

Trigle rude, Cavalion (F).

نوع من الطريرج الصغير القند يطول نحو ١٢ سم. ثوبه إلى الصفرة المرجانية الزاهية يزيد احمراراً مع اقترابه من الظفر ويحمر نحو البياض الاغبر عند البطن. يوجد في جميع البحار.

Trigla corax (S).

Trigle perlon, Perlon, Perlan (F).

نوع من الطريرج يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبه إلى الوردية القفصية السمر الملمجة. يعقب عند الظفر ويبيض عند البطن. يكثر وجوده في المحيط الهادي.

Trigla cucullis (S).

Trigle morrude, Grondin barbin, Orgue (F).

نوع من الطريرج يكثر في المتوسط يطول من ٢٠ إلى ٢٧ سم. ظهره إلى الحمرة المرجانية. جانباه وبطنه إلى البياض الاصفر المواج.



طريث

Trigla lineata (S).

Trigle Imbrigo, Surmulet sans barbe, Camard (F).

نوع من الطريرج مبذل في جميع البحار يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم. ثوبه إلى الحمرة الجوية اللامعة تعلوها نمشة سوداء.

Triglidae (S).

Triglides (F). Triglidae (E).

نميلة اسماك بحرية من رتبة النملطيات الشاككات الزعانف. اجناسها وانواعها عديدة اعرفها واشهرها الطريرج والجلاج.

Rameau de moins d'un an (F).

الطريد هو العرجون قبل ان يبلغ الحول.

Trigla (S). Trigle, Grondin (F). Gurnard (E).

Courtil mâle (F).

Curlew male (E).

هو الكروان الذكر.

Voie (F). Way (E).

طريق ج طرق. كلمة شاملة تستعمل في عدة معني اشياء:

Voies de recours (F).

Voirie (F).

Voie de droit (F).

Voies et moyens (F).

Voie d'exécution (F).

Voie classée

طريق تنظيمية



طريخ

Tornelle délicate لَيْدَة طُرَيْقَة

هي السمك اللذيذ للأكل الآبار، اطليه.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

جنس فطور مجهرية يعرف بالصنفة، اطليا.

Tranzschella

الجذور المتخارطة تنقص عليها وتتمركز بين الجرادة والاليات الخشبية حيث تتابع نشاطها الجوي وعملها التخريبي الذي يؤدي النبات لانه يعطب الاوعية ويمنع التبادل النسفي || يكافح بالتغلب النباتات الموصولة ويتظهر التربة بالكلس الحراق او بسلفور الكربون.

Tazard (F).

١٧٢٢٦ - طَزَر

سكة بحرية تدعى اسقري طزار ، اطلها .

Véranda (F).

١٧٢٢٧ - طَزَر ، فَرَنْدَا

Veranda (E).

١٧٢٢٨ - طَسَق ، طَسَك ، تَكْس

Taxe, Contribution (F). Tax, Impost (E).

الطسق : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على الارض . وكسب عمر الى صان ارفع الجزية عن رؤوسها ونحو الطسق من ارضها . وقيل شبه الخراج له مقدار معلوم (اللسان) .

١٧٢٢٩ - طَسَل

هو الماء الجاري على وجه الارض وهو التراب الدقيق الناعم وهو غصو السراب .

Géotropisme (F).

١٧٢٣٠ - طَسَم

Geotropism (E).

اثر الجاذبية الارضية في اتجاه النمو النباتي . وهو يدعى ايجابياً اذا كان متجهاً نحو مركز الجاذبية الارضية وسلباً اذا اتجه انجهاً ماعكساً .

Desman (F).

١٧٢٣١ - طَسَمَان

جنس حيوانات حاشية من فصيلة البوليبيدات . يألف صغاف الازهار والسميرات ، قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . له نوعان طسمان المسك وطسمان الجبل .

١٧٢٣٢ - طَسَمَانُ الْمَسْكِ \*

Myogale moschata (S). Desman musqué (F).

Musk-rat (E).

نوع من الطسمان موطنه فسج الارباء يمتد من بحر ارال الى بحر قزوين وإلى ضفاف بحر الدنبر . وهو يشبه الزبابة لكنه يحجم السنجاب الكثير . اسمر اللون . فاسر الفراء . مستطيل الخطم والذنب . يحمل عند قاعدة ذنبه غدد مسكية المادة القوية المرف || قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . يعيش في نفق يحلده على مستوى الماء .

١٧٢٣٣ - طَسَنَاج \*

Spheniscus (S).

Spheniscus (F). Spheniscus (E).

جنس طير من عدييات الريش ، كفيات القدم ، وفصيلة الطسنجيات . انواعه المرفوقة قليلة العدد موطنها القطب الجنوبي ارجاسها قطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . مناقدها جاسلة ، مبطلة ، مخددة الافاك العليا الشارفة المدبودة الحوافي . اجنتها مجدافية الشكل ، حشرفية الريش . اذناها جدام كاسية || تدثن في افاحيص مستتلة المسق . اناثها تبيض وتحضن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع || قوتها الاسماك والقشريات .

١٧٢٣٤ - طُسْتَاغِيَّات \*

Spheniscidae (S).

Spheniscidae (F). Spheniscidae (E).

فصيلة طيور بحرية من عدييات الريش ، كفيات القدم .

Voie privée (F).

طريق خاص

Voie publique (F).

طريق عام

Voie de fait (F).

طريقة العنف

١٧٢١٧ - طريق البحر ، طريق السحب

Chemin de halage (F). Towing-path (E).

هي الطريق الممتدة حذاء النهر او القناة الصالحة للاملاحة والتي يجوز استعمالها لجر المراكب او سمحها .

Chemin rural (F).

١٧٢١٨ - طريق ريفية

Rural road (E).

كل طريق في الريف تربط الدساكر والقرى ببعضها بعض .

Chemin agricole (F).

١٧٢١٩ - طريق زراعية

Agricultural road (E).

كل طريق يمر بين الاراضي الزراعية او تربطها ببعضها بعض .

Méthode (F).

١٧٢٢٠ - طريقة ، منهج

Method (E).

هي الاسلوب المفروض اتباعه في شئ معين . كقولك طريقة الاستيثار والاستغلال او العمل .

١٧٢٢١ - طريقة الحدف

Méthode de réduction (F). Method by reduction (E).

١٧٢٢٢ - طريقة سيئية

Méthode sexagésimale (F). Sexagesimal method (E).

Système décimal (F).

١٧٢٢٣ - طريقة عشرية

Decimal system (E).

Système métrique (F).

١٧٢٢٤ - طريقة متروية

Metric system (E).

هي طريقة القياسات المترية .

١٧٢٢٥ - طَرِيْم \*

Armillaria mellea, Armillariella mellea, Agaricus melleus, Rhizomorpha intestina, R. subcorticalis, R. fragilis (S). Armillaire de miel, Pourridié-agaric (F). Root-rot honey agaric (E). Hallimasch (D).

فطر من الفاريفوريات موطنه فسج الارباء ، مركب الجذور فيؤذيها . يصيب من الاتجار الحرجية السديان وزان والقرم والبيلا والحوو والاكسبا والسنوبر والتوب والارليس . ويصيب من الاتجار المشرقة الكركية والحوو والمشمش والدراق والكركز والتفاح والاجاص والجوز والحشويات على اختلافها ثم اللوز والتوت والين والشاي والكاكاو والكينا والمطاط . ويصيب ايضاً بعض النباتات الزراعية والبريئة كالبيطا والفلقاس والجزر والاسماليا والبرنج والخزام || فطره الحاربي في دوره الفطري الصحيح : فطر طويل الساق النجيلة الاسطوانية ، اوسمه قلسوية الشكل ، حقيقة الحافة المنكسبة الى الداخل ، قشرها نحو ٥ سم . لونها اصفر صلب يعلوه مراح زبي . لباه جابل المقطع ، ابيض اللون مر المراق . وهو من الفطور الماكولة . مردود تذهب مع الخلل || يظهر في الخريف ويؤدم حتى اوائل الشتاء . مركب المواد الفسوية والخشبية المنحلة على الجذور والاشخاب المطروسة ارضاً || وهو في دوره المشيجي يبتني برة مفطلة حدية الاطراف قشرها نحو ١٢ سم . لونها الى السمرة ، تنفلق عن خيوط كثيفة مستطيلة تسرح في التربة السطحية الى ان تلتقي



طريق



طسمان المسك



طساج

## ١٧٢٤٣ - طَعْمَةُ Agraine, Agrénage (F).

نثر الحب في مواضع معينة لتجسس عليه الطير فصاد.

## ١٧٢٤٤ - طَعْنٌ، رُجُوعٌ، إِنْشِجَاعٌ (F). Recours

في الانتباه الى السلطة للحصول على الفاء حكم أو تمديله

أو تفسيره أو إعادة بحثه.

## ١٧٢٤٥ - طَعْنُ الشُّهْدِ Reproche de témoins (F).

وسيلة يتدرج بها أحد المتخاصمين ليثبت شهادة شخص

معين.

## ١٧٢٤٦ - طَعَامٌ اِذْطَالُ الطَّيْرِ وَالسَّبَّاحِ.

## ١٧٢٤٧ - طَطَّرَ

الطَّيْرَ طَائِرٌ ج طَرَانُ (اللسان).

## ١٧٢٤٨ - طَغْمُوسٌ Gorilla (F).

هو الغورل، أظلمها.

## ١٧٢٤٩ - طَغْمُوسَةٌ مُحْتَشِمَةٌ \*، سَمْبَلُورَةٌ

مُحْتَشِمَةٌ Cymbalophora

pubdica (S). Cymbalophora pudique (F). Cymbalophora pudica (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط.

فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار. مرتبها غاشلة قوتها

عصف النجيليات || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م.

بسطها نحو ٤٤ م. رأسها غلروي الشكل، عيناها

كيران ياقوتيتان. زباناها مشطيان. مرثها مستطيل.

جوشنها حطلي اللون. بطنها الى الخلفي الاحمر المالح ||

روشناها الاسمانيا الى البياض التي يملو بضيغ وتجميع

كسني. روشنها الخلفيان الى البياض الوريدي المالح

يملو تقيج كسني || لها جبل واحد في الحول. تظهر

الفراشة في حزيران ويثي حتى آب. تسرح في الليل.

تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتتمتع الممكن على

الصفحات السفلى من نعال الارواق || السرعة تطول نحو

٣٠ م. جسمها انوبيي الشكل، ارنه اللون، اسر المالح

تملو مجموعات متفرقة من الملب الاسود الانتشاب،

الخلفي الاطراف. رأسها اسود. مدها ورواجها الى

البرادي || طسود الاكمال يسمر نحو اربعة اسابيع

ويتقضي ضمن صلبة تحبها السرعة في شقوق العاء أو

تحت القشور.

## ١٧٢٥٠ - طَفٌّ، طِفْافٌ، طَفَّاحَةٌ

Excédent de mesure (F).

## ١٧٢٥١ - طَفٌّ

الطَفٌّ هو سفح الجبل وساحل البحر ج لغوف.

## ١٧٢٥٢ - طَفَّافٌ Emerger (F). To emerge (E).

برز على سطح الماء.

## ١٧٢٥٣ - طَفَّارٌ \*، طَبَّيُّ الْوَعْرِ

Oreotragus saltator (S). Oreotragus sauteur (F).

Kilppbok, Kilppspringer (E).

حيوان لبون يجر من الظباء وحيد الجنس والنوع. موطنه

يمتد من الحيفة الى كنيه واوغندا وروديزيه. يألف

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطائها التقبل  
الجنوبي || ملجتها الحياتي جماعي تميش معظم حياتها في  
الماء ولا تألف الجزر الا في زمن التساقط والترسيم ||  
قوتها الاسماك والقشريات || اشهر اجناسها السلطانج.

## ١٧٢٥٠ - طَسِيفَةُ النَّثَانِ \*، نَارِيَّةٌ شَهْبَاءُ

Cryptoblabes gnidiella (S).

Pyrale grise, Cryptoblabes polyphage (F).

Cryptoblabes gnidiella (E).

حشرة صغيرة من فصيلة التاريدات حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض المناطق الشرقية من حوض البحر الابيض

المتوسط. تألف يساتين البيون وجنائن الدراق والموالت التي

يكثر فيها النثان، فراشتها عجيقة تميش على غزونها

الاسمالي. مرتبها ناهمة تميش على بشرة ثمار البرتقال وصل

بطول نحو ٤ م. بسطتها تراوح من ١١ الى ١٣ م. رأسها

معطل الجرم، قصير الخطم. عيناها كيرتان، ناشزتان.

زبانها غطيان. ملمسها دقيقان. مرثها جعدة.

جوشنها وبطنها الى الشبهة || رواشتها الى الشبهة يملوها

مواج تبني وسار اسر || لها جيلان في الحول. تظهر

فراشة الجيل الاول في ايار وفراشة الجيل الثاني في آب.

تسرح في الليل وتبيت في النهار || السرعة، عند بلوغها

الادراك التام، تطول نحو ١٠ م. جسمها شبه اسطواني

الشكل، مستطيق القند والمخسر. ثوبا الى السرة الجلوية

المراح يملوها غطان جانبيان، قاطبان، شديدة السرعة.

رأسها اسود. مدها ورواجها الى الخلفي الاسمر || طرد

الاكمال في الجيل الاول يسمر نحو ١٥ يوما ويسمر

في الجيل الثاني نحو ٢٨ اسبوعا ويتقضي ضمن صلبة

تسبحها السرعة بين شقوق الماء أو تحت القشور.

## ١٧٢٣٦ - طَعَامُ الْأَرْتَبِ Phagnale (F).

هو الملى، اطبله.

## ١٧٢٣٧ - طَعْلُورٌ Tolypoosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهوويات. يثره

البويرة لاقباسة الشكل والحجم. طياله حشوة لامتجانسة

تغلغل عند بلوغها عن غيرات هابية لونها الى السرة

القائمة.

## ١٧٢٣٨ - طَعْمٌ Goût (F). Taste (E).

هو ما يؤيده اللزق من تصنيف لكل ما يدخل الفم.

## ١٧٢٣٩ - طَعْمٌ Appât (F). Baie (E).

كل ما يوضع من طام لاجتذاب الصيد من طير أو سمك

أو دحوش.

## ١٧٢٤٠ - طَعْمٌ، مَطْعُومٌ، غَرِزٌ، قَلَمٌ، مَرْلُوفٌ

Greffon (F). Graft (E).

هو جزء النبات المطلوب تكثيره والمد للانضمام بالمعلم.

## ١٧٢٤١ - طَعْمُ الْمُرْدَرَعِ، نَطْلٌ Goût de terroir (F). Native tang (of wine), Raciness

(of style) (E).

علم خاص، يعود الى التربة والموقع، يكون في بعض

الحاميل كالتبغ والنب وما اشبه.

## ١٧٢٤٢ - طَعْمَةٌ Production (F). Product (E).

هي ما نتج من محصول.



طبيّة للنّاثان



ظفوسة محشمة



طَفَّار

Hydrargyrisme (F).  
Hydrargirism (E).

١٧٢٦٢ - طَفَّح زَيْبِي

تسم بالزئبق .

١٧٢٦٣ - طَفَّح وَرْدِي

هو الحامى مرض جلدي ، اظليه .

Plectrophanes nivalls (S).  
Plectrophane des neiges (F).

١٧٢٦٤ - طَفَّر التَّلَج

طائر من الجوارم غروليات المناقر وفصيلة الثورويات .  
موطنه يمتد من بلاد القطب الشمالي الى حوض البحر الابيض المتوسط ذلك لانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشتى . ملجئه الحياتي جماعي . افواجه تدم بضعة الاف . قوته البزور والحشرات || جسمه صغير القد يطول من ١٧ الى ١٩ سم . ثوبه الشتوي يكثر فيه البياض وتقل فيه الشقعة والسمرة . ثوبه الصيفي يبقى على البياض الصناعي الموج في الزور والصدر والبطن والافتيك . اما الرأس والحشران والرداء والسفطان والذنب فالى الشقعة المتباينة الماجات والمطوقة بالابيض . سقفا ذلقان . ذنبه فارق الطرف || يدخن عنه بين الجبارة وفي تخاليف الصخور . الاثنى تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوما .

Mutation

١٧٢٦٥ - طَفَّرَة

تبدل فتياتي يحصل في وثل وسدة وراثية . راجع اختباه وشرود .

١٧٢٦٦ - طَقَل

زمن احرار الشمس قبيل الغروب .

Argile (F).

١٧٢٦٧ - طَقَل

هو الصلصال ، اظليه .

Tendre, soyeux (F).  
Tender, Silky (E).

١٧٢٦٨ - طَقَل

الطفل : الرغص الناعم من كل شيء . ج . طفل ومقول .

Cotylédon (F). Cotyledon (E).

١٧٢٦٩ - طَقْلِي

هو الاشران نبات عشبي ، اظليه .

Emersion

١٧٢٧٠ - طَقُو ، طَفُوء

Herbe tendre (F).  
Tender herb (E).

١٧٢٧١ - طَقُوءَة

الطقوء : التبت الرقيق .

Paralique (F). Paralic (E).

١٧٢٧٢ - طَقْفِي

نمت تمريني يطلق على كل ما له صلة بالطف اي باسائل البحر .

Echis (S). Echis

١٧٢٧٣ - طَقْفِيَة

جنس حيات خبيثة من فصيلة الافاعي الانوبيات الاعايد . انواعها عديدة جميعها من اقاعي البلاد الحارة . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبها الى الصبغة السمره تعلو رقشة بياض وتغطان اسودان اود ابيضان متعرجان . وبعضها سحلي الثوب الابلق ، مطوق العنق || اشهر انواعها الطغية الحرة وام الطغيتين ومقد الجوز والأردب .

التجاد الرقيقة التي تملو من ٢٤٠٠ الى ٢٧٠٠ م . عن سطح البحر . ملجئه الحياتي جماعي . إجله يتألف من ثلاث الى اربع اناث ومن ثلاثة الى اربعة شواهد يقودها ذكر مانع . قوته اوراق السط والاعشاب المختلفة . يسرح في طلب القوت من الفجر الى الساعة التاسعة ومن العصر الى العشاء ولا يتراد الماء الا ابد العشاء . سعيه طفر وعداء || جسمه قريب الشبه من الشموه ومن الرثم . طوله نحو ٨٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه نحو ٥٦ سم . وطول قرن الذكر نحو ١٠ سم . اما الانثى فجماد واسه مستعرض الجبهة صغير الخطم . اذناه منتصبان . عيناه كبيرتان كسكتين . قرنا غروليان جبالان . مجاريه الدمية جليلة الوضاض . جرابه شديدة التشنج . ثوبه يتغير مع فصول السنة الا ان اللون السائد هو الصبغة الموحشة بالاسود . يطن دائما تبني اللون اصهر الموج || الاثنى تتحلى بثوب الذكر وهي ثنائية الخلف . تنص شادنا واحدا ترضعه نحو ثلاثة اشهر .

Zamenis (S). Zamenis

١٧٢٥٤ - طَفَّارَة

جنس حيات من الثعالبات . انواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدة . جميعها طوال دقاق تطفر بين المسنور ووق الرمال وفي الماء . اطولها تراوح من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . قوتها الاسماك والضفادع والوزغ والبطاء . الخ .

Podocnemis (S).

١٧٢٥٥ - طَفَّاشَة \*

Podocnéme (F). Podocnéme (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الحفاصيات . انواعها المعروفة عشرة . اعطائها بعض مناطق امريكا الجنوبية وجزيرة مدغشقر . تألف الانهر والبحيرات والندران والنتاق || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والصوى والكبيرة . الصغيرة تطول نحو ٣٠ سم . اما الكبيرة فتطول من ٧٥ الى ٩٠ سم . ثوبها الى الكهبة السمره . ذيلها شميكة . قليلة الاحديداد ، بيضية الشوذن . زعانفها منبسطة ملحقة بعتد الذبال . رؤوسها مكرمة . اعناقها منبسطة العلو والغلظة . اذناها قصيرة . قوائمها شديدة التشنج ، خاسية الخالب الامامية ، رباعية الخلفية .

Parélie, Parhélie (F).

١٧٢٥٦ - طَفَّالَة ٥

Parhellon, Mock sun (E).

الطفالَة صورة الشمس متمكة في سحابة .

Immaturité (F).

١٧٢٥٧ - طَفَّالَة ٥

Immaturity (E).

حالة الشيء غير الناضج . المذاق الحامز في معتم البار دليل الطفالَة .

Cerne (F). Ring (E).

١٧٢٥٨ - طَفَّالَة ٥

الدائرة الطالعة في مقطع جذع الشجرة .

Lave (F). Lava (E).

١٧٢٥٩ - طَفَّح

طفع ج . طفوح . هي حم المادن المصهورة اللببية التي ينفذ بها البركان عند ثورانه .

Débordement (F).

١٧٢٦٠ - طَفَّح

Overflowing (E).

سيلان الماء خارج مجراه .

١٧٢٦١ - طَفَّح النَّوَر

هو البثار ، اظليه .



طَفَّاشَة



طَفَّيَة



طَفِيَّة حَرَّة

١٧٢٨١ - طَفْسُوس Taxus (S). If (F). Yew (E).  
جنس اشجار حرجية من الطفسوسيات الصنوبريات . يقال  
أنها تمر نحو ٣٠٠٠ سنة . أنواعه وصنوبرية عديدة .  
أشجارها متفاوتة القدر تملر من ٥ إلى ١٥ م . أغصانها  
وفروعها منتصبه تقبل التشذيب والتقليم . أوراقها متعاقبة ،  
ثنائية الصف ، شديدة الخضار المائي ، لامة الصفحة  
العليا ، وهي جميلة للمادة تحت الناز والخيل وزيتي البكر  
والماز والفسان . ثمارها غنية الشكل ، حمية الحجم  
عامة المواد السامة . اشعاشها صناعية جيدة الصنف ،  
ناعمة الزقمة ، قوية الانداج والزروب ، لوها الى الجؤرة  
المستبة بالاسمر . شكرها ابيض اللون قليل البهارة .

١٧٢٨٢ - طَفْسُوس عَادِي \* زَرْب Taxus bacata (S). If commun (F). Common yew.  
Taxus tree (E). Echte Eibe, Ilenbaum, Eibenbaum (D).  
Tasso, Libo, Livo, Albero della morte (I).  
نوع من الطفسوس المبلول تجتره تملر من ١٢ الى ١٥ م .  
فروعها عديدة جميعها بطيئة النمو الا انها تخضع لثقل  
مطابق التشذيب الذي يعمل بها شئ الاشكال الممكن  
انسجاما مع الظروف والمكان .



مَقْ احمر النقاد

١٧٢٨٣ - طَفْسُوسِي \* هو التوكسيدوم ، اعطيه .  
١٧٢٨٤ - طَفْسُوسِيَّات Taxinées, Taxodinéas (F).  
سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل الطفسوس والوطوق  
والشش والسلياق .  
١٧٢٨٥ - طَفَطَق هو الاريل ، اعطيه .

١٧٢٨٦ - طَفَطِيَّة \* Chettusia (S).  
Chétusie, Chétusie (F).  
جنس طير من طوال الباق وفضلة الزرقائيات . انواعه  
نحو ١٥ جميعا من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق  
والصيف والشتي وقد تكثر الاقارب في البلاد الحارة .  
اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام . اذنانها قصيرة .  
ظهورها واجنتها الى السرة . بطونها الى البياض || تألف  
المنافع ويجاري الماء والبروج النناء . قوتها الحوام والحشرات  
والقشريات . تدفن في المنافع بين الاعشاب . الاثن تحضن  
وسمها نحو ٤ يفيات .



طفسوس عادي

١٧٢٨٧ - طَطَل Sève (F). Sap (E).  
هو التسع ومنهم من خصصه بالنسج الحاميط .  
١٧٢٨٨ - طَطَل Brume (F). Haze, Mist (E).  
قيل اخف المطر واسمعه وقيل التني وقيل فودن ودون المطر .  
ج طلال وظلل .

١٧٢٨٩ - طَلَا Faon (F). Fawn (E).  
الصغير العمر من ذوات الظلف ج . إطلا .



طَلَطِيَّة

١٧٢٩٠ - طَلَا Enduit, Vernis (F).  
كل مادة مائنة تستعمل طليا .  
١٧٢٩١ - طَلَاطِلَة ، غَلَصَة Luette, Uvule (F). Uvula (E).  
زائدة لحمية التركيب ، مخروطية الشكل ، متحركة ،  
ناضبة ، توجد تحت مدخل الحلقوم .

١٧٢٩٢ - طَلَاة Habitus  
رسم هيئة الشئ ، او النبات الخارجية الطبيعية .

١٧٢٩٤ - طَفِيَّة حَرَّة \* Echis echis,  
Echis vulgaris (S). Echis commun, Vipère des  
sables (F). Echis (E).

حبيّة سرلوة من الاناعي انبوييات الاغادي . جسمها  
معدل التضاعة يطول نحو ٨٥ سم . ثوبا الى الصبهة الحنطية  
تملوا وقشة يضاء خفيفة وضئان اسودان متعرجان . رأسها  
لوزي الشكل . عفاها مستطعة الجرم . عيناها خرزيتان ،  
ناشزتان . منقارها رافضان مرتفعان نحو الملاء . عدد  
اسنانها ٤٨ منها ٢٤ في كل فك . عفاهاها اماميتين  
متعرجتان || تسرح في الليل وفي النهار . تنس في الرمل  
والتراب بسرعة . قوتها كل ما دب وطار وتمكت منه ||  
بياتها الشثوي يستمر نحو حسة اشهر . تبلغ كامل نموها  
بمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة || الاثن تساند  
بمر اربع سنوات . جرابها الشواري يحوي من ١٢ الى  
٢٠ بيضة . يتفك البيض عند خروجه من الانطوية الى  
الجراب ثم يسلك الشوار حتى الفلج حيث يخرج للقاء  
النور جوارن كاملة البدة سارحة || لدغها عتة ان لم  
تعالج بسرعة وقد تكون قاضية اذا اصاب احد الترابين  
الدورية || تعتبر من التمايين السامة الحنطية الشديدة  
الاذي .

١٧٢٩٥ - طَفِيَّي ، مَطَفَال ، ضَيْفَن Parasite  
كل كائن يعيش على ما هو شي من النبات او الحيوان .

١٧٢٩٦ - طَفِيَّي بَاطِي ، اُنْتُفِيَّت Entophyte  
نمت تعريتي يطلق على الفطور المجهريه الفطالية التي تعيش  
داخل النبات المبتلى بها .

١٧٢٩٧ - طَفِيَّي ظَاهِرِي ، اِكْتَفِيَّت Ectophyte  
نمت تعريتي يطلق على كل طفيل ينمو على ظاهر الانشاء  
النباتية او الحيوانية .

١٧٢٩٨ - طَقِين \* Immature  
نمت تعريتي توصف به البار والبذور غير الناضجة .

١٧٢٩٩ - طَق \* Tockus (S). Tock (F). Tockus (E).  
جنس طير من فصيلة الاركوكيات . انواعه قليلة البد ،  
جميعها من الطيور الافريقية . اجسامها كبيرة القد .  
مناقبها غليظة وحمجة ، مسنة الطفاف ، تتميز بمنظورها  
من التتواء القرنية || يألف اليمس والغابات والاحراج .  
قوته النار والجربوب والبذور والحشرات والعظام والفئران ||  
اعرف انواعه الملق الاخر المتفاد .

١٧٢٨٠ - طَقْ اَحْمَر المُنْقَاد \* Tockus erythrorhynchus (S).  
Tock à bec rouge (F).  
نوع من اللق . اعطانه تمتد من الحيشة الى السننل .  
جسمه كبير القد يطول نحو ٨٥ سم . منقاد غليظ القاعدة  
مقوس الشكل ، مسن طفاف المظلل الاعلى ، احمر اللون .  
اسمر الملقط || يألف الفياض وضئان الانهر . طرابه  
يميد المدي متقطع الشوط كالتنار || قوته النار والبذور  
والحشرات والوزع والعظام والفئران || يدفن في تجاويف  
الجلود . تقع الاثن من ٤ الى ٥ يضا فتحضنها نحو  
١٥ يوما مجبور عليها بالطين والقش على غرار البقير  
والخنو .

1۷۳۰۷ - **طَلَح المَوَاشِي** \*  
Ixodes reduvius,  
Hyalomma aegypticum (S). Tiquet du bétail,  
Réduve (F).

نوع من الطلح الاسمر، المبسط، البيضي الشكل، الصغير  
القد. الذكر منه بطول نحو ٤ م. والانثى تطول نحو  
١٨ || يتطفل على جميع المواني اخصها الابقار والاعنام  
والجمال.

1۷۳۰٨ - **طَلَحِيَّات**  
Ixodidae (S). Ixodidae (E).

فصيلة حشرات من القتراديات قوتها الدم تنصه حيث  
تستطيع. اجناسها وانواعها عديدة، جميعها صغيرة القد.  
ذكرها اصفر حجماً من اناتها. تتميز باخطائها الناقية  
المماصة للمشارية التركيب التي تتشيث في اجسام الموائ  
التي تركها. لذلك يصعب زرع الطلح من عائلته حيث  
فصل جسمه حيث يبقى الرأس مع اجزاء الفم في جلد  
المائل.

1۷۳۰٩ - **طَلَح**  
الطلح: ما بني في الحوض والتدير من ماء كثرت فيه  
الدعاميس لا سبيل الى شربه.

1۷۳۱٠ - **طَلَحَام** هو القيل في ذروة بأمه ونشاطه.

1۷۳۱١ - **طَلَّة** Botrytis

جنس فطور مجهرية من الطليديات. وفضيلة الوطحيات.  
يتميز بمشجيه المورث الاسطواني الشكل، التليظ القطر،  
الخلوي او السطحي الانتساب. جرابه الكندي منتصب  
الجلوس، عديد الفروع العمودية الارزكاز. كئانه  
طرية، عقدية او ضمية التجميع، يبيغ الشكل،  
نحية الغلاف، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه كثيرة  
العدد اعرفها واشهرها ما يتبع.

1۷۳۱۲ - **طَلَّة البَصَل** \*

Botrytis squamosa (S).  
فطر مجهرية يركب اوراق البصل فيسبب يباس اطرافها  
بعد اختطاف لونها || يكافح باستعمال بيسلفيت  
الكليسيوم.

1۷۳۱۳ - **طَلَّة التوليب** \* Botrytis tulipae (S).

فطر مجهرية يركب اوراق التوليب فيؤذيها وقد يعيب  
الشرائح الزهرية فيقطعها || مظهره الخارجي بقع صغيرة  
شبه مستديرة رمادية اللون تركب البصل فيسبب جفاف  
نسجه المتحارة || وهو على الشرايح الزهرية لطع صغيرة  
عديدة تشبه الازهار بعد ان تسي الى عموها || يكافح  
عند ظهوره باستعمال بيسلفيت الكليسيوم وتطهير  
التربة بالكلورين.

1۷۳۱٤ - **طَلَّة الثوم** \* Botrytis alli (S).

فطر مجهرية يمتري الثوم والبصل في اثناء سفلها. مظهره  
الخارجي وشاح كئندي لبد التجميع، خلي الحية، اغبر  
اللون، يركب اقراص الثوم والبصل فيقطعها || يدارك  
باجتناب حفظ الثوم والبصل في الامكان الرطبة.

1۷۳۱٥ - **طَلَّة الدَّمِيكَة** Botrytis galanthina (S).

فطر مجهرية يركب الدميكة عند انناشها من التربة  
فيقطعها ويؤاح اغبر اللون نذني الشكل يسطر على الالواق  
فيقرسها بعد ان يؤتمها ببشوره السود الكثيفة.

1۷۲۹۳ - **طَلَام، قَتِير** Chênevis (F).  
هو التوم اي حب الشاهدانج.

1۷۲۹٤ - **طَلَايح** Prodromes  
هي الاعراض التي تستبق المرض وتشير اليه.

1۷۲۹٥ - **طَلَايح** هي البواكير، اطلبا.

1۷۲۹٦ - **طَلَب، عَرِيضَة، اِنْتِاس** Requête (F). Requête (E).

هو كل مطلب يقدمه صاحبه الى سلطة تملك حق النظر  
بقضيته واجراء اللازم.

1۷۲۹۷ - **طَلَب، دَعْوَى** Demande (F). Demande (E).

هو ما يطره البارز على المحكمة راجياً لقرار وجود حق  
له. ويأتي بمعنى الدعوى تسمياً.

1۷۲۹٨ - **طَلَب اِلْتِغَاء** Recours en annulation (F).  
Petition for annulment (E).

هو طلب الغاء عمل اداري.

1۷۲۹٩ - **طَلَب اِعَادَة النَظَر في القَضِيَّة**  
Pouvoir en révision (F). Petition for rehearing (E).  
هو طلب اعادة النظر في بعض القواعد القانونية كقنيت  
من مصتها او في بعض الاحكام لالغائها.

1۷۳۰٠ - **طَلَب قَبُول اِلْتِاس** Rescision (F). Rescision (E).  
دعوى غايتها نقض الحكم دون الالتفات الى موضوع  
الدعوى التي صدر عنها.

1۷۳۰١ - **طَلَب مَا فَوْق اَلْحَقِّ**  
Plus petito, Ultra petita (F).  
هو الحكم ينير مطالب الخصم كان يحكم القاضي بشيء لم  
يطلب منه أو بشيء يزيد عما طلبه منه.

1۷۳۰۲ - **طَلَب نَقْض اَلْحُكْم**  
Pouvoir en cassation (F). Appeal for reversal of  
judgment (E).  
هو الطلب بابطال حكم، صدر من محكمة الدرجة  
الانتهائية، لمن فيه.

1۷۳۰۳ - **طَلَّة** Arôme agréable (F).  
Agreeable aroma (E).  
الطلة: الذئبة من الروائح. يقال رائحة طلة وخر طلة.

1۷۳۰٤ - **طَلَح**  
هو السط الصمغي، ينجر من الغضا رعاها الابل. الواحدة  
طلحة.

1۷۳۰٥ - **طَلَح** Ixodes (S). Ixode (F).  
جنس قراد من فصيلة الطليديات قوته الدم الذي يمتصه  
من الحيوان || اشهر انواعه طلح المواني وطلح الكلاب.

1۷۳۰۶ - **طَلَح الكَلَاب** \* Ixodes ricinus, Tique des chiens, Pou des bois (F).  
نوع من الطلح المبسط الصغير القد. الذكر منه يطول  
نحو ٢ م. والانثى تطول نحو ٩ م || يتطفل على معظم  
الحيوانات الوحشية والداجنة اخصها الكلاب والخيبرات  
فيتمص منها ويؤذيها.



طلح الكلاب



طلح المواني



طلة البصل



طلة التوليب



طلة الثوم

سنة: البيوض، العسلية، المغاس، الغفصة، الفياتور يكم، النشبة.

### ١٧٣١٦ - طَلْسَة الزَّيْتُون \* ٥

*Botrytis elliptica* (S).

فطر مجهري يركب بعض أنواع الزيتون فيسبب يفساس اوراقها بعد ان يوشم نصلها ببقع حطية لاتقاسية الشكل والتجميع || يكافح باستعمال بيلفنت الكلسيوم .

*Botrytis fabae* (S).

\* ٥

فطر مجهري يركب اوراق الفول وقد يصيب الانصار والقرن || مظهره الخارجي نقط مبرشة مستديرة سمراء اللون تركب النصل على صفحتيه ثم تتسع فيبلغ قطرها من ١٠ الى ١٥ سم. بعد ان ينصرف لونها الى الرمادي الزاهي تمتلئه حالات متناوبة سمراء الموالج || وهو على القرن يقع متصل او متراكبة تغلف الفلقة السفلية فتعطلها وتبدلها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير الحديثة . وين المستحسن انتاج الدورة الزراعية الثلاثية التي تقضي عليه خلل التربة من المعائل .

*Botrytis infestans* (S).

\* ٥

فطر مجهري يركب سوق القنب عند شخها وعولما من الربة فيذوبا بمرسة || مظهره الخارجي لطنة سمراء عرضها نحو ١ سم. تلوق الساق فتعطلها وتسبب يفساس مع اوراقها وازهارها || لا يستوجب المكافحة لانه عدم النبات، قليل الانتشار.

*Botrytis trifolii* (S).

\* ٥

فطر مجهري يركب النفل في سوقه واوراقه || مظهره الخارجي يقع صغيرة مبرشة مستديرة سمراء اللون تملو السوق والاوراق فتسبب جفاف النبات .

### ١٧٣٢٠ - طَلْسَة الوَرْد \* ٥

*Botrytis paeoniae* (S).

فطر مجهري يصيب الودج وزئبق الوادي . مظهره الخارجي يقع لاتقاسية الشكل والحجم تركب الاوراق والسوق والزيمات . تبدو على النصل بقع صغيرة حمراء اللون ثم تتسع وتتحرف نحو السمررة يقابلها على الصفحة السفلى يقع مرادية خلية ليدة || يكافح باستعمال بيلفنت الكلسيوم المركز ١٪ .

*Botrytis cinerea* (S).

\* ٥

فطر مجهري عيم الانتشار يركب جميع المواد النباتية النخلة او السائلة الى الاغلال . كما يركب نباتات المصاري والمشاات الكثيفة || مظهره الخارجي نواس خلى عتكيوي الحمل اللون .

### ١٧٣٢٢ - طَلْسَمِيَّة \* ٥ هَذَبَاء زَرْقَاء

*Catananche coerulea* (S). *Catananche, Cupidone bleue* (F). *Blue cupidone, Blue succory* (E). *Rasselblume, Blaue Rasselblume* (D). *Cupidonia, Belvedere turchino, Madre d'amore* (I).

نبات عشبي بري معمر ينبت من فصيلة المركبات . كان يستعمل في كتابة طلاس الحب والبفس . ساقه دقيقة رفعاء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه خفيفة مستطيلة . منظرها قرصي الانتشار . طولها يراوح بين ٢٠ و ٣٠ سم. نصلها ثلاثي المروق ثنائي او رباعي التفصيص ، خلى الصفحة السفلى . ازهاره روبيسي ، فردى التجميع . ازهاره الى الزرقاء || تنوره يثمر من تموز الى ايلول .

*Botrytides* (S).

\* ٥

*Botrytides* (F). *Botrytides* (E).

عمارة تطور مجهرية من فصيلة الطليحات . اجنلها

*Collia* (S).

### ١٧٣٢٤ - طَلْطَانِي \* ٥

*Collia* (F). *Collia* (E).

طلطي هو الاسم الهندي . جنس اسماء جبرية ونهرية من مفتوحات الخاتة وفصيلة الصابونيات . انواعها المعروفة سبعة اعطائها اغوار اهر الخند || اجسامها مبردية الشكل ، مستطيلة التلطيض ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اشادها كبيرة ، رحية الانفراج . زمانها الظهيرة صغيرة ، الصدرية مستطيلة حسانية الشكل . الشرجية خفيفة ، مستطيلة ، تمتد حتى طرف الغليل . الوالها الى الزرقاء الخضراء المولج . بطونها الى الصغار الملعب || لحوبها مأكولة ، جيدة الصنف .

Pollen

### ١٧٣٢٥ - طَلْع ، وَكَيْع \* ٥

هو الصلح ، اطله .

*Spadice* (F). *Spadix* (E).

### ١٧٣٢٦ - طَلْعَة ، حَبَبَة \* ٥

شكل من اشكال الازهار مركب من محور يحمل ازهاراً لاطفة وسيدة الشق ، مثاله ازهار النخل .

*Pollinique* (F).

\* ٥

*Pollinic* (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالطلع كالجبوب والانايب الطلمية .

Talc

### ١٧٣٢٨ - طَلْق \* ٥

Mica

### ١٧٣٢٩ - طَلْق ، مِيكَآ

صوانة الالومين والبتراس والحديد والمغنيزية . وهو احد الاجسام التي يتألف منها الفرانيت اي الاصيل .

### ١٧٣٣٠ - طَلْق مُنْشَد ، مِيكَاشِيست

*Micaschiste* (F). *Mica-schist* (E).

هو ما حوى الطلق والحجر المنشد اي الشيت .

*Nuage peu épais* (F).

### ١٧٣٣١ - طَلْدَة \* ٥

الطله ما رق من السحاب .

*Botryosporium*

### ١٧٣٣٢ - طَلْسَوَسَة \* ٥

جنس تطور مجهرية من الماصريات وفصيلة الطليحات . انزله قليلة المد والاضى . مظهره رية تركب النباتات السقية الخزيلة من النجيليات الى الاججار الحرجية .

*Faon* (F). *Fawn* (E).

### ١٧٣٣٣ - طَلْي \* ٥

الطل : ولد الخليل ج اطلاء .

*Tache, Souillure* (F).

*Smeat, Dirt* (E).

### ١٧٣٣٤ - طَلْيَة \* ٥

*Aveugle de naissance*

\* ٥

هو الكه اي الاعى خلفه .

*Astatique* (F).

\* ٥

*Astatic* (E).

ما كان بحالة الازان المتضاد المستمر

*Nidifuge* (F).

### ١٧٣٣٧ - طَلْيِق \* ٥

نمت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تنقف نشطة كاسية تستطع الاستغناء عن ايوها .



طلسة الزيتون



طلسة الفول



طلسة الودج



طلسية



طلاي

Tomocerus (S). \* - طُمُور ١٧٣٤٨

Tomocère (F). Tomocerus (E).  
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة الطموريات.  
أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد  
المتحدة الحارة || أجسامها صغيرة محرشقة تقطو من ٤  
إلى ٥ سم. ألوانها إلى الخشن المتباين الماجات. حراشفها  
إلى السرة العاتقة الغضبية الموج. بطونها لامتناهية التدرجات  
مبشرة الحلب الذي يكثر في المؤخر || أشهر أنواعه  
الطمور الميزل (Tomocerus vulgaris) الذي يتم  
تحت الحجارة والاعشاب ولما الانجرار اليابسة.

Tomoceridae (S). \* - طُمُورِيَّات ١٧٣٤٩

Tomoceridés (F). Tomocericidae (E).  
فصيلة حشرات قافزة دامت من رتبة الكهكليات. أجناسها  
المتعددة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض أقطار البلاد  
والمتحدة الحارة || أجسامها صغيرة، محرشقة، تقطو من  
٢ إلى ٦ سم. ألوانها ملونة، يكثر فيها الحجاب السوي.  
رؤوسها مستضخمة. أفاكها وقائرها ناشرة. عيونها زنجية.  
قرونها الاستشارية رباعية الفصل، مستطيلة. بطونها  
سداسية السكم للامتساوية العرض. أجهزتها القفزية  
نشطة وبسلة بمناس حادة. مكانها مستطيلة مسننة  
وهيئة. قوائمها معتدلة الطول تنتهي باظافر حادة ||  
أشهر أجناسها الطمور.

Boue (F). \* - طِيم ١٧٣٥٠

Loup (F). \* - طِيمَال ١٧٣٥١  
هو الذئب، أطلبه.

Eau bourbeuse (F). \* - طِيمَكَة ١٧٣٥٢

Muddy water (E). ما يمي في الحوض من الماء الكثر.

Inerme (F). Thornless (E). \* - طِيمَلُول ١٧٣٥٣

الطلول هو العاري. وهو من النبات ما كان سراً مسلماً  
لا زغب عليه.

١٧٣٥٤ - طِيمَم علم وتعلم الطائر : وقع على غصن.

١٧٣٥٥ - طِيمَن التين من الأرض : السهل المنخفض.

Alluvion (F). Alluvium (E). \* - طِيمِي ١٧٣٥٦

هو ما يحمله النهر من تراب وطين يلتصق باملاك المتاخين  
على أن لا يبلغ قفلة من أرض يضيفها إلى ما بعدها في  
سبيله أو إلى ما يقابلها. ويعبر الطي ملكاً لمن لصق  
بأرضه.

Cryptophyte (F). \* - طِيمِير ١٧٣٥٧

Cryptophyte (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو تحت سطح التربة.  
الكلم من النباتات الطيرة.

Gymnocladus (S). \* - طِيمِيلَة ١٧٣٥٨

Gymnoclade, Chicot (F).

شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من العنديات وفصيلة  
القريات || ساقها منتصب، رفيعة، عاتمة الإتيان.  
أوراقها صغيرة النصال السنانية الشكل. أزهارها غبرية  
كبيرة القند، بيضاء اللون، غصنها الموج، خافتة العرف  
المطري. ثمارها حنابل متساكنة تغلف بعض البزور  
الآعية المادة.

١٧٣٣٨ - طِيلِيل

الخصير المنسوج من دود أو من سف.

Tellinus (S). \* - طِيلِيْس ١٧٣٣٩

Telline (F).

جنس عمار من الرخويات الصفحيات الخياشيم. أنواعه  
عديدة جميعها صولانية الاصفاذ تعيش غائرة في رمال  
الشاطئ.



طِيلِيْس

Tellinidae (S). \* - طِيلِيْسِيَّات ١٧٣٤٠

Tellinidés (F). Tellinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم.  
أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات  
الأراضي الطباشيرية والبعض الآخر معاصر. موطنها يشمل  
معظم بحار العالم باستثناء المناطق القطبية || أصدافها  
تتأرجح بين المستديرة والأهليلجية الرقيقة اللون، جميعها  
متصلة القند أو كبيرة. ألوانها جميلة الألوان الزاهية يكثر  
فيها الأحمر ومشتقاته || أعراف أجناسها وأشهرها الطيليس  
والذيلفان.

١٧٣٤١ - طِيمَ ما على وجه الماء من غشاء.

Tomate (F). \* - طِيمَاط ١٧٣٤٢

رأبج بطورة.

Rhus à feuilles d'épine (F). \* - طِيمَخ ١٧٣٤٣

الطبخ شجر يدعى به يحمي أديمه أحر اللون. ويدعى أيضاً  
المرب، أطلبه.



طِمْرُوق مِلُول

Ensilage \* - طِيمَر ١٧٣٤٤

هو اللغز في الطمورة كغز اللبلل والكلاء والمساقل  
لحفظها مدة من الزمن.

Enfouissement (F). \* - طِيمَر ١٧٣٤٥

Burying (E).

وضع الشيء في التربة وطمرو كالبدار والاصمدة.

Plecotus (S). Oreillard (F). \* - طِيمَرُوق ١٧٣٤٦

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات. أنواعه عديدة تتميز  
بشاذ كبير أذنانها المتدخعة فوق الجبهة. معظم أنواعه  
يعيش في البلاد الباردة وبعضها يألف المناطق المعتدلة.  
أعرفه الطمروق الميزل.

١٧٣٤٧ - طِيمَرُوق مِيزْل \* -

Plecotus auritus (S). Oreillard commun (F).

نوع من الطمروق موطنه فسح الأرباب يمتد من آسيا المتحدة  
إلى الشرق الأوسط وأروبة وأفريقية الشمالية || ثوبه إلى  
الريدة الخيشية السمار يقيق مع اقترابه من ثقب الظفر.  
طوله نحو ٨٥ سم. بسطه ٢٥٠ سم، ذنبه ٤٠ سم. وأذنه  
٣٥ سم || يألف في الشتاء جيع المواق القليلة الرطوبة  
وتغير الموضع إلى الرياح الباردة كالبيوت المنفردة والخربة  
والكهوف الجنوبية المعرض. ويألف في الصيف الانجرار  
الحرجية والنفقة والإبراج المنفردة والماور الشمالية المعرض.  
يعيش جماعات قليلة العدد. يحمي على الأرض ويسلق  
الحيطان كما تقفل القارة وبرصها. قوة الحوام والذباب  
والحشرات الصغيرة المختلفة. مسرعه يدوم من النسق  
حتى فحة الليل ومن الفجر الباكر حتى الشروق.



طِمْرُوق





ملانة التربة



ملانة الحقائق



ملانة الحراج



ملانة القاع



ملانة حفرة



ملنجية

Rejeton (F).

Shoot, Sprout, Offshoot (E).

الطوب ج أطباب : عروق تشعب من اروة الشجرة .

Tombereau (F). Tip-cart (E).

الطبر كالمجلة عربة للقلل ذات دولابن .

Thunbergia (S).

Thunbergia (F). Black eyed susan (E). Thunbergia (D). Thunbergia (I).

جنس نباتات من فصيلة الانتياش معقودة التعريف على اسم الطبيب الرحالة السويدي « طنبرج » . انواعها ثمانية منها المشيئة الحولية ومنها اليفئة المعمرة . اوراقها متعاقبة الاوتكار ، قلبية او سهمية التصل . ازهارها كبيرة القد ، زاعية الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

Thunbergia fragrans (S). Thunbergia odorifera (F).

جنس سرية عائرة معمرة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها سهمية مسنة الحافة . ازهارها عاجية اللون ، فواشي العرف الطري . قطرها نحو ٣ سم || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

Thunbergia alata (S). Thunbergia alata (F).

جنس سرية عائرة معمرة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها سهمية الشكل متعاقبة التسنين الضعيف . ازهارها صفراء اللون او برتقالية يملوها في وسطها موج اسود تتوسط بقعة بيضاء || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

Thunbergia chrysops (S). Thunbergia dorée (F).

مشية سرية حولية زينة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقها قلبية الشكل . كأس زهرها سبكة التسنج ، مقنونة الطرف . قناباتها يفضية مهدية ، توجيهها جبري الحية ، يتلاتها ذعية اللون ، ارجوانية المراج يملوها طروق ازرق . ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

Xiphidria (S). Xiphidria (F).

جنس حشرات من فصيلة الخنوبريات . انواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد المعتدلة . اجسامها اسطوانية الشكل طولا براوح بين ١٠ و ١٦ سم . اناثها سوية الالوان ينلب فيها الاسمر والحطلي . قرونها الاستشارية خيالية التركيب ، افقية الانتشاب . رواشها شفافة كثيرة العروق . مرزات اناثها صخرية القد ذرية || قرونها غاشية تركيب جذوع الانجار الحرجية المائلة اعصها المث والحور والدرادر .

Xiphidriidae (S).

Xiphidriidae (F).

فصيلة حشرات من غثايات الاجنحة الاشرية . اجسامها وانواعها عديدة تتميز باستدارة رؤوسها واستطالة اعناقها وقصر اطراف اناثها . قرونها غاشية تحلل وتسرود جذوع المث واليتولا والسنتيان والحور والدرادر .

Tanytus culiciformis (S).

حشرة من فصيلة المحشيات . جسمها قريب الشبه من البومفة ، يطول نحو ٥ سم . || نوبها الى الطلعة السمره يملوها ، عند الذكر ، سلطان اسودان في الصدر وستة

١٧٣٦٩ - طنطب

Cheval de race (F).

Botte de roseaux (F).

Bunch of reeds (E).

حزمة القصب . والقصب الواحدة ملنة .

١٧٣٦١ - طنان

هو الطرلوس ويدي الطائر الطنان والطائر اللبابي .

١٧٣٦٢ - طنانة

الطنانة علم يبحث في مقاييس الاصوات ومقارنتها .

١٧٣٦٣ - طنانة

جنس حشرات ناعمة من فصيلة النحلوات . انواعها نحو ٢٠٠ مولها العالم . تتميز باجسامها الخفيفة الزباد . اناثها عديدة الالوان الزاهية المنفصلة ، منها الاسفر والاحمر والاسود والابيض والاصفر والصلابي || قرونها الطل ورقيق الازهار . وهي من الحشرات اناثها المفيدة لانها تساعد على تأخير الزهر واخصابه || ام انواعها واشهرها ما يلي .

Bombus terrestris (S). \* طنانة التربة

Bourdon terrestre (F). طولا براوح بين ٢٥ و ٣٠ سم . رأسها اسود يملو توشيح احمر وسط اسفر . قرونها سوداء . جوشها والمفصل الاول من يبطها الى الصفرة . مفصلها الثاني والثالث الى السواد اللامع . اما الرابع والخامس فالى البياض الاخير . قرونها سود . خرشها متوسط العدد تقيه في التربة او تحت الشيا . تسرح ابتداء من اواخر ايار .

١٧٣٦٥ - طنانة الحدائق

Bombus hortorum (S). Bourdon des jardins (F). طولا نحو ٢٠ سم . رأسها اسود يملو توشيح احمر . جوشها وقرونها والمفصل الاول من يبطها الى الصفرة . مفصلها الثاني والثالث الى السواد . اما الرابع والخامس فالى البياض . قرونها سود . خرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من نيسان . تألف الحقائق والجنائن القرية من الاماكن الآهلة .

١٧٣٦٦ - طنانة الحراج

Bombus sylvarum (S). Bourdon des bois (F). طولا نحو ٢٠ سم . جسمها كثيف الزغب الدقيق الطويل . نوبها الى الصفرة اللؤلؤ . قرونها جوية اللون . خرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من ايار . تألف الحراج والذابات الكيفية الظليلة .

١٧٣٦٧ - طنانة القاع

Bombus lapidarius (S). Bourdon des carrières (F). طولا نحو ١٦ سم . نوبها الى السواد اللامع . مفصلها الثلاثة الطرفية الى الحمرة الصنائية . قرونها سمر يملوها زغب احمر . خرشها متوسط العدد تقيه بين الحجارة والصخور . تسرح ابتداء من ايار .

١٧٣٦٨ - طنانة عطرية

Bombus fragrans (S). Bourdon parfumé (F). طولا نحو ٢٠ سم . رأسها ويطها الى الصفرة . جوشها زيتوني . قرونها اسود يملوها زغب اشقر . خرشها قليل العدد تقيه في صمغ الاشجار . تسرح ابتداء من ايار .

خاسيا الفصّل. جوشها اصفر من بطنها. بطنها بيضيّ الشكل. مرزّتها مستقيمة. اجنتها عادمة اللون، مهدية الاطراف. ثوبها الى النبي الاشقر المواج || تربيتها منتشرة في اريوة وامريكة.

17388 - **طَفُوشِيَّات** (S).

Trichogrammidae (F). Trichogrammidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصوصة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها نافعة تقتطّل على مكن الحشرات من مختلف الفصائل || حشراتها شديدة الصغر تطول من ١ الى ٢ مم. اجسامها ربة. جواشها اقصر من بطنها. قرونها الاستشعارية قصيرة، خاسية الفصّل او سباعيتها. ارساغها ثلاثية العقل. مرزّتها قصيرة، مستقيمة. اجنتها مهدية الختار || اشهر انواعها الطفوش الشارد.

17389 - **طَهَاف** Stratus

هو السديم غرب من السحاب المرتفع.

17390 - **طَهْر، نَقَاء** Asepsie (F).

Asepsis, Aseptic methods (E).

انعدام المواد الغثة او الفاسدة التي تنقل الامراض.

17391 - **طَهْرُوج \*** Ithagnosis (S).

Ithagnosis (E). Ithagnosis (F).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الطيوريات. انواعه المعروفة خمسة موطنها جبال الهند. لحنها الحياتي جاعي. قوتها الاغشاب والحبوب والجذامير والحشرات اغصها النمل || اجسامها متوسطة القلّة تطول من ٤ الى ٥ سم. اوثابها الى الطحلة السمرات المتفاوتة الماجات. رؤوسها صغيرة متوسية بقناير لاقائية التسجيع والاستاطالة. حويثا مطوقة بالابيض. مناقبها قصيرة ورضلية. اعناقها طويلة. اذنانها متوسطة الطول، مقطوعة الاطراف || الانثى اصغر قدّا من الذكر وافتح ثوبها. تذكّن اقصوصها في الارض. تبيض من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها نحو ثلاثة اسابيع بينا الذكر يؤين لها الغذاء || تعتبر من الطرائد الفاعرة.

17392 - **طَهْس \*** Endonastie (F).

الطهس النضاف الزنبد عل السوق تسهيلًا لبروز الورقة من التربة.

17393 - **طَهْس** Détériorer (F).

To deteriorate (E). افسد العمل بسوء تصرفه.

17394 - **طَهْف** Frais (F). Fresh (E).

نمت وصني بدل عل مزاجبة الشيء كتركّل زبدة طهفة اي طازجة.

17395 - **طَهْف \*** Millium nigricans (S).

Mais de Guinée (F). African millet-grass (E). Echetes Flattergrass (D). Miglio nero (I).

نبات عشبي زراعي حولي من التجليات. مهد البلاد الافريقية الحارة حيث تكثر زراعته نظرًا لاستعماله الغذائي والعللي. وهو قريب الشيء من الدخن. اوراقه كبيرة القد، عصفية النصل، متقاربة الابعاد. عشكوكه الزهري كبير الحجم. ثماره حبوب صغيرة مستديرة مقلطحة غيرة اللون.

خطوط متعّرة في البطن. اما الخطوط المتعّرة في ثوب الانثى صفراء اللون || رأسها مستعرض. زباناها ريشاني عند الذكر، قلابيان عند الانثى. روثانها، عند الشقين، الى البياض الاغبر المرقوش بالحنطي. قوامها الى الصفرة، مغاسلها سود || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الاول. تأثت غسفات المنافع ويجاري الماء || يرقّتها مائية ثم قازية، وأجّة ودائمة.

17378 - **طَنج** هو المور، اطلبه.

17379 - **طَنَرَق مَبْدُول \*** Tanrec commun (F).

حيوان ليون حاشر يدعى مزال، اطلبه.

17380 - **طَنَر**

الطنر غرب من السمك (الحيط).

17381 - **طَنَطُور الجندي**

هو التلغيفة الحبيشة. اطلها.

17382 - **طَنَين \*** Tanghin, Tanghen (F).

مادة جمالية تستخرج من عصارة ساق الطنينة السامة او من لباب ثمارها.

17383 - **طَنِينَة \*** Tanghinia (S).

Tanghinie, Tanguin (F).

جنس اشجار برية وتربيلية من فصيلة الغدليات انواعها المعروفة خمسة جميعها كبيرة القلّة تملو من ٨ الى ١٥ م. اغشاشها صلبة مستجة متظية اللون. ثمارها نووية الشكل بنقية الحنج لونها يراوح من الاصفر الى الاجر || اشهر انواعها الطنينة السامة.

17384 - **طَنِينَة سَامَة \*** Tanghinia venenifera (S).

Tanghinie de Madagascar (F). نوع من الطنينة وهي شجرة جميلة الھندام تملو نحو ١٠ امار. اوراقها سائنة الشكل، نصلها جامد الصفحة عايق الخضار اطحل المواج || يستخرج من لباب ثمارها وين عصارة ساقها مادة جمالية شديدة الوق تثل القلب والجهاز العصبي || يقال ان باقر ملك مدغسكر امر عام ١٨٣٠ باخضار جميع بحرة الجزيرة وراقها وكان عديم نحو ٦٠٠٠ نحمك عليهم باجترار عصارة الطنينة السامة لتستريح البلاد من طلعة الابالة. وهكذا كان فاقوا جميعهم اليوم واحد.

17385 - **طَنَف، طَنَف** Auvent (F).

Pent-roof, Porch-roof (E).

الحيد من الجبل وما نأثا من. وافرز الخاط. وما اشرف خارجًا عن البناء. والسقيفة تشرع فوق باب الدار.

17386 - **طَنَف** شجر احمر يشبه النم (السان).

17387 - **طَنُفُوش شَارِد \***

Trichogramma evanescens (S).

Trichogramme errant (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطفوشيات. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تقتطّل على مكن الحشرات ومنها القرمزيات (الكورنيل) || جسمها صغير القلّة يطول نحو ١ مم. رأسها مستعرض الجرم. زباناها قصيران، منفرجان،



طفوش شارد



طهوج



طهف



طولاب مهذب

كبيرة ، ناشرة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اغطائها لثاقية او ماسحة . كواهلها مستطيلة الشكل ، مبشرة الحلب . شيفاتها كبيرة . بطونها شبه اسطوانية . قوائمها نشيطة . اؤلها كبيرة ، اشبهها الاسود ثم الاسمر المحتلي || يرقاتها ونجدة او نائلة وعاصلة || اشهر اجناسها الطواحة والكرندوة .

١٧٤٠٣ - طُورَاة \* في الانتلة السوداء . اطلبا .

١٧٤٠٤ - طُورَاعِيَّةُ التَصَرُّف \* (F) Disponibilité (F). Disposal (E).

هي في القانون المدني صفة متعلقة بالاموال يجعلها قابلة للتسليك .

١٧٤٠٥ - طُورَالُ السَّاق \* طُورِيلَاتُ السَّاق

Echassiers (F). Wading-birds (E).

رَبَّةٌ من الطيور تتميز باستطالة سيقانها واعناقها وبثاقيعها . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع في مشرة فضائل : البيلشريات والتفلقيات والتنتليات والجاريات وجابجات الارض والفرزقيات والكركات والقلقيات والتحاميات والكتاتيات

١٧٤٠٦ - طُورَالُ القُرُون \* هي القززيات ، اطلبا .

١٧٤٠٧ - طُورَابَجَّة \* ، طُورَابِي \* Tupaia (S). Tupaie, Cladobate (F).

جنس حيوانات لبونة حاشرة من فصيلة الطوابجيات . انواعه المعروفة سبعة . اعطائها تمتد من الهند الى الهند الصينية والانام وبجزر الارخبيل حتى صومر والفيليبين . تألف الغابات والاحراج . تسلك الاشجار بحفة . تروح في النهار وتبيت في الليل . قوتها الحشرات والورز والفئران والجرذان ... || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . بما فيه الاذنان التي تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها مستطيلة الاعظام ، مخروطية الشكل . سبالها كيفية . عيونها واذاها صغيرة . اذنانها مستطيلة جلة . اؤلها تختلف مع الانواع . اناها رباعية الاطبا .

اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية :

طوابجة اسمر حديدي \* Tupaia ferruginea (S).

طوابجة تانا - تانا \* Tupaie ferrugineux (F).

طوابجة تانا - تانا \* Tupaia tana (S).

طوابجة جاوا \* Tupaia tana, Tana (F).

طوابجة نيكوبار \* Tupaia javanica (S).

طوابجة نيكوبار \* Tupaie de Java (F).

طوابجة نيكوبار \* Tupaia nicobarica (S).

طوابجة نيكوبار \* Tupaie de Nicobar (F).

١٧٤٠٨ - طُورَابِيَّات \* Tupaia (S).

Tupaia, Tupaia (F). Tupaia (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة شسقلة . اجناسها وانواعها قليلة البدن . اعطائها المناطق الحارة والاستوائية من الهند

والانام وبجزر الارخبيل || جميع اجناسها صغيرة ، مستطيلة

الاجسام والاذنان ، قريبة القبة بالتسحاب . رؤوسها

مخروطية ، ذلقة الاعظام . آذانها صغيرة . قوائمها الخلفية

الاشجار بحفة . قوتها الحشرات والوديات والورز والفئران ||

اعرف اجناسها واشهرها الطوابجة .



طوابجة

١٧٣٩٦ - طُورَابُ مُهْدَب \*

Dolomedes fimbriatus (S). Dolomède frangé (F).

Long-legged spider (E). Gartenlachspinne (D).

نوع من العناكب القانصة الساعية ثنائية الروايا سداسية

المشانت ينتمي الى فصيلة الخنثريات . جسمه متوسط القد

يطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ٢٤ سم . عند الانثى .

سداسه اهلجلي الشكل ، اصعب اللون ، اغبر التوشيح .

عيناه زرقيتان . شيفاه ضليمان ، محبذا الغلاف . فكاه

مستطيلان . جرامزه قوية ، نشيطة ، مبشرة الحلب . بطنه

مستطيل الشكل البيضي ، حنلي اللون ، اسمر المراج ،

يعلمو تشيح ابيض واسود وخار مهذب اغبر || يالفت

المنافع والاهوار . قوته الحشرات الحلائية . يسرح في التبار .

عككته كالجرايب ينسجها تحت الحجارة في مكان قصه ||

ملبجه الحياتي لا يختلف عن ملبين سائر العناكب .

١٧٣٩٧ - طُورَابَة \* Fourrage débine (F).

Straits fodder (E).

اليسير من الكلاله .

١٧٣٩٨ - طُورَابِيَّات \* حشائش مرة كانت تأكلها اليهود في الفصح . (اللسان) .

١٧٣٩٩ - طُورَابِيَّات \* Pimelopterus tahmel (S).

Pimélode (F).

سمكة بحرية مأكولة من مفتوحات المائات وفصيلة

السلوريات . توجد في معظم البلاد الحارة . تتميز بفرابة

شكلها ، بقصر رأسها المقطوم ، بكثرة طبهايا التكية

وباستطالة بعض حشكاتها الزغيفية كما يبدو في الرسم .

وهي عادمة الانسان ، خلية العظام الفكية .

١٧٤٠٠ - طُورَابِيَّات \* Clausilia (S).

Clausille (F).

جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة

الخلزويات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٧٠٠ منتشرة

في جميع الاصقاع الحارة والمتلة الحرارة || اصنافها

صغيرة القد وشيعة الشكل المستطيل . طولها تقواوح من ٨

الى ٢٥ سم . تعيش في المواق الرطبة وقرب المنافع ويجاري

الماء . قوتها المواد النباتية .

١٧٤٠١ - طُورَابَة \* Scatophaga (S).

Scatophage (F). Scatophaga (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة الطواحيات وربة ذوات

الجناحين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار

العالم || اجسامها مبياض تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها

كبيرة . عيونها ناشرة ، متباعدة عند الشقين . قرونها

الاستشعارية شديدة القصر تنتهي بسيلة دقيقة . اعطائها

ضليمة ، لثاقية . كواهلها وبطنها متكاثفة الحلب . رواشها

ملونة . قوائمها نشيطة ، مبشرة الحلب . اؤلها عديدة و

اشبهها المحتلي || الحشرة الجملةنة قانصة . البرقة نائلة

وواجبة .

١٧٤٠٢ - طُورَابِيَّات \* Scatophagidae (S).

Scatophagidae (F). Scatophagidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها

المعروفة كثيرة البدن ، منتشرة في معظم اصقاع العالم .

جميعها من اللباب الطالح الحاتم || اجسامها متفاوتة القد ،

تطول من ٥ الى ١٤ سم . رؤوسها شبه مكورة . عيونها

## Phase

١٧٤١٧ - طَوْرُ

## Diaphase

١٧٤١٨ - طَوْرُ انْفِصَالِي

Geopelia (S). طَوْرِي \* طَوْرِي  
Géopélie, Pigeon-épervier (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . يتميز بصغر قده ورشاقته وشكله واستطالته أفتيكه المتراصفت الريش. ثوبه الى الصخرة المخططة والموشة بالاسود || موطنه الشرق يألف القياي والحقول المزدودة . اسرابه صغيرة يروح عدد افرادها بين ١٢ و ٤٠ . قوته الجيوب واليور . يثنى في الجنبات والادغال القليلة الارتفاع . انشاء تبيض يفتش على مرتين في السنة .

Torania gloriosa (S). ١٧٤٢٠ - طَوْرَانِيَّة \*  
Toranie glorieuse (F).

دوبية من العناكب الساعية القانصة ، ثنائية الروايا سداسية المثنان تنتمي الى فصيلة اللاحيات . موطنها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة || جسمها صغير القد بطول نحو ١٥ سم. عند الذكر ونحو ٢٠ سم. عند الانثى . صدارها مستدير الشكل ، حطلي اللون ، اسمر الموج . عيناها زنجيتان . فكها صغيران . جرابها كبيرة ، كثيفة الحلب . بطنها يبيض الشكل ، اسمر اللون منقط بالاحمر كالجرار || لسمها مؤذية تسبب بعض الحمى .

Corythax, Turacus (S). ١٧٤٢١ - طَوْرَق \*  
Touraco (F). Turacus (E).

جنس طير من فصيلة الموزيات . اطلانه البلاد الافريقية الحارة . انواعه المرفقة قليلة العدد - جميعها ابدية - اجسامها تطول من ٤٣ الى ٤٧ سم . اوطاها جيلة الالوان القاعة . مناقيرها قصيرة ، حمرطوية الشكل ، شارفة المخاط العليا المحفوفة الطفاف . رؤوسها متوجبة بفتاح حوذوية الشكل || اعرف انواعه واشهرها الطورق الازجواني .

١٧٤٢٢ - طَوْرَقُ اَرْجَوَانِي \*  
Corythax Buffoni, Turacus persa (S).

Touraco pourpre, T. bleu (F). Purple Turacus (E). نوع من الطيور . اطلانه تشتمل معظم مناطق افريقية الجنوبية . يألف الاجراع والغابات والنباتات حيث تكثر الثار والجيوب البرية || جسمه بطول نحو ٤٧ سم . ثوبه الى الخضار الازجواني الموج . جناحه مجعدة بالاخضر الانياس والازرق والاحمر والاسود . ذنبه الى الزرقه المابقة الخضراء الموج . قزخته خضراء القاعدة والزلام الاول ، بنفسجية الزلم الثاني ، حمراء الثالث والرابع || يثنى في تجاوياف الانجار القديمة المهم . انشاء تقصع أربع يبيضات تحضنها بمثابة الذكر || قوته الثار البرية والجيوب . يعيش في التقصص انما يرغب في المواقع الظليلة . قوته في الاسر يرتكز على الثار البانمة والرز المسلووق والخبز المجلل بماء السكر .

Pullulation (F). ١٧٤٢٣ - طُوس \*  
Pullulation, Swarming (E). الطوس التكاثر السريع .

١٧٤٢٤ - طُوس هو الثوبان الحريبي ، اطلبه .

Brebis (F). Ewe (E).

هي النجبة . ج طولبات . ولا يقال الكيش طولبا .

١٧٤١٠ - طُوبَة هي الاقنوم ، اطلبه .

١٧٤١١ - طُوبِين Talpa (S). Taupe (F). Mole (E).

جنس حيوانات من آكلات الحشرات وفصيلة الطوبينيات انواعه المرفقة ١٠ ، موطنها العالم القديم . اشهرها الطوبين المبول او المله الاروبي . جميعها جامة تعيش في انفاق ورداء تخدعها على اعماق مختلفة تراوح بين ٣٠ و ٧٠ سم . اجسامها مكملة اسطوانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . رؤوسها رشيبة تنتهي بفتناطيس صفيحة . حيونها خرزبة صفيحة . اذنانها الخارجية طامسة . اذنانها جدها تطول نحو ٢ سم . اينها قصيرة مستعرضة خماسية الاصابع المجهزة بالظافر القوية المستطيلة الدرية . ارجلها صغيرة القدة والظانير || انثاها تحمل مرة في العام وتضع من جرون الى خمسة جراء || يجتر الطوبين من الحيوانات المؤذية لانه يقضم كل نبات يجترى طريقه في التحرير عن الحشرات ويهرسح اربع مرات في النهار عند الصباح وعند الساعة التاسعة وعند الظهر وعند الغروب || يكافح باستعمال الفخاخ والمصايد والعظم السامة .

Scalops parvus (S). ١٧٤١٢ - طُوبِين امْرِيكي \*  
Scolope de Floride (F).

حيوان لبن حاشر جاس من فصيلة الطوبينيات . اطلانه بعض مناطق الولايات المتحدة اخصها فلورديه والتكساس || جسمه صغير القد كرم بطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير الجرم مستطيل الفم الذي يبلو كقفم الزبابة . عيناها خرزيتان . اذنانها مساحتان ، طامستان . يدها قصيرتان غليظتان مغطيتا بالظافر قوية . ذنبه شديد القصر عادم الور . ثوبه الى السمرة المابقة باستثناء قة الرأس ويقدم القزاق فاتها الى الغيرة الصفراء || يعيش تحت الارض في انفاق تخدعها على اعماق متفاوتة الفور اقصاها ٥ سم . قوته البيدان واساربع الحشرات ويرقاتها ومازن التل والشلق... || الانثى تحمل مرة في العام وتضع من جرون الى ثلاثة جراء .

Talpidae (S). ١٧٤١٣ - طُوبِينِيَّات  
Talpidés (F). Talpidae (E).

فصيلة حيوانات صغيرة من رتبة الحشرات تشمل الطوبين واللسبان .

Tota (F). Grivet (E). ١٧٤١٤ - طُوت  
هو هجرس سبا ، اطلبه .

Plancton, Plankton (F). ١٧٤١٥ - طُوتَح \*  
Plankton (E).

كثلة من المواد العضوية المنقورة بالماء قواسم مجموعات من الحيوانات الدنيا المائية والنباتات المجهريه من وحيدات الخلية . اليتر الواحد من ماء البحر يحوي نحو ٥٠٠٠٠٠ كائن حي من هذه الحيوانات الدنيا والنباتات المجهريه . وحيث ان هذه الكائنات تتكاثر بسرعة لا مثيل لها ، تراوح من يوم الى يومين ، لذلك فالطوح يعني كامل كائنات الكثلة من حية وميتة . ج الطواح .

Planctique (F). Planktic (E). ١٧٤١٦ - طُوتَحِي \*  
نمت ترميني يطلق على الكتل العضوية العائمة في الماء او الثائبة فيه .



طوبين امريكي



طوراني



طورانية



طورق ارجواني

١٧٤٣٨ - طَوْقَة

أرض مستديرة سهلة بين أرضين غلاظ .



طوقان

١٧٤٣٩ - طَوْقُونُون ، طَوْقُونُون

Teucrium (S), Germandrée (F), Germander (E).  
جنس نباتات برية وزراعية ترابية من فصيلة الشفويات  
أنواعه نحو ١٠٠ معظمها عشبي لذي معمر شائع الاستعمال  
الطبي . منافعها عديدة يزيل السعال ويقيده الطحال . وهو  
مر الطعم ، حامض ومقو ، يدر الصفراء ويقي الصفصاء  
ويقضي على الديدان || أوراقها متقابلة مفردة كثيرة  
التشريح . أزهارها أبيلة مختلفة الألوان || أشهر أنواعه  
ما يلي .



طوقونين أصفر

١٧٤٤٠ - طَوْقُونُون أَصْفَر \* ، عَشْبَة الطَّحَال

Teucrium flavum (S), Germandrée flavescens, Pouliot jaune (F), Yellow germander (E), Gelber Gamander (D), Camendrio giallo, Querciola maglore (I).

عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فروصها  
منتصب زياها الحامض . أوراقها كبيرة مفردة وسنطة النصل  
الحمل البشرة على صفحتيها . ختل أوراقها وزغب لحاء  
فروصها وساقها بيض اللون ، صفر المراح . أزهارها  
روسية التجميع ، حامية الإزهار ، صفراء اللون .  
أزهارها يستمر من حزيران إلى آب || يقال أنها تشفي  
أكثر علل الطحال .



طوقونين أكريني

١٧٤٤١ - طَوْقُونُون [كْرِينِي] \* ، بَقْلَة العَرَف

Teucrium creticum (S), Germandrée crétoise, Pouliot de Crète (F), Cretan germander (E), Cretischer bergvalendel, Ysop-Gamander (D), Camendrio di Crète, Querciola di Crète (I).

عشبة برية طيبة معمرة مهددة الشرق الأوسط . يقال أنها  
من النباتات الناعضة الناعضة . تملو نحو ٨٠ سم . ساقها  
فروصها منتصب . أوراقها تطول نحو ٤ سم . وتعرض نحو  
٦ م . أزهارها بنفسجية اللون ، فردية أو ثلاثية التجميع .  
أزهارها يستمر من أيار إلى تموز .



طوقونين جبلي

١٧٤٤٢ - طَوْقُونُون جَبَلِي \*

Teucrium montanum (S), Germandrée de montagne, Pouliot de montagne, Thym blanc (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠ إلى ٢٥ سم . ساقها فروص . فروصها  
غشوشية ، نخيلة ، مستديرة الإصابع . أوراقها لائفة ،  
ضيقة النصل ، غبراء الصفحة السفلى . أزهارها بيضاء  
اللون يملوها مراح أصفر || أزهارها يستمر من أيار إلى  
آب .



طوقونين شرقي

١٧٤٤٣ - طَوْقُونُون شَرْقِي \*

Teucrium orientale (S), Germandrée d'Orient (F).  
عشبة برية وترابية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . ساقها  
فروص منتصب . أوراقها غشوشية التفريش . النصل باهت  
الحضار ، خلي البشرة . أزهارها عنقودية التجميع ، زرقاء  
اللون || أزهارها يستمر من تموز إلى آب .



طوقونين كبير

١٧٤٤٤ - طَوْقُونُون كَبِير \* ، طَوْقُونُون لَيْثِي

Teucrium fruticosum (S), Germandrée ligneuse (F).  
جنت ترابية تملو من ١٠٠ إلى ١٨٠ سم . فروصها  
نباتية متباعدة . أوراقها معتقة مستطيلة . نصلها بارز  
المرق والشرانين ، أزغب الصفحة السفلى . أزهارها  
كبيرة اللثة ، زرقاء اللون ، أزهارها يستمر من شباط إلى  
حزيران || وهي من النباتات الجامدة التي ترطب في بعض  
الآربة المينة والمواقع الحامضة .

Châtré (F).

To castrate, To geld (E).

١٧٤٣٥ - طَوْش

انزع الخصيتين في ذكور الحيوان .

١٧٤٣٦ - طَوْشَاء \*

Anandre, Anandraire (F).  
الطوشاء كل زهرة عادمة الجهاز الذكري .

Chapon (F).

فرخ الدجاج الخفي . ج طواشن ومقايش . (E).

Epervier commun (F).

هو الباشق المعروف ، اطليه .

١٧٤٣٩ - طَوْط

هو القطن أو قطن البردي .

١٧٤٣٠ - طَوْطَانِيَات

عامة من فصيلة دجاجيات الأرض . اجناسها وأنواعها  
عديدة جميعها من القواطع الصغيرة اللثة . أنولها منقطة  
مرقطة ، رقعتها الهليلجية الشكل . مناقيرها دقيقة نصفية  
التخديد . أرسافها نخيلة || تألف مجاري الماء وشطوط  
البحار والأنهار . قوتها الديدان والحشرات والرخويات  
والقشريات || تدثر في الأشجار وبين الاعشاب وعلى  
التراب . الاثني تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها سجدتها  
من ١٧ إلى ١٩ يوما || أشهر اجناسها الطيطوي والقناراع  
والقنقع .

١٧٤٣١ - طَوْطِي

هي البياض (عن ابي حامد الغزالي).

١٧٤٣٢ - طَوْطِي

نعت تعريبي يطلق على كل نبات يتكاثر تلقائيا في تربة  
معينة وأقليم محدد .

Spontanéité (F).

Spontaneity (E).

١٧٤٣٣ - طَوْعِيَة

صفة ما هو تلقائي .

١٧٤٣٤ - طَوْق

أطار من حديد يطوق بعض الاشياء لمنع تصدعها . والطق  
هو حاويل النخل الذي يستعمل في الصمد البيا .

١٧٤٣٥ - طَوْقَان

le Toucan (F), the Toucan (E).  
الطوقان كوكبة نجوم جنوبية الموق تشبه بشكلها طائر  
الطوقان || عدد نجومها ١٤ جميعها من المرتبة الخامسة  
وما دونها .

١٧٤٣٦ - طَوْقَان \*

Rhamphastos (S), Toucan (F).  
جنس طيور أمريكية مستهجنة الشكل . موطنها البرازيل  
والفريز وبوليفيا . اجسامها كبيرة اللثة طولها يراوح بين  
٥٠ و ٧٠ سم . أنولها مختلفة يكثر فيها السواد اللامع .  
اعتاقها ومجاسرها بيض . أذنانها حر الانائيك . مناقيرها  
غلظة الشكل ، كبيرة الحجم ، وردية اللون ، سود البهرة .  
تألف الغابات وتدثر في صمور الأشجار . قوتها البار  
والحشرات والوزع .

١٧٤٣٧ - طَوْقَانِيَات

Rhamphastidae (S), Rhamphastidae (E).  
فصيلة طير من المملكتات . اجناسها وأنواعها عديدة تتميز  
بمناقيرها الغلظة المخدودة . اعطائها البلاد الحارة  
والاستوائية . أعرف اجناسها وأشهرها الطوقان .

١٧٤٥١ - طَوْلَقْ تَكَاتْ ٥

*Dendroplex picus* (S).

*Talapiot-pic* (F). *Talapiot-pic* (E).

نوع من الطوب . عاثر من فصيلة الطولييات . موطن معتدل المناطق الغربية من أمريكا الجنوبية . يألف الغابات والرياح حيث تكثر الديدان والإساريع والحشرات || جسمه محتدل القد بطول نحو ٢٢ سم . يتميز بمقناده الجالس كالحرية المستقلة الطرف . ثوبه الى السرة السوداء يملؤها تجعيج معترض اسود في الجناح والذنب ورشة سوداء في الصدر . صدره وبطنه وزناكه الى الشقعة السوداء . حلقة عينه الى الزرقاء مقناده وساقاه الى السرة المائلة || يتسلق الاشجار من الصباح الى المساء وينكت القشور والحاء في طلب الديدان والإساريع || يذئن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات بتفضها بمادة الذكر نحو ١٥ يوما .

١٧٤٥٢ - طَوْلَقِيَّاتْ ٥

*Dendrocolaptidae* (S).

*Dendrocolaptidae* (F). *Dendrocolaptidae* (E).

فصيلة طير من الجوارثم المتسلقات رقبقات المناقر . اجناسها وأنواعها المعروفة نحو ٧٠ . موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية . تألف الغابات والرياح والأحراج الجبلية . قوتها الحشرات وإساريعها || أعرف اجناسها وأشهرها الطوب والقصاب .

١٧٤٥٣ - طَوْلَقْ ٥ ، طَوْرِيَّه

*Torrey* (S)

*Torrey*, *Torrey* (F).

جنس اشجار حرجية من الطقسيات . أنواعه عديدة مهدا الشرق والبلاد الأمريكية . اجناسها متوسطة القد دائمة الخضار . غراعيها متعاقبة ابدة . اوراقها عروبة الشايبة الصف ، منقطة ، احليجية ، ذرية . نصلها جامد اللينة ، شائك القصة ، عايق الخضار ، مخطط الصفحة السفلى . أشهر أنواعه ما يلي .

١٧٤٥٤ - طَوْلَقْ جَوْرِيَّه

*Torrey nucifera* (S). *Torrey à noix* (F).

شجرة سروية حرجية وزيينية بطيئة النمو . مهدا اليابان تملو من ٧ الى ٢٠ م . غراعيها تبدو خضراء اللون ثم تنحرف الى الجوزة . اوراقها شديدة الخضار العايق اللامع . مسام نصلها عند فركها تحرر بعض المواد العذبة الكريهة الرائحة || ثمارها جوزية القد والشكل ، لونها الى الأخضر المنشح بالابيض تقطيه بعض الحلووط الحمر .

١٧٤٥٥ - طَوْلَقْ زَرْبِيَّه الْوَرَق

*Torrey taxifolia* (S). *Torrey à feuilles d'if* (F).

شجرة حرجية جادسة مهدا أحرار فلوريدا من أعمال أمريكا الشمالية . تملو من ٧ الى ١٠ أمتار . غراعيها شديدة الخضار . اوراقها زربية الشكل ، ابرية المقصة ، فواكه الرائحة الكريهة .

١٧٤٥٦ - طَوْلَقْ كَبِير

*Torrey grandis* (S).

*Torrey grand* (F).

شجرة سروية حرجية وزيينية ، بطيئة النمو ، مهدا الصين . تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . غراعيها يفتية اللون . اوراقها تطلو نحو ٤ م . نصلها لامع الصفحة العليا الفتية اللون ، باحت السفلى المعتدلة الخضار ، ثمارها بيضية الشكل ، صفراء اللون تطلو نحو ٣ م . وتعرض نحو ٢ .

١٧٤٥٥ - طَوْرِيُون كُوْرِي ٥ ، مَارُوم ، صَعْتَر

الحمر ، مَرَمَاخُور

*Teucrium marum* (S). *Germandrée ambrée*, *G. maritime*, *Marum*, *Thym aux chas*, *Herbe aux chas* (F). *Marum-germander*, *Cat thyme* (E). *Katzen-gamander*, *Katzenkraut* (D). *Camendrio maritimo*, *Maro* (I).

بجلة برية طيبة بمسرة صغيرة القد ، ساقها فناء تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها معتقة فضية الشكل تطلو نحو ١٠ سم . تعرض من ٢ الى ٥ . نصلها وسيد العرق خلى البشرة البنية اللون . ازهارها ابيلة الازتكاز ، فردية او ثنائية التجميع . لونها الى الزرقاء الباهتة || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

١٧٤٥٦ - طَوْرِيُون عَنَزِي ٥ ، عَمَامَدَارِيُون ، كَمَادَارِيُون

*Teucrium Chamaedrys* (S). *Germandrée officinale*, *G. petit-chêne*, *Petit-chêne* (F). *Common germander*, *Ground oak*, *Wall germander* (E). *Echter Gamander* (D). *Camendrio officinale*, *Germandria*, *Querciola* (I).

عشبة طيبة ممررة تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . ساقها تحيلة مسطحة . اوراقها مفترسة ورسنة . نصلها خلى الصفحة السفلى . ازهارها غسبة التجميع ، هامية الازتكاز ، حراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول . منافعها الطبية عديدة راجعها في مادة طوريون .

١٧٤٥٧ - طَوْلَقْ الْبَتُولَا ٥

فراشة من فصيلة القنليات طولها نحو ٣٨ م . ذكرها اسمر الجسم ، اسهب الراوش الموحجة والمبقجة بالاحمر والاصفر والمخلط . انثاءا كستنية الجسم والراوش يملو في روثنها الاسمين بقية حراء صناعية || يسرح من آب الى ايلول . رفته تركب اوراق البتولا .

١٧٤٥٨ - طَوْلَقْ السِّنْدِيَّانْ ٥

*Thecia quercus* (S).

فراشة من فصيلة القنليات طولها نحو ٣٤ م . ذكرها حنطلي الجسم ، اغير الصدر ، بنفسجي الراوش الملوقة بالاسمر . انثاءا حنطلية الجسم غير الراوش المسجبة بالاسمر والمقطعة بالاحمر والاصفر || يسرح من حزيران الى تموز . رفته تركب اوراق السديان .

١٧٤٥٩ - طَوْلَقْ

قياس درجات طول الامكنة . عماده قوس خط الاستواء القائم بين هاجرة الموقع والهاجرة الاصلية .

١٧٤٥٠ - طَوْلَقْ ٥ ، اَبُو سَاق

*Himantopus* (S).

*Echasse* (F). *Stilt* (E).

طائر من طوال الساق القواطع . طوله نحو ٤٠ سم . متقار جالس ، مستطيل ، اسود . ساقه خازقة الطول جؤورتا اللون . قفنه وظفروه يستطاع الى السواد اللامع يملو موج اخضر . عتقه وصدره وبطنه واذنيه الى البياض اللبي يختفه موج وردى || يرتاد النائق والقطوط البحرية . قوته الحشرات والفصادق والقشريات والرخويات والديدان || يذئن عشه في النائق بين الاحشاب يدبر اقصوصه في الموائع التي لات تغمرها المياه . انثاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدها نحو ١٧ يوما .



طَوْرِيُون كُوْرِي



طَوْرِيُون عَنَزِي



طَوْلَقْ الْبَتُولَا



طَوْلَقْ السِّنْدِيَّانْ



طَوْلَقْ



طَوْلَقْ

وسيط الطوليات . انواعه المعروفة ٦٥ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية . بعضها يظل مأكول الارواق والآخري صناعي يستخرج منه صباغات صفر ، او طيبي يدخل في عدة تركيب وعقاقير . اوراقه كبيرة القد . انزاعه فردية التجميع ، محورية الزنكاز .

**١٧٤٦٢ - طَوَلِيَّات** (F).  
سيط من الاقنشيات اجنانه وانواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية معظمها اعشاب حولية وعشيرة صغيرة القد ، متدلة الارواق ، حيلة الازهار القليلة العدد . اشهر اجنانه الطولوة .

**١٧٤٦٣ - طَوِي** هي الاشعة ، اطليا . ج . اطواء .

**١٧٤٦٤ - طَوِيل الأَرْجُل** (F).  
Macropode (F).  
Macropodous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الارجل .

**١٧٤٦٥ - طَوِيل الأصابع** (F).  
Macroductyl, Macroductylous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الاصابع .

**١٧٤٦٦ - طَوِيل الذَّئْب ، طَوِيل المِرْكَة** (F).  
Macrocerque (F). Macrocerus (E).  
نمت تعريفي توصف به كل دودية او حشرة مستطيلة الذئب او المِرْكَة .

**١٧٤٦٧ - طَوِيل الدَّيْل** (F).  
Macroure (F).  
Macroureous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الديل .

**١٧٤٦٨ - طَوِيل الرَّاس ، مُصَفِّع الرَّاس** (F).  
Dolichocephale (F). Dolichocephalic (E).  
من نموت التصنيف الشكلي في الحيوانات الالهية .

**١٧٤٦٩ - طَوِيل الرَّسْع** (F).  
Long jointe (F).  
Long in the pastern (E).  
هو في الخيل صفة الرسغ الطويل الذي يقرب الحوشر من الخفيض . وقد يعتبر من عيوب جياذ السبق .

**١٧٤٧٠ - طَوِيل الزُّبَان** (F).  
Macrocre (F).  
Macrocerous (E).  
نمت تعريفي توصف به الحشرات المستطيلة الزباني .

**١٧٤٧١ - طَوِيلَات الأَرْجُل** (S).  
Macropodidae (F). Macropodidae (E).  
فصيلة حيوانات من الجربيات . اشهر انواعها القنقر .

**١٧٤٧٢ - طَوِيلَات الرِّيش** (F).  
Longipennes (F).  
Longipennates (E).  
مرتبة من كفريات القدم تشل بعض الطيور المائية الكبيرة الجثة ، المستطيلة الريش والقوية الطيران كزنج الماء والقطرس والحُرشة .

**١٧٤٧٣ - طَوِيلَات السَّاق** هي طول الساق ، اطليا .

**١٧٤٧٤ - طَوِيلَات المُنْقَار** (F).  
Longirostre, Longirostral (F).  
نمت تعريفي يطلق على الطيور المستطيلة المنقار .

**١٧٤٧٥ - طَبَّار ، مُتَبَخَّر** (F).  
Volatil (F).  
Volatile (E).

## ١٧٤٥٧ - طَوَلَقُ كِلْفَوْرِيَّة

Torreyia californica, T. myristica (S). Torreyia californica (F).

شجرة سبروتية حرجية وزيينية مهددا احراج كلفورنية من اعمال امريكا الشمالية . تملو من ١٠ الى ١٤ م . خراشيبها بحرية الخشار . اوراقها تقطو نحو ٧ م . وتقرض نحو ٣ م . نصلها جامد النسيج ، اسود القصبة الاربعة الشاككة . عاقب الخصار على صفحته العليا ، بحرى الصفحة السفلى ، اغاذ الرقعة اللاسبجة || ثمارها اسطوانية تقطو نحو ٥ م . قطرها ٣ م . لنها الى الخصار الزاهي تملو شحنة حنطية تتخللها خطوط ارجوانية .

## ١٧٤٥٨ - طَوَلِيَّة التَّجِيلِيَّات \*

Tholera capitis (S).  
Tholera capiteuse (F). Tholera capitis (E).  
حشرة متراكبة الحراشف والزغب من فصيلة النسيقات وريقة حرشفات الاجنحة . موطنها بين من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واشعة قوتها مَثَر الازهار . سرتها تعيش على التجليات || جسمها متوسط القد يقطو نحو ١٨ م . بسطها نحو ٤١ م . رأسها معتدل الحجم و كستي اللون . عينها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، غبطيان عند الانثى . حشرتها كستي اللون . بطنها حنطي اللون ، كستي الحيد || روشاها الاماميان الى الكستي الحنطي المولج تملو زواكش مضطوط معتزلة غشايها يراوح من الجوزي الى الحنطي . روشاها الخلفيان الى الحنطي الاشعث يملو مولج وردي يسمر عند الاطراف || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويتبع الممكن للحد على الصفحات السفلى من نصال الارواق السرة تقطو نحو ٢٢ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى السرة القامة يملو موج امفر وعطل شيجي اسود وضمان جانبيين من كل جهة . رأسها جزوي اللون . مدها الى السرة . ورجاها سود || طور الاكمال يسمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي في التربة ضمن جلباب من اللبن .

## ١٧٤٥٩ - طَوَيْس \*

Thomomys (S).  
Thomomys (F). Thomomys (E).  
جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة الجوميسيات . انواعه المعروفة ٢٦ موطنها البلاد الامريكية . قوتها المواد النباتية . تعيش كالكلة تحت الارض في اتفاق مستطيلة ، متعرجة تنتهي باجسام فسيحة لا يقل عمقا عن ١٥٠ م . || اجسامها صغيرة ، مكرومة ، تقطو من ١٣ الى ١٧ م . واذنابها من ٥ الى ٦ م . رؤوسها مستطيلة ، شبه مخروطية الشكل ، منقوبة المقاصف . عينها خريزة شديدة الصغر . آذانها لاقفية . جرابها قصيرة . اصابعها نسيطة الاظافر المقوسة الحادة . اثرها تراوح من الركة الباعة الى المطلة المسرام || انماها سداسية الاطباء ، تضع من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . نتاجها من ٤ الى ٦ ادراس .

## ١٧٤٦٠ - طُون

Tonne (F). Tun (E).  
وسدة وزنية قدرها يساوي ١٠٠٠ كيلوغرام .

## ١٧٤٦١ - طَوَلَقَة

Dicliptera bivalvis (S).  
Dicliptère, Herbe dianthère (F). Balsam herb (E). Balsamkraut (D). Dicliptera (I).  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الاقنشيات



طويلة التجليات



طويس

الاثني مكها في نصال الارواق فينتف عن رقات دقيقة حراء اللون تسردب النصال وتقيم فيها حتى الاكمال .

١٧٤٨٦ - **طِيثَار الشوفان \*** ، **مَيْسِيلُ الشوفان** Mayetiola avenae (S). Cécidomyie de l'avoine (F). حشرة من الطياريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م . لونها الى الوردية يعلوها مواج جزوي || رقاتها تركب الشوفان وتقتل فيه قبل الطيار المبيد في القمح والشيلم .

١٧٤٨٧ - **طِيثَار الصنوبر** Cécidomyia pini (S). Cécidomyie du pin (F).

حشرة من فصيلة الطياريات . جسمها شديد الصغر يطول من ٢ الى ٣ م . رأسها مكور ، شديد السمة . عينهاا زيمتجان . زباناهاا عيطيلان ، مستطيلان . صدرها الى السرة المجردة المواج . بطنها الى السرة الحمراء المواج . زيفها الى الغبرة النفضية . ورشناهاا قسطنطينا اللون . قوائمها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر حزيران . تألف حراج الصنوبر . تمتع الاثني مكها في القشور قرب الندبات التي يسيل منها الراتنج البرقة يرقنقالية اللون تميش على المواد الخشبية والراتنجية حتى الاكمال .

١٧٤٨٨ - **طِيثَار العوسج** Lasioptera rubi (S). Lasiophtère des ronces, Cécidomyie des ronces (F).

حشرة من فصيلة الطياريات . جسمها شديد الصغر يطول من ٢ الى ٣ م . رأسها مقلطح . عينهاا زيمتجان . زباناهاا عيطيان . صدرها اصفر تملوه ثلاثة خطوط سود ملتحة القاعد . بطنها يرمي الشكل اغبر ، تملو ستة خطوط معرصة . مرزها مستطيل . ورشناهاا صفيان ابيضان . قوائمها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف المواق التي يكثر فيها العوسج || تمتع الاثني مكها على الصالحج فينتف بعد عشرة ايام عن رقات يبيض اللون تبقى بجمعة حتى الاكمال قترنق القشور وتمعلها .

١٧٤٨٩ - **طِيثَار القمح \*** Mayetiola tritici, Contarinia tritici (S). Cécidomyie du blé (F). Wheat midge (E). Weizengallmücke (D). حشرة من الطياريات صغيرة اللون طويلا من ٢ الى ٣ م . لونها الى الصفرة تمتع مكها عند قاعدة سفا البر فينتف عن رقات تقفي عليه قبل تمام تكويته .

١٧٤٩٠ - **طِيثَار القنيط \*** Contarinia nasturtii, C. torquens (S). Cécidomyie du chou-fleur (F). Swede midge (E). Kohlgallmücke (D).

حشرة من الطياريات صغيرة اللون طويلا لا يتجاوز ٢ م . لونها فسفي اللون . ورشهاا خلية . تركب القنيط في اول عهده فتنتج مكها على برعم القلب فينتف عن رقات تلثمها ثم تعود الى الارواق فتنتج بها . اجيالها الحولية ثلاثة .

١٧٤٩١ - **طِيثَار الكرمة \*** Contarinia viticola (S). Cécidomyie de la vigne (F). Grape midge (E). Rebenblüten-gallmücke (D).

حشرة من الطياريات صغيرة اللون طويلا نحو ٣ م . لونها اسمر اللون يعلوه مواج اغبر . تمتع مكها على حورات الكرمة (الحشرة هي الزمعة بعد الاكاث) فينتف عن رقات تقوض داخل الحورات وتقضي عليها .

١٧٤٩٦ - **طِيَامَة \*** Patrogonie (F). Patrogonie (E). الطيامة نظرية بيولوجية فحولها ان كل جنس حيواني يمر ، في تكوينه الجنيني ، بمراحل نمازية متسلسلة الظواهر النشائية تقدي في نهاية الملاف الى الشكل المنتظر .

١٧٤٩٧ - **طِيَب** Parfum (F). Perfume (E). كل ذي رائحة عطرة فوحاسة مستحبة من العطور والادهان . ج الطيباب وطوب .

١٧٤٩٨ - **طِيَب الْعَرَب** هو الاذخر ، اعطيه .

١٧٤٩٩ - **طِيَبْط** طائر من طوالب الساق يعرف بابي طيب ، اعطيه .

١٧٤٨٠ - **طِيَبْط مَتَوَجَّ** Vanneau huppé (F). راجع ابو طيب متوج .

١٧٤٨١ - **طِيَار \*** Cécidomyia (S). جنس حشرات فارة من فصيلة الطياريات انواعه عديدة جميعها صغيرة اللد تمتع مكها على النبات فينتف عن رقات مؤذية تسبب الكثير من الاضرار || اشهر انواعه واشدها اذى ما يقع .

١٧٤٨٢ - **طِيَار الاجاص \*** Contarinia pyryvoxa (S). Cécidomyie des poires (F). Pear midge (E). Birnengallmücke (D).

حشرة من الطياريات طويلا يراوح بين ٢ و ٣ م . رأسها اسود . زباناهاا عيطية خطية تتألف من ٢٦ فاصلة . جوفهاا اسود يشوبه مواج قصي . ارجلهاا خطية زيا . انتاء تمتع مكها في زمرة الاجاص فينتف عن رقات تلثم الشرة أثناء نموهاا فتسود وتملص || اضراره قد تكون كثيرة في الانواع الباكورية . يكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة غير المرتكزة على النحاس .

١٧٤٨٣ - **طِيَار البنفسج \*** Perrisia affinis (S). Cécidomyie des violettes (F).

حشرة من الطياريات صغيرة اللد ، حطية اللون ، زيا الجسم . تركب اوراق البنفسج فتنتجها وتمنع مكها على صفحاتها السفلى فينتف عن رقات دقيقة فراء اللون تلثم النصل فتؤدي النبات وتضمم الاضرار بعد ان تسبب قتلها .

١٧٤٨٤ - **طِيَار الغلب \*** Perrisia cenophila (S). Cécidomyie des feuilles de vigne (F).

حشرة من الطياريات صغيرة اللد سمر اللون تركب خلب الكرمة فتنتج مكها في البروق فينتف عن رقات دقيقة نغيلة لونها الى الصفرة تميش تحت البشرة على حبيرات ونسج العروق .

١٧٤٨٥ - **طِيَار السنديان** Lestremia leucophaea (S).

Cécidomyie du chêne (F).

حشرة من فصيلة الطياريات . جسمها شديد الصغر ، يطول نحو ٢ م . || لونها الى السرة الصفراء المواج . رأسها مكور . عينهاا زيمتجان . زباناهاا مستطيلان . ملاسهاا رباعية الاجزاء . قوائمها مستطيلة . ورشناهاا صفيان ، مخفبان || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر ايار . تألف حراج السنديان || تمتع



طيثار الاجاص



طيثار البسج



طيثار الشوفان



طيثار القمح



طيثار القنيط



طيثار الكرمة



## ١٧٤٩٢ - طَيَّار مُيِد \*، ذُبَابَة هِس

*Mayetiola destructor* (S). *Mayetiola destructor*, *Mouche de Hesse* (F). *Hessian fly* (E). *Hessen fliege* (D).

حشرة من الطيارات. طولها يراوح بين ٢ و ٤ م. ثوبها الى الطلحة السراء. يطنها الى الحشرة. زباناها مركبة من ١٤ فاصلة || تركب القنص والقيل والشعر. تظهر في نيسان ثم تمتص مكبا في حلف الزرع فيقتل هن رقات دقيقة تلمن النصل وتتجه نحو الكبرية حيث تمتص التسع وتسبب ذبول الحلف والسيلاب.

١٧٤٩٣ - طَيَّار وَرَق الاجاص \* (S). *Perrisia pyri* (S). *Cécidomyie des feuilles de poirier* (F).

حشرة من الطيارات صغيرة القند طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السرة الخفيفة. تظهر في اوائل الربيع فتتركب اوراق الاجاص وتنتج مكبا على مسحاتها السفلى فيقتل هن رقات تتمركز عند اطراف النصل حيث تعيش على الحبيبات النامية فتطعمها وتشنجها وتثقل عملها فيزولوي الحيوي. لها جيلان في الحول الواحد.

١٧٤٩٤ - طَيَّارَات (S). *Cecidomyiidae*, *Itonididae* (S). *Cécidomyiidae*, *Itonididae* (F). *Cecidomyiidae*, *Gall gnats* (E). *Gallmücken* (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة زهاء ٣.٠٠٠ جميعها صغيرة القند. اجسامها مستطيلة رقيقة. ارجلها نحيلة وطويلة. قرونها الاستشعارية قلابية الشكل حلبي، تطول في الذكور وتقتصر في الاناث. رقاتها دقيقة، صغيرة، مدببة الاطراف. منطها خاضل وبعضها طفيل او مفترس. تعيش على التيجليات والائليات والركسك وبعض الاشجار والنباتات الفطرية. فتقتضي على السنج المجبرية وتسبب الاورام في غلظت الاجزاء التي تصيبها كالبراعم والازهار والثمار والاوراق والسوق والجذور.

## ١٧٤٩٥ - طَيَّر، طَيُّور، أَطَيَّار

*Oiseaux* (F). *Birds* (E).

مفرد الطير طائر. والطير صف حيوانات من الفقاريات. انواعها المعروفة زهاء ٢٥.٠٠٠ تقسم الى ثلاث فئات او شعب: (١) الجوزجيات؛ (٢) الراكص او العوادي؛ (٣) عذجات الريش.

اما رتبها وفصلاتها، حسب التصنيف الحديث، فهي موضوع الجدول التابع على الصفحة التالية.

١٧٤٩٦ - طَيَّر، تَسَر طَائِر (F). *Altair* (E).

الطير او النسر الطائر نجم ثير من كوكبة العقاب. مركزه في رأس العقاب قبالة النسر الواقع من كوكبة القيثارة. يبعد عن الارض نحو ١٦ سنة ضوئية.

١٧٤٩٧ - طَيَّر الْعَرَاقِيب هو الشرق، اطلبه.

١٧٤٩٨ - طَيَّر اللَّبَل هو الخفاش، اطلبه.

١٧٤٩٩ - طَيَّرَان (F). *Flock* (E).

انتقال الطير وبعض الحشرات التي تسير في الفضاء بواسطة اجنحتها.

١٧٥٠٠ - طَيَّرَة \* *Myripristis* (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البقديات الشائكات الزعانف. انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بحار المناطق الحارة انحصارها البحر الاحمر والمتوسط. اجسامها صغيرة القند طولها يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم. اوتهاا جميلة الالوان الزاهية فيها الاحمر والارزوني والوردي والاشهب والفضي.

١٧٥٠١ - طَيَّرَات (F). *Ornithologie* (F). *Ornithology* (E).

الطريات او علم الطير جزء من علم الموالية يبحث في الطيور.

١٧٥٠٢ - طَيَّس (F). *Myriad* (E). *Myriades* (F). *Myriad* (E).

الطيس العدد الحاصل بكثرته.

١٧٥٠٣ - طَيَّسِي \* (F). *Thalassophile* (F). *Thalassophile* (E).

نمت ترميني يطلق على كل حشرة تعيش بعض ادوار حياتها في البحر او في الماء الاجاج.

١٧٥٠٤ - طَيَّسَل (F). *Pruine* (F). *Bloom* (E).

مادة عضوية لزجة مستنقة ناعمة كثر الغبار تغشي بشرة الثمار والقطور وما اشبه.

١٧٥٠٥ - طَيَّشَرَة \* (F). *Tischeria* (S). *Tischeria* (F). *Tischeria* (E).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اعطائها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف الحراج التي يكثر فيها السديان || جسمها صغير، نحيل، شبه اسطواني الشكل. بسطها نحو ١٠ م. رأسها معتدل الحجم يكسو بعض السهف. عينها صغيرتان، بارزتان. غطها صغير. ملمسها قصيران. زباناها غطيان، مستطيلتان. اجنحتها خفيفة، لامسارية الاعداد. بطنها نحيل، كثيف الخمل. ثوبها الى السرة التينية المواج || سرقتها غاصلة تعيش على اوراق النباتات الحربية. انحصار السديان والمخلول.

١٧٥٠٦ - طَيَّشَرَة مُعَلَّسَة \*

*Tischeria complanata* (S).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف حراج السديان والزان والمفص والمخلول || جسمها صغير القند. بسطها نحو ٨ م. رأسها معتدل الحجم. عينها صغيرتان، بارزتان. غطها ولباسها قصيرة. زباناها غطيان. اجنحتها خفيفة، مدببة الاطراف. بطنها متكاثف الخمل. ثوبها الى الطلحة السراء المواج || سرقتها صغيرة، دقيقة، رقالة. تلمن نصال الاوراق وتعيش بين البشريات.

١٧٥٠٧ - طَيَّشَرَات \* (F). *Tischeriidae* (S).

*Tischeriidae* (F). *Tischeriidae* (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض الاقاليم البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة قضيبة. رؤوسها معتدلة الحجم. لهاغاتها مسترة بمضغغ حشرية. عيونها كبيرة، ناشرة. قرونها الاستشعارية غطية.



طيار سيد



طيرة



طيرة

## الطير : شعبها ورتبها وفضائلها (حسب التصنيف الحديث)

شعبة	رتبة	فصيلة
جَوَائِدُ	دَوَائِدُ الشَّكْلِ	تَوَائِدُ ، طَوَائِدُ ، مُرَوَّيَاتُ ، تَغَوَّيَاتُ ، رُزَمِيَّاتُ ، كَارُوَّيَاتُ ، دَرَبَائِيَّاتُ ، دُرُوَّيَاتُ ، نَحَّاسِيَّاتُ ، مِغَزَّيَاتُ ، قَبَسِيَّاتُ ، زَطَرَوِيَّاتُ ، مَزُونَاتُ ، دُغَرِيَّاتُ ، مَرَقَلَاتُ ، بُسِيَّاتُ ، قَوْقِيَّاتُ ، عَصَافِيرُ الشَّرَا ، شَقَقِيَّاتُ ، وَصَمِيَّاتُ ، هَمَزِيَّاتُ ، شُحُورَوِيَّاتُ ، صَوَّيَاتُ ، دُخْلِيَّاتُ ، مِدْيَائِيَّاتُ ، خَلِيَّاتُ ، كَايَّاتُ ، كَيْدِيَّاتُ ، عَرِيَّاتُ ، كَسِيَّاتُ ، جَرِيَّاتُ ، دَوَلِّيَّاتُ ، صَخَائِيَّاتُ ، رُحِيَّاتُ ، قُرَدُوَّيَّاتُ ، غَرَلِيَّاتُ ، كَلْبَسِيَّاتُ ، غَرَابِيَّاتُ ، زُرُورِيَّاتُ ، غَرَمَلُوَّيَّاتُ ، دَكُرَوِيَّاتُ ، تَيْبَرِيَّاتُ ، مَرَدِيَّاتُ ، بَقَائِيَّاتُ ، قَنَاصِيَّاتُ ، بَعَائِيَّاتُ ، خَطَائِيَّاتُ ، كَرِيَّاتُ ، مَانَوِيَّاتُ ، فُلَيْيَّاتُ ، كَيْشِيَّاتُ ، عُنَاجِيَّاتُ ، قُبُورَوِيَّاتُ ، عَصَوِيَّاتُ ، قَلَنْجِيَّاتُ ، بُوَرِيَّاتُ ، رَمَازِيَّاتُ ، كَتَابِيَّاتُ ، جَيْلِيَّاتُ ، رُزَارِيَّاتُ ، طَوَائِدُ ، بَلَصُوجِيَّاتُ .
	نَاقِرِيَّاتُ الشَّكْلِ	فَلَوَّيَّاتُ ، بَقَائِيَّاتُ ، غَائِيَّاتُ ، طَوَقَائِيَّاتُ ، خِرِيَّاتُ ، نَقَارِيَّاتُ .
	ضَوْغِيَّاتُ الشَّكْلِ	قَرَلَائِيَّاتُ ، نُوَدِيَّاتُ ، مَطْمُوَّيَّاتُ ، خُضَارِيَّاتُ ، ضَوْغِيَّاتُ ، بَيْرَزَائِيَّاتُ ، لُبَطُوَّيَّاتُ ، هُدَعْدِيَّاتُ ، شَذَائِيَّاتُ ، أُرْكُوَّيَّاتُ .
	طُرُغُوَّيَّاتُ الشَّكْلِ	طُرُغُوَّيَّاتُ
	سَمَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	سَمَائِيَّاتُ ، حَيَّيَّاتُ ، هَرَمِيَّاتُ
	سَبِيَّاتُ الشَّكْلِ	سَبِيَّاتُ ، غَوَّيَّاتُ ، بَكِيَّاتُ ، بَذَرُغُوَّيَّاتُ ، عُونَارِيَّاتُ
	بُويَّاتُ الشَّكْلِ	بُويَّاتُ ، بَغِيَّاتُ
	قُبُورِيَّاتُ الشَّكْلِ	مَوَازِيَّاتُ ، قُبُورِيَّاتُ
	جَوَرِيَّاتُ الشَّكْلِ	جَوَرِيَّاتُ
	بَيْغَاوَاتُ الشَّكْلِ	بَيْغَاوَاتُ ، دَرَاتُ
	حَمَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	حَمَائِيَّاتُ ، دَرَنَكُوَّيَّاتُ ، دَيْمِيَّاتُ ، غَفُورِيَّاتُ
	زَقَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	جَبِيَّاتُ ، زَنْجِيَّاتُ ، سَلَاجِيَّاتُ ، زَقَائِيَّاتُ ، دُجَائِيَّاتُ الْأَرْضِ ، عَلَمَائِيَّاتُ ، نَكَائِيَّاتُ ، حُنُكُوَّيَّاتُ ، بَرَهِنِيَّاتُ ، سَرِيَّاتُ ، بَنُكُوَّيَّاتُ ، شُوَّيَّاتُ ، كَرَكْرِيَّاتُ ، نَوْرِيَّاتُ ، عَجْهُوَّيَّاتُ ، بَطْرِيقِيَّاتُ .
	كُرِّيَّاتُ الشَّكْلِ	هَلْدَائِيَّاتُ ، نَعُورِيَّاتُ ، كُرْكِيَّاتُ ، رَعَائِيَّاتُ ، بَغَمِيَّاتُ ، بَقَلِيَّاتُ ، هَرَمِيَّاتُ ، غَشُوَّيَّاتُ ، كَرَزَائِيَّاتُ ، كَرَبِيَّاتُ ، حَبَارِيَّاتُ .
	دُجَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	طَبُورِيَّاتُ ، نَدَرِيَّاتُ ، غُرُورِيَّاتُ ، حَيَّيَّاتُ ، شَقَائِيَّاتُ ، عُرْنَائِيَّاتُ ، هُرَائِيَّاتُ .
	صَفَرِيَّاتُ الشَّكْلِ	نَسْرِيَّاتُ ، بُعَائِيَّاتُ ، قُفُيَّاتُ ، اِنشُورِيَّاتُ ، بَرَاةُ ، مَرُونِيَّاتُ ، صَفَرِيَّاتُ .
	وَزَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	بَطَائِيَّاتُ ، كَمِيَّاتُ
	نُحَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	نُحَائِيَّاتُ
	أَلَقَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	أَلَقَائِيَّاتُ ، عَلَامِيَّاتُ ، سَلَائِيَّاتُ ، عَوْقِيَّاتُ ، بَلَشُوَّيَّاتُ .
	بَجِيَّاتُ الشَّكْلِ	قُبُورِيَّاتُ ، بَجِيَّاتُ ، أَلَحَائِيَّاتُ ، غَائِيَّاتُ ، زُفَّاتُ ، شَائِيَّاتُ .
	رُعَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	فَقَرَسِيَّاتُ ، رُعَائِيَّاتُ ، عَفَائِيَّاتُ ، عَوَامِيَّاتُ .
	عَطَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	عَطَائِيَّاتُ
	عَمَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	عَمَائِيَّاتُ
	رَقُورِيَّاتُ الشَّكْلِ	رَقُورِيَّاتُ
رَوَاكِيضُ	كَبِيرِيَّاتُ الشَّكْلِ	كَبِيرِيَّاتُ
	شَبِيَّاتُ الشَّكْلِ	شَبِيَّاتُ ، دُرُومِيَّاتُ
	رُزَمَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	رُزَمَائِيَّاتُ
	نَعَائِيَّاتُ الشَّكْلِ	نَعَائِيَّاتُ
عَلِيمَاتُ الرِّيشِ	مُطَنِّجَاتُ الشَّكْلِ	مُطَنِّجَاتُ ، طَرُوسِيَّاتُ



طيطن صغير

ونبه يبيض . اياهه وقواده وكلاه سود الخمار . منقاره احمر الانتشاب جزوي للملاط . سيقانه الى الاحمر القرمزي || سره قليل البعد من ٦ الى ١٢ . يأنف المنافع وضفاف المياه العذبة . يفتن عشه بين اشعاب المنافع .

#### ١٧٥١٤ - طيطنوي أخضر\* ، تسناسة

*Totanus ochropus, Tringa ochropus* (S). Chevalier cul-blanc (F). Green sandpiper (E).

طائر من الطيطوي موطنه حوض البحر المتوسط . يحوي من مصفه الى مشاته منظم بلاد الشرق واوروبا وافريقية الشمالية والشرقية || يأنف المنافع وضفاف المياه العذبة . يفتن عشه بين الاشعاب قرب الماء || ثوبه متركب الالوان الزاهية اخضر المولج . انفيه ناصع الياض . منقاره اسمر . سيقانه الى الخضر الزيتوني .



طيطوي احمر الساق

#### ١٧٥١٥ - طيطنوي البتاتح\*

*Totanus stagnatilis, Tringa stagnatilis* (S). Chevalier stagnatille, C. à pieds verts (F). Marsh sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٤ . رأسه وعنه الى الابيض الرمادي يملو تخطيط اسود مستطيل . ظهره الى الرمادي الاحمر تملو رقة سوداء . صدره وبطنه واخفيه الى البياض الناصع تتخلله رقة برءاء مبيضة . اياهه وقواده مبيقة . منقاره اسود . سيقانه الى الخضر الزيتوني . سره من ٢٠ الى ٥٠ . يأنف المنافع وضفاف الانهر والبحيرات . يسبح ويغوص . يفتن عشه في المنافع فوق التراب . افصوه مستطيل الشكل قليل السمك .



طيطوي اخضر

#### ١٧٥١٦ - طيطنوي الغياض\*

*Totanus glareola, Tringa glareola* (S). Chevalier sylvain (F). Wood sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه متركب الالوان مرط || يبيض أزواجاً متفرقة تتجمع الى اسراب عند التزوج . يأنف المنافع وضفاف الانهار والبحيرات . يفتن عشه في الخللج وفي الادغال .



طيطوي البتاتح

#### ١٧٥١٧ - طيطنوي سلطاني\*

*Totanus griseus* (S). Chevalier gris, C. aboyeur (F). Greyshank (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متركب الالوان الزاهية . ظهره اسود الريش . ريشه جزوي الخمار منق بالابيض . رأسه وعنه تخطيط بالابيض بطنه واخفيه ييضوان . ذنبه موشج بالرمادي الاحمر . منقاره اسود . سيقانه الى السرة الخضراء || سره بعد من ١٢ الى ٢٠ . يأنف ضفاف الانهر والبحيرات . يفتن عشه في اشعاب المنافع فوق التراب .



طيطوي الغياض

#### ١٧٥١٨ - طيطيات

*Teuthididae* (S). *Teuthididae* (F). *Teuthididae* (E).

فصيلة اسمك بحرية من كاملات العظام . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها الى اسماك البحر الاحمر || اجسامها اهليلجية الشكل ، حشكية ، وسيدة الزعنفة الظهرية . رؤوسها معتدلة الجرم ، مغاطمها صغيرة لانسطة . اسنانها صغيرة حادة وسيدة الصف في الفكين . اعرف اجناسها الطيط .



\* طيطوي سلطاني

#### ١٧٥١٩ - طيطن \*

*Gastrophilus* (S). *Gastrophile* (F). *Gastrophilus* (E).

جنس حشرات من فصيلة الطيطيات ودية ذوات الجناحين .

ملاسها نحيلة . مرافقها صغيرة . بطونها كثيفة الحمل القصير . حذاتها مفقودة . رواشها سنانية الشكل . جريزاتها تامة . غناظها الخلفية رباعية المناسخ || اساريمها لافحة . قوتها غلايا اللون . غادراتها طليقة تتحور داخل نفق السرة . اشهر اجناسها الطيشر .

#### ١٧٥٠٨ - طيطع \*

*Teuthis* (F). *Teuthis* (E). جنس اسمك بحرية من فصيلة الطيطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصنافها البحر الاحمر || اجسامها اهليلجية الشكل ، معتدلة القفا . تطلو من ١٨ الى ٢٦ سم . اثوابها الى الحلقة تنير وتزهر في النصف السفلي وتسير في النصف العلوي وتتصرف الى الرصاصي المانيق في الرأس والظهر || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

#### ١٧٥٠٩ - طيطقان

هو كرات البر ، اخلبه .

#### ١٧٥١٠ - طيطن صغير\*

*Pteromalus puparum* (S). *Pteromale jouet* (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطيطيات . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتطفل على البشوريات والكرناتيات والذهوريات || جسمها صغير القد بطول نحو ١ م . وثلاثه خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زباناتها غطبان متفرجان . جوشها شبه اسطواني . بطنها يبيض الشكل ، مقطوم القاعدة . مرزئها صغيرة مستقيمة . اجنتها ودية تغلوا مشحة زرقاء خفيفة . ثوبها الى الخضر الالامع الاسف المولج .

#### ١٧٥١١ - طيطنات

*Pteromalidae* (S). *Pteromalidae* (E).

فصيلة حشرات من ذبة غشايات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ جميعها نافعة تتطفل على الحشرات المؤذية من مختلف الفصائل || حشرات صغيرة قد تطلو من ١ الى ٣ م . اجسامها رمية . جريزاتها اصفر من بطونها الخروطية المؤخر . قرونبا الاستقامية متباينة الاشكال . مرزئاتها صغيرة مستقيمة . اثوابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر || اشهر انواعها الطيطن الصغير والديراق الهم والنارزون القصير الزبان .

#### ١٧٥١٢ - طيطوي

*Totanus* (S). *Chevalier* (F). *Sandpiper* (E).

جنس طير من عمارة الطيطيات وفصيلة دجاجيات الارض . انواعه ١٥ جميعها من القواطع . اثوابها مرطفة . صدرها وبطنها يبيض . منقارها مستطيلة ، شاذجة للملاط . سيقانها دقيقة . ارسافها نحيلة || تألف المنافع ويجري الماء وضفاف الانهر والبحيرات . قوتها الحشرات وعلى اختلاف انواعها والشرافين والاسماك الصغيرة . تدن اوكارها في التراب وبين الاشعاب وفي الاجار . اناتها تبيض نحو ٣ بيضات تحضها وسدعا نحو ٣ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

#### ١٧٥١٣ - طيطنوي احمر الساق\*

*Totanus calidris, Tringa totanus* (S). Chevalier gambette, C. à pieds rouges (F). Common redshank (E).

طائر من الطيطوي . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى السرة الرمادية للزيتونية يملو تخطيط اسود مستطيل . عنقه وبطنه

1٧٥٢٨ - طَيْهَشِيَّة Spectroscopie (F).  
Spectroscopy (E).  
علم يبحث في طيف التور وهو ما يسمح ويوضح بمجموعة العناصر الكيماوية التي تركب منها الشمس.

1٧٥٢٩ - طَيْهَشَان Chlamydospore  
هو الفلّات الارسيبي الشكل الذي يلحف ويحفن يونفات الفطور ج. طيلاس.

1٧٥٣٠ - طَيْهَشَانِي Pallé (F). Palléal (E).  
نمت تعريف يطلق على كل ما هو منسوب الى رداء الرخويات وقضبات الاريل. كقوك التجويف الطليساني والاحساس الطليساني.

1٧٥٣١ - طَيْمٌ هو بهشة الديق، اطلبها.

1٧٥٣٢ - طَيْش Argile (F). Clay, Argil (E).  
الطين اي الصلصال هو سيليكات الالومينيوم المائي يوجد غالباً مخلوطاً باكسيد الحديد واكسيد المغنيز وغيرها. وهو اذا كثر في التراب صيره منديجاً صلباً. انواعه عديدة تختلف باختلاف مركباته ومقدار كل منها. وهو على اللون منه الاحمر والاخضر والجاويز والاصفر.

1٧٥٣٣ - طَيْشٌ ، وَحْلٌ ، غُرْبَلٌ Boue (F).  
Dirt, Slime, Mud (E).  
تراب نام لرج ينفمر الماء وقد يجمد على وجه الارض.

1٧٥٣٤ - طَيْشٌ خَزَقِي Bol, Argile ocreuse (F).  
نوع من الصلصال الاحمر المغربي الشان الناعم.

1٧٥٣٥ - طَيْشٌ غُرْبِي Argile colloïdale (F).  
Colloidal clay (E).  
نوع من الطين اللزج الناعم السهل التشكيل.

1٧٥٣٦ - طَيْهَشِيَّات Tinantia (S). Tinante (F).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة اليفلانيات مقودة التعريف على اسم العلامة الفرنسي طينان (١٨٠٣-١٨٥٣) || انواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها سبروتية، مهددة امريكة الوسطى. سرتها غرابة لينة تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنانية تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣. تصلها جادة الصفحة، خلي البشرة العليا، امط السفل. انزهارها عشوي التجميع، تاجي الزركاز. ازهارها زرقاء اللون او بنفسجية || تنموها يستمر من تموز الى تشرين.

1٧٥٣٧ - طَيْهَش دَبَاغ Prionus coriarius (S).  
Prione tanneur (F). Prionus coriarius (E).

حشرة خاشبة من فصيلة القرنيبات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها البلاد المعتدلة الحارة. تألف الاحراج. خنافسها تعيش على غزو ثمارها الموي. يوقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة في جنود وجنود الاشجار اليابسة || جسمها كبير القد يطول من ٣٠ الى ٤٠ م. ثوبها ثنائي اللون، رأسها وزباناها وكوسلها وبطنها وبرازمها الى السواد النحسي، ظهرها الى البصرة الكستنية. رأسها كبير الجرم. عينها صيرتان. زباناها كيرتان منسفلتان الى الوراء، منسفلتان عند الذكر، نحيلان عند الانثى. ظهرها مقطوع المؤخر اللامع. غداها شديدة الصلابة. برداها كيرتان القد، حنطية اللون || جبلها ثلاثي الحول.

انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد تطول من ١٢ الى ١٦ م. رؤوسها كبيرة، مستعرة. عيونها كبيرة جاحضة، متباعدة عند الثقلين. قرونها الاستشعارية شديدة القصير تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطائها وملابسها صغيرة. كواسلها مكورة، كثيفة الخمل. بطونها يرمية متكاثفة الخمل. مرزاتها ذرية. رواشها كبيرة، مقبجة. قوائمها نشطة. طيراتها سريع الحركة، بعيد العين || الجملة تسرح في كل مكان وتتصقب ذوات الحافر. البرقة تنتقل باللمس الى اغشية الفم الحاطية ثم الى المدة حيث تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث.

1٧٥٢٠ - طَيْهَشِيَّات Gasterophilidae (S).  
Gastérophilidés (F). Gasterophilidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم. تألف الاساكن التي ترتادها الحافريات ان داجنة || متوسطة || اجسامها متوسطة القد، تطول من ١٠ الى ١٦ م. رؤوسها كبيرة، مستعرة. عيونها كبيرة، جاحضة، متباعدة عند الثقلين. قرونها الاستشعارية قصيرة. اعطائها ضامرة. ملابسها صغيرة. كواسلها مكورة، كثيفة الخمل القصير. بطونها يرمية للشكل، متكاثفة الخمل. مرزاتها صلبة. رواشها قليلة التضخيم. قوائمها نشطة. طيراتها سريع الحركة شديد العين، بعيد || الاثني تهريق المكن فدياً على ذوات الحافر. يرقاتها شبه الحليبية الشكل، مبطة، عشارية السكر. تعيش المرحلة الاولى من عمرها في اغشية الفم الحاطية ثم تنتقل الى المدة فتستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث || اشهر اجناسها الطيلطن.

1٧٥٢١ - طَيْعٌ Humidifier (F). To damp (E).  
لين التي بواسطه المطيع الذي يؤين الرطوبة اللازمة.

1٧٥٢٢ - طَيْفٌ Spectre (F).  
Spectre, Spectrum (E).

1٧٥٢٣ - طَيْفٌ عَيْطِي Raie noire du spectre (F). Spectrum-line (E).

1٧٥٢٤ - طَيْفٌ قَيْسي، طَيْفٌ الشُّور Spectre solaire (F). Solar spectre (E).  
مجسمة الاشعة الملوثة الناتجة عن تفكك الضوء الشمسي.

1٧٥٢٥ - طَيْفٌ صَوْتِي Spectre du son (F).  
Spectrum sound (E).

1٧٥٢٦ - طَيْفٌ ضَوئي Spectre de la lumière (F).  
Spectrum light (E).

1٧٥٢٧ - طَيْفُورٌ Aegialites (S). Aegialite (F).  
طائر من طراز الساق وفصيلة الزرقائيات. موطنه الشطوط البحرية وضفاف الانهر والبحيرات. قوته الحشرات والدعاصيص والديدان والحوام. يمشى جماعات قليلة العدد || جسمه صغير القد، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الملوي جبل الطحلة الخضراء المواج. ثوبه السفلي الى البياض الماجي. عنقه مطروق بالاسود. رأسه ميقب بالاسود والجاويز. جناحه ذلق الطرف يلحف الذنب. ذنبه غروبي الشكل، صغير الجرم. ساقه نحيلة قيمة سمراء اللون.



طيفور



طيش دباغ

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تسمى في الليل . تسافد بعد ظهورها باسبوح . تركز الحكن في شقوق الخشب المطروح ارساً || البرقة عنه يلوغها الكيال طول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ جرمه اسطواني الشكل ، خطي اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً يقضي في التربة ضمن صلبة من المواد الليفية والعضوية المجتمعة بالريال .



طيهوج قيثاري

### ١٧٥٤٣ - طيور الفردوس

Oiseaux de paradis (F). Birds of paradise (E).  
طيور من مختلف الاجناس والانواع تنتمي الى فصيلة الفردوسيات ورثة الجواثم . وهي مشهورة بفرم نحو ارباشها الجميلة الالوان .

### ١٧٥٤٤ - طيور أهلية ، طيور داجنة

Volailles (F). Poultry, Fowls (E).  
هي الطيور التي صار البادعا وتربيتها فاصبحت اليفة تعيش مع الانسان ولا تخشاه كالحمام والديجاج والجهشيات وبعض البيط والالوز والغرغر .

### ١٧٥٤٥ - طيور لا تحسن بيضها

Oiseaux qui ne couvent pas (F).  
الطيور التي لا تحسن بيضها كثيرة المدد تنجسها مشرة اجناس تنتمي الى اربع فصائل : الشقيقيات ، الشقيقيات الخريقيات والكاروبيقيات .  
اما اجناسها فهي :

Indicateur (F).

الخريقت

Scythrops (F).

السُروب

Mégapoda (F).

الشقيقان

Oxylophes-geai (F).

الصصف

Mégacéphale (F).

الطيطاب

Eudynamis (F).

العلميس

Molothre (F).

الفلّاس

Cathérure (F).

النهق

Coucou (F).

الولواق

Lelpoa (F).

الليتنوح



طيهوج كبير

### ١٧٥٤٦ - طيور هو عجل الحبوب ، اطلبه .

Oiselier (F).

طيوري

Bird-seller, Bird-fancier

هو بائع الطيور .

Germandrée (F).

١٧٥٤٨ - طيوريرين

هو الطوريون ، اطلبه .

Aunée visqueuse (F).

١٧٥٤٩ - طيبين

هو الطبايق . اطلبه .

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تسمى في الليل . تسافد بعد ظهورها باسبوح . تركز الحكن في شقوق الخشب المطروح ارساً || البرقة عنه يلوغها الكيال طول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ جرمه اسطواني الشكل ، خطي اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً يقضي في التربة ضمن صلبة من المواد الليفية والعضوية المجتمعة بالريال .

### ١٧٥٣٨ - طيهوج ، خريست

Tétrás (F).

Grouse (E).

جنس طير من عمارة الخريسيات وفصيلة الطيهوجيات له نومان القيثاري والكبير || والطيوج يتميز بكبر الجثة وكثافة الريش . متفاره غليظ الخطم الاعلى ، حاد الحلقه ، اعقف البيرة . ثوبه متراكب الالوان المتناخلة العابقة الالامة . وهو يختلف بين الذكر والانثى || يأنف الاجراج الجبلية الكثيفة البريدة عن العمران . قوته البرام والبار والحجوب والبيدان والحشرات || انشاء تنش في افحوص تدبره بين الخللج والخفاش حيث تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وسعدا نحو ٣ اسابيع .

### ١٧٥٣٩ - طيهوج قيثاري ، خريست الشرق ،

ديك التامول

Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix (S). Tétrás lyre, Petit coq de bruyère, Tétrás à queue fourchue, Coq des bouleaux (F).

طائر من الطيهوج متوسط القد طول الذكر يراوح بين ٤٥ و ٦٥ سم . وطول الانثى من ٤٥ الى ٥٥ . ثوبه متراكب الالوان يغلب فيه الازرق الاسفع الموج والاسود الشديد الالمة . افنيكه مستدير الريش الجانبي على شكل قيثارة . زمكاه بيضاء الريش يبرزه من مناكبه واباهره || موطنه فسح الارباع . يرغب في الموامع الرطبة القليلة الارتفاع . يكثر وجوده في الشرق .

### ١٧٥٤٠ - طيهوج كبير ، خريست الجبعل ،

ديك الخلتنج

Tetrao urogallus (S). Tétrás urogalle, Grand coq de bruyère, Grand tétras (F). Capercaille, Cock of the wood (E). Auerhuhn (D).

طائر من الطيهوج . كبير الجثة ، طوله يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . ثوبه متراكب الالوان العابقة الالامة . افنيكه اسود اللون مستدير الشكل يتألف من ١٨ ريشة . الانثى اصغر حجماً من الذكر ثوبها الى الصبغة الصفراء يعلوه التوشم الاسمر من الرأس الى الاقنيك ومن الحلق الى الزنكيك || موطنه شامع الاطراف يمتد من الهنت الى شمالي اوروبة . يأنف الاجراج الكثيفة انحصا اسراج الصنوبر .

Tetraonidae (S).

Tetraonidae (E).

١٧٥٤١ - طيهوجيات

فصيلة طير من رتبة الديجاجيات اطارها مختلفة الاجسام

# ظ



ظلي



ظلي التبت

١٧٥٥٥ - ظبياء

الظبياء كواكب .

Acacia mellifera (F).

١٧٥٥٦ - ظبية

هي السط الممل من الاشجار المغيرة الزهر التي يكثر وجودها في بعض ضفاف جزيرة العرب .

Ajuster (F). To adjust (E).

١٧٥٥٧ - ظبط

Antilope (F). Antelope (E).

١٧٥٥٨ - ظبي \*

حيوان وحيد الجنس والنوع من ذوات الظلف المخترات المخرجات القرون . وهو رقيق القوام ابيض القد ، يطول نحو ١٢٠ سم . ويعلو ٨٠ سم ، بينا ذنبه لا يتجاوز ١٦ سم . رأسه معتدل القد ، خطمه مستدير الطرف ، عيناه كبيرتان فرحان . اذناه جالستان محدثان . جرائزه دقيقة وقوية . ثوبه يختلف باختلاف الشق والمصر . الذكور البالغة اعين ثوبا من الاناث والذكور الفتية . قرون ذكورها منتصبة ، متتابة الحيد ، خماسية الدورة اللولبية تطول نحو ٥٠ سم . اما الاناث فجاء الرووس . ثنائية الاخلاف ، فردية الطل . ج ظباء .

Cephalope (F).

١٧٥٥٩ - ظبي أزرق

هو الحلم ، اطلبه .

Cervicapre (F).

١٧٥٦٠ - ظبي أسود

هو الغفر ، اطلبه .

١٧٥٦١ - ظبي التبت \* ، شيرو

Pantholops Hodgson (S). Pantholops de Hodgson, Chiru, Antilope tibétaine (F).

شيرو هو الاسم المشهور في بلاد التبت . حيوان لبون مجتر من الظباء . موطنه نجد التبت من ارتفاع ٤٠٠٠ الى

Ectoproctes (F).

١٧٥٥٠ - ظاهريات الشرج

Ectoprocta (E).

ظاهرات الشرج فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز بنشوز الشرج خارج نطاق اللوامس .

١٧٥٥١ - ظاهريات المتك

Ectognathes, Ectotrophes (F).

رتبة حشرات دابة من طائفة هدية الاذنان . تتميز بالانلاق متكها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل غطية الشكل . اجسامها مستطيلة يكثر فيها الشكل المزدني . جميعها دالة هواكة ومنها الناملة والقارضة التي تلحس الكتب والياب . اجناسها وانواعها زهاء ٣٥٠ تجمع الى فصيلتين : الشحيبيات والظنبوريات .

١٧٥٥٢ - ظاهريات زوئية

Manifestations orageuses (F). Tempestuous manifestations (E).

هي العوامل الجوية التي تسبق او ترافق الزوايع والاعاصير كالرياح والغبار والسحب .

١٧٥٥٣ - ظاهرة ، متشع

Phénomène (F).

Phenomenon (E).

هو كل تحول يحدث في حالة الجسم او في خصائصه . فان لم يكن مصحوبا بتغير في طبيعة مادته سمي ظاهرة حكمية (فيزيائية) . اما اذا اقترن بتغير في طبيعته فهو ظاهرة كياوية .

Phénoménisme (F).

١٧٥٥٤ - ظاهرة

Phenomenism (E).

الظاهرية وتدعى الخليلولة والمنشعية ، مذهب فلسفي يقول بان المعرفة محصورة في الظواهر او في الحوادث الحسية . وهو بذلك يناقض الانتولوجية اي علم الكائنات ذلك لانه لا يبحث في الاسباب ركنية الانتولوجية .



ظربان



ظربان امريكي



ظربة



ظرو

Précaire (F).  
Precarious (E).  
١٧٥٧٣ - **ظَرِيرِي، وَكَيِي**  
قابل الإبطال والزوال .

Cloportes (F).  
Wood-louse, Slater, Sow-bug (E).  
١٧٥٧٤ - **ظَرْمُوط**  
دويبة من القشريات مساويات الأرجل مشهورة باسم حمار قبان اطلبه .

Oniscidae (S).  
Oniscidés, Cloportes (F). Wood lice, Sow bugs (E).  
Kellersasseln, Landasseln (D).  
١٧٥٧٥ - **ظَرْمُوطِيَّات**  
فصيلة دويبات من القشريات مساويات الأرجل . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من المالمين القديم والجديد || أشهر أنواعها الظرموط المعروف بحمار قبان والدُرْعَام والكُرَيْس .

Koelreuteria (S). Koelreutérie (E).  
١٧٥٧٦ - **ظَرُو \* ظَرُو**  
جنس نباتات شجرية من فصيلة البتديات . انواعه عديدة معظمها حسري وبري . جميعها اشجار وخميرات سرسة . اوراقها مركبة متعاقبة عابطة . ازهارها مستقلة الغلات ، رباعية البتلات ، صفراء اللون ، عشكوية التجميع ، تاجية الارتكاز || أشهر انواعها ما يلي .

١٧٥٧٧ - **ظَرُو أُسُود** هو اليكف ، اطلبه .

١٧٥٧٨ - **ظَرُو نُتَائِي الرِيش**  
Koelreuteria bipinnata(S). Koelreutérie bipennée(F).  
نوع من الظرو شجرته كبيرة اللقد تملو نحو ٢٠ م . اخصائها واقتناها فائقة . اوراقها تملو نحو ٧٠ سم . وريقاتها ثنائية الريش . نصلها يبيغ الشكل ، منشاري الحافة ، مالمس البشرة || عثاكيله الزهرية كبيرة اللقد قطرها ابراج بين ٤٠ و ٥٠ سم || ازهاره يذوم طول شهر تموز .

١٧٥٧٩ - **ظَرُو عَشْكَوِي**  
Koelreuteria paniculata (S). Koelreutérie paniculée (F).  
نوع من الظرو شجرته سر بوية تملو نحو ١٢ م . اخصائها واقتناها سراكية . اوراقها كبيرة اللقد ، وريقاتها عديدة وثرية التجميع ، نصلها يبيغ الشكل ، مسن الحافة ، خلل الصفحة السفلى يطلو نحو ٩ سم . ويبرس نحو ٥ . عثاكيله الزهرية فائقة قطرها نحو ٤٠ سم . ازهاره مغرية يجبرها النمل || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٥٨٠ - **ظَرُو نَحْلِي**  
Koelreuteria apiculata (S). Koelreutérie apicole (F).  
نوع من الظرو شجرته سر بوية صلبة اللقد تملو نحو ٦ اطار . اقتناها واقتناها زياء الهاء . اوراقها صلبة ، وريقاتها اعليجية الشكل ، ضيقة وقصيرة ، نصلها خلل البشرة عل صفحته || عثاكيله الزهرية كثيفة التجميع قطرها نحو ٣٠ سم . ازهاره مغرية يجبرها النمل || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٧٥٨١ - **ظَرِيرَة**  
Helminthosporium (S).  
جنس فطور مجهرية من الريدياتان فصيلة الفطريات . جربه الكيحية ملوثة منتصبة حزمة التجميع . كائناته طرية او جانية الارتكاز ، يبيغ او اعطانية الشكل ، مولورة ، شفعية الانقسام || انواعه عديدة تستغل على مختلف النباتات ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٧٥٨٠ م . عن سطح البحر . يألف السهول والودية الرية الجنبات . يسرح في الصباح ومن العصر الى الغنفة غنسه الذي يأوى اليه في النهار حفية في الرمل تخفيه عن العيون . ملجئه الحياتي فردي ، الذكر لا يقترب من الانثى الا في زين الدواق والسفاد ثم يفرقان جسم متوسط اللقد يطلو نحو ١٢٥ سم . ويرتفع نحو ٨٠ سم . ذنبه ١٨ سم ، قرنه ٦٠ سم . ثوبه الى الصهبة تسمر في الرأس والظفر وتبيض في البطن . حبة الذكر وعصره الى السرة العابطة . قرناه احيدان ، شديدا السوداء اللامع || الانثى جاء ثالثة الخلف تقص شاذنا واحدا في اوائل الصيف .

١٧٥٦٢ - **طَبِيّ الزَّوَر** (F).  
Orétrague sauteur (F).  
حيوان ليون يجز من الغباء يدعى طقار ، اطلبه .

١٧٥٦٣ - **طَبِيّ شَيْخَانَة** (F).  
Antilope tchikara (F).  
حيوان من الغباء يدعى شخانة ، اطلها .

١٧٥٦٤ - **طَبِيّ عَرِي** هو الأصفر ، اطلبه .

١٧٥٦٥ - **طَبِيَّة** (F).  
Biche (F). Hind (E).  
انثى الثبي ج غباء وطبيات واطب . كنيها ام الخنف وام شادن وام اللالا .

١٧٥٦٦ - **طَبِيَّة** (F).  
Vagin des solipèdes (F).  
Vagina of solipeds (E).

الحياء من كل ذي حافر (السان) ومنرج الوادي والجرب الصغير وربما كانت الصبوة لكيس اثنت مصفحة منها .

١٧٥٦٧ - **ظَر ، ظَرَّة** (F).  
Silax  
الحجر الصواني الاعدد الاطراف ج . ظران وأطرة .

١٧٥٦٨ - **ظَرَّو** هو التراب اليابس من شدة البرد .

١٧٥٦٩ - **ظَرْب** (F).  
Butte, Pierre saillante  
ج ظراب . ما نتأ من الحجارة .

١٧٥٧٠ - **ظَرْبَان \* ، ظَرْبَان** (S).  
Ichthomyx (S). Ictomyx (E).  
حيوان من اليايس صير الجفة ، بجنتع الرأس ، اسلم الاذنين ، صماءه يويان ، اسود السرة ابيض البطن ، قصير القروان ، منتن الرائحة الكريهة . ج ظرون .

١٧٥٧١ - **ظَرْبَان امريكي \* Mephitis (S).**  
Moufette, Moufette (F). Shunk (E).  
نوع من الظربان يعيش في امريكة يتسل باكثر صفات ظربان الجزيرة ومنها التناث التي ينفر منها الانسان والحيوان ونتاجه هذه صمدرا جراب يحيط بقاعدة الذنب يتجمع فيه مادة سائلة قذرة دحية التركيب يستعملها الظربان لغلأ عند الحوف والنفاح عن النفس . وهو بجنتع الرأس . طويل الخلف . مستطيل الذنب الكث .

١٧٥٧٢ - **ظَرْطَرَّة \* (F).**  
Petunculus (S).  
Pétoucle (F). Petunculus (E).

جنس حيوانات مجرية من الرضويات فصليات الخناجيم وفصيلة الفلكتيا . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجاز المال || اصدانها شبه مستديرة الشكل ، مساوية المصارع المنحدرة ، المنحدرة ، الملوثة || تعيش بين الصخور وفي الرمال البعيدة الدور .

طولها ٧ سم. وعرضها ٣ سم. بيضا ينحرف لونها الى الجوزة يطوقه حمار قائم || يسبب ذبول الاوراق وقلة الانتاج. يكافح بتطهير البذار قبل ذره .

**١٧٥٩٠ - ظُرَيْرُكِل \* Zorilla (S).**  
**Zorille (F). Skunk (E). Bandititis (D).**

جنس حيوانات لبونة ضارية من فصيلة السعوييات انواعه المروفة قليلة اصنافها البلاد الافريقية وفي قرية الشبه من الزرب. اجسامها مستطيلة مستقيمة طولها براوح بين ٨٥ سم. ورواسها غروبية القالب. قوائمها قصيرة، اذنانها جلطة سنانية الشكل طولها نحو ٢٥ سم. اثوابها الى الصهية السوداء ظهورها ورواسها مخططة بالابيض والاسود. قوتها الفار والجرذ والطيور والوزغ والحيات وجميع الحشرات .

**١٧٥٩١ - ظُطَيْرِش \* ، ظُطُورِش \* Zonotrichia albicollis (S).**

**Chingolo à gorge blanche (F).**  
طائر من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يألف المزارع والاماكن الاطعمة كاللدوري . نظامه الحياتي جامعي || جسمه صغير يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة الخضراء المواج يعلوها تسبيج اسود . رأسه مرقوش بالكسني والاسني . زوره ابيض . يحسره وعنه وصدره الى الريد . حذقه عينه كسنيته اللون . متقاده ورساه الى السمرة . جناحه متدل الحنج . ذنبه مستطيل الشكل ، مغرض الطرف القليل الاستدارة || قوته البور البرية والثار العنينة . تفرده مستحب الاالحان الطلقة || يثخن عشه في الاغصان والاشجار القريبة من سطح الارض . الاثني ثيفين من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .

**١٧٥٩٢ - ظُغْنُونِ اُدْهَس \* Erythrostrana parva (S).**

**Erythrostrane rougeatre (F).**  
طائر من الفصايرب الجواثم سنيات النفاقية وفصيلة المنيابيات. اصنافه تمتد من الهند الى اوروبا يحبب هضابها وجبالها ذهابا وايابا كل عام . يألف الاذغال والنابات . قوته الحشرات المجنحة اغصنها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه يتقلب مع العمر ويختلف بين الذكر والانثى . الذكر عند بلوغه الاذكاء يكون جوي الرأس والرداء والجناح والذنب ، ازرق الحمر ، احمر الزور اصفر الصدر ، ابيض البطن . ثوب الانثى الى الشبهة السوداء تميم في الرأس والرداء وتتميز في الصدر والبطن . يثخن عشه في الشجيرات المتصلة الارتفاع بين الاغصان والفروع . الاثني تحضن بتناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

**١٧٥٩٣ - ظُغُونِ Dromedaire de somme (F).**  
**Dromedary of burden (E).**  
البعير يستعمل ويعمل عليه . ج. ثمن .

**١٧٥٩٤ - ظُفَّاف \* ، عُرُفُو Eudytes (S).**  
**Gorfu (F). Gorfu (E).**

جنس طير من عدييات القدم وكفيات القدم وفصيلة الطرسوجيات . انواعه المروفة قليلة المدد اعطاهما بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبه غروبية الشكل . حججها حتم البط المبدول . ورواسها صغيرة متوجة بكشاش ملونة . مناقبها جوية اللون ، حذقة الاذنان العليا البائرة الطعام.

**١٧٥٨٢ - ظُرَيْرُ الثُّومِ \* Helminthosporium allii (S).**

فطر مجهري يتطفل على فصوص الثوم فيمطها || مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل تركب فصوص الثوم في طورها الثشوي فتفرح القشور المتحارة بعد ان تشكها بنخامة بياضية سوداء اللون تقودها الى العطب . يكافح بتطهير الفصوص ، قبل زرعها ، بسائل الفورمول المخلول ٣ / ١ / ١ .

**١٧٥٨٣ - ظُرَيْرُ الخِيصَل \* Helminthosporium cucumerinum (S).**

فطر مجهري يتطفل على اوراق الخيار فيمطها ويؤذي النبات || مظهره الخارجي يقع فسيحة صفراء اللون قطرها نحو ١٥ سم. تركب التصل على صفحته العليا يتقابلها على السفلى لطفة خلية رصاصية || يكافح بتطهير البذار قبل استعماله .

**١٧٥٨٤ - ظُرَيْرُ الشَّاي \* Helminthosporium theae (S).**

فطر مجهري رمي يمتري جنبات الشاي اليابسة فيركب لحاء الجذوع والقضبان ويتكاثر عليها .

**١٧٥٨٥ - ظُرَيْرُ القطن \* Helminthosporium gossypii (S).**

فطر مجهري يتطفل على بعض انواع القطن في ظروف خاصة قوامها استحكام الجلفات الجوي مقرونا بارتفاع الحرارة واستمرار الارتفاع مدة من الوقت || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة وريدية او قزمية اللون تركب الاوراق والكؤوس الزهرية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

**١٧٥٨٦ - ظُرَيْرُ المَصَان \* Helminthosporium sacchari (S). Eye spot de la canne à sucre (F).**

فطر مجهري يتطفل على اوراق المصان . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة حراء اللون ، سوداء المحور ، صفراء اغمار تركب تصل الاوراق الفتية على حدود زانها الاخضر . اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

**١٧٥٨٧ - ظُرَيْرُ المِطَّاف \* Helminthosporium heveae (S).**

فطر مجهري يتطفل على المطاط في طوره الثشوي . ركب الاوراق فيرتفع يقع صغيرة مراء اللون تتحول تدريجيا الى بقع قديمة تشوه التصل دون ان تؤذي النبات .

**١٧٥٨٨ - ظُرَيْرُ الموز \* Helminthosporium musarum, H. torulosum (S).**

فطر مجهري يتطفل على اوراق ومزار الموز || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون تركب التصل بموازاة اعصابها ثم تتسع فيفسر لونها بعد ان تصعد بشرة البقعة الزهرية || وهو على الثار جفاف يحمل غائم الشرة يقودها الى اسوداد القشرة وصفها || يكافح باستعمال سائل بودرو المركب ٣ / ٣ / ٥٠ على ثلاث مرات . الاول عند ظهور الرمم على الاوراق والثانية عند ظهور الطرح والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع .

**١٧٥٨٩ - ظُرَيْرُ قَدِي \* Helminthosporium turcicum (S).**

فطر مجهري يتطفل على الذرة الصفراء وقد شوع في ظروف خاصة على المنخفضة والشوفا والشعير والمصان والارز . مظهره الخارجي يقع قديمة الشكل تركب النصف في تصل وعده . تبو ضيقة سمراء اللون ثم تستطيل وتتسع فيبلغ



ظُرَيْرُ المَصَان



ظُرَيْرُ قَدِي



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرِش



ظُغْنُونِ اُدْهَس



ظُفَّاف



اعتاقها مستطيلة . اجنحتها جديافة ، حشفية الريش .  
اذنابها جذاع كاسية . اثنوايا ملوثة ، رؤوسها واعتاقها  
وظهورها واجنحتها سود . صدورها ويطونها بيض . كشافها  
مذهبة اللون او رمادية او ليلكية || قوتها الاسماك  
والثدييات وبعض الرخويات || ملجتها الحيثاني جماعي .  
اسرابها او بالاحرى مستعمراتها تعد من ٢٠ الى ٣٠  
الف نفر .

١٧٦٠٧ - ظفيرة هي التنع البري ، اطليه .

١٧٦٠٨ - ظفيرة \* Thelyphonus (S).

Thélyphone (F).

دوية سامة من الرتيلات . مهددا البلاد الحارة والاستوائية .  
تتميز باستطالة الذنب والجرايز || فوها الى الطحلة يفر  
في الرأس ويسمر في البطن وفي اللاتط . لستها سامة  
مؤذية || تسرح في الليل وتلوى الى جنود الاشجار  
التخرة في النهار . قوتها الحوام والحشرات .

١٧٦٠٩ - ظُلّ Ombre (F). Darkness, Shade (E).

الظل هو نقيض النسخ وهو المنطقة المظلمة التي يكتسبها  
الجسم الذي يتعرض سير اشعة النور .

١٧٦١٠ - ظُلاع

داه في قوائم الدابة لا من سير ولا من تعب .

١٧٦١١ - ظنن Défaut (F). Default (E).

١٧٦١٢ - ظنن Chaleurs des chiens (F).

هو معاناة الكلاب . ويقال للكلبة المستعرة ظالمة .  
اما الكلب فظالم .

١٧٦١٣ - ظنن Ongle (F). Hoof (E).

ظفر كل حيوان يجتر كالبقرة والشاء والمز ... وهو  
كالخافر للفرس وكالف للبعير .

١٧٦١٤ - ظنن Rocailleux (F).

Rocky, Pebbly, Flinty (E).

نمت تمريني يطلق عل كل موقع تكثر فيه الصخور  
الناشرة .

١٧٦١٥ - ظلف الفرس

ظلف الفرس نجم نير من كوكبة الدجاجة .

١٧٦١٦ - ظلم Stevia, Piqueria (S). Stévie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية وتربينية من سبيل الفصيات  
وفصيلة المركبات . النواع عديدة . اوراقه ثلاثية العروق .  
السفلى منها الوسطى متقابلة اما العليا فتتاقية . ازهارها  
روئسي . روئساته مركبة من ثلاث او خمس اضعامتساوية .  
اشهر انواعها التربينية ما يتبع .

١٧٦١٧ - ظلم أَرْجُونِي Stevia purpurea (S).

Stévie pourpre (F).

عشبة معمرة تربينية جادة تملو نحو ٧٠ سم . ساقها فراء  
فاضة . اوراقها مخددة النصل ، خلية البشرة . ازهارها  
ظلفية التجميع . ارجونيات اللون || ازهارها يستمر من  
آب الى ايلول .

١٧٦١٨ - ظلم عُرْصُفِيّ الْوَرَق

Stevia isaeolia (S). Stévie à feuilles d'iva (F).

عشبة معمرة تربينية جادة تملو نحو ٦٠ سم . ساقها

١٧٥٩٥ - ظُفْر ، ظُفَر Ongie, Sabot (F).

Nail, Hoof, Claw (E).

الظفر مادة قرنية تنبت في اطراف الاصابع . ج انظار  
واظافير .

١٧٥٩٦ - ظُفْر الْعُقَاب

ظفر العقاب ضرب من الثبات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٧ - ظُفْر الْقَطْ Pied de chat

عشبة برية معروفة برجل القط ، اطليها .

١٧٥٩٨ - ظُفْر التَّسَر

ظفر التسر ضرب من الثبات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٩ - ظُفْرَاء هي التنع البري ، اطليه .

١٧٦٠٠ - ظُفْرَة

نبات حريف ينفع التروح الخبيثة والتأكيل . (اللسان) .

١٧٦٠١ - ظُفْرَة الْعُجُوز Graine de tribule

هي ثمرة الحسك . اطلب حسك .

١٧٦٠٢ - ظُفْرَة الْفَرْلان

ظفرة الفرلان كواكب (محيط المحيط) .

١٧٦٠٣ - ظُفُوف \* Tornatella (S).

Tornatella (F). Tornatella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل  
وفصيلة الباغيات . انواعها المعاصرة المروفة قليلة المد  
منتشرة في بعض مجار البلاد الحارة اخضها الهند والبحر  
الابيض المتوسط || اصدافها بيضيه مستطيلة ، محزنة  
الاعتقاب ، مستطيلة القبة الامتساوية الرخابة . حيلة  
التبقيج ، زاوية الالوان .

١٧٦٠٤ - ظُفُفَات Myriangiaceae (S).

Myriangiades (F). Myriangiaceae (E).

عمارة فلور مجهرية من فصيلة البقياس . اجناسها  
وانواعها عديدة . اجربها الزقية كروية الشكل سطحية  
الارتكاز . ازناتها ريمية . نكاتها اعليجية . غلاتها  
غشائية المادة ، نصفية ، مستعرضة || منها نوع واحد  
مؤدى للصد .

١٧٦٠٥ - ظُفُفِير ، زَأْدُكَة Onglet (F). Mitre (E).

جزء الساق المظلمة الذي يترك وتياً فوق العلم ، وهو أيضاً  
ما يترك من النصل المظلم فوق آخر عين .

١٧٦٠٦ - ظُفِير \* Cleidothaeus (S).

Cleidothère (F). Cleidothaeus (E).

حيوان بحري وحيد الجنس والنوع من الرخويات صفحيات



ظفوف



ظفر



ظفينة

اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية من الماعلين القدم والجدي || اجسامها متوسطة القد تقو من ٣ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحظة. قرونها الاستشعارية صغيرة الاطراف. تأثير الذكور مستطيلة ضليمة. كسلها كبيرة عيدة. اخادعها لافحة. اوراقها متباينة اللون منها الاجر الاسفع المواج والاخضر والبقيجي والذهبي || تألف الحراج الجبلية ولا تقرب الصنوبريات. تعيش في جلدوع الاشجار النخرة. يرقاتها غاشبة مؤذية.

Collet de l'arbre (F).

Neck of the tree (E).

هو اصل الشجرة اي مركز انتشاب الجذور على الجذع.

١٧٦٢٩ - ظنِب

\* ١٧٦٣٠ - ظنْبَار عَشَارِي النُطْ ه

Zonabris decimpunctata (S). Zonabris 10

points (F). Zonabris decimpunctata (E).

حشرة طيبة واشعة خاضلة والجمه من فصيلة الملويدات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. خنافسها تعيش على بتلات الازهار وعلى التلامي. يرقاتها تعيش في اول عيدها على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتراسه من الحشرات الدنيا. الخنافس التي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريمة الرائحة، تحوي في شواربها وفي جهازها السدي مادة نافطة تسيج بشرة الجلد وتثير الباء والايلاع || جسمها متوسط القد يعطو من ١٢ الى ١٤ سم. ثوبها اسود الرأس والكوسل والطين والجرازم، اصفر الظهران المنقط بالاسود. راسها صغير الجسم. زباناها صولجانيان. عيناها صغيرتان. ظهرها منمحل الاحديداب، مستدير الطرف الاحف. غدها خاسيتا المنقط السود || جمل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اوامر تموز. تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها بثلاثة اسابيع وتتبع المكان تحت غلاء الاشجار وتشورها وتحت الجلالة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تقو نحو ٢٠ سم. جسمها مبسط الشكل، سداسي الراويج، اغبر اللون. اسمر المواج، عنابي الرأس، ضليع التأثير || طول الاكعال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما ينقضي في التربة.

Heteropatella (S).

١٧٦٣١ - ظنْبة ه

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلايمات. يكتيادته سطحية الارتكاز، كرشية الشكل، جلدية الجلود الاسود، كوية الانفلاق. بوفاته قوسية الاحديداب، حليلة الاطراف، مؤثرة الانقسام، شفاقة || انواعه المؤذية قليلة اعراضها ما يتبع.

\* ١٧٦٣٢ - ظنْبة القَرَنْفَل ه

Heteropatella dianthi, H. veltellinensis (S).

فطر مجهري يصيب اوراق القرنفل فيعطلها ويمنعها عن القيام بوظيفتها || يبدو على الازراق في اول عيده لطفاً مستطيلة محتلة اللون ثم غبراء تركب ساقه التصل الى كامل زامه الاعل || وهو في طوره الثاني نقط سمر تملو الطبخ قشيب انصداع البشرة واعراق النسيج || يكائن بنفخ التبول باحد القواطير الخففة وذلك بعد انتفاع الازراق الموسوية. ومن الضروري انتفاع الازراق عند ظهور الطبخ.

\* ١٧٦٣٣ - ظنْبة السيسم ه

Heteropatella antirrhini (S).

فطر مجهري يصيب اوراق السيسم فيعطلها بعد ان يقرح

فرواه زياء. اوراقها عرسية الشكل، مستطيلة التصل، دقيقة الزام الاخير. ازهارها بيضاء اللون، خلية البيرة. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

Stevia eupatoria (S).

Stévia eupatoire (F).

عشة معمرة زيبينة جادسة تقو نحو ٦٠ سم. ساقها فرواه مرطاه. اوراقها سنائية التصل. سنفة الزام الاخير. ازهارها وريدة اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

١٧٦٣٠ - ظنْم مُسْتَن

Stevia serrata, Piqueria trinervia (S). Stévia dentelée (F).

عشة معمرة زيبينة سريوية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروها خلية الحاء. اوراقها متمائة، نصلا ساني الشكل، ملس البيرة، سنن الحافة. ازهارها حر. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

Solifuges (F).

١٧٦٢١ - ظنْبيَّات

رتبة من العنكبوتيات ترغب في الظل وتخشى الشمس.

Umbraticole (F).

١٧٦٢٢ - ظنْكيل ه

نمت ترميفي يطلو على كل حشرة تعيش في الظل وعلى كل نبات ينو في ظل غيره.

Pénombre (F).

Penumbra, Semi-darkness (E).

هو الظل الخفيف او شبه الظل الذي يحوق بالظل.

١٧٦٢٤ - ظنْم، عَسَلَق، عَسْج

Autruche (mâle) (F). Ostrich (male) (E).

ذكر النامج اعظمة وظلان. يقال عار الظلم حراراً اذا صوت.

١٧٦٢٥ - ظنْمَح

شجرة على صورة الدلب. وهي ايضاً شجرة التين في لنة طيبة. الواحدة لمنعة او لمنعة. ومنهم من قال شجرة الساق.

١٧٦٢٦ - ظنْمَحَة ذَهَبِيَّة الْوَرَق ه

Castanopsis chrysophylla (S).

Castanopsis à feuilles dorées (F).

شجرة حرجية وتزيبينة من فصيلة السوليات. ساقها غليظة صلفة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. هيكلها دائن الشوزن. اوراقها تقو من ٨ الى ١٨ سم. وترتض من ٣ الى ٤ سم. نصالها جرداء لامعة، صفحتها العليا الى الخضار الزبني صفحتها السفلى الى الصفار الذهبي. ثمارها قريبة الشبه بالكستنة لكنها بطيئة النمو لا تنضج الا بعد مرور سنتين كاملتين.

١٧٦٢٧ - ظنْمِيَّان

شجر ينبت بنجد يشبه القرظ (السان) والقرظ هو السط البري.

Lamprima (S).

١٧٦٢٨ - ظنْمَابَة

Lamprime (F). Lamprima (E).

جنس حشرات غاشبة من غديات الاجنحة صفحيات القرون وفصيلة المنظويات. انواعها المعروفة قليلة المدد



نُطَار عَشَارِي النُطْ



ظنْبة القَرَنْفَل



ظنْبة السيسم

تحت المكن في لحاء سوق الأشجار ينبت فيها ويحلبها ويسلبها || أشهر أنواعها وأعما انتشاراً الظفة المنزلة .

١٧٦٤١ - **ظنفة مؤنثة** \* *Emphytus cinctus* (S).  
*Emphyte ceint* (F).

نوع من الظنوب . ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها زفير اصفر || يرقاتها شديدة الاذى تعيش على سوق النبات فتخرج اللحاء والشكير .



ظنوب اسطواني

١٧٦٤٢ - **ظنهور** \* *Pleurodelus* (S).  
*Pleurodèle* (F). *Pleurodelus* (E).

ظهور هو الاسم للمربي القليل . جنس حيوانات زنادية قازية من السرفويات ووصيلة السمندليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق افريقية الشمالية بعضها المغرب || اجسامها مستطيلة الشكل ، تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رؤوسها مقلطحة ، شبه مقطوعة الاضمار . اذنانها ظهورها مسننة اختار النجى القليل للتشور . اذنانها مستطيلة ، رقيقة ، مسننة الحمار العلوي . اناؤها مزركشة وسنجة وبذبة || تألف المنافع للزناد واللاهور . قوتها للبدان والبلاغيص والحوام التي تغفل على وجه الماء .



ظنوب الناب

١٧٦٤٣ - **ظهار** هو الجانب القصير من الريش .

١٧٦٤٤ - **ظهارة** \* *Epithélium* (F). *Epithelium* (E).  
كل نسج تكون من حبيبات او خلايا صفيحية التجميع تلتف او تبطن الاجزاء الحية .

١٧٦٤٥ - **ظهاري** \* *Epithéal* (F). *Epithelial* (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالظهارة .

١٧٦٤٦ - **ظهر** \* *Dors* (F). *Back* (E).  
هو الجانب العلوي المقابل للبطن عند الحيوان يمتد من الحارك الى الكفل .

١٧٦٤٧ - **ظهركان** \* *Elytre* (F). *Elytron* (E).  
الظهر هو الفند الخدياني القرني التركيب الذي يلحف جناح الحشرة من غدييات الاجنحة . وهما ظهران وظهران وباء في الحصص عن اجنحة الجراد ما حرقته : «قالليطان يقال لها الظهران والرقيقان يقال لها القشران .»



ظنوب بحري

١٧٦٤٨ - **ظهر الأسد**  
ظهر الأسد نجيم ثير من كوكبة الاسد الاصفر .

١٧٦٤٩ - **ظهرة** \* *Tortue* (F). *Tortoise* (E).  
هي السلحفاة ، اطلسا .

١٧٦٥٠ - **ظهري** \* *Dorsal*  
نمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بظهر الحيوان .

١٧٦٥١ - **ظهريات** \* *Ficoïdées* (S). *ظهريات* (F).  
*Ficoïdées*, *Mesembryanthémacées* (F).  
*Ficoïdées* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجسامها وانواعها المعروفة زعاج ٨٠٠ معظمها بري وبعضها طبي وزراعي وربي . اعرف اجسامها الظهرية .



ظهور

١٧٦٥٢ - **ظهرة** ، **ظهيرة** \* *Mesembryanthemum* (F). *Ficoïde* (F).

ج ظهار . الاسم العلمي من اليوناني بمعنى زهرة تستصف البهار اي زهرة الظهر . جنس نباتات عشبية ليفية لحمية

نصلها || مظهر الخارجي يقع صخرة مستديرة قطرها نحو ٤ م . تركيب النصل الارزاق تقتضي على النسل المنحارة التي تيسر وتحت || يكافح عند ظهوره باقتطاع الارواق الموصونة وينفض الشيل باحد القواطير الفعالة .

١٧٦٣٤ - **ظنوب** \* *Tibia* (F). *Tibia* (E).  
الظنوب عند الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ والرسغ . ويده الساق .

١٧٦٣٥ - **ظنوب** \* *Macchilis* (S). *Macchile* (F).  
جنس حشرات دابة من فصيلة الظنوبيات . انواعه زنادية جميعها خاضعة ودائمة تعيش على العبل ولحاء الاشجار للمقطوعة . اجسامها حشرية الجلد ، منزلية الشكل تطول من ٧ الى ١٦ م . || اعرف انواعها واسمها ما يلي :

١٧٦٣٦ - **ظنوب أسطواني** \* *Macchilis cylindrica* (S). *Macchile cylindrique* (F).  
نوع من الظنوب طوله يراوح بين ٨ و ١٢ م . جسمه اسطواني الشكل ، ثوبه الى الصبغة المابقة الخطية الموج . يكثر في العيص والادغال وسياجات الجناش . يعيش على المواد المضوية السائرة الى الاختلال وعلى لحاء النباتات اليابسة والمقطوعة .

١٧٦٣٧ - **ظنوب القاب** \* *Macchilis polypode* (F).  
نوع من الظنوب طوله يراوح بين ٩ و ١٢ م . ثوبه الى الصبغة يعلوها موج اشعث ويقع سحر جانبيه . ملامحه وزبانه وقوائمها واسراك عزمة بالابيض || يكثر في الغابات والاحراج . يعيش على العبل وجميع المواد المضوية السائرة الى الاختلال .

١٧٦٣٨ - **ظنوب بحري** \* *Macchilis maritimus*, *Petrobius maritimus* (S). *Macchile maritime*, *Pétrobe maritime* (F).  
نوع من الظنوب طوله يراوح بين ١٠ و ١٤ م . ثوبه الى السمرة السفعاء الموج ، زبانه وقوائمها سوية اللون الخشن الماين . اسراكه عزمة بالابيض || يكثر قرب الشواطئ البحرية وفي الجرف وعلى ضفاف الانهر .

١٧٦٣٩ - **ظنوبيات** \* *Macchillidae* (S). *Macchillidés* (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ظهارات المكث . اجسامها وانواعها عديدة تتميز باجسامها المردنية الشكل . اناها وتآثيرها وملابسها الكبيرة كبرية القد ، زناها ثلاثية التركيب . جواشها محدبة . راجعها مستطيلة ، حلقاتها مستعرجة . اطرافها الشرجية ثلاثية الزوائد الذيلية ، مستطيلة الاطوار الدقيقة الذرية || أشهر اجسامها الاقتصادية الظنوب .

١٧٦٤٠ - **ظنن** \* *Emphytus* (S). *Emphyte* (F). *Emphytus* (E).  
الواحدة ظنفة . جنس حشرات مؤذية من فصيلة المشارديات ورتبة غشائيات الاجنحة الاشريرات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في الشرق الاوسط واروپة وافريقية الشمالية || اجسامها صغيرة مستدقة تطول من ١٠ الى ١٢ م . بسطها تراوح من ١٨ الى ٢٠ م . اناؤها الى المواد المختلف المتعدي وسها الحمضة والمزرة بالابيض والاصفر || اناها اكبر قدماً من ذكورها وتتنير بمزناها المشارية . اجسامها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة ||

نحو ٢٥ م. سطحها اخضر اللون ، اغبر المواج ، زهرتها  
هامية الارتكاز ، قرمزية اللون ، قطرها نحو ١٠ م.

### ١٧٦٦٠ - ظهيرة تليسية

Mes. testiculare, Argyroderma roseum (S). Ficoide  
testiculare (F).

نبته تزيينية شاذلة مقرة . اوراقها قتل حلالية الشكل او  
تليسية طولها نحو ٥٠ سم . عرضها ٣٥ سم كما أنها ٢٥  
سطحها بجري اللون مبهر الزغب . انزهارها وردية اللون .  
ارجوانية المواج . قطرها نحو ٢٠ م || انزهارها شوي .

### ١٧٦٦١ - ظهيرة تشمبية

Mes. geminum, Gibbacum geminum (S). Ficoide  
jumelee (F).

نبته تزيينية شاذلة مقرة . اوراقها غروطية الشكل ثوامة  
التجميع تطلو نحو ١٥ م. انزهارها صغيرة القند ، قرمزية  
اللون || انزهارها يستمر من آذار الى ايار .

### ١٧٦٦٢ - ظهيرة ثنائية الفرس

Mes. bilobum, Derenbergia biloba (S). Ficoide bi-  
lobée (F).

نبته تزيينية شاذلة معمرة تملو نحو ٤ م. تركب من  
قرص جذعي تملو فلتان ملفطحتان متحدتا القاعدة  
توسطها زهرة جملة ، كبيرة القند ، صفراء اللون . اما  
الفتلة فببرية اللون ، ثنائية التفصيص الطرقي || انزهارها  
يستمر طوال تشرين الاول والثاني .

### ١٧٦٦٣ - ظهيرة حصية

Mes. calculus, Conophytum calculus (S). Ficoide-  
calicou (F).

نبته تزيينية شاذلة . جذعها فتلة حصبية الشكل سطحها  
مالس البشرة ، اخضر اللون ، احر المواج . طولها نحو  
٣ م. تملوها زهرة صفراء اللون قطرها نحو ١٢ م.  
زهرتها تنوم من آب الى تشرين الاول .

### ١٧٦٦٤ - ظهيرة خذروفية

Mes. turbiniforme, Lithops turbiniformis (S). Fi-  
coide en toupie (F).

نبته تزيينية شاذلة . جذعها فتلة تملو وتعرض نحو ٢٥ م.  
سطحها مالس البشرة ، اسمر اللون . حناؤها اغشيش وبدي .  
زهرتها هامية الارتكاز، صفراء اللون ، قصيرة الاذان ،  
قطرها يراوح بين ٣٥ و ٤٠ م.

### ١٧٦٦٥ - ظهيرة خلية

Mes. velutinum, Gibbaeum velutinum (S). Ficoide  
veloutée (F).

نبته تزيينية شاذلة مقرة . اوراقها فارشة ، مثلثة الشكل ،  
خلية النصل ، طولها الاكبر نحو ٦ م. انزهارها مستطيلة  
الاذن ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٥ م || انزهارها  
يستمر من آذار الى نيسان .

### ١٧٦٦٦ - ظهيرة خيمية

Mes. umbellatum, Ruschia umbellata (S). Ficoide  
en ombelle (F).

جملة تزيينية جاذبة تملو نحو ٩٠ سم . اوراقها متقابلة ،  
متصالية ، اصصية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، تطلو نحو  
١٦ م. نصلها اخضر زاه || انزهارها خيمية التجميع ،  
بيضاء اللون ، صغيرة القند || انزهارها يستمر طوال  
فصل الصيف .

برية وزراعية من فصيلة الظهريات . انواعه نحو ٣٠٠  
منعها من النباتات الافريقية المنبت . اوراقها غريبة  
الاشكال المختلفة الهبة والقدر . انزهارها كبيرة القند وردية  
اللون او مرجانية وارجوانية وصفراء || اكثرا من النباتات  
المعمرة وبمضها يحول رسولي . اشهرها ما يتبع .

### ١٧٦٥٣ - ظهراء ٥

Anserina (S).

Anserina (F). Anserina (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاجل  
وفصيلة اللاعيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
اعطتها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اصداها  
شبه وشية الشكل مستعرضة الحجاب الايمن الثاني الزوائد  
الرغية الشكل || اجسامها حلزونية ، رؤوسها مستطيلة ،  
مقطوعة ، ثنائية القواس المديونة . لوانها مستطيلة دقيقة .  
ارجلها بيضية القواعد يملوها اسقاط قرنية المادة .

### ١٧٦٥٤ - ظهري

الظهري نبات شبه القبار او الكبر (محيط المحيط) .

### ١٧٦٥٥ - ظهيرة ارجوانية

Mesembrian-  
themum coccineum (S). Ficoide écarlate (F).

جملة تزيينية فرعاء تملو نحو ٨٠ سم . جذعها وفروعها  
دقيقة . اوراقها صغيرة القند ، نصلها الى الخصار الازرق  
اللامع . انزهارها ارجوانية اللون قطرها نحو ٤ سم .  
انزهارها يستمر طوال الصيف .

### ١٧٦٥٦ - ظهيرة ألوية

Mes. aloides,  
Nananthus aloides (S). Ficoide-Aloes (F).

نبته تزيينية شاذلة مقرة . اوراقها قتل الوية الشكل ، خمية  
التجميع ، حلبيبة الصغمة ، خضراء اللون ، تطلو نحو  
٥ م. انزهارها قصيرة الاذن ، صفراء اللون ، ارجوانية  
المواج ، قطرها نحو ٢٥ م. || انزهارها يستمر من آب  
الى ايلول .

### ١٧٦٥٧ - ظهيرة بترية

Mes. tigrinum,  
Faucaria tigrina (S). Ficoide-Tigre (F).

نبته تزيينية شاذلة مقرة . اوراقها قتل خمية بيضة  
الشكل ، سنية الحافة ، نصلها الى الخصار البحري  
يملو تجذع ثني يحوم اطراف احر . انزهارها متوسطة الاذن ،  
كبيرة القند ، قطرها يراوح بين ٥ و ٧ م. لونها الى  
الحمرة المرجانية || انزهارها يستمر من آب الى تشرين  
الاول .

### ١٧٦٥٨ - ظهيرة بلورية\* ، حشيشة البلور ،

خشب البلور ، غاسول افريقي

Mes. cristallinum, Cryophytum cristallinum (S).  
Ficoide glaciale, F. cristalline, Herbe à la glace,  
Glaciale (F). Ice plant, Diamond ficolides (E). Eis-  
kraut-Mittagsblume (D). Cristallinoide, Diaciacio,  
Erba cristallina (I).

عشبة برية وزراعية صناعية يستخرج من عصارة اوراقها  
املاح قلوية تدخل في صناعة البلور || اوراقها كبيرة  
القند ، فارشة ، متمعبة النصل الكثيف الحلييات البلورية .  
انزهارها صغيرة القند ، بيضاء اللون ، خمسية السبات .  
انزهارها يستمر من تموز الى آب .

### ١٧٦٥٩ - ظهيرة بيفية

Mes. oviforme, Oophytum oviforme (S). Ficoide  
ovoide (F).

نبته تزيينية شاذلة معمرة . جذعها فتلة بيضية الشكل تملو



ظهيرة بلورية

اسطوانية ، مقطوعة ، عادمة الحب . ازهارها صغيرة القذ  
قصيرة الاذن ، ابطية الارتيكاز ، يبيض اللون || تستعمل  
كالكافور وفي مدة الليل تفيد المدة وعسر الحفم .

### ١٧٦٧٤ - ظهيرة قارية

Mes. murinum, Stomatium murinum (S). Ficoide  
souris (F).  
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها نفل غارية الشكل  
مسنة الختار ، رمدية اللون || زهرتها مسكية العرف ،  
معتلة القذ ، لونها الى الصفرة الباهتة || ازهارها صبي .

### ١٧٦٧٥ - ظهيرة قنفذية

Mes. echinatum, Delosperma echinatum (S). Ficoide  
hérisson (F).  
بجلة ترينينية قنفذية الشكل تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها  
اسطوانية تطول نحو ١٣ سم . قواعدها مهدبة شائكة ،  
نصلها طليعية البشرة ، زبأ الحلبات || ازهارها فردية  
التجميع ، يبيض اللون ، صغيرة القذ ، قصيرة الاذن .  
ازهارها يستمر طوال السنة .

### ١٧٦٧٦ - ظهيرة مثمرة

Mes. edule, Carpoprotus edulis (S). Ficoide-figue  
F. comestible, Figulier des Hottentots (F). Hottentot  
fig, Sour fig (E). Hottentottenfeige (D). Fico degli  
tontottoli (I).  
بجلة زراعية مأكولة الثأر ، تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها  
فراء . فروعها مبطة مستطيلة فائشة . اوراقها متقابلة ،  
متشابهة ، اسطوانية الشكل ، ثلاثية الزوايا . مسنة  
الختار تطول من ٨ الى ١٢ سم . || ازهارها كبيرة القذ  
قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفار الباهت يملو موج  
وردي . ساقها شفعية التجميع عددها يراوح بين ١٢ و ١٤ .  
ثمراها جوزية الشكل والقذ مأكولة سكرية الطعم .

### ١٧٦٧٧ - ظهيرة مقطوعة

Mes. truncatellum, Conophytum truncatellum (S).  
Ficoide tronquée (F).  
نبته ترينينية شاذلة . جذعها فتل كروية الشكل مقطوعة  
القاعدة قطرها نحو ١٢ سم . سطحها اخضر اللون مزركش  
بالجؤوي . زهرتها صفراء ، قطرها نحو ١٥ سم . || ازهارها  
يلوم من آب الى تشرين الاول .

### ١٧٦٧٨ - ظهيرة مشقادية

Mes. rostratum, Cheiridopsis rostrata (S). Ficoide  
à bec (F).  
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها فتل مقررة ضمية  
التجميع ، لا قياسية الحجم ، عابقة الخضار ، البحرية  
مهدبة الختار . زهرتها فردية ، مستطيلة الاذن ، كبيرة  
القذ صفراء اللون ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ سم .  
ازهارها رديي .

### ١٧٦٧٩ - ظهيرة نسيطة

Mes. nobile, Pleiospilos nobile (S). Ficoide noble (F).  
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها فتل ضمية التجميع  
عوزية الشكل . نصلها عابق الخضار البحري ، اغبر  
الختار ، بطول نحو ٥ سم . زهرتها مهدبة ، كبيرة القذ ،  
صفراء اللون ، قصيرة الاذن ، قطرها نحو ٥ سم .  
ازهارها غريخي .

### ١٧٦٨٠ - ظواهر

Météores (F). Meteors (E).  
جميع المخلوقات الطليعية الجوية المرتبط وقوعها كالمسافة  
والبرق وقوس قزح والمطر والتلج والبرد الخ .

### ١٧٦٦٧ - ظهيرة دجروية

Mes. noctiflorum, Aridaria noctiflora (S). Ficoide  
nocturne (F).  
بجلة ترينينية فراء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقها  
اهليجية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . نصلها الى  
الخضار البحري الاحمر الموج || ازهارها دجروية  
الانبتاج ، يبيض اللون ، فواحة العرف المطري . قطرها  
يراوح بين ٣٠ و ٤٥ سم || ازهارها يستمر طوال  
فصل الصيف .

### ١٧٦٦٨ - ظهيرة رؤسية

Mes. capitatum, Conicosia capitata (S). Ficoide à  
rosette, F. à fleurs capitées (F).  
بجلة ترينينية مسرة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها اسطوانية  
الشكل ثلاثية الزوايا تطول من ١٢ الى ١٨ سم . نصلها  
الى الرتبة الضلالة . ازهارها رؤسية ، قطرها نحو ٥ سم .  
لونها الى الصفرة الذهبية || ازهارها يستمر من تموز  
الى آب .

### ١٧٦٦٩ - ظهيرة زعفرانية

Mes. croceum, Hymenocyclus croccus (S). Ficoide  
safranée (F).  
بجلة ترينينية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فراء متشعبة ، اوراقها  
متقابلة ، اسطوانية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، قصيرة القذ ،  
باهتة الخضار ، سمراء الختار || ازهارها فردية التجميع  
قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الزعفرانية || ازهارها  
يستمر طوال الخريف والشتاء .

### ١٧٦٧٠ - ظهيرة شائكة

Mes. spinosum, Eberianzia spinosa (S). Ficoide  
épineuse (F).  
بجلة ترينينية فراء تملو نحو ٦٠ سم . جذعها وفروعها  
شائكة . اوراقها فتل صغيرة تطول نحو ٢ سم . نصلها  
بحري اللون تملو رقة سمراء || ازهارها صغيرة القذ ،  
وردية اللون ، صفراء الموج || ازهارها رديي .

### ١٧٦٧١ - ظهيرة صلبة

Mes. validum, Cephalophyllum dissimile (S). Ficoide  
robuste (F).  
بجلة ترينينية بلعها يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها  
اسطوانية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . لونها الى الخضار  
الزاهي تملو نشة فضية دقيقة || ازهارها وردية اللون ،  
متوسطة الحجم ، دقيقة الاذن التي يراوح طولها بين ٥  
و ٨ سم . || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

### ١٧٦٧٢ - ظهيرة عطرية

Mes. fragrans, Glottiphyllum fragrans (S). Ficoide  
parfumée (F).  
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها فتل لاقياسية الحجم  
يغلب فيها الشكل الساني . طيها يراوح بين ٥ و ٧ سم .  
عرضها من ٢ الى ٣ سم . ومجاكتها نحو ١٢ سم . زهرتها مهدبة ،  
قصيرة الاذن ، كبيرة القذ ، عطرية العرف ، قطرها  
يراوح من ٨ الى ١٢ سم .

### ١٧٦٧٣ - ظهيرة عقدية \* ، ملثة ، غاسول

Mes. nodiflorum (S).  
مصري  
Ficoide à nœuds fleuris (F). Egyptian fig-marigold (E).  
Aegyptisches kalikraut (D). Erba del nodiflora (I).  
عشبة برية تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . منبها الرمال ،  
مهدها شواطئ البحر المتوسط ، فروعها فائشة . اوراقها



ظهيرة عقدية

بعض مناطق أفريقية الجنوبية. سوقها جلمورية مدادة أو منكشفة قوصية الشكل. أوزانها سيفية التصلال، مزدوجة التصنيف. أزهارها سداسية البتلات اللائسارية الحجم، ثلاثية الاسدية، عديدة الألوان. تزرع لقزوين في الحدائق والمراكن || أنواعها المعروفة عديدة، أشهرها التالية :

#### ١٧٦٨٩ - ظُورَة نَتَالِيَّة اللون

*Moraea bicolor* (S). *Morée bicolore* (F).  
نوع من الظورَة. جلمورها مداد. شراخها يرتفع من ٣٠ إلى ٩٠ سم. أوزانها عديدة، ضيقة التصلال، جميلة الخضار اللامس. أزهارها كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. لونها اصفر وأسد || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

#### ١٧٦٩٠ - ظُورَة شِراخِيَّة

*Moraea spathacea* (S). *Morée à spathe* (F).  
نوع من الظورَة. جلمورها مداد. شراخها يرتفع من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. وقتها واحدة سيفية التصلال البحري الخضار. أزهارها صفراء اللون. عطرية العرف || تنويرها يستمر طوال شهر أيار.

#### ١٧٦٩١ - ظُورَة طَاوُوسِيَّة

*Moraea pavonia* (S). *Morée paon* (F).  
نوع من الظورَة. جلمورها قوصي الشكل. شراخها يرتفع من ٣٠ إلى ٦٠ سم. وقتها واحدة سيفية التصلال المزنب. أزهارها جراء اللون يملوها عند قواعدها بتبيج اسود مخضف بالازرق والاصفر || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٧٦٩٢ - ظُورَة مَهْدَبَة

*Moraea fimbriata* (S). *Morée frangée* (F).  
نوع من الظورَة. جلمورها مداد. شراخها يعلو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوزانها عديدة ضيقة التصلال الجمادة المهديّة الخفاف. أزهارها متدلة الحجم. قطرها نحو ٥ سم. لونها الى اليلكي الزاهي || تنويرها يستمر طوال شهر أيار.

#### ١٧٦٩٣ - ظُورَة

دعامة تبنى الى جانب حائط ليدم عليها.

#### ١٧٦٩٤ - ظُورَة

*Gymnosporangium* (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاليات تتميز باستقلالها التطوري وبانتفاء البتلات المتحارة التي تصبغ في كل طور. فحين هي تتطفل على الورديات في طورها الايدي اذ بها تتطفل على عريانات البور في طورها البدامي. طورها الثشوي لا نظامي الادوار وقد يطول عدة اسابيع. مظهرها الخارجي بقع مستديرة ثم تماثيل وردية الشكل لا قياسية التصنيع حلامية المادة المتخللة. شبيها الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا النسيج النباتية || أنواعها المؤذية عديدة أشهرها اقتصادياً ما يلي.

#### ١٧٦٩٥ - ظُورَة الإِجاص

*Gymnosporangium sabinae*, *Rostelia cancellata* (S). *Rouille grillagée du poirier* (F). *Pear rust* (E). *Birnenkitterrast* (D).

فطر مجهرى يصيب الاجاص والرمز والزراجل والأهبل فيؤذي الارواق والافئاد والبّار || مظهره الخارجي على الارواق، في طوره الايدي، بقع مستديرة قطرها راوح

#### ١٧٦٨١ - ظُوب هو صياح التيس عند الهياج.

#### ١٧٦٨٢ - ظُوباء \* *Alstroemeria* (S). *Alstroemère* (F). *Alstroemeria* (E).

جنس نباتات عشبية سريرية من فصيلة الترجسيات. مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية. سوقها موزقة. أوزانها مستطيلة التصلال. أزهارها قمية الشكل، متبانية الألوان الزاهية || تزرع لقزوين في الحدائق وضمن البيوت. ترطب في الاتربة المنسوبة التركيب التصري الوفرة المواد الغذائية المضوية والمعدنية || أنواعها المعروفة عديدة، أشهرها التالية :

#### ١٧٦٨٣ - ظُوباء بُرُتْقَالِيَّة

*Alstroemeria aurantiaca* (S). *Alstroemère orangée* (F).  
نوع من الظوباء منبتها الشيلي والبيرو. شراخها منتصب يرتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوزانها مستطيلة التصلال الضيقة، عابقة الخضار في الصفحات العليا، بحريته في السفل، تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض نحو ١٥ سم. أزهارها صيواني التجميع. أزهارها برتقالية اللون || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

#### ١٧٦٨٤ - ظُوباء حَمْرَاء

*Alstroemeria haemantha* (S). *Alstroemère rouge sang* (F).  
نوع من الظوباء. منبتها يمتد من الشيلي الى البرازيل. شراخها منتصب يرتفع من ٩٠ الى ٩٠ سم. أوزانها مستطيلة، ضيقة، تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ١٢ الى ٢٠ سم. نصالها بحرية الخضار على الصفحتين العليا والسفل. أزهارها صيواني التجميع. أزهارها الى الحمرة المابقة السماء || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٧٦٨٥ - ظُوباء رَشِيْقَة

*Alstroemeria pulchella* (S). *Alstroemère élégante* (F).  
نوع من الظوباء. منبتها بلاد المكسيك. شراخها منتصب يرتفع من ٥٠ الى ٩٠ سم. أوزانها مساوية الشكل تطول من ٨ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. أزهارها صيواني التجميع. أزهارها وردية اللون يملوها بتبيج احمر يخالطه الاصفر || تنويرها صيفي.

#### ١٧٦٨٦ - ظُوباء مَلَوْنَة

*Alstroemeria versicolor* (S). *Alstroemère versicolore* (F).  
نوع من الظوباء. منبتها بلاد الشيلي. شراخها منتصب يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. أوزانها شبه نعطية الشكل مستطيلة القد. أزهارها صيواني التجميع. أزهارها صفراء اللون يملوها تشيز اربواني يتخلله الأبيض والبرتقالي. وهي قمية الشكل، تطول نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٧٦٨٧ - ظُورَى

الظورَى من البقر هي الضبة (التاج).

#### ١٧٦٨٨ - ظُورَة

*Moraea* (S). *Morée* (F). *Moraea* (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السونيات. مهدا



ظوبا



ظورة الاجاص

الجزوة تملو شلع النصل وعروقه على صفحته السفلى وتبقى على حالها الى أن يكتمل دورها الايدي الذي يطول بفسحة ايام ثم تدغل في طورها الدماهي فيبلغ طول دعائها نحو ١٥ سم || وهو على الانثان واغن الثار بنور قرعية لونها الى السمرة تملب اللحاء والبشرة وتشوه الثار وتذللها . يكافح كاسر فلور الظئرة .



ظئرة التفاح



ظئرة الزعرور



ظئرة الورديات



ظئون

بين ٥ و ١٠ م. مبيثرة ، لاقياية التجميع ، حراء اللون ، برتقالية الحافة تركب النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة السفلى يقع بنس الحسم لونها الى الصفار الداكن . وعند اكمال هذا الطور الذي يبلغ تمامه نظرف سمة ايام او ثمانية ينتئ الطور الدماهي الذي تبصر عنه الصاميل التودلية الشكل التي تملو البقع الحمر يديوم نحو ثلاثة ايام ثم يذبل بعد أن يتحول لونه الى الجزوة فالسرة وبعد ان يقرح التسج المنحارة ويقفي عليها || يكاتم بنشمال سائل بورود المركز ٠,٦ ٪ . يضاف اليه كلس حراق بمعدل ٠,٨ ٪ او سائل بورود المركز ٠,٦ ٪ . يضاف اليه ٠,٣ ٪ من سلفات الحديد .

#### ١٧٦٩٦ - ظئرة الأكيدنيا ٥

*Gymnosporangium confusum*, *Rozetella mespili* (F). Rouille du néflier (F).

ظفر مجهري يتطفل على الاكيدنيا والسفرجل فيحطب الارواك ويؤذي الثار || مظهره الخارجي ، على الارواك ، يقع مستدرة برتقالية اللون سمر الحمار تملو النصل على صفحته العليا تجميعه وترفع البشرة تنفذ ذكل دعامة اسطوانية طولها نحو ٥ م. تنفجر عنه ادراكها الى عدة قدد || وهو على الثار يقع قرعية سلبة لونها الى السمرة العابقة تشوه الثار وتصلبها بعد ان تمرق سمر نهوما . يكافح باستعمال السلفوكسية عند الازهار .

#### ١٧٦٩٧ - ظئرة التفاح ٥

*Gymnosporangium juniperinum*, *G. tremelloides*, *Rozetella penicillata* (S). Rouille griligée du pomier (F). Stem gall of mountain juniper (E). Apfelrost (D).

ظفر مجهري يصيب التفاح والاجاص والغيراء . مظهره الخارجي على الانثاد والافئان يقع قرعية لا قياية الشكل تملو اللحاء ترفع البشرة وتنفجرها وتصلبها || وهو على الارواك يقع مستدرة لونها الى الجزوة تملو النصل على صفحته السفلى تجميعه وترفع البشرة التي تبدو كالدهامة الاسطوانية طولها يراوح بين ٤ و ٦ م. ثم تنفجر الى عدة قدد حلزونية الشكل || يكافح باستعمال السوائل السلفوكسية قبل الازهار وعند اكثاله .

#### ١٧٦٩٨ - ظئرة الزعرور ٥

*Gymnosporangium clavariaeforme*, *Rozetella lacera* (S). Rouille de l'aubépine (F).

ظفر مجهري يتطفل على الزعرور وقد يصيب الاجاص . مظهره الخارجي على الارواك ، يقع مستدرة لونها الى

#### ١٧٦٩٩ - ظئرة الورديات ٥

*Gymnosporangium juniperi-virginianae*, *Rozetella pyrata* (S). Rouille des rosacées cultivées (F).

ظفر مجهري واسع الانتشار خاصة في امريكه الشمالية حيث يتطفل على جميع نباتات الفصيلة الوردية || مظهره الخارجي على الفروع والافئاد يقع قرعية مبيثرة لا نظائية الترتيب تركب اللحاء تنفطبه وتسبب الذبول واليباس . وهو على الارواك يقع لا قياية الشكل والحجم تركب النصل على صفحته العليا بين المروق والشلع . تبدو صفراء اللون ثم تتحرف الى الحطبي وتقطع بالنصل فتندده وتقرده الى الالتفاف على ذاته الى أن يذبل ويبس . يكافح مكانسة ظئرة الاجاص .

#### ١٧٧٠٠ - ظئان ٥

بقية السمل في الخلية .

#### ١٧٧٠١ - ظئان ٥


هو الملى الضيقة الورق ، اطلبها .

رقية من الحيوانات الطعلبية ظاهرات الشرج . فصائلها واناسها عديدة مظهرها مجري وبعضها يعيش في المياه العذبة || افواهمها عادمة الدقة . لواسها دائرية الانتشاب مصنية الارتكاز .

#### ١٧٧٠٣ - ظئون ٥

جنس نباتات عشبية معمرة دودية الجذور من فصيلة الترجسيات .

لهذا بعض مناطق الشرق الاقصى اسمها جاوا . اوراقها كبيرة ، جذعية الانتشاب تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٨ سم . نصالها جميلة الخضار اللامع . ازهارها صوبالي التجميع . ازهارها صفراء اللون او يضاء او ثنائية الخضاب || انبواه المعروفة ثلاثة لا فارق بينها سوى لون الازهار وحجم الارواك || تزورع للزئين في الحدائق فقط .



ع

Eburna (S).

Eburne (F). Eburna (E).

جنس حيوانات بحريّة مفترسة من الرخويات معديات الاجريل  
ولصيلة الطحريات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة  
في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها متشابهة مالمسة  
كالمعاج، لماعة، بيضاء اللون، وردية المواج، يعملوها  
تقيق جوي او عنائي وفي قريية الشبه من البيق، بطينة  
القاعدة والوسط، محزنة القبح المديب || شائعة الاستعمال  
الصناعي.

١٧٧١٣ - عاجيز عن الوقاء، مُعَدَم، مُعْصِر،

مغلاقي (E). Insoluble (F). Insolvent (E).

هو من عاجز عن وفاء ديونه .

Ada (S). Ade (F).

١٧٧١٤ - عَادَاة  
جنس نباتات عشبية إعمية معمرة من فصيلة السحليات.  
انواعها المعروفة قليلة جميعها برية ورّ بيئية. اروساها  
اسطوانية او مخروطية، جنيشة، تطول نحو ١٠ سم. اوراقها  
من اثنين الى ثلاث وفي قرصية الانتشاب ضيقة النصل  
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٠ م. ازهارها  
عنقودية التجميع، ارجوانية اللون، سواد التجميع، تركّز  
على سمرخ يعملو من ٢٥ الى ٣٠ سم. ازهارها يستمر من  
شباط الى نيسان .

Aglyphe (F).

١٧٧١٥ - عَادِمُ الْأَخْدُودِ

نمت تعريفي يطلق على كل حية غير سامة مالمسة الانسان  
العامدة التخديد .

Adactyle (F).

١٧٧١٦ - عَادِمُ الْأَصَابِعِ

نمت تعريفي يطلق على بعض القشريات عادات الملاقط .

Caducue (F).

Deciduous (E).

المائل اسم حال يطلق على النبات الذي تسقط اوراقه  
كل سنة || والعلل هو تلك الاوراق المتناثرة الساقطة .

١٧٧٠٥ - عَائِقُ

المائق : فرخ الطائر اذا طار واستقل وقيل المائق فوق  
التناض وهو الذي يتحسر من ريشه الاول وينبت له  
ريش جلدي اي قوي .

١٧٧٠٦ - عَائِقُ الثُّرَيَّا

عائق الثريا نجم ذير من كوكبة سيوس .

Atik

Démarieuse (F).

Beet thinner, Thinning machine, Gapper (E).

معمل ميكانيكي يقطع في سيره ما زاد من النبات عن المعدل  
المغروب فيه . وهو يستعمل في الزراعات الكبيرة .

Infertile (F).

Infertile, Unfruitful (E).

١٧٧٠٨ - عَائِكَة

الشجرة التي لا تأتير .

Antimite, Mitecide (F).

Mite-Killer, Mitecide (E).

١٧٧٠٩ - عَائِثُ ٥

كل مادة من شأنها ابعاد المئث او القضاء عليه تدعى  
عائثاً .

Rigole (F).

Trench, Channel, Duct (E).

١٧٧١٠ - عَائِلُودُ

يجرى الماء حفر له في التربة . ج. عوائير .

Ivoire (F).

Ivory (E).

١٧٧١١ - عَاج ، ضَبَّاج ، مَسْكَ

انياب الفيلة او عظام انيابها .



عاجة



١٧٧٣١ - عَاشِيَّة ، قِرْصُ Prêt (F). Loan (E).  
عقد يُلزم به المرء الى غيره متقوًلاً او حياً او شيئاً معيناً  
بنوعه ليستعمله زمناً محدوداً ثم يرد .

١٧٧٣٢ - عَاشِيَّة الاستِئْجَال Prêt à usage (F).  
Commodatum (E).

هي دفع شيء الى المستير ليستعمله ثم يرد بينه وبلا  
مقابل .

١٧٧٣٣ - عَاشِيَّة الاستِئْهَال Prêt de consommation (F).

قوامها ان المعير ينقل ملكية البين المارة الى المستير  
ليستعملها في منامه ويرد مثلها في زمن معين .

١٧٧٣٤ - عَازِل Isolant (F).  
غير ناقل للكهرباء . Insulating, Isolating (E).

١٧٧٣٥ - عَازِل Isolateur (F). Insulator (E).  
صفة المواد او الاشياء التي تتصل بخلاصة عدم نقل الكهرباء .

١٧٧٣٦ - عَاسِيف Très fort (F). Very strong (E).  
نعت تعريفي يطلق على اشد التبروغ سورة .

١٧٧٣٧ - عَاسِقُون Tinnunculus (S).  
Crécerelle (F). Kestrel (E).

جنس طير من عماره الصقور وفضيلة الصقريات . انواعه  
٢٠ جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل والقدم ، مستقيمة  
الرقاب . طولها يراوح بين ٢٢ و ٣٢ سم . نوها اُخر  
الريش . مواضعها ذلقة . اذنانها طويلة . ارباسها دقيقة ،  
عريضة ، صفراء اللون . مناسبرها قصيرة ، سوداء اللون ،  
قوية البهرة الحادة || يلدن في الانجار الشائعة . اناثه  
تضع وتحمضن من ٤ الى ٧ دفنات || وهو من الجوارح  
النافعة لانه يقضي على منظر القوازم الضارة || اشهر  
انواعه العاسوق المعروف وعاسوق الدورى والعويق .

١٧٧٣٨ - عَاسِقُون الدُّورِي \* Tinnunculus sparverius (S). Crécerelle des moineaux (F). Windhover (E).

نوع من العاسوق وهو طائر غفيف الجناح ، حاد المزاج ،  
شديد البلس . طول نحو ٢٧ سم . ثوبه الى الحمرة العانية  
يبقى عنه الظهر ويصفر عنه البطن . ريشه اُخر التوسيم  
الاصفر || يصيد الدورى والصافير الصغيرة والقوازم  
والنمط والحشرات . وهو من الطيور القوازم التي يحجب  
الشرق والغرب .

١٧٧٣٩ - عَاسِقُون مَعْرُوف \* Eousque Tinnunculus alandrius (S). Crécerelle commune, Emouchet doré (E). Common windhover (E).

نوع من العاسوق وهو اكبرها جنة وايها شكلاً واعنتها  
صيداً . قدره قدر الباشق . طول نحو ٣٢ سم . ثوبه الى  
الحمرة النائية المنعجة-المواج . وهو اُخر الريش ، اسود  
التوسيم المستطيل || قوته القوازم والنمط والقفاذع  
والحشرات .

١٧٧٤٠ - عَاشِب ، عَاشِب ، عَاشِب ، مُعْشِب Herbeux, Herbu (F). Grassy, Herbous, Overgrown With herbs (E).  
ما كان كثير المشب .

١٧٧٤١ - عَاشِيَّات ، عَوَاشِب Herbivores (F).  
Herbivorous (E). الحيوانات التي تأكل الاعشاب .

١٧٧١٧ - عَادِم الرأس Acéphale (F).  
Acephalous (E).  
اسم يطلق على بعض الرغويات من صفحيات الياشيم  
تتميز بانعدام الرأس .

١٧٧١٨ - عَادِم العُرُوق Enerve (F). Enervate (E).  
نعت تعريفي يطلق به الاراق الخالية من العروق .

١٧٧١٩ - عَادِم العُضْد Enode (E). Enod (E).  
نعت تعريفي يطلق على الاعشاب الماددة العُضْد .

١٧٧٢٠ - عَادِم الفِكَ Agnathé (F).  
Agnathous (E).  
هو من الحيوان من كان ادم الفك او الفك الاسفل من  
الشفق . ومن الحشرات من كانت عادمة التأثير .

١٧٧٢١ - عَادِم المَاصِل Inarticulé (F).  
Inarticulate, Jointless (E).  
اطلب لا مفصل .

١٧٧٢٢ - عَادِمَات الفِكَ Agnathes (F).  
Agnatha (E).

فئة من الاسماك عادمة الفكوك ورتبة الزعانف . متجسراتها  
تدعى صدفيات الجلود . هياكلها غضروفية لا عظمية .  
خياشيمها بيضية الشكل || الرتبة الوحيدة الماصرة تدعى  
حلفيات الانزله . اعرف اسماكها الملحى والميكسين .

١٧٧٢٣ - عَاشِيَّة Hautain (F). Haughey (E).  
هي الكومة التي ترمى على الشجرة . ج عواد .

١٧٧٢٤ - عَاشِرَجَة ، مُتَشَكِّك Grimpance (F).  
Twining, Creeping (E).  
كل نبتة تتسلق غيرها .

١٧٧٢٥ - عَاشِد Mycétophage (F).  
Mycetophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الفطور .  
م . عايدة .

١٧٧٢٦ - عَاشِرَشَة ، مُعَرَّشَة ، مُعَرَّشَة Liane (F). Liana (E).  
كل نبتة ساتها طويلة قصفة لا تمكها من الالتصاف  
بدون عائل ترتكز عليه .

١٧٧٢٧ - عَاشِرَش Traverse (F). Joist (E).  
هو السحاق نوع من النيدوم ، اطليه .

١٧٧٢٨ - عَاشِرَش Adventice (F). Adventitious (E).  
كل نبتة تتكاثر مرضاً وتغالبها مع غيرها من النباتات  
المزدية .

١٧٧٢٩ - عَاشِرَش Traversé (F). Joist (E).  
كل خشبة جازفة تدعى جازفة .

١٧٧٣٠ - عَاشِرَش ، عَاشِرَش Commodat (F).  
Free loan (E).

عقد يلزم به المعير دفع شيء الى المستير ليستعمله زمناً  
محدوداً ثم يرد او مثله بمقابل او بلا مقابل .



عاسوق الدورى



عاسوق معروف

177٥٠ - عاصفة Tempête (F). Storm (E).  
اختلال جوي عنيف القوة شديد الوقع بهيج العواصف الجوية ويثيرها.

177٥١ - عاصف Fissipare (F). Fissiparus (E).  
كل ما كان تناسله عضوة اي بالانقسام الى شطرين . ويدعى أيضاً معشوق .

177٥٢ - عاصفة Serpent véneux (F).  
Venomous snake (E).  
حية غريبة يموت الذي تلسه من ساعته .

177٥٣ - عاكف عقيم Stérile (F).  
Sterile, Barren (E).  
ما كان لا يقبل الاخصاب .

177٥٤ - عاكف قرصاً \* ، عود القرح Anacyclus pyrethrum (S). Anacyle pyrethre, A. pourpre (F). Pellitory of spain, Alexander's foot (E). Alexanderfuss, Spichelwurz (D). Pilator, Parletoira de Spagna (I).  
نبات عشبي طلي حولي من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريغ والتشريح . نصلها خمل البشرة . رويكاته الزهرية كثيرة العدد ، مستطيلة الاذن ، صفيرة القند . تجارة زور مجتمعة الغلاف ، ذهنية المادة ٤ جلوره واوراقه واذا زهره فواحة العرف ، طعمها حريف لاذع ، وانفجها بهيج الانف وقد تسبب العطاس . يستخرج منها مسحوق ناعم مادته الفعالة الغريبة يستعمل في القضاء على الحشرات . ويستعمل في عدة تركيب طيبة اغصها معجنات الانسان .

177٥٥ - عاكف ، حاج ، زنجبيل العجم ، أشترغار Ahagi mannifera, Al. maurorum (S). Alhage, A. des Maures, Sainfoin agul (F). Camel thorn, Hebrew manna plant (E). Alhagistrauch, Mannastrauch (D). Lupinella alhagi, Manna di Persia (I).  
نبات عشبي ليني مخشوب معمر من فصيلة القرنيات . ساقه شائكة فرما تملو نحو ١٠٠ سم . فروسه نحلة الشوك . اوراقه بسيطة كاملة مستطيلة ٥ وهو من النباتات التي تفرز المن ويقال ان من بني اسرائيل كان من فرزه لانه كثير الوجود في صحراء سيناء .

177٥٦ - عاكف العزال هو الشكاعة ، المظلمة . Réflecteur (F). Reflector (E).  
جهاز يعكس النور او الحرارة .

177٥٧ - عاكس 177٥٨ - عاكب Claviceps (S).  
جنس فطور مجهرية من النساخيات وفصيلة النساخيات . تتميز باصنافها التي تحيط الوبينة وتنفس فيها تتشكل اطراً جولياً يحوي السورين ٥ يولها عيطي الشكل متوازي التركيب تحفصه تكات مستورة ٥ انواعه عديدة منها واحد يركب النبات ويؤذي هو عاكب الشيلم .

177٥٩ - عاكب الشيلم Claviceps purpurea, Sclerotium clavus, Sphacella segetum (S). Ergot du seigle (F). Ergot (E). Mutterkorn (D).  
فطر مجهرى يركب الشيلم وغيره من النباتات اغصها البيشة والنفث والفرغل والدكنيل والدوسر والديس وذيل الغار والزيبر والشعير والشوفان والمصوية والمكرش والعزنع

177٤٢ - عاشيق ومَعشوق اطلب غلدة كروية .

177٤٣ - عاشيق Triglachinum (S).  
Triglachin, Trosart, Joncage, Faux jonc (F). Arrow grass, Marsh arrow grass (E). Echter Dreisack (D). Triglachino, Giuncastrello, Giunco falso (I).  
جنس نباتات برية ، مروحية ، اسلية الشكل ، ممررة من فصيلة النساخيات . انواعه عديدة معظمها من نباتات الواقع الرطبة اغصها المتناقع وريال الشطوط البحرية وغضاف الانهر واغوارها .

177٤٤ - عاشقيات Triglachinaceae (S).  
Triglachinacées (F). Triglachinaceae (E).  
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها الشكل والاوراق . اغزارها كية ، مرتفعات المبيض . اشهر اجناسها العاشم .

177٤٥ - عاشوب Herbicide (F).  
Herbicide, Weed-Killer (E).  
كل مادة فاعلة تستعمل للقضاء على الاعشاب ج . عاشوب .

177٤٦ - عاشيق \* Corynetes (S). Corynète (F).  
جنس حشرات غشبية من فصيلة الزونجات . انواعه المعروفة ١٤ معظمها من حشرات العالم القديم ٥ جميعها صفيرة القند . اطرافها تراوح من ٤ الى ٨ مم . انطباها متراكبة الاالوان الزاخية ٥ سرورها ناري . قوتها رحيق الاشارة اغصها ازهار الفصيلة الصفيرالية ٥ اشهر انواعها عاشيق الزرق (Corynetes caeruleus) الذي يعيش في الحدائق ويدخل المنازل حيث يقرص بعض الحشرات الضارة .

177٤٧ - عاشيق زرق \* Corynetes caeruleus (S).  
Corynète bleu (F). Corynetes caeruleus (E).  
حشرة وائمة خاشبة قانصة من فصيلة الزونجات وربة مندعات الاجنحة . غنفسها تعيش على ازهار النباتات البرية والتربينة . يرقاقها خاشبة قانصة تقتصر الحشرات الدنيا ٥ جسمها صغير القند يطول من ٤ الى ٥ مم . ثوبها الى الزرق . رأسها مستعرض الجرم . زباناها غيظيان ، مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرها مستدير الطول اللامع ، تحيل التحيزيز القندي القاطب . ارساغها خاشبة المعقل ٥ لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل ٥ البرقة عنه ادراكها الكمال الجسودي تطول من ٨ الى ١٠ مم . جسمها رمدي الشكل ، مستطيل القدم والرأس ، مستدق الطرف الذوق ، سداسي الروابج ، ضلع التأثير . اسنق اللون ، اسنق الموج ، مبرر الحطب ، اسنق الرأس ٥ طول الاكامل الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً يقتضي في شقوق الحطب او تحت القشور والانقراض .

177٤٨ - عاص Réfractaire (F). Refractory (E).  
كل مادة تقاوم الموالد المأوفة ولا تتصاع الى غططها الرئيسي . كالطين الذي يصبى الحرارة فلا تصهره .

177٤٩ - عاصرة \* مهترس Fouloir (F).  
Beater (E).  
آلة تستعمل لسحق التار واستخراج عصارها اغصها العنب .



عاشم



عاشيق زرق



عاق قرصا



عاكوب الشيلم

Pubis

١٧٧٧٥ - عائنة

١٧٧٧٦ - عائنة اصل الاذن. ج. عوانة.

Anthropoide (F).

١٧٧٧٧ - عائس

المانس طائر يدعى الادبيج، اطلبه.

Demoselle de Numidie (F).

١٧٧٧٨ - عائس نميدة

طائر يدعى ادبيج نميدة، اطلبه.

Pubien (F), Pubic (E).

١٧٧٧٩ - عائسي

Infirmite (F), Infirmity (E).

١٧٧٨٠ - عاهة

كل اثر يبقى في البدن عقب اصابة او مرض. والمعانة قد تكون وقتية اذا كانت وشيكة الزوال او دائمة.

Taxes (F), Taxes (E).

١٧٧٨١ - عائداات

هي الرسوم المفروضة على العقارات والبضائع. واحداها عائدة.

Rentabilite (F), Rentability (E).

١٧٧٨٢ - عائلة

راجع ايراد.

Delphinium (S), Dauphinelle (F).

١٧٧٨٣ - عائق

جنس نباتات حولية ومحولة ومعمرة من المرققيات وفصيلة الشقيقيات. انواعه المعروفة نحو ٦٠ معظمه بري وبعضها زراعي تربوي. اولها متناقة، منعقة، مفصصة وبغرفة. انزهارها عنقودي او سنبل التجميع. انزهارها جميلة الشكل، مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي.

١٧٧٨٤ - عائق الحدائق \* وجمل القيصرة، مهنماز

Delphinium ajacis (S), Dauphinelle des jardins, Pied d'alouette des jardins (F), Rocket larkspur (E), Gartenrittersporn (D), Calcatrappa dei giardini, Speronella (I).

نبات عشبي حولي تربوي يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقه فراء. اوراقه غليظة التشرح. عنقوده الزهري كبير القد، لبد الازهار. لون ازهاره يختلف باختلاف الصرم. يكثر فيه الازرق والايض والتبشجي واللوردي والاحمر || ازهاره ينسمر من حزيران الى تموز.

١٧٧٨٥ - عائق الحقل \* كسنودة ملكية

Delphinium consolida (S), Dauphinelle consoude, D. des blés, Consoude royale (F), Field larkspur, King's consound (E), Feldrittersporn, Hornkümmel (D), Consolida regale, Calcatrappa delle biade (I).

نبات عشبي حولي بري وتربوي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. هيكله هرمي الشكل. ساقه فراء. فروعه محاذية المتناحية الزهرية القليلة الكثافة. ازهاره زرقاء اللون، او بيضاء. اصرامه الزراعية عديدة منها الملكية الزهر الصغيرة القد والمردنية المستطيلة. جميعها طيبة تستعمل كمادة لويل وطاردة للود ودائمة الجروح الا انها جعالية المادة الفعالة مما يجعلها من النباتات السامة المؤذية || ازهارها ينسمر طوال فصل الصيف.

١٧٧٨٦ - عائق الشرق

Delphinium orientale (S), Dauphinelle d'Orient (F).

نبات عشبي حولي بري وتربوي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم.

والنزار والقطبان والقش والتجير والتجبل والنسبل والمزمار والملقح، الخ. || مظهره الخارجي زرايد اسود، شكله شكل الدابرة، يدخل بوفعة عند الجذرة عند تقطع الزهرة فيستقر في المبيض حيث يبيض وينمو قليلا فيجوز الحية وما فيها الى مادة صلبة سواء اللون تحوي مع بوفه بعض الجواهر السامة والمواد الشبه قلووية احصاه الماكورين. يكاتفه بتظليل البذر من الحب المكروب وقد يتم ذلك اما بالتلفس واما بالتلف في الماء حيث يرقه الحب السليم ويطلق الحب المكروب. او باستعمال احد الفواظير المطهرة.

١٧٧٦٠ - عاكورين ٥، إرغورين، دكيرين

Ergotine

مادة شبه قلووية توجد في الجيوب المربوة بفطر الماكور.

Règne (F), Kingdom (E).

١٧٧٦١ - عاتم

العالم او المملكة هو اول قسم في تصنيف الاحياء. يقال عالم الحيوان وعالم النبات او مملكة الحيوان ومملكة النبات. راجع تصنيف.

١٧٧٦٢ - عام

العام حولي يأتي على الفصول الاربعة والربيع والصيف والخريف وتل هذا فالعام اخص من السنة.

١٧٧٦٣ - عاكمة

Gerbe (F), Sheaf, Bundle (E).

مجموعة من غيوط الحصيد.

١٧٧٦٤ - عاميل

Facteur (F), Factor (E).

كل عنصر آزر من مجموع عناصر الوحدة.

١٧٧٦٥ - عاميل

Ouvrier, Salarie (F).

Workman, Salaried, Paid (E).

هو كل شخص مرتبط بمقد العمل او عقد الاستئصال فيعمل ببيده عملا صناعيا او زراعيا.

١٧٧٦٦ - عاميل اساسي

Facteur premier (F).

Prime factor (E).

١٧٧٦٧ - عاميل التأكسد

Agent oxydant (F).

Oxidizing agent (E).

١٧٧٦٨ - عاميل تطبيقي

Facteur expérimental, Applied factor (E).

١٧٧٦٩ - عاميل حيوي

Facteur biotique (F).

Biologic factor (E).

١٧٧٧٠ - عاميل وسيط، عاميل مساعد، وسيط

Agent catalytique, Catalyseur (F), Catalytic agent, Catalyst (E).

جسم يحدث التحليل باللامسة. اطلب مساحل.

١٧٧٧١ - عاميل مشترك

Facteur commun (F).

Common factor (E).

١٧٧٧٢ - عامور

Amor (F).

العامور كوكب سيار يدعى الراعي، اطلبه.

١٧٧٧٣ - عائنة

العانة كواكب يبيض اسفل من السعود.

١٧٧٧٤ - عائنة

Anesse (F), She-ass (E).

هي الاتان، اثني الحمار.



عائق المائت



عائق الحقل

## ١٧٧٩٣ - عَائِقْ كَشْمِيرِ

*Delphinium cashmirianum* (S). *Dauphinelle du Cachemire* (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه مستديرة خاسية التفصيص، نصلها خلي البشرة، سنن الحافة. أزهاره كبيرة القدر، قباياها غريزة الشكل، حنطية اللون. بتلاتها بنفسجية. عناقيده صغيرة رجلة || أزهاره يستمر من حزيران الى تشرين الأول.

## ١٧٧٩٤ - عَائِقْ مَمَسَكْ

*Delphinium brunonianum* (S). *Dauphinelle musquée* (F).

نبات عشبي تزييني معمر يعلو نحو ٣٠ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه كولية الشكل، ثلاثية او خاسية التفصيص. أزهاره كبيرة القدر، زرقاء اللون، ارجوانية الحتار، سواد الزقفة، فوساة العرف المسكي المستحب || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز.

**١٧٧٩٥ - عَائِلْ** *Plante hôte* (F). *Host-plant* (E). هو كل نبات يعيش عليه نبات طفلي.

**١٧٧٩٦ - عَيَّ** *Lamper* (F). *To toss off* (E). اخذ الماء عياناً من غير مص وهو ما يفعله الطائر. والعبء هو طريقة شرب الطير.

**١٧٧٩٧ - عَيَّالِيَه** *Abatia* (S).

*Abatia*, *Abatie* (F). *Abatie* (E). جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة النفسيات. أنواعها المعروفة قليلة المد اصحابها بعض المناطق الحارة من أمريكا الجنوبية || سيقانها منتصبة فراء. اوراقها متعاقبة. أزهارها عقودية طرفي. أزهارها جميلة يكثر فيها اللون الودي ثم الاصفر || بعض أنواعها تزييني يزرع في الحدائق.

**١٧٧٩٨ - عَيَّادِ الشَّمْسِ، عَيَّنِ الشَّمْسِ، دَوَّارِ الشَّمْسِ** *Heliathanthus* (S).

*Héliathanthe*, *Soleil* (F).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. أنواعها المعروفة نحو ٥٠ سيقانها اسطوانية جالسة. اوراقها منقطة او لاطفة، كاملة، كبيرة القدر. السفلية منها متعاقبة الاوتكان اما الوسطى والعالية متعاقبة. أزهارها رؤسي التجميع، كبير الاقراص المستديرة التي تبيل مع اتجاه الشمس. أزهارها انبوية، صغيرة، لبدة، سراسية، مستطيلة السنين. بذورها وتدية الشكل، مغلفة الحروف، دهنية اللباب || اشهر انواعها الزراعية ما يتبع.

**١٧٧٩٩ - عَيَّادِ الشَّمْسِ الأَرْعَبْ**

*Heliathanthus mollis* (S). *Héliathanthe velu*, *Soleil velu* (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، زبابة، عادمة الفروع. اوراقه لاطفة متعاقبة، بيضيه الشكل، نصلها كبير الصفحة المشقة ثلاثي المروق البارزة، اطحل اللون || قرصه الزهري متوسط القدر، قطره نحو ١٠ سم. لسينات أزهاره خلية البشرة لونها الى الصفار الكبيريين || أزهاره يستمر من تموز الى تشرين الاول.

ساقه فراء. هيكله هربي الشكل. اوراقه قوية التشريح. عناقيده الزهرية صغيرة القدر. أزهاره بنفسجية اللون. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

**١٧٧٩٧ - عَائِقْ أَيْق\*** *Delphinium speciosum* (S). *Dauphinelle élégante* (F).

نبات عشبي تزييني معمر يعلو نحو ٦٠ سم. ساقه مورقة قليلة الفروع. اوراقه خاسية التفصيص، سننة الحافة نصلها خلي البشرة. أزهاره الى الزقفة النيلية اللامعة. عناقيده الزهرية صغيرة القدر رجلة || أزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

**١٧٧٩٨ - عَائِقْ جَبَلِي\*** *Delphinium staphisagria* (S).

*Dauphinelle staphisagria*, *Herbe aux poux* (F). *Stavesacre*, *Lousewort* (E). *Scharfer rittersporn*, *Leusskraut* (D). *Calcatrippa staphisagria*, *Strafusaria*, *Tusano* (I).

نبات عشبي بري طبي يعلو نحو ٧٠ سم. ساقه فراء. فروعها منتصبة. اوراقه مفصصة ومقرشة، نصلها خلي البشرة سنن الحافة، بحري اللون. عناقيده الزهرية صغيرة القدر، لبدة. أزهاره وردية اللون. بذوره حامزة الطعم تستعمل كهومة وباسطة مطاردة للديدان. لكنها خطيرة نظراً لما تحويه من مواد جحالية مؤذية || أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

**١٧٧٩٩ - عَائِقْ ذَلِيلْ** *Delphinium zaili* (S).

*Dauphinelle zaili* (F). نبات عشبي تزييني معمر يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. هيكله هربي الشكل. ساقه فراء. فروعها منتصبة تشعب على ارتفاع ٢٠ او ٤٠ سم. اوراقه ضيقة للتشريح القدي الشكل. أزهاره عناقيد كبيرة القدر كبريتية اللون. أزهاره يستمر من تموز الى آب.

**١٧٧٩٠ - عَائِقْ سَمَنْجُونِي** *Delphinium azureum* (S). *Dauphinelle azurée* (F).

نبات عشبي تزييني معمر يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه وفروعها واوراقها وأزهارها خلية اللحاء والبشرة. اوراقه خاسية او سباعية التفريغ. أزهاره سمجونية اللون. عناقيده الزهرية مستطيلة الشكل متدلة الكثافة || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز.

**١٧٧٩١ - عَائِقْ كَبِيرِ الزَّهَر\***

*Delphinium grandiflorum* (S). *Dauphinelle à grande fleur*, *Pied d'aloette de Chine* (F). *Large flowered larkspur* (E). *Grossblütiger Rittersporn* (D). *Calcatrippa a fiori grandi* (I).

نبات عشبي تزييني معمر يعلو نحو ١٠٠ سم. ساقه فراء. فروعها متباعدة، عاحية المناقيد الزهرية. اوراقه قوية التفريغ. أزهاره كبيرة القدر بيضاء اللون او زرقاء او حمراء || أزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

**١٧٧٩٢ - عَائِقْ كَرْدَبَنَلِي**

*Delphinium cardinale* (S). *Dauphinelle cardinale* (F).

نبات عشبي تزييني معمر يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه مورقة عادمة الفروع ثلاثية او رباعية المقان. اوراقه خاسية التفصيص والتشريح. سبله الزهرية مستطيلة رجلة. أزهاره ارجوانية اللون صفر التشويج || أزهاره يستمر من نيسان الى تموز.



عائِقْ أَيْق



عائِقْ جَبَلِي



عائِقْ كَبِيرِ الزَّهَر

## ١٧٨٠٥ - عَبَادُ الشَّمْسِ المَارِد \*

*Helianthus orgyalis*, *H. salicifolius* (S). *Hélianthe titan*, *Soleil de six pieds* (F).

نبات زراعي معمر يعلو نحو ثلاثة أمتار وقد يبلغ في ظروف خاصة ستة أمتار. ساقه مرطبة لمسه. أوراقه كثيرة العدد، متقاربة الارتكاز || اقراصه الزهرية كثيرة العدد، قطرها يراوح بين ٣ و ٧ سم. لسيئات أزهاره سوية الصغار القام || أزهاره يستمر من أيلول إلى تشرين الأول.



عباد الشمس الجبار

## ١٧٨٠٦ - عَبَادُ الشَّمْسِ الخَفَل

*Helianthus laetiflorus* (S). *Hélianthe fastueux*, *Soleil fastueux* (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقه هدية الزغب الجامد. أوراقه سنانية الشكل، جامدة الصفة، نصلها غشخ للمس، ثلاثي القرو، مسن الحافة، بحري الخضار، قرصه الزهري صاجي الشكل. قطره نحو ١٢ سم. لسيئات أزهاره صفراء اللون، وردية الختار || أزهاره يستمر من آب إلى أيلول.



عباد الشمس الستري

## ١٧٨٠٧ - عَبَادُ الشَّمْسِ النِيلِي

هو طرنشول الصباغين، امليه.



عباد الشمس السقولي

## ١٧٨٠٨ - عَبَادُ الشَّمْسِ رَقِيقُ الرِّوَقِ

*Helianthus angustifolius* (S). *Hélianthe à feuilles étroites*, *Soleil à feuilles étroites* (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ٦٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه هدية الزغب. أوراقه متباعدة الارتكاز. نصلها يطول من ٧ إلى ١٨ سم. ويبرش من ٤ إلى ٨ سم. وهو سيك الصفحة الخشن || اقراصه الزهرية قليلة العدد. قطرها يراوح من ٥ إلى ٨ سم. لسيئات أزهاره سفيرة القذ، صفراء اللون || أزهاره يستمر من آب إلى تشرين الأول.



عباد الشمس القضي

## ١٧٨٠٩ - عَبَادُ الشَّمْسِ كَثِيرُ الرِّوَقِ \*

*Helianthus strumosus*, *Hellanthi* (S). *Hélianthe macrophyllae*, *Soleil à grandes feuilles* (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ١٢٠ إلى ٢٢٠ سم. جذوره سقولية اصبعية الشكل. ساقه ثنائية أو ثلاثية القبان، عادية القرو، قليلة الزغب. أوراقه متعاقبة، بيضية مستطيلة، نصلها كبير القذ مغبر الصفة. قرصه صاجي الشكل، قطره نحو ٨ سم. لسيئات أزهاره الى الصفار الباهت || أزهاره يستمر من آب إلى تشرين الأول.



عباد الشمس المارد

## ١٧٨١٠ - عَبَار ٥

*Tolypeustes* (S).

*Apar*, *Tolypeuste* (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة المرمعات. أنواعه المعروفة ثلاثة أعطانها بعض مناطق امركة الجنوبية. تألف الغابات والاحراج. ملجئها الحياتي فردي. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل اجسام تحفرتها في التربة قرب جلود الانهار اجسامها صفيرة. رؤوسها مخروطية. اقفاها مجهزة باسنان اسطوانية الشكل يراوح عددها من ٨ الى ٩ ازواج في كل فك. عيونها واذانها صفيرة. اذنانها قصيرة مشعلة. قوائمها قصيرة. اطانيها قوية. دروعها مؤلفة من جين رأسي وجين منكمبي تقصده من الجين الحوضي ثلاثة احزمة غضروفية متعاطلة متحركة تنقبض وتتمدد عند الحاجة ما يحيل البعير يتكور عندما يشاء الى انثائها ثنائية الاطباء تقصع في كل رمص من جرو الى ثلاثة جراء اما انواعه الثلاثة فهي التالية :



عباد الشمس كبير الورق

## ١٧٨٠٠ - عَبَادُ الشَّمْسِ الْجَبَّار \*

*Helianthus giganteus* (S). *Hélianthe géant*, *Soleil géant* (F).

نبات زراعي معمر يعلو نحو ٣٠٠ سم. جذوره سقولية جنيازية طويلة. ساقه خضبة، مالة اللحاء، عادية القرو. أوراقه كبيرة القذ، نصلها ساني الشكل، مسن الحافة، جامد الصفة السبكية || قرصه الزهري متوسط الحجم قطره نحو ٨ سم. لسيئات أزهاره عابقة الصفار || أزهاره يستمر من آب إلى تشرين الأول.

## ١٧٨٠١ - عَبَادُ الشَّمْسِ السَتَوِي \* طُرُنْشُول

*Helianthus annuus* (S). *Hélianthe annuel*, *Tournesol*, *Grand Soleil* (F). *Golden flower* of Peru, *Sun-flower* (E). *Echte Sonnenblume* (D). *Elianto dei fiori grandi*, *Mirasole*, *Girasole*, *Tazza regia*, *Coppa di sole*, *Sole* (I).

نبات زراعي حولي يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة مغزيرة اللحاء تحمل في اعلاها بعض القرو البقعة. أوراقه كبيرة القذ ليلية الشكل || نصلها نحو المس، عابق الخضار البحري. قرصه الزهري الرئيسي، كبير القذ قطره يراوح بين ١٥ و ٥٠ سم. لسيئات أزهاره صفراء اللون ذهنية الموج || أزهاره يستمر من تموز الى أيلول || وهو من النباتات الصناعية الشائعة الزراعة والاستهلاك. يزود دهنية وطفلة.

## ١٧٨٠٢ - عَبَادُ الشَّمْسِ السُقُولِي \* طُرُنْشُول

كَنْتَكْر ، قِلْفَاس رُومِي

*Helianthus tuberosus* (S). *Hélianthe tubéreux*, *Topinambour* (F). *Canadopotato*, *Jersusalem artichoke* (E). *Knollensonnenblume* (D). *Elianto tuberoso*, *Tartufo bianco*, *T. del canna*, *Carciofo di terra* (I).

نبات سقولي زراعي معمر. جذوره سقوية الشكل والقد، ساقه مستقيمة تلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أوراقه كبيرة القذ، مستطيلة المثل، نصلها جامد الصفة الخشن، مسن الحافة، ثلاثي القرو الرئيسية. قرصه الزهري متوسط القذ قطره نحو ٦ سم. لسيئات أزهاره احمليجية الشكل، زاهية الصفار || أزهاره يستمر من أيلول الى تشرين. زراعته شائعة، ساقه مأكولة، يرغب في الاتربة المتوسطة الانسجام والرطوبة.

## ١٧٨٠٣ - عَبَادُ الشَّمْسِ القُصِي \*

*Helianthus argophyllus* (S). *Hélianthe argenté*, *Soleil argenté*, *S. du Texas* (F).

نبات زراعي حولي يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فراء. فروصها دقيقة، متباعدة، زيا اللحاء، أوراقه كبيرة القذ، بيضية الشكل، ثلاثية القرو || نصلها انقب البشرة فصي الموج || اقراصه الزهرية كثيرة العدد، سفيرة القذ، لسيئات أزهاره مستطيلة الشكل، جملة الصفار الزاهي، حطيفة الختار || أزهاره يستمر من تموز الى أيلول.

## ١٧٨٠٤ - عَبَادُ الشَّمْسِ القَاسِي

*Helianthus rigidus*, *H. scaberrimus* (S). *Hélianthe rigide*, *Soleil scabre* (F).

نبات زراعي معمر يعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة قاسية. أوراقه متعاقبة، كبيرة القذ، بيضية، لسنة. نصلها جامد الصفة السبكية الخشن. اقراصه الزهرية قليلة العدد، معتدلة القذ، قطرها يراوح بين ٦ و ١٠ سم. لسيئات أزهاره الى الصفرة الزاهية السوية. || أزهاره يستمر من آب إلى أيلول.

## ١٧٨٢١ - عُبْدُ بُوُونٌ \*

Eupelmidae (S).

Eupelmidae (F). Eupelmidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجنحتها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها ناعمة تتنقل على الحشرات الضارة من نصفيات الاجنحة والتمديات والحشرقيات || حشرات صغيرة طولها من ٢ الى ٤ سم . اجسامها شبه اسطوانية . مرنّاتها صلبة ، مستقيمة . اثوابها عديدة الالوان يكثر فيها الاسود الفحمي . اجنحتها شديدة القصير او لا يوجد لها || اشهر انوعها عيول جيبي .

## ١٧٨٢٢ - عُبْدُ بِيَمِي \*

Abdimi abdimi (S).

Sphénorhynch (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة القلقليات . اصطناعه البلاد الافريقية يحبب بجيراتا وانهايرا كل عام || ثوبه اسود اللون تملوه مابة ارجوانية في الرأس والظهر والصدر وباجة خضراء في الجناح والذنب . عماره وزوره وبعده وزمكاه بيض . راسه متوج القفن بكشفة صغيرة من الريش الارجواني الاسود المالح || يالف مجاري الماء . قوته الحشرات والزحافات والقنريات وبعض الاشباب المائية .

## ١٧٨٢٣ - عُبْدُ بَرَبِ هُو السَّاقِ الكاذب ، اطليه .

## ١٧٨٢٤ - عُبْدُ بَرَبِ

المشب العبرود وشب عبرد هو الرقيق الردي الصار .

## ١٧٨٢٥ - عُبْدُ بَرَبِ \*

Epiurus (S).

Epiurus (F). Epiurus (E).

جنس حشرات مؤذية من غمديات الاجنح دوسيات القرون وفصيلة المستبريات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش تحت قشور ولاء الانجار في اثناء لانفاسية الحطوط تغلبها بالعلل والمرض || اجسامها صغيرة بحدة الطاهر ، بيضيه اللون ، طولها من ٢ الى ٣ سم . اثوابها بيضاء يكثر فيها الاسود والكستني والماني . احمادها مهمة التخديد الطولي .

## ١٧٨٢٦ - عُبْدُ بَرَبِ

Jujubier des lotophages (F).

هو الفصال ينبت ويعظم قرب شطوط الانهار .

## ١٧٨٢٧ - عُبْدُ بَرَبِ \*

Abralia (S).

Abralia (F). Abralia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة ثلاثة منها واحد يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني في المحيط الاطلسي والثالث في المحيط الهندي . جميعها تألف المجاذج والشطوط . اجسامها شبه مخروطية الشكل . ارجلها حاسنة ، معتدلة الطول ، مجزأة بكلازيات . تشكّل القواعد وبضفين من المحامير الطولية الارتيكار .

## ١٧٨٢٨ - عُبْدُ بَرَبِ

Année conyze (F).

هو البرنوف ، اطليه .

## ١٧٨٢٩ - عُبْدُ بَرَبِ

Obsidienne, Obsidiane (F).

Obsidian, Volcanic glass (E).

نوع من الفلدسبا البوتاني . جسم حجري شديد الصلابة مرجعه الصخور النارية || يكثر وجوده عند قوّهات البراكين القديمة والحديثة ، وفي بعض مناطق مصر ومغاربوا والمكسيك والبيرو .

## ١٧٨٢١ - عُبْدُ بُوُونٌ \*

Tolypeustes tricornatus (S).

Apar de Buffon (F).

موطنه البرازيل والغويان وبوليفيا . جسمه بطول نحو ٤ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٧ سم . قوامه خاسية الاسايح في الامامية والخلفية . درسه عبري اللون .

## ١٧٨٢٢ - عُبْدُ مَحْرُوطِي الذَّئْبِ \*

Tolypeustes conurus (S).

Apar à queue conique, Mataco (F).

نوع من البعّار موطنه بوليفيا وبعض مناطق الاريتتين . جسمه بطول نحو ٤ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٦ سم . قوامه الامامية رباعية الاسايح . درسه اسمر اللون . اطمل الموج .

## ١٧٨٢٣ - عُبْدُ مَوْرِي \*

Tolypeustes Muriel (S). Apar de Murie (F).

موطنه الشيل وبعض مناطق الاريتتين . جسمه بطول نحو ٤ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥ سم . قوامه الامامية رباعية الاسايح . درسه اسمر اللون اصغر الموج .

## ١٧٨٢٤ - عُبْدُ مَوْرِي

Expression algébrique (F). Algebrical expression (E).

جلة حساية مردها الجبر .

## ١٧٨٢٥ - عُبْدُ مَوْرِي

Plocearia domestica (S). Plocearia domestica (F).

حشرة متبولة قاصنة من فصيلة الرديوات رتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير القذ بطول نحو ٩ مم . راسها صغير ، بلوطي الشكل . خطها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زبابها دقيقتان مستطيلتان . كولها وشعي الشكل . الزوج الامامي من قوائمها مجهز القنص . للمدور يعمل متحساّ حاداً || قوفا الى الحظلي الاسمر يملو موج نبي في الرأس والكول || مسرحتها دجوي . قوتها الدم تنصه من البعوض اولاً ثم من كل حشرة تستطيع قصها .

## ١٧٨٢٦ - عُبْدُ مَوْرِي

Eglantier (F). Briar, Dog-rose (E).

هو التسرير ويعرف بالورد الجبلي ، ينظف ويعظم حتى تقطع منه العصي .

## ١٧٨٢٧ - عُبْدُ مَوْرِي

العيب هو حب الكالكنج وشب الثلب وشجرة الآء عن اللسان . ويحمر من الاغلات عن ابي حنيفة .

## ١٧٨٢٨ - عُبْدُ مَوْرِي

اليد : نبات طيب الرائحة تكلف به الابل لانه ملينة مسنة (اللسان) .

## ١٧٨٢٩ - عُبْدُ مَوْرِي

هو السجور ، اطليه .

## ١٧٨٣٠ - عُبْدُ مَوْرِي \*

Eupelmus Geeri (S). Eupelme Geeri (F).

حشرة مباشرة ناعمة من فصيلة الميديليات . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة والمتنوعة نحو المعتدلة الحرارة . تتنقل على الكثير من الحشرات اصغها المتوسيات ومنها مندوسة القول || جسمها عديم الجناح ، صغير القذ بطول من ٢ الى ٣ سم . جوشها غدد الجانبيين . بطنها معتدل الحجم . مرنّاتها جالس التصل الجامد ، معتدل الطول . قوفا الى السواد الفحمي اللامع .



عَبَّارٌ بُوُونٌ



عيول جيبي



عُبْدُ بَرَبِ



عبروس



عشبة التيه

١٧٨٣٦ - عُشْبَة (F).  
هي البوق ، أطبل . أما البقة فن وضع الاير مصطفى الشهابي .

١٧٨٣٧ - عُشْبَر ، عُشْبَر (F).  
Griffe (bot.) (F).  
Root (E).  
اول ما يثبت من اصول القصب ونحوه وهو غرض رخص  
قبل ان يظهر على سطح التربة . الواحدة مبكرة .



عش

١٧٨٣٨ - عُشْبُوس الزَّوْع \*  
Zabrus tenebrius, Z. gibbus (S). Zabre des cé-  
réales, Z. bossu, Z. des moissons (F). Corn ground  
beetle (E). Getreidelackkäfer (D).  
حشرة ضارة من البقوسيات . جسمها محبوس الشكل ،  
طوله يراوح بين ١٤ و ١٦ م . ثوبها بني اللون ، اسود  
المواج || تعيش تحت الحجارة وبنيها ، تسرح في الحقول  
تتركب الزروع وتقرض الحب قبل ادراكه || يرقاتها  
تقزم في التربة داخل افئاف تحفرها قرب جلور الزروع ،  
تخرج منها في الليل لتفشي على الانقلاب التابية .



عشوس

١٧٨٣٩ - عُشْبُوس \*  
Ibacus (S).  
Ibacus (F). Ibacus (E).  
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل  
طوال القليل وفضيلة الكركديات . انواعه المعروفة عديدة  
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اجسامها مبططة  
كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز بصفها قوامها  
ويدورها القصيرة المسننة الطرف الاسامي || اثوابها  
مشايبة الالوان يكثر فيها الاخضر وبشقاته || جميعها  
ماكولة متوسطة السنن .



عشوس اسفغ

١٧٨٤٠ - عُشْبُوس اسفغ \*  
Amara aenea (S).  
Amara bronze (F).  
حشرة ضارة من البقوسيات . جسمها لوزي الشكل ،  
محبوب السطح طوله نحو ٨ م . ثوبها ابيض الفخار الخفي  
يعلمه مواج اسفغ . زباناها حر الجسم ، سود الطرف .  
قوامها سود السيقان والافخاذ ، حر الارصاغ || تركب  
التجليات على اختلاف اجناسها واتواعها . تعيش على  
اليزور قبل ادراكها || يرقاتها خاضة قليلة الاذى .



عشوس اسفغ

١٧٨٤١ - عُشْبُوس اسفغ \*  
Amara fulva (S).  
Amara rous (F).  
حشرة ضارة من البقوسيات . جسمها محبوس الشكل ،  
طوله يراوح من ٨ الى ١٠ م . ثوبها اسفغ اللون ،  
اخضر المواج . تركب الزراعات الخفيفة على اختلاف  
اتواعها . قوتها الارزاع واليزور وتقضم وتعلبها || يرقاتها  
خاضة تمشي على مختلف اوراق النبات اخضاها التجليات  
والصلبيات والركيات .



عشوس كسني

١٧٨٤٢ - عُشْبُوس كسني \*  
Amara eurylna (S). Amara chatain (F).  
حشرة ضارة من البقوسيات . جسمها بيضي الشكل يطول  
نحو ١٠ م . ثوبها كسني اللون اشقر المواج . زباناها  
وقوامها سود . تركب البقول والنباتات الخفيفة اخضاها  
الصلبيات || يرقاتها خاضة قليلة الاذى تكتفي بقضم  
امراط الارواق .

١٧٨٤٣ - عُشْبُوسِيَات \*  
Pterostichidae (S).  
Pterostichidae (F). Pterostichidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة عُمْدِيَات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد ، تحبذ الاتحاد ،

١٧٨٣٠ - عُشْبُوسِيَة \*  
Agelena (S).  
Agelène (F). Agelena (E).  
جنس عنكب من فصيلة العيشويات . انواعها المعروفة  
كثيرة العدد ، منتشرة في معظم اصقاع البلاد الممتدة  
الحارة || جميعها كبيرة القد . تدش في البراري بين  
الاشعاب والادغال . قوتها الذباب والحوام وبعض الحشرات  
الصغيرة || اشهر انواعها عشوشة التيه وعشوشة انيقة .

١٧٨٣١ - عُشْبُوسِيَة التيه \*  
Agelena labyrinthica (S). Agelène labyrinthica,  
Araignée labyrinth (F). Labyrinth-Spider (E).  
نوع من العيشوشة موطنها البلاد الممتدة الحارة . تألف  
البراري والحراج . قوتها كل ما علق بشراكها من حشرات ||  
جسمها يطول نحو ١٢ م . عند العنكب ونحو ١٦ م .  
عند العنكب . صدرها اهليجي الشكل ، جزوي اللون  
يمتد من الرأس وينتهي مع اقترابه في البطن .  
عينها زرقانية ، ثيابها صفراء متفقدان . فكاه  
ضليمان مقوسان . جزامها مستطيلة . كثيفة الملب .  
بطنها بيضي الشكل ينتهي بزاويتين دقيقتين وهو الى السمر  
الخضية يملوها تمسج احمر وسرته تبتني || شعها قمي  
الشكل ، كبير القد ، قصير العنق الاجوف ، طليق  
القاعدة اللبنة يبيض الخيوط || يبيتها الشري يستمر  
نحو خسة اشهر تقريبا في عكدة صليجية الشكل ، جامدة  
الحبك تحفرها تحت الحجارة المرتفعة من غر اللام .

١٧٨٣٢ - عُشْبُوسِيَة انيقة \*  
Agelena elegans (S).  
Agelène élégante (F). Elegant-Spider (E).  
نوع من العيشوشة . موطنها البلاد الممتدة الحارة . تألف  
البراري . قوتها الحشرات الصغيرة اخضاها الذباب والحوام  
التي تعلق في شراكها بكثرة || جسمها صغير القد يطول  
نحو ٣ م . عند العنكب ونحو ٤ م . عند العنكب . صدرها  
قمي الشكل ، جزوي اللون . عينها زرقانية . ثيابها  
صفراء متفقدان . فكاه مقوسان . جزامها مستطيلة  
كثيفة الملب . بطنها بيضي الشكل ينتهي بست زوائد  
نخلة . وهو اسير اللون ، اخضر المواج يملو ملوك اسود  
يضمن خسة خطوط معترضة اقل اسودا منه || شعها  
قمي الشكل ، كبير البوسة المستديرة ، طليق القاعدة  
اللبنية يبيض الخيوط ، عديد الشراك والحبال التي تملو  
من جميع الجهات || عكبتها بلوطية الشكل تحببها تحت  
الحجارة او بينها في المراتع التي لا تحشى غر اللام .

١٧٨٣٣ - عُشْبُوسِيَات \*  
Agelenidae (S).  
Agélinés (F). Agelenidae (E).  
فصيلة من العناكب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد .  
اعطتها معظم اصقاع العالم || تتميز بفضائل الاجسام ،  
بانتشار الجرامز ، بالتساق الشعير ويكثر الماشات العليا ||  
اشهر اجناسها العيشوشة ، والفلس المعروف بتكبوت  
النازل ، والنيسة .

١٧٨٣٤ - عَيْطَة \*  
Andain (F).  
Swath, Windrow (E).  
البطة كبة المشب التي يحصدوها الحاصد على كل غطوة  
اما اذا كانت من الزروع كالقشع والشعير فندى غبطا .

١٧٨٣٥ - عَيْطَاب ، عَيْطَاب \*  
Antilope mâle (F).  
Antelope male (E).  
هو الذكر الفحل من البلاء .

ينتهي زهرة وحيدة بيضاء اللون ، صفراء المواج ، فواحة العرف المطري || ازهاره يستمر من شباط الى نيسان .

١٧٨٥٢ - **عَبَّهْرُ شَقِيْق** (S). *Leucolum pulchellum* (S). *Nivéole gracieuse* (F).

اوراقه عصفية خفيفة النصل الفسفي اللون . شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم . زهرته صغيرة القذ ، بيضاء اللون ، صفراء الخاتر ، خافتة العرف || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٧٨٥٣ - **عَبَّهْرُ شَتَوِيّ** (S). *Leucolum hiemale* (S). *Nivéole d'hiver* (F).

اوراقه عصفية ، نخيلة ، زائجة الخفسار . شراخه يملو من ١٠ الى ١٥ سم . شراخه ثنائي المصراع . ازهاره ثلاثية او رباعية التجميع ، بيضاء اللون ، خفساره النشة . ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٧٨٥٤ - **عَبَّهْرُ صَيِّفِيّ** (S). *Leucolum aestivum* (S). *Nivéole d'été* (F).

اوراقه عصفية الشكل جملة الخفسار الزاهي . شراخه يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ينتهي بفسه من الازهار راوح عددها بين ٤ و ٨ وهي عاجية اللون خافتة العرف المطري . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٧٨٥٥ - **عَبَّهْرُ وَدِّيّ** (S). *Leucolum roseum* (S). *Nivéole rose* (F).

نبته نخيلة رفهة . اوراقها دقيقة ، مستطيلة ، خلية النصل ، بحرية اللون . شراخها يملو نحو ١٥ سم . شراخها ثنائي المصراع ، زهرها وردية اللون ، وحيدة ، تطول نحو ١٠ م || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الثاني .

١٧٨٥٦ - **عَبَّهْل** (F). *Dictateur* (F). *Dictator* (E). *٥*

الجهل المطلق التصرف . ج عبايلة .

١٧٨٥٧ - **عَبَّهْلَة** (F). *Dictature* (F). *Dictatorship* (E).

الجهلة الساطة المطلقة التصرف .

١٧٨٥٨ - **عَبَّوَة** (F). *Magnitude* (F). *Magnitude* (E). *٥*

تعير اصطلاحى يستعمل في قياس الضوء الفلكي وتحديد لمعان النجوم والكواكب .

١٧٨٥٩ - **عَبْدَوِيَّة** (F). *Esclavagisme* (F). *Pro-slavery* (E).

ملجن طبيعي عند بعض انواع التمل يرتكز على غزو قرى غيره من الأنواع وعلى سلب ما فيها من بيتن لاحتضانه واستعباده فيها بعد .

١٧٨٦٠ - **عَبَّور** (F). *٥*

المبور : الجمدة من الفم وقيل اصفر وقيل يمد اللغظ ج عبائر .

١٧٨٦١ - **عَبُوس** (S). *Apus* (S).

جنس دويبات مائفة مفترسة من القشرينات خشبويات الاطراف وقصيلة الميوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المناقع والغدران والاهوار || اجسامها صغيرة شبه بيضيه الشكل ، مبطلة

لامسة الاطواب المختلفة الالوان . قرونها الاستشعارية زياة المفصل ، حلبيه الاطراف . ارساغ قوائم ذكورها الامامية ثلاثية العقل تحمل صفان من الهابم || رفاقها دقيقة ، صفيرة ، غبراء اللون ، سمره الرأس والمذب . اعرفها واضرها اقتصاديا البقوس .

١٧٨٤٤ - **عَبَل** (F). *Grivet* (F).

هو الاثل المفصل ، اطليه . وهو يحوي في خالته واوراقه الكثير من حامض التنيك لذلك يوقف الاسهال كما يصنع الشعر وسبافه اصفر قائم .

١٧٨٤٦ - **عَبِيلَة** (S). *Aplidia* (S). *Aplidia* (E).

الواحدة عبيلة . جنس حشرات غاضلة من غديات الاجنحة فضيلة الجمليات صفحيات القرون . انواعها المعروفة ستة . اعطائها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، صفيرة القذ ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . قرونها الاستشعارية صفحية . اثارها ثنائية اللون . رؤوسها وكواسها وبطنها اعين خضاباً من المانحدا . ظهورها لا يلحم كامل البطن || قوتها اوراق النباتات البرية ولا تمتف من الزراعة والبقليّة .

١٧٨٤٧ - **عَبِيلَسَة** (S). *Vitrina* (S). *Vitrina* (F). *Vitrina* (E).

جنس حيوانات برية من الرغويات معديات الاجرل وفضيلة البراقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || تعيش في المواق الرطبة تحت الطحالب والجلالة وتحت جرز الحطب المغفورة بالثلج || اصداها صفيرة ، حلزونية ، رفيقة ، شفافة ، ملونة . اجسامها مستطيلة ، رباعية اللواس ، ملونة كالاصداق .

١٧٨٤٨ - **عَبِين** (F). *٥*

اطلب متصلب .

١٧٨٤٩ - **عَبَّهْر** (F). *Leucolum* (F). *Leucolum* (S).

جنس نباتات بصلية من فصيلة التريجيات . اوراقها قرسية الانتشاب ، قليلة العدد ، مستطيلة النصل العصي الشكل . ازهارها بحرية متراكبة التلات ، يجمعها وعملها شراخ دقيق مسط || اشهر انواعه الزاوية التريينية ما يلي .

١٧٨٥٠ - **عَبَّهْرُ خَرِيفِيّ** (F). *Leucolum autumnale* (S). *Nivéole d'automne* (F).

اوراقه خيطية نخيلة زائجة الخفسار . شراخه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . شراخه رسيد المصراع . ازهاره صغيرة القذ ، ثلاثية او رباعية التجميع . بتلاها وردية القاعدة والانتشاب بيضاء الصفحة || ازهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول

١٧٨٥١ - **عَبَّهْرُ رَيْبَعِيّ** (F). *Leucolum vernum* (S). *Nivéole printanière*, *Grelot blanc* (F). *Spring snow-flake* (E). *Frühlings-Knotenblume* (D). *Primestro*, *Campanello*, *Bulbobo bianco* (I).

اوراقه عصفية منبطلة تعرض نحو ١٦ م . نصلها جميل الخفسار الباق . شراخه الزهري يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم .



عبل



عيلة



عبره ربيعي



عبوس



Orgasme (F). **عُورُفَان** - ١٧٨٧٥  
Orgasm (E).  
المُتَرُ وَالْعُورُفَانُ حالة الانماط التام التي تعقب التنجس .

١٧٨٧٦ - **عُورُفَان**

هو سباق عرته ، أطلبه . واحدة عرته .

Genre spécifique (F). **عُورُفَان** - ١٧٨٧٧  
Specific genus (E).  
المترة في تصنيف الاحياء هي الجنس الذي يشمل معظم الميزات العامة والخاصة الموصفة .

١٧٨٧٨ - **عُورُفَان** هو الذئب ، أطلبه .

١٧٨٧٩ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

Gallus (S).  
Cocks (F). Cocks (E).  
جنس طير من فصيلة التندريجات . ربع الحقة ، قصير الاجنحة مستديرا . افيئكه يتألف من ١٤ الى ١٨ ريشة متعقبة الزوايا الاخير . رأسه منوج برف لحمي ويجعل حل جانبي شقه رشتين لحيتين . منقاره قوي القرنية ، مقوس الفك الاعلى ساقه عفيف . ريشه اسطو او كاسي . نحاله خمسة منها ثلاثة امامية دائمة واثنان خلفيان ، ويبدوها لا قياسي . دابرت قوية حادة الطرف || انواعه خمسة اشهرها العُورُفَان الداجن المعروف بالدياج الاهل .

١٧٨٨٠ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** \*  
Gallus Bankiva, G. ferrugineus (S). Coq de Bankiva (F).

طائر من العُورُفَان جبل الشكل ، طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه مراكب الالوان الزاهية فيه الاصفر والذهبي والاسمر والاحمر والابرجواني والاصفر الاسفل المولج والاسود والاسمر والاخضر . عرته احمر اللون ورشتهاء كذلك || اثناء تدنن في التربة وترصع الفصوصها بالقش والریش . تبغش من ٢٠ الى ٢٢ بيضة تحضنها بسدعا ثلاثة اسابيع . قوته الاشباح والحبوب والبار والخضار والخشرات . موطنه الهند التالاية حتى ارتفاع ١٢٠٠ م . والسند وبورما والهند الصينية والفلبين .

١٧٨٨١ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**  
Gallus furcatus (S). Coq de Java, C. tacheat (F).  
نوع من العُورُفَان . طوله نحو ٦٥ سم . جبل الشكل عديد الالوان المزاكية الزاوية المنسقة ، يكثر في صدره الاسود الاسفل المولج . عرته ازرق الانتشاب بنفسجي القمعة ، فكه الاعلى اسود اللون اما الاسفل فاصفر || موطنه جافه .

١٧٨٨٢ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** \*  
دجاج اهل

Coq domestique, Poule domestique (F). Domestic cock, Domestic hen (E).  
نوع من العُورُفَان يعرف بالدياج الاهل . موطنه العالم . يقال انه يتحدر من عُورُفَان بنكيجيه . عرته السمينيين قبل الميلاد بنحو ١٤٠٠ سنة . وعرفه البابليين بعد ذلك بنحو ٨٠٠ سنة ، اما اليونان فلم يذكروه الا في عهد اريستوفان وذلك نحو ٤٥٠ سنة قبل الميلاد || ضروريه وسلالاته عديدة لا تحدد ، يقال انها تفوق الالف . فوارقها كثيرة منها الثوب والشكل والحجم والعرف والارعة وعدد البيض وصنف اللحم والطاقة الانماطية والمناعة الذاتية ، الخ .

تلحفها بجناات حديدية تلتف الظهور وتلتصم بالراس . ارجلها صادية شديدة الصغر ، كثيرة الدم . اذنانها طليقة ثنائية السرك .

١٧٨٩٢ - **عُورُفَان** ٥

Apusidae (S). Apusidae (F).  
فصيلة دويبات مائية من القشريات غيوشويات الاطراف . اجناسها وانواعها متوسطة الدم ، منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المنافع والاهوار حتى جفافها وتعود اليها عندما تعود المياه . سرعا يحفظ مجيئها في الارض الجافة اكثر من ثلاث سنوات || اجناسها صغيرة القد تلحفها جينات محدودة ملتصقة بالراس . اوتراها الى الريدة الحفره المولج || جميعها مفترسة ، قوتها الحويئات والديدان التي تعيش في الماء || اشهر اجناسها الميريس .

١٧٨٩٣ - **عُورُفَان**

Adenozma (S). Adénosme (F). Adénosme (E).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الاتشنيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت افريقية الشرقية وسواحل الهند . تنبت في المواقع الرطبة || اوراقها متعاقبة ، صغيرة القد ، اذنيته اتصال الاطليجية الشكل ، عطرية العرف الشبيه بالنعنع ، ازهارها ودية اللون ، خافتة العرف المستحب . ازهارها سنبل التجميع .

١٧٨٩٤ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجيان ، أطلبه .

١٧٨٩٥ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشج القضي ، أطلبه .

١٧٨٩٦ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشج القضي ، أطلبه .

١٧٨٩٧ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشج القضي ، أطلبه .

١٧٨٩٨ - **عُورُفَان** ٥

Abys (S). Abys (E).  
البييلة حيوان بحري من الحويئات ودية الماصات . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٧٨٩٩ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .

١٧٨٩٠ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .

١٧٨٩١ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .

١٧٨٩٢ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .

١٧٨٩٣ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .

١٧٨٩٤ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .

١٧٨٩٥ - **عُورُفَان** ، **عُورُفَان** ، **عُورُفَان**

هو الشجينة ، أطلبه .



عُورُفَان دَاجِن



عُورُفَان دَاجِن



١٧٩٠٧ - عَثَر

هو الأطر من النباتات التزيينية ، اطبله .



عثة السجاد

١٧٩٠٨ - عَثْرَب

شجر نحو شجر الرمان في القدر وورقه احمر مثل ورق الخماض رَق عليه يطون الماشية اول شيء ثم تدق عليه الشحم بعد ذلك وله صالح جمر وله حب كحب الخماض . واحدته عَثْرَة (عن ابي حنيفة) .

١٧٩٠٩ - عَثَق

هو البقس الدائم الحفرة ، اطبله . واحدته عَثَقَة .



عثة الشحم

١٧٩١٠ - عَثْكُول

Panicle (F). Panicle (E).  
عنقود من السيليات بسيطاً كان أو مركباً .

١٧٩١١ - عَثْكُولِي

Paniculé (F). Paniculat (E).  
نعت تعريفي يوصف به الازهار الذي شكله شكل الشكول .

١٧٩١٢ - عَثَلَب

Bouture (F). Slip, Cutting (E).  
هو كل قصيب او فند او عقلة الخ . صار قطعاً وتخضيره للنورس .

١٧٩١٣ - عَثَلَبَة

Bouturage (F).  
Propagation by slips, P. by cutting (E).  
علية غرس العنابل بعد تأطعها .

عثة الفراخ

١٧٩١٤ - عَثْلُوبِيَّات

Schizophytes (F).  
العثلوبيات فنة من النبات تتكاثر بالتجزئة اي بقطع جزء منها وفيرسه في التربة . يقال نبات عثلوب .

١٧٩١٥ - عَثْمَان

فرخ الجباري وفرخ العثمان .

١٧٩١٦ - عَثْنَج

العثنج : الفصم الثقيل من الابل .



عثة الفراثين

١٧٩١٧ - عَثِيَّات

Dermestidae (S).  
Dermestids (F). Dermestidae (E).  
Speckkäfer (D).  
فصيلة حشرات المذ من رتبة تمحيدات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القدر ، زيا الجسم ، متراكبة الانوار المختلفة المزركفة . فورها الاستمشادية صرطنانية الشكل . ارسافها خالية المغل || تركب الازهار ولها الانجبار وتختلف المواد الحيوانية . رقاتها تعيش على المواد العضوية وبقياء الحيوان الجافة كالجلود والفراء والريش واللحوم المقددة ، الخ .

عثة المناحف

١٧٩١٨ - عَثِيل

Densiflore (F).  
Densiflorus (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات متراكب الازهار البلية .

١٧٩١٩ - عَجَاذَة

Ergot (F). Spur (E).  
دائرة الطائر آتي يضرب بها .

عشجول

١٧٩٢٠ - عَجَاكَة ، عَجَاكَة

Salaire (F).  
Salary, Hire (E).  
هي الاجرة التي يتقاضاها العامل لقاء العمل الذي قام به .

١٧٩٢١ - عَجَام

المعجام الخفصاش الضخم .

Anthrenus verbasci (S).  
Anthrene des tapis (F). Carpet beetle (E).  
حشرة من العثيات يضيغة الشكل طولها نحو ٣ م . ثوبها اسود اللون . عمدلها مدجنان يقع حشفيته طلاء اللون . يرقبها دقيقة قصيرة هلبية الجسم ، سمراء اللون ، سوداء الرأس والارجل ، يضاء المذب . تلحس السجاد واسائر الاثقة الصوفية .Dermestes lardarius (S).  
Dermeste du lard (F). Larder beetle (E).  
حشرة من العثيات طولها نحو ٩ م . ثوبها اسود اللون تملو مشحة خلية طلاء . تتركز في النصف الاول من النمدين || يرقبها غبراء اللون تلحس الشحم والفراء واسائر المواد الحيوانية .Dermestes vulpinus (S).  
Dermeste renard (F).  
حشرة من العثيات طولها نحو ٨ م . ثوبها اسود اللون ، اغبر الحوافث الخلية . يطبها الى السمرة يطلو خط قاطب اطحل || يرقبها سمراء اللون سوداء الرأس والدرج والارجل . تركب الفراء والجلين وتختلف المواد الحيوانية والنباتية .Attagenus pellio (S).  
Attagne des pelletiers (F).  
حشرة من العثيات طولها نحو ٤ م . ثوبها حشطي اللون . اسر المراج تحمل في كل من عمدنها نقطة يضاء || يرقبها شقراء اللون سمراء الرأس تحمل عند شربها ضمة من الحلب الطويل . تركب وتقرض الفراء والبسط واليابب الصوفية .Anthrenus pimpinellae (S). Anthrene des pimpinelles (F).  
حشرة من العثيات يضيغة الشكل طولها نحو ٣ م . ثوبها الى السمرة تحمل في وسط عمدنها جدة معتمة يضاء اللون . تركب يوجه عام جميع ازهار نباتات فصيلة المركبات اعصها الكمون والانيسون .Anthrenus museorum (S). Anthrene des musées (F).  
حشرة من العثيات جسمها يضيي الشكل مبطط . طولها نحو ٣ م . ثوبها ابلق اللون . تعيش على ازهار نباتات الفصيلة الجسمية || يرقبها صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون ، مجذعة مبطط هلبية حشطية ، تقرض كل ما وصلت اليه من المواد الحيوانية المحفوظة كالحشرات والبير والحيوان .Clavatus (S).  
Clavatul (F). Clavatul (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدغيات الارجل وفصيلة الكريزيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي وشواطئ افريقية الشمالية || اصداها وشية الشكل تملو بعض المناحف الكبيرة الحادة . فوالتها شبه فرجية الشكل . مدول الفوة مجهز بثلاث اسنان ، السن الوسطى قصيرة اما الجانبين تكبيرتا القد مدببنا الاطراف .Culture sèche (F).  
Dry-farming (E).  
المشر والمشري والذي : ما سقته السياه من اريجار والزرع . ومنه في حديث الآكاة « ما كان يملأ أو عثياً فيه المشر » .

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها من نمول الحماط الاستوائية والحارة || جميعها حرجية تألف الغابات والحدائق اجسامها كبيرة القد مجهزة بمنخس حادة تهريق السم او تقلّفه عن بعد || بعض أنواعها دجوي والبعض الآخر يسرح في النهار || اشهر اجناسها المعروفة والكبار .

١٧٩٣٦ - عَجَزْ  
هي العقاب الذهبية، تأخذ السخلة فتطير بها . ج عجزان .

١٧٩٣٧ - عَجَزْ  
Déficit (F). Deficit (E).  
هو مقدار النقص المحقق بعد اجراء كامل الحساب .

١٧٩٣٨ - عَجَزْ ، قَبْ  
Sacrum  
عظم في آخر سلسلة الظهر .

١٧٩٣٩ - عَجَزْ الاستغلال  
Déficit d'exploitation (F). Working deficit (E).  
هو ما نقص من الدخل بعد تقويم المستغل بالنسبة الى الكلفة .

١٧٩٤٠ - عَجَزْ الأسد  
عجز الاسد اربعة كواكب صغار اسفل من المواء .

١٧٩٤١ - عَجَزْ حَرْقِيّ  
Sacro-iliaque (F).  
Sacro-iliac (E).

١٧٩٤٢ - عَجَزْ ذَيْلِيّ  
Sacro-caudal

١٧٩٤٣ - عَجَزْ شَرْجِيّ  
Sacro-rectal  
ويسمى مستقيمي وهو مختص بالمعي المستقيم .

١٧٩٤٤ - عَجَزْ عَصْفِيّ  
Sacro-coccygien (F).  
Sacro-coccygeal (E).

١٧٩٤٥ - عَجَزْ فَقْرِيّ  
Sacro-vertébral (F).  
Sacro-vertebral (E).

١٧٩٤٦ - عَجَزْ قَطَنِيّ  
Sacro-lombaire (F).  
Sacro-lumbar (E).

١٧٩٤٧ - عَجِيف  
Qui se prive de nourriture (F).  
نمت ترميفي يطلق على كل فراشة او حشرة جلجلة لا تذوق القوت . يعني ، غالباً ، تعيش من يوم الى اسبوع . م . عيفة .

١٧٩٤٨ - عَجِفَاء  
Terre aride (F).  
Barren ground (E).  
المجفأ والارض المجفأ . التي لا خير فيها .

١٧٩٤٩ - عَجِفِيّات  
Entomophthoraceae (S).  
Entomophthoracées (F). Entomophthoraceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة النطرييات ورتبة الليفيات .

١٧٩٥٠ - عَجَلْ  
Veau (F). Calf, Veal (E).  
ولد البقرة حتى السنة الثانية من عمره ثم يصبح جذاً .

١٧٩٥١ - عَجَلْ البَحْر  
هو الفقمة حيوان مائي ليون ..

١٧٩٥٢ - عَجَلْ خَصِيّ  
Bouvillon (F).  
Young bullock, Steer (E).  
هو المجل سلت خصيتاه .

١٧٩٢٢ - عَجَان  
Périnée (F). Perineum (E).  
المسافة الكائنة بين عضو التناسل والشرج .

١٧٩٢٣ - عَجَالِيّ  
Périneal (F). Perineal (E).

١٧٩٢٤ - عَجَايَة  
Tendon  
المجاية . ج عجي وصجايا وصجايا : اوتار قوائم الخيل والاولى .

١٧٩٢٥ - عَجَبْ  
هو جلاب النيل ، اطلبه .

١٧٩٢٦ - عَجَبْ ، عَجَبْ  
Racine de la queue (F).  
Origin of the tail (E).

المعجب : اصل الذنب وهو من كل دابة مسانم عليه الوركين من اصل الذنب المنزوع في مؤخر المعبر . وهو المصعص والمعجب . ج اعجاب وصجوب .

١٧٩٢٧ - عَجْدْ  
Raisin sec (F). Raisins (E).  
البيد هو الزبيب او حب الزبيب .

١٧٩٢٨ - عَجِير ، عَقِيد  
Loupeux (F).  
Wenny, Knobby (E).  
من اللبث ما كان ذا عجز او عقد .

١٧٩٢٩ - عَجْرَة  
Eclat de souche, Souches,  
Souquet (F). Shiver, Splinter, Ragstone (E).  
جزء من اروية الشجرة ، يحمل برمة او بعض البراعم ، يقطع ويفرس .

١٧٩٣٠ - عَجْرَة ، مَعْجَرَة  
Défolié (F).  
Defoliate (E).  
نجر عجرد ومجرد : عار من ورقه .

١٧٩٣١ - عَجْرَم ، أَشْكَل  
Rhamnus petiolaris (S). Nerprun pétiole (F).

الواحدة عجمرة وأشكلة ، شجيرة برية ، حرجية ، جبلية من فصيلة النبقيات . اعطانها بعض جبال الشرق الادنى ومنها جرد لبنان || ساقها فروع كثيرة المقد الشائكة . فروعها متعاقبة ، متفرعة ، شائكة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، سنائية النصال الجامدة ، شديدة الحفار ، متقابلة المروق . ازهارها شمعية التجميع ، غشوية ، خاسية الازهار . ثمارها كروية لحمية ، حامضة المذاق ، جزؤية اللون عند الادراك || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٧٩٣٢ - عَجْرَم  
دوبية سلبة تكون في الشجر (اللسان) .

١٧٩٣٣ - عَجْرَمَة  
شجرة شائكة كثيرة المقد . ج عجرم .

١٧٩٣٤ - عَجْرُون \*  
Camponotus (S).  
Camponote (F).

جنس نمل كبير القد عديد الانواع ويكثر وجوده في اسراج البلاد الحارة . منه انواع تنبي قراها بالطين وغيرها تسرد الخشب وتنقذه .

١٧٩٣٥ - عَجْرُونِيّات  
Camponotidae (S).  
Camponotidés (F). Camponotidae (E).  
فصيلة حشرات من النمليات غشائيات الاجنحة الحمويات .



عجرون

## ١٧٩٦٢ - عَجُور \* ، عَيْدَ اللاوي

Cucumis chaté (S). Concombre chaté, Abdellavi des Egyptiens (F). Chate of Egypt, Orange melon (E). Agyptische Melone, Orangen Melone (D). Clatte, Cocomero d'Egitto (I).

نوع من الفناء المأكول الثَّار تكثر زراعت في البلاد الحارة انحصار مصر والسودان . يوجد في الاربة البداية المتوسطة الاندماج وهو يرغب في الري لكن يخشى الرطوبة المتحمكة



عجل

## ١٧٩٦٣ - عَجُور القريشي

هو البياض الزراعي ، اطلبه .

١٧٩٦٤ - عَجَبَج (F). Beuglement, Meuglement  
Bellowing (E). صوت البقر من ذكر واثني .

١٧٩٦٥ - عَدَدَ ، عَدَدَ (F). Dénombrement  
Enumeration (E). العدد والتعداد هو الاحصاء النوعي لمشتلات مكان معين .



عجور

١٧٩٦٦ - عَدَدَاءُ ، وَكَّرَ (F). Courer  
Runner (E). كل من كان سريع العدو او اشترك في سباق الركض .

١٧٩٦٧ - عَدَدَاءُ الشَّطِّ (F). Octodrome  
طائر من طول الساق يدعى جَوَّعْكَر ، اطلبه .

١٧٩٦٨ - عَدَابَ ، رَمَلُ التَّاقِ (F). Tangué, Tanque, Tangu (sable fin) (F). Slimy sand (E). رمل وحل وافر الغبار والناحور المغنية التشيلية . يستعمل في دمل الاربة الماداة الاندماج .



عذار

١٧٩٦٩ - عَدَادَ (F). Effectif (F). Actual (E). هو مجموع الاجزاء والعمال والمؤمرين الذين يقتضون ال شركة ما او مصنع او مؤسسة . الخ .

١٧٩٧٠ - عَدَادُ السَّرْعَةِ (F). Compteur de vitesse  
Quickness meter (E). آلة تستعمل في معرفة سرعة الشيء .

١٧٩٧١ - عَدَاوَر \* ، هِدْرَ (F). Hydra (S).  
Hydra (F). Hydra (E).

جنس حيوانات مائية من العادات انواعه كثيرة العدد جميعها مفترسة تعيش لاصقة على النباتات البحرية . اجسامها مؤلفة من اثنيون عضوي دقيق طوله يراوح بين ٥ و ١٠ سم ومن جناس خيطية نحيلة شديدة البكول وظيفتها القبض على الحيوانات الدنيا التي تمر في ساجها .



عذار

١٧٩٧٢ - عَدَاوَر \* (F). Zoidiome  
Zoidiome (E). نعت تعريف يطلق على كل نبات لا يتم تأخير ازهاره الا بواسطة الطير او الحشرات .

١٧٩٧٣ - عَدَاوَرَات \* ، هِدْرَات (F). Hydralres (F). رتبة حيوانات مائية من الحيوانات .

١٧٩٧٤ - عَدَاوَرَة (F). Zoidiome  
Zoidiome (E). اسم يطلق على التأخير الذي يحصل بواسطة الطير والحشرات .

Vèle (F). She-veal (E).

اية البقرة حتى السنة الثانية من عمرها وبمدها تصبح جليدة .

١٧٩٥٤ - عَجَلَكَة ، طَبِير (F). Charrette, Tombereau  
Cart, Tip-cart (E). عربة للنقل ذات دولابين .

١٧٩٥٥ - عَجَلَسَ \* (F). Hoplostethus (S).  
Hoplostêthe (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة المغذيات الشائكات الزعانف . موطنها المتوسط والقرزم . تتميز بعينها الكبيرتين المستديرتين وبغرابة الانكسال الثالثة التي تملو كامل رأسها . طولها نحو ٢٥ سم . ثوبها الى السمرة السفعاء يملوها مراح بنفسجي . بطنها فضي اللون ، زعانفها وردية والزعجيرة بها كبيرة القد فارقة .

١٧٩٥٦ - عَجَلَسَ التَّوَسُّطَ (F). Hoplostethus mediterraneus (S).  
Hoplostêthe de la Méditerranée (F). Hoplostethus mediterraneus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة المغذيات رزنية شائكات الزعانف . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اثمارك الثاقف . ملجئها الحياطي شرنبي || جسمها شبه بيضي الشكل ، معتدل البسيط ، بطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الخفسار الزهني يملوها مراح بنفسجي يمتد في الظهر . بطنها فضي المراح . زعانفها متراكبة الاخر والوردي . رأسها كبير الحرم ، انفس الخط ، تملوها زخارف نائقة . شذها رجب الانفراج . فكها السفلي يتقدم العلوي . اسنانها صغيرة ، متراسة ، حلية السطح . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، نائضتان ، مملوكتان بالزوايق النائقة . زعنفتها الظهرية وحيدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها القبلية كبيرة ، فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧٩٥٧ - عَجَمَكَة (F). Noyau (F). Stone (E).  
القسم الداخلي من الثمرة صلب وقسا وحوى البيرة .

١٧٩٥٨ - عَجَمَكَة نخلة تثبت من نواة .

١٧٩٥٩ - عَجَمِيَّات \* ، لَوَزِيَّات (F). Arbres à noyaux (F). Trees from stones (E).  
هي الاشجار الجمية البزور كالدراق والخوخ والمشمش واللوز ، الخ .

١٧٩٦٠ - عَجَنَ ، إِعْتَجَان (F). Pétrissage (F).  
Kneading (E). عملية خلط الدقيق بالماء ودعكه ليصير عجياً .

١٧٩٦١ - عَجْجُوم \* ، أَبُو جَلَمَ (F). Rhynchops (S).  
Bec-en-ciseaux (F). Scissor-bill, Skimmer (E).

جنس طيور راسه مائنة من صفحيات الناقير كفات الاندماج . انواعه خمسة جميعها بلقاء الثوب . تتميز بشكل مناقيرها التي تشبه جلم الحياط . رؤوسها صغيرة القد . اعناقها طويلة . اجسامها مستطيلة ذلقة . اذنانها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تألف السلوط البحرية والبرية . قوتها الحشرات والاسماك . مسرحها دجوي يتعد من القرب الى الشروق || انشائها تدين في افاحيص ندرها على الرمل بين قصور الجرف والشراط .

القدم || جسمها صلب، متوسط القد، متكاثف الجمل. بسطها تراوح من ٤٤ إلى ٦٠ سم. الأنيب أكبر قدماً من الذكر وأبهر ثوباً منه. رأسها مخروطي. عيناها صغيرتان، بارزتان. زباناها شطيان مزدوجان. عظمها قصير. ملمسها صفيان. اجنحتها كبيرة، ملونة وبقيعة || سرقتها خاضعة تمش على اوراق البتليات.

Adrasia (S). \* عذريسة ١٧٩٨٥

Adrasie (F). جنية معمرة برية وزراعية تربيته من فصيلة الدلائيات. منبتها جزر الزايج || تساهل النصار متنبية. فرومها نحلة. اوراقها متعاقبة، سنانية النصال الجامدة المتوسطة القد. ازهارها فردية التجميع، طرفي الاوتكاز. ازهارها كبيرة، خماسية البتلات، تبتية اللون يملؤها موانج ليلكي || تزرع في الحدائق في المراتع الجنوبية لانها تحثى صقح الششاء.

Endromididae (S). عذريسيات ١٧٩٨٦

Endromididae (F). فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المدد جميعها شحالية الاعلان. مركزها التربي يقرها من البفليات || اجسامها صلبة، شبه اسطوانية الشكل، ينقلها حل مستطيل، بسطها تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ سم. انثيا اكبر قدماً من ذكورها. رؤوسها مخروطية. عيونها مرطاة. اعطامها قصيرة. ملمسها صفيان. قرونها الاستعمارية شطية مزدوجة. اجنحتها كبيرة، عادمة التهذيب. انثيا متراكبة الالوان الجملية. اساريمها شبه مرطاة. تمش على الاجبار. اكامل خادراتها يتم ضمن صلجة مستقلة || اشهر اجناسها العدريس.

Mule (F). Mule (E). عذس ١٧٩٨٧

العذس والعذس هو البيل وقد سموه بجزره. قال الشاعر: اذا حلت بزني على عذس على الذي بين الحمار والعذس

١٧٩٨٨ - عذس \* ، بلسن

Ervum lens, Lens esculenta (S). Lentille (F). Lentil (E). Echte Linse (D). Lente, Lenticchia (I). نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية. ضروبه عديدة تختلف باختلاف مقدورها الاماني والانتاجي وسرعة ادراكها واللوان جوبوها. الع. جميعها صغيرة القد، جذورها سطحية، سوقها مضطمة رفراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. اوراقها مركبة، متساقية، عتنية الاطراف. وريقاتها صغيرة القد يضيقة الشكل متعاقبة. ازهارها محورية الاوتكاز، طويلة المعلق، بيضاء اللون، زرقاء التوضيح. ثمارها قرون صغيرة مغلطمة، مائلة البشرة، يوجد في داخل كل منها من الحبة الى الحبتين || وهو من النباتات الزراعية الشائعة الاستعمال بمجود في جميع الارربة الخفيفة المعتدلة الاندماج التي لا تقتصر الى الكلس. موقعه في الدورة الزراعية يأتي في الاول ثم تقيمه الحظوة الى الثمير. والعذس من النباتات المشهورة بغزارة موادها الغذائية النافعة. فهو يحوي نحو ٨٢ وحدة غذائية يمكن تمجدها كما يلي:

مواد هيدروكربونية	٥٨ %
مواد بروتينية	٢٢ %
مواد دهنية	٢ %

اما تين العذس فهو من انواع الكلاء الجيدة التي تتلفها الموائش بشهوة.

Hydroides (F). عذاريات ، هذريات ١٧٩٨٥  
طبقة حيوانات مائية من شعبة الهيفات تشمل ثلاث رتب: المدارات والمرجانيات والجلديات.

Génétique (F). Genetic (E). عذالفة  
علم يبحث في التناسل وروابطه واوراره عند الحيوان والنبات.

١٧٩٨٧ - عذد تام، عذد صحيح، عذد كامل  
Nombre entier, N. intégral (F). Integral number, Whole number (E).

١٧٩٨٨ - عذد قانولي، نصاب  
Quorum هو المدد الاذن المفروض ليكون اجتماع اعضاء الجمعية قانونياً.

١٧٩٨٩ - عذد كسري  
Nombre fractionnaire (F). Fractional number (E).

١٧٩٩٠ - عذد مركب  
Nombre composé (F). Composite number (E).

١٧٩٩١ - عذدي  
Numéral, Numérique (F). Numeral, Numerical (E).  
دال على عدد او محص بالمدد.

١٧٩٩٢ - عذر  
Striga (S). Strige, Goutte de sang (F). Witch weed (E). Echte Witchweeder (D). Striga (I).

جنس نباتات عشبية برية مرموعة من فصيلة الخنازيريات مهدا البلاد الحارة تكثر في المروج وفي البور على السواء. يقال انها طيبة.

١٧٩٩٣ - عذراس معقب

Adrastus limbatus (S). Adrasie bandé (F). Adrastus limbatus (E).

حشرة خاضعة ناهمة من فصيلة السالويات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها بعض اقالم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاذن واروبه. تألف الموانج للربطة والمروج وضفاف الماء والاحراج الدغلة. خنافسها تمش على اوراق النبات. يرقاتها تمش على المواد الضوية وعلى جذور النباتات الصائرة نحو الاخلال || جسمها صغير دقيق يطول من ٤ إلى ٦ سم. ثوبها ثنائي اللون، اسود الجسم، كسني الظفران المنصب بجمار اسمر. رأسها صغير القد. زباناها عيطيان. عيناها صغيرتان. ارسافها خماسية العقل || الانثى اميز قدماً من الذكر وابهر ثوباً منه واقرصر زبانا واسنم بطناً || جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر شهر ايار وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار وتثبت في الليل || زين الدساح يستمر طول شهر حزيران وترزض المكان في الجملانة وحت الليل ضمن انابيب سحبة الشكل || البرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٢ سم. ثوبها الى الصفار المابق النعاني الموانج || طول الاكامل يستمر من ٤٥ إلى ٥٥ يوماً ويتغذي في التربة.



عذراس معقب



عذريس



عدرية



عذس

١٧٩٩٤ - عذريس  
Endromis (S). Endromis (F). Endromis (E).

حشرة من فصيلة المدريسيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. اصلها تشمل كامل المنطقة الشمالية وما يتأخها من العالم

١٨٠٠١ - عَدَمُ الرَّجُوعِ Irrevocabilité (F).

Irrevocabilité (F).

صفة تتميز بها الحبة بين الاحياء وقد لا تسمح بدونها ونموها انه يحظر على الواهب ان يحتفظ لنفسه مباشرة او مداورة في عقد الحبة بحق الإبطل أو التطيل .

١٨٠٠٢ - عَدَمُ الصَّحَّةِ Irrégularité (F).

Irregularity (E).

هو النقص الذي لا يصح للموضوع الابدس .

١٨٠٠٣ - عَدَمُ المَحْجُوزِيَّةِ عَدَمُ الاِحتِياج Inopposabilité (F).

Inopposability (E).

هو ان يستحيل على الخصم ان يبيع شئمه بحق له .

١٨٠٠٤ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّحْوِيلِ Incessibilité (F).

Untransferable (E).

صفة الاموال التي لا يمكن نقل ملكيتها الى الغير .

١٨٠٠٥ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّصَرُّفِ Inaliénabilité (F).

Inalienability (E).

صفة الاموال المينة التي لا يمكن نقلها او تكليفها بحقوق عينية جديدة كالارتفاق والرهن ، الخ .

١٨٠٠٦ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّقَادُّمِ Imprescriptibilité (F).

Imprescriptibility (E).

صفة تلازم حقاً او دعوى لا يقطعهها مرور الزمن كدعوى الاحوال الشخصية والاملاك العامة .

١٨٠٠٧ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْحَزَرِ Insaisissabilité (F).

Unseizability (E).

صفة عين ثابتة او منقولة لا يستطيع الدائن مالكتها ان يبيعها .

١٨٠٠٨ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْقِسْمَةِ Indivisibilité (F).

Indivisibility (E).

هي حالة ما تنقسم قسمه مادياً او منوياً . كالاقطار وسق الارتفاق والالتزام بدفع ثمن حيوان حي معين .

Pernoptère mâle (F).

Pernopterus male (E).

١٨٠٠٩ - عُدْمُولُ الذكر من الرثم .

١٨٠١٠ - عُدْمُولُ هو الصفدع ، اطليه .

١٨٠١١ - عُدْمُولُ اخْضَرُ Grenouille verte (F).

هو الصفدع الاخضر ، اطليه .

١٨٠١٢ - عُدْمُولُ اشْعَرُ Grenouille poilue (F).

هو الصفدع الاشعر ، اطليه .

١٨٠١٣ - عُدْمُولُ اغْرَ Grenouille rousse (F).

هو الصفدع الاغر ، اطليه .

١٨٠١٤ - عُدْمُولُ الحَقْلُ Grenouille oxyrhine (F).

هو صفدع الحقل ، اطليه .

١٨٠١٥ - عُدْمُولُ جَبَّارُ Grenouille géante (F).

هو الصفدع الجبار ، اطليه .

١٨٠١٦ - عُدْمُولُ نَشِيطُ Grenouille agile (F).

هو الصفدع للنشيط ، اطليه .

١٧٩٨٩ - عَدَسُ الْمَاءِ \*

Lemna (S). Lentille d'eau, Lenticule, Caniliée, Caneille (F). Duck-weed, Water-lens, Water lentils (E). Kleine Wasserlinse (D). Lenticularia, Lente d'acqua, Erba antrina (I).

جنس نباتات عشبية مائية من وحيدات الفلقة ورفصيلة عسليات الماء . تتميز بصغرهما ودقة سوقها واستدارة اوراقها العنسية الشكل والقد التي تغلف على سطح الماء . ازهارها وحيدة المسكن ، ثلاثية التجميع يضمها شرفا وحيد يتألف من زهرتين ذكريتين وزهرة انثوية واحدة .

١٧٩٩٠ - عَدَسُ مُرٍّ هو الايدوسارون ، اطليه .

١٧٩٩١ - عَدَسَةُ الْعَيْنِ Lentille de l'œil (F).

Eye lens (E).

١٧٩٩٢ - عَدَسِيَّاتُ الْمَاءِ Lemnaceae (S).

Lemnaceae (F). Lemnaceae (E).

فصيلة عَدَسُ الْمَاءِ من وحيدات الفلقة . اجناسها ٤ وانواعها ٢١ جميعها من النباتات المائية والمنفعة المنتشرة في جميع اسواق العالم .

١٧٩٩٣ - عِدْفُ Géniteur (femelle) (F).

Begetter (female) (E).

هو في النبات ما صار تتيبع ميسم زهره بمكبر زهرة اخرى مصدرها الدم المختب .

١٧٩٩٤ - عِدْفُكَّةُ Incompressibilité (F).

Incompressibility (E).

عدم القابلية للضغط والانصراف والكبس .

١٧٩٩٥ - عُدْمُولُ \* Adelpops (S). Adélops (F).

حشرة كفة من عذبات الاجنحة دوبريات القرون . تألف الاثنية والكهوف والواقع المظلمة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتلة الحارة || جسمها اهليجي الشكل يطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السرة الثنية المواج . زباناها دوبريان مستطيلان . قوائمها تحيلة مستطيلة || قوتها المواد الضوية النحلة تلتسها بزباناها لانها كفة عادمة البصر .

١٧٩٩٦ - عَدَمُ الاختصاص Incompétence (F).

Incompétence (E).

هو ان لا تكون القاضي او المحكمة او لاحدى السلطات العامة سلطة على ايجاز على قانوني .

١٧٩٩٧ - عَدَمُ الانقياس Asystole (F).

١٧٩٩٨ - عَدَمُ الأهلية Incapacité (F).

Incapacity (E).

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من وجوب حق له . لذلك تقسم عدم الأهلية الى :

عدم أهلية الاداء Incapacité d'exercice

عدم أهلية الوجوب Incapacité de jouissance

١٧٩٩٩ - عَدَمُ التَّعَادُلِ عَدَمُ التَّعَادُلِ Asymétrie (F).

Asymmetry (E).

شذو غير مألوف في التناسق او التعادل .

١٨٠٠٠ - عَدَمُ التَّفْهِيدِ Inexécution (F).

Non-fulfilment (E).

هو ان لا يقوم المرء بیکل ما التزم به او بفضه .



عَدَسُ الْمَاءِ



عُدْمُولُ

الفرمان والدفان ولا تضع في العش الواحد أكثر من بيضة .

### ١٨٠٢١ - عَدْن

Dérochement, Epierrage, Epierrement (F). Scouring, Clearing land of stones (E).

رفع الحجارة أو إقلاعها من أرض الحقل .

١٨٠٢٢ - عَدْن ، صَفِير Adenium venenatum (S). Adénie (F). Adenle (D). Adenia (I). جنبة يرية معمرة من فصيلة الدفليات ، أوراقها معتقة ، متعاقبة ، سنانية . نصلها جلدي الصفحة بحري اللون . أزهارها حشوكي تاجي . أزهارها غبراء اللون || منبتها البلاد الحارة ، تكثر في الجزيرة وهي من النباتات السامة .

١٨٠٢٣ - عَدُو ركض الدابة السريع . Galop (F). Gallop (E).

١٨٠٢٤ - عَدُوَّتُهُ \* Idotea (S). Idotée (F). Idotea (E). جنس دوبيات بحرية من فصيلة العدويّات . أعطائها بحار البلاد الحارة وأخصها البحر الأحمر والمحيط الهندي . تعيش بين النباتات البحرية قرب المحاذج والشطوط || أجسامها تساعية السكم متعددة التبييط ، تقوّل من ٣ الى ٦ سم . مناطقها الشريعية ملحقة بصفايح مندمجة تبدو كالخشب المتصل . قرونها الاستشعارية مسطّلة ، مدببة الأطراف . أرجلها سباعية الأزواج ، محبنة المقاطع الذرية || أثوابها متراكبة الجؤري والأحر والأصفر والأزرق والبني .

١٨٠٢٥ - عَدُوِّيَّات Idoteidae (S). Idotéidés (F). Idoteidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريّات متساويات الأرجل أجسامها وأنواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية . تعيش بين النباتات البحرية القريية من المحاذج والشطوط || أعرف أجسامها وأشهرها العدوتة .

### ١٨٠٢٦ - عَدُوِّي

Infection, Contagion, Contamination انتقال الجراثيم أو الميكروبات الطبية الى جسم الحيوان السلم وأصابته بالمرض الذي تحمسه تلك الجراثيم أو الميكروبات . راجع إصابة .

١٨٠٢٧ - عَدِيد Multi, Poly (F).

١٨٠٢٨ - عَدِيد الْأَرْجُل Polypode (F). Polypod (E).

١٨٠٢٩ - عَدِيد البُرُور Polysperme (F). Polysperm (E).

صفة بعض الفطور التي تتميز فيها الأعضاء الثرية بوفرة البذور .

١٨٠٣٠ - عَدِيد الثُغُور Polystomate (F). Polystomatous (E).

١٨٠٣١ - عَدِيدَات الصِّحَاف Polyplacophores (F). Polyplacophora (E).

شعبة من الرغويات الراباطيات . أنواعها المعروفة نحو ٦٠٠ يكثر وجودها على صخور الشاطئ \* أشهر أنواعها الحديدة والكيتون .

١٨٠١٧ - عُدُوبِيَّات Ranidae (S).

Ranidés (F). Ranidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازبة من لمة الحديديات ومرتبة السورنات ورتبة البرمائيات أي عديمات الذنب || أجسامها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع أصقاع العالم القديم والجديد || أجسامها متفاوتة القد تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز ثلاثيتها ، وتقلو فقرة العنبر من التنوات المظلمة الجانية . فكوكها العليا مسنة . أصابع قوائمها الخلفية مفيدة محظاب لاقامي الرخابة || أشهر أجسامها المدوك أي الضفدع .

١٨٠١٨ - عُدُمُون Adimonia (S).

Adimonia (F). Adimonia (E).

جنس حشرات غاصلة من مفصليات الأجنحة وفصيلة الفشاريات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ أعطائها مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألفت المرامي والحقل قوتها النباتات المشية من الأوراق الى الأجزاء والجذوع والجذور || أجسامها متوسطة القد . أنثاها أكبر جرمًا من ذكورها وافتح ثوبًا وأصفر ظهرًا إذ أنه لا يلحف كالم البيط عند الاثلاث . أثوابها متباينة الألوان يكثر فيها الاسود والاسمر القاتم والجؤري المالح || أعرف أنواعها وأشهرها الاثلاث التالية :

### ١٨٠١٨\* - عُدُمُون سُرُورِي

Adimonia rustica (S). Adimonia rustique (F).

يعتبر من الخنافس المؤذية لانه يلتهم الأوراق التي تلتصق سطح التربة . ثوبه الى السمرة القائمة ، أسفح الموج عند الذكر ، باهته عند الانثى .

### ١٨٠١٨\* - عُدُمُون عَتِيد

Adimonia tenaceti (S). Adimonia obstiné (F).

يعتبر من الخنافس المؤذية لانه يلتهم كل ما استطاع اليه سبيلا من أجزاء النبات . ثوبه الى الجؤرة يزعمه عند الذكر ويهت عند الانثى .

١٨٠١٩ - عِدْمِيْس Eudynamis (S).

Eudynamis (F). Eudynamis (E).

جنس طير من فصيلة القيقوبيات . أنواعها المعروفة عشرة موطنها يمتد من إيران الى الهند والبريا والفلبين || أجسامها ريشة تقوّل من ٣٥ الى ٤٠ سم . أجسامها كبيرة ذلقة . أذناها مسطّلة ، مستديرة الأطراف . مناقيقها ضلعية مقنقة الخاطم العليا الشارفة ، جالسة السفل . سيقانها معتدلة الطول . حيوها مطوقة بحار ماسح امرط لا ريش فيه || قوتها الجراد والحشرات والبرية والبزور || أعرف أنواعها وأشهرها العديميس الشرقي .

### ١٨٠٢٠ - عِدْمِيْس شَرْقِي \* ، قَوَال

Eudynamis orientalis (S). Eudynamis oriental (F).

سمي قوالاً لان صياحه يشبه القول . طائر من العديميس . موطنه يمتد من الهند الى إيران || جسمه ريش القوام بطول نحو ٤٠ سم . ثوب الذكر الى السواد الاخضر المالح الاسف . ثوب الانثى الى الخضار الالمن المرقوش بالابيض . حلقه البين سواد اللون عند الشفق || يألف الأجرار البميرة الأجرار . قوته الحشرات والجراد والثار البرية والبزور || طيراه سفيف وتصعيد وتبييط . شوطه قصير المدى || انتاه لا تمش بل تضع البيض في أعشاش



علمون



عديميس شرقي



عدوتة



- Impennés (F). **عُدْبِمَات الرِيَش** ١٨٠٥٢ -  
Impennates (E).  
فئة من الطير فصائلها قليلة العدد تتميز بأرياشها الخاصة  
وبقصر أجنحتها الزرقية الشكل المستحالة ال التحديق  
في الماء بدلاً من الطيران في الفضاء . أشهر أطيافها البطريق  
والطرسوج .
- Amétabole (F). **عُدْبِمَة التَّطَوُّر** ١٨٠٥٣ -  
Ametabola (E).  
Acarpe (F). **عُدْبِمَة الثَّمَر** ١٨٠٥٤ -  
Acarpous, Barren (E).  
نمت تعريفي يطلق على النباتات التي لا ثمر لها .
- Aptère (F). Aptera (E). **عُدْبِمَة الجَنَاح** ١٨٠٥٥ -  
Acaule (F). **عُدْبِمَة السَّاق** ١٨٠٥٦ -  
Acaulous, Stemless (E).  
نمت تعريفي يطلق على النباتات التي ليس لها سوق ظاهرة  
أو التي سوقها جذمة . أما عادمة السوق بتأتا فتدعى القفر .  
والتي ساقها قصيرة جداً فهي النجمة .
- Cudrania (S). Cudranie (F). **عُدْبِين** ١٨٠٥٧ -  
جنس الشجار برية وزراعية من فصيلة التوتيات . أنواعه  
قليلة العدد، مهددة الشرق . جميعها سروية تملو ٦  
ال ١٢ م . سوقها فراء فناء . أوراقها عابلة، متعاقبة ،  
بيضية أو مفضضة التصل المائل البشرة التالك المقصدة .  
أزهارها ثنائية المسكن ، ثمارها حمر اللون .
- Palourde (F). Clam (E). **عُدْبِيَّة** ١٨٠٥٨ -  
كل صفة مأكولة كالحار والمحليده وغيرها تدعى عدية .
- Adhara **عُدْرَى ، عُدْرَة** ١٨٠٥٩ -  
المذارى أو المذرة خمسة كواكب في آخر الحقرة .
- Unonia (S). Cunonie, Cunone (F). **عُدَام** ١٨٠٦٠ -  
الواحدة عذامة . شجرة رحيمة الجنس والنوع من فصيلة  
السفرسيات . ساقها مألبة منتصبة فراء تملو ٣ الى  
١٢ م . أوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها سنانية الشكل  
وثرية التجميع ، خاسية العدد أو سباعية . تصلها جامد  
الصفحة ، منشاري الحافة . أزهارها عتقودي الشكل ،  
أبطي الايتكار . أزهارها خاسية البتلات ، عشارة الامدية  
لونها الى الازييض الموشح بالاصفر .
- Barbillon (F). Barbel (E). **عُدْبَة** ١٨٠٦١ -  
عدبة . ج. عدبات . زوائد غيطية لماسة تكون في أحد فكي  
السمكة أو في كليهما .
- Dulcaquicole (F). **عُدْبِي** ١٨٠٦٢ -  
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أوليات يعيش في المياه  
العذبة .
- Nymphe (F). Nymphe (E). **عُدْرَاء** ١٨٠٦٤ -  
في الحوراء ، أطلبا .
- Cochylis **عُدُوط** ١٨٠٦٥ -  
فراشة من فصيلة القاتلات وثرية حرشيات الاجنحة ،
- Lenticelle (F). Lenticel (E). **عُدْبَسَة** ١٨٠٦٢ -  
Lenticulaire (F). Lenticular (E). **عُدْبَسِي** ١٨٠٦٣ -  
Abiose (F). Abiosis (E). **عُدْبِم الحَبَاة** ١٨٠٦٤ -  
Abranchiate **عُدْبِم الخِيَاشِيم** ١٨٠٦٥ -  
Exsangue (F). Bloodless (E). **عُدْبِم الدَّم** ١٨٠٦٦ -  
Acéphale (F). Acéphalous (E). **عُدْبِم الرَأْس** ١٨٠٦٧ -  
Insipide (F). **عُدْبِم الطَّعْم ، عَث** ١٨٠٦٨ -  
Tasteless (E).  
Anélytre (F). **عُدْبِم الغُدْم** ١٨٠٦٩ -  
نمت تعريفي يطلق على كل حشرة جلادة عديمة الغد .
- ١٨٠٤٠ - **عُدْبِم الفِكر ، لا فِكرِي**  
Invertébré (F). Invertebrate (E).  
هي الحيوانات التي لا فكار لها . واللافقاريات هي ؛  
الارالي والافسنجيات والمحيطات والشوكيات والودديات  
والرخويات والمفصليات .
- ١٨٠٤١ - **عُدْبِم الفَلَكَة ، لا فَلَكي**  
Acotylédone (F). Acotylédonous (E).  
نمت تعريفي يوصف به النبات الذي لا فلكة في نطيطه .
- ١٨٠٤٢ - **عُدْبِم الفُوْهَة**  
Apomastome, Apomatostome (F).  
١٨٠٤٣ - **عُدْبِم الْعُذَالَة ، لا بَتَلِي**  
Apétale (F). Apetalous (E).  
هو النبات الذي لا قالة في زهرته .
- ١٨٠٤٤ - **عُدْبِم اللِّسَان**  
Aglosse  
١٨٠٤٥ - **عُدْبِم اللُّون**  
Achromatique (F). Achromatic (E).  
١٨٠٤٦ - **عُدْبِم التَّصِيْمَة**  
Aplacental  
١٨٠٤٧ - **عُدْبِمَات الْأَعْدَايد**  
Aglyphodontes  
حيات خيطية منها فصيلة التابيين وفصيلة الاصيليات .
- ١٨٠٤٨ - **عُدْبِمَات الْأَرْجُل**  
Apodes, Gymnophiones (F). Apodai, Footless (E).  
رقت من الصفغديات .
- ١٨٠٤٩ - **عُدْبِمَات الْأَصْدَاف**  
Aplacophores (F). Aplacophora (E).  
شعبة من الرخويات الرباطيات الارالي . اجناسها وأنواعها  
المعروفة نحو ٢٥٠ .
- ١٨٠٥٠ - **عُدْبِمَات الجَنَاح**  
Aphanipteroides  
طبقة حشرات من شبة الحسدليات تشمل رتبة واحدة  
تدعى القذذانيات . فصائلها عديدة ، أشهرها البرغوثيات  
أما اجناسها وأنواعها لكثيرة العدد جميعها من الحشرات  
الثاقبة المامسة الصغيرة القد .
- ١٨٠٥١ - **عُدْبِمَات اللَّذْتَب**  
Anoures (F). Anoures (E).  
أطلب بتر .



عُدُوط

**Fritillaria lutea (S). عَرَّار أَصْفَر**  
**Fritillaire jaune (F).**  
 نوع من المرار . اوراقه العليا متعاقبة ، ضيقة ، سنانية .  
 شراخه يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . زهرته وحيدة كبيرة  
 القد . لونها الی الصفار الكبير يعلو تقطیع بنفسجي .  
 ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

**Fritillaria persica (S). عَرَّار الْعَجَم**  
**Fritillaire de Perse (F).**  
 نوع من المرار دوفست متراكبة غليظة الاسقاط اللبدة .  
 شراخه يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه صغيرة ،  
 سنانية ، متعاقبة ، بحرية النصل ، تركب الشراخ بكامله .  
 ازهاره عنقودية التجميع ، صغيرة القد ، عريفة الرائحة ،  
 لونها الی البنفسجي الأزرق المواج || ازهاره يستمر  
 من نيسان الى ايار .

**١٨٠٧٦ - عَرَّار الْعَاب ، ثُولِبِ الْمُرُوج**  
**Fritillaria meleagris (S). Fritillaire pintade, Pintade, Damier, Tulipe des prés, Œuf de vanneau (F). Checkered lily, Checkered tulip (E). Echte Schachblume (D). Frittellaria meleagro, Melesgride (I).**  
 نوع من المرار البري اوراقه متعاقبة تطول من ٨ الى  
 ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . شراخه الزهري يعلو  
 من ٢٠ الى ٥٠ سم . ازهاره تطول من ٣ الى ٥ سم . لونها  
 الی الحمرة البنفسجية يعلوها تقطیع ابيض . ضروره  
 الترييبنة عديدة فارقها لون الزهر || يستخرج من بصله ،  
 بصد سلقه ، مادة نشوية مأكولة تشبه البطاطا .

**١٨٠٧٧ - عَرَّار عَرِيش الْوَرَق**  
**Fritillaria latifolia (S). Fritillaire à feuilles larges (F).**  
 نوع من المرار اوراقه سنانية النصل مستعرضة . شراخه  
 يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . زهرته كبيرة القد وحيدة . لونها  
 الی الحمرة الخمرية الموحجة بالاصفر || ازهاره يستمر  
 من نيسان الى ايار .

**١٨٠٧٨ - عَرَّار قَيْصَرِي**  
**Fritillaire impériale (F).**  
 نوع من المرار يعرف باكليل الملك ، الطلح .

**١٨٠٧٩ - عَرَّار مُدْهَب**  
**Fritillaria aurea (S). Fritillaire dorée (F).**  
 نوع من المرار اوراقه العليا متعاقبة او ضعية التجميع ،  
 عيطية النصل . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرته  
 تطول نحو ٣ سم . لونها الی الصفار الاخضر المذهب المواج  
 يعلوه تقطیع حطلي || ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .

**١٨٠٨٠ - عَرَّاسَة \***  
**Ophidium barbatum (S). Ophidie barbu, Donzelle (F).**  
 سمكة بحرية بيوض من فصيلة الجيريات شائكات الزعنات.  
 اعطائها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط والمحيط اطلسي ||  
 جسمها نعليل الشكل ، معتدل التليط ، قريب الشبه  
 بالثيق ، يطلو نحو ٢٥ سم . ثوبها الی المرجاني القضي  
 المواج يعلوه الی الظهر تمشج ازرق ويعلو الی الجانبين  
 نمشة زرقاء حمراء . رأسها اسفلي الشكل ، ذلي الحظ .  
 زعناتها الظهرية والذيلية والشرجية متتابعة تشكل زعنفة  
 واحدة . زعنفتها الحوضية طامسة . فكها الاسفل يتأخر  
 عن الاعلى ويعمل اربع عذبات دقيقة مستطيلة || لحمها  
 متوسط الصنف ، مأكول .

طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م . رؤسها العلويان الی  
 الحطلة الصفراء تفرغها جدد سود . رؤسها السفليان الی  
 الحطلة القفصية || برقائها ثلثو المرار اللون ثم تنحرف الی  
 الزردي وتنتهي بالاحمر ولذا يدعيها اللبدان الحمر . لها  
 جيلان في السنة . بيائها النشوي تقضيه كخادرة تحت  
 لحاء بعض الاشجار اعصها الكرمية . تظهر القراشات في  
 الربيع وتحتضن مكها على البرام الزهرية والورقية فينتف  
 عن رقات تركب تلك البرام || وفي جيلها الثاني الذي  
 يبتدئ عادة في تموز تحت الاناث مكها على الثار وسها  
 العنب فينتف عن رقات دقيقة تغسل الثار من حيث  
 نقت فتعطها وتقيم حتى انسلاخها الاخير ثم تتركها  
 وتنتجو نحو اللحاء حيث تختبئ وتتحول الی غادرات .

**١٨٠٦٦ - عَذِيق، ثَوْرَة**  
**Corymbe (F). Corymb (E).**  
 شكل من اشكال ازهارا يكثر في الفصيلة الوردية  
 كازهار الاجاص والتفاح .

**١٨٠٦٧ - عَذِيقَات**  
**Corymbifères (F). Corymbiferous (E).**  
 سبط من فصيلة المركبات الابنوبية الزهر . ومنتمى  
 توصف به النباتات العذقية الازهارا .

**١٨٠٦٨ - عَذِيق**  
**Culture non irriguée (F). Dry-farming (E).**  
 كل نبات لا يسقي الا المطر . خلاه زنة . الحطلة الزنة  
 هي الحطلة المروية .

**١٨٠٦٩ - عَرَّ النخل \***  
**Graphiola phaeniceis (S). Graphiole des dattiers (F).**  
 وسم فطري سبه فطر مجهري من فصيلة المريات ورتبة  
 الدعاميات || يصيب غصن النخل فتيلو كانها جرياء  
 لانه يثبتها بنشوة صقية الشكل بنية اللون يعلوها عند  
 عومها الاسمر ، المنخفض الارتكاز ، خيط دقيق مركب  
 يحمل غبريات القطر || يقال النخلة المصابة بهذا الوسم  
 نخلة ممرار || يكاثف باستمال بائل يوردو المخلول من ٢  
 الى ٢.٥ ٪ .

**١٨٠٧٠ - عَرَّاب**  
 شجر يفتل من لحائه الحبال . الواحدة عرابة . تأكله  
 القرد ( اللسان ) .

**١٨٠٧١ - عَرَّادَة**  
**Sauterelle femelle (F). Female locust (E).**  
 الجرادة الانثى .

**١٨٠٧٢ - عَرَّار**  
**Cri de l'autruche mâle (F). Cry of the male ostrich (E).**  
 صوت الطليم

**١٨٠٧٣ - عَرَّار \*** ، فريتيلاريا ، حَشِيشَة الْحَجَل  
**Fritillaria (S). Fritillaire (F). Fritillaria (E). Schachblume (D). Frittellaria (I).**

جنس نباتات دوفسية برية وترييبنة من فصيلة الزنبقيات .  
 ازهارها جرسية الشكل ، معتقة ، متدلية ، تجمها شراخ  
 تكلمه منه من الاوراق للسنه المتراكبة . انواعه المعروفة  
 نحو ٣٠ . عصارة بصلها جحالية المادة ، حارمة الطعم ،  
 سهله وقد تصعب سامة عند الاكثار منها . اشهر انواعه  
 ما يتبع .



عَرَّ النخل



عرار



عرَّاسَة

Agropyrum junceum  
Herniaria maritima  
Kochia arenaria

نجير ، سيلون  
نومان بحري  
هيشم الرمال

١٨٠٨١ - عَرَاةٌ ٥  
Thigmotaxie, Thigmotropisme (F).  
Thigmotaxy, Thigmotropism (E).  
خاصة النباتات المتسلقة اذ تجعلها تلتف بسوقها على ساندنها او تلتف بحولها المحزنة او المحجمة .

## ٢ - نباتات الأثرية الرملية الداخلية

Spergularia campestris  
Arabis arenosa  
Agrostis alba  
Vicia lathyroides  
Scleranthus annuus  
Scleranthus perennis  
Rumex acetosella  
Aira caryophylla  
Aira praecox  
Draba verna

أبو غلام حقلي  
إربس رملي  
أردا أبيض ، نجير أبيض  
ياقة جلبانية  
حشيشة القناويل الحولية  
حشيشة القناويل المعمرة  
حمض النخم  
خرطالية ترنقيلة  
خرطالية مبكرة  
درابة ربيعية

١٨٠٨٢ - عَرَاةٌ ، تَنْصَاب  
Placier (F).  
Town traveller (E).  
من عرض الشيء لتصرفه أو بيمه .

١٨٠٨٣ - عَرَاةٌ ٥  
Oniscia (S).  
Oniscia (F). Oniscia (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل  
وفصيلة الخوذيات . أنواعه المعاصرة المعروفة ستة منتشرة  
في مجار البلاد الحارة || أصدانها شبه بيضية اللون ،  
لولبية التخديد النازح ، مستطيلة الانغلاق الطولي المقاطب ،  
قمية الاغصان المستنقة الاطراف .

## ١٨٠٨٤ - عَرَاةُ الأَثَرِ

Détermination des sols d'après la végétation  
spontanée

عراة الأثرية أسلوب واقعي يقود الى معرفة نوعية الأثرية  
من نباتها الطوعية ذلك لان لكل تربة نبات تستقر فيها  
تلقائياً . وقد وضعنا في الجداول التالية أهم هذه النباتات  
المدلالية وأشهرها :

## ١ - نباتات الأثرية الرملية الساحلية

Arrhenatherum elatius  
Selene conica  
Eragrostis minor  
Eragrostis pilosa  
Eragrostis major  
Armeria plantaginea  
Luzula  
Plantago arenaria  
Plantago lagopus  
Helianthemum guttatum  
Herniaria labra  
Herniaria hirsuta  
Agrostis spica venti

شليم رفيع  
علوك مخروطي الورق  
عزّع صغير  
عزّع عقالي  
عزّع كبير  
عيققان لسوني  
لزولة  
لسان الحمل الرملي  
لسان الحمل المفدي  
مداخن لؤلؤي  
نومان امرد  
نومان مزغب  
هزنوس

أثل ، طرفاء (عدة أنواع)  
أريل أحر  
حباحب الرمال  
حشيشة الرمال  
حلل القدران  
ذيل الأرنب  
ذيل الفار البحري  
سرغة دوفصية  
سرمق بحري  
سمادي (بعض أنواع)  
شعير الكتيان  
شنداب بحري  
ظهير عقدية  
عصوية الرمال  
علد مزدوج السنايل ، عنب البحر  
غاليون الرمال  
فجيلة الشع  
قردب الرمال  
قرنفل الرمال  
كتان بحري  
لبلاب بحري  
لسان الحمل التفرني  
متيلا مقورة  
مساح (بعض الأنواع)

## ٣ - نباتات الأثرية السبخة وتدعى بمجوية أو الف الملح

Artemisia maritima  
Salicornia  
Salsola kali  
Aster tripolium  
Suaeda  
Inula crithmoides  
Atriplex halimus  
Senecio crassifolia  
Glyceria maritima

أبست بحري  
اشنان (جميع الأنواع)  
حرض  
خرّام  
دلوق (جميع الأنواع)  
راسن بحري  
سرمق بحري  
شرونة لحية الورق  
شعبة الما البحرية



عَرَاةٌ

Orchis maculata	محملب أبيض	Plantago maritima	لسان الحمل البحري
Carex	سعادى (بعض الانواع)	Plantago crassifolia	لسان الحمل لحمي - الورق
Quercus pedunculata	سنديان مزند ، رور	٤ - نبوت الاثرية الصوانية ، براح	
Genista germanica	شيزاء جرمانية	Betula verrucosa	بتولا ثلثولبية
Salix capraea	صفصاف الماعز	Campanula persicaefolia	جريرس دراقني - الورق
Potentilla tormentilla	عرق انجبار	Jasione montana	جزيون اذوق
Fistuca arundinacea	عكروش علقاني	Sedum Forsterianum	حي - العالم الظريف
Dianthus Armeria	قرنفل اريمر به	Malva moschata	غبازة مسكية ، عطر
Cirsium ferox	قصوان شكس	Erica cinerea	خلنج ربادي
Erythraea pulchella	قطريون ائبق	Erica scoparia	خلنج مكنتي
Cerasus padus	كرز عتقودي	Erica ciliaris	خلنج مهدب
Lobelia urens	لوبيلية محرقه	Hypericum pulchrum	داذي ائبق
Lotus uliginosus	لوطس	Digitalis purpurea	ديجيتال ارجواني
Molinia caerulea	مولينيه ، غرطالية زرقاء	Pteridium aquilinum	دشدار
Scutellaria minor	هربون صغير	Ornithopus perpusillus	رييدان قزم
Ulex europaeus	وزال كبير	Antennaria dioica	رجل القط - الشائع
Ulex nanus	وزال مثنون	Calluna vulgaris	محيسم

## ٦ - نبوت الاثرية الكلسية

Laburnum anagyroides	ابنوس كاذب	Quercus sessiliflora	سنديان لامى - الزهر
Coronilla emerus	امروس الزهارين	Senecio adonidifolius	شرونة زغلطية الورق
Berberis vulgaris	بربريس ، عيد الريح	Senecio viscosus	شرونة لزجة
Buxus sempervirens	بقس دائم الخضرة	Genista tinctoria	شيزاء الصباغين
Asperula tinctoria	جوية الصباغين	Potentilla argentea	عشبة القوى القوية
Ophrys	حاجبية (جميع الانواع)	Festuca heterophylla	عكروش هاتلك
Lavandula latifolia	غزامى ذكرية	Veronica verna	فيرونيكا ربيعية
Lavandula officinalis	غزامى غزنية ، خيرى البر	Veronica officinalis	فيرونيكا غزنية ، لبلاب المهبوس
Lactuca perennis	غس الغالب	Dianthus deltoides	قرنفل دالي
Rhamnus alaternus	زفرين الجرد ، ثبق مترادف	Vaccinium Myrtillus	قام آسي
Hyssopus officinalis	زوقا	Gnaphallium sylvaticum	كرسفية مرجية
Thymus serpyllum	سعر البر ، زعر	Castanea saliva	كستنة مبذولة ، شاهبلوط
Thymus vulgaris	سعر شائع	Nardus stricta	ناردين المروج
Quercus lanuginosa	سنديان ازغب	Epilobium angustifolium	نذ - سنبل
Ononis natrix	شبارق ، لتين القدماء	Sarothamnus scoparius	وزال الشبح

## ٥ - نبوت الاثرية الطينية الرملية

Pulsatilla vulgaris	شقيق النعناع المبذول	Teucrium scorodonia	اسقودريون مائي ، ثوم الحية
Eryngium campestre	شنداب حقلي	Juncus squarrosus	أسل خشن
Lonicera xylosteum	سرعية الجدي الدغلية	Betula pubescens	بتولا زغبية
Vincetoxicum officinale	صقلاب غزني	Viola canina	بنفسج كلابي
Crucianella angustifolia	صلبانية ضيقة الورق	Peucedanum gallicum	بوسيدان غالي
Catananche caerulea	طلسية ، هندباء زرقاء	Campanula patula	جريرس عريض الورق
Teucrium montanum	طوقريون جبلي	Pedicularis sylvatica	حشيشة القمل الحرجية
Teucrium chamaedrys	طوقريون غزني	Pedicularis palustris	حشيشة القمل المتبقية
Globularia	عينون مبذول	Scirpus compressus	حلال لب
Geranium sanguineum	غرنيق دموي	Aira caespitosa	غرطالية التيمص
Calamagrostis argentea	غر - ار فضي	Hypericum humifusum	داذي رطب
Rubia peregrina	فوة - مرحلة	Scorzonera humilis	ديج حقير
Veronica teucrium	فيرونيكا ائبق		

Pastinaca sativa	سيارون كبير	Cornus mas	قرنوس ذكر
Lithospermum officinale	شنجبار غزني	Cirsium acaule	قصوان قرئش
Saponaria officinalis	صابونية غزنوية	Brunella hyssopifolia	قلاع حسل "الورق"
Potentilla reptans	عشبة القوى المسلحة	Brunella grandiflora	قلاع كبير الزهر
Potentilla anserina	عشبة القوى الوزية	Colutea arborescens	قنصور شائع
Euphorbia helioscopia	فريون النجر	Centaurea scabiosa	قطريون اجرب
Euphorbia verrucosa	فريون ثألي	Andropogon Ischaemum	كتيبة
Melampyrum arvense	قرطب الزرع	Carlina vulgaris	كرلين شائع ، زند العبد
Erytraea centaurium	مرارة الحنش	Linomyris vulgaris	لنسير مبدول
Allium ursinum	كرات الدب	Cerasus mahaleb	مهلبل
Ononis campestris	لئين الحقل	Sorbus aria crantz	مخلص
Ononis spinosa	لئين شائك	Hellanthemum vulgare	مداين شائع
Lychnis flos-cuculi	لحنس وردى	Melica ciliata	مغشيرة مهدبة
Anthyllis vulneraria	لوتيا ناعمة ، حشيشة الجرح	Satureia montana	ندغ الجبل
Lotus corniculatus	لوطس قرني	Hippocrepis comosa	نمت النعم
Fraxinus excelsior	مرآن شامخ	Spartium junceum	وزال الشرق
Dipsacus fullonum	مشط الراعي ، شوك الدراج	Ligustrum vulgare	ياسم معروف
Rhamnus cathartica	نبق مسهل		
Agrostis canina	نجير كليبي		
Epilobium hirsutum	ند غفائي		
Mentha arvensis	نمغ صغري	Circaea lutetiana	أبو سلام ، شرق
Falcaria vulgaris	هيردان شائع	Juncus glaucus	أسل بحري اللون

## ٧ - نبوت الاثرية الطينية الكلسية

Aquilegia vulgaris	اكيلاجيا عقابية
Coronilla varia	إمروس ارقش
Sambucus ebulus	يبلسان صغير ، فخان صغير
Sonchus oleraceus	تقناط معروف
Bromus asper	برغول كبير
Campanula trachelium	جريس السنت ، قفاز مريم
Campanula glomerata	جريس صغري
Lathyrus tuberosus	جليان مدرن
Tussilago farfara	حشيشة السعال
Buplerum falcatum	حليلاب منجلي
Mercurialis perennis	حليوب معمر
Androsaeum officinalis	داذي غزني
Daphne laureola	دفنة عود الغار
Aegopodium podagraria	رجل المزمى ، حشيشة المزمى
Fagus sylvatica	زان معروف
Orchis mascula	مهلبل ذكر
Orchis latifolia	مهلبل عريض الورق
Orchis incarnata	مهلبل قرمزي
Stachys annua	سطاقس حولي
Stachys recta	سطاقس سنبل
Carex sylvatica	سمادى حرجي
Carex pendula	سمادى مدلى
Tragopogon pratensis	سلسفيل المارج
Colchicum autumnale	سورتيان الخريف
Iris foetidissima	سوسن متين ، قوسون

## ٨ - نبوت الاثرية المتعوية

Achillea ptarnica	أخيلية بقلة العطاس
Myosotis palustris	أذنان الغار المنقعي
Juncus	أسل (بعض الانواع)
Viburnum opulus	الظوب تلجي
Equisetum maximum	اسوخ كبير
Equisetum palustre	اسوخ منقعي
Sanguisorba officinalis	بلان غزني
Geum rivale	جيوم نهري
Pedicularis palustris	حشيشة القمل المتعوية
Scirpus caespitosus	حلال الحصر
Populus tremula	حور ربراج
Scrophularia aquatica	خننازيرية المتناقع
Scrophularia nodosa	خننازيرية عقداء
Pulicaria vulgaris	رعاع شائع
Stachys palustris	سطاقس المتناقع
Carex	سمادى (بعض الانواع)
Symphytum officinale	سمفون غزني
Salix caprea	صنصاف الماعز
Cardamine pratensis	صناب الماء
Comarum palustre	عشبة القوى المتعوية
Schaenus nigricaus	عين البقر
Eupatorium cannabinum	غفت ابن سينا
Lythrum salicaria	فرتدل مبدول

بضيئة مقطوعة القاعدة طول من ٣ الى ٤ سم. نصلها  
خلى الصفحة السفلى || ازهار نوربها تعد من ٣ الى ٥  
وهي صيوانية التجميع، بيضاء اللون || ازهارها يستمر  
من نيسان الى ايار .

#### ١٨٠٨٨ - عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق \*

*Spiraea hypericifolia* (S). Spirée à feuilles de millepertuis (F).

جنيبة عمرة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة ،  
مستطيلة ، مسنة الزام الاخير . نصلها ازغب البشرة  
ثلاثي المروق او خنسي || ازهار نوربها تعد من ٥ الى ٧  
وهي صيوانية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر  
من ايار الى حزيران .

*Spiraea douglasii* (S). Spirée de Douglas (F).

جنيبة زرقية تملو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية  
مستطيلة . نصلها بطول نحو ٨ سم. وهو خلى الصفحة  
السفلى ، مشاري الحافة في زامه الاخير || ازهارها  
عشوية التجميع ، وردية اللون المايح || ازهارها يستمر  
طوال الصيف .

*Spiraea pubescens* (S). Spirée pubescente (F).

جنيبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. فروعه ارجوانية .  
اوراقها اهليلجية مقطوعة القاعدة . نصلها خلى الصفحة  
السفلى ، مسن الزايمين الاخيرين || ازهار نوربها متوسطة  
العدد ، غنية التجميع ، لونها الى البياض الاسفر المويح .  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٠٩١ - عَرَاوَة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

*Spiraea salicifolia* (S). Spirée à feuille de saule (F).

جنيبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية تطول  
من ٤ الى ٨ سم. نصلها عابق اخضر مسن الحافة يستعمل  
في غش الشاي || ازهارها وردية اللون ، عشكوية التجميع ،  
هرمية الشكل ، عكوكها يطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها  
يستمر من حزيران الى تموز .

*Spiraea chinensis* (S). Spirée chinoise (F).

جنيبة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مستديرة  
مفصصة . نصلها خلى الصفحة السفلى المقلد الطول .  
ازهار نوربها خلية الاعضاء ، متوسطة العدد ، صيوانية  
التجميع ، لونها الى البياض الاسفر المويح || ازهارها  
يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٠٩٣ - عَرَاوَة عُسْكَوِيَّة \*

*Spiraea filipendula* (S). Spirée filipendule, Filipendula (F). Common-droptow, Italian may (E). Knollenmädüss, Knolliges Mädesüss (D). Spirea filipendula, Erba peperina (I).

جنيبة برية طيبة تملو نحو ٦٠ سم. جفوها عشكوية  
عقدية . اوراقها اهليلجية ذرية . نصلها مشاري الحافة .  
ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون عشكوية التجميع . ازهارها  
يستمر من حزيران الى تموز || عسلها حاضرة الطعم ،  
طيبة وندرة البلبل .

*Spiraea cantoniensis* (S). Spirée de Canton (F).

جنيبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ايديدة ، سنانية ،

*Veronica beccabunga*  
*Arundo phragmites*  
*Hydrocotyle vulgaris*  
*Cirsium palustre*  
*Cladium mariscus*  
*Alnus glutinosa*  
*Valeriana officinalis*  
*Mentha aquatica*

فيريوكيا قررة العين  
قصب ، يوص  
قصة الماء الشائعة  
قصبون النائع  
كلاديين منقي  
مفت غروي  
ناردين غزني  
نمغ الماء

#### ٩ - ثبوت الاتربة الطرية وهي معظمها نباتات ناقسة

*Arnica montana*  
*Carum verticillatum*  
*Andromeda polifolia*  
*Viola palustris*  
*Swertia perennis*  
*Erica tetralix*  
*Osmonda regalis*  
*Carex*  
*Salix repens*  
*Sphagnum*  
*Triglochin palustre*  
*Oxycoccus palustris*  
*Gentiana pneumonanthe*  
*Lobelia urens*  
*Menyanthes trifoliata*  
*Drosera rotundifolia*  
*Drosera longifolia*

ارنيكا جبلية ، زهرة المطاس الجبلية  
اطريلال حائقي  
اندروبيده كثيرة الورق  
بنفسج منقي  
جص ممعر  
خلنج رباعي  
سرخس ملكي  
سمادي (بعض الانواع)  
سوخ مداد  
طحلب النائع (جميع الانواع)  
عاشم منقي  
قام صغير  
كوشاد منقي  
لوبيلية عرقه  
نقل الماء  
نيدمان مستدير الورق  
نيدمان مستطيل الورق

*Spiraea* (S). Spirée (F).  
*Spiraea* (E).

جلس نباتات برية وزرقية وطيبة من فصيلة الورديات .  
انواع كثيرة العدد جميعها جنيات وبنجيات . اوراقها  
متعاقبة ، عابلة ، مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها  
صغيرة القند ، لا قياسية الشكل والتجميع . اما الاخصائين  
في علم النبات فيقسمون انواع العراوة الى ثلاث ثلث :  
- الثلثة الاولى تشمل الانواع ذات الازهار الصيواني  
والمعقودية غير المنشعب . - الثلثة الثانية تشمل الانواع  
ذات الازهار المنقبي . - الثلثة الثالثة تشمل الانواع ذات  
الازهار المشكوكي والمعقودية المنشعب || اشهر انواعه  
الطبية والزرينية ما يتبع .

*Spiraea cana* (S).

*Spirée blanche* (F).

جنيبة تملو من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل  
تطول من ٢ الى ٤ سم. نصلها مسن الزام الاخير ،  
خلى الصفحة السفلى البياض اللون || ازهار نوربها كثيرة  
العدد ، غنية التجميع ، صغيرة القند ، بيضاء اللون ،  
غبراء المويح || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٠٩٧ - عَرَاوَة خَوْخِيَّة الْوَرَق

*Spiraea prunifolia* (S). Spirée à feuilles de prunier (F).

جنيبة عمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها



عراوة داذية الورق



عراوة عسكوية

18102 - عَرَاوَة الْمَاء *Naladaceae* (S).  
*Naladaceae* (F). *Naladaceae* (E).  
 فصيلة نباتية من وصيدات القلفة. اجناسها وأنواعها نعا.  
 ١٠٠ جميعها مائية. ازهارها وسيدة الشق || اشهر  
 اجناسها عروس الماء.



عراوة لية النيس

18103 - عَرَاوَة النَّبَس *Naladaceae* (S).  
 هي النيفوز الايسر، اطليه.

18104 - عَرَب *Cauteriser* (F) *To cauterize* (E).  
 عرب الدابة : يزها على اشجارها ثم كولا.

18105 - عَرَبَة ، شَاحِنَة *Voiture agricole* (F).  
*Farmer vehicle* (E).  
 عجلة كبيرة تستعمل في نقل المحاصيل الزراعية وغيرها  
 من سائر الاشياء.

18106 - عَرَبَج *Chien de chasse* (F). *Pointer* (E).  
 هو الذي أي كلب الصيد.

18107 - عَرَبِيد *Chien de chasse* (F).  
 هو الاربد، اطليه.

18108 - عَرَبَرَب *Chien de chasse* (F).  
 هو ساق الصباين، اطليه.

18109 - عَرُبُك *Urbec* (F).  
 حشرة تدعى زئبقت الكرك، اطليها.



عراوة ملكة المروج

18110 - عَرُبُون ، عَرَبُون *Arrhes* (F).  
*Earnest, Deposit* (E).  
 هو مبلغ من النقد أو أي عين متغرة يدفعها احد طرفي  
 العقد إلى الآخر ساعه التعاقد.

18111 - عَرَبِيج *Arrhes* (F).  
 المربيع نوع من الكلاب الاسوية الضامرة الخضر.

18112 - عَرَّة *Arrhes* (F).  
 هي المرة، اطليها.

18113 - عَرَن \* *Myricaria* (S).  
*Myricaire, Petit tamarisk* (F). *Small tamarisk* (E).  
*Rispelstrauch* (D). *Piccolo tamarisco* (I).  
 جنس جنبات برية ورتيبيية معمرة من فصيلة الالائيات.  
 انواعها قليلة. سوقها فراء مستطيلة القصبان المجزوة  
 اللون. خراصيها دقيقة تنقبض بالتمديد الزهري || وهو  
 من النباتات السبروية التي تعيش في أي مكان كان حتى  
 بين الصخرون || اعرف انواعها ما يلي.



عرق

18114 - عَرَن جِرْمَانِي *Myricaria germanica* (S).  
*Myricaire d'Allemagne* (F).

جنبة برية ورتيبيية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. خراصيها  
 دقيقة تسلك نحو ٣ سم. عناقيدها الزهرية كبيرة وهلة.  
 ازهارها صغيرة القد، ودية اللون، يضاء الموج.  
 ازهارها يستمر من ايار إلى تموز.

18115 - عَرَن دَوْرِي *Myricaria dahirica* (S).  
*Myricaire de Daourie* (F).

جنبة برية ورتيبيية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم.  
 خراصيها غليظة تسلك نحو ٦ سم. عناقيدها الزهرية كبيرة  
 القد، لينة. ازهارها صغيرة، ودية اللون، مخزوية  
 القنابات الخطيفة || ازهارها يستمر من ايار إلى تموز.

مسفة الزام الاخير || ازهار نوربًا قليلة العدد، صيونية  
 التجميع، متوسطة القد، مَرَاكبة البتلات المكبية،  
 لونها أبيض المربع بالاخضر || ازهارها يستمر  
 طوال شهر حزيران.

18095 - عَرَاوَة لِحْيَةِ النَّبَس \* *Spiraea aruncus* (S). *Spirée de chèvre, Barbe de*  
*bouc* (F). *Goat's beard, Steeple weed* (E). *Wald-*  
*geissbart, Spierstande* (D). *Spiraea spigata, Barba di*  
*capra* (I).

جنبة برية طيبة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها بيضيه مقنونة  
 القاعدة تطول نحو ٤ سم. نصلها خماسي المروق، خلي  
 الصفحة السفلى || ازهارها يضاء اللون، عثكوية التجميع  
 شكل عثكوي يشبه لحة النيس || وهي من النباتات  
 الطيبة تدر البول وتفيد اوجاع المفاصل والالتهابات.

18096 - عَرَاوَة مُجَعَّدَة *Spiraea bullata* (S).  
*Spirée à feuilles cloquées* (F).

جنبة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها بيضيه  
 الشكل لا قياسية التسنين. نصلها مجد الصفحة، خلي  
 البشرة، مَاجِج اللون || ازهارها ودية، صغيرة القد،  
 لينة التجميع. نوربًا عثقية الشكل || ازهارها يستمر  
 طوال فصل الصيف.

18097 - عَرَاوَة مَرْيَانَة *Spiraea bella* (S).  
*Spirée décorative* (F).

جنبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. فروعها فارشة مضلفة.  
 اوراقها سنائية الشكل، نصلها عايق الخضر ثنائي  
 التسنين || ازهار نوربًا عثقية التجميع، ودية اللون.  
 ازهارها يستمر من ايار إلى حزيران.

18098 - عَرَاوَة مَلَكَة الْمُرُوج \* *Spiraea ulmaria* (S). *Spirée ulmaire, Ulmaire, Reines*  
*des prés* (F). *Meadow-sweet, Queen of meadows*  
*(E). Echtes Mädesüss, Weisenkönigin* (D). *Ulmara*  
*regina dei prati* (I).

جنبة برية طيبة تملو من ٢٥ الى ١٠٠ سم. اوراقها  
 مركبة. وريقاتها الهليجية سنائية. نصلها يارز المروق  
 والتسنين. ازهارها يضاء اللون. خضرها الموج، عثقية  
 التجميع || وهي من النباتات التي تدخل في الطب التجاسي.  
 نقيعها يفيد الاستسقاء والالتهابات والحميات والسعال.  
 ويستخرج من قضبانها اللينة عصارة لزجة صفراء اللون  
 تحوي الكثير من الحامض المراوي (acide spiréique).

18099 - عَرَاوَة وِلْسُون *Spiraea Wilsoni* (S).  
*Spirée de Wilson* (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها زياء اللحاء.  
 اوراقها مشرمة، نصلها اغبر اللون، خلي البشرة على  
 صفحتيها || ازهار نوربًا عثقية التجميع، تلمها نحو  
 ٥ سم. لونها أبيض الاصفر الموج || ازهارها  
 يستمر من حزيران إلى تموز.

18100 - عَرَاوَة يَابَانِيَّة *Spiraea nipponica* (S).  
*Spirée nipponne* (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها بيضيه  
 مقنونة القاعدة، طرية نحو ٢٠ سم عرضها ١٦. نصلها  
 خلي الصفحة السفلى للبراء الموج || ازهار نوربًا كبيرة  
 العدد، غصية التجميع، صغيرة القد، مستطيلة البتلات،  
 يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

18101 - عَرَاوَات *Spirées* (F).  
 سبط من فصيلة الورديات، اشهر اجناسه العراوة.

١٨١٢٥ - عُرْجُون Rafle (F). Grape-stalk (E).  
هو المتقود من العنب وغيره بعد انتزاع حبه .

١٨١٢٦ - عُرْجُون ١٨١٢٦  
ضرب من الكفاة قدر شبر وهو مليب ما دام غصناً ، وهو كالقطر يبيس وهو مستدير .

١٨١٢٧ - عُرْجُون Rameau (F). Bough (E).  
هو القند المحل قبل أن يكون غصناً . ج . عراجين .

١٨١٢٨ - عُرْجُونِي Rameau (F). Ramal (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما ينشب في المروجون من ابن وزمعات .

١٨١٢٩ - عُرْدَ عرد النبات : طلع وانتصب واشتد .  
١٨١٣٠ - عُرْدَ العرد : الحار في قطع النعم .

١٨١٣١ - عُرْدَاد Eléphant de la somme (F).  
المرداد : الغيل العامل . (E). Elephant of burden

١٨١٣٢ - عُرْدَمِيَّة Phallisme (F). Phallism (E).  
المرمية عبادة المردم عند الاقدمين كالسوريين والمصريين والكمانيين والفيلبيين والاشوريين وعرب الجاهلية واليونان ..... طقوس وثنية قوامها إقامة الشعائر التعبدية امام نصب يرمز الى المردم لانه بمقتدم محور الحياة في الكون .

١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصُّوْبَرِ الْبَرِّيَّ

Aradus cinnamomeus (S).  
Arade du pin sylvestre (F).  
حشرة غاضلة من فصيلة المردوسيات . جسمها صغير ، مسطحة ، بطول نحو ٤ م . عند الذكر ، نحو ٦ م . عند الانثى || ثوبها الى الخشنى الاغمر يعطو مواج يراوح من الشثقة الى الليرة . رأسها مزخرف بتنوتات وانطاف . غططها ينتمن في اعداد لا يتجاوز الحلقة الصدرية الاولى . عيناها جانبيتان . زياتانا معتدلا الغلاظة . كوسلها مقطوم القاعدة والمقدم . حجبها قليلة ، صغيرة . منجبة الظهران مسنجة بالاغبر . ظهرانها اسود العروق ، يلحف البطن دون الخمار . خمار بطها اسود التجذيع . قوائمها صغيرة || تألف المواقع التي يكثر فيها البرز . تعيش على الالهاب .

١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعَقَصِ

Aradus corticales (S).  
Arade plat (F).  
حشرة دامة من فصيلة المردوسيات . جسمها صغير مسطحة ، بطول نحو ٦ م . رأسها مزخرف . عنقها معتدل الطول . غططها ينتمن في اعداد يمتد حتى الحلقة الصدرية الثانية . عيناها صغيرتان . زياتانا معتدلا الغلاظة . حجبها صغيرة . ظهرانها ادم الخنجة ، لا يلحف كامل البطن || رأسها وزياتانا الى الخشنى الاغمر . كوسلها رصحنى الى الخشنى المبيح والمغطط بالاسود . بطها احر التبيح ، اسمر التسنج المتفرس . الصفحة السفلى الى السمة القائمة || تألف الغابات . تعيش تحت قشور الغصص والسليمان قوتها المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات Aradidae (S).

Aradidae (F).  
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات

١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مَرْنِي ، جَوْزُ مُجَنِّح Pterocarya (S). Pterocaryer (F).  
جنس اشجار حرجية وزينية من فصيلة الجوزيات مهدا البلاد الاسيوية ، انواعه قليلة جميعها اشجار فرعاء ، دفلة ، كبيرة الحجم وراية النخل . اوراقها صياغية عابلة مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ مسنة الحافة تشبه اوراق المزان ولذا دعوا الجوز المراني . اما ثمارها فجوزية مجنحة وهذا ايضا ما جعل بعضهم يسميها الجوز المجنح . الثمرة صغيرة اللد ، غلافها الجلدي لاصق بالقشرة الخشبية ، لبانها حنلي اللون يضيي الشكل لا يؤكل .

١٨١١٧ - عُرْكُونُ صِيصِي Pterocaryastenoptera (S).  
Pterocaryer de Chine (F).

شجرة من المرتون تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها طويلة المالحق ، وريقاتها لسنة تطول من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها ازغب الصفحتين . ثمارها بحجم البندق ، اجنحتها ضيقة مستطيلة || مهدا الصين . اوراقها صياغية .

١٨١١٨ - عُرْكُونُ مَرْنِي الْوَرَقِ

Pterocarya fraxinifolia (S). Pterocaryer à feuilles de frêne (F).

شجرة من المرتون تملو من ١٢ الى ٢٠ م . اوراقها مستطيلة المالحق ، وريقاتها نحو ٩ سم . نصلها عابق الصفحة العليا باحت السفلى . ثمارها بحجم البندق ، اجنحتها وافة العرض قليلة الطول || مهدا المجر والقوقاس . تستعمل للزينة ، اوراقها صياغية .

١٨١١٩ - عُرْكُونُ يَابَانِي Pterocarya rhoifolia (S).  
Pterocaryer du Japon (F).

شجرة من المرتون تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها جلدية النصل الاصفر اللون ، صفحته العليا لمسا البشرية اما السفلى خضراء . ثمارها بحجم الجوز الصغير || مهدا اليابان وقد انتشرت زراعتها الزينية نظراً لقراية شكلها ولاضرار اوراقها .

١٨١٢٠ - عُرَيْلِيَّة \* Artabotrys intermedia (S).  
Artabotrys à parfum (F).

نبات عطري سرعي معمر من فصيلة التشديات . منته بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية اخضها الهند وجايا . ويخرج نبات صناعي لاستثمار عطره || يستخرج من اثماره دهن عطري فاخر الصنف شائع الاستعمال في الهند وجايا واسائر الاقطار الاسيوية .

١٨١٢١ - عُرَيْمِيَّة Artemia (S).

Artemie (F). Artemie (E).

دوية من القشريات الدنية غشيوبيات الاطراف . تعيش في المناطق والندران السبخة حيث الملوحة لا تقل عن ملوحة البحر وقد تفوقها || جسمها ادم الحاف . عيناها مزنتان . زياتانا مستطيلان عند الذكر . ارجلها الصدرية صفحية الشكل .

١٨١٢٢ - عُرُج Boiserie (F). Halting, Limpig (E).  
عطب يحل بقوام اللواب فاذا كان مقطعا اعتبر من العيوب المبطلة للبيع .

١٨١٢٣ - عُرْجَاء العرجاء هي السبع ، اطلبا .

١٨١٢٤ - عُرْجَاء Rameau tortueux (F).

Tortuous bough (E).  
هو القند العادم الاستقامة الكثير التعاريج والعقد .



عُرِيل



الجناح . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبطلة . رؤوسها مزقرفة . اعطاشها قصيرة ، محسنة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . قوائمها صغيرة . ارساها ثنائية القمل || جميعها غاضلة او دامة تعيش على اوراق النبات او على المواد النباتية المحتلة .

## ١٨١٣٦ - عَرُوبِيلْ أَزِيدَه \*

*Adelocera murina* (S). *Adelocera murina* (E). حشرة غاضلة ومفترسة من فصيلة الساليليات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها فسيح الارباع يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا واسريكة الشمالية . تألفت البراري والمباقل والحقول المزروعة . غنائسها تعيش على اوراق النبات من مختلف الفصائل ومنها البقول التي تفضلها على غيرها . يرقاها في التربة في الربيع ، نحو اربع سنوات لا تكال دورتها الحياتية . تنفك بجذور الزروع والبقول والنباتات الترتيبية والاشجار المثمرة وتقتصر اساريع بعض الحشرات وكزيرة ذوات الجناحين || جسمها متوسط القد ، اهليجي الشكل ، يطول من ١٢ الى ١٨ سم . ثوبها الى السرة المابقة بملوحا زغب احمر يحمل اللون الى الريد . رأسها مستعرض الشكل . فكها مخروطي . فكها غليظا زباناها خيطاني . عينها صغيرتان سمحتان . كوسلها قليل الاسفدياب . ارساها خاسية القمل ، حبيبة الخالب || الاثنى اثنى قدام من الذكر واكد ثوبا منه واقتصر زبانا واضخم بطنها || جليلها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار اباد وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسمى على الارض بقطة واذا وقعت على ظهرها تلطف لاستعادة وضعها الطبيعي .

## ١٨١٣٧ - عَرُوبِيلْ \*

*Gastridium* (S). *Gastridium* (F). جنس نباتات عشبية برية معروية من فصيلة النجيليات انواعه المعروفة قليلة منبتها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تتميز انواعه بفخامة سبيلاتها المكشوفة الشكل || بعض انواعه ينبت طوعيا في الجرد الليتانية .

## ١٨١٣٨ - عَرُوس ، عَرُوسَه \* ابن عرس ، اطليه .

## ١٨١٣٩ - عَرُوسُول \*

*Ortixelus Meiffreni* (S). *Ortixelus de Meiffren* (F). طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزرقائيات . موطنه بعض مناطق افريقية الاستوائية يجوها في طلب القوت يألف صغاف بجاري الماء والحيارات والمستنقعات . قوته الحشرات والديدان وبعض الاشباب المائية . ملجئه الحياتي : جاعي || جسمه صغير القد ، رشيق القوام ، مفلطح الرأس ، صغير المنقاد اللدب الطرف . جناحاه كبيران لاحفان . ذنبه مستدير الطرف . ثوبه الى الشقة الموحدة بالابيض . رأسه كسني اللون . عيناه مكحلان . حمراه الى البياض الجاعي . متفاده ورساه الى الشرة الحنطية || يدثن انحصوصه في التربة بين الاشباب الرقيقة . الاثنى تحضن سدعا من ٤ الى ٥ بيضات . ترغيبها يستمر نحو ١٥ يوما . الذكر يلون لها الغذاء .

## ١٨١٤٠ - عَرُوسِيَّات

هي فصيلة السوريات . اطليا .

## Alarch

## ١٨١٤١ - عَرُوش

العروش مجموعة كواكب صغار تنقل السالك الاخرى .

## ١٨١٤٢ - عَرُوشُ الثَرِيَّا

مجموعة كواكب بالقرب من الثريا .

## ١٨١٤٣ - عَرُوشُق \* هو ورد الهند ، اطليه .

## ١٨١٤٤ - عَرُوبَه مُتَقَلِّب \* \*

*Orsodacne variabilis* (S). *Orsodacne variable* (F). *Orsodacne variabilis* (E). حشرة واحة غاضلة من فصيلة التفاريات ورتبة غديبات الاجنحة . تألفت المواقع التي يكثر فيها الزعرور والبرقوق والحلب والكرز . غنائسها تعيش على ازهار النباتات المذكورة وعلى ازهار الصيوانيات . يرقاها تلم الاراء ه الى ٨ سم . ثوبها متقلب الالوان تقلب فيه الشقة الحنطية الملوح مع اسوداد الرأس . رأسها مستد الجرم . عيناه كبيرتان جاحطتان . زباناها خيطاني قدقان . غلظها مخروطي مزق الطرف . ظهرها مستدير المؤخر للاخرة غداها مستدلت الصلابة ، متناحدا التحيزز الخفيف . ارساها رباعية القمل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تساه بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتع الممكن على نصال الاراء || والبرقة عند ادراكها الكال الجسوري طول نحو ١٢ سم . جسمها دقيق الجرم ، شبه اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب النحيلة ، اكهب اللون ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينتهي في الجملانة ضمن صلجة من المواد النباتية والثرابية المعجونة بالريال .

## ١٨١٤٥ - عَرَضِبْ \*

*Ajuga, Bugula* (S). *Bugle* (F). جنس نباتات عشبية برية طلية من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة معظمها طبي ينفع الجرح والصدور والسعال . ويقال انه يقوي الدم || أشهر انواعه ما يتبع .

## ١٨١٤٦ - عَرَضِبْ جَعْدِي \*

*Ajuga iva* (S). *Ivette musquée, Ive, Petit-If* (F). *Herb ivy, Musky bugle* (E). *Ivygünsel* (D). *Bugula muschiata, Erba iva* (I).

عشبة معمرة تملو نحو ٢٠ سم . اوراقها كاملة مستطيلة ، سفنة الحافة . ازهارها ارجوانية اللون ، عقدية التجمع . اوراقها وازعارها وجميع اجزائها مسكية بزيان المنحب الفولج . ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

## ١٨١٤٧ - عَرَضِبْ شَرَقِي \*

*Ajuga orientalis* (S). *Bugle d'Orient* (F). عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . سوقها مستطيلة الزغب الصوني الشكل . اوراقها بيضية لسنة . ازهارها سبيلة التجمع ، زرقاء اللون بملوحا ملوح ودي . تنابها قمصنة وسنة الحمار || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٨١٤٨ - عَرَضِبْ شَتَدَقُورَه \* عَرَضِبْ مَدَّاد

*Ajuga reptans* (S). *Bugle rampant* (F). *Bugle weed Common bugle* (E). *Kriechender Günsel, Lorenzkraut* (D). *Bugula, Lorenzia, Soldola* (I).

عشبة معمرة غليظة الازوية . سوقها جذرية مدادة تملوها



عردل اريد



عردل



عردل متقلب



عرصف جعدي



عرصف شرقي



عرصف شتقوره



عرصف شياً

**١٨١٥٨ - عُرُصَت شَيْءٌ**  
**Artanthe (F).**  
 نوع من التامول. جنة معمرة من فصيلة الفلغليات  
 اوراقها طيبة ناعمة وبهم من يستعملها مضغاً. راجع  
 تامول خبيق الورق.

**١٨١٥٩ - عُرُطَيْتِيَا** هو السكك ، اطلبه .

**١٨١٦٠ - عُرُطُوس مُتَتِسِسْ\***  
**Athous obscurus, Athous haemorrhoidalis (S), Athous confus, Taupin confus (F), Athous obscurus (E).**

حشرة مؤذية ناهمة مفترسة من فصيلة السوسيات ورتبة  
 مفيدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم  
 الاصقاع الاروبية. تألف المياكل والحقول المزدرة  
 والادغال والاحراج. خنافسها تعيش على نباتات الازهار  
 واوراق القراص والحرفش. يرقاتها مؤذية تقضم كل ما  
 النجيليات والبقول والبطاطا والشديد وتقتصر على ما  
 تستطيع من الحشرات || جسمها متوسط القد بطول من ١١  
 الى ١٤ م. ثوبها ملتبس الالوان ، اسود الرأس والكسول ،  
 احمر البطن ، كشي الجفuran ، اسمر الجرازم . ارجاسها  
 صغير الجرم . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عيناها  
 صغرتان بارزتان . ظهورها متصابيح التحيزير الفدي  
 القاطب . ارسافها خاسية المنقل تتميز باستطالة العتلة  
 الاول وبغصم الرابعة || الانثى تدعى عرطوسه وهي اميز  
 قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبانا || جيلها  
 رباعي الحول . تظهر الحشرة المجلجلة في ايار وتبقى حتى  
 تموز . تسرح في النهار ويبيت في الليل || البرقة بطيئة  
 التنو تدرك الكال الجسوري بمرر ثلاث سنوات فيصبح  
 طويلا نحو ٢٧ م. ثوبها الى الصفرة الصائبة يملوها  
 موج امفر .

**١٨١٦١ - عُرُطُونْ\***  
**Orthonyx (S), Orthonyx (F), Orthonyx (E).**

جنس طير من الجوارث ورتقات المناقير وفصيلة المانوريات.  
 انواعه المعروفة اربعة موطنها استراليا وزيلندة الجديدة .  
 تألف الاحراج والغابات العاتية الانجار . ملجئها الحياها  
 زويي . قوتها الحشرات والنمل والتار والبروزر || اجسامها  
 متوسطة القد ، ريشة القوائم تطول من ٢٤ الى ٣٢ م.  
 رؤوسها مستدلة الجرم . مناقيرها رقيقة سنيرة . اجنحتها  
 مستديرة . اذنانها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف . اوتابها  
 متباينة الالوان تكثر فيها الكهكة الخنطية المواج والريدة  
 السمر . جميعها مرقوشة الراء والجناح والذنب || تدشن  
 اعشاشها في الادغال القليلة الارتفاع عن سطح الارض .  
 الاثاث تحضن وهدعا من بيضة الى بيضتين في مرتين  
 او ثلاث مرات في الحول . الترخيم يستمر نحو ثلاثة  
 اسابيع . الذكور ثوين الحاية والذواء .

**١٨١٦٢ - عُرْطِيلْ\***  
**Erotulus (S), Erotyle (F).**

جنس حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرون  
 وفصيلة العرطليات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في  
 معظم مناطق البلاد الاستوائية || اجسامها شبه بيضيه  
 الشزلى ، بحبة الصفحة العليا ، تطول من ١٠ الى ١٠ م.  
 اوتابها ملونة ، زاهية الخفاف وسنها المؤذرة والمجذبة والمبيضة .  
 تعيش على جميع انواع الفطور اغصها اللغيفه التركيب .

قصبان ترتفع من ١٠ الى ٣٠ م. اوراقها القرصية مدبجة  
 بالجزوي والاصفر الاسفنج المواج . ازهارها عنقودية  
 الجميع زرقاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى  
 تموز .

**١٨١٤٩ - عُرُصَف شَيْءٌ\***  
**Ajuga chia (S), Bugle chia (F), Chia bugle (E), Chia Günsel (D), Ajuga chia, Bugula chia (I).**

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٤٠ سم . اوراقها الجذعية  
 السفل مستطيلة . عنقودها الزهري على غلى طول الساق .  
 ازهارها زرقاء اللون . قناباتها قصيرة تبيث || ازهارها  
 يستمر من ايار الى آب .

**١٨١٥٠ - عُرُصَف صَنْوَبَرِيْ ، كَالْفَيْطُوس**  
**Ajuga Chamaepitys (S), Bugle petit-pin, Chamépit-  
 yts, ivette (F), Ground pine, Yellow bugle (E),  
 Gelber Günsel, Ackergamander (D), Bugula ivatetica,  
 Campeizio (I).**

عشبة حولية تملو نحو ٢٠ سم . اوراقها ثلاثية التشرير المدهي.  
 ازهارها صفراء اللون سنطية الجميع || ازهارها يستمر  
 من نيسان الى تشرين الاول .

**١٨١٥١ - عُرُصَفْ هَرْمِيْ\***  
**Ajuga pyramidalis (S), Bugle pyramidal (F).**

عشبة معمرة تملو نحو ٢٥ سم . ساقها مفصلة زياء اللحاء.  
 اوراقها مستطيلة ، نصلها متموج الصفحة المابقة  
 الخفاف البحري . ازهارها عنقودية الجميع الهرمي الشكل ،  
 لونها الى الزرقه البنفسجية || ازهارها يستمر من نيسان  
 الى آب .

**١٨١٥٢ - عُرُصُمْ**  
**Streptosolen (S), Streptosolène (F).**

جنس نباتات جنيبة زيبينية معمرة من فصيلة الباذنجانيات.  
 سوقها فرعاء تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ م. اوراقها ابيدة ،  
 كاملة ، بيضيه الشكل ، نصلها خلى البشرة على صفحتيه .  
 ازهارها يرتقالية اللون ، عذقيه التجعج ، تاجية الارتكاز .  
 ثمارها جوزية القد ، بيضيه الشكل ، مقطوعة العقب ،  
 لية السود . بزورها عذسية صغيرة ، رقيقة ، حنطية  
 اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع .

**١٨١٥٣ - عُرُصَنْ\***  
**Sidérödendron (F).**

جنس اشجار حرجية من فصيلة الفويات . انواعه قليلة  
 العدد منها البلاد الحارة . سوقها فرعاء تملو من ١٢ الى  
 ٢٥ م . اوراقها متقابلة اعليجية مستطيلة . ازهارها  
 عنقودية الجميع ، تاجية الارتكاز ، ثمارها عنية .  
 اخشابها ناعمة الرقة ، ثقيلة الوزن ، شديدة الصلابة ،  
 خرية اللون ، فاعرة الصنف ، تستعمل في الصناعات  
 الثمينة .

**١٨١٥٤ - عُرُصْ**  
**Latitude**

المسافة البكائة بين موقع معين وخط الاستواء .

**١٨١٥٥ - عُرُصْ**  
**Offer, Proposition (F), Offer, Proposal (E).**

هو طلب ابرام عقد يتفق مع الشروط المفروضة .  
**١٨١٥٦ - عُرُصِيْ**  
**Accidental, Fortuit (F), Incidental, Casual (E).**

**١٨١٥٧ - عُرُطَبْ** هو القنطريون الكبير ، اطلبه .



عرصن



عرطوس ملتس



عرطون

مستطيلة، رملية، متدلية. اهدابها فلسية، ذرية متقابلة. ثمارها جزؤوية اللون، عينية الشكل، قطرها نحو ١٠ م. اغشائها صناعية شاملة الاستعمال.

١٨١٦٩ - عَرَبَرُ رَفِيع (F). *Genévrier de Tauride*. هو القزاق، اطلبه.

١٨١٧٠ - عَرَبَرُ سَيْنَة (F). *Genévrier sabine*. هو الابل، اطلبه.

١٨١٧١ - عَرَبَرُ سُورِي \*، دَقْرَان

*Juniperus drupacea* (S). *Genévrier de Syrie*, *G. drupacé* (F). *Syrian juniper* (E). *Syrischer Wacholder* (D). *Ginepro di Siria* (I).

شجرة وشية الشكل سبروتية مذبذبة تملو من مترين الى ٢٠ م. خرايبها وبناتها قصيرة مراكية. اهدابها تطول من ١٢ الى ٢٥ م. وتعرض من ٣ الى ٥. نصلها بحري الصفحة العليا، اخضر السفل. ثمارها نووية الشكل قطرها نحو ١٥ م. لوها الى الارجواني الملبق المواجه للاع.

١٨١٧٢ - عَرَبَرُ شَالَع \*

*Juniperus communis* (S). *Genévrier commun* (F). *Common Juniper* (E). *Wacholder*, *Machandelbaum* (D). *Ginepro* (I).

جنية سبروتية ترغب في الاربية الكنسية تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ م. خرايبها فارقة. بناتها اسطوانية. اهدابها خيطية تطول من ٨ الى ١٥ م. ثمارها عينية الشكل ولقد تبدو سنخية ثم تدور مع الاذلاق وهي تستعمل في تطهير علة مستحضرات منها الكحولية كالجين والبيتر ومنها الكنسرو كالشوكروت.

١٨١٧٣ - عَرَبَرُ عَال

*Juniperus procera* (S). *Genévrier élevé*, *G. d'Afrique* (F). *Uganda juniper* (E). *Afrikanischer Wacholder* (D). *Ginepro abissino* (I).

شجرة سبروتية ممددا الحيفة وقد عت زراعتها خطوط حوض البحر المتوسط. ساقها منتصبة فراء تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. خرايبها متدلية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها صفحية عادة التسنين. ثمارها مستدرة صغرة قطرها نحو ٥ م. لوها الى الخفي الاعمر. اغشائها صناعية جيدة الصنف.

١٨١٧٤ - عَرَبَرُ فِيرَجِينَة

*Juniperus virginiana* (S). *Genévrier de Virginie*, *Cédré de Virginie*, *C. rouge* (F). *Red juniper* (E). *Virgischer Wacholder* (D).

شجرة سبروتية متدلة النمو، كبيرة القد تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اغشائها اقلية الانتساب. خرايبها رملية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها خرزوية الشكل لوها الى الخضار الازرق الدايق يفوح منها عند اللس عرف كره مسهجن. ثمارها ييفية الشكل تطول نحو ٧ م. وتعرض نحو ٥ م. لوها الى البنفسجي المائم. اغشائها صناعية جيدة الصنف حراء اللون.

١٨١٧٥ - عَرَبَرُ فِينِشِي

*Juniperus phoenicea* (S). *Genévrier de Phénicie*, *Morven*, *Lycien*, *Sabine maritime* (F). *Phoenician juniper*, *Arabian juniper* (E). *Phönizischer Sadebaum*, *Rotfrüchtiger Wacholder* (D). *Ginepro licio* (I).

شجرة سبروتية صغرة القد تملو من ٤ الى ٨ امتار.



عرعر سوري



عرعر شائع

١٨١٦٣ - عَرَبِيَّاتٌ ٥ *Erotyliidae* (S).

*Erotyliidae* (F). *Erotyliidae* (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرون. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متباينة القد والشكل، منها البيضية والاهليجية والاسطوانية، تطول من ٤ الى ١٦ م. اوتواها جميلة الخضاب الزاهي الاسفع الموج. قرونها الاستشعارية مؤلفة من ١١ فصلة، الفصلة الثلاث الاخيرة دبوسية الشكل. ارساها خماسية العقل. المغلة الرابعة شديدة الصغر تكاد لا تظهر. اشهر اجناسها الحرطيل والطرخوف.

١٨١٦٤ - عَرَبَرُ \*، شِيْرِي *Juniperus* (S).

*Genévrier*, *Genèvre* (F). *Juniper tree* (E). *Ge-meiner Wacholder* (D). *Ginepro* (I).

جنس نباتات حرجية وتزيينية من السرويات. انواعه عديدة، منها الاجمار والشجيرات والجنبا، جميعها ابيدة. بناتها منتصبة لا ضمية. اوراقها هدية خرزوية الشكل او حشرقية. ازهارها وحيدة المسكن. ثمارها عينية القد والشكل، حلوة الطعم، عطرية العرف يستخرج منها بالتقطير بده التخثير قنديد مقوم ينشط الباه ويهد البول. اغشائها صلبة. عصارتها صمغية بخورية سريعة الجفاف. اعرفها واشهرها ما يتبع.

١٨١٦٥ - عَرَبَرُ الْبَحُور *Juniperus thurifera* (S).

*Genévrier à l'encens*, *G. porte-encens* (F). *Incense juniper* (E). *Welhrauchwacholder* (D).

شجرة سبروتية صغرة القد تملو نحو ٥ امتار. خرايبها منفجرة الزوايا. بناتها اسطوانية، اهدابها فلسية ذرية متقابلة، لوها الى الخضار البحري الاسفع الموج. ثمارها عينية قطرها نحو ١٠ م. لوها الى الزرقه الخيطية. يستخرج منها بالخز مادة صمغية عطرية تستعمل استعمال البخور.

١٨١٦٦ - عَرَبَرُ الشَّعَال *Juniperus occidentalis* (S).

*Genévrier d'Occident* (F). *Western juniper*, *Sierra juniper* (E).

شجرة سبروتية تعيش في جميع الاربة والمواقع تملو من ٣ الى ٢٠ م. خرايبها جامدة منتصبة. بناتها اسطوانية، اهدابها ثلاثية الصنف، فلسية، ذرية، يفوح منها عند اللس عرف اخاذ وانثني الرائحة. ثمارها زرقاء اللون، عينية الشكل قطرها نحو ٨ م.

١٨١٦٧ - عَرَبَرُ الصِين *Juniperus chinensis* (S).

*Genévrier de Chine* (F). *Chinese juniper* (E). *Chinesischer Wacholder* (D). *Ginepro cinese* (I).

شجرة سبروتية كبيرة القد تملو من ١٥ الى ٢٥ م. اسرامها عديدة، اشهرها المذهب والقضية. جميعها تزيينية سريفة النمو. خرايبها جالسة منفجرة. بناتها اسطوانية منتصبة. اهدابها خرزوية ثلاثية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ م. نصلها اخضر اللون، ابيض المختار. ثمارها بنفسجية اللون، طليعية البشرة، ييفية الشكل تطول نحو ١٠ م. وتعرض نحو ٧.

١٨١٦٨ - عَرَبَرُ خَرِيع

*Juniperus flaccida* (S). *Genévrier flasque*, *G. pleureur* (F). *Drooping juniper* (E). *Trauerwacholder* (D). *Ginepro piangente* (I).

شجرة منتصبة القد تملو من ٨ الى ١٠ امتار. خرايبها

ولا شك . وقال ابو حنيفة : ان العرقعة اصلها واسع يأخذ قطعة من الارض تنبت لها قضبان كثيرة بقدر الاصل وليس لها ورق له بال اما هي عيدان دقاق وفي اطرافها زرع يظهر في رؤوسها شيء كالشعر اصفر ، وهو مثل قعدة الانسان يبيض اذا يبس وله ثمرة صفراء والايل والقم تأكله ربابا ويابساً وله شديد الحمرة . فيقال كان غيته غرام عرقعة . || والعرقع جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الورديات . انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٥ جميعها جنبات ونجيرات . اصطناعها بلاد الشرق واوروية . سويقها قصيرة معطها حرياط وبعضها شائك . اوراقها بسيطة ، كاملة ، نصالها منشارية الحافة ، جامدة النسيج ، مزينة الصفحات السفلى . ازهارها عديدة الاسدية ، صغيرة القد ، مستديرة البتلات ، نورية التجميع او فردية . ثمارها نووية تحوي من ٢ الى ٥ بذور || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع :

C. horizontalis	عرقعة افقية
C. frigida	عرقعة الثلج
C. Zabeli	عرقعة ذابل
C. tomentosa	عرقعة زب
C. melanocarpa	عرقعة سوداء الثمر
C. salicifolia	عرقعة سورية الورق
C. simoni	عرقعة سيموني
C. microphylla	عرقعة صغيرة الورق
C. racemifolia	عرقعة عنقودية
C. multiflora	عرقعة كثيرة الزهر
C. lucida	عرقعة لامعة
C. vulgaris	عرقعة مبذولة
C. acuminata	عرقعة مدبية
C. disticha	عرقعة مزدوجة التصنيف
C. rotundifolia	عرقعة مستديرة الورق

١٨١٨٧ - عَرَقُوط Acacia orfata (S).  
Acaela Froskal (F).  
نوع من السنط وهو جنبة شائكة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. فروعه سريعة كثيفة منشعبة . اوراقه مركبة ، وريقاته بيضيه صغيرة القد شاحبة الخضار . ازهاره عنقودية التجميع ، زهرته صفراء اللون || اصطناع الجزيرة وسائر البلاد العربية . يصلح للترزين وللسياجات . الواحدة عرقطة .

١٨١٨٨ - عَرَقُوط « دوبيية لا خير فيها تذكر العرب انها لا تبول الا شفرت يبولوا الى صوب القبلة والحيات تأكلها » المديري .

١٨١٨٩ - عَرَقُفِدا Orphie (F) Garfish (E).  
سمكة بحرية تدعى غرمان ، احلها .

١٨١٩٠ - عَرَق Arak  
شراب مسكر يصطنع من كحول العنب مع الانثيون .

١٨١٩١ - عَرَق Sueur, Transpiration (F).  
Sweat, Transpiring (E).  
سائل تنفصه مسام الجسم وتفرزه بعض الغدد الخاصة .

غراسيها منفردة جامدة . بناتها اسطوانية . ادها مدسية الصنف ، غرزية الشكل ، كثيفة التجميع ، متراكبة . ثمارها عنبية ، قطرها نحو ١٥ م . لونها الى الحمرة السوداء اللامعة || يستخرج منها بالخز اجود اصناف البخور المرعري .

١٨١٩٦ - عَرَقَر كَادِي Juniperus oxycedrus (S).  
Genévrier oxycedre, Oxycedre, Cade, Cadier (F). Prickly cedar, Sharp cedar (E). Zader Wacholder (D). Ginepro ossiccedro (I).  
شجرة سريرية مبذولة تملو من مترين الى ثمانية امتار . عودها الارزاق طول نحو ١٦ م . نصلها اخضر الصفحة العليا ، ابيض السفلى التي يتوسطها خط اخضر . ثمارها جزوية اللون حصية الشكل والقد || يستخرج من خشبها بالتقطير زيت الكاد وهو دهن اسود اللون شديد اللعالية يستعمل في معالجة الامراض الجلدية .

١٨١٩٧ - عَرَقَرِيَّة Genièvre (F). Juniper-berry (E)  
هي ثمرة المرعر

١٨١٩٨ - عَرَق Odeur (F). Odour (E).  
العرق : الرائحة او طيبة او متنة وأكثر استعماله في الطيبة .

١٨١٩٩ - عَرَق عَادَة Coutume (F). Custom (E).  
هي المبادئ القانونية المستمدة من التقاليد والعادات .

١٨١٨٠ - عَرَق Crinlère (F). Mane (E).  
جاء شعر العنق في الخيل والبغال والحمار .

١٨١٨١ - عَرَق « هو غير الانزعج . ج عَرَق وأعراف .

١٨١٨٢ - عَرَقُ الاسد Zosma  
عرف الاسد نجم نير من كوكبة الاسد الاصفر . ويدعى خنثيرة الاسد والحزنه .

١٨١٨٣ - عَرَقُ الدليك « عشة تزيينية تدعى عمنه خلية ، احلها .

١٨١٨٤ - عَرَقُ قَاء « هي الصنع المختلطة ، احلها .

١٨١٨٥ - عَرَقُ قَاء \* Acrida turrita (S). Acrida (F).  
حشرة كبيرة القد من فصيلة الجراديات . اصطناعها البلاد الحارة . تألف المواقع الرطبة حيث يكثر السب . الذكر منها يطول من ٣٠ الى ٤٥ م . والانثى من ٥٥ الى ٧٥ م . رأسها مخروطي الشكل . زباناها مستعرضة القاعدة مستعقطة الطرف . قوائمها مستطيلة . ظهرها في الذكر يطول نحو ٤٠ م . وفي الانثى ٧٢ . توهبها الى الخضار الموشح والمنش بالخنطي .

١٨١٨٦ - عَرَقُج \* Cotoneaster (S). Cotonéastre, Cotonéaster (F). Cotonéaster, Quince leaved medlar, Rockspray (E). Steinkquitte, Quittenmispel, Zwergmispel (D). Cotognastro, Cotonastro (I).  
جاء في اللسان : « غريب من النبات سهل سريع الانقياد واحده عرقعة . وقيل هو من شجر الصيف وهو لين اغبر له ثمرة عشاء كالحلك . وقال ابو زياد : المرعج طيب الريح اغبر الى الخضرة وله زهرة صفراء وليس له حب



عمر كادي



عرقان



عرقج



عرق اللم



عرق الذهب



عرق الذهب الحزني



عرق انجبار

ساقها فراء . ازهارها يفساد اللون ، جيلة الشكل ، عقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، منتصبة || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

### ١٨٢٠٢ - عرق الذهب المخزني \*

Uragoga ipeacuanha, Cephaelis ipeacuanha, Psychotria ipeacuanha (S). Psychotria ipeacuanha, Ipeacuanha, Ipeá do Brasil (F). Ipeacuanha (E). Ipeacuanhapflanze (D). Ipeacuanha (I).

نوع من عرق الذهب وهو عشبة ليفية صغيرة القد تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اصلها البلاد الحارة الرطبة . يستخلص من جنورها النخيلة ، الحليدية ، القعدة ، مادة قلوية فاعلة تحوي نحو ٢٪ من عنصر الاميتين (Emetine) الشائع الاستعمال الطبي .

١٨٢٠٣ - عرق السوس هو السوس ، اطبله .

١٨٢٠٤ - عرق السوس البرتي

هو الاسطرافالوس عرق السوس ، اطبله .

١٨٢٠٥ - عرق التجيل هو اللغن الاجر ، اطبله .

١٨٢٠٦ - عرق النسا

Nerf sciatique (F). Ischiatic nerve (E).

١٨٢٠٧ - عرق انجبار \*

Potentilla erecta, P. tormentilla, Tormentilla officinalis (S). Potentille tormentille, Tormentille officinale (F). Blood-root, Tormentil, Septfoil (E). Blutwurzfingerkraut (D). Potentilla tormentilla (I). نوع من عشبة القوي وهو نبات عشبي طلي مداد من فصيلة الشليكيات يكثر في الغابات والرمالي . جذاميره غليظة افقية الانتشاب . ساقه فراء . ازهاره زنادية فردية تاجية ، صفراء اللون .

١٨٢٠٨ - عرق مدتي هي هدابة المدينة ، اطبله .

١٨٢٠٩ - عرقاة ، عرقلة Collet (F). Neck, Collar (E). ارومة الشجرة التي تشعب منها المروق .

١٨٢١٠ - عرقلة Filaire (F). Filaria (E). هي الهداية ، اطبله . اما العرقلة فهي تسمية الدكتور حبيب صادر .

١٨٢١١ - عرقلة هو المحض ، اطبله .

١٨٢١٢ - عرقصون Sciophila (S). Sciophile (F). Sciophila (E).

جنس حشرات من فصيلة القرمصيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المرفوعة نحو ١٥ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، نجيلة ، تقطو من ٤ الى ٦ م . رؤوسها صغيرة ، شبه مزاوية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستعارية عيطية مركبة من ١١ فصلة . ملاسها رباعية العقول . مراشفتها ضليمة . كواسلها بيضيه . بطونها مردنية . اوتابها ملونة . رواشها قسطانية التخفيف . قوائمها الوسطى والخلفية مهدبة الظنايب ، مجهزة بمناسخ ذربة || تألفت الغابات والمواقع الرطبة . اساربعها نجاية او عاردة تميش تحت لحاء الانجار او عل القطود .

١٨٢١٣ - عرقصون هو جلمه الحبشة ، اطبله .

١٨١٩٢ - عرق ، وتين ، وريد ، ودج

Veine (F). Vein (E). عضو وراثي من اعضاء الجهاز الدوري في الجسم .

١٨١٩٣ - عرق Nervure (F). Nervure, Nerve (E).

عضو وراثي ثانوي من اعضاء الجهاز الدوري الثاني مركزه الرئيسي في نصل الورقة ينشعب عن ضلعها .

١٨١٩٤ - عرق هو السلالة ، اطبله .

١٨١٩٥ - عرق ابيض

Veine blanche (F). White veins (E).

رسم ونجم الواقع الاقتصادية تسببه حشرات التريبس والفيزيدو التي تركب اوراق النخ تقطع الخشب وتمتص عصارة الخلايا واللحم الناضج ولا تترك حل نسيج النصل بمحاذاة النصل والمروق والثرابين سوى اليافا خليفية جامدة ميتورة لا مناعة عندها جميعها من عبث الامراض الفطرية ولا طاقة نشوية فيها تمكها من متابعة نشاطها الحيوي || يكافح هذا الوس بالقتال على الحشرة التي تشبه ذلك فور ظهورها على الاوراق . راجع تريبس النخ .

١٨١٩٦ - عرق ابيض

هو الجزر الابيض ، اطبله .

١٨١٩٧ - عرق اكور هو عود الوج ، اطبله .

١٨١٩٨ - عرق الخلاوة

هو الصابونية الخزنية ، اطبله .

١٨١٩٩ - عرق الدم ، دموية

Sanguinalia canadensis (S). Sanguinalre du Canada (F). Blood-root, Red puccoon, Blood-wort (E). Kanadisches Blutkraut (D). Sanguinalia del Canada (I). نبات عشبي جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المشخاشيات . جذاميره غليظة عقودية مادة غزيرة العصارة اللبكية الحمراء اللون . اوراقه فردية تشعب وحيدة عند كل عقدة يطلوها شراخ . وهي معققة ، كفية ، خاسية او سداسية الفصوص المسننة الحافة || فصلها الى الخصار البحري يعلو موج اجر . شاربته الزهرية تملو نحو ١٥ سم . وهي فردية الزهرة التي تتألف من ٨ الى ١٢ بتلة بيضيه الشكل يفساد اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار . وهو من النباتات الصناعية الطبية والزيينية وذلك لان عصارته اللبكية تستعمل في صباغ الالافه ولان جميع اجزائه من الجنس الى الورقة والزهرة تستعمل طبيا كمهوع او مخدر .

١٨٢٠٠ - عرق الذهب \*

Psychotria (S). Psychotrie, Psychotrie (F). Psychotria (E). Breckkraut, Brechpflanze (D). Psicotria (I). جنس نباتات برية من فصيلة القوييات اصلها البلاد الحارة . انواعها عديدة جميعها جنبا وجنبا منتصبة السوق ، اوراقها متعاقبة معتقة كاملة . ازهارها عقودية التجميع او تاجية الارتكاز . ثمارها جليدية يابسة . له نواتج مشهوران واحد طبي وآخر تريبي .

١٨٢٠١ - عرق الذهب الابيض الزهر

Psychotria leucocephala (S). Psychotrie leucocephale (F).

نوع من عرق الذهب وهو جنبة معمرة تملو نحو ١٥٠ سم .

فردية التجميع ، ابطية الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها المرقون الحزني .

### ١٨٢٢٢ - عَرَقُون مَحْزُونِي \*

Euphrasia officinalis (S). Euphrase, Euphrasie, Casselunettes, Luminet (F). Euphrasy, Common eye bright (E). Echter Augentrost (D). Eufrasia, Spezza occhiali, Luminella (I).

نوع من المرقون وهو نبات عشبي يري حولي شبه طفيلي لانه يركب بجذوره جذور النباتات الاخرى || اقلية حوض البحر المتوسط ، اوراقه صغيرة القند متعاقبة نصلها مشاري الخافقة منمقفت التسنين . ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره تنفع اليرد وجميع التهابات العين .

jaune d'oeuf (F). عَرَقِيل هو صفار البيض . Yolk of an egg (E).

### ١٨٢٢٤ - عَرَم \* عَرَم

Œufs de gangas (F). Eggs of the Pin-tailed grouse (E).

المرم : بيض القطا .

### ١٨٢٢٥ - عَرَم ، قَارِص ، اَمِير يَاسَر

Carissa (S). Carisse (F). Carandas plum (E). Carisse (D). Carissa (I). جنبة معمرة برية طيبة من سبط المرميات وفصيلة القفليات . اصطناعها الهند وبعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . ساقها فروع . فروعها سرية شائكة . اوراقها سنانية متعاقبة . ازهارها عكوكية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، بيضاء اللون || ازهارها رديمي يستمر من ايار الى تموز .

### ١٨٢٢٦ - عَرَمَاض ، عَرَمَض

ملحبل كانه نسيج العنكبوت . والنفاق الاخضر الذي يتفتق الماء .

### ١٨٢٢٧ - عَرَمَة \* Georychus (S). Géoryque (F).

جنس حيوان من فصيلة اللخليات . انواعه ثمانية . اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . انوثاها الى السمرة . ورووسها مستديرة ، فقامها مقطوعة . عيونها خرزوية . اذنانها لا قوية ، قوائمها قصيرة . اطانيوها قوية ، اذنانها خصل شعر تملو جذع || انانها تقص من جروون الى اربعة . تألف الهام والاراضي الرملية الشجرية . اجسامها متوسطة العمق . انفانها طويلة متعرجة كثيرة الفتوة ، قوتها جذور ولحاء وشكير النبات .

Meule (F). Stack (E). عَرَمَة ، عَرَمَة الكدس من الحصيد يرم ويخفظ روبا يندرس .

### ١٨٢٢٩ - عَرَمَض

Salpichroa (S). Salpichroa, Œuf de coq (F). جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه عديدة جميعها سبوتية . سوقها فروع تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروعها سريعة . اوراقها اطليجية مستديرة القاعدة ، صغيرة القند ؛ نصلها نامج التسنج ، غلي اللمس جيل الخفصار . ازهارها محورية الارتكاز ، جليجية الشكل ، بيضاء اللون . ثمارها جوزية الشكل والقند ، لبة السودق ، غبراء اللون .

### ١٨٢٣٠ - عَرَمَض

المرمض : كل شجر لا يعظم ابداً .

### ١٨٢١٤ - عَرَقِيَّات \* Scrophillidae (S).

Scrophillidés (F). Scrophillidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متفاوتة القند ، تطول من ٤ الى ١٦ سم . رؤوسها صغيرة ، شبه موزانية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عند الشقين . قوتها الاستشعارية خيطة ، مركبة من ١١ فصلة . مراتبها وبلاستها معتدلة الطول . كواسلها شبه بيضية . رواتبها قسطانية التخفيف . قوائمها الخلفية مستقيمة الانعقاد || تألف الرياض والغابات والحراج . يرقاها تمديد على الاغصان الخرة وتحت القشور || اشهر اجناسها المرقص والميكومية والية .

### ١٨٢١٥ - عَرَقُط مُتَوَج \* Oreolea cristata (S).

Oréoleque huppé (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المردريات ورتبة الجروم سنيت المنقير . يألف الغابات والاحراج . ملجته الحياتي جامي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والثآير البائنة واليزود || جسمه صغير القند ، يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه جميل الالوان المتداخلة . رأسه معتدل الجرم الملس الخفصار الامسم ، تملو ، عند الذكر ، قزعة شرابية الشكل حيلة اخفصار اللعاب . رداؤه وجناحاه وذنبه الى اخفصار الامس يعلمو مواج يراوح بين الشبهة والثرقة . زوره الى البياض المعاجي . اعل صدره الى الحمرة الجوزية . بطة الى الصفرة يملو مواج يراوح بين الشبهة والخفصرة || يثدن عنه في الادغال المستعمية . الاثنى تحفن بمنابرة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات .

### ١٨٢١٦ - عَرَقُوب Jarret (F). Hough, Hock (E).

عضو من اعضاء القوائم في الدواب وهو ما ضم ملثني الساق والوظيف من مؤخرها .

### ١٨٢١٧ - عَرَقُوب الرامي Arkab

عرقوب الرامي كوكب نير من برج الرامي . مركزه على الساق اليسرى وهو الاول من الصردين .

### ١٨٢١٨ - عَرَقُوب القطا

ساقها . وهو ما يبالغ به في القصر فيقال يوم اقصر من عرقوب القطا .

### ١٨٢١٩ - عَرَقُوة

المروقة نجان متقدمان من كوكبة القوس الاعظم .

### ١٨٢٢٠ - عَرَقُوبُل Duchesnea (S). Duchesnée (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد جميعها قريبة الشبه من الشبلك . سوقها مداة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها منتصبة مستطيلة المائلين ، نصلها مفصص الصفحة . ازهارها الى الصفرة الذهبية . ثمارها شوية التركيب ، شيلكية القند والشكل ، حراء اللون ، مأكولة ، لكها عادمة النكهة والعرف .

### ١٨٢٢١ - عَرَقُون \* Euphrasia (S). Euphrasie (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الخنازريات . انواعه نحو ٢٠ منظرها من اشباب المناطق الحارة . اوراقها صغيرة متعاقبة سفتة الخافقة . ازهارها



عرقط متوج



عرقون



عرقون حزني



عرمه

١٨٢٤٠ - عُرُوسٌ \*  
Epi de maïs (F).  
Maize head, Maize ear (E).  
عور اسطواني الشكل غليظ القدر تتركز حوله على صفوف متتابعة حبوب الذرة الصفراء .



عور

١٨٢٤١ - عُرُوسَةُ \*، مَرَعَى الحُوتِ  
Clio (S). Clio (E).  
جنس دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الاربل وفصيلة المرؤسات . انواعها المعروفة عشرة منتشرة في المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط || ملجئها الحيائي جماعي . اسرأها تعد بضعة ملايين || اجسامها صغيرة عادمة الفلاف الصلبي شبه وشية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . افواها مطوقة بزوائد غروطية نابضة . زعانفها زوجية متشعب في العنق . اذواها عديدة منها الازرق والبنفسجي والجووي والاحمر || الحيتان تتغى اسرأها وتلتها بشرافة .



عور النتم

١٨٢٤٢ - عُرُوسِيَّاتُ \*  
Clonidae (S). Clididae, Clonididae (F). Clonididae (E).  
فصيلة دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الاربل عريانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || تتميز باجسامها الصغيرة الشبه وشية الشكل وبملاسها المحجمة الاطراف وبخلوها من الفلاف الصلبي || اشهر اجناسها العروسة .

١٨٢٤٣ - عُرُوهوم ، عُرُوهون  
Champignon (F). Mushroom, Fungus (E).  
هو كل فطر تام الخلفة بين الساق والكمكة .



عوروس

١٨٢٤٤ - عُرُوة  
Pérénne (F). Perennial (E).  
صفة النبات المعمر . وقد تستعمل بمعنى الممتدة الانحضرار في النبات الذي لا يخضع لاعمال الزمي الموت . ضدها بالمعنى الارل حولي . وبالمعنى الثاني عايل ونافض ونفيس .

١٨٢٤٥ - عُرُوس الماء  
Naiade, Nais (F). Nalad, Water-nymph (E).  
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انواعها المعروفة ١٠ جميعها من نباتات المياه العذبة . سورها متشعبة قصفة . اوراقها رقيقة شفافة . ازهارها ثنائية المسكن ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع . التفكير منها قولها مداة والانوية مبيض || وهي من النباتات القروية في المساك الاسطاعية لانها تدخل في غذا بعض الاسماك اغصها البسوط .



عوروسة

١٨٢٤٦ - عُرُوسُ الثيل  
هو لولس الثيل ، اطلبه .  
١٨٢٤٧ - عُرُوسَةُ البَحَرِ هي السحل المثلج ، اطلبه .

١٨٢٤٨ - عُرُوسَةُ الْقَرَّاصِ \*  
Eurrhyncha urtica (S). Eurrhyncha de l'ortie, Teigne des orties (F). Eurrhyncha urtica (E).  
حشرة مزوقة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم البلاد المتدلة الحرارة من الشرق الاسوط واروپية . فراشها واسعة قوتها رقيق الازهار . سورها غاضلة تتركب اوراق القراص والشعويات البرية والزراعية فتقتل الارراق وتقيم في داخلها || جسمها يطول ١٠ م . ١٢ م . بسطها تراوح من ٣٠ الى ٤٢ م . رأسها صغير الجسم ، قصير الخيط . عيناها زيتان ، صغيرتان .



عوروسة القراص

١٨٢٣١ - عُرُوش  
Rafle (F). Grape-stalk (E).  
المروش والمرشوش هو العنقد انترع عنه .

١٨٢٣٢ - عُرُوط  
Congre commun (F).  
سمكة بحرية تدعى زرقوة مبلولة ، اطلها .

١٨٢٣٣ - عُرُومِيَّات  
Carissées (F).  
سبط من فصيلة الدفليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها جنبا وجنبات فروع شاذكة ، اشهرها المرم .

١٨٢٣٤ - عُرَن  
Forme cartilagineuse (F).  
شكل من الزيدات هو انتفاخ عظمي قاس يعترى الصنفعة الجائبة من اطراف الحافر .

١٨٢٣٥ - عُرَن \* ، سَلَّةُ زُرَاعِيَّةٍ ، سُنُفُون  
Onobrychis sativa (S). Sainfoin cultivé, Esparcette, Bourgogne (F). Sainfoin, Holy clover, French grass (E). Echte Esparcette, Hannenketmetess (D). Sanfieno, Sedragola, Crocetta (I).  
نبات عشبي علني معمر من فصيلة القرنيات القرشية . جلوده وثدية قوية تتورق في الارض من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . سوه تخنجة جفوة تطول من ٥٠ الى ٧٥ سم . اوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاتها يضيية الشكل كثيرة العدد . ازهاره سنبلية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية ، مستطيلة الزناد ، ودية اللون ، مسحة العرف ، مغرية الرقيق يحرسها النحل ، ثماره يزور مغلطة خنطية اللون ، بارزة الزراكش ، عجنة الاطراف ، لا تحافظ على طاقها الانباتية اكثر من سنتين || وهو من النباتات التي تجود في جميع الاثرية ولا تخفى سوى الرملة الماددة الانساج . علفه غزير الماددة ، جيد الصنف ، يحسن الدو ويؤيد فيه نسبة البنية .

١٨٢٣٦ - عُرَنُ القَنَ \* ، سَلَّةُ عِرْفِ الديك ، سِنُ العَجُوز  
Onobrychis cristagalli (S). Sainfoin crête de coq, Hérissou (F). Cock's head, Medick vetch (E). Hahnenkamm (D). Cresta di gallo (I).  
نوع آخر من المرن وهو من النباتات المغلية الحولية التي تحتش مرة واحدة . سنباله الزهرية صغيرة القدر ، عريفية الشكل ، مستطيلة الزناد ، يزوره خنطية اللون العايق ، كثيرة التماريع والزراكش النافرة || يجود في جميع الاثرية ولا يخفى الزراعة العذبة .

١٨٢٣٧ - عُرَنَاس ، عُرَنَاس  
طائر كالحامة لا تقهر به حق يطير من تحت قديمك فينزفك . هو النقا ، اطلبه .

١٨٢٣٨ - عُرَنَاسِيَّاتُ  
Cracidae (S). Cracidae (F). Cracidae (E).  
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات ، اجناسها خمسة طيورها متوسطة الجفنة ، مستطيلة الشكل ، قوية المنقار الاسحن ، قذرية الرأس ، مستدرة الاجنحة ، مستطيلة الذيل . اجناسها المشهورة ثلاثة المنقار والخزان واشكس .

١٨٢٣٩ - عُرَنَدَة \*  
Télotisme (F). Telotism (E).  
المرندة حالة الصلابة وبداعها في العضو الفجج .

## ١٨٢٥٦ - عُرْيَانُ السَّيْضِ Gymnogyne (F).

Gymnogynous (E).  
نمت ترابي في علم النبات على كل زهرة عريانة المبيض.

## ١٨٢٥٧ - عُرْيَانَاتُ Pterotracheidae (S).

Ptérotachéide (F). Pterotracheidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديلات الأرجل. اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مَيْمَةٌ، أعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || معظم أنواعها عديم الصدف والقليل منها يحمل مصداقاً لتلحف الأشعاش || اعرف اجناسها وأشهرها المريانة والشفارة والفردولة والنبله.

## ١٨٢٥٨ - عُرْيَانَاتُ الْأَسْكَانِ Gymnodontes

مرتبة اسماك من الطغليات تنتمي الى رتبة ملحومات الفك. اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة تجمعها فصيلتان الفحميات والفقيقات.

## ١٨٢٥٩ - عُرْيَانَاتُ الْبُورِ Gymnospermes (F).

Gymnospermes (E).  
احد قسمي باديات الزهر في النبات.

## ١٨٢٦٠ - عُرْيَانَاتُ الْخَيْشُومِ Nudibranches (F).

Nudibranchiates (E).  
صف حيوانات من الرخويات المدلية.

## ١٨٢٦١ - عُرْيَانَةٌ Pterotrachea (S).

Ptérotachée, Firole (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديلات الأرجل وفصيلة المريانات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطائها بحار البلاد الحارة، يكثر وجودها في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط || اجسامها عريانة مستطيلة هلامية شفافة تنتهي بأذناب متفاوتة الطول دقيقة الاطراف. زعانفها صغيرة وترية التجميع. افواهها خطمية. خياشيمها قريبة الانقسام تلتصق القلوب في مجموعة واحدة مركزها تحت البطن.

## ١٨٢٦٢ - عُرْيَانَةٌ كَيْسُ الْبُورِ Gymnosporange

هي الفطور الطفيلية التي لا ينفذ اكياس بوهها غشاء او لحاف.

## ١٨٢٦٣ - عُرْيَانَةٌ Imperata (S). Impératè (F).

جنس نباتات عشبية، برية، مرغوة، من فصيلة النجيليات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || جميع انواعها شتوية. عصفها ضيق، متوسط الطول، متبادلها مركبة، صغيرة.

## ١٨٢٦٤ - عُرْسُ Ctenolabrus (S).

Cténolabre (F). Ctenolabrus (E).  
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الكيديات انواعها المعروفة قليلة. جميعها صغيرة القد. أعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة. ومنها نوعان مسرحها البحر الأبيض المتوسط.

## ١٨٢٦٥ - عُرْسُ سَوْنِي Ctenolabrus iris (S).

Cténolabre Iris (F). Ctenolabrus Iris (E).  
سمكة من العريس اعطائها بعض مناطق البحر الابيض

زنانها خيطيان. ملمسها دقيقان. مرشفاها متدل الجرم. جوشها وبطنها الى التي الاسفح الموج || رواشها الى المبيض المائج يعلو تيجج وزركشة متداخلة الاربد والاصفر والاملح الفضي || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفرشة في ايار وتبقى حتى آب. تسرح في النهار || الاثن تتجج المكن مباحداً على الصفحات العليا من نصال الارواق || الطور الاسروي يستمر نحو ٢٨ اسبوعاً والسرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٢ الى ١٤ م. جسمها اسطواني الشكل، اغبر اللون، احمر الموج، تملوه ثلاثة صفوف قاطبة من الملب القصير رأسها مجوّري اللون. رواجها البطنية مجهزة بكلايب صغيرة حادة الاطراف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متينة الجلك تسحبها السرعة بين طيات الارواق المفتولة.

## ١٨٢٦٩ - عُرُوقُ الصَّبَاغِينَ \*، عُرُوقُ صُفْرٍ، بَقْلَةُ الْخَطَاطِيْفِ، مِيرَان

Chelidonium majus (S). Grande chélidoine, Eclaire, Herbe aux hirondelles (F). Celandine, Swallow-wort, Greater celandine (E). Gemeines Schellkraut, Schölkraut (D). Chelidonia maggiore, Erba nocca (I).  
نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخشخاشيات. اوراقه مركبة مفردة بحرية اللون. ازهاره كبيرة القد، طويلة الزناد، لونها الى الصفار الزاهي || يكثر وجوده قرب البيوت الريفية وفي السياجات. عصارته لينة كاوية صفراء اللون تقضي على التاول. يعيق من اوراقه عند فركها رائحة لاذعة تأخذ بالانف والحلق. ويستخرج منه صباغ اصفر مرغوب فيه.

## ١٨٢٥٠ - عُرْيَانَاتُ Graphilolaceae (S).

Graphilolacées (F). Graphilolacées (E).  
فصيلة الفطور العزّية من رتبة الصباغيات. تتميز ببهها الوحيد الخلية، اما بوهها فتشائي الجيلة شعبي الانقسام.

## ١٨٢٥١ - عُرْيَانَاتُ Inerne (F). Thornless (E).

نمت ترابي توصف به الاعضاء النباتية الماددة الشكل والزغب.

## ١٨٢٥٢ - عُرْيَانُ الْجِسْمِ Gymnosome (F).

Gymnosomate (E).  
نمت ترابي يطلق في علم الحيوان على كل جسم عادم الكساء.

## ١٨٢٥٣ - عُرْيَانُ الْجِلْدِ Gymnodermate,

Gymnoderme (F). Gymnoderma (E).  
نمت ترابي يطلق في علم الاحياء على كل حيوان مكشوف الجلد.

## ١٨٢٥٤ - عُرْيَانُ الذَّيْلِ Gymnure (F).

نمت ترابي يطلق في علم الحيوان على كل ذيل عديم الوبر او الملب او الحراشف.

## ١٨٢٥٥ - عُرْيَانُ السَّاقِ Gymnocaula (F).

Gymnocaulous (E).  
نمت ترابي يطلق في علم النبات على كل ساق عادمة الارواق.



عروق الصباغين



١٨٢٧٦ - عَرَبِيَّةٌ \* Anarrichus lupus (S).

Anarrichus, An. lupus (F).

سمكة بحرية يمرض من شائكات الزعانف وفصيلة الجحتريات موطنها المناطق الباردة والمتعددة الحرارة من المحيط الاطلسي. قلما تقترب من المباح. اسرابها متوسطة العدد || جسمها شبه اهليجي الشكل، كبير القد، يطول نحو ١٤٠ سم. رأسها اقلس. شفتها رجب الانفراج. اسنانها كبيرة جادة الاطراف. عيناها صغيرتان ممتاحتان. جلدها عديم السهف مسحب السطح. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة. زعنفتها الذيلية صغيرة محدبة الطرف || ثوبها الى الخضار البحري الفاتح يطلو بتجعد معرض اسمر تشدد سمرة في الرأس واعلى الظهر || لحمها جيد الصنف وجلدها مرغوب فيه.

١٨٢٧٧ - عَرَبِيَّةٌ Antre du lion (F). Lion's den (E).

البرين والعرينة : مأوى الاسد.

١٨٢٧٨ - عَرَبِيَّةٌ \* Euphonus (S).

Euphone (F). Euphonus (E).

جنس طير من فصيلة التنفريات. انواعه المعروفة نحو ٢٤ سمها من طيور امريكة الوسط والجنوبية. تألف الغابات والحراج. نظامها الحياتي جماعي. اسرابها متغايرة العدد || اجسامها صغيرة القد، هيأة، تطول من ١٢ الى ١٦ سم. مناقبها مخروطية صغيرة. اجنحتها معتدلة الحجم. اذناها متوسطة القد، مقطوعة الاطراف. اسرارها دقيقة. اصابعها صغيرة. اولها بجلة الالوان الساطعة يكثر فيها الازرق والاصفر || تتميز بكثرة تغريدها المستحب الانعام. جميعها تعيش على التار واليابس والبلور. اخلاقتها ريفية. معطر انواعها يألث القفص ويحب التغريد || تدنن اعشاشها في الاشجار الغناء المعتدلة الارتفاع عن سطح التربة. اناثها تضع من ٤ الى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوما.

١٨٢٧٩ - عَرَبِيَّةٌ \* Esacus (S). Esaque (F).

طائر من طول الساق وفصيلة الزرقائيات. يتميز بجمته وبسرعة عدوه. موطنه مناطق الهند والافانك وايران. يألف المناطق والقيعان وصفات الانهر وكثبان الرمل. ملجئه الحياتي جماعي. جماعته قليلة العدد. قوته الحشرات والديدان والدعاصيص || جسمه يطول نحو ٢٨ سم. يتميز بكبر منقاده المركب من جزئين، من جزيه فضورية يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقاد وجزه قرني يكون الثلث الاخير. جناحه ذلق الطرف يلحف الذنب. ذنبه مخروطي الشكل، قصير. ثوبه العلوي الى الزبداء السمره يطلوها موج اسود. رأسه اشد سمرة من رداءه. عيناها مقلتان بخط ابيض يمتد كالحجاب حتى القفن. زوره وانفكه الى التربة. عدوه وبطله الى الشبهة. منقاده وساقه الى الكهبة السمره.

١٨٢٨٠ - عَرَبِيَّةٌ Rectrices caudales (F).

Caudal tail-feathers (E).

المرالان : الريشان اللتان في طرف ذنب العقاب.

١٨٢٨١ - عَرَبِيَّةٌ Rectrices caudales (F).

المرالان : الريشان اللتان في طرف ذنب العقاب.

١٨٢٨٢ - عَرَبِيَّةٌ Ferme (F). Farm (E).

العربة كلمة معصرية ترادف مزرعة. والمزرعة هي كل ارض زراعية موصوفة الحدود يستثمرها صاحبها او يؤجرها بقدر.

للتوسط اخصها المناطق الشمالية || جسمها صغير القد يطول نحو ١٣ سم. ثوبها الى الحمرة الزاهية. زعنافتها سود || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٨٢٦٦ - عَرِيضٌ صَحْرِيٌّ \* Ctenolabrus

rupestris (S). Ctenolabrus des rochers, Ronqué (F).

Ctenolabrus rupestris (E).

سمكة بحرية يمرض من العريش. اصطنابها معطر اقاليم البحر الابيض المتوسط. سرسها حشاش المباح والتفاف || جسمها اهليجي الشكل. معتدل التيطيط، يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الصبغة الوردية يطلوها موج اخضر وعشرة خطوط حنطية قاطبة. رأسها مخروطي الشكل، مدبب الخطم. فكاهها صغيران. شفتها قليل الانفراج. عيناها كبيرتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل، لامتناهية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مقنطرة الطرف || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٨٢٦٧ - عَرِيضٌ الْأَوْزَاقُ Platyphylle (F).

Platyphylous (E).

١٨٢٦٨ - عَرِيضٌ الْبَتَّلَاتُ Platyptéale (F).

Platypetalous (E).

١٨٢٦٩ - عَرِيضَاتُ Plathelminthes, Platodes,

Vers plats (F). Platyelminthes, Platyhelminthes (E).

شعبة الديدان العراض. تشمل ثلاث رتب: الشريطيات والملقحات والمهزئات.

١٨٢٧٠ - عَرِيضَةٌ، مَعْرُوضٌ Péition (F).

Petition (E).

كتاب يرفع الى السلطات العامة يعرض فيه رأياً او طلباً او شكوى.

١٨٢٧١ - عَرِيضَةٌ الْحَدَكَةُ Platygastré (F).

جنس حشرات مفيدة من عشائيات الاجنحة تعيش رقاتها على اسارع بعض الحشرات المضرة فتيها.

١٨٢٧٢ - عَرِيضَةٌ \* Testacelle (F). Snail-slug (E).

تدعى في لبنان « براق عريان » جنس دويبات من فصيلة المريطيات. انواعها قليلة العدد، اعطائها حوض البحر المتوسط. وهي من الدويبات النافعة المفترسة التي تلهم الديدان على اختلاف انواعها.

١٨٢٧٣ - عَرِيضَتِيَّاتٌ Testacellidae (S).

Testacellidés (F). Testacellidae (E).

فصيلة دويبات من الرخويات المحدثات الارجل الرئوية الشبثانية. اجناسها وانواعها عديدة. اشهرها المريطة.

١٨٢٧٤ - عَرَبِيَّةُ الْمُرُوجِ هو الساهر، اطليه.

١٨٢٧٥ - عَرَبِيصَةٌ \* عَرَبِيصَةٌ عَرَبِيصَتَانُ

Platycerus (S). Platycère (F).

جنس سحرات كبيرة القد من مفصليات الاجنحة. انواعها عديدة. اعطائها ارجاع البلاد المعتدلة الحرارة. اجسامها غليظة، قرونها الاستثنائية صفيحية الشكل، اولها الى السواد الباهم الاسفح الملوحي || رقاتها تتركب اوراق الاشجار الحرجية قطعها.



عَرِيضٌ صَحْرِيٌّ



مر يطة



عَرِيصَةٌ



عَرَبِيَّةٌ



عَرَبِيَّةٌ



عَرَبِيَّةٌ

يألف الغابات ويقترّب من الاماكن الآهلة ولا يتعدى على الانسان . ملجته الحياتي زوجي || جسمه ابيض لزوي رشيقا ، يطول نحو ١٧٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٩٠ سم . رأسه صغير الجرم . اذناه صغيرتان ، مستديرتان ، عيناه صغيرتان . سباله كثيفة مستطيلة . فروه قصيرة الوبر . ثوبه الى الصدر والخصر الخمر الموالج يعبق في الظهر ويذو في الصدر والبطن . ويجعل غدة ادرية المركز تفرز مادة كريمة الرائحة . الانثى اضع ثوباً من الذكر || يتسلق الاشجار خفة ويمدو على الارض بسرعة . قوته الطير والماعز وكل ما استطاع اليه من الحيوان .

### ١٨٢٩٨ - عَسَاكَة كَبِيرَة \*

*Leucospis gigas (S). Leucospis géant (F).*  
حشرة من العساكات كبيرة القد . موطنها بعض اقطار البلاد الحارة والمشمخة نحو المعتدلة || جسمها مستطيل الشكل ، منق الجوشن ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبها الى السواد اللامع تملو خطوط عريضة صفراء كبريتية الموالج رأسها شبه مخروطي الشكل . زباناها خيطيان . قوائمها مستطيلة . مسنة الظنايب . اجنتها غشائية ، ضيقة ، قليلة المروق والاعصاب . اشترها مستطيلة ، منققة تستقر عند الاستراحة في اخدود يقطب الظهر حتى الجوشن || تتطفل على الزنابير والزرافات فترز اشترها في جمل الحشاء مها كان صلباً ومتمتع المكان في البدا وعليها .

### ١٨٢٩٩ - عَسَاكِيَّات \*

*Leucospidae (S). Leucospidae (F).*  
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نائمة تتطفل على الحشرات القفارة من ذوات الجناحين || حشراتا متوسطة القد وكبيرة تطول من ٧ الى ١٥ سم . اجسامها ضخمة ملونة . رؤوسها مخروطية . زباناها خيطية . قوائمها طويلة ، مسنة الظنايب . مرزاتها مستطيلة ، حادة منققة نحو الظهر عند الاستراحة || اشهر انواعها العساكة الكبيرة .

### ١٨٣٠٠ - عَسَاة \* هي خلية النحل ، اطليها .

### ١٨٣٠١ - عَسَامَة \*

*Morphogenèse (F). Morphogenesis (E).*  
العسامة مجموعة النوايس التي تتحد وتحم شكل النسيج والاعضاء في كل جسم حي منذ ابتداء تطويره .

### ١٨٣٠٢ - عَسَب \* هو الاربوس العطر ، اطليها .

### ١٨٣٠٣ - عَسَب \*

*Sperme du chameau (F). Sperm of the camel (E).*  
شلخ الفحل من الابل .

### ١٨٣٠٤ - عَسَب ، عُسَب \*

هو في النبات اُقرَد الذي يتحلل بجميع صفات الضرب المثالية المطلوبة .

### ١٨٣٠٥ - عَسْبَار \* ، عَسْبَارَة

*Proteles cristatus (S). Protèle à crête, Loup fous-seur (F). Aard-wolf (E).*

حيوان من اللوامس وحيد الجنس والنوع يشبه الضبع المخذعة لكنه اصفر منها جفة واقبع ثوباً واخشن صوفاً . اعطته البلاد الافريقية ، يسرح في الليل ، قوته الجيف وكل ما استطاع اليه سيلاً من صغار الحيوان والطير .

### ١٨٢٩٣ - عَرَّة - Bichette (F).

*Little hind, Young hind (E).*  
هي بنت الظبية حتى افتراقها عن امها .

### ١٨٢٩٤ - عَرَز ، عَرَزَر

المرز والزرير : هو ثمن الكلا بعد الحصيد . تقول : حل اخذت عَرَزَر هذا الحصيد اي حل اخذت ثمن مراده .

### ١٨٢٩٥ - عَرَزَر

*Terré compacte (F). Compact soil (E).*  
المرز : الارض السلية السريعة السيل .

### ١٨٢٩٦ - عَرُف \* هو الحمام الطوراني ، اطليها .

### ١٨٢٩٧ - عَرَق \* Sarslage (F). Weeding (E).

سرح القشرة السطحية من التربة بالمزق الآلي او اليدوي وذلك لتنظيف التربة باقتلاع الاعشاب والقارة وتخریب انابيب الاستحلاب نملاً لتبخر الماء .

### ١٨٢٩٨ - عَرَل \* Isolement (F).

*Separately, isolation (E).*  
فصل الحيوان المريض عن السليم .

### ١٨٢٩٩ - عَرَل من الوصاية

*Destitution de la tutelle (F). Dismissal of the tutelage (E).*  
تجريد الوصي من مهمة الوصاية التي اسندت اليه .

### ١٨٢٩٠ - عَرَمَة \* Energide (F). Energid (E).

الترمة محيط غليوي يشتمل على نواة ومنطقة زكنية تتفعل بتوجيهها .

### ١٨٢٩١ - عَرِهَل \* Pigeon mâle (F). Pigeon male (E).

الزهرل والزهل : الذكر من الحمام .

### ١٨٢٩٢ - عَرُو \* Imputabilité (F). Imputability (E).

هو القول بان فلاناً فعل فعله مية مادياً وادبياً .

### ١٨٢٩٣ - عَرُوق

الزروق : خلل الفتق المادم اللب وهو دباغ .

### ١٨٢٩٤ - عَرِيب

راجع نشعة وجرة .

### ١٨٢٩٥ - عَرِيبَاء \* هي الجشة ، اطليها .

### ١٨٢٩٦ - عَرِيم \* Azim (S). Azime (F).

جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة القاتيات . انواعه المعروفة عديدة منها المناطق الاستوائية من البلاد الاسيوية والافريقية || سوقها سريعة او ملتفة . اوراقها منققة ، متقابلة . نساها اهليجية الشكل ، جميلة الخضار اللامس . ازهارها ابيض وهاسي الازتكاز ، عفودي التجميع . ازهارها صفيرة يضاء اللون او وردية ، عطرية الدرف الخالط .

### ١٨٢٩٧ - عَسَّاس \* ، فُوصَة

*Cryptoprocta ferox (S). Cryptoprocte féroce, Foussa (F).*

حيوان لاسم مقترس من فصيلة السنوريات . موطنه جزيرة مدغشكر . يعتبر اكبر غواراي الجزيرة . مسرعه دجوي .



عَرِم



عاس



عَسَاكَة كَبِيرَة



عسبار

Phyllostachys (S).

Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصيرة برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات  
وفصيلة النجيليات. أنواعه عديدة ترُفب في الأترية القليلة  
الانتاج ، الميعة النور ، القصوية ، الثبالية ، الرطبة .  
اشهرها ما يتبع .



عصرب

١٨٣١٣ - عُشْبُون أُسُود

Phyllostachys nigra (S). Bambou noir (F). Black bamboo (E). Japanische Blattsähre (D). Bambie nero (I).

نوع من العسطنس يملو من المثرين الى السبعة امتار .  
سوف يكاملها مع سلايها وعصرها الى السواد اللامع .  
اوراقه تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم .  
نصلها مالم الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، مهدب الحافة .  
يعتبر من النباتات البروتية القليلة المتطلبات . يغسل  
الأترية الخفيفة الرطبة .

١٨٣١٤ - عُشْبُون أَمْفَر

Phyllostachys aurea (S). Bambou doré, B. jaune (F). Yellow bamboo (E). Gelbe Blattsähre (D). Bambie giallo (I).

نوع من العسطنس يملو من ٤ الى ٥ امتار . سلايها  
مقارعة قصيرة ، عصر بارزة مقارعة . افتاده عديدة ،  
دقيقة ، متشعبة . اوراقه تطول من ٧ الى ١٤ سم . نصلها  
مسن الحافة ، مالم الصفحة العليا خلي السفلى || وهو  
نبات سبروتي يعيش ويمجد في جميع الأترية .



عسوبة مرققة

١٨٣١٥ - عُشْبُون بُشْبِي

Phyllostachys violascens (S). Bambou violacé (F).

نوع من العسطنس يملو من الثلاثة الى الست امتار . سوف  
يكاملها بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٥ الى ١٨ سم .  
وتعرض نحو ٣ سم . نصلها مسن الحافة || زراعت تتطلب  
بعض العناية ، يرغب في الأترية المعتدلة الانتاج والرطوبة ،  
الرافرة المواد القصوية .

١٨٣١٦ - عُشْبُون بُشْبِي

Phyllostachys ruscifolia (S). Bambou petit-houx (F).

نوع من العسطنس يملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . سلايها  
تبدو خضراء اللون ثم تصفر . اوراقه تطول من ٦ الى ١٠ سم .  
وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مستدير القاعدة ، ذات  
المقصعة . وهو نبات سبروتي يمجد في جميع الأترية القليلة  
والمعتدلة الانتاج .

١٨٣١٧ - عُشْبُون دَبْرَجَنْدِي

Phyllostachys viridiglaucens (S). Bambou vert glaucescent (F).

نوع من العسطنس . يملو من ٥ الى ٦ امتار . سلايها  
متوسطة الطول ، خضراء اللون . عصر بارز اسود . اوراقه  
تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها  
اخضر الصفحة العليا خلي السفلى || وهو نبات  
سبروتي ، زراعت كثيرة الانتاج لكنه يغشى الجفاف .



عسطنس

١٨٣١٨ - عُشْبُون كَسْتِيلُون

Phyllostachys castillonis (S). Bambou de Castillon (F).

نوع من العسطنس ، يملو من ٣ الى ٥ امتار . سلايها  
متناقية المخضرة والصفرة . اوراقه تطول من ٨ الى ١٤ سم .  
وتعرض نحو ٣ سم . نصلها منشاري الحافة يملو وتوسع  
اصفر وردي || يعتبر من النباتات البروتية التي يمجد  
في جميع الأترية الممكن ردها .

Chien-loup (F).

Wolf-dog (E).

سلالة من الكلاب تتميز ببطنها وبقابليتها الى اقتباس  
ما يطلب منها .

١٨٣٠٧ - عُشْبِي

Pileostegia (S). Pileostégie (F).

جنس جنبات ترينية معمرة من فصيلة السفسريات ، انواعه  
قليلة العدد ، سوفها زرجونية تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم .  
اوراقها كاملة ابيدة سنانية النصل الجامد الصفعة وهي  
حاضرة مرة تدلوي بها الجراحات . ازهارها صيوانية التجميع ،  
بيضاء اللون . سلماتها خيمية الشكل بارزة || ازهاره  
يستمر طوال الصيف .

١٨٣٠٨ - عُشْبِي

١٨٣٠٩ - عُشْد

هو الذهب ، اطليه .

هو البير ، اطليه .

١٨٣١٠ - عُشْرَاب \*

Butalis grisola (S).

Butalis gris (F). Brown fly-catcher (E).

طائر من الفلوراب من فصيلة المذبذبات . موطنه جميع  
المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية . يألف  
جميع الاماكن القريبة من الماء || جسمه صغير القد  
يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى الرتبة . جبهته  
ورأسه مرقوشان بالاسود . ويعملو في جناحيه بعض التسنج  
الايضي . ثوبه السفلي الى البياض الاخير . عنقه وصدره  
وايطلاه مرقوشة بالاسمر . مقناده وحففة عيه الى السواد  
الحالك . ساقاه واصابعه الى السمرة السوداء . ثوب الاثنى  
عادم التسنج في الجناح || طيرانه خفيف الحركة رشيقا .  
وينتقل على الارض بلياقة . قوته الحشرات من الذباب  
الى الفراش واليساميب ولا ينف من الثار النعينة اليانعة ||  
يدفن عشه بين الاغصان . الاثنى تضع في اوائل حزيران  
من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بجانب الذكر نحو ١٤ يوما .

١٨٣١١ - عُشْرُوبِيَّة مَعْرَكَة \*

Notodonta ziczac (S). Notodonte zigzag, Zigzag,

Bois veiné (F). Notodonta ziczac (E).

حشرة من فصيلة الشوسليات ورتبة حشرقيات الاجنحة .  
موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط  
والاودية واروية . قراشها واسمه قنبا رقيق الازمار .  
سرقها تعيش على اوراق الخور والصفصاف || جسمها  
معتدل القد يطول نحو ١٥ سم . بطنها نحو ٤٢ مم .  
راسها صغير الجرم ، بني اللون . عينها صغيرتان . زناناها  
مشطيان مزروجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند  
الانثى . جوشها الى البني الخفي الموج بطنها الى البني  
الاصفر المواج . ووشها الاماميان الى الخفي المتفاوت  
السرعة تملو مشحمان بنية وخطوط وعروق سمراء اللون .  
وروشها الخلفيان الى البياض اللثني المواج . اهدابها عاجية ||  
لها جيلان في الحول . تظهر قراشة الجيل الاول في نيسان  
وتظهر قراشة الجيل الثاني في تموز . كسرج في الليل .  
تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن  
مبيدات على الصفحات السفلى من نصال الاوراق ||  
السرعة تطول نحو ٢١ سم . جسمها مالم القشار اكهب  
اللون اسود الشمول . مستطيل الرأس ، مستفخم البطن  
حتى السكة السابعة ثم يضيق تدريجيا حتى كسرج الذي  
ينتهي بذنبتين صغيرتين || طول الاكمال الذي يستمر  
نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلبة تحميها السرعة تحت  
القشور او في شقوق النحاء .

## ١٨٣١٩ - عَشْقُوسٌ مَأْكُولٌ

١٨٣٢٦ - عَشْقُودُ

Asperococcus (S). Aspérocoque (F). Asperococcus (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السمر. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحارة || كلاليتها صغيرة وقصيرة. أوراقها قديمة، حلامية التركيب. مراجعها أطول حاشية تحت امتداد النصال || تعيش على الصخور المدخورة.

١٨٣٢٧ - عَشْقُودُ، عَشْقُودُ هو الدرة، الحلباء.

Chapeau, Péridium (F).

Pileus, Peridium (E). عسقلاان الفطر: اعلاه ورأسه.

Escallonia (S).

Escallonie (F). Escallonia (E).

جنس شجيرات برية وزراعية تريينسية، من فصيلة السفريات. مهدها بلاد الشيلي. سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة أمتار. أوراقها أبيض، متعاقبة، مسننة الحواف. أزهارها لاقياسي الشكل والتجميع. أزهارها ملونة || أنواعها المعروفة قليلة، أشهرها التالية.

١٨٣٣٠ - عَشْقُودَةُ رَاتِنِجِيَّةِ \*

Escallonia illinita (S). Escallonie résineuse (F).

نوع من المسقولة. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة أمتار. أوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها جلدية، جرداء، مسننة الحواف، لامية الحفاز. صفحتها السفلى مبرقة التندراتجية. أزهارها بيضاء اللون، محورية الارتكاز، صغيرة القد، قطرها نحو ٨ مم. || تنويعها صيفي.

١٨٣٣١ - عَشْقُودَةُ عَفْرِةِ \*

Escallonia pulverulenta (S).

Escallonie pulvérisée (F).

نوع من المسقولة. ساقها تملو من متر الى مترين. أوراقها أحليجية، مقبولة. نصالها خلية البشرة، عفرة. أزهارها صغيرة القد، وريدية اللون أو بيضاء، تجمعها عناقيد طرفية الارتكاز متدلية || تنويعها يستمر طوال شهر تموز.

١٨٣٣٢ - عَشْقُودَةُ دَرَامَةِ \*، أَكْرُيْكَتَا

دَرَامَةِ \*

Acronycta leporina (S).

Acronycta lièvre (F). Acronycta leporina (E).

حشرة من فصيلة السقليات وريدية حشريات الالجنة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الأبيض المتوسط. فراشها واسعة قوتها رقيق الأجزاء. سرقتها تعيش على أوراق الانجار الوردية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٦ مم. بسطها نحو ٤٠ مم. رأسها كبير الحجم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان مستطيلان. جروثها متعرجة اللون. بطنها الى الزرقه تملوها خنة خطوط معترضة سحره اللون || درشتاها الاماميان الى الزرقه الباهتة يملوها تنقيط اسود وزرقه حلالية الشكل. درشتاها الخلفيان الى الحطلي الاصفر الموالج || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل في اليل || نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. ترحب الاكل. تناظر بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتد الممكن لطفها على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرقة تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، مائل

Phyllostachys mitis (S). Bambou comestible (F).

نوع من العسوس، يملو من ٨ الى ١٢ م. قطر ساقه يراوح من ٥ الى ٧ سم. سلامياته مستطيلة صفراء اللون. أوراقه تطول من ٨ الى ٩ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها اخضر الصفعة العليا، ازرق السفلى. اماليجه الفتية مأكولة تستعمل استنبال الحلون || يرغب في التربة الدبالية المتوسطة الاندماج والرطوبة.

١٨٣٢٠ - عَشْقُوسٌ مُقَنَّعٌ

Phyllostachys marmorea (S). Bambou marbré (F).

نوع من العسوس، يملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. سلامياته بتسجية موشة بالرمادي. أوراقه تطول من ٧ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ م. نصالها عابق الحفاز يملو تضليل اغبر يابث || يرغب في التربة الرملية او القليلة الاندماج الغنية الرملية.

١٨٣٢١ - عَشْقُوسٌ \*

Isotoma (S).

Isotome (F). Isotoma (E).

جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة العسويات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ م. أنوثها سوية اللون منها الاسود والافضر والاطحل. رؤوسها ضخمة. بطنها أحليجية الشكل، مبرقة الحلب. جهازها القفزي نشيط || أشهر أنواعه العسوم الاخضر (Isotoma viridita) الذي يكثر وجوده على الطحالب وتحتها.

١٨٣٢٢ - عَشْقُوسِيَّاتٌ \*

Isotomidae (S). Isotomides (F). Isotomidae (E).

فصيلة حشرات قافزة، دامت وقافزة من رتبة الكهديات. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١ الى ٤ م. رؤوسها شبيهة بالشوزن. افكاها وتأثيرها لاطة. عيونها زرقية. قربها الاستشعارية قصيرة، رباعية الفصل. صغورها ثلاثية الحلقفات. تتميز بقصر مقدم الجوشن العادم الحلب. بطونها سداسية السكم مجهزة بجهاز قفزي نشيط. مكانها ثنائية او ثلاثية الانسان. قوائمها قصيرة تنتهي باظافر محجمة حادة || أشهر اجناسها العسوم.

١٨٣٢٣ - عَشْقَارُ \*

Eschara (S).

Eschère (F). Eschara (E).

جنس حيوانات طحلبية من فصيلة المسقريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط || مستعمراتها مغمورة قليلة الفور، من ٣٠ الى ٥٠ م. تحت سطح الماء. جميعها متشعبة منفصلة المحيطات الثابتة الطبقات.

١٨٣٢٤ - عَشْقَارِيَّاتٌ \*

Escharidae (S).

Escharidés (F). Escharidae (E).

فصيلة حيوانات طحلبية بحرية اجناسها وأنواعها الممارسة قليلة العدد معظمها يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحارة || تتميز بقوامها الدائرية وبشكلها القدسية المحصورة.

١٨٣٢٥ - عَشْقَبٌ، عَشْقَبَةٌ

Grappette, Grappillon (F). Small bunch of grape (E).

عشيق صغير منفردا كان أو متصلا بملاق غيره. ج عصاب.



عشوق



عشقولة راتنجية



عشقودة درامة

ازهارها عشقودية التجميع . عصاره عاقلها تشي من الجرب وتستعمل في تنظيف الانسجة الصوفية .

### ١٨٣٣٧ - عَصَلَجُ افَغَانِي

*Leontice chrysogonum* (S). *Léontice chrysogone* (F). نوع من السليج الطبي البري والبرزي . ساقه تملو نحو ١٥ سم . اوراقه وريشة الشكل ، وريقاتها احليجية ثلاثية او خماسية المتفصيص ، تصلفها بحري اللون . ازهاره الصفار الذهبي يحلفها شخاخ دقيق مسط || ازهاره يحصل في ايار .

### ١٨٣٣٨ - عَصَلَجُ الأسد \* ، راحة الأسد ، خميرة الدار ، رُكف

*Leontice leontopetalum* (S). *Léontice pied-de-lion*, *L. commun*, *Leônure* (F). *Lion's-leaf*, *Lion's-turnip* (E). *Echte Löwenblatt*, *Löwentrapp* (D). *Leontice pié di leone* (I). نوع من السليج وهو نبات عشبي طبي بري يملو نحو ١٠ سم . اوراقه مركبة ثنائية التلث . وريقاتها بيضيه الشكل ، مقطوعة القاعدة ، مشرطة الطرف . ازهاره صفر اللون . ازهاره يحصل في ايار .

### ١٨٣٣٩ - عَصَلَجُ الفَتَاي

*Leontice altaica* (S). *Léontice de l'Altai* (F). نوع من السليج البري والبرزي . ساقه موقرة ، تملو نحو ١٢ سم . اوراقه مركبة وريقاتها احسية الشكل لا متساوية القد . ازهاره كبريتية اللون كيفية التجميع . ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .

### ١٨٣٤٠ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤١ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٢ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٣ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٤ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٥ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٦ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٧ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٨ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٩ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٥٠ - عَصَلِقُ \*

*Felis pardalis* (S). *Ocelot* (F). *Tiger-cat*, *Leopard-cat* (E). حيوان لاح مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه شام الاطراف يمتد من امريكا الشمالية الى المكسيك والبرازيل . يألف الاخراج . ملجته الحياتي زوجي || جسمه اهيف القوام رشيقيها يطول من ١٢٥ الى ١٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسه متدل الجرم . اذناه صغيرتان ، مستهزتان . عيناه عسلتان ، حادتان . ثوبه الى الصهوة الحمراء المواج يملعوا تنير اسود ورقشة سمراء وتتشيز حنطلي . ذنبه عشاري الاطواق السود || مسرجه دجوي يشتر من الغروب الى نعمة الليل ومن الفجر العميق الى بزوغ الشمس . يتسلق الاشجار بحفنة السنور ويعود على الارض بسرعة الخيل . قوته الطير والايال والقرد والخنائيس والجردان || حبل الاثني يدوم نحو ٧٠ يوما تقص في نهايته من جريون الى ثلاثة جراء تبقى مع والديها نحو ستة اشهر .

### ١٨٣٤١ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٢ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٣ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٤ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٥ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٦ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٧ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٨ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٤٩ - عَصَلِقُ \* ١٨٣٥٠ - عَصَلِقُ \*

*Brindille* (F). *Spig*, *Twig* (E). قضيب دقيق قصير املس طوله من ٥ الى ٢٠ سم . ينتهي غالبا ببرعة او ببرام عمرية || والسليج في العرف الحربي هو القضيب الدقيق على الفصن او الفتة .

### ١٨٣٤٢ - عَصَلِقَات

*Melanthaceae* (S). *Mélanthacées* (F). *Melanthaceae* (E). فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة الفلقات . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعا شجيرات وجنبات معمرة ابيدة الورق .

القشار . ثوبها الى الريدة الخضراء تملعوا سبعة خطوط مزدوجة ، قاطبة ، جوقية . رأسها الى الجزوة القائمة . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلجية تحبكهما السرعة بين حلاه الاشجار .

### ١٨٣٣٣ - عُفُودَة هَزِيلَة \* ، اَكُونِيَكَا هَزِيلَة \*

*Acronycta strigosa* (S). *Acronycta strigosa* (E). حشرة من فصيلة الحشرشات ورقية حرشفات الاجنحة . موطنها الاقاليم المحتلة الحارة من الشرق الاوسط والاذن واروبة . فراشها جارسه قوتها رقيق الازهار . سرقها تمشي على اوراق الزعرور والوخ || جسمها صغير القد ، هزيل . يطول نحو ١٠ سم . يسلفها نحو ٢٩ سم . رأسها متدل الجرم تشي اللون . عيناه كبريتان . زبانا خيطيان . جوشها وبطنها الى التني الاكلف المواج || رواشها عند الشقين الى التني الاكلف تملعوا في الزوج الاعامي بقعة قاعدية صفراء واخرى ختارية سمراء وتجنح وتغطيط وزرقوة الى التني الاشقر . وتملعوا في الزوج الخلفي نقطة قاعدية صفراء وبعض الزرقوة السمراء . اهدابها الى الصمرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن لطعا على الصفحات السفلى من تصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٢٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالم القشار . ثوبها الى المخيطي الاسمر تملو اطواق بيضاء رأسها شديد السرة اصفر المواج . مدنها الى التني . ورواجها الى السرة القائمة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما يتقضي ضمن صلجية متينة الحبلك تسجها السرعة بين حلاه الاشجار او تحت القشور الصلفة .

### ١٨٣٣٤ - عَصَلِقُ \* ، اَرِي

*Miel* (F). *Honey* (E). مادة سكرية يصنعها النحل من رحيق ومنش ازهار والبار والارواق فيضعها ويحفظها في تخاريب مسددة خامة ، يصطنعها من الشمع وينطها بقرقة رقيقة شفافة شمعية المادة تمتع عنها الفساد || اجود العسل طعما ورائحة ما كان بجناه الصمغ والخزام وصمغ البان والموسج والليمون والرن والحنطوق والنفل والسنت || اما متوسط تركيبة المادي فهو :

غلوكوز وفليزول	٧٠ ٪
سكاروز	٥ ٪
ماء	٢٢ ٪
نيت ودكستين	٢ ٪
مواد صمغية ومعينية	١ ٪

### ١٨٣٣٥ - عَصَلَجُ ، عَصَلَجُ ، نَاجِم

*Scion* (F). *Shoot* (E). السليج هو القضيب النامي على العلم قبل بلوغه الحول . وقد يكون برقا فيضي اذ ذلك ناجما . ج عساليج || ويقال عسلجت الشجرة اذا اخبرجت عساليجها .

### ١٨٣٣٦ - عَصَلَجُ

*Leontice* (S). *Léontice*, *Patte de lion* (F). *Leontice*, *Lion's-ear* (E). *Löwenblatt trapp* (D). *Leontice* (I). جنس نباتات عشقودية طيبة من فصيلة البرباريسيات . انزاعه ٦ عاقلها معمرة ، سوتها حولية ، اوراقها مركبة .



عفودة هزيله



عسل الاسد



عسل

## ١٨٣٤٩ - عَسَلِيَّة \* Combrétées (F).

سبط من فصيلة الأهلبيجات، اشهر نباتاته السمس.

## ١٨٣٥٠ - عَسَلِيَّات \* Osmylidae (S).

Osmylidés (F). Osmylidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شفافات الانجمنه . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها متوسطة الحجم تكثر فيها الاستطالة . بسطها تراوح من ٣٢ الى ٤٨ سم . رؤوسها شبه اسفينية الشكل . عيونها كبيرة جاحظة . قرونها الاستشعارية غشيطية مستطيلة . اجنحتها مزخرفة ومبججة بالاسمر وهي كبيرة ، لاحقة ، شبه متساوية بين الزوجين . جلونية الاسترسال عند الراحة . بطونها شبه اسطوانية الشكل . اثوابها مزرققة بالاصفر والاسمر والوردي والابيض || تألف غشقات مجاري السام حيث تكثر الاصاب || اناتها تمتص المكنن على نصال الاوراق . يرقاتها مفترسة ، قازبة تعيش في البر وفي الماء || اشهر اجناسها السميل .

## ١٨٣٥١ - عَسْن \* Périthèce (F). Perithecium (E).

هو غلات الثمرة في الفطر وهو الثمرة الفطرية التي تحضن الارقاق . ج . عسان .

## ١٨٣٥٢ - عَسْب \* Ciré (F). Beeswax (E).

هو الشمع العسل .

## ١٨٣٥٤ - عَسُودَة \* Lepidodactylus (S).

Lépidodactyle (F).

جنس عظام من فصيلة السويديات . انواعه ١٠ . جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ٦ الى ٧ سم . اثوابها بين الصفار والخضار تعلوها نمشة بمرام او سوداء . ج . عساد .

## ١٨٣٥٥ - عَسُودِيَّات \* Lepidae (S).

Lépidés (F). Lepidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة الظفانيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، رباعية الابريل ، خاسية الاصابع المبطنة . المحجمة || اشهر اجناسها السودة .

## ١٨٣٥٦ - عَسُوس \* Issus (S). Issé (F). Issus (E).

جنس حشرات ناسقة من فصيلة السوسيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الباردة ويعتبر مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الرؤوس ، ناشزة الجباه والعيون ، صغيرة القرون الاستشعارية ، مستطيلة القوائم المسنة الشائكة . اجنحتها مستعرضة ، شبيكة ، لاحقة ، شفافة . اثوابها متباينة الالوان ، تكثر فيها السمرة على اختلاف ماباتها التي تراوح من الشقعة الى الحمرة الوردية والخضار الزيتي || قوتها النسخ تمتصه من الاوراق .

## ١٨٣٥٧ - عَسُوس السِنْدِيَّان

Issus coleoptratus (S). Issé des chênes (F).

حشرة ناسقة من فصيلة السوسيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م . || رأسها مستضخم ، عظمها ذرب .

## ١٨٣٤٣ - عَسَلِيَّة \* ، زَهْرَةُ الْعَسَل

Melanthus (S). Mélanthe, Fleur de miel (F). Melanthus, Honey flower (E). Honigblume (D). Fior di miele, Melanta (I).

جنس ثيبريات وجنيات طيبة وزيينية من فصيلة العسلديات . انواعها قليلة العدد صغيرة القد . اوراقها متعاقبة مركبة ورتية التجميع . ازهارها خشوية لا قياسية الشكل ، خاسية الفصل الانقسامية . رباعية البتلات والاسدية . احادية الپام . ثمارها جرداء مضلعة رباعية الارتفاعات ، وفي فواحة البرق السطري ، غزيرة الرحيق السكري الاسمر اللون الذي يستمر من اجمع حبات الامراض الصدرية . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

## ١٨٣٤٤ - عَسَلِيَّة صَغِيرَة \* Melanthus minor (S).

Mélanthe mineure (F).

جنية سريرية صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم . ساقها جوفاء اوراقها صغيرة القد . اذنياتها سائبة . وريقاتها تد ٧ او ٩ وهي ضيقة النصل للمشاري الحافة . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، متدلية . لونها الى السرة الخفيفة يملوها مواج اسف || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

## ١٨٣٤٥ - عَسَلِيَّة مُسَدَّلَة

Melanthus comosus (S). Mélanthe chevelu (F).

جنية صغيرة القد تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها مسطحة . اوراقها صغيرة مستعرضة مهدلة . وريقاتها غشيط دقيقة . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، منتصبه . بتلاتها برتقالية اللون ، غضر القواعد حر التبديع || ازهارها يستمر طوال فصل الحريف .

## ١٨٣٤٦ - عَسَلِيَّة مُشْطَلَة

Melanthus pectinatus (S). Mélanthe pectiné (F).

جنية سريرية تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها جوفاء جالسة . اوراقها متوسطة القد . اذنياتها سائبة . وريقاتها سائبة النصل ، خلية الصفحة السفلى تد من ١٣ الى ٢١ . ازهارها عنقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من اواسط آب الى اواسط تشرين الاول .

## ١٨٣٤٧ - عَسَلِيَّة هَرَمِيَّة \* Melanthus major (S).

Mélanthe majeure, M. pyramidal, Pimprenelle d'Afrique (F).

جنية جاحدة تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . ساقها جوفاء متعرجة . اوراقها كبيرة . اذنياتها متدحمة . وريقاتها لاطفة تد ١١ او ١٣ او ١٥ نصلها بحري اللون بالغ التسنن . ازهارها عنقودية التجميع ، هرمية الشكل ، تاجية الارتكاز ، لونها الى الحمرة المابقة || ازهارها يستمر طوال فصل الحريف .

## ١٨٣٤٨ - عَسَم \* Combretum (S).

Combret, Chigomier (F). Vegetale-glu-giant (E). Langfaden (D). Combrete, Combreto (I).

جنس نباتات حرجية من السميئات وفصيلة الأهلبيجات . انواعه نحو ٨٠ منها الانجار والشجيرات والجنابات . اعطائها البلاد الاستوائية . قشورها تحوي بعض الاسود الصمغية الماتجة القابضة . بزورها دهنية يستخرج منها زيت مأكولة .



عسلي



عسم



عسودة

اللون ، غبراء الجدار . تركيب الارواق في دورها النهائي الذي يستيقظ الارواباب فتنشط النصل وتندلي السنف والانتاج دون ان تسي الى نحو النبات .

### ١٨٣٦٤ - عُشْبٌ ، مُوَكِّنٌ ، مُوَكِّنَةٌ

Nid (F), Nest (E).

المش موضع حفر ينشئ الطائر يحجمه من دفاق الخطب ويختلف الحشائش والمواد فينشئ في الشجر . وان كان في جبل او عمارة فهو وكر وكُنْ ، اما اذا كان في الارض فهو انحوص وادي . ج عشاش وأعشاش وعششة .

### ١٨٣٦٥ - عُشَارِيّ الْأَقْسَامِ

Décátome (F).

ما كان مقسوماً الى عشرة اجزاء .

### ١٨٣٦٦ - عُشَارِيّ الْأَوْجَةِ

Décadèdre (F).

Decahedral, Decahedron (E).

من الهاد ما كان عشاري الابهة او القواعد .

### ١٨٣٦٧ - عُشَارِيّ الْفِصْلِ

Décamère (F).

Decamere (E).

ما كان مركباً من عشر فصل .

### ١٨٣٦٨ - عُشَارِيَّات الْأَرْجُلِ

Decapoda (S).

Decapodes (F), Decapoda (E).

اسم تعريفي يطلق على القشريات وعلى الرغويات الراسيات الارجل الرباعيات الحيشوم .

### ١٨٣٦٩ - عُشَارِيَّةُ الْمِدَقَاتِ

Décagyne (F).

Decagyn (E).

من الازعار ما كان وزيمها مؤلف من عشر مدقات .

### ١٨٣٧٠ - عُشَانَةٌ ، زُوغُونِيَّةٌ

Zoogonie (F).

Zoogony (E).

المشاة علم يبحث في تطور الحيوان .

### ١٨٣٧١ - عُشَانَةٌ : المشاة : اصل السفة .

### ١٨٣٧٢ - عُشْبٌ

Essarter (F).

To clear, To grub (E).

اتقلع الاعشاب المضرة من التربة .

### ١٨٣٧٣ - عُشْبَةٌ

Herbe (F), Herb, Grass, Wort (E).

العشبة ج . عشب وأعشاب . كل نبات رغو مومي الساق والارواق الدلالية .

### ١٨٣٧٤ - عُشْبَةُ الْأَبْرَاقِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

### ١٨٣٧٥ - عُشْبَةُ الْأَبْرَاقِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

### ١٨٣٧٦ - عُشْبَةُ الْبَرَاغِيثِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

### ١٨٣٧٧ - عُشْبَةُ الْبَلُورِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

### ١٨٣٧٨ - عُشْبَةُ الْبَوَاسِيرِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

### ١٨٣٧٩ - عُشْبَةُ الْبَوَاسِيرِ الْعَقْدَاءِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

### ١٨٣٨٠ - عُشْبَةُ الْبَيْكَارِ

٢٨٨٠ ميكرون

عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد

عينها كبريتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوسلها مزواني صغير . حبيبتها تماثل الكوسل شكلاً وقدماً . ظهراتها يرمي الشكل ، لاحت ، شارف . بطنها غروطي . قوامها مسنة الظنايب الخلفية || ثوبها الى الخططي الاضخم يملو شجج كسني في الرأس والكوسل والحجفة والظهران والقوقام . بطنها الى الخططي الاسمر || تألف حراج السديان والفصص . قوامها نسخ الارواق .

### ١٨٣٥٨ - عَسَوِيَّاتٌ

Issidae (S).

Issidés (F), Issidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغرية ، لاقياسة الشكل ، مستدلة التيطيط . رؤوسها غليظة ، محجمة المقدم . اعظامها ذرية مستدلة الطول . كوسلها صغرية ، شبه هربية الشكل ، جالسة القواعد . اجنحتها مشبكة ، ملونة ، لاحقة . بطونها غروطية الشوزن او ستانية . قوامها قوية ، مستطيلة ، ضليعة الظنايب الخلفية المسنة الخلفاجربية || اشهر اجناسها الموسس .

### ١٨٣٥٩ - عَسُوفٌ

Corsé (F).

نمت تعريفي توصف به البورغ الشديدة السورة .

### ١٨٣٦٠ - عَسُوبِيَّاتٌ

Eurytomidae (S).

Eurytomidés (F), Eurytomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة اجناسها وانواعها قليلة العدد منها النافعة التي تتطفل على الحشرات الضارة ومنها المانسة المؤذية التي تتطفل على النجيليات || حشراتا صغرية القد تطول من ٢ الى ٤ م . اجسامها مستطيلة . بطونها ضامرة . مرزاتها قصيرة . زرايتها الاخيرة مخرائية الشكل || اشهر انواعها يصوم النجيليات .

### ١٨٣٦١ - عَسِيلٌ

Verge de l'éléphant (F).

Verge of the elephant (E).

السيل : قصب الفيل ج . عسل .

### ١٨٣٦٢ - عَسِيمَةُ النَّبَعِ ، \* ، زَائِلَةُ النَّبَعِ

Pseudomonas tabaci (S), Feu sauvage, Feu rouge, Rouille brune (F), Wild fire, Wild fener (E).

وصم يكتيري فتاك سريع العدوى يمتري النبع في الماشات وفي الحقول || المائل الواسم يكتيري بقصبيية اسطوانية دقيقة ، طولها يراوح من ١٤٠ الى ٢٨٠ ميكرون عرضها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون تحمل في احد قلوبها ثلاث هديات سوية يراوح طولها من ٢٨٠ الى ٢٨٠٠ ميكرون || مظهره الخارجي ، على نصال الارواق ، يقع مستديرة لا قياسية الحجم تبلو صفراء اللون ثم تتحرف الى السرة وتنتهي باللباس || يكافح وقتاً يتطهر تربة الماشات ويتطهر البذار بحلول الفورمول او بحلول نيزرات القفصة المركز ١ / ١٠٠ على ان لا تفوق مدة نقع البذار في المحلول ١٥ دقيقة .

### ١٨٣٦٣ - عَسِيمَةُ مَزَوَانِيَّةٌ \*

Pseudomonas angulata (S), Maladie des taches anguleuses, Feu noir (F), Angular leaf spot, Black fire (E).

وصم يكتيري شديد البؤس قليل الانتشار يركب النبع في الحقل بعد دخوله في الدور الثاني من شامحه || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الحجم . مزوانية الشكل ، سوداء



عصبة النبع



عصبة مزوانية

اللون، خلية اللحم. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات. نصلها اهليلجي الشكل، سنن الحافة، خلي البشرة على صفحتيه. أزهارها عاجية اللون، أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

#### ١٨٣٩٥ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرَةِ \*

*Potentilla pulcherrima* (S). *Potentille superbe* (F). عشبة معمرة تتلوه من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها منتصب. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات. نصلها ابيض الصفعة السفلى، اغضر العليا. أزهارها الى الصغار الزاهي || أزهارها يستمر من تموز الى آب.

#### ١٨٣٩٦ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْفُضْيَةِ \*

*Potentilla argrophylla* (S). *Potentille argrophylla* (F). عشبة معمرة تتلوه من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها السفلى ثلاثية التركيب، ووريقاتها خلية البشرة، فضية اللون، ناعمة للمس. أزهارها صفراء اللون، قطرها يراوح من ٢ إلى ٤ سم. || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

#### ١٨٣٩٧ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَبِيرَةِ الزَّهَرِ

*Potentilla grandiflora* (S). *Potentille à grandes fleurs* (F). عشبة معمرة مبدولة تتلوه من ١٥ إلى ٤٠ سم. أوراقها مركبة ثلاثية. ووريقاتها مسننة الزام الثالث والرابع. أزهارها غنية التجميع، زنادها يحبل من زهرتين الى خمس كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة المابقة للامعة || أزهارها يستمر من تموز الى آب.

#### ١٨٣٩٨ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْلَيْفِيَّةِ

*Potentilla fruticosa* (S). *Potentille frutescente* (F). عشبة ليفية معمرة تتلوه نحو ١٠٠ سم. ساقها خلية اللحم طحلاء اللون. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات الاهليلجية الشكل. نصلها خلي البشرة، ناعم للمس، أزهارها ذخية اللون. أزهارها يستمر من حزيران الى آب.

#### ١٨٣٩٩ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُنْتَصِبَةِ

*Potentilla ambigua* (S). *Potentille ambiguë* (F). عشبة معمرة منبسطة الساق. أوراقها ثلاثية التركيب جامدة النصل. ووريقاتها الوسطى مستطيلة مسننة الزام الاخير. أزهارها فردية، طويلة الزناد، صفراء اللون. أزهارها يستمر طوال شهر حزيران.

#### ١٨٤٠٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُنْتَصِبَةِ

*Potentilla erecta* (S). *Potentille dressée* (F). عشبة معمرة زبابة تتلوه من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ووريقاتها خاسية مستطيلة، نصلها جامد الصفعة مغبر البشرة السفلى. أزهارها الى الصغار الكبريتي الزاهي || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٨٤٠١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْوَزْبَةِ \*

*Potentilla anserina* (S). *Potentille anserine*, *Herbe aux oies* (F).

عشبة طيبة معمرة مبدولة ترغب في المواقع الظليلة الرطبة. تتلوه من ١٥ إلى ٥٠ سم. ساقها منبسطة تفرش عند كل عقدة. أوراقها ثلاثية الصف المقابل. ووريقاتها تعد من ١٥ إلى ٣٥ نصلها خلي البشرة، فضي اللون. أزهارها كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصغار الكبريتي الباهت || أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

#### ١٨٣٨١ - عُشْبَةُ الْجَلِيدِ

هي الظهيرة البلورية، اطلبها.

#### ١٨٣٨٢ - عُشْبَةُ الْخَلِيلِيْنِ

هي الخليلون، اطلبها.

#### ١٨٣٨٣ - عُشْبَةُ الدِّبَاغِيْنِ

هي الدربل، اطلبها.

#### ١٨٣٨٤ - عُشْبَةُ السَّبْعِ

نبات من الدقة، اطلب كرد.

#### ١٨٣٨٥ - عُشْبَةُ الطَّحَالِ

هي الطوقرين الاسفر، اطلبها.

#### ١٨٣٨٦ - عُشْبَةُ الْعَلَقِ

هي الزغليلة، اطلبها.

#### ١٨٣٨٧ - عُشْبَةُ الْفَقْرَاءِ

هي حشيشة الفقراء، اطلبها.

#### ١٨٣٨٨ - عُشْبَةُ التَّمَلِّ

هي المائق الجبل، اطلبها.

#### ١٨٣٨٩ - عُشْبَةُ الْوَزْبَةِ

*Herbe aux écus* (F). عشبة يقال انها طيبة تدر البول. تدعى حشيشة القمر الحولية، اطلبها.

#### ١٨٣٩٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى ، بُونْتِيْلَا، بُونْتِيْلُونِ

*Potentilla* (S). *Potentille* (F). *Potentilla* (E).

جنس نباتات عشبية طيبة مدادة معمرة من الفروليات. انواعه عديدة. أوراقها مركبة، أزهارها مبدولة الزناد، مختلفة التجميع. مظهرها بري وتزييني وبعضها طيب يستعمل في عدة مستحضرات وعلاجات مقوية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

#### ١٨٣٩١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَبْيَضَةِ

*Potentilla speciosa* (S). *Potentille élégante* (F).

عشبة زغبية معمرة تتلوه من ١٠ إلى ٣٥ سم. أوراقها ثلاثية التركيب. ووريقاتها مغبرة النصل المسن الحافة، الاغضر الصفعة العليا، الخليلي السفلى الغضبية الملاج. أزهارها ثلاثية أو خاسية التجميع، متوسلة القند، يضاء اللون || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٨٣٩٢ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْبَيْضَاءِ \*

*Potentilla alba* (S). *Potentille blanche* (F).

عشبة معمرة جبلية مبدولة. ساقها تحيلة تتلوه نحو ٢٠ سم. أوراقها السفلى خاسية أو سباعية التركيب. ووريقاتها خلية النصل الناعم المسن الحافة. أزهارها نورية التجميع، طويلة الزناد، يتلونها برتقالية القاعدة والوسط، عاجية الاطراف || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار.

#### ١٨٣٩٣ - عُشْبَةُ الْقَوَى الدَّمَوِيَّةِ

*Potentilla acrosanguinea* (S). *Potentille rouge sang*, *P. sanguine* (F).

عشبة معمرة زغبية اغضاء تتلوه من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أزهارها مكسبة دموية اللون كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

#### ١٨٣٩٤ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّةِ \*

*Potentilla rupestris* (S). *Potentille des rochers* (F).

عشبة معمرة مبدولة تتلوه من ٣٠ إلى ٥٠ سم. توجد بين الصخور وعلى اطراف الاراضي الملاحاة. ساقها جرداء



عشبة القوي البيضاء



عشبة القوي الصخرية



عشبة القوي الفاخرة



عشبة القوي الغضبية



عشبة القوي الوزبة



## ١٨٤٠٢ - عُشْبَةُ الْمِسْك \* ، أدوكسا

*Adoxa moschatellina* (S). Adoxe, Herbe au musc, Moscatelle (F). Hollow-root, Moschatel, Musk-root (E). Echtes Bisamkraut, Moschus-Kraut (D). Erba del muschio, Muscatella (I).

نبات عشبي طوي جلومري وحيد الجلس والنوع من فصيلة الفويات ، أوراقه قرصية الانتشاب ، مركبة ، مستطيلة المالحيل المنصبة ، ثلاثية الفصوص ، نصلها مفرد الصفحة الخلفية البثرة . أزهاره نورية التجميع مستطيلة الزناد ، خاسية البتلات الوردية اللون || جلومره وأوراقه وأزهاره فواحة الرائحة العطرية المسكية وهي طيبة جزيلة الشفع مضادة للقتلش .

## ١٨٤٠٣ - عُشْبَةُ الْمَن \* ، Glyceria (S), Glycérie (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . أنواعه نحو ٣٠ نوعاً منتصبه جبهة تنهي بمناكل سنبلية . أوراقها عصفية الشكل كآرأقار الخططة . منها أنواع علفية مزروعة غنية بالمواد التسوية ومنها أنواع منتصبه يألفها لمن السال الذي يغشى سنانها عند انتصاف النهار في آخر أيام الصيف فيترك عليها مادة لزجة سكرية العلم مأكولة .

## ١٨٤٠٤ - عُشْبَةُ الْهِنْد في السبجل الطبي ، اطلبه .

## ١٨٤٠٥ - عُشْبَةُ بَرِّيَّة في الارالاه العاربه ، اطلبه .

## ١٨٤٠٦ - عُشْبَةُ حَمْرَاه في ابو غلام ، اطلبه .

## ١٨٤٠٧ - عُشْبَةُ مَقْدَسَة في القيسين ، اطلبه .

## ١٨٤٠٨ - عُشْبَةُ هِنْدِيَّة في الزيان ، اطلبه .

## ١٨٤٠٩ - عُشْبِي ، حَشِيصِي (F). Herbaceous (E).

تمت تعريفي يطلق على النباتات ذات السوق الية التي تكون صلابها دون صلابه النباتات الليفية .

## ١٨٤١٠ - عُشَّة

الشج : الشجرة البقية القضايا المنقرضة .

## ١٨٤١١ - عُشْتَار \* ، Astarta (S).

## Astarte, Astarté (F). Astarte (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات تصفحيات الخياشيم وقصيلة المشاريات . أنواعها المعروفة ٢٠ منها الفائرة والماصرة . الماصرة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة || اصداؤها صنية ، يكثر فيها الشكل السيولي . مصاريها متساوية الاطراف ، دقيقة التنسين الحتاري ، ويلوها تحزيز طولي نحيل يستمر حتى الفتة . ثنائيا ثنائيا طليقة ، مستطيلة الوهايا زاهرة ، يكثر فيها الاحمر والوردي || تعيش مغموة في الروال المعمرة بالماء .

## ١٨٤١٢ - عُشْتَارِيَّات \* ، Astartidae (S).

## Astartidæ (F). Astartidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات تصفحيات الخياشيم . اجناسها وازواعها قليلة العدد ، منها الفائرة التي تمتد متحمراتها من الاراضي السيلورية الى الثالثة ومنها الماصرة المنتشرة في جميع بحار البلاد الباردة || اصداؤها صنية الجسم ، صيلوانية الشكل ، متساوية المصاريم ، دقيقة التنسين الحتاري || اعرف اجناسها واشهرها المشتار .

## ١٨٤١٣ - عُشْتَرَّة \* ، Dianella (S).

## Dianelle (F). Dianella (E).

جنس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الزنبقيات . منها نباتية وبعض مناطق استرالية . اروبها زائدية . أوراقها متعاقبة ، ثنائية الصف ، خيطية الشكل ، ايضة ، دائمة الاخضرار . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها متعاقبة الحجم ، سداسية البتلات النبطية التجميع الشكل ، التينية العروق . سداسية الاسدية المنصبة الاطراف || تزود للزئين . قرب في الاتربة المتوسطة الاندماج الالوانة المناسر الذائبة واللصوية || اشهر انواعها المعروفة الاربية التالية :

## ١٨٤١٤ - عُشْتَرَّة تَسْمَانِيَّة \* ،

## Dianella tasmanica (S). Dianelle de Tasmanie (F).

نوع من العشتره . منها جزيرة تسمانية . تملو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها تطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، كبير القد ، كثير الفروع والشعب . ازهارها الى الزرقه الزاوية . ثمارها عنبية ، زرقاء اللون ، متدلية || تنويرها صفي .

## ١٨٤١٥ - عُشْتَرَّة زَرْقَاء \* ، Dianella caerulea (S).

## Dianelle bleue (F).

نوع من العشتره . منها بعض مناطق استرالية . تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . أوراقها كثيرة العدد . عصفية الشكل ، تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٨ سم . ازهارها عشكولي التجميع قليل الانفرج ، قصير الفروع . ازهارها الى الزرقه العالقة الجسدية . ثمارها عنبية متدلية || تنويرها يستمر من اذار الى حزيران .

## ١٨٤١٦ - عُشْتَرَّة صَقِيلَة الْوَرَق \* ،

## Dianella laevis (S). Dianelle à feuilles lisses (F).

نوع من العشتره . منها بعض مناطق استرالية . تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها عصفية الشكل ، صقيلة النصل ، شديدة الخضار ، تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٨ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، هري الشكل . ازهارها الى الزرقه السانجوية . ثمارها عنبية ، ليلكية اللون ، متدلية || تنويرها ديبعي .

## ١٨٤١٧ - عُشْتَرَّة مُلْتَقَّة الْوَرَق \* ،

## Dianella revoluta (S).

## Dianelle à feuilles enroulées (F).

نوع من العشتره . منها استرالية . تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . أوراقها عصفية الشكل ، جامدة التسج ، مالة الخفاف ، ملتفة ، تطول من ٧٠ الى ٨٠ سم . وتعرض من ٦ الى ٨ سم . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها الى الزرقه السايوية . ثمارها عنبية زرقاء اللون || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ١٨٤١٨ - عُشْد \* ، Séquille (F).

## Gang, Crew, Set (E).

الشد ما يحل بالانسان من علة سبها مرض اصابه او عالجها جراحية أجريت له .

## ١٨٤١٩ - عُشْر

هو جزء من شرة يقطع من انتاج الارض ويدفع الى ولي الامر غريبة عن الارض .



عشبة المسك



عشبة المن



عشتره تسمانية

الزهرية رجلة مستطيلة || ازهارها يستمر من آب ال  
تشرين .

١٨٤٢٨ - **عَشَقَّة مَبْدُولَة \*** ، **قُسُوس مُسَلَكِي**  
Hedera helix (S). Lierre commun (F). Hedera, common ivy (E). Gemeiner Efeu, Efeu (D). Edera, Ellera, Verna, Verola, Vite nera (I).

جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٢ الى ٣ م .  
اوراقها لا قياسية الشكل يظل لها الالاجلي . مالحق  
ازهارها واحبا خلية البشرة طلاء اللون . ثمارها نووية  
تجمل ال السرة العاقبة || ازهارها يستمر من ايلول ال  
تشرين .

١٨٤٢٩ - **عَشُوف** .  
Arbre sec (F). Dry tree (E).  
العشوف هو الشجرة اليابسة .

١٨٤٣٠ - **عَشْرِفَيَات ٥** .  
Pyrénomycètes (F).  
فصيلة فطور مجهرية تنتمي ال مرتبة الفسيقيات ورتبة  
الزقيات تتميز بم جان من التكاثر او بالتناوب بوغ  
واحد من الزق وذلك بعد تمام ادراكه . اما اصناسها  
بسيطة وقد تكون فردية او مركبة || اجناسها وانواعها  
عديدة يجدها ثلاث عائل وهي السخايات والسناخيات  
والبيبايات .

١٨٤٣١ - **عَشِير** .  
Cri de l'hyène (F).  
الشير : صوت الضبع .  
Cry of the hyena (E).

١٨٤٣٢ - **عَشِيق \*** .  
Agapornis (S).  
Agapornis, Inséparable (F). Love-birds (E).  
طائر وحيد الجنس والنوع من زعانف الببغاوات . موطنه  
يشمل جميع مناطق افريقية الوسطى وجزيرة مدغسكر ||  
يألف القفص لكنه لا يعيش الا ذكرا واثي . تربيته  
منتشرة في جميع اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة لانه  
يخشى البرد || جسمه صغير القد ، ذلق الذنب والجناح ،  
مفاد عريض وقصير . ثوبه جميل الالوان المتراكبة فيه  
الاسمر والاخضر والاصفر || قوته الدخن والقنبر والمفوف  
والنس والثار الناصجة || الانثى تشبهها في تجويف  
جلع . حشيتها تراوح من ٣ الى ٤ بيضات ترخها نحو  
١٥ يوما .

١٨٤٣٣ - **عَصَا الذهب** . هو قصب الذهب ، اطله .

١٨٤٣٤ - **عَصَا الراعي** .  
Houlette (F). Crook (E).  
مصا رأسها أجوف كالملقعة يستعملها الراعي لقتل الحجارة .

١٨٤٣٥ - **عَصَا الراعي** .  
هي القرد نبات بري وتربي ، اطله .

١٨٤٣٦ - **عَصَا الراعي الزَبَاء** . هي الدار ، اطله .

١٨٤٣٧ - **عَصَا هِرْمِس** . هي الحلوب ، اطله .

١٨٤٣٨ - **عَصَا يعقوب** . هو القيتوم السبيلة ، اطله .

١٨٤٣٩ - **عُصَاب ، مَسْوَكَ الرَّاعِي ، شِبْرَج**  
Lepidium (S). Passerage (F). Dittender (E). Senf-  
kraut (D). Lepidio, Peperella (I).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الصليبيات .

١٨٤٢٠ - **عُشْر** .  
Calotropis (S).  
Calotrope, Calotropis (F). French cotton, Mudar  
plant (E). Wahre mudarplanze (D). Calotropis (I).  
جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الصقلابيات . انواعه  
عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنات . لحاء جذورها  
مقوية ومروقة . اصلاها الجزيرة وبعض المناطق الاسيوية  
والارافقية الحارة || جاء عنه في القاموس : « العشر  
شجر فيه حراق لم يفتتح الناس في اجد منه ويحش في  
الحاد ويخرج من زهره وشبهه سكر وفيه مرارة » . وقال  
ابو حنيفة : « العشر من العشاء وهو من كبار الشجر  
وله صمغ حلو وهو عريض الورق صمدا في السماء وله  
سكر يخرج من شبيه وموضع زهره » . وفي الصحاح :  
« وثمرته نقاعة كنفاعة القناد الاصفر » || الواحدة  
عشرة والجمع عشر وعشرات .

١٨٤٢١ - **عُشْرَق** . يعرف بابي سلام ، اطله .

١٨٤٢٢ - **عُشْرَكَة ٥** .  
Préfoliation, Vernation (F).  
Vernation (E).  
هي الترتيب القمعي اي انتظام الاوراق داخل البرعة  
الورقية .

١٨٤٢٣ - **عُشْرِفَيَات ٥** .  
Circaceae (S).  
Circécées (F). Circaceae (E).  
فصيلة نباتية ، كانوا يصنفونها في التصنيف السابق  
كسب من فصيلة الاسدييات ، وهي من ذوات الفلقتين  
عديدة العائلات . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٣٦ ||  
نباتاتها عشبية ، منها الحولية والمعملة والممررة ، اصلاها  
بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . اوراقها بسيطة ،  
متقابلة او متناوبة . ازهارها خضوية رباعية المدور .  
ازهارها سبيل التجميع ، تاجي الارتكاز .

١٨٤٢٤ - **عُشْرِي** .  
Décimal (F). Decimal (E).  
نعت تعريفي يطلق على القياسات والحسابات المرتكزة على  
عشرة .

١٨٤٢٥ - **عَشَقَة** .  
Hedera (S). Lierre (F). Ivy (E).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاراليات . انواعها نحو  
٦٠ جميعها ليفة عشوية عازلة الخشوية . معظمها بري  
وبعضها زراعي تربي . سوقها تنسقل بواسطة افطارها .  
اوراقها متناوبة معتقة جلدية النصل ايده . ازهارها عتودي  
التجميع عتودي او ابلي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد  
بيضاء اللون || اوراقها طيبة ويستخرج من سوقها عصارة  
صمغية مقوية وهيجية || اشهر انواعها التريينية ما لي .

١٨٤٢٦ - **عَشَقَة كَلْشِيد** .  
Hedera colchica (S).  
Lierre de Colchide (F).  
جنية جادسة ليفة متسلقة تطول من ٥ الى ٢٥ م . اوراقها  
ثلاثية او خاسية التفصيص ، نصلها يطول نحو ١٢ سم .  
ويعرض نحو ١٠ مالحق ازهارها واحبا كثيفة الحراشف  
الاصفر اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٤٢٧ - **عَشَقَة كَنَارِيَة** .  
Hedera canariensis (S). Lierre des Canaries (F).  
جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٣ الى ١٥ م .  
اوراقها ثلاثية او خاسية التفصيص ، كبيرة القد ، ثلجية  
الشكل تعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . مالحق ازهارها واحبا  
حراشفية السواء ، نجمة الحراشف الطلاء اللون . عناقيدها



عشقة مبدولة



عشيق

## ١٨٤٤٧ - عُصَابَةُ مَعِدِيَّة

Suc gastrique (F).

Gastric Juice (E).

سائل حامضي التركيب ، يحوي بعض الصفات والكولوريدات القلوية والمضغوتات ، يفرزه غشاء المعدة ، يصلح خاصة لحضم المواد الآحية .



عصاب عريض الورق

## ١٨٤٤٨ - عُصَابَةُ مِعْرِيَّة

Suc intestinal (F).

Intestinal Juice (E).

سائل حامضي التركيب وظيفته متماثلة عمل العصارة المعدية في هضم الطعام واستخلاص مواده الغذائية .

## ١٨٤٤٩ - عُصَابَةُ نَوَوِيَّة

Suc nucléaire (F).

Nuclear sap (E).

راجع سائل نووي .

## ١٨٤٥٠ - عُصَابَةُ

Bailles, Ecales (F). Shell, Pod (E).

هي مجموع الصفات والعصيات التي تنفصل عن الحب عند الدراس .



عصاة منجزة

## ١٨٤٥١ - عُصَابَةُ

Osphys (S).

Osphy (F). Osphys (E).

جنس حشرات من فصيلة التهرقيات رتبة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة تسعة منتشرة في جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسادها مستطلة الشكل ، معتدلة التسطيط ، تطول من ٦ الى ٩ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاطراف . عينها بارزة . انثراها متوسطة القند . ملابسها الفكية كبيرة . قرونها استثمارية غيبية ، سنية . كواسلها مقببة الشكل . بطونها مستديرة الممتلئة . اعحامها تلحف البطن باستثناء الطرف المستدير . قوائمها نشيطة . تتميز بانفاذ قوائمها الخلفية البالغة الضخامة . اثارها ملونة || الحشرة الجملانة واسعة وشاحنة . اما البرقة فشكارا و فاجحة .



عصاة

## ١٨٤٥٢ - عُصَابِي

Scare pourpré (F).

سكة بحرية تدعى درة البحر ، احلها .

## ١٨٤٥٣ - عُصَابُ

Ceblypyris (S).

Céblépyris, Echenilleur (F). Ceblypyris (E).

جنس طير من الجوائم وفصيلة المنفايات . هذه بعض مناطق البلاد الافريقية . انواعها قليلة العدد . قوته الحشرات ، اعصها الاساريج والبرقات ولا يصف عن الثار التناضجة من برية وزراعية || جسمه متوسط القند . ذنبه رتاجي الريش المستطيل ، الفارق الطرف . بعض ارياش افيجي جامدة التركيب مدببة الاطراف الشاككة || ثوبه متباين اللون . رأسه احمر . حشره الى السمرة الباقية . سباله اسود . ظهوره الى الربعة الحنطية المواج . جناحه الى السوداء الاسفم . صدره وبعطه ومؤخر ظهره وقاعدة ذنبه الى الربعة الحنطية المؤشمة بالاسود || يدان عته في الاشجار الرقيقة . الاثنى تحضن نحو اربع بيضات تريحها ينثر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الاثنى دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .



عصا

## ١٨٤٥٤ - عُصَابَةُ

Immunologie (F).

Immunology (E).

علم يبحث في مقاومة الجهاز العضوي الحي لتلذيات الاوصام المختلفة .

## ١٨٤٥٥ - عُصَابِي

Immunologique (F).

Immunologic (E).

نعت ترميضي يطلق عل ما هو مختص بالعصاة .

انواعه نحو ٧٠ اعطائها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . جلودها وشية مدادة . سوطها دقيقة منتصبة . اوراقها معتقة ، متناقية ، تصلها سبك الصفحة ، سرح البشرة . ازهارها عتكرلي التجميع ، طري الاثران . اذعارها صغيرة القند بيضاء اللون او صفراء . ثمارها غريدلية . اشهر انواعه العصاب العريض الورق .

## ١٨٤٤٠ - عُصَابُ عَرِيضِ الْوَرَقِ \*

Lepidium latifolium (S). Grande passerage, Moutarde des anglais, Cresson à arges feuilles (F). Pepperwort, Green mustard (E). Pfefferkresse (D). Lepidio Ibride, Erba mostarda (I).

نوع من العصاب وهو عشية برية طيبة معمة مبلولة في الاساكن الظليلة المشية . ساقها تلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها قلبية الشكل . اذعارها صفراء اللون . منافها الطيبة كثيرة وهي مفادة لداء الحفر ويقال انها تنفي من الكلب .

## ١٨٤٤١ - عُصَابَةُ ، حَوْتِ

Heterodon (S).

Hétéron (F). Heterodon (E).

جنس حيات بيوضة من فصيلة الحنثيات عادات الاخايد والسموم . انواعها المعروفة نحو عشرة . اعطائها بعض المناطق الحارة من الماكن القديم والجديد . جميعها صغير القند اطولها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . اثارها ملونة و مبلقة او جذعة بالاسود والجووي والاحمر . رؤوسها شبه مخروطية الشكل ، رقيقة اطرافها . اذنها مستطلة الاطراف || قوتها الحشرات والورديات والصفادع والظناب والقران والمصافير ويبيضها || اعرف انواعها واشهرها العصاة النتجة .

## ١٨٤٤٢ - عُصَابَةُ مُنَوَّجَةُ \* ، حَوْتِ مُنَوَّج

Heterodon diadema (S). Hétéron diadème (F).

نوع من العصاة . موطنها بلاد الجزائر والمغرب . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات والورديات والظناب والقران || جسمها يطول نحو ٥٠ سم . رأسها شبه مخروطي الشكل . ربيع الخطم . عينها صغيرتان ، ماحتان . ثوبها الى الصبغة يعلوها تصبب اسود يمتد من الرأس الى طرف الذنب . عصبه رأسها تمتد الى الجبهة فينبو كالتاج . يطها الى السمرة الحنطية || تعتبر من الحيات المفيدة الاثوذية .

## ١٨٤٤٣ - عُصَادَةُ ، قَرَابَةُ

Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

طريقة اصطفا خاصة باصلاح النسل او بتثبيت بعض الصفات المميزة قولها تساهل الاقارب المنتجة دون مراعاة درجات التنب .

## ١٨٤٤٤ - عُصَابَةُ

Jus (F). Juice (E).

ما عصر من الثار ويخلط الاعضاء النباتية .

## ١٨٤٤٥ - عُصَابَةُ التَبِغِ

Jus de tabac (F).

Juice of tobacco (E).

نقع اوراق التبغ وهو غني بمادة التيكوتين المنصر القلوي النقال في التبغ . يستعمل في مكانة الحشرات اعصها الارق .

## ١٨٤٤٦ - عُصَابَةُ خِلَبِيَّة

Suc cellulaire (F).

Cell-sap (E).

Plante volubile (F). **عَصْبَة ، عَصْفَة** - ١٨٤٧٣

Volubile plant, Twining plant (E).

كل نبات عارض يلتف على غيره .

١٨٤٧٤ - **عَصْبَة السُّوس** هي النشم ، اطبله .

١٨٤٧٥ - **عَصْبَة التَّلَب**

هي الموقاريقون المعروف ، اطبله .

١٨٤٧٦ - **عَصَبِيَّاتُ الْجَنَاح** Neuroptera (S).

Névroptéroïdes. Névroptères (F). Neuroptera (E) Netzflügler (D).

طريقة حشرات من شعبة الحسدليات تشمل ثلاث رتب وهي سادات الاجنحة وشافات الاجنحة وشبكيات الاجنحة . اما فصائلها وابناسها وانواعها فكبيرة العدد جميعها من الحشرات النافعة || تحليتها : حشرات تامة التطور بجنحة ، اجنحتها غشائية متشابهة . رؤوسها وزئامها كبيرة القد . اضلاعها قارضة . ارساغها خماسية العقول . ملاسها الترحية جذعة . برقاها مفرطة قوة التأثير .

١٨٤٧٧ - **عَصْبِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ** Névroptère (F).

Neuropteral (E). هي كل حشرة تنتمي الى طبقة عصبيات الجناح .

١٨٤٧٨ - **عَصْد** Sperme animal (F).

Animal sperm (E).

المصد هو السليغ اي افراز الغدد التناسلية عند ذكور الحيوان .

١٨٤٧٩ - **عَصْر ، عَصْرَار**

Expression, Pressurage (F). Expression, Pressing (E). هو كبس الشيء لاستنزاف عصارة .

١٨٤٨٠ - **عَصْر** Epoque, Période (F).

Epoch, Period (E). أحد من الزمن .

١٨٤٨١ - **عَصْرُ الْجَلِيد** Période glaciaire (F).

Ice age (E).

١٨٤٨٢ - **عَصْرُ الْعَنْب** Foulage (F). Fulling (E).

حقن العنب واستخراج عصارتها . ومنهم من قال هرس العنب .

١٨٤٨٣ - **عَصْرُ حَجَرِيّ** Age paléolithique,

A. de la pierre taillée (F). Palaeolithic age (E). هو الدور الطراني ، اطبله .

١٨٤٨٤ - **عَصْفُوس ، عَصْفُوس** Coccyx

طرف الذنب وقد شاع اسناده الى طرف آية النعم . ج عصافوس .

١٨٤٨٥ - **عَصْف ، قَرْف** Ecimage (F).

Topping, Pollarding (E).

اقتطاع بعض فتن النبات انصها الفتن الحامية . وعندما تكون الفاية من المصق اقتطاع الانزهار فهو الحصى .

١٨٤٨٦ - **عَصْفَة** Pame (F). Blade (E).

ورقة الزرع وبمظم النباتات التجيلية . ج عصف .

١٨٤٨٧ - **عَصْفَةُ الْخَمَرِ** Bouquet (F). Aroma (E).

ريح الخمر . يقال ان الخمر عصفقة مستمجة .

١٨٤٥٦ - **عَصَب** Nerf (F). Nerve (E).

هو الوحدة التي يتكون منها الجهاز العصبي في الجسم الحيواني . وظيفته تنظيم وتكبير عمليات الجسم والسيطرة عليها واخضاعها الى مختلف احساساته . ج أعصاب .

١٨٤٥٧ - **عَصَب** Nervure secondaire (F).

Secondary nerve (E).

هو في اوراق النبات الوعاء القسني الواصل ما بين العرق والثريران . اما ترتيب اوعية الورقة فهو غليظ وعروق وعصب وثريران || والعصب في روائش بعض الحشرات يحتل المرتبة الثانية بعد العروق .

١٨٤٥٨ - **عَصَب**

العصب غيم احر تراه في الاقن عند مغيب الشمس . يقال عصب الاقن اي احر .

١٨٤٥٩ - **عَصَب** راجع اسطرافالوس نوارس .

١٨٤٦٠ - **عَصَب** Bistournage (F). Castration (E).

طريقة في الحصاد تقتل فيها حيال الحمى ولا تسئل فتضر وتتلأثي .

١٨٤٦١ - **عَصَبُ بَصَرِيّ** Nerf ophtalmique (F).

Ophthalmic nerve (E). هو العصب المختص بالبصر .

١٨٤٦٢ - **عَصَبُ حَرَكِيّ** Nerf moteur (F).

Motor nerve (E). كل عصب اختصاصه الحركة .

١٨٤٦٣ - **عَصَبُ حِسِّيّ** Nerf sensoriel (F).

Sensory nerve (E). هو العصب الذي ينتمي الى جهاز الحس .

١٨٤٦٤ - **عَصَبُ حَنَجَرِيّ** Nerf laryngé,

N. laryngien (F). Laryngeal nerve (E).

كل عصب نحاس بالحنجرة .

١٨٤٦٥ - **عَصَبُ رِئَوِيّ** Nerf pulmonaire (F).

Pulmonary nerve (E). العصب المرتبط بالرئة .

١٨٤٦٦ - **عَصَبُ سَمْعِيّ** Nerf acoustique (F).

Acoustic nerve (E). العصب الخاص بجهاز السمع .

١٨٤٦٧ - **عَصَبُ سَنَحِيّ ، عَصَبُ نُحْرُوِيّ**

Nerf alvéolaire (F). Alveolar nerve (E).

العصب الخاص بنخاريب الانسان .

١٨٤٦٨ - **عَصَبُ شَمِيّ** Nerf olfactif (F).

Olfactory nerve (E). العصب الخاص بحاسة الشم .

١٨٤٦٩ - **عَصَبُ عَصْدِيّ** Nerf brachial (F).

Brachial nerve (E). العصب الخاص بالعضد .

١٨٤٧٠ - **عَصَبُ قِحْفِيّ ، عَصَبُ مُخِيّ**

Nerf crânien (F). Cranial nerve (E).

العصب الخاص بالجسمجمة .

١٨٤٧١ - **عَصَبُ مُبْعِد** Nerf abducteur (F).

Abducent nerve (E). كل عصب اختصاصه الأبعاد .

١٨٤٧٢ - **عَصَبُ نَظَرِيّ** Nerf optique (F).

Optic nerve (E). العصب المختص بالعين .

١٨٤٩٩ - عَصَلٌ Uriner (F). To urinate (E).  
عسل الكلب والذئب والتعلب : بال .

١٨٥٠٠ - عَصَلٌ Rhododendron (S).  
Rosage, Rhododendron (F). Rhododendron (E).  
Rosebaum (D). Rododendro (I).

جنس نباتات معمرة برية و تزيينية من فصيلة الخنجيليات.  
انواعها المعروفة نحو ١٧٠ منها الانجار والشجيرات والجنات.  
اوراقها معتقة جلدية النصل . ازهارها خمسية البتلات  
بارزة الاسدية الشفوية التجميع الكثرية المدد . واحدها  
عصلة || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع .

١٨٥٠١ - عَصَلَةٌ أَفْغَانِيَّةٌ

Rhododendron collectianum (S). Rosage de l'Afghanistan (F).

جنية سر بوتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها  
نشيطه قوية . اوراقها سنانية تطول من ٨ الى ٨ سم .  
نصلها خالي الصفحة السفلى الطحلاء اللون . نوربها خمسية  
الشكل عديدة الازهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٢  
و ٣ سم . بتلاتها خلية البترة ، بيضاء اللون . اوراقها  
عطرية الرائحة عند الفكك || ازهارها يستمر طوال شهر  
ايار .

١٨٥٠٢ - عَصَلَةُ الشَّرْقِ \* ، غَار شَيْخِي ، بِقَيْلٌ  
Rhododendron ponticum (S). Rosage d'Orient (F).

جنية سر بوتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها  
سنانية ، ضيقة ، ذرية ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها اخضر  
اللون المايق اسفح الموج . نوربها تضم من ٣ الى ٥ ازهار  
قطر الواحدة منها براوح بين ٦ و ٦ سم . لونها الى  
البنفسجي يعلو قوتم اسمر || ازهارها يستمر من ايار  
الى حزيران .

١٨٥٠٣ - عَصَلَةُ الْيَنَانِ

Rhododendron yunnanense (S). Rosage du Yunnan (F).

جنية سر بوتية متوسطة القفد تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها  
اهليجية الشكل خفيفة الزام الاخضر الذلق المذهب ؛ نصلها  
يطول من ٦ الى ١٠ سم . تملو حلة من الملب الجامد .  
نوربها تضم من ٥ الى ١٥ زهرة قطر الواحدة منها نحو  
٥ سم . لونها الى البياض الساطع تملو مشعة وريدة ورقشة  
حراء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥٠٤ - عَصَلَةٌ بَاهِرَةٌ

Rhododendron fulgens (S). Rosage éclatant (F).

شجيرة سر بوتية كبيرة القفد تملو من ٣ الى ٦ اشرار . ساقها  
فراءه فناء . اوراقها بيضيه الشكل ؛ نصلها يطول نحو  
١٢ سم . صفحته العليا اخضره اللون ماله اما السفلى  
فحنطية غدية وقلبية . نوربها تضم من ١٥ الى ٢٠ زهرة  
اريجوانية اللون ، زاهية الموج ، صغيرة القفد || ازهارها  
يستمر طوال شهر ايار .

١٨٥٠٥ - عَصَلَةٌ بَحْرِيَّةٌ الْوَن

Rhododendron hypoglucum (S). Rosage glauque (F).  
جنية سر بوتية جميلة الشكل تملو نحو ٣٠٠ سم . ساقها  
وفروعها قليلة الزغب . اوراقها اهليجية تطول من ٥ الى  
٧ سم . نصلها جامد الصفحة ، اسمر البترة ، مجري  
الخضار . نوربها صيوانية الشكل تضم من ١٠ الى ١٦  
زهرة متوسطة القفد لونها الى البياض الساجي تملو نمشة  
سراء || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

١٨٤٨٨ - عُصْفُورٌ هو فرط الصباحين ، اطليه .

١٨٤٨٩ - عُصْفُورٌ Oiseau (F). Bird (E).

قال حزة : سمى عصفورا لانه عصى وفر . والعصفور اسم  
شامل لجميع الطيور الصغيرة القفد . الاثنى عصفورة والجمع  
عصافير . قال الشاعر :

« كعصفورة في كت لفل يسومها

حياض الردى والفل يلهو ويلعب »

١٨٤٩٠ - عُصْفُورُ الْبَيْنِ

Bec-figue (F).  
اسم شائع يطلق على بعض العصافير من آكلات البين  
كأبي قلنسوة وغيره .

١٨٤٩١ - عُصْفُورُ الْجَنَّةِ هو الخفاف ، اطليه .

١٨٤٩٢ - عُصْفُورُ الشُّوْكَ

Prunella (S).  
Accenteur (F). Accentor (E).

جنس عصافير صغيرة القفد من الجواثم . انواعه قليلة المدد  
اثوابها الى الطلحة تغير وتسمر وزهره وتبقى مع مختلف  
الانواع . اعتاقها نمشة بالابيض . اجنحتها موشة  
بالاسمر . مناقيرها دقيقة قوية . ارساها حنطية الجلد .  
قوتها الحشرات والهورم والبرور البرية || اعرف انواعه  
واشهرها ما يلي .

١٨٤٩٣ - عُصْفُورُ الشُّوْكَ الْجَبَلِيِّ \*

Prunella collaris (S). Accenteur alpin, Pégot (F).

طائر آبد طولُه نحو ١٨ سم . يستمر بتجديع جناحه وبياض  
عنه وطرف ذنبه . يألف الجبال . قوته الحشرات والهورم  
والناتك والليدان والآبار النووية الحرجية وبرور البتات  
البرية اصغها الشوك || يفتن في الارض وبين تخاليف  
الصخور . الاثنى تضم من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين  
في السنة تحضنها بمرابة الذكر من ١٢ الى ١٤ يوما .

١٨٤٩٤ - عُصْفُورُ الشُّوْكَ الصَّغِيرِ \*

Prunella modularis (S). Accenteur moucheté, Ac. mouchet, Mouchet chanteur, Trainee-bulison (F).  
Hedge-sparrow (E).

طائر آبد طولُه نحو ١٥ سم . ثوبه عادم البياض تملو  
مشعة صناعية وتفتح اسمر . يألف الحدائق والادغال  
والساجيات واحراج الصنوبر والتوب . قوته الحشرات  
على اختلافها والبرور البرية والزراعية || يفتن في  
الادغال والنجار الفناء . الاثنى تضع من ٥ الى ٦ بيضات  
على مرتين في السنة المرة الاولى في ايار والثانية في تموز .  
الحضن يدوم من ١٢ الى ١٤ يوما وقد يشترك فيه الذكر .

١٨٤٩٥ - عُصْفُورُ قَارِيٍّ

Oiseau-souris (F).  
طائر يدعى الحُتْرُ ، اطليه .

١٨٤٩٦ - عُصْفُورُ مَائِيٍّ

Oiseau-diamant (F).  
طائر من فصيلة السرديات يدعى رقتش ، اطليه .

١٨٤٩٧ - عُصْفُورٌ

Organe copulateur (F).  
Copulatory organ (E).

شوار ذكر كل حشرة مجنحة واصغها الجراد .

١٨٤٩٨ - عَصَلٌ

Scorpioide (F). Scorpoid (E).  
نمت تعريفه يعلق على ما كان شكله شكل ذنب العقرب  
بالالتواء والحنجمن .



عصفور الشوك الجبلي



عصفور الشوك الصغير



عصلة الشرق

من ٣ الى ٤ سم. صفحته العليا لمساء البشرة غضراء اللون . صفحته السفلى خالية ، فلسية ، غبراء المواجه . نوربًا غيمية الشكل عديدة الازهار الصغيرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. لونبًا الى اليباض الناصع || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

#### ١٨٥١٣ - عَصَلَة صَفْرَاء

*Rhododendron lutescens* (S). Rosage jaunâtre (F). جنبة صغرية القذ تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة اوراقها سنائية ذرية . نصلها يطول نحو ٦ سم. صفحته السفلى طحلاء اللون ذهبي الحراشف الميمرة . نوربًا تقص من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونبًا الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر من شباط الى اذار .

#### ١٨٥١٤ - عَصَلَة صَوْبِيَّة الزَّعْب

*Rhododendron lanatum* (S). Rosage laineux (F). شجيرة سرويتية تملو من ٣ الى ٦ اثمار . ساقها وفروعها واثانها كثيفة الزغب المستطيل الصوفي الشكل . اوراقها اعليجية مقطوعة . نصلها يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وهو خلى البشرة على صفحته . نوربًا تقص من ٦ الى ١٠ اثمار لونبًا الى الصفار الباهت تملو بمشة حراء . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٨٥١٥ - عَصَلَة عَطْرِية

*Rhododendron fragrans* (S). Rosage parfumé (F). بجلة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة . اوراقها صغرية اعليجية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، اسمر السفلى الفلسية الحراشف . نوربًا طقية تقص من ١٢ الى ١٥ اذرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. عرفها مستحب الرائحة لونبًا الى الصفار الباهت || ازهارها يقوم طوال شهر نيسان .

#### ١٨٥١٦ - عَصَلَة قَاحِرَة \*

*Rhododendron calophyllum* (S). Rosage superbe (F). شجيرة سرويتية بجلة الشكل المردني المقطوم . تملو من ٨ الى ١٥ م. عروقها واثانها سرسة . اوراقها سنائية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى ، زغبي ليد التججيع ، اصفر اللون . نوربًا تقص من ٥ الى ٧ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم. لونبًا الى الحمرة القاتية الزاهية || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

#### ١٨٥١٧ - عَصَلَة كَرْوَلِينِيَّة

*Rhododendron carolinianum* (S). Rosage de la Caroline (F). جنبة سرويتية متوسطة القذ تملو من ١٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها غمرولية الشكل قصيرة البقعة المندية . نصلها يطول من ٥ الى ٧ سم. صفحته السفلى خالية البشرة طحلاء اللون . نوربًا تقص من ٣ الى ٥ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونبًا الى الوردى اللامع المواجه || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٥١٨ - عَصَلَة كَلِيفُورِنِيَّة

*Rhododendron californicum* (S). Rosage de Californie (F). جنبة سَبْرُوتِيَّة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها سنائية ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. نصلها اسمر الصفحة

#### ١٨٥١٦ - عَصَلَة جَرَسِيَّة

*Rhododendron campanulatum* (S). Rosage campanulé (F). شجيرة جاحدة تملو من ٤ الى ٥ اثمار . اوراقها يضيبة الشكل مستديرة الطولين . نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم. وهو اغضر الصفحة العليا احمل السفلى . نوربًا كبيرة القذ ، كثيرة الازهار الجرسية . قطر الواحدة منها يراوح بين ٢ و ٣ سم. لونبًا الى الالباض يملو موجه ليكي وستار اخضر || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٨٥١٧ - عَصَلَة خَمَلِيَّة

*Rhododendron villosum* (S). Rosage velu (F). شجيرة سرويتية صغرية القذ تملو من ٥ الى ٦ اثمار . ساقها وفروعها مالة اللحاء . اثانها واعناق اوراقها هلبية . اوراقها يضيبة الشكل مقطوعة القاعدة ، مدببة المقصة . نصلها خلى البشرة على صفحته طولها يراوح بين ٥ و ٨ سم. نوربًا تقص من ٣ الى ٥ اثمار كبيرة القذ لونبًا الى الحمرة البنفسجية || ازهارها يستمر طوال الربيع .

#### ١٨٥١٨ - عَصَلَة ذَهَبِيَّة الزَّهَر

*Rhododendron aureum* (S). Rosage jaune d'or (F). بجلة معمرة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة ، مرصاة اللحاء . اوراقها سنائية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. نصلها فلسي الصفحة السفلى . نوربًا تقص من ٣ الى ٥ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٣ سم. لونبًا الى الخضر الذهبي الجليل || ازهارها رديبي .

#### ١٨٥١٩ - عَصَلَة رَقِيعَة

*Rhododendron maximum* (S). Rosage élevé (F). شجيرة سرويتية بجلة الشكل شائعة الاستعمال التزييني . تملو نحو خمسة اثمار . اوراقها خيفة ذرية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحته . نوربًا علفية الشكل ، خلية الزناد والماليق والاغن ، عديدة الازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونبًا الى الوردى يملو توش اصفر ومشة حراء ومشة غضراء . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٥١٠ - عَصَلَة زَيْتُونِيَّة الْوَرَق

*Rhododendron oleaeifolium* (S). Rosage à feuilles d'olivier (F). بجلة سرويتية متوسطة القذ تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها فشي اللون اخضر الحار . نوربًا تقص بعض الازهار الوردية ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم. ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٨٥١١ - عَصَلَة سَمِرْنُوف

*Rhododendron Smirnowi* (S). Rosage de Smirnow (F). جنبة جاحدة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها سنائية مدببة تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها اصفر الفسلم ، غائر العروق ، خلى الصفحة السفلى ، مائل العليا الزاهية الخضار . نوربًا تقص من ٣ الى ٥ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٣ و ٨ سم. لونبًا الى الوردى يملو موجه ليكي || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٨٥١٢ - عَصَلَة صَغِيرَة الزَّهَر

*Rhododendron micranthum* (S). Rosage à petites fleurs (F). جنبة سرويتية صغرية القذ تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها غليظة . اوراقها سنائية الشكل ، نصلها يطول



عَصَلَة قَاحِرَة

الشكل، لبد الارتكاز. تكثر في المروج وفي معظم الاراضي الرملية من اقالم البلاد المتدلة .

#### ١٨٥٢٦ - عَصَوِيَّةُ الرُّوجِ \*



عصلة مشوكه

Phleum pratense (S). Fléole des prés, Massette, Timothy (F). Cat's tail, Herds grass, Timothy grass (E). Timotheeschragras, Timotheegrass (D). Codolina, Fleo dei prati, Erba di Timoteo (I).

اشهر انواع العسوية واحسنها علماً واورقها انتاجاً جيد في المراعي بالاشتراك مع الفحل ويختلف البتات القرنية . يرغب في الاقاليم المعتدلة والارربة البنية الرملية المتوسطة الاندماج . له شجيد الصفات متقلبه الخليل والبقار والعلم .

١٨٥٢٧ - عَصِيرٌ ، مَعْصَارٌ (E). Juicy (F). Juteux (F). عَصِيرٌ أو الرب .

١٨٥٢٨ - عَصِيرٌ ، عَصَارٌ (E). Must (F). Moût (F). سائل سكري يستخرج من بعض الحار كالعنبر والنفاح ، الخ .



عسوية المروج

١٨٥٢٩ - عَصِيرُ الحَصْرِصِ (E). Verjuice (F). Verjus (F). عصير حب الثوب في طوره الشثوي المغمضي . يستعمل في تخميص الثرايات السكرية وفي صناعة الخردول ، وقد يضاف الى الحمر لزيادة حوضتها فيها لو دعت الحاجة .

١٨٥٣٠ - عَصِيرُ الدُّبِيِّ هو القطب الشام ، اطلبه .

١٨٥٣١ - عَصِيرُ الدَّنِّ (E). Tubful (F). Cuvée (F). هو ما يستوحه الدن من عصير .

١٨٥٣٢ - عَصِيفٌ (F). Ligulaire (S). Ligularia (S). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المريكبات . انواعه كثيرة العدد ، منها معظم اصقاع العالم . سوقها فردية منتصبة تنهي بالازهار . اوراقها جلدية الانتصاب كبيرة القذ . ازهارها رؤوسية التركيب سنبل او عقديرة التجميع . ثنائيات قلائدنا وحيدة الصف || يرغب في الموامع الرطبة والارربة المنسوبة التركيب الحكمي || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .



عصيف الحجاب

#### ١٨٥٣٣ - عَصِيفُ الحِجَابِ \*

Ligularia divorura (S). Ligulaire des coteaux (F). نوع من العصيف الممر . ساقه زهرية تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه شبه مستديرة الشكل طولها نحو ٥٠ سم . وعرضها ٤٥ سم . ازهارها عذكوئي التجميع . رؤوساته الزهرية كبيرة القذ حنطية الاقراص يرتقايلة للسليبات ، قطرها يراوح بين ٩ و ١٢ سم || تنوره يستمر من آب الى ايلول .

#### ١٨٥٣٤ - عَصِيفٌ بَحْرِيٌّ الدَّنِّ \*

Ligularia glauca (S). Ligulaire glauque (F). نوع من العصيف الممر . ساقه سرعة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه قليلة الشكل تطلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . نصلها باحث الحصار سمك الصفحة . ازهارها سنبل التجميع رؤوساته الزهرية ذهبية اللون || تنوره يستمر طول شهر تموز .



عصيف بحري اللون

١٨٥٣٥ - عَصِيفٌ سِيرِيَّةٌ (S). Ligularia de Sibérie (F). نوع من العصيف الممر . ساقه سرعة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القذ تطلو نحو ٤٠ سم .

السفل ، اخضر العليا ، ثخين النسيج . نورتها تفهم من ٣ الى ٧ ازهار ، قطر الواحدة منها يراوح من ٥ الى ٦ سم . لونها الى الابيض المنش بالقرنزي || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

#### ١٨٥٣٩ - عَصَلَة مُسْتَدِيرَة الرُّوجِ

Rhododendron rotundifolium (S). Rosage à feuilles rondes (F).

جنية سبروتية تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها مستديرة الشكل قليلة القاعدة تطلو نحو ١٢ سم . وتعرض نحو ١١ نصلها بحري المنسفة السفل ، اخضر العليا . نورتها تفهم من ٨ الى ١٢ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم . لونها الى الوردى الزاهي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٥٤٠ - عَصَلَة مُشَوَّكَة \*

Rhododendron hirsutum (S). Rosage hérissé (F). جملة متوسطة القذ تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها دقيقة . اوراقها بيضيه الشكل ، مقفولة القاعدة ، مدببة العنقصة الشاككة . نصلها خلي البشرة يطلو من ١٥ الى ٣٠ سم . لونه الى الحصار الزاهي . نورتها تفهم بعض الازهار الصغيرة القذ الوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٥٤١ - عَصَلَة مُلْتَبَسَة

Rhododendron ambiguum (S). Rosage ambigu (F). جنية سبروتية كبيرة القذ تملو نحو ٣٠٠ سم . اذنتها ضمية الانتصاب . اوراقها اهلجية الشكل ، نصلها يطلو من ٥ الى ٧ سم . بشرته جملة الحصار اللامع تملوها نمشة غنية بمراء . نورتها تفهم من ٥ الى ١٠ ازهار جرسية الشكل ، كبيرة القذ ، قطر الواحدة منها نحو ٥ سم . لونها الى الحصار الليموني || ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

#### ١٨٥٤٢ - عَصَلَة مُمْتَنَزَة

Rhododendron insigne (S). Rosage remarquable (F). شجرة جادة عمودية الشكل تملو من مترين الى ستة امتار . اوراقها سنائية تطلو من ٨ الى ١٢ سم . نصلها جميل الحصار اللامع البشرة . نورتها تفهم من ٨ الى ١٠ ازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم . لونها الى البياض الموشح بالوردي || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

#### ١٨٥٤٣ - عَصَلَة مُهْدَبَة

Rhododendron ciliatum (S). Rosage cillé (F). جملة كبيرة القذ سبروتية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سنائية الشكل ، خنقبة النصل ، مدببة الزام الاخير ، طولها نحو ٥ سم . صفحتها العليا ناعمة البشرة صفحتها السفلى غنية ، مرفطة ، مهدبة ، طلاء اللون . نورتها تفهم من زهرتين الى ست ازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم || ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

١٨٥٤٤ - عَصُوفٌ (E). Strong ale (F). Vent violent (F). العصفوف والعصيف : الربيع الشديدة .

#### ١٨٥٤٥ - عَصَوِيَّةٌ ، ذَيْلُ القَطَا

Phleum (S). Fléole, Phléole (F). Cat's-tail grass (E). جنس اعشاب ممرعية برية وزراعية من فصيلة النجيليات ، انزواعه المعروفة ١٠ جميعها شلتية . سوقها دقيقة منتصبة . عصفها سنائي مستطيل . ازهارها سنبل التجميع ، اسطواني

ذهبيتا الحلقة المطوقة بالابيض . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة . زعنفتها الشرسية خط من المناخس الذرية . زعنفتها اللبالية حلالية الطرف || لحها متوسط الصنف ، مأكول .

#### 1٨٥٤٥ - عَصَادَة ، أَلْبَدَاد Alidade

جهاز التخطيط يستعمل في المساحة وهو مركب من مسطرة لها مصويتان شاقوليتان موجهتان بالتوازي مع حافة طرفها .

1٨٥٤٦ - عَضَار Loranthus schimperi (S).  
نوع من الحاصل يزرع للزينة . راجع حصال .

#### 1٨٥٤٧ - عَضَاه

النضار: كل شجر يعظم وله شوك . وما صغر من شجر الشوك فهو الغص . وما ليس بغص ولا عضاء من شجر الشوك ، فالشكامي والحلاوي والحاذ والكب والساج . الواحدة عضاءه وضه .

#### 1٨٥٤٨ - عَضَاهَة Organisme (F).

هي الجهاز العضوي الذي يميز الاجسام الحية من الجاهل .

#### 1٨٥٤٩ - عَضَاهِي ، مُعَقَّى ، مُعْصُون Organisé (F). Organic (E).

#### 1٨٥٥٠ - عَضْب العصب: هو العجل عند طلوع قرنه .

#### 1٨٥٥١ - عَضْبَة \* ، عَضْبَة اليككار Silphium (S).

Silphide, Plante au compas, Silphide, Silphie, Silphion (F). Compass plant, Bastard chrysanthemum, Polar plant (E). Geschlitzte Tassenpflanze (D). Silfo (I).

جنس نباتات جنية زيبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه ١٢ ، اصطلح العالم . سوقها دماعة صابرة رائتية . اوراقها غنية التجميع . ازهارها رؤسية كبيرة القذ صفراء اللون . زورها مفلطحة ومجنحة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

#### 1٨٥٥٢ - عَضْبَة ثَلَالِيَة الْوَرَق Silphium trifoliatum (S).

Silphie à feuilles ternées (F). جنبة معمرة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها اسطوانية مرطاه للحاء ، بحرية اللون . اوراقها غنية ثلاثية التركيب ، سنانية النصل ، تطلو نحو ١٦ سم || رؤسيتها الزهرية متوسطة المدد قطرها براوح بين ٤ و ٥ سم ، لونها الى الصفرة || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

#### 1٨٥٥٣ - عَضْبَة رَاتْنِيَّة Silphium terebinthaceum (S).

Silphie térébinthacé (F). جنبة زيبية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها تنميز بفرازة مادنها الراتينية . اوراقها غنية التجميع ، بيضيه الشكل ، قليلة القاعدة ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، تطلو نحو ٣٠ سم . وتعرض ١٥ سم . || رؤسيتها الزهرية عديدة ، قطرها براوح بين ٥ و ٨ سم ، لونها الى الصفرة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

#### 1٨٥٥٤ - عَضْبَة مَحْرُوقَة Silphium perfoliatum (S).

Silphie perfolié (F). جنبة معمرة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها رباعية التضلع . اوراقها متقابلة متدحمة الاذنيات التي تبدو مقعرة كالكرتوب تتوسطها الاثتان || رؤسيتها الزهرية عديدة ، قطرها براوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

وتعرض نحو ٣٠ . رؤسياته الزهرية ذهبية اللون ، سبلي التركيب ، قطرها براوح بين ٤ و ٥ سم . لسنتها ثنائية التخرج تملو كاتها مزدوجة || تنوره يستمر من تموز الى آب .

#### 1٨٥٣٦ - عُصْفَيَف كَبِير الْوَرَق Ligularia macrophylla (S).

Ligulaire à grandes feuilles (F).

نوع من العصف الممر . ساقه زيا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل تطلو من ٤٠ الى ٥٥ سم . نصلها الى الحصار الازرق الموج . ازهاره سبلي التجميع ، رؤسياته الزهرية كبيرة القذ ، حطية الاقراص ، صفر السنتات || تنوره يستمر من تموز الى آب .

#### 1٨٥٣٧ - عُصْفَيَف يَابَانِي Ligularia japonica (S).

Ligulaire du Japon (F).

نوع من العصف الممر . ساقه سرسة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القذ سباجية او تساعية التفريش . نصلها طابق الحصار سيمك الصفحة . ازهاره عنقودي التجميع . رؤسياته الزهرية صفر الاقراص ، جر السنتات ، كبيرة القذ ، قطرها نحو ٩ سم || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

#### 1٨٥٣٨ - عُصْفِيَّة Glume (F). Husk, Chaff (E).

قناة تحيط بسنبيلة التيجليات وما عصفتان لكل سنبيلة .

#### 1٨٥٣٩ - عَصْفِيَّة فَهْرَة في البها ، اطلبا .

#### 1٨٥٤٠ - عَصِيل Sclerospora (S).

جنس فطور مجهرية من عماره السنتيات وفضيلة السنتيات . يتميز بقمر خيوطه البوفية وقلة تشعبها وكبر بيضياتها واستدارة مراهفها || انواعه المعروفة قليلة اشهرها عصيل التيجليات .

#### 1٨٥٤١ - عَصِيل التيجليات \*

Sclerospora graminicola, S. macrospora (S).

فطر مجهرية من العصيل يتميز باسوداد بيضياته الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نحو ٦٠ مي . || يركب شرائف الحلقة والذرة وقد يتدها الى الازرار . مظهره الخارجي سقم واصفرار ثم تبقي اتصال وقد يؤدي الى المجسنة واعلاص الازرار .

#### 1٨٥٤٢ - عَصِيم Feuilles des arbres (F). Leaves (E).

العصم: هو ورق الشجر .

#### 1٨٥٤٣ - عَصَا ، عَقَى Lotir (F).

قسم الارض الى عدة عصفون .

#### 1٨٥٤٤ - عَضَابَة لِفِيَّة \*

Lepidopus argenteus (S).

Lépidope argenté, Argentine (E).

سكة بحرية مقشرة بيوض من فصيلة السيفيات شاككة الزمانف . اصطلح اغراض ونفاق البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجرم كنصل السيف يطلو نحو ١٤٠ سم . لونها الى الزرقه مبلعوا موج ودي ورشة فضية تتخللها نقط ذهبية . رأسها وظهورها اصق عضاءً من ابطلها وبعطها || رأسها شبه اسفيني الشكل مستطيل الطر . شدتها كبير . اسنانها كثيرة العدد منها الثابتة والمتحركة والذرية والمنقعة || ميناها كيرتان



عصيل التيجليات



عضابة فسيّة



عضبة



وفلسطين . يكثر قرب الحقول المزروعة والبيارات . يلتصق قوته في النهار . جحره دهاليز فسيحة عديدة الانفاخ يحزن فيها ما استطاع من حبوب .

## Muscle

## عَصَلَة ١٨٥٦٦

جمجمة نسج عضوية ليفية تتميز بخصائصها الانقباضية والانبساطية . تقسم عضلات الجسم الحيواني التي يعرف عنها بالجهاز العضلي الى ثلاثة اقسام : قسم العضلات الارادية او العضلات الخاططة التي يسيطر عليها الجهاز العصبي فتتنقبض وتنبسط بفعل الارادة . وقسم العضلات غير الارادية او العضلات المسماة اي غير الخاططة وهي التي لا تأتمر بالارادة كعضلات الجهاز الهضمي والوعية الدموية . ثم قسم عضلات القلب وهي من العضلات الخاططة الارادية التي تتميز باستمرار الحركة طوال الحياة .



عصفوط

Muscle extenseur (F). عَصَلَة بَاسِطَة ١٨٥٦٧  
Extensor muscle (E).

Muscle abdominal (F). عَصَلَة بَطْنِيَّة ١٨٥٦٨  
Abdominal muscle (E).

Muscle alaire (F). عَصَلَة جَنَاحِيَّة ١٨٥٦٩  
Alary muscle (E).

١٨٥٧٠ عَصَلَة حَاجِيَّة ، عَصَلَة كَامِشَة  
Muscle corrugateur, Sourcilier (F). Corrugator muscle (E).

Muscle iliaque (F). عَصَلَة حَرْقِيَّة ١٨٥٧١  
Iliacus muscle (E).

Muscle malaire (F). عَصَلَة خَدِّيَّة ١٨٥٧٢  
Malaris muscle (E).

Muscle circulaire (F). عَصَلَة دَائِرِيَّة ١٨٥٧٣  
Circular muscle (E).

Muscle releveur (F). عَصَلَة رَافِعَة ١٨٥٧٤  
Levator muscle (E).

Muscle anal (F). عَصَلَة شَرَجِيَّة ١٨٥٧٥  
Anal muscle (E).

Muscle pectoral (F). عَصَلَة صَدْرِيَّة ١٨٥٧٦  
Pectoral muscle (E).

Muscle temporal (F). عَصَلَة صَدْغِيَّة ١٨٥٧٧  
Temporal muscle (E).

Sphincter عَصَلَة عَاصِرَة ١٨٥٧٨

١٨٥٧٩ عَصَلَة مَادَّة ، عَصَلَة مَبْدِة  
Muscle protractor (F). Protractor muscle (E).

١٨٥٨٠ عَصَلَة مَبْعُدَة ، عَصَلَة قَاطِحَة  
Muscle abducteur (F). Abductor muscle (E).  
عصلة مبعدة عضواً عن محور الجسم .

١٨٥٨١ عَصَلَة مَخْطَطَة  
Muscle strié (F). Striped muscle (E).

هي كل عسلة في الجسم يسيطر عليها الجهاز العصبي فيسير انقباضها وانبساطها .

١٨٥٨٢ عَصَلَة مَذَارِيَّة ، عَصَلَة مَلَاغِم  
Muscle orbiculaire (F). Orbicular muscle (E).

١٨٥٥٥ عَصَبَة مُشْرَمَة (S). Silphium laciniatum (S).  
Silphe laciné (F).

جنية معمرة تملو من متر الى مترين ساقها حلية خشنة . اوراقها لافحة متعاقبة دائمة الاتجاه نحو الشمال . نضجها الصلابة ، نثره يبعه يبلغ الضلع || رؤوسها الزهرية كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ سم . لونها الى الصفار الكبريتي الزاهي || انزاعها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٥٥٦ عَصَة Lot  
هي الحصة أو السهم أو النصيب وهي القلعة من الشيء أو الجزء منه : ج عصفون .

١٨٥٥٧ عَصْد Emondage (F).  
Pruning, Lopping (E).  
تقليم الفروع والاضغان الكبيرة التي تنبت على السوق .

١٨٥٥٨ عَصْد Bras (F). Arm (E).  
من اعضاء قوائم الثواب الامامية . ج اعضاء وأعضاء .

١٨٥٥٩ عَصْد زَنْدِي ، عَصْد مِرْقِي  
Brachio-cubital, Huméro-cubital (F). Humero-cubital (E).

١٨٥٦٠ عَصْد كُعْبُرِي ، عَصْد كُوْعِي  
Huméro-radial (F). Humero-radial (E).

١٨٥٦١ عَصْد يَاتِ الْارْجُل Brachipoda (S).  
Brachiopodes (F). Brachiopoda (E).  
شعبة من صف اشباه الديدان .

١٨٥٦٢ عَصْرِس Guimauve officinale  
هو الخبطي الخنزري زهره قاني الحمرة تسود منه جحافل الدواب اذا اكلته .

١٨٥٦٣ عَصْرُوط \* Calotes (S).  
Calote, Lézard-arlequin (F).  
جنس عظام من فصيلة الحورذنيات . انواعه ٣٥ اعطائها البلاد الحارة الاسيوية . تتميز باستطالة اذانها الدقيقة وبقدرة على الاستعلاء (الماتنة) || تألف الادغال والغابات والحراج . قوتها الحشرات .

١٨٥٦٤ عَصْرُوط مِلْوَان \* Calotes versicolor (S). Calote versicolore, Lézard-arlequin versicolore (F). Versicolour calotes (E).  
حيوان يبرض من لونية الحورذنيات شارفات الانسان ، مكثبات الاسنة ، رباعيات القوائم ، خناسيات الاصابع || جسمه يطول من ٢٧ الى ٤٠ سم . ثوبه الى الوردية الخفيفة تلوها رقة سمراء . قوته جمعة بالاصفر . وهو كائنات اجنح يتنمى بالشولة فئاتن المحيط الذي يوجد فيه || يألف الادغال والحراج للبيئة الانجار . يعيش ذكراً وانثى من اواسط الربيع حتى اواخر الخريف .

١٨٥٦٥ عَصَل \* Psammomys obesus (S).  
Psammomys obèse (F).  
حيوان لين قاضم من فصيلة الفأريات . وسيد الجنس والنوع . شكله شكل الجرذون ، طوله نحو ١٩ سم . وذنبه ١٤ ، ثوبه الى الوردية الصهباء . موطنه رمال مصر وسيناء



عصفوط ملوان



عفل

البيوية تستغرق ٢٤ ساعة و٥٠ دقيقة. اما دورته الفلكية حول الشمس فتستغرق نحو ٨٨ يوماً || يقال ان حجمه لا يفوق بل من جرم الارض وهو يرى دائماً مغسوراً بنور الشمس نظراً لقربه منها . ويقال انه لا يوجد حول سطحه غلاف جوي وان حرارته تبلغ نحو ٣٥٠° مع || اما المتجيمين فيدعونه منافقاً لكونه مع السعد سعداً ومع النحس نحساً .

١٨٥٩٩ - عَطَارِد هو الناردين الاقريطي ، اطلبه .

١٨٦٠٠ - عَطَاط \*  
Telophorus (S).  
Télophore (F). Telophorus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشروبات المناظر وقصيلة الصرديات . اعطاه تمتد من افريقية الجنوبية الى الاستوائية والشرقية . وهو من الصوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجته الحيائي زرجي الا في زمن القطعاع . قوته الحشرات والديدان الصغيرة واليزور والثآليل جسمه متوسط اللد يظل نحو ٢٢ سم . متقاده معتدل الجرم ، ضليح . جناحه متوسطا اللد . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . ثوبه الملوي الى الخضار الالامس ، اطراف اياهه واطراف رقاله الى الحمرة الاربوانية . ثوبه السفلي ، من الزور الى الافنيك ، احمر اللون صناعي المايج . متقاده ججوي . رساه واصابه الى \*السرة القائمة || يذثن عشه في الاجنار الرقعة . الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم بها الانثى دون الذكر الذي يؤئن لها الغذاء والحماية .

١٨٦٠١ - عَطَاطِي \*  
Faunistique (F). Faunistic (E).  
كل ما له صلة بالعلم وبالحيوانات الداجنة في كورة معينة .

١٨٦٠٢ - عَطَان ، عَقَص  
Tanin (F). Tannin (E).  
مادة سامة قابضة توجد في انسجة بعض النباتات . عصرها الفعال يدعى الطان . والعطان يعتبر من المقويات الطبية الصحية وهو يستعمل في الدباغة .

١٨٦٠٣ - عَطَب هو القطان ، اطلبه .

١٨٦٠٤ - عَطْبُل ، عَطْبُول النلية الطويلة العنق .

١٨٦٠٥ - عَطَر  
Essence (F). Species, Attar (E).  
سائل طيار رائحة يكون بحالة شيفات في خلايا النبات او في قوتها وبيوبها الخاصة .

١٨٦٠٦ - عِطَر هو البهون العطر ، اطلبه .

١٨٦٠٧ - عِطَر القَدَاح ، دهن القَدَاح ، نِيرُونِي  
Nérôli (F). Neroli (E).

عطر يستحصل عليه من تقطير زهر التارنج الذي يدعى قداحاً .

١٨٦٠٨ - عِطَر جَعْدِي  
هو الحيازة الجلمدية ، اطلبها .

١٨٦٠٩ - عِطْرَف  
Vipère (F). Viper (E).  
الامى الكبيرة اللد .

١٨٥٨٣ - عَصَلَة مُقَرَّبَة ، عَصَلَة قَالِلَة

Muscle adducteur (F). Adductor muscle (E).  
عصلة مقربة عضواً الى محور الجسم .

١٨٥٨٤ - عَصَلَة مُقَلَّصَة  
Muscle constricteur (F). Constrictor muscle (E).

١٨٥٨٥ - عَصَلَة مَلْسَاء  
Muscle lisse (F). Skin muscle (E).

هي العضلة غير المخططة التي لا تؤثر فيها الإرادة او الجهاز العصبي .

١٨٥٨٦ - عَصَلَة هُدْبِيَّة  
Muscle ciliaire (F). Ciliary muscle (E).

١٨٥٨٧ - عَصَمَكْرِي  
Micro-organisme (F).  
هو كل كائن حي متناهي الصغر . ويدعى نفطور ، اطلبه . اما كلمة عصمكري فن وضع المجمع العلمي في مصر . ج . عصمكريات .

١٨٥٨٨ - عَضُو  
Organe (F). Organ (E).  
جزء من كائن مركب ، وجوده لازم او ضروري . ج . اعضاء .

١٨٥٨٩ - عَضُو التَلْفِيح ، عَضْمُول  
Organe copulateur, O. de copulation (F). Copulatory organ (E).

١٨٥٩٠ - عَضُو سُبَاتِي ، عَضُو ودَاجِي  
Organe carotide (F). Carotid organ (E).

١٨٥٩١ - عَضُو شَمِي  
Organe olfactif (F). Olfactory organ (E).

١٨٥٩٢ - عَضْرَة  
Fissiparité (F). Fissiparism (E).  
المضوة والتضيعة ، التناسل بالانقسام الى شطرين كما هي الحال عند الاولاي والكتيريات .

١٨٥٩٣ - عَضُوي  
Organique (F). Organic (E).  
نعت تعريفي توصف به الاعضاء والاجسام والمواد المضوية من اي فئة كانت .

١٨٥٩٤ - عَصِيد  
Effeiture (F). Stripping off the leaves (E).  
ما انتزع او اسقط من الورق .

١٨٥٩٥ - عَصِيد \*  
Palmette (F). Palm-shaped (E).  
شكل من اشكال تقليم الاجنار المشرة .

١٨٥٩٦ - عَصَا  
Fente longitudinale (F). Longitudinal slit (E).  
العد : الشق طولاً . انعطاط الخشب : انشقاقه طولاً .

١٨٥٩٧ - عِطَار  
Strombus lantiginosus (S).  
نوع من الدلاع يكون منه انظار الطيب .

١٨٥٩٨ - عِطَارِد  
Mercure (F). Mercury (E).  
كوكب سيّار من الخنس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي وهو اقربها من الشمس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء تبلغ نحو ١٩٩٥٠٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية



عصيدة



عطاط

Tige volatile (F).  
Vulubile stem (E).

١٨٦١٥ - عَطَفَة

هي الساق التي تنطفت وتلتف عل دعائها .



عطوف نقات

Vrille (F). ١٨٦١٦ - عَطَفَة ، حَالِق ، أَرْشِبَة  
Tendrill (E).

ورقة تحولت الى عرق لين التركيب اسطواني الشكل ، مستطيل ، يمكن النبات من التسلق والتشبث كما في الكرومة وغيرها .

Aetophorus imperialis (S). ١٨٦١٧ - عَطْفُور \*  
Aétophore impérial (F).

حشرة دامت من فصيلة السلكويات وريشة مفعدات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألت المقاصب والمناقع التي يكثر فيها الاسل لانها تعيش عل المواد النباتية المنحلة تحت القصب والاسل المطروح ارساً || جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجسم ، بطول نحو ١٢ سم . زباناها غطيان . كولها مغزلي الشكل . ثوبها ال الصفرة الصنابية المواج بلعوا في ظهورها خرس نقط سود . ظهرها لا يلحف كامل الجسم .



عطوب

Hédéracé (F). ١٨٦١٨ - عَطْفِي ، تَبْلَبي  
Hederaceae (E).

نمت تعريفي توصف به السوق النباتية للمادة او المستلفة اللبلاية الشكل .

١٨٦١٩ - عَطَلٌ راجع أنه .

Otolithus (S). ١٨٦٢٠ - عَطْلِيط \*  
Otolithe (F). Otolithus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة نحو عشرة . اعطائها بحار البلاد الحارة || جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الفك الاسفل ، مقعرة الزعانف الظهرية الشائكة ، عمودية الذيلية || اثنائها الى الجؤوة يملؤها مواج اخضر يفر عند البلن ويسمر في الظهر || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .



عطود

Faune (F). Fauna (E). ١٨٦٢١ - عَطْم \*  
العلم هي مجموعة حيوانات كورة او قطر او حقة جيولوجية .

Faune abyssale (F). ١٨٦٢٢ - عَطْم لُجِيَّة \*  
Abyssal fauna (E).

مجموعة الحيوانات البحرية عل اختلاف رتبها وعضائنها واجناسها التي تعيش في المناطق العميقة من البحر .

Faune aquatique (F). ١٨٦٢٣ - عَطْم مَائِيَّة \*  
Aquatic fauna (E).

مجموعة الحيوانات المائية التي تعيش في منطقة بحرية خاصة او معينة .

Faunique, Faunique, ١٨٦٢٤ - عَطْفِي \*  
Faunesque (F). Faunic (E).

نمت تعريفي يطلق عل ما هو خاص بالعلم .

Milieu climatique naturel (F). ١٨٦٢٥ - عَطَن \*  
Natural habitat (E).

هي البيئة المناخية الطبيعية الخاصة بالحيوان او النبات ج اسطان .



عطيط

١٨٦١٠ - عَطُوف نَقَات \* ، بَخَّاخ ، بَرَّاق

Sepedon haemachata (S). Cobra cracheur, Haemachata, Serpent cracheur (F).

حية سرلودة سامة من الطوفيات امانيات الاخاديد مشهورة بقذف سمها مع اللع في وجه من تعتبر مهاجاً || جسمها متوسط الشخانة بطول نحو ٦٥ سم . ثوبها ال الصفرة الخطية المواج يملؤها من عنقها ال طرف ذنها تجميع جؤوي معترض وضطوط دقيقة متكررة ومتعارضة سواد اللون . رأسها لوزي الشكل . عنقها مستدقة . عينها مستديرتان قزمزيتان . عدد اسناتها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و٢٦ في الاعل من اصلها عقاقشان امانيات ذريتان لامتحركان || بيئاتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . تبلغ كامل نموها بمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة || تعتبر من التايين الشديدة الاذى .

١٨٦١١ - عَطْرُوب \*

Eetroplus (S). Eetrople (F). Eetroplus (E).

جنس اسماك نهريّة وبحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها اغوار انهر الهند || اجسامها بيضيه الشوزن ، مبططة ، منقوشة ، بطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل ، صغيرة الاعظام . عيونها صغيرة نازحة . زعانفها الظهرية مستطيلة عشارية الاشعة والمناخس الحادة تقابلها الترسية المائلة شكلًا وقدأ . الحوضية صغيرة مزوانية والبطنية كذلك . الذيلية مستعرضة مقطوعة || اثنائها الى الخصار البحري يملؤها تجميع معترض بنفسجي اللون . ونها انواع مرقوشة بالفضي واخرى فضية البطن || لحومها مأكولة مرغوب فيها .

١٨٦١٢ - عَطْرُود \*

Erythrura (S). Erythrure (F).

جنس عصافير صغيرة القد من الجؤام مخروطيات المناقير وفصيلة الزغبيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزايج . ملجئها الحيائي جماعي اسرابها تمد أكثر من مة زوج || اجسامها صغيرة مكنة قريبة الشبه بالدوري الا انها قصيرة الذئاب المقنطية . اثنائها الى الكهبة يملؤها مواج اصفر او اشقر . بطونها الى الثرة . ونها نوع ثلاثي الالوان الزاغبة يكثر وجوده في غابات تيمور .

١٨٦١٣ - عَطْرُور \*

Chloranthe (F).

جنس نباتات جبينية وعشبية معمرة من فصيلة الطورديات . انواعها المعروفة عديدة اعطائها بعض المناطق الاستوائية والحداء من الفارة الاسيوية || اوراق وانواعها جميع الانواع عطرية العرف المستحب . ونهم من استعمل الازواك استعمال التمنع والشاي .

١٨٦١٤ - عَطْرُورِيَّات \*

Chloranthaceae (S). Chloranthacées (F). Chloranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدات القمالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها عديدة فيها الاشجار والشجيرات والنبات والاشواب . اعطائها المناطق الاستوائية والحداء من الهند الى جزر المحيط الهادي الى امريكا الجنوبية || اوراقها بسيطة متعاقبة . ازهارها سنبلية التجميع . ثمارها نفوية ، متدلية ، صغيرة التشتيت المالحون بقلقة آحية متشاكسة || اشهر اجناسها الطورود والاسكرين .

مختلفة الاحجام والالوان ، تغلب فيها الاستطالة والاشكال المتسجمة والالوان الخضر النحاسية الالامه || جميعها مفيدة صغيرة قوتها الحشرات والحوام .

### ١٨٦٣٦ - عَظَامِيَة الحِيطَان

Lézard des murailles (F).

هي بحلية الحيطان ، اطلمها .

Lézard vert (F).

### ١٨٦٣٧ - عَظَامِيَة خَضِرَاء

هي بحلية خضراء ، اطلمها .

Lézard agile (F).

### ١٨٦٣٨ - عَظَامِيَة رَشِيقَة

هي بحلية رشيقة ، اطلمها .

Lézard vivipare (F).

### ١٨٦٣٩ - عَظَامِيَة وَلُود

هي بحلية ولود ، اطلمها .

Azara microphilla (S).

### ١٨٦٤٠ - عَظُر

Azara à petites feuilles (F).

شجيرة برية ورزينة من فصيلة النسيان . مهدا بلاد الشيل ، ساقها فراء تعلو من ٤ الى ٦ م . فروصها متقابلة مزدوجة التنصيف . اوراقها ابيدة متقابلة معتقة صغيرة القد تطول من ٢٥ الى ٣٠ م . نصلها جامد الصفرة ، رمي الشكل . مسن الحافة . ازهارها عطرية العرف ، صغيرة القد غصراء اللون ، محورية الارتكاز . ثمارها غنية ، برتقالية اللون || تنورها يستمر من اواسط شباط الى اواخر اذار .

### ١٨٦٤١ - عَظْلَم

هو الوصمة ، نبات عشبي من الصليبيات . وهو اسم عدة صباغات ذرق اخضها الوصمة والنبات ...

### ١٨٦٤٢ - عَظْلَم

هو تحرط الصباغين ، اطلمها .

Os (F). Bone (E).

### ١٨٦٤٣ - عَظْم

نسيج ضام صلب يتكون منه الهيكل العظمي الحيواني وهو مركب من اربع طبقات : (١) الطبقة الخارجية المرفوعة بالسحقاق وهو غشاء ليفي غالف - (٢) الطبقة القشرية الشديدة الصلابة - (٣) الطبقة الداخلية الهشة المرفوعة بالاسفنجية - (٤) الخضاعة وهي المادة الدهنية التي تملئ فجوات الطبقة الاسفنجية ومن اسمائها الرم والنعقي . والعظام تستعمل في عدة صناعات اهمها صناعة الاسلحة الفسفورية كما تدخل في غذاء الحيوان والطير .

Os spongieux (F).

### ١٨٦٤٤ - عَظْم اسْفِنْجِي

Spongy bone (E).

Fémur (F).

### ١٨٦٤٥ - عَظْم الفخذ

Femur, Thigh-bone (E).

اقوى عظام الجسم واسهلها ، يتألف من العظم الطويل يحده من طرفه الاعلى المدور وتوابعه ومن طرفه الاسفل تنوء اللقمة أو اللقنتين .

Bréchet (F). Breast-bone (E).

### ١٨٦٤٦ - عَظْم القَص

هو الجوشوش ، عظم صدر الطير .

Scapulum (F).

### ١٨٦٤٧ - عَظْم الكتف ، عَظْم لَوْحِي

Calcanéum (F).

### ١٨٦٤٨ - عَظْم الكَعْب ، عَقب

Heel-bone (E).

Ethusa (S).

### ١٨٦٢٦ - عَظُوز

Ethusa (F). Ethusa (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الابريل قصار الذيل وفصيلة الذباليات . انواعه المرفوعة قليلة العدد ، اعطائها بجمار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها لينة لا تقرب الشطوط الا في زمن التسرة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، متراكبة التتواتر المدببة الاطراف . تتميز بالانجاس المفرط الموجود بين قوائمها ، وزوجان كبيران مستطيلان ، وزوجان صغيران . ملاقطها قصيرة ، شديدة النشط . عينها ديبوية . اثوابها الى الخضر الازرق تملو ماجة حراء . قوائمها الكبيرة وملاقطها مطوقة بالاصفر والوردي .

Don (F).

### ١٨٦٢٧ - عَظِيَّة ، تَحَلَة

هي الهبة على اختلاف اشكالها .

Androcée (F). Andracium (E).

هو جهاز التفكير في النبات ، واجمع جنس .

Filago (S).

### ١٨٦٢٩ - عَظِيم \*

Filago, Filago, Herbe à coton (F). Horewort, Cotton rose cud-weed, Cud-weed (E). Schimmelkraut (D). Filago, Filonia, Canapicchio, Erba da Coton (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات الشرويات . انواعه المرفوعة لا تجاوز البانبة جميعها نباتات بحلية فرعاء . اوراقها غليظة . ازهارها روكسية كثيفة التجميع يطول عند الادراك زغب ابيض اللون يشبه ندف القطر . قالوا انها لا تتحلل من المنافع الطبية لكنهم اهلوا ذكرها .

### ١٨٦٣٠ - عَظَاء

اسم تعريبي شامل يطلق على منظم الزخافات التي لتنتهي الى رتبة السقايات .

Sauriens, Lacertillens (F).

### ١٨٦٣١ - عَظَالِيَّات

Saurians (E).

رتبة العظاء وهي حيوانات زحافة بيوضة عادية السم . مفترسة قوتها الحشرات والحوام . فصائلها ٢١ ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صماء الاذن ، جويوية الصدر ، رباعية القوائم او ثنائيتها او عادية . اجسامها مستطيلة ، جلودها حشرقية ، اجناسها متحركة || اشهر فصائلها الجروريات والحرباويات والحردويات والخنجويات والحنازيات والسقترقيات والسليليات والسوديات والميشريات والفارغات والقهرقيات والورليات والورقيات .

Carpe (F).

### ١٨٦٣٢ - عِظَام المِخْم

Carpus, Wrist (E).

Iles (F). Illa (E).

### ١٨٦٣٣ - عِظَام حَرَقِيَّة

le Lézard (F). Lacerta (E).

الظاينة كوكبة نجوم شالية الموضع مركزها بين كوكبي الدجاجة والذرة المسلسلة || نجوما قليلة العدد بعضها ملون منها من المرتبة الرابعة .

### ١٨٦٣٥ - عَظَامِيَة \* ، سَقَامِيَة ، سَحْلِيَّة

Lacerta (S). Lézard (F). Lizard (E).

الظاينة والسقامة والمظامة ج عظام وظايات وظايات ، جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات . انواعه عديدة



عظيم



عظاية

Saurographie, Saurologie (F). **عَفَفَنَة** ١٨٦٦٦  
Saurology (E).  
المظنة علم يبحث في المظائيات على اختلاف فصولها وأجناسها.

Saurographique, **عَفَفَنِيَّة** ١٨٦٦٧  
Saurologique (F). Saurologic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمظنة.

**عَفَّار** ١٨٦٦٨  
شجر ينشد منه الزناد كالخرق. قال أبو حنيفة: «أخبرني بعض الإعراب أن العفار شبيه بشجرة الغبيراء ونورها أيضا كنورها وهو شجر غوار. ولذلك جاد الزناد. وأحدته عفارة».

Poudreuse (F). Powdery (E). **عَفَّارَة** ١٨٦٦٩  
أداة خاصة تدر بواسطتها مختلف المساحيق الحشورية والقاطورية المستعملة في مكافحة الحشرات والقطور والأصنام.

Noix (F). Walnut (E). **عَفَّارَة** ١٨٦٧٠  
المفازة هي الجوزة المأكولة. ج. عفار.

Capsule de coton (F). **عَفَّارَة** ، **بَيْتَم** ١٨٦٧١  
Nut of the cotton (E).  
العفارة والكنفة. ج. عفار وكنايف، هي جراء القطن المروقة عابياً بجوز القطن أو لوز.

Traitement curatif (F). **عَفَّاس** ١٨٦٧٢  
Curative treatment (E).  
العفاس ج. عفاسات هي العلاجات الشافية في الحيوان والنبات.

Fuligula (S). **عَفَّاس** ١٨٦٧٣  
Fuligule, Nyroca, Canard plongeur (F). Nyroca (E).  
جنس طيور مائية من عمارة العفاسيات وفضيلة البطيات. أنواعه عديدة جميعها من القواطع. أجسامها ربة قدرها قدر البطة الصغيرة. مناقبها مبطنة عريضة القاعدة. أوتارها بلقاء اللون فيها الأبيض مع الرمادي مع الآخر والأزرق والبنفسجي والأسود. ذكورها أزرع من أنثاهما وأكبر حجماً منها. قوتها الأسماك الصغيرة والقشريات وكل ما هو صغير في الماء تقتصمه بالفتس. وهي تغفل المياه البحرية على العذبة || تدثر في الأسر والقبس على ضفاف البحيرات. أنثاهما تضع من ٨ إلى ١٠ بيضات تحضنها وحدها من ٢٢ إلى ٣٣ يوماً.

**عَفَّاس أَبْيَض** ١٨٦٧٤  
Fuligula marila, Nyroca marila (S). Fuligule à collier, F. milouinan (F). Scamp (E).  
نوع من العفاس طولها نحو ٥٥ سم. أخضر الرأس، مطوق العنق، أسود الجوف والذنب، أبيض البطن، حنطي المنقاد، أحمر العين، أحمر الرجل.

**عَفَّاس أَبْيَض \*** ، **عَفَّاس كَبِير** ١٨٦٧٥  
Clangula glaucion, C. hyemalis (S). Fuligule de milouen, Garrot vulgaire (F). Several duck (E).  
نوع من العفاس يطول نحو ٦٥ سم. رأسه وجوفه إلى الفرة. سائر جسمه إلى البياض الناصع. منقاده أسود. يألف مياه المناطق الباردة والمعتدلة.

Ischion (F). Ischlum (E). **عَظْمُ المَعْدَنَة** ١٨٦٤٩  
Vomer **عَظْمُ المَبَكَّة** ، **مَبَكَّة** ١٨٦٥٠  
Os parietal (F). **عَظْمُ جِدَارِي** ١٨٦٥١  
Parietal bone (E).  
Os cotyloide (F). **عَظْمُ حَقِي** ١٨٦٥٢  
Cotyloid bone (E).

**عَظْمُ حَلَزُونِي** ، **عَظْمُ مَقْنُول** ١٨٦٥٣  
Os turbiné (F). Turbinal bone (E).

Os scaphoide (F). **عَظْمُ زُورَقِي** ١٨٦٥٤  
Scaphoid bone (E).

Os temporal (F). **عَظْمُ صُدْغِي** ١٨٦٥٥  
Temporal bone (E). هو الجزء المسئيل من عظم الفك.

Diaphyse (F). **عَظْمُ طَوِيل** ، **مُشَاش** ١٨٦٥٦  
Diaphysis (E).

Os coracoide (F). **عَظْمُ غُرَابِي** ١٨٦٥٧  
Coracoid bone (E).

Os membraneux (F). **عَظْمُ غِشَائِي** ١٨٦٥٨  
Membranous bone (E).

Osteolithe (F). **عَظْمُ مُتَحَجِّر** ١٨٦٥٩  
Osteolith (E).

Ethmoide (F). **عَظْمُ مُنْخَلِي** ١٨٦٦٠  
Ethmoid (E).  
العظم المنخل أو العظم القربالي أو العظم المنصفي هو ركيزة الأنف في الجمجمة.

Os sphénoide (F). **عَظْمُ وَتَدِي** ١٨٦٦١  
Sphenoid bone (E).

Osteux (F). **عَظْمِي** ، **عِظَامِي** ١٨٦٦٢  
Bony, Oseoux (E).  
نعت تعريفي يوصف به ما هو كالعظم طبيعة أو تركيباً أو شكلاً.

**عَظْمِيَّات** ، **كَلِمَاتُ العِظَام** ١٨٦٦٣  
Télostéens (F). Teleosts (E).

صيف من الأسماك يضم أكثرها. أجناسه وأنواعه عدة الاق تجميعها ثنائيات الفصائل وتقسيمها خمس رتب، هي: عصفليات الحياض، شائكات الزعانف، مفتوحات الخانة، ملحويات الفك، ولساوات.

**عَظْمِيَّاتُ الرُّؤُوس** ١٨٦٦٤  
Osteoglossidae (E).  
فصيلة أسماك نهريّة من كلمات العظام تتميز برؤوسها المالحوة بصفائح عظمية المادة. أجناسها وأنواعها قليلة العدد منتشرة في بعض أنهر وبحيرات البلاد الآسيوية والأفريقية والأمريكية.

**عَظْمِيَّاتُ الرُّؤُوس** ١٨٦٦٤  
Osteoglossidae (E).

Osséine, Ostéine (F). **عَظْمِين** ١٨٦٦٥  
Ossein, Ostein (E). العشاء الهلامي الموجود في العظم.



عفاس أبلق



عفاس أبيض

١٨٦٨٥ - عَفَّاصُ Bouchon (F). Stopper (E).  
صمام القارورة . عصفها : سدا بالعفاس .

١٨٦٨٦ - عَفَّائِيَّاتُ Paleodictyoptères (F).  
Paleodictyoptera (E).

طليقة حشرات من شعبة السرنجيات وطائفة المجنحات أصلاً .  
أنواعها وأجناسها وفصائلها عديدة تنضم إلى ثلاث رتب  
السرماطيات والزهريات واللوثديات . جميعها من مخلوقات  
الآزمنة الغابرة . أحاديثها تتوالى من الأواسط إلى الأواخر  
الأباج الأول || جميع حشراتنا كبيرة القصد وبعضها  
مستغنى .

١٨٦٨٧ - عَفَّالَةُ Epiphila (S).  
Epiphile (F). Epiphila (E).

جنس حشرات فراشية من فصيلة البشوريات ورتبة  
حرفشيات الاجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة المدد اعطائها  
بعض جبال امريكا الجنوبية || فراشاتها واسعة قوتها  
ريقق الازهار البرية . اساريها خاضعة تعيش على اوراق  
النبات || اجسامها معتدلة القصد طولها من ١٦ الى ٢٠ سم .  
سبطها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ سم . رؤوسها صغيرة ،  
ملونة . عيونها ناشزة ، كبيرة . قرونها الاستشعارية  
صولجانية . مراشفها دقيقة . جواشنها وبطنها مزينة او  
خالية . جميعها ملونة . رواشها غضبية متراكبة الاالوان .  
معظمها يلجج الزوج الاسامي المنقط بالابيض وبعضها  
يلجج الاسامي والخلفي || اعرف انواعها واكثرها انتشاراً  
العفالة المستحبة (Epiphila dilecta) .

١٨٦٨٨ - عَفَّانُ الرَّصْع Loque, Pourriture du couvain (F). Rag. Breeding-  
cells rot (E).

وصم جرثومي فتاك يدمم العاقبة يمتري رصع النحل يفتسي  
عليه || يكتافح بانتطاع أقسام الخنازيب المصابة وينقل  
النحل إلى قدير او خلية نظيفة ومطهرة .

١٨٦٨٩ - عَفَّةُ  
العفة «سكة جرداء بيضاء صغيرة مطبوخة كالراز» .

١٨٦٩٠ - عَفَجُ Duodenum  
المعج : ما ينتقل الطعام اليه بعد المددة ، وهو للسباع  
كلها بمنزلة المصارين لذوات الخف والثلث التي تؤدي  
اليها الكرش ما دفعت . ج اعفاج وعفجة .

١٨٦٩١ - عَفْدُ ، لَغِيدُ Lagopède (F).  
Lagopus (E).

جنس طير من عارة الخروسيات وفصيلة الطيوريات .  
انواعها ١٤ منظرها قطبي يألّف اسراج الجبال العالية .  
ثوبها مختلف الالوان . رأسها كاسي الريش . اجنحتها  
قصيرة بقع مستديرة . اذنيها قصير مستدير يتألف من  
١٤ ريشة . ارباضها كاسية حنّ مخالها . ج عفدان .  
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

١٨٦٩٢ - عَفْدُ أَبْكَمَ Lagopus mutus (S).  
Lagopède muet, L. des Alpes, L. ptarmigan (F).  
Ptarmigan, Willow grouse (E).

طائر من العفد، طولها نحو ٣٨ سم . ثوبه عديد الالوان ،  
دائم التغير ، يتبدل كل شهر ، تغلب فيه الصهبة والجزوء  
والبياض ، قوادمه واذنيكه وباطن سقطه سود || موطنه

١٨٦٩٦ - عَفَّاسُ أَشْهَبَ \* Nyroca ferina (S).  
Fuligule milouin (F). Pochard (E).

نوع من العفاس يطول نحو ٤٧ سم . رأسه وعقه الى الشبهة  
العالية ، جريئو وذنبه الى السوداء القمعي ، سائر اشهب  
اطحل . عيانه الى الحمرة . منقادده حطلي .

١٨٦٩٧ - عَفَّاسُ مَتْرُوحَ \* Netta rufina (S). Fuligule roussâtre, Brante rous-  
sâtre, Siffleur huppé (F).

نوع من العفاس طولها نحو ٥٥ سم . رأسه اصهب اللون  
منقوش الريش . عقه وجريئو وبطنه وذنبه الى البنفسجي  
الاسود المواجه ، جناحها الى الغبرة ، مناكبه يبيض . عيانه  
ورجله ومنقادده الى الحمرة .

١٨٦٩٨ - عَفَّاسُ مَصْرِيَّ \* Fuligula cristata, F. nyroca (S). Fuligule morillon,  
Sarcelle d'Egypte (F). Tufted duck (E).

نوع من العفاس طولها نحو ٤٢ سم . رأسه اخضر اللون  
اسمع المواجه . جسمه رمادي التوب . جريئو الى البنفسجي  
اللامع . عيانه الى الحمرة ، منقادده اطحل ، رجله الى السمرة  
الخطية .

١٨٦٩٩ - عَفَّاسِيَّاتُ Fuligulines (F).  
عارضة طير العفاس من فصيلة البليات .

١٨٦٨٠ - عَفَّاشُ Ovarula (S).  
جنس فطور مجهرية من الطليسات وفصيلة الطليحات .  
انواعه عديدة معظمها طفيف لا مؤذي . جرابه الكينيدي  
مجانبي الشكل ، غمي التجميع . كئانه يفضية او  
اهليجية . مشبهه خلوي الانتساب يركب السوق والاوراق  
فيقرح النسيج واليشرة .

١٨٦٨١ - عَفَّاشُ الْحَفَافِ \* ، عَفَّاشُ اُولِيكَا Ovarula obliqua (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الحامض فيلونها || منظره  
الخارجي بقع مستديرة فسيحة تظلمها من ٦ الى ١٥ سم .  
تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا . تبدو سمراء  
اللون ، حراء الحالة ثم تنصرف الى السمرة الكالفة التي  
يعقبها اليباس .

١٨٦٨٢ - عَفَّاشُ اللُّوْطُسُ ، عَفَّاشُ كَرَوِيَّ Ovarula sphaeroidea (S).

فطر مجهرى يمتري وريقات اللوطس فيملها || منظره  
الخارجي بقع يمر تركب النصل على صفحته العليا تستدب  
يباس البشرة يقابلها على الصفحة السفلى ندف خلي ،  
ابيض اللون تفرزه المسام الموبوءة .

١٨٦٨٣ - عَفَّاشُ التَّيْمُنِ \* Ovarula citri, O. Briosii (S).

فطر مجهرى يصيب ثمار الليمون الحامض في قشورها  
فيلونها || منظره الخارجي بقع رداية او بيضاء اللون  
تركب ثشرة الشرة قبل اكثال نموها فتشورها وتصلها .

١٨٦٨٤ - عَفَّاشُ السَّجِيلِ Ovarula pulchella (S).

فطر مجهرى يركب اوراق التيجيل على اختلاف انواعه .  
منظره الخارجي بقع صغيرة ، مستديرة ، ميمرة ، غبراء  
اللون ، تملو النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة  
السفلى ندف خلي اطحل اللون .



عفاس اشهب



عفاس متروح



عفاس مصري



عفاس الحفاف



عفاس الليمون



عفالة



عقد أبيض

الحارة والمعتدلة والحارة من العالم القديم || اجسامها شبه بيضية اللون ، تطول من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم ، قليلة التشويز ، يلحمها خلف الكويل . قرونها نازعة . ثآشيرها ضئيلة . كولسلها مستقيمة ، معتدلة الايدياد . اعماؤها لافحة ، نخلة التخديد القاطب . قوائمها نشيطة . انوثها متباعدة الخشاب تكثر فيها الحوة ثم الصمحة فالعرة || الحشرة الجلجلة ناصقة ، سريعة الحركة ، تألف ضفاد مجاري الماء العذب ، خاصة الضفاد الرملية حيث تنتمن بسرعة . البرقة والجمعة وبعضها غاضل .

#### ١٨٧٠٠ - عُقْرُونِيَّات ٥ Omophronidae (S).

Omophronidae (F). Omophronidae (E). فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المنطقة الشمالية وفي افريقية والهند || اجسامها شبه بيضية اللون . رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . مقدم جوشها يخلط حلقور اليريد . حافة البلورة مقوسة . كولسلها شبه منحرفة الشكل . مستقيمة القاعدة . اعماؤها نخلة التخديد القاطب الذي يمد ١٤ او ١٥ اعدوداً . قوائمها نخلة ، معتدلة الطول || مكها شبه اسطواني الشكل ، تمتد افرادياً في التربة . يرقاتها سداسية القوائم . قوائمها سداسية الغمل . دورياتها عريضة تتحور في التربة داخل رواق انبوي الشكل || تعيش على ضفاد مجاري الماء . معظم اجناسها غاضل وبعضها مفترس والبرقة كذلك لكنها لا تسرح في البال || اشهر اجناسها العُقْرُون .

١٨٧٠١ - عُقْرِي Pulverulent (F). Pulverulent (E). ثبات وصن يدل على الزغب الخمل الذي يفضي بعض الاجزاء البائية والحويانية .

#### ١٨٧٠٢ - عُقْرِي ٥ Actinophrys (F). Actinophrys (E).

جنس حيونات مجهرية بحرية من الشمسيات . تتميز بجلها من الهيكل الصواني الذي تقوم مقامه حويصلة كروية نابضة تكتنفها المناسخ اللزبة .

١٨٧٠٣ - عُقْصَة ٥ في السقيط . اطليه .

١٨٧٠٤ - عُقْص ٥ هو سندان البرتقال ، اطليه .

١٨٧٠٥ - عُقْص ٥ هو المطان ، اطليه .

#### ١٨٧٠٦ - عُقْصَات Tannate

١٨٧٠٧ - عُقْصَة Cécidie, Galle, Bédégaur (F). Bédégaur, Rose-gall (E).

بثرة مخلفة الاشكال تحصل في نسج النبات تسببها بعض الحشرات او الفطريات || اشهر انواعها واشكالها ما يتبع .

١٨٧٠٨ - عُقْصَة القُمَّل Acarocécidie (F). بثرة في نسج النبات يسببها القمل .

#### ١٨٧٠٩ - عُقْصَة جُرْنُومِيَّة ، عُقْصَة بَكْثِيرِيَّة Bactériocécidie (F).

بثرة تسببها الجراثيم والبكتيرياات التي تتطفل على النباتات اغصها التجليات ونسبها الزروع .

الجبال العالية والقمم الريفية . قوته الاعشاب والجذور والبرام والارواق والثمار والحبوب على اختلافها || ينش في الخلع . اثناء تبيض من ٨ الى ١٠ بويضات .

#### ١٨٦٩٣ - عُقْدَة أَيْض \* Lagopus albus (S).

Lagopède blanc (F). White grouse (E). طائر من العفد ، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع ، اياهو وانثيك الى السرة . اما ثوبه الصبي الرسمي فالى الصبغة والصفرة والجؤوة يعلوه توضيح اسمر ومواج اسف || موطنه المناطق الشمالية . قوته المواد النباتية على اختلافها وبعض الحشرات || اثناء تبيض من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر في عش تدثه في بعض الجنبات الفتاة دائماً باتجاه الجنوب .

#### ١٨٦٩٤ - عُقْدَة إِيْكُوسِيَّة \* Lagopus scoticus (S).

Lagopède d'Ecosse (F). Red grouse (E). طائر من العفد ، طوله نحو ٣٧ سم. ثوبه الشتوي والصبي واحد . يكثر فيه الياض ، قوامه وياهو وانثيك الى السرة الفحمية || موطنه شمالي انكلترا ، يألف المناطق والبيصيرات ، قوته الاعشاب والارواق والبرام والثمار والحبوب || ينش عشه في الخلع ، اثناء تبيض من ١٠ الى ١٢ بيضة .

#### ١٨٦٩٥ - عُقْدَة وَد \* Anchomenus (S).

Anchoméne (F). Anchomenus (E). جنس حشرات جدوية المسرح مفترسة ناعمة من مفصليات الاجنحة وفصيلة السلكوتيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق المعتدلة والحارة والمشرقة نحو الباردة || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٧ سم. انوثها بمظهرها عابقة الالوان السوية . يكثر فيها الاسود والكسبي || يرقاتها مفترسة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة .

#### ١٨٦٩٦ - عُقْر Sanglier (mâle) (F).

Wild boar (male) (E). هو ذكر الخنزير الوشي . ج عقار واعفار .

#### ١٨٦٩٧ - عُقْرَاة ، عُقْرَة ، عُقْرِيَّة Camail (F).

Hood (E). هي ريش عتق الديك وتعرف أيضاً بالبرائل .

#### ١٨٦٩٨ - عُقْرُون القشور ٥ Aphrophora corticea (S).

Aphrophore des écorces (F). حشرة من فصيلة السركوبيات ورتبة متجانسات الاجنحة .

جسمها صغير القد بطول من ١٠ الى ١٢ مم. || ثوبها متراكب الاصفر والخطي والاسود والانيير . رأسها حلالي الشكل ، اسفر اللون ، اسود الوجهة . عظمها ثلاثي الاجزاء اسود . عينها كبرتان . زربانها قصيران . كولسلها مشع بالاسمر والاسود . حقيفتها صغيرة . ظهراتها كامل الحنجرة ، لاصف ، حنطي اللون يعلوه تمشيح اسفر وزغاريف بيضاء وسوداء . روشنها غشائيان . بطنها الى الحنطي الاسمر . قوائمها مبلقة || مسرحتها حراج الصنوبر . تعيش بين القشور وتحتها . يرقاتها غاضلة تعيش على اوراق الاعشاب .

#### ١٨٦٩٩ - عُقْرُون ٥ Omophron (S).

Omophron (F). Omophron (E).

جنس حشرات ناقصة من فصيلة الغفرونات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في بعض المناطق




عقد أبيض



عقدود



عقرون



عقريس

- Drogail** ١٨٧٢٢ - **عَفَصَة حَشْرِيَّة** (F). Entomocécidie (F).  
بثرة تسببها الحشرات عند لسعها أوراق النبات .
- Ovulariopsis (S).** ١٨٧٢٣ - **عَفِيشَة** (S). Nématocécidie (F).  
جنس فطور مجهرية ، وسية النوع ، من الطليقات  
وفصيلة الوبليات || جرابه الكنيدي اسطواني الشكل  
يحمل في طرفه كنيذة واحدة بيضيه || نومه المروف  
عفيشة القطن .
- Ovulariopsis gossypii (S).** ١٨٧٢٤ - **عَفِيشَة القُطْن** (S).  
فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها || مظهره  
الخارجي يقع خلية ، قصيرة الزغب ، لا قياسية الشكل  
والحجم ، تملأ النصل فتبدو كالارمداد || اضراره  
محدودة ، وثيقة الصلة بكثرة الرطوبة الجوية ، لا تستوجب  
المكافحة .
- Amphicyllis (S).** ١٨٧٢٥ - **عَفِيل** (S). Amphicyllis (F).  
جنس حشرات من فصيلة الليديات ورتبة عثديات الاجنحة  
انواعه المروفة قليلة العدد اعطائها منظم مناطق البلاد  
المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودة ، نصف  
كروية الشكل ، تقطو نحو ٣ م . رؤوسها مستعرضة .  
عينونها قليلة البروز . تأشيرها وفكوكها قياسية . ملاسها  
الفكية قصيرة . قرونها الاستشعادية صويغانية . كواسها  
مستعرضة . اعماؤها لافحة . قوائمها خشقة ، مهدبة .  
اثوابها لامة يكثر فيها الجؤوي والاسود البنفسجي المواج  
والكتشي الاسفع || تعيش على الفطور وعلى الاختشاب  
السائرة الى الاحتلال .
- Ptomaine (F). Ptomain (E).** ١٨٧٢٦ - **عَفِين** (E).  
عنصر قلوي التّركيب ينتج من انحلال المواد العضوية .  
ج عفينا .
- Jauge (F). Trench (E).** ١٨٧٢٧ - **عَقِي** (E).  
حفرة مستطيلة في الارض توضع فيها الفراس المقلوعة من  
المشتل ريثما تفرس في مستورها .
- H'Aigle (F). Aquila (E).** ١٨٧٢٨ - **عَقَاب** (E).  
العقاب كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين كوكبة  
حور وسية وكوكبة الدلفين . عدد نجومها ١٥ اشهرها  
« الطير » او « النسر الطائر » الذي يولج النسر الواقع  
من كوكبة القيثارة . ثم « الشاعين » و « ذب العقاب »  
و « انور الظليين » في ذنب العقاب .
- Aquila (S). Aigle (F). Eagle (E).** ١٨٧٢٩ - **عَقَاب** (E).  
جنس طير من الكواس وفصيلة الصقريات يشغل اقبل  
الجوارح واعتادوا واشدها بأساً وابيسها مزاجاً واحداً بصراً  
واسرعها طيراناً || انواعه عديدة بعضها مسرولة ، قوية  
الغالب الحادة ، قصيرة المناسر ، بحجة البهائر الذرية .  
تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا عضها الجوع .  
تدثر اوكنانها في قم الجبال بين الصخور الناتئة او في  
قنان الاشجار الباسقة . انائها تقع من رقتين الى اربع  
رقات تحضنها وسدها نحو ٦ اسابيع || قيل فيه : العقاب  
سيد الطيور والنسر عريفها . كنيته ابو الاشيم وابو الحجاج  
وابو حسان وابو الدهر وابو الحمى . واللاتي ام الحوام  
وام الشمور وام طلبة وام لوح . ومن اسمائها : سهوم  
لقوة وعقاف مغرب || اشهر انواعه ما يتبع :
- ١٨٧١٠ - عَفَصَة حَشْرِيَّة** (F). Entomocécidie (F).  
بثرة تسببها الحشرات عند لسعها أوراق النبات .
- ١٨٧١١ - عَفَصَة سَلَكِيَّة** (F). Nématocécidie (F).  
تقضم في نسيج النبات سببه بعض الحشرات السلكية .
- ١٨٧١٢ - عَفِيشَات** (F). Gallicoles (F).  
هي الآرات فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة .
- ١٨٧١٣ - عَفِيشَة** (S). Cynips (S).  
جنس حشرات من فصيلة الآبرات . راجع آبرة .
- ١٨٧١٤ - عَفِيط** (F). Ebrouement (F).  
نثر الشاء بأنفها او عطاس الماعز .
- ١٨٧١٥ - عَفَن** (F). Chancissure, Moisissure (F). Mustiness, Mouldiness (E).  
فساد من تودة او غيرها يصيب المأكول والبار والمسالق  
والحبوب .
- ١٨٧١٦ - عَفِن** (F). Chanci, Moisi (F).  
ما هو مصاب بالفن .
- ١٨٧١٧ - عَفَنُوس الصَّوَّسَر** (S). Aphanus pineti (S).  
Aphanus des pins (F).  
حشرة خاضعة من فصيلة الطريبات ورتبة مختلفات الاجنحة .  
جسمها مستطيل الشكل ، مبسط ، يقطو نحو ٨ م .  
رأسها شبه مخروطي الشوذن ، اسود اللون . غطلمها متدل  
الطول ، اسود . عينها صغيرتان . زباناها مستطيلتان .  
كوسها مغرب النصف الخلفي ، اسود النصف الامامي ،  
يعلو في كل من جانبيه نقطة سوداء تاتخ القاعدة .  
حجفتها مزوانية ، سوداء ، يعلوها خطان مذهبان . بطها  
اسود اللون ، ابيض الخثار . قشراتها اغبر . قوائمها مسنة  
الفتايب || مسرحها غابات الصنوبر . تركب ازهار  
واوراق النباتات البرية .
- ١٨٧١٨ - عَفَنِيَّات** (F). Mucorinées (F).  
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة النظريات ورتبة البيضيات .
- ١٨٧١٩ - عَفَر** (F). Anon (F). Ass's foal (E).  
ولد الحمار والاتي عفوة . ج عفاه .
- ١٨٧٢٠ - عَفُوس** (S). Aphycus (S).  
Aphycus (F). Aphycus (E).  
جنس حشرات ناعمة من فصيلة الزرافيات ورتبة غشائيات  
الاجنحة المضمورة . انواعه المروفة قليلة العدد موطنها  
بعض مناطق البلاد الحارة . جميعها تستغل على الحشرات  
المؤذية من ذوات الجناحين والحرفشيات || اجسامها صغيرة  
القد تقطو نحو ١ م . رؤوسها نصف دائرية الشكل .  
قرونها الاستشعادية خيطية . جواسنها اسطوانية . بطونها  
قصيرة ، مخروطية المؤخر ، مهدبة التراجا . مرزاتها  
قصيرة . اثوابا ترازو من الوردى الى البني . اجنحتها  
موشجة بالازرق الفاتح .
- ١٨٧٢١ - عَفُوسَة** (F). Pourriture (F).  
Rot, Rottenness (E).  
اسم شامل يطلق على عدة اوصام تصيب النبات مختلف  
انصافه سببها فطور مجهرية مختلفة .



عَفِيل



### ١٨٧٣٠ - عُقَاب مُسَيَّرَة ، عُقَاب البَادِيَة ، خُدَّارِيَة

*Aquila pennata, A. minuta, A. nipalensis* (S). *Aigle botté, A. nain, A. des steppes* (F). *Steppe eagle, Booted eagle* (E).

طائر من العقاب الصغيرة القد ، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١٢٠ وهو اسمر السطحين الظهر والذنب ، ابيض المنكبين والصدر والبطن || اصطناعه البلاد الحارة والممتدة بجوها باستمرار وهو لا يفرق الاسراج الكثيفة والبادية لكنه لا ينقطع من ورود مجاري الماء || والعقاب المسيرة تأثت الحياة المجاعة سربها براوح بين ثلاثة رسة ازواج . تصيد القوامس والبرقش والرزوز والزاغ . انتاء تحض مرة واحدة في السنة من رقتين الى ثلاث رقتان.



عقاب ذهبية

### ١٨٧٣١ - عُقَاب مُؤَزَّرَة

هي السهوك ، طائر من العقاب ، اطلبه .

١٨٧٤٠ - عُقَابِيَة . *Biogenèse* (F). *Biogenesis* (E). نظرية بيولوجية تماكس النظرية الثالثة بالتنازل الذاتي . عووها ان كل كائن حي يتولد من كائن حي آخر .

١٨٧٤١ - عُقَادَة . *Insolubilité* (F). *Insolubility* (E). صفة الاشياء التي لا تنحل .

١٨٧٤٢ - عُقَار هو الحمر ، اطلبه .

### ١٨٧٤٣ - عُقَار ، عَيْن ثَابِتَة

*Immeuble, Bien-fonds* (F). *Real, Real property, Estate* (E).

هي مال لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بتخصيصه والايان الثانية تصنف الى اربع اقسام : || الاولى : الاموال الثانية بطبيعتها وهي التي لا يمكن نقلها من مكانها بحكم طبيعتها كالارض والشجر والمنازل || الثانية : الاموال الثانية بالتخصيص وهي بطبيعتها اعيان منقولة الا ان صاحبها الحقها بين ثابته فأكسبها القانون صفة الثبوت . الثالثة : الاموال الثانية بالاضافة او بالتعلق وهي حقوق تنصب على عين ثابته غير حق الملكية || الرابعة : الاموال الثانية بالقرار المالك وهي حقوق منقولة يفيض عليها صاحبها صفة الثبوت مجازاً باقرار منه .

١٨٧٤٤ - عُقَار مُرْتَفِق . *Fonds dominant* (F). العقار المرتفع او المخدم هو الذي يتفوق من الارتفاق .

١٨٧٤٥ - عُقَار مُرْتَفِق بِهِ . *Fonds servant* (F). العقار المرتفع به او المخدم هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر .

### ١٨٧٤٦ - عُقَار

العقار : عشية ترتفع قدر نصف القامة وثمره كاليندق وهو مفض البتة ولا يأكله شيء حتى انك ترى الكلب اذا لايه يموي ، ويسى عقار ناعمة . وناعمة امرأة طينته رجا ان يذهب البلع بفائلته فأكلته فقلتها (اللسان) .

١٨٧٤٧ - عُقَارِي . *Foncier* (F). *Landed* (E). كل ما له صلة بالعقار كالمصرف العقاري والفرية العقارية الخ .

### ١٨٧٣٠ - عُقَاب البَادِيَة

هي العقاب المسيرة ، اطلبه .

### ١٨٧٣١ - عُقَاب البَحْر

هي المورينا ، سمكة من الشفنيات ، اطلبه .

### ١٨٧٣٢ - عُقَاب البَحْر الجَفَّاعَة

*Mourine commune* (F). هي المورينة المبلولة ، سمكة بحرية ، اطلبه .

### ١٨٧٣٣ - عُقَاب الشَّط

هي الشبقة الثامنة ، اطلبه .

### ١٨٧٣٤ - عُقَاب ذَهَبِيَّة \* ، عَجَز ، لَمَّاعَة

*Aquila fulva, A. chrysaetus* (S). *Aigle doré, A. royal, A. fauve* (F). *Golden eagle* (E).

طائر من العقاب وهو اجملها قدراً واصطناعها جنة واصندا بأساً وبطشاً . طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطه سقطة نحو ٣٠٠ سم. ثوبه الى الصبهة المحطية يملوها توشم اسمر . رأسه وفتحه ذهبيا الريش . اما باطن سقطة فكثير البياض . زيمكاه كدراء اللث . ذنبه الى الصبهة السمر . يملوها تجذع مفرض || تأثت الجبال الشاهقة المنية ، تنش وكها في صدوع الصنوبر الناتئة او في اعالي الاشجار الكبيرة الباسقة . انتاء تبيض مرة في السنة نحو ثلاث رقتان تحضها وسدعا نحو ستة اسابيع || وهي تصيد كل ما دب وطار واستطاعت اليه سيكاً . وقد تقفل الشولة والبول والمخزاة واحمل ثم الثعلب والكلب والرزب والسنور . لكنها لا تمتع من البيل والارانب والسمور والقتذ والقاق والزاغ واحمل البع .

١٨٧٣٥ - عُقَاب رَحْمَاء هي الرخاء ، اطلبه .

### ١٨٧٣٦ - عُقَاب سَقَعَاء \* ، عَصَر الْأَوْتَب

*Aquila clanga, A. nevia* (S). *Aigle criard* (F). *Spotted eagle, Rough-footed* (E).

نوع من العقاب كبير الجثة ، طوله نحو ٧٢ سم. وبسطه سقطة تفوق ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمره الموشمة يملوها موشج اسفر زديعا لمة واسوداداً || اصطناعها العالم القديم وهي من الطيور الآبئة التي لا تهر عطشا اثناء شتداد الحر في ايام الصيف لتعود اليه عند قدوم الشتاء كما تأثت مجاري الماء وترغب في الاساكن الرطبة || انتاء تحض رقتين مرة واحدة في العام وحضها يدم ستة اسابيع . وهي من الطيور الثالثة الواجب حمايتها لانها تقضي على جميع القوامس والزناجات بما فيها الاناعي .

### ١٨٧٣٧ - عُقَاب قَبْصِيْرَة \* ، خَالِطَة ، خَطَابِيَة مَلِك المَعْيَنَان

*Aquila imperialis, A. heliaca* (S). *Aigle impérial* (F). *Imperial eagle* (E).

طائر من العقاب كبير الجثة ، طوله براوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. وبسطه سقطة من ٢٤٠ الى ٢٦٠ سم. ثوبه اصدا الصبهة ، اسفر الموشج . ذنبه متجاسر الريش يملوها توشم عريض لا يقاسي الشكل والحليم || وهو من القوامع التي تجرب الماء . يأث الاسراج والسهول ولا يخش الاساكن الاكلة . يلد ركنه في فنان الاشجار القريبة او في صدوع الصنوبر الناتئة . انتاء تحض وسدعا مرة في العام من رقتين الى ثلاث رقتان || يصيد الاريل والياور والثعلب وكبير الطير ويقضي على جميع القوامس من اي نوع كانت.



عقاب سقعا



عقاب قيصرية

الشكل . اذناها مجدافية . اثوابها مبقجة تكثر فيها الكلبة الصفراء يملؤها تبقج اخضر بنفسي الموج .

١٨٧٥٤ - **عَقَان ، مَلَخ** (F). Dragon (F). Sucker (E). قضيبي ينمو من برعة عرضية ناشئة على ارموة او جذر بعض النباتات المقة .

١٨٧٥٥ - **عَقِب** (F). Calcanéum (F). Calcanéum (E). هو مؤخر القدم .

١٨٧٥٦ - **عَقَب** (F). To vary or rotate (E). Assoler (F). رتب الزراعات الحقلية على طريقة دورية تماثية وفقاً للمحاصيل خاص يعرف بالدورة الزراعية .

١٨٧٥٧ - **عَقْبَان** (F). Alges, Aquilions (F). Eagles, Aquila (E). عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ثمانية اجناس وهي العقاب والهوك والنس والبقعة والدولف واليمنق والبشيلة والسرئوف . جميعها كبيرة الجثة قوية المنسر الجالس الانتشاب الاسحين البهرة الشديدة الانعقاد الحادة الطرف .

١٨٧٥٨ - **عَقِيبِي** (F). Calcanéen (F). Calcanéal (E).

١٨٧٥٩ - **عَقِي** (F). Biogène (F). Biogen (E). نمت ترميزي يطلق على ما يحدث الحياة او ينشط الخصائص الحيوية ويهضها .

١٨٧٦٠ - **عَقَمَة ، عَقِمَة** (F). Variété (F). Variety (E). هي القرب ، اطلبه .

١٨٧٦١ - **عَقْد ، قَوْس** (F). Cintre (F). Arch, Curve (E). هو القوس الخشبي الذي يستعمل لبناء المقعد عليه وهو البناء على شكل قوس .

١٨٧٦٢ - **عَقِيد** (S). Trachelospermum (S). Trachelosperme (F). جنبة عارشة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها متعاقبة منعقة اييدة . نصلها يبيضي الشكل ذرب الزايم الاخير يطول نحو ٧ سم . ويرى ٤ . وهي طيبة ناعمة تلسم المرحاح بسرعة ويدون زئل || ازهارها يضاء اللون ، عرفة الزائحة ، عذقية التجميع ، تاجية الارتكاز . ثمارها جراء اسطوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم . بزورها مستطيلة القزعة البورية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٧٦٣ - **عَقْد** (F). Nouaison (F). راجع انتقاد - هو ن النبات بدء تكوين البزرة بدء اتصال الواليج بالبيضية اي بعد اخضاعها .

١٨٧٦٤ - **عَقْد ، عَمَل ، تَصَرَّف** (F). Acte (F). Deed (E). هو الایابة التي تلتقي آثاراً قانونية وقد صار تدوينها في وثيقة كتابية تثبت عصها .

١٨٧٦٥ - **عَقْد** (F). Contrat (F). Contract (E). المقعد والتماقد هو توافق الادارة بين اثنين او اكثر على انشاء التزامات فيما بينهم .

١٨٧٤٨ - **عَقَاصَةُ الْعَبَب**

هي اوديس الكرمه ، اطلها .

١٨٧٤٩ - **عَقَاصَة** (F). Dent canine de la vipère (F). Canine tooth of the viper (E).

هي التيب المدببة الطرف ، الانبوية او المخددة التي تستعملها الانبي لبخ السم . ج عَقَاف .

١٨٧٥٠ - **عَقَافَةُ الْوَرْد** \*

Argyroploce ochroleucana (S). Argyroploce du rosier, Tordeuse du rosier (F). Argyroploce ochroleucana (E).

حشرة من فصيلة القاتلات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها معتد من الشرق الادنى الى ارموة . فراشها صغفة تعيش على غزونها الاملائي . سرقتها خاضعة تعيش على اوراق الورد بعد ان تحلقها بشياخ من التواس . جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٨ سم . بسطها ترابح من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدل الحجم ، صغير الحظم ، الشهب اللون ، سيوري الموج . عينها زهيتان ، صغرتان ، ناشرتان . زباناها غيطيان . ملاسها الفككة والشغوية قصيرة . مرشها جعدة . جوشها ويطنها الى الشبهة . روشتها الاملايان الى المصلحة الزاهرة يملوها تجنح اشهب تكتنفه ماجة زرقاء . روشتها الخلفيان الى الشبهة السيورية . اهدابها عابية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر نيسان وفراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار . والانثى تلقي المكن مباحدا او لطخاً صفرة ورتبة المدد تطلقها مادة غروية تقبها على الصفحات العليا من نصال الاوراق || الطور البريبي يستمر في الجيل الاول نحو ثمانية اسابيع ويستمر في الجيل الثاني نحو ١٧ اسبوعاً وينتضي على الاوراق التي تعقها السرقه وتعيش في داخلها على الخضيب والعصاره || السرقه عند الادراك التام تطول نحو ٢٠ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستضخم الوسط ، اخضر اللون ، اصفر الموج ، يملو في كل سكة من سكم البطن طوق من الثوم السريد المنويته بالهلب . رأسها ودقها الصدرية الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٠ اسبوعاً وينتضي ضمن ورقة مفتولة كالبوق ومشبكة بخيوط حريرية المادة .

١٨٧٥١ - **عَقَاق ، عَقَق** (F). Gestation (F). Pregnancy (E). المَعَقَّاقُ والمَعَقُّ : الحمل عند الحيوان عامة وعند ذوات الحافر خاصة . والحامل من ذوات الحافر تدعى المَعَقَّق ج عَقَّقَ وعَقَّقَ .

١٨٧٥٢ - **عَقَاقِير** (F). Drogues (F). Drugs (E). ما يتناول به من الادوية . وقال الجوهري : العقاقير اصول الادوية .

١٨٧٥٣ - **عَقَاقِم** \*

Platurus (S). Plature (F). Platurus (E). جنس حيات خفيفة سامة من اساميات الاخاديد وفصيلة الحيدرويات . انواعه المروفة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد المخرة اخضعها البحر الاخر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مبطلة مستطيلة ، تطول من ١٢٠ الى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة شبه مخروطية



عَقَافَةُ الْوَرْد



عَقَام

18779 - **عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ** (F). Contrat à titre onéreux

هو ما اخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما أعطى .

18780 - **عَقْدُ الرَّعْدِ ، مَتَشْرُوعُ الْعَقْدِ**

Avant-contrat (F). Advance contract (E).

هو الاتفاق الوقفي ينشأ مع تحديد المسؤولية للمفاته على تحقيق الاتفاق المقبل .

18781 - **عَقْدُ الْوَكَالَةِ ، تَوْكِيلٌ ، وَكَالَةٌ**

Mandat (F). Mandate (E).

عقد يجزى به المرء غيره أن يفعل باسمه شيئاً له . أما صيغ الوكالة فمفيدة منها العامة والخاصة والسريعة والضمنية والتشريعية والنيابية .

18782 - **عَقْدُ بَيْعٍ تَامِيهِ**

Contrat pignoratif (F). Pignorative contract (E).

عقد اقترض على شكل البيع بالوفاء ببيع به المقرض عقاراً إلى المقرض ولكنه يحتفظ بحجزة العقار المبيع ويدفع سنوياً المقرض فوائد قرضه .

18783 - **عَقْدُ تَبَادُلِيٍّ ، عَقْدُ مَلْزَمٍ لِلطَّرَفَيْنِ**

Contrat synallagmatique (F). Indented deed (E).

هو الذي يلتزم به كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق الآخر كمقتد البيع فانه يتقابل فيه التزام البائع بتسلّم ملكية المبيع وتسليمه . والزام المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع .

18784 - **عَقْدُ تَبَرُّعٍ** (F). Acte à titre gratuit

عمل قضائي قوامه تملك حق أو مال بلا بدل يؤخذ أو معاوضة تشترط .

18785 - **عَقْدُ تَبْعِيٍّ** (F). Contrat accessoire

Accessory contract (E). هو ما كان تابهاً لمقد أصلي قائم قبله كالكفالة والرهن .

18786 - **عَقْدُ تَحْفَظِيٍّ ، عَمَلٌ تَحْفَظِيٌّ**

Acte conservatoire (F). Acte conservatoire (E). عمل يراد به انقاذ مال من خطر ملح .

18787 - **عَقْدُ تَرَاضٍ** (F). Acte consensuel

Consent deed (E). هو العقد الذي يكفي لانقاده الإيجاب والقبول بين العاقدين مهما كانت طريقة اجرائه .

18788 - **عَقْدُ تَوْكِيدٍ** (F). Acte confirmatif

Confirmative deed (E). عقد قانوني يزِيل به عاقده عيوباً كانت لصيقة بعقد سابق .

18789 - **عَقْدُ جَمَاعٍ** (F). Contrat collectif

Collective contract (E). هو الذي ترتب له أفراد جماعة معينة بمجرد رضاه متوجهاً .

18790 - **عَقْدٌ حَكَمِيٌّ** (F). Quasi-contrat

Implied contract (E). العقد الحكمي أو شبه العقد تسمية تطلق على الالتزامات التي يتكبد مبدعيها أعمال إرادية محض قد ينتج منها تمهيدات للتبرير كالفصالة ودفع غير المستحق ، الخ .

18791 - **عَقْدٌ عَلَى التَّخْصِيسِ**

Acte à titre particulier (F). هو تملك عين أو أعيان مملوكة أربابها .

18796 - **عَقْدٌ احْتِيَالِيٌّ** (F). Contrat aléatoire

Aléatoire contract (E). ويدعى عقد المخاطرة أو عقد الفرر . عقد يشترط فيه المتعاقدين أو أحدهم حدثاً من الربح أو أماناً من الخسارة إذا وقع حادث غير مضمون الحدوث .

18797 - **عَقْدٌ إِدَارِيٌّ** (F). Contrat administratif

Administrative contract (E). هو كل عقد تنفذه الادارة في سبيل انجاز اعمال عامة او خاصة مردها المنفعة العامة او الخاصة .

18798 - **عَقْدٌ أَوْسَاسِيٌّ** (F). Contrat solennel

Solemn contract (E). هو الذي لا يكفي لانقاده اقتران القبول بالإيجاب بل لا يكون صحيحاً إذا لم تتبع في تكوينه مراسم خاصة حددها القانون .

18799 - **عَقْدٌ اسْتِيفَاقٍ** (F). Fiducie

عقد يلتزم به مشتري العقار ظاهراً بأن يرده الى البائع حيناً يعني له بالاتزامات التي قطعها على نفسه نحوه .

18790 - **عَقْدٌ إِسْنَادِيٌّ** (F). Acte attributif

Attributive deed (E). هو عقد موضوعه نقل حق الى شخص أو استئاده اليه .

18791 - **عَقْدٌ أَصْلِيٌّ** (F). Contrat principal

Principal contract (E). هو ما كان مستقلاً عن عقد آخر كالبيع والايجار .

18792 - **عَقْدُ الْإِذْعَانِ** (F). Contrat d'adhésion

Adhesion contract (E). هو عقد وضع شروطه الجبرية مقدماً أحد طرفيه ليتعامل بها مع كل من يرغب في التعامل معه .

18793 - **عَقْدُ التَّبَرُّعِ** (F). Contrat à titre gratuit

Gratuitous contract (E). عقد يولي به أحد الطرفين الطرف الآخر فائدة بلا عوض .

18794 - **عَقْدُ التَّرَاضِيِّ** (F). Contrat consensuel

Consensual contract (E). هو الذي يكفي لانقاده اقتران القبول بالإيجاب .

18795 - **عَقْدُ الْجُرُزِ** (F). Vipère commune

Common viper (E). حيّة عقيمة سامة تدعى أفعى مبذولة . اطلبها .

18796 - **عَقْدُ الْخَطِطَيْنِ**

عقد الخطين كوكب ثير من الرشاء . اطلب رشاء .

18797 - **عَقْدُ الْعَمَلِ** (F). Contrat de travail

Labour contract (E). هو التعاقد الذي يرصد اربو به نشاطه ومعارفه على خدمة اربو آخر فيسمل تحت اشرافه مقابل جعل يدعى اجرة . وهو في العرف الشائع التعاقد الذي يمل بموجبه العامل لدى رب العمل .

18798 - **عَقْدُ الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ**

Contrat collectif de travail, Convention collective de travail (F). Collective contract of labour (E). هو تعاقد جامع يرم بين رب العمل أو مئطليه وبين مئطلى إحدى النقابات . موضوعه تنظيم شروط العمل التي تحدد على اساسها العقود الفردية بين رب العمل واعضاء هذه النقابات .

## ١٨٨٠٦ - عَقْدَةٌ خَتَاوِيَّةٌ، عَقْدَةٌ دَرِيَّةٌ

في السُلْمَةِ ، اطْلِبْهَا .

## ١٨٨٠٧ - عَقْدَةٌ

بِكَيْتَرِيَّةٍ مُسْتَدِيرَةِ الشَّكْلِ تُعْرَفُ بِالسَّبِيحَةِ ، اطْلِبْهَا .

## ١٨٨٠٨ - عَقْرَبٌ ، قُصْبُلٌ

Scorpio (S). Scorpion (F). Scorpion (E).

المعرب للذكر والانثى على السواء. ج. عقارب. وعند التخصص يقال للذكر عقربان وللأنثى عقرباء وعقربة || والمعرب جنس دوبيات خبيثة سامة من فصيلة الشبديات ورتبة المعربيات. أنواعه عديدة مختلفة الاحجام والالوان. طولها يراوح بين ٢ و ١٥ سم. جميعها دجوية تسرح وتسمى في الليل وتختبئ في النهار. تحمل في طرف ذنبها ابرة مننقة، حادة الحمة، جوفاء. تتصل بها غدتان تفرزان مادة قلوية سامة. وهي تستعمل ابرتها للدفاع عن النفس او لتخدير وقتل فريستها من المظاء الصغيرة.

## ١٨٨٠٩ - عَقْرَبٌ اسودٌ ، عَقْرَبٌ اصفر

الدَّثَبُ

Euscorpion flavicaudis (S).

Scorpion noir, S. à queue jaune (F).

Black scorpion (E).

نوع من المعرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. جسمه صغير القد ، اسود اللون ، اسير الذنب الخفي المارح. يملك سحبي التركيب مفلطح الشكل ينتهي بذنب معطل الشخانة ، سداسي السك ، يحمل في اوله ميثطان يفلغان الشوار الجنسي ويحمل في طرفه شولة مننقة حادة جوفاء يستعملها في بث سمه. عيناها مركبتان ضعيفتا البصر القصير المجال. مقبناه الفكاي كبيرا الجرم. ميثطاه دقيقا الانثان التي يبلغ عددها عشرة ازواج عند الذكر ١٢ زوجا عند الانثى || الذكر اصغر قدما من الانثى، يطول نحو ٣٥ سم. اما الانثى فتطول نحو ٤٥ سم. || مسرعه دجوي. قوته الحشرات المختلفة الاجناس وسكبها ويراقها || الانثى تسافد بعمر ثلاث سنوات وتعيش نحو خمس سنوات. اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدوبيات المؤذية الفارسة.

## ١٨٨١٠ - عَقْرَبٌ اصفرٌ ، شَبْدَعٌ اصفر

Buchus australis (S). Buchus jaune, Scorpion

jaune (F). Yellow scorpion (E).

نوع من المعرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمه كبير القد ، اصفر اللون الباهت. يملك مفلطح ينتهي بذنب مبسط سداسي السك. شوكه قوية مننقة جوفاء حادة الحمة. لدغته مؤلمة. سمه شديد الاذى || عيناها مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات. مقبناه الفكاي مستنسا الحافة للاتطة. ميثطاه كثيرا الانسان التي تبلغ عند الذكر ٣٠ زوجا. وعند الانثى ٣٢ زوجا || الذكر اصغر قدما من الانثى ، يطول نحو ٦٥ سم. وتطول الانثى نحو ٨٠ سم. مسرعه دجوي. قوته كل ما دبت واستطاع اليه سبيلا || الانثى وتلد شبيدة تعيش نحو ست سنوات وتسافد بعمر سنتين. الذكر يعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدوبيات الشديدة الاذى والضرر.

## ١٨٨١١ - عَقْرَبٌ اكْمَةٌ ، رُشْكٌ

Belisarius (S). Bélisar, Scorpion aveugle (F). Blind scorpion (E).

نوع من المعرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. موطنه

## ١٨٧٩٢ - عَقْدٌ عَلَى الشُّمُولِ

Acte à titre universel (F).

هو تلك بعض اموال شخص او كلها بلا تعيين ولا تخصيص .

## ١٨٧٩٣ - عَقْدٌ عَيْنِي

Contrat réel (F).

Real contract (E).

هو الذي لا يتمد إلا بتسليم المقودود عليه كالدوية والقروض ورهن الحياة .

## ١٨٧٩٤ - عَقْدٌ غَيْرُ مُسَمًّى

Contrat innommé (F). Unnamed contract (E).

هو الذي لم يخصص القانون باسم معين بل اخضع نشوئه واسكانه للقواعد العامة المقررة لجميع المقودود.

## ١٨٧٩٥ - عَقْدٌ قُرُورِي

Contrat instantané (F).

Instantaneous contract (E).

هو الذي يكون تنفيذه فوراً يبدأ يوم متى شاء ذلك المتعاقدان.

## ١٨٧٩٦ - عَقْدٌ قَضَائِي

Contrat judiciaire (F).

Judiciary contract (E).

هو الذي يقره الخصوم امام القاضي خلال الدعوى ليفضوا به موضوعاً متنازعاً فيه .

## ١٨٧٩٧ - عَقْدٌ مُتَّحَدٌ

Contrat commutatif (F).

Commutative contract (E).

هو الذي يحدد المتعاقدان فيه مدى التزام كل منهم فيعرف للمطلي ما اعطى والاخذ ما اخذ حتى لو تفاضلا .

## ١٨٧٩٨ - عَقْدٌ مُزَوَّجُ الاطراف

Contrat bilatéral (F).

Bilateral contract (E).

هو ما عقده عاقدان بالرضي والاتفاق .

## ١٨٧٩٩ - عَقْدٌ مُسَمًّى

Contrat nommé (F).

Named contract (E).

هو ما اخصه القانون باسم معين كالبيع والمقايضة والشركة والوديعة والمارية .

## ١٨٨٠٠ - عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ

Acte à titre onéreux (F).

عقد لا يمد بفائدة على المقودود له الا اذا قدم بدلاً عنها .

## ١٨٨٠١ - عَقْدٌ مُتَّحِدٌ

Contrat successif (F).

Successive contract (E).

هو الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن كالاجارة وعقد العمل والبيع بالتقسيت الخ.

## ١٨٨٠٢ - عَقْدٌ مُنْفَرِدٌ

Contrat unilatéral (F).

Unilateral contract (E).

هو الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب واحد . كالمارية فان على المستعير ان يردھا وليس على المير اي التزام .

## ١٨٨٠٣ - عَقْدٌ نَاجِزٌ

Contrat en mains (F).

Contract in hands (E).

من عقود البيع التي لا يترتب فيها دل الشاري اي نفقة من نفقات التصدير ورسوم التسجيل ، بل تكون كلها على البائع .

## ١٨٨٠٤ - عَقْدُكَمْ

في غاتم سلجان ، اطْلِبْهُ .

## ١٨٨٠٥ - عَقْدَةٌ

Loupe, Nœud (F).

Wen, Knob, Knot (E).

العقدة والعبارة تنوع خشبي في سوق بعض الاشجار .



عقرب اسود



عقرب اصفر



عقرب اكمه

جملها مرسوية : سوفها مدادة . اوراقها متعاقبة كاملة .  
ازهارها فردية ، محورية ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون .  
ثمارها سنخية عديدة وصحبة الطرف ، قريبة الشبه من ذنب  
المقرب ومن اساريع بعض الحشرات || اعرف انواعها  
المطلوبة هي :



مقرب حنطي

- S. muricatus (S). Scorpius petite (F).  
S. vermiculatus (S).  
S. scorpius grosse (F).  
عقربية ملتزمة ، وذنة (F). Scorpius rayée (F).  
S. sulcatus (S).  
عقربية وبرة ، سليفية (F).  
S. subvillosus (S).  
Scorpius velus (F).

١٨٨٢٠ - عُقْرَظْل  
Eléphant pleine (F).  
She elephant with young (E).  
أنثى الفيل الحامل

١٨٨٢١ - عُقْس  
Pterocéphale (F).  
Pterocéphale (F).



عقربية

١٨٨٢٢ - عُقْصَة  
Pointe de la feuille (F).  
Point of the leaf (E).  
هي طرف نصل الورقة للمدب .  
١٨٨٢٣ - عُقْصِيّ  
هو البيق ، اعطيه .

١٨٨٢٤ - عُقْصَق ، كُنْدُش  
Pica (S). Pie (F).  
Magpie (E). Estern (D).



عقق ازرق

جنس طير من فصيلة الترابيات . انواعه عديدة ، اعطاهما  
العلم . اثوابها بقع . اذنانها طويلة . اسوارها قمعية .  
قوتها الحشرات والحبوب والثمار ويبيض الصائغر . ومن  
طباعها اختلاف كل ما يهر نظرها . تألف الحدائق  
والغابات القريبة من الممران . تألف في الانجار الرفية .  
اناثها تبيض من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣  
اسبوع || وقد اختلفوا في سبب تسميته عققاً فقال  
المجاسط لانه يقف فرائحه كسائر الغربان وقيل اشتقاق  
من صوت . قال الشاعر :

إذا يارك الله في طائر فلا يارك الله في العقق  
طويل الذناب قصير الجناح منى ما يجد غفلة يرق  
يقلب عينيه في رأسه كأنها قفطان زريق

١٨٨٢٥ - عُقْصَقْ أَزْرَقْ \*  
Pica cyanea, Cyanopica cyanus (S). Pie bleu (F).  
Blue magpie (E).



عقق مرقوق

نوع من العقق طوله يراوح بين ٣٥ و ٤٠ سم . ثوبه  
ازرق اللون . رأسه الى السواد اللامع . رسنه الى  
السمره الخفيفة . يألف الحدائق والغابات والارواح .

١٨٨٢٦ - عُقْصَقْ مَرْقُوقْ \*  
Pica caudata (S).  
Pie vulgaire, P. bavarde (F). Common magpie (E).  
نوع من العقق طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه اسود اللون ابيض  
مقاروه ورسنه الى السمره اللامعة . يألف الحدائق والغابات  
القريبة من الممران . وهو مبدل في جميع بلاد الشرق  
الاوسط ويكثر من الطيور المؤنثة الفسدة .

١٨٨٢٧ - عُقْصَقْ  
Orbex (S). Orbex (F).  
الاحدة عقفا وهي جنبة صغيرة القد من فصيلة السفايات .

البلاد الحارة من العالم القديم . يألف المغاور والكهوف  
والاودية القديمة . مسرعه دجوي . قوته الحشرات ومكها  
والذباب والحوام تقوده اليها حاسة الشم ثم السمع || جسمه  
صغير القد يطول عند الذكر نحو ٢٥ سم . ويطول عند  
الانثى نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السمره الخفيفة . بطنه مفلطح  
سكني التركيب ينتهي بذنب سداسي السكم يحمل في طرفه  
شولة جوفاء حادة اللمة يستعملها في بث سمه لتخدير  
فريسته ولزود عن الحياة || عيناها مركبتان عادتتا البحر  
لذلك يدعى المقرب الاك || الانثى تعيش نحو خمس سنوات  
اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه .

١٨٨٢٢ - عُقْرَبُ الْبَحْرِ  
هو الجلاخ ، من الاسماك البحرية ، اعطيه .

١٨٨٢٣ - عُقْرَبُ الْمَاءِ  
هو سرطان البحر ، اعطيه .

١٨٨٢٤ - عُقْرَبُ حُنْطِيّ \* ، شُبْدَعُ حُنْطِيّ  
Buthus occitanus (S). Buthus brun, Scorpion  
brun (F). Brown scorpion (E).

نوع من المقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات . موطنه جميع  
المناطق الحارة من العالم القديم || جسمه متوسط القد ،  
حنطي اللون ، مفلطح البطن . ذنبه معتدل التيطيط ،  
سداسي السكم يحمل في طرفه شولة جوفاء حادة اللمة .  
عيناها مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات لكنها ضعيفتا  
البصر القصير المجال . ميشط الذكر مركبان من ١٨  
زويجا من الاناث . اما ميشط الانثى فن ٢٠ زوجا ||  
الذكر يطول نحو ٥٠ سم . والانثى من ٦٠ الى ٦٤ سم .  
مسرعه دجوي قوته الحشرات وكل ما دب || الانثى  
تعيش نحو ست سنوات . اما الذكر فيعيش حتى القيام  
بمصلحة الكوم || يعتبر من اللوييات الشديدة الافى  
والفرور .

١٨٨٢٥ - عُقْرَبَان  
Scorpion (mâle) (F).  
Scorpion (male) (E).

ذكر المقارب يعيش الى حين يكوم الانثى حيث تقضي  
عليه .

١٨٨٢٦ - عُقْرَبِيَّات  
Scorpionides  
رتبة دوييات خبيثة من النكبويات . فصائلها سبع  
تختلفة الاشكال والاحجام والالوان . اشهرها فصيلة  
الشبديات التي تحوي المقارب .

١٨٨٢٧ - عُقْرَبِيَّاتُ الْمَاءِ  
Nepidae (S).  
Népides (F). Nepidae, Water scorpions (E).  
Wasserskorpions (D).

فصيلة من بق الماء التابعة الى رتبة نصغية الاجنحة .

١٨٨٢٨ - عُقْرَبِيَّاتُ كَاذِبَةٌ  
Pseudoscorpionides  
رتبة من النكبويات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع  
الى فصليتين . خشراتها عادمة السم ، صغيرة القد ، مبطة  
الاجسام ، مستطيلة اللامس .

١٨٨٢٩ - عُقْرَبِيَّة \* ، ذَنْبُ الْعُقْرَبِ  
Scorpius (S). Scorpius, Ornithope, Chenille,  
Chenillette (F). Scorpion's tail, Caterpillar plant (E).  
Raupenkraut, Raupenkeel (D). Coda di scorpione (I).  
جنس نباتات عشبية برية مدادة من فصيلة القرنيات  
الفراشية . انواعها عديدة مهدها حوض البحر المتوسط .

قوائمها نشطة. ثوبها الى البني الاسفع المواج || تألف العبابات التي يكثر فيها الزئان والمملول. يرقها مراقبة تميش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة .

١٨٨٣٣ - عَقَقِيدِيَّات (S). Eucnemididae (E).  
Eucnemididae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل . معتدلة التبطيع ، تطول من ٤ الى ١٢ م. رؤوسها مستعرضة التقف . عيونها بارزة . تأثيرها وبناسها نظامية . قرونها الاستثمارية متباينة الاشكال منها الخيطية والمنشطية والمنسفة والمنشارية ، جميعها مؤلفة من ١١ فصلة . كواسلها لاقباصية ، يكثر فيها التريبع . اتحادها لاشعة . قوائمها نشطة . ارساغها خاسية العقل . اولها ملونة || تألف العبابات . معظمها دجوي المسرح . جميعها خاسلة ودامت . يرقاتها مراقبة تميش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الميقيشيد .

١٨٨٣٤ - عَقُوبَة (F). Penaty (E).  
في الاقتصاص من الجرم باسم المجتمع .

١٨٨٣٥ - عَقُوبَة (F). Correa (S). Corrée (F).  
جنس نباتات برية وتربيتين من فصيلة السذابيات . انواعه قليلة جميعها شجيرات صغيرة القند تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ م. سوقها فراء زيا . اوراقها ابيدة معققة متقابلة . نصلها اهليلجي الشكل ، جامد النسيج ، خلي الصفحة السفلى . ازهارها بوقية ، رباعية البتلات الملحمة ، ثمانية الاسدية . الزوايا زاهية فيها الابيض والوردي والفستقي والاحمر || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٨٨٣٦ - عَقُوق (F). Pleine (F). Full (E).  
العقوق هي الاثني الحامل من ذوات الحافر والظلف خاصة ج عَقُوق وِعَقَاق .

١٨٨٣٧ - عَقَقَان (F). Or natif (F). Native gold (E).  
هو الذهب الصرف الطبيعي .

١٨٨٣٨ - عَقَقِيب (F).  
هو المرزة الرمداء ، اطلبا .

١٨٨٣٩ - عَقَقِيد (F). Insoluble  
نمت تمريني يطلق على كل مادة لا تذيب وصل كل عمل حسابي وما اشبه لا ينحل .

١٨٨٤٠ - عَقَقِيد (F). Plinthe (F). Plinth (E).  
سطح مربع في قاعدة عمود او في تاجه .

١٨٨٤١ - عَقَقِيد هِنْدِي (F).  
هو الكركم الصبغي ، اطله .

١٨٨٤٢ - عَقَقِيس (F).  
هو الميراء الزيا ، اطلبا .

١٨٨٤٣ - عَقَقَقَانِيَّات (S). Calotermitidae (S).  
Calotermitidae (F). Calotermitidae (E).

فصيلة حشرات قارضة دجوية من رتبة العققانيات . انواعها عديدة جميعها غليظة الرؤوس ، قوية المشافر ، عادمة اليوافيق . قوتها المواد الصغوية والسليولوزية . نياكها رداء

بياقها فراء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها لاطنة متقاعة ستانية الشكل . نصلها يطول نحو ١٥ سم. وهو جامد الصلعة ، خلي البشرة ، جنثيلي العرف . ازهارها معقوي التجميع ، محوري الاذنكاز . ازهارها صغيرة القند ، صفراء اللون . اوراقها غزيرة المادة الجحالية القمالة نقل اللثة والبقرة ، تؤذي المزر ولا تضر بالابل .

١٨٨٣٨ - عَقَقَقَانِيَّات (S) ، ايزوبتر (S). Isoptera (S). Isoptères (F). Isoptera (E).

رتبة حشرات قارضة صغيرة الجسم ، مستطيلة الشكل ، غليظة الرأس ، قوية المشافر الحادة ، طويلة الاجنحة عند وجودها . نظامها الاجتماعي والاقتصادي نظام النمل . تبني نياكها تحت الارض وقوتها ودخلها الاخشاب . اشهر فصائلها : الارضيات والعققانيات .

١٨٨٣٩ - عَقَقَة ، قَسَلَة ، قَلَم ، عَقَلَب (F). Bouteur (F). Slip (E).

قصب او جزء من قصب يفصل عن النبات ويفرس . والقلم تقع على اشكال مختلفة احصاها :

عَقَلَة برعية او زمية (F). Bouteur à cell (F). Slip for bud (E).

عَقَلَة جذرية (F). Bouteur par racine (F). Slip by root (E).

عَقَلَة جلمورية (F). Bouteur de rhizome (F). Slip of rhizome (E).

عَقَلَة دبوسية (F). Bouteur à talon (F). Slip at butt (E).

عَقَلَة فندية (F). Bouteur par rameau (F). Slip by bough (E).

عَقَلَة غشبية (F). Bouteur à crosse (F). Slip for cutting (E).

عَقَلَة ورقية (F). Bouteur par feuilles (F). Slip from leaves (E).

١٨٨٣٠ - عَقَم ، عَقَق (F). Stérilité (F). Sterility (E).  
القم والمقم : حال الاثني التي لا تحمل .

١٨٨٣١ - عَقَقَقَصَة (F). Volucella (S). Volucelle (F).  
جنس حشرات من فصيلة السرفيديات . انواعه عديدة . طوطا يراوح بين ١٢ و ١٨ م. تتميز بسرعة طيرانها وسفرها اوراقها المخذعة والمذبذبة بالاسود والابيض . يرقاتها قاسية الجلد ، كثيفة الغلب المستطيل . معظمها يعيش على خمي ووسع الزنايزير والزراقط وما اشبه . اشهر انواعه :

عَقَقَقَصَة زيا (F). V. bombylans (S). Volucelle bourdon (F).

عَقَقَقَصَة شفاة (F). V. pellucens (S). Volucelle transparente (F).

عَقَقَقَصَة منقطعة (F). V. zonaria (S). Volucelle zonée (F).

١٨٨٣٢ - عَقَقِيد (S). Eucnemis (S). Eucnémis (F). Eucnemis (E).

حشرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة العققيدات ورتبة غديات الاجنحة . اعطائها بعض مناطق اوروبية الشمالية والوسطى ويجال الشرق الاقصى || جسمها صغير القند ، مستطيل الشكل ، قريب الشبه بالسائل . طوطا نحو ٨ م. رأسها صغير . عيناها بارزتان . تأثيرها وبناسها الفكية معتدلة الجرم . زباناها مشطيان . كواسلها شبه مربع الشكل . غمدها لاحفان يعلموا تحفيد تحيل قاطب .



عَقَقَصَة زيا



عَقَقَصَة شفاة



عَقَقَقَصَة منقطعة

## ١٨٨٥١ - عَكَابِيَّةٌ خَمَلِيَّةٌ

*Tradescantia pilosa* (S). *Ephémère velue* (F).  
عشبة ثريبتية معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أرونها شتوية  
فراء. أوراقها لاطئة متعاقبة. نصلها عصني الشكل،  
خلي البشرة على صفحته يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض  
نحو ٢ سم. أزهارها كثيرة العدد ليلكية اللون || أزهارها  
يستمر من حزيران إلى تشرين الثاني.



عَفِيفَان

## ١٨٨٥٢ - عَكَابِيَّةٌ فِيرَجِيَّةٌ

*Tradescantia virginiana* (S). *Ephémère de Virginie* (F).  
عشبة سرطوية معمرة ساقها منتصبة فراء تملو نحو ٦٠ سم.  
أوراقها لاطئة متعاقبة. نصلها ضيق الصفحة مدبب  
المقصة يطول نحو ٣٠ سم. ويعرض من ٢٥ إلى ٣٠ سم.  
أزهارها جميلة الشكل تفرش نحو ٣ سم. ألوانها تختلف  
باعتلاف الفروغ فيها الأزرق والبنفسجي والأبيض  
والوردي والاحمر || أزهارها يستمر من أيار إلى تشرين.

## ١٨٨٥٣ - عَكَابِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

*Tradescantia rosea* (S). *Ephémère rose* (F).  
عشبة سرطوية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها خفيفة  
النصل غضة تطول نحو ١٨ سم. ويعرض من ٢ إلى ٣ سم.  
أزهارها وردية اللون مستطيلة الزناد || أزهارها يستمر  
من حزيران إلى تشرين الثاني.



عَفِيفَة

١٨٨٥٤ - عَكَاكَاةٌ  
Génophène (F).  
تختلف أشكال الانفعالات البيئية التي تبو على عكر  
موصوف معين.

١٨٨٥٥ - عَكَاكَا  
Araignée (mâle) (F).  
Spider (male) (E).  
ذكر النكبوت.

١٨٨٥٦ - عَكَاكَا  
Commuatrice, Permutatrice (F). Rotary converter, Rectifying commutator (E).  
المكاس جهاز خاص يسمح بتحويل التيار الكهربائي  
من متواصل إلى تناوبي والعكس بالعكس.

١٨٨٥٧ - عَكَاكَا، عَكَاكَا  
Toile d'araignée (F). Cobweb, Spider-work (E).  
المكاش والمكاش والمكاش: بيت النكبوت.

١٨٨٥٨ - عَكَاكَا  
Orbitèle, Orbitéaire (F).  
نمت تعريف يطلق على العناكب التي تسج عكاشها  
كالشعاع. نواسه سهل الانكسار، جيد المناعة، شديد  
القة، يستعمل في تعديد المقاييس المجهرية.



عَكَابِيَّة

١٨٨٥٩ - عَكَاكَا  
Cosmopolite (F). Cosmopolite, Cosmopolitan (E).  
صفحة المدينة الجاسمة من كل طوائف البشر وصفة من  
اسب جميع البلدان وأهلها ومن اعتبر العالم كوطه أو  
من كان العالم وطه كيمض الحيوان والطير والنبات.

١٨٨٦٠ - عَكَاكَا  
هي الجناسه، اطليبا.

١٨٨٦١ - عَكِير  
Pollen récolté (F).  
جدرات اللوح يجي بها التحل على ارساغها وسبقها  
وانفاذها فتجملها في الشهد.

وانفاق ودحايز تبنيها بالطين في التربة وعليها فوق الاخشاب  
التي تفرشها || تعيش في الطلام. نظمها الاجتماعي  
والاقتصادي قريبة الشبه من نظم النحل والنمل، فيها الملكة  
اليويوس والذكر الكامل والجنود والعامل الخنايث || اشهر  
انواعها:

عَفِيفَان \*  
Reticulitermes lucifugus (S).  
Termite lucifuge (F).

عَفِيفَان اصفر العنق \*  
Caloterms flavicollis (S).  
Termite à cou jaune (F).

عَفِيفَان اغمر \*  
Hodoterms ochraceus (S).  
Termite ocre (F).

١٨٨٤٤ - عَفِيفَةٌ \*  
Gryphaea (S). Gryphée (F). Gryphoea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيريات الخياشيم  
وفصيلة المحاريات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في البحر  
الايوني المتوسط وفي بعض مناطق الاطلسي || اصداؤها  
نصف مستديرة الشكل، متعققة القدم، لانسواوية  
المصاريع، كبيرة اليسارية صغيرة اليمينية || انواعها  
المأكلة عديدة اشهرها العفيفة المقرنة (G. angulata).

١٨٨٤٥ - عَفِيفِي، عَفِيفِيَّة  
Agate  
حجر كريم من مركبات المرو (الكوارتز) المختلطة ببعض  
أكاسيد الحديد التي تصبغها بالوانها المتخلية القائمة بين  
الاصفر والاحمر.

١٨٨٤٦ - عَفِيفِي يَمَّان  
Onyx  
نوع من العقيق الجيد الصنف يتميز بخطوطه المتوازية  
الترتيب المشتركة المركز.

١٨٨٤٧ - عَكَاكَا  
Commelinaceae, Commelynaceae (F). Commelinaceae (E).

هي فصيلة الزولانيات من وحيات الفلقة. اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد. اعطائها البلاد الحارة والاستوائية.

١٨٨٤٨ - عَكَاكَا

*Tradescantia* (S). *Tradescantie, Ephémère* (F). *Common spider-wort* (E). *Tagblume, Drelmasterblume* (D). *Efemero* (I).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة العكابات. انواعها  
عديدة معظمها بري وبعضها ترابي. أزهارها هامة ثلاثية  
الفصل والبتلات، سداسية الاعدية، خلية الاقدام || اشهر  
انواعها سالي.

١٨٨٤٩ - عَكَابِيَّةُ الْوَيْوِي

*Tradescantia fluminensis* (S). *Ephémère de Rio* (F).  
عشبة سرطوية ثريبتية معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها  
بيضية مستطيلة. نصلها عايق الخضار على صفحته العليا،  
بنفسجي الصفحة السفلى. أزهارها كثيرة العدد، بيضاء  
اللون، عصارها قابلة الحطب || أزهارها يستمر طوال  
السنة.

١٨٨٥٠ - عَكَابِيَّةٌ بِتَفَافِ الزَهْر

*Tradescantia albiflora* (S). *Ephémère à fleurs blanches* (F).

عشبة ثريبتية مركبتية معمرة. سوقها مسطحة تنثرش عند  
كل مقدة. أوراقها بيضية الشكل، قلبية القاعدة،  
مدببة المقصة، نصلها جبل الخضار الزاهي. أزهارها  
قليلة العدد بيضاء اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى  
تشرين الثاني.

## ١٨٨٦٧ - عُكْبَر مُقْتَصِد

*Microtus oeconomus* (S). *Campagnol économe* (F). نوع من العُكْبَار ، موطنه البلاد الروسية ، طوله نحو ١٢ سم. وذنبه ٤ ، جسمه اسطواني الشكل مقصفه مقطوم الطرف ، اذناه مستديرتان صغيرتان . ظهره الى الصهبة السراة المابقة . ابطاه الى الصهبة الصفراء بطنه ابيض اشير || يعيش جماعات كثيفة العدد وهو من العُكْبَار القاطنة التي تجوب البلاد في طلب الحبوب والحبش . جمره الفتوي رجب الجوانب يخزن فيه ما لا يقل عن ٥ كيلو من الحبوب والحبوب .

## Arvicolinés (F).

## ١٨٨٦٨ - عُكْبَرِيَّات

المُكْبَرِيَّات او قُتْرَان الزرع عارة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . اجناسها وانواعها عديدة موطنها العالم . جميعها صغيرة اللد . اجسامها ريمية . رؤوسها مغزوية غليظة . مقاعها مقطومة . آذانها مستديرة بارزة . اذناها صغيرة كاسية || اعرف اجناسها العُكْبَر واللسين والسفة .

## Balai de sorcière (F).

## ١٨٨٦٩ - عُكْد

## Witches broom (E).

ضمة من الافنان الكثيفة التجميع تشبه المكسنة تسبها بعض فطور التفرية . راجع تفرية .

## Nid d'araignée (F).

## ١٨٨٧٠ - عُكْدِيَّة

## Nest of spider (E).

المكديكة عكاش لبه النواس ، جرابي الشكل ، ينسجه العنكبوت حيث يقع للاستراحة فيه .

## Base du cœur (F).

## ١٨٨٧١ - عُكْدَة

## Base of the heart (E).

هي قاعدة القلب .

## ١٨٨٧٢ - عُكْر °

*Génotype* (F). *Genotype* (E). هو الذي يمثل نتيجة عمل الجين في التركيب الخلوي وهذا ما يحمل التركيب العكري مثلاً لمجموعة الصفات الوراثية .

## ١٨٨٧٣ - عُكْر ، كَمَاءُ الماء ، قَسَطِل الماء

*Traps* (S). *Macre*, *Châtaine d'eau*, *Truffe d'eau*, *Tribule*, *Cornuelle*, *Echarbot* (F). *Water chestnut*, *Water caltrop* (E). *Echte Wassernuss* (D). *Tribolo aquatico*, *Castagna d'acqua* (I). جنس نباتات عشبية ، عشوية ، مائية ، حولية من فصيلة الاغديات . انواعها الزراعية ثلاثة ، اوراقها كبيرة اللد مستطيلة الزناد نصلها معمي الشكل منشاري الحافة . ازهارها فريدة محورية بيضاء اللون . ثمارها جوزية شاذكة ، متباعدة الاشكال ، كستنية اللباب المأكول .

١٨٨٧٤ - عُكْر أَبُو شَوَكْتَيْن *Trapa bispinosa* (S). *Macre à deux épines*, *Singhara* (F). نوع من العكر الشرقي تكثر زراعته في الهند والهند الصينية . ثماره كثة الشكل ثنائية الفصل الجالسة الخشوية الحادة الشوكية . دقيق لباه يستعمل في تحضير بعض الحلويات .

## ١٨٨٧٥ - عُكْر أَبُو قَرْيَن °

*Trapa bicornis* (S). *Macre bicornis*, *Ling*, *Ling Kio* (F).

نوع من العكر الشرقي تكثر زراعته في الهند والهند الصينية . ثماره كثة الشكل ثنائية الفصل الجالسة الخشوية الحادة الشوكية . دقيق لباه يستعمل في تحضير بعض الحلويات .

## ١٨٨٧٥ - عُكْر أَبُو قَرْيَن °

*Trapa bicornis* (S). *Macre bicornis*, *Ling*, *Ling Kio* (F).

نوع من العكر الشرقي تكثر زراعته في الصين حيث يستعمل في معظم المأكول الوطنية . ثمرته تشبه رأس الكبيك بقمره للمتقنين حجمها حجم الكستنة . لباه جيه الصف وهدا ما يحملها تحتل المركز الاول بين انواع العكر .

## ١٨٨٦٢ - عُكْبَر

*Microtus, Arvicola* (S). *Campagnol* (F). *Vole*, *Field-mouse* (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية ، من العُكْبَرِيَّات وفصيلة الفأريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة اللد تتميز بفزارة ثمرها . اثنائها تقع من ثلاث الى اربع مرات في السنة كل مرة من ٤ الى ٦ ادراس تيصر وتكتسي بعد بنسجها ياسر وسرح في طلب قوتها بمرسة اسابيع || قوتها الحبوب والجنور وتغفل المواد النباتية اخضعها لحاء الاشجار في الشتاء عند الانواع العادة لليات الشتوي .

## ١٨٨٦٣ - عُكْبَرِ اصْمَر °

*Microtus glareolus, Arvicola glareolus* (S). *Campagnol fauve*, *C. des grèves* (F).

نوع من العُكْبَار ، طوله نحو ١١ سم. وذنبه ٤ ، ثوبه الى الصمرة يقيق مع اقترابه من ثيج الظهر وينحرف الى الياض عند الصدر والبطن || يألف المروج والحقول والارحاج والادغال والحدائق . يعيش جماعات كثيفة العدد تلغ بعض الاولوف || قوته الحبوب والثار والبولوط والكتسنة والجنور وهدا الاشجار عند الجوع .

## ١٨٨٦٤ - عُكْبَرِ البَر °

*Microtus terrestris, Arvicola terrestris* (S). *Campagnol terrestre* (F).

نوع من العُكْبَار ، موطنه الشرق الاوسط ، طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ٧ ، جسمه اسطواني الشكل مقصفه مقطوم الطرف . اذناه مستديرتان كبيرتان . ثوبه الى الصهبة البتراء يقيق قليلاً مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن . يألف الحقل والمراعي وضفاف الانهر ويجاري الماء . قوته المواد النباتية على اختلافها من الحبوب الى الثار والجنور وللحاء وكمار القصب .

## ١٨٨٦٥ - عُكْبَرِ الحَقْل ° قَارَة الغَيْط

*Microtus arvalis, Arvicola arvalis* (S). *Campagnol des champs* (F).

نوع من العُكْبَار ، موطنه فسبح الاربابا يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اردية ومن البلاد المصرية حتى امالي السودان . جسمه اسطواني الشكل ، طوله يبلغ ١١ سم. وذنبه ٣ ، ثوبه الى الصهبة الصفراء ، بطنه الى الياض البتبي . مدب جرانزه ابيض . مقصفه متدل التذويج اذناه مستديرتان صغيرتان || يألف الحقل والمراعي والارحاج والحدائق ويجاري الماء والمستنقعات . يعيش على السواحل البحرية وفي الجبال حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . يركض بسرعة يحمي السرير ويحسن السباحة لكنه اخرق التسلق يعلته || قوته جمع المواد النباتية مها كان مصدها وروصها .

## ١٨٨٦٦ - عُكْبَرِ قَارَب °

*Microtus amphibius, Arvicola amphibius* (S). *Campagnol amphibie*, *C. aquatique* (F). *Water rat*, *Water vole* (E). *Wasserratte*, *Mollmaur* (D).

نوع من العُكْبَار ، طوله ١٦ سم. وذنبه ٨ ، جسمه ضخم مقصفه ذاتي الشكل . اذناه كبيرتان . ثوبه الى الصهبة السراة يقيق مع اقترابه من ثيج الظهر وينحرف الى الثيرة عند الصدر والى الياض عند البطن وغواي الجرار . يألف ضفاف البحيرات والانهر ويجاري الماء . يسبح وينطس وينشق الاشجار . قوته الحبوب والجنور والحشرات والقشريات والاسماك الصغيرة .



عُكْبَر اصْمَر



عُكْبَر الحَقْل



عُكْبَر قَارَب



عُكْر ابو قَرْيَن





عُكْرُ أَبُو قُرُونٍ



عُكْرُ سَحَر



عُكْرُ الْمَرْج



عُكْرُولُ مَطْوَق

الانسياب . تعيش في الماء ولا تغلق على سطحه إلا عند الحاجة إلى تجديد الهواء || جسمها كبير القند يطول من ٣٠ إلى ٣٥ سم . ثوبها إلى الصخرة النحفية يطولها مروج اخضر . كوسلها وظهورها مغطيان بخمار اصفر . رأسها مستعرض الشكل ، قصير الخلف . فكاهها قويان . عيناها كيرتان زياتها صفيقان ، مستطيلان . ظهرها مستدير الطرف اللاحق . جرابها صفراء اللون تتميز بكبر الزوج الخلفي المبط الساق والارياض المدة لتجديد . اسرافها خاصة القمل || الاثني اكبر قند من الذكر قابت ثوباً منه وايضاً تحديداً في غمدها || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . قوتها كل ما تيسر لها من الحيوانات الدنيا التي تقتنصها في الماء || الاثني تمتع المكان في البر على صفحات الاوراق التي تلتصق التراب . يخطف لكن بعد متحه بنحو ثلاثة اسابيع عن يرقات مردنية الشكل ، سمراء اللون ، سود الرؤوس ، كثيفة الخلف تسمى الى الماء بعد التقف يوبون وهي كالخشرات الجملانة تسبح وتغطس وتقرس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والاوالي .

١٨٨٨٤ - عُكْرُ لِيَّاتٍ  
Dytiscidae (S).  
Dytiscidae (F). Dytiscidae, Predaceous diving beetles (E). Schwimmkäfer (D).

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من حشرات مياه المناطق الحارة . تألف المئات والايوار والبحيرات والايهر والراكدة المياه ولا تغلق على سطح الماء إلا عند الحاجة لتجديد الهواء || اجسامها متفارقة القند ، منها الصغيرة الدقيقة التي تطول نحو ٢ سم . ونسها الكبيرة المستفصنة التي تطول نحو ٤٠ سم . جميعها يغبية الشكل ، معتدلة الاحدياد . تتميز بجرابها الخلفية المبطلة الارياض المدة للسباحة . ارساخ الجرامز الامامية ، عند الاكوار ، مجهزة بحماهم تمكنها من التقبث بظهور الاناث عند الكوم . وهي لا تخرج من الماء الا في زمن السمكة او عند الانتقال إلى مكان اذ تفسر اذ ذلك في الليل || البرقة كالخشرة الجملانة تسبح وتغطس وتقرس كل ما تيسر لها من الحيوانات الدنيا || اشهر اجناسها المكزول والذرقوط والمندروس والراس .

١٨٨٨٥ - عُكْسٌ ، قَدْرِيخٌ ، قَرْقِدٌ

Marccottage (F). Layering (E).

احلى طرائق تكثير النبات تقوم بحج الغصن ودنه في التربة دون فصله عن امه الى ان تبرز له جذور فيفصل ويفرس .

١٨٨٨٦ - عُكْسُ التَّجَرَّةِ  
Dénitrification (F).  
Denitrifying (E).

تحويل يحصل في بعض الاربة الرطبة بتأثير جراثيم خاصة تحول النترات الى نيتريت فامونياك غازوت وهو بذلك يكون عكس التجرة ومنه غرر كبير لان النترات اقرب تحييز واسهل امتصاصاً من النيتريت .

١٨٨٨٧ - عُكْسِين

Invertine (F). Invertin (E).

خيرة العكس تمكس السكروز فيصير غلوكوزاً .

١٨٨٨٨ - عُكْم

Enveloppe (F). Envelope (E).

العكم الثلاث ج اعكام وعكام .

١٨٨٨٦ - عُكْرُ أَبُو قُرُونٍ \*  
Trapa natans (S).  
Macre commune (F).

نوع من العكر المبلول يعيش في جميع مناطق البلاد الحارة والمتندلة . ثمارها مأكولة تستعمل مسلوقة أو مشوية وهي بحجم الكفاة تحمل اربعة قرون متعاقبة ذرية سادة شائكة .

١٨٨٨٧ - عُكْرُش

Festuca (S). Féтуque (F).

Festuca grass (E). Schwingel (D). Festuca (I).  
جنس نباتات عشبية مرموية حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اعشاب كثلية تنمطها الماشية من الخيل الى الماعز . وقد قيل فيه « اعلف حمارك عكرشا حتى يحيد ويكشا »

وهو من النباتات التي ترطب في الاربة المنجبة المحافظة على رطوبتها || اشهر انواعها المرموية التي تزرع في المروج والمراعي الثلاثة التالية :

عُكْرُش احمر \*  
Festuca rubra (S). Féтуque rouge (F).

عُكْرُش المروج \*  
Festuca pratensis (S).

Féтуque des prés (F).

عُكْرُش منتصب  
Festuca elatior (S).

Féтуque élevée (F).

١٨٨٨٨ - عُكْرُشَة

Hase (F). Doe-rabbit (E).

هي انثى الارنب .

١٨٨٨٩ - عُكْرُشِيَّات

Festucaceae (S).  
Festucacées (F). Festucaceae (E).

سبط من النجيليات يشمل عدة اجناس وانواع ، اشهرها العكرش . معظمها نباتات عشبية برية وبعضها علني ، يزرع في المراعي .

١٨٨٩٠ - عُكْرَمَة

Pigeonne (F).

هي الحامة ، أنثى الحمام . اما الاذك فهو العرطل والحديد .

١٨٨٨١ - عُكْرِيْز

Alchryson (S).  
Alchryse (F). Alchryson (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الخلدات . منته بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . ساقه فارقة خلية الماء ، وتلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . اوراقه معتقة ، متعاقبة ، كلوية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهاره عقدوي التجميع . ازهاره صفراء اللون .

١٨٨٨٢ - عُكْرِيْسُ اَسْوَدَ

Xylocoris ater (S).  
Xylocoris noir (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم . ثوبها الى السمرة القطرانية ، يهت في البطن ويصق في الرأس والكتول والحجفة والخنجينين || رأسها محرم . خطمها معتدل الحجم . عيناها صغيرتان . كوسلها عموديب . حجبها حمرة . حنجبتها صفيتان . روشناها اغبران . قوائمها دقيقة . سمراء اللون || تألف حراج السنوبر وتعيش بين القشور وتحتها . قوتها الخشرات والحوام .

١٨٨٨٣ - عُكْرُزِلُ مُطَوَّقٌ \*

Dytiscus marginalis (S). Dytique marginé (F).

Dytiscus marginalis (E).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المكزوليات وربة غمديات الاجنحة . تألف المئات والقدان ويجاري المياه البطنة

Sarcoptes (S). Sarcopte (F). **عَلَّ** ١٨٨٩٨  
Sarcoptes (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة الجربيات ورتبة القراديات  
انواعه عديدة جميعها صغيرة القد، ذرية، مؤذية عابطة.  
بعضها يحدث الجرب في الانسان والحويان || يكافح  
بإستعمال مركبات الكبريت .

١٨٨٩٩ - **عَلَّ أَمْلَسْ \*** ، **جَرَبْ أَمْلَسْ**  
Sarcoptes laevis (S). Sarcopte lisse (F).  
نوع من الجرب يركب بصل ارياش الطير فيسبب سقوطها.

١٨٩٠٠ - **عَلَّ قُمْلِي \*** ، **جَرَبْ قُمْلِي** ، **جَرَبْ**  
Sarcoptes scabiei (S). **نَاشِف**  
Sarcopte de la gale, Acare de la gale, Gale sèche (F).  
Itch-mite (E).

نوع من الجرب الشائع يتطفل على الخيل والابل والبقر  
والنم والماعز فيؤذيها من جلدها ويسبب لها الحكاك  
واللتوشش والهرزال .

١٨٩٠١ - **عَلَّ مُتَقَلِّب \*** ، **جَرَبْ مُتَقَلِّب**  
Sarcoptes mutans (S). Sarcopte changeant (F).  
نوع من الجرب يتطفل على ارساغ الطير اخصها الداجنة  
فيؤذيها ويشوهها .

١٨٩٠٢ - **عَلَّابَة**  
Empaqueuse (F).  
هي الصارة جهاز ميكانيكي يصّر ويلبب الاشياء .

١٨٩٠٣ - **عَلَّابَة \***  
Bionomie (F). Bionomics (E).  
علم البيئة الحاربية ومدى تأثيرها في الكائنات الحية .

١٨٩٠٤ - **عِلَاج**  
Traitement (F). Treatment (E).  
هو الدواء المستعمل في مكافحة مرض معين او وصف مقدار.

١٨٩٠٥ - **عِلَاجَات شَافِيَة \*** ، **أَدْوِيَة**  
Traitements curatifs (F). Curative treatments (E).  
هي الادوية الناجمة المستعملة للشفاء من علة بدت او  
لقضاء على حشرة ظهرت . وأجمع فاس .

١٨٩٠٦ - **عِلَاجَات وَاقِيَة**  
Traitements préventifs (F). Preventive treatments (E).  
هي الادوية التي يحسن استعمالها لوقاية من مرض يخشى  
وقوعه او لاجتناب وصف مرتقب .

١٨٩٠٧ - **عِلَاس \***  
Chélat (F).  
العلاس مركب عضوي يمكنه اختلاط مع المواد الترية  
من تكوين تآلف عنصري يقوم الانحطاط دون ان يعرقل  
سير التشيل الغذائي .

١٨٩٠٨ - **عِلَاس \***  
Olac  
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة العلابيات .  
انواعه المعروفة ٢٥ منبتها معظم المناطق الحارة والاستوائية  
من العالم القديم واسرائيلية || اشهر انواعه عِلَاس سرنتيب  
(Olacae de Ceylan) اوراقه مأكولة وتطبخ كالمكفوف  
وفيهر .

١٨٩٠٩ - **عِلَاسِيَات \***  
Olacaceae (S).  
Olacacées (F). Olacaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلغلتين مستقلة القنالات مرتفعات  
المبيض . اجناسها المعروفة ٢٦ اما انواعها فنحو ١٧٠ ||

١٨٨٨٩ - **عُكْسَةُ أَيْقَة \***

Mycetophila elegans (S). Mycetophilie élégant (F).  
حشرة لامؤذية من فصيلة المكسيات . جسمها صغير القد  
يطول من ٤ الى ٦ سم . رأسها صغير . عيناها بارزتان .  
زباناها خيطيان . ثوبها الى الصفرة الصنابية . روثانها  
الى الصفار الباهت . قوائمها كثيرة . غنايبها مجهزة  
بمناسخ حادة || مرتعها الغابات . الاثني اكبر ذرأ من  
الذكر ، تخرج مكبتها في سوق الفطور وفي نكاحه فينتف  
عن يرقات تميش على الفطور حتى طور الاكمال .

١٨٨٩٠ - **عُكْسِيَّات \***  
Mycetophilidae (S).  
Mycetophilidés (F).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
المعروفة متوسطة العدد . معظمها من علم الاقاليم المعتدلة  
المنحرفة نحو الباردة . مرتعها الغابات حيث تكثر الفطور ||  
اجسامها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها صغيرة منحدية . عيونها  
رؤمية . قربونها الانتشارية خيطية ، تمتد من ١١ الى ١٧  
فصلة . اخطامها فياجية . قوائمها مستطيلة . غنايبها مجهزة  
بمناسخ نسيطة || يرقاتها شبه اسطوانية الشكل ، بيضاء  
ألون . جميعها خاضعة او دامتة . خادراتها طليقة لا تنغم  
في التربة لكنها تلتفت بشواء وثيق .

١٨٨٩١ - **عُكْنَة** هي سورجان الجبل ، اطبله .

١٨٨٩٢ - **عُكُوب \***  
Gundelia tournefortii (S).  
Gundèle, Gundéle, Accoub (F).  
نبات عشبي بري شوكي معمّر وحيد الجنس والنوع ،  
من فصيلة المركبات . اعطاه بلاد الشرق الاوسط يكثر  
في المناطق البرية الجبلية . وهو بقلة ناعمة لا تحلج من  
بعض الفيتانيات والناصر المفيدة . فلانها مأكولة تستعمل  
مطبوخة .

١٨٨٩٣ - **عُكُوزَة**  
Racine de la queue (F).  
اصل ذنب الدابة حيث عري من الشعر من مغرز الذنب.

١٨٨٩٤ - **عُكُوس \***  
Ixa (S). Ixa (F). Ixa (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ،  
قصار الذليل وفصيلة القوسيات . انواعه المعروفة قليلة  
العدد اعطاه بحر البلاد الحارة || اجسامها صغيرة تطول  
من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٥ الى ٦ سم . تتميز  
بامتداداتها الجانبية الاسطوانية الشكل الهزلية الاطراف  
المدية . ارجلها نحيلة مستطيلة . ملاقطها كبيرة دقيقة  
الاطراف || انواها الى السمرة المتفاوتة الشدة والملاجات  
الحطية والثرينية .

١٨٨٩٥ - **عُكُيس \***  
Achroique, Acronyque (F).  
Acronychal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نجم او كوكب عندما يكون  
مركزه في الفضاء مائكا للشمس فيظهر عند غروبها  
ويغيب عند شروقها .

١٨٨٩٦ - **عُكُيس ، دَرِيحَة ، رَقِيْدَة**  
Marcotte (F). Layer (E).  
الفنن الذي يكس او يدريخ او يرقد .

١٨٨٩٧ - **عُكُيس الكَرْمَة ، رَقِيْدَة الكَرْمَة**  
Provin (F). Layer of a vine (E).  
سرع الكرمة الذي صار تدريخ .



عُكْسَةُ أَيْقَة




عُكُوب



عُكُوس



عَلَّ أَمْلَسْ



عَلَّ قُلِي



علائش

١٨٩٢٠ - **عُلْش**  
الطراء والائل والحاج والبيتوت والمكرش جميعها من العُلش .  
ج علاش (اللسان) .

١٨٩٢١ - **عُلْج**  
هو الحمار الوحشي السمين القوي .  
Onagre gros et gras (F).

١٨٩٢٢ - **عُلْجَان \* عُلْج**  
Arundinaria (S). Bambou (F). Bambou (E).  
جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات  
وفصيلة النجيليات . اذواعه عديدة ترغب في الاربة الرملية  
الدبالية الرملية . اشهرها ما يلي .

١٨٩٢٣ - **عُلْجَان لَسَع**  
Arundinaria nitida (S). Bambou luisant (F).  
نوع من العُلجان يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سلاحياته  
الى الجذوة البنفسجية . عجره عديد الاغصان . اوراقه تطول  
من ٦ الى ٨ سم . نصلها مائل للبرشة جبل الخضار اترابي  
للاعم || يرغب في الاربة القليلة الاندماج الوافرة المواد  
المضوية .

١٨٩٢٤ - **عُلْجَان مُشَلَّج**  
Arundinaria tessellata (S). Bambou à réseau (F).  
نوع من العُلجان يملو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه  
ذلفة اتراب الاخير تطول نحو ٤٥ سم . وتعرض نحو ١٠  
نصلها جبل الخضار يحويه اطار اصفر ويجعل حل صفحته  
السفل خطين اترابين متوازيين مع الضلع || يرغب في  
الاربة الرملية الدبالية الرملية .

١٨٩٢٥ - **عُلْجَان مُوَشَّج**  
Arundinaria veitchi (S). Bambou panaché (F).  
نوع من العُلجان يملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . سلاحياته  
اسطوانية . عجره عجيلة مفندة . اوراقه معتقة تطول من  
١٢ الى ١٥ سم . وتعرض نحو ٣ . نصلها اخضر الصفحة  
العليا احمر السفل يحويه اطار اصفر || يرغب في الاربة  
الخفيفة القنية الرملية .

١٨٩٢٦ - **عُلْجَان تَحْلِي**  
Arundinaria palmata (S). Bambou-Palme (F).  
نوع من العُلجان يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . سلاحياته  
اسطوانية . عجره عجيلة مفندة . اوراقه معتقة تطول من  
٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من سائر انواع جنسه . وهو من  
الصفحة العليا يجري السفل || يرغب في الاربة الرملية  
الدبالية الرملية .

١٨٩٢٧ - **عُلْجَان وَضِع**  
Arundinaria humilis (S). Bambou de fortune (F).  
نوع من العُلجان يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . سلاحياته  
اسطوانية خضراء اللون . عجره تربتية . افئاده قليلة . اوراقه  
مبشرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مائل البرشة  
جبل الخضار || يرغب في الاربة الرملية القليلة الاندماج  
النتية بالمواد المضوية .

١٨٩٢٨ - **عُلْجُوم \* ضِفْدَع الحَبْل** ، **ضِفْدَع**  
Bufo (S). Crapeaud (F). Toad (E).  
جنس حيوانات دوداء صغيرة القد قازية من فصيلة  
الكلبيويات وثنية عديمات الاذنان . انولاه نحو ٨٠  
منتشرة في جميع العالم تتميز عن الضفادع العادية بقصر

جميعها اشجار وبخيرات . اعطائها بعض اصقاع البلاد  
الحارة والاستوائية من العالم القديم . سبطها رقيقة ، فرعاء .  
اوراقها متعاقبة ، كاملة . اترابها عشوية التجمع او  
فردية || اشهر اجناسها العلائش .

١٨٩١٠ - **عُلْاش \* Sardinella aurita (S).**  
Allache (F). Allache (E).  
سمكة بحرية قريبة الشبه بالسردين من فصيلة الصابوغيات .  
اعطائها بحار البلاد الاستوائية والحارة وبعض مناطق البحر  
الايبيس المتوسط . سرسحها الافواط والتفاف والهاياج .  
سرها كثير العدد كالسردين || جسمها اهليلجي الشكل  
يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . مهفها مائل ورفيق . زعنفتها  
الظهرية مقعرة الطرف واقرن من الرأس من زعنفة السردين .  
زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح . نوبها الى الربعة  
الزرقاء يملعوا موج فضي يمتد عند الظهر . نبطها الى  
البياض القضي المائجة || لحمها مأكول متوسط الصنفت .

١٨٩١١ - **عِلَاط**  
Face latérale de l'encolure (F).  
صفحة المتق في الدواب والمراثي . والعلائش صفحتا  
المتق من الجانبين || وين الحامة طوقها في صفحتي عنقها .  
ما أملع علاطها || وعلائش الشمس هو الذي يترأى للناظر  
منها كانه خط .

١٨٩١٢ - **عِلَاط**  
Fil (F).  
الخط الدقيق . يقال اعطى الابة بملاطها اي يخطها .

١٨٩١٣ - **عِلَاق**  
Elyme des sables, Oyat (F).  
هو اليموس للكتبان ، اطليه .

١٨٩١٤ - **عِلَاقَة ، عُنُق ، ذُتْب**  
Pétiole (F). Pétiole (E).  
جزء دقيق من الورقة يعمل بالنصل فيدفع اليه بالنفس الباهل  
ويقتل النسخ الكامل . وهو صلة الوصل بين الورقة والغصو  
النباتي الذي ترتكز عليه .

١٨٩١٥ - **عِلَاك** هو الحيفس ، اطليه .

١٨٩١٦ - **عِلَام**  
Amande du nerprun (F).  
لب جميع التبق . Buckthorn almond (E).

١٨٩١٧ - **عِلَام \***  
Accipiter majus (S).  
Epervier majes. Grand épervier (F). Greater  
sparrow-hawk (E).  
طائر من البواشق ، طوله نحو ٤٠ سم . ويسطه ٨٥ سم .  
جسمه رفيع القوام . نوبه جلي التوشيع . صدره اغمر الرقعة  
الغبراء المخططة بالاسود || خلقه خلق البواشق الا انه  
احمر مزاجاً وأشد بطلاناً من سائر انواع جنسه . وهو من  
القواشق التي تجوب العالم القديم ولا تقيم في الشرق الاذ  
اكثر من خبتين يوماً في السنة .

١٨٩١٨ - **عِلَامَة** هي السمة ، اطليه .

١٨٩١٩ - **عَلْب \***  
Tragelaphus euryceros (S).  
Tragelaphe eurycère, Bongo (F). Tragelaph,  
Bongo (E).  
نوع من الجهيل وهو اكبرها قدأ وقرناً وانسها قالبا وارسها  
انتشاراً . ثوبه كبت اسفر يملوه تجديد ابيض ورشة صفراء  
كسائر انواع جنسه . الاكثر اميق لولاً من الاثنى || اعطائه  
فصية الارباء تمتد من بحيرة تشاد الى ليبريه والغاناين .



علائم



علب



علجان



علجوم

Bufonidae (S).

## ١٨٩٣٣ - عُلُجُومِيَّاتٌ

Bufonidés (F), Bufonidae (E).

فصيلة حيوانات من لمة البُيُوتات ومرتبة السُويَّات ورتبة البُيرَاترات أي عديمات الذنب || أجناسها المعروفة ثمانية وأصنافها ١٣٠ منها القازبة والمائية والبرية والجاساة والشاحبة. أعطاها خلع اصطناع باستثناء جزيرة مافسكسر وبعض جزر المحيط الهادي || يجمعها عادمة الانسان. السنبها الحليجية الشكل. فقارها الازمامية المتقدمة عادمة الضفول. اما التنوع الضفولي الذي يمتدح فقرة المميز ويغطيها فين التمدد. اصابع قوائمها الازمامية طليقة. اما اصابع قوائمها الخلفية فقيدة عظام لاقياسي المدى لانه يختلف مع الاجناس والالوان || اعرف اجناسها واشهرها الملجوم.

Ephedra (S), Ephédre (F).

## ١٨٩٣٤ - عُلْدٌ

جنس نباتات ممررة برية من فصيلة العلديات. انواعه المعروفة ٢٠. يجمعها جنبات فراء عفاة. تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. فروعه متعاقبة ثنائية او ثلاثية الانتصاب. اوراقها صغيرة متعاقبة تركب القعد. ازهارها وبيدة المسكن، الذكورية منها فردية او ثنائية التجميع، اسما الانثوية سنبلية. ثمارها سنبلية. مهدها شواطيء بحار البلاد الحارة والممتدة. اعرفها واعمها الملد المزروع السنايل.

## ١٨٩٣٥ - عُلْدٌ مُؤَدَّجٌ السَّنَابِلُ \*، عُنْبُ البحر

Ephedra distachya (S), Ephédre distique, Raisin de mer (F), Sand cherry, Ses grape (E), Gewöhnliches Meertraubenchen (D), Uva di mare (I). نوع من الملد، موطنه شواطيء البحر المتوسط، جنينه تملو نحو ٣٥٠ سم. سنابل ازهاره الانثوية مزدوجة التجميع. ثماره سنبلية، صغيرة القد، حازمة الطعم. مأكولة، لا تخلو من بعض المنافع الطبية وتستعمل في عدة شرابات قنيدية مقوية.

## ١٨٩٣٦ - عُلْدُوسُ الوَزَالِ \*

Alydus calcaratus (S), Alyde des genêts (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الكورسيات ورتبة مَحْطَلات الاجنحة. جسمها مبسط، مبررء الحلب بطول نحو ١٢ سم. راسها شبه يميني الشوزن، اسود اللون. غطلمها مستدل الطول. عيناها صغيرتان، ناشزتان. زباناها مستطيلان. كوسلها سنطلي اللون، اسود الرباط بالراس. سنبلتها صغيرة، مزروانية، شديدة السرة. ظهريها الى الخيطي الاخير. بطنها احمر، جقوي الخثار المنقطع بالخطي الصفصة السفلى من بطنها الى السواد. قشرها شفاف. قوائمها متكاثفة الحلب || مسرعا البراري. تركب المدينة من النبات اخصها القرنيات الفراقية ومنها الوزال.

Gnetaceae (S).

## ١٨٩٣٧ - عُلْدِيَّاتٌ

Gnétaées (F), Gnetaceae (E).

فصيلة نباتية من عريانات البزور. اجناسها ثلاثة: الملد والرجرج والموس.

Aliment (F), Food (E).

## ١٨٩٣٨ - عُلُسٌ

هو الغذاء، اطلبه.

قوائمها. اجسامها تطلو من ١٥ الى ٣٥ سم. تبلغ كامل نموها ونشائها بمرح خرس سنوات. اثنواها مخططة، ثلوثية الجلد، تحمل بعض الندد الفارزة. سائلها كرية الرائحة كاوية تنفضها وتزورها دفاعاً عن النفس.

## ١٨٩٣٩ - عُلُجُومٌ أَخْضَرٌ \*

Bufo viridis (S), Crapaud vert (F), Green toad (E). نوع من الملجوم القاذب. اعطائه جميع الاصقاع المتدلة الحراة من المال القديم || جسمه متوسط القد يطول نحو ١١ سم. عند الذكر ونحو ١٥ سم. عند الانثى. جلده كثير التمول الصغيرة تتخللها بعض الندد الفارزة. سائلها كرية الرائحة كاو يلقفه الملجوم دفاعاً عن النفس || رأسه قصير. عيناها كبيرتان. فم واسع الشدق. فكاه عادمة الانسان. اصابع قوائمها الازمامية طليقة. اما الخلفية فقيدة عظام يكثف الزام الاول || ثوبه الى السرة الزيتية المواج تملوها رقيقة حراء وسرجة خضراء يطولها الاسود || مسرعه دجوي. قوته الحشرات وما استطاع من الزحافات || الانثى تقرأ من ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ ديلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يعتبر من الحيوانات النافعة لانه يقضي على الكثير من الحشرات والجواران والديدان.

## ١٨٩٣٠ - عُلُجُومٌ الْبَحْرِ

Baudroie (F). هو الكرواح، جنس اسماك بحرية، اطلبه.

## ١٨٩٣١ - عُلُجُومٌ جَبَّارٌ \*

Bufo marinus (S), Agua, Bufo géant (F), Giant toad (E).

نوع من الملجوم. اعطائه امريكة الجنوبية والوسطى. جسمه كبير القد يطول نحو ٢٥ سم. عند الذكر ونحو ٣٥ سم. عند الانثى. جلده متمل وتملوه غدد فارزة، سائلها كرية الرائحة كاو. رأسه غليظ وقصير. عيناها كبيرتان، جاحظتان. خطمه واسع الشدق، مقطوف الطور يملو بحن عظمي المادة يمتد من طرف الخطم الى مستوى العين. فكاه عادمة الانسان. اصابع قاتمته الخلفيتين مقيدة بحظاب يكثف الزام الاول || ثوبه الى السرة الخنطية يملوها مواج اغفر ورقيقة سودا تتخللها الندرة || مسرعه دجوي. قوته الحشرات والزحافات. الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ ديلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يتميز ببقية الضاج الشبيه بمواء الكلب.

## ١٨٩٣٢ - عُلُجُومٌ مَبْدُولٌ \*

Bufo bufo (S), Crapaud commun (F), Common Toad (E). نوع من الملجوم. اعطائه جميع اصقاع البلاد الممتدة الحراة من المال القديم || جسمه متوسط القد يطول نحو ١٠ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم. عند الانثى. جلده كثير التمول تتخللها بعض الندد الفارزة، سائلها كاو كرية الرائحة || رأسه قصير. عيناها كبيرتان جاحظتان. خطمه واسع الشدق. فكاه عادمة الانسان. اصابعه الخلفية وقرع الخطاط. ثوبه الى الخضار الاسمر يطلو مواج زيتي ورقة كستنية || مسرعه دجوي. قوته الحشرات والزحافات والديدان || الانثى تقرأ من ٤٠٠٠ الى ٧٠٠٠ ديلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يألف حياة الاسر ويشير بحاسة التوجيه. يعتبر من الحيوانات النافعة.



علجوم اخضر



علجوم جبّار



علجوم مبذول



علد مزدوج السنايل



علدوس الوزال

الاستشرابية خيلية طويلة . مرزاتها قصيرة مدببة . رقاتها عادمة الأرجل البطنية ، مزدوجة التنوير الماكس الذي يشبه الكلاب .



علة الاجاص

١٨٩٤٥ - **عُكْتَال\*** (F). *Phalaropus* (S). *Phalarope* (F). طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة العُكاليات . طوله نحو ٢٢ سم . ظهره الى السمره الصهباء يعلو على سطح اسود . رأسه وعصره الى السمره . زوره ابيض . عتقه وصدره الى الصهبه الرمادية . بطنه وخوافيه واخيه يبيض . جناحه ضيق ذئق ، اسود الظاهر ، ابيض الباطن . ابطاه وقوامه صغر الخمار . منقاره مستطيل اسمر اللون . ارساغه قوية اصابعه مفصصة الحظاب || الاثني اصفر قدماً من الذكر واقل تلويثاً . تدن بين الاشباب قرب الماء . تبيض ٤ بويضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



علة الزرع

١٨٩٤٦ - **عُكْتَالِيَات** (F). *Phalaropodini* (F). عمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض القواطع . اجناسها وانواعها قليلة . اجسامها صغيرة القد . مناقيرها مستطيلة . ارساغها قوية ، اصابعها مفصصة الحظاب || ترتاد شطوط البحار وضفاف البحيرات . تقضي نصف اوقاتها عائمة على سطح الماء والنصف الآخر في الاجواء وعلى الحضيض . قوتها القشريات والرخويات والشرافيت والاسماك الصغيرة والحرايز وبعض الاشباب || لها جنسان : الملعالم والحظلاف .



عسوط مجنح

١٨٩٤٧ - **عُكْتَل\*** (S). *Melanocorypha* (S). *Calandra* (F). *Calendra* (F). جنس طير من فصيلة القتريرات . انواعه ٩ ، اعطائها البلاد الاسيوية والافريقية والاربية . جميعها قنبرية الرأس ، مستطيلة الجناح ، قصيرة الذنب ، دقيقة الرسع ، قوية المنقار . اقواها الى الصهبه الخفيفة تعلوها رشفة سمره . تأتف الحقول المزدودة والمراعي والبقاع . تدن في المراعي وبين الزرع . اناثها تحضن وضعها من ٤ الى ٥ بويضات || اعرف انواعه واشهرها :

**عمل الحيشة** (S). *M. albiterminata* (S). *Calandra d'Abysinie* (F). **عمل الهند** (S). *M. maxima* (S). *Calandre de l'Inde* (F). **عمل روسيا** (S). *M. tartarica* (S). *Calandre de Russie* (F). **عمل زنجي** (S). *M. negra* (S). *Calandre nègre* (F). **عمل معروف** (S). *M. calandra* (S). *Calandre commune* (F).



علمال

١٨٩٤٨ - **عُكْتَلَان** (S). *Tapiscia* (S). *Tapiscio* (F). جنس نباتات زربية مسمرة من فصيلة الصنابات . انواعه قليلة جميعها شجرية تملو من ٦ الى ٨ انتار . اولوقها عابله ، مركبة ، ورية . وريقاتها خاسية او سباعية العدد . نصلها يبيض الشكل ، فلي القاعنة يعلو من ٦ الى ١٣ سم . صفحته العليا خضراء اللون اما السفلى فاحلله . ازغاره شكلية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون ، صغيرة القد ، قواصة العرف الطلري .



علم

Affener (F).

١٨٩٤٩ - **عُكْف**

١٨٩٣٩ - **عُكْس** ، **سِف** (S). *Cephus* (S). *Cèphe* (F). الواحدة علة . جنس حشرات من فصيلة العُكليات . انواعه عديدة . اجسامها نحيلة مستطيلة . رواشها شفافة ، كثيرة الروق . قرونها الاستشرابية خيلية ، رقاتها دقيقة الجسم كلالية الشكل ، عادمة الأرجل المستطيلة . اعرف انواعه واعرضها علة الاجاص وعلة الزرع .

١٨٩٤٠ - **عُكْسَة الاجاص\*** ، **سِف الاجاص** (S). *Janus compressus* (S). *Cèphe du poirier* (F). *Janus compressus* (F). *Birnentriebswespe* (D). حشرة من العُكس ، طولها يراوح بين ٦ و ٨ سم . جسمها اسطواني الشكل . جوشها اسود اللون تعلوها مشعة صفراء . بطنها الى السمره البرتقالية . تظهر في الربيع وتختبئ مكانها في لحاء الاناث فينفذ من رقاتها تلمم الشكير والحشب فتسله وتسب ذبول التواهي وموتها .

١٨٩٤١ - **عُكْسَة الزرع\*** ، **سِف الزرع** (S). *Cephus pygmaeus* (S). *Cèphe pygmée*, *Cèphe du blé*, *C. des chaumes* (F). *Wheat stem sawfly* (E). *Getreidehalmwespe* (D). حشرة من العُكس ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . جسمها نحيل البنية ، اسطواني الشكل . ثوبها الى السمره ، بطنها مجنح بالاصفر . تختبئ مكانها في قصب الزرع فينفذ عن رقات تدخل القصب وترعى لب الكمار فتضع للنسج عن السنبال التي تبيض وتلوي || تكافح بانتقاع وحرق الجملاد لانها تبيت فيه ضمن شرائق صغيرة وشعة الشكل .

١٨٩٤٢ - **عُكْسَط** ، **مِيزَان الارتفاع** (F). *Altimètre* (F). *Altimeter* (E). جهاز يمين رعا الموضع بالنسبة الى سطح البحر اي ارتفاع المكان من مرمى مياه البحر .

١٨٩٤٣ - **عُكْسُوط مُجَدَّع\*** (S). *Chilochorus* (S). *Chilochore bipustulatus* (F). *Chilochorus bipustulatus* (E).

حشرة خاتلة آفة ناعمة من فصيلة النصوصيات ودية مندعات الاجنحة . تأتف غابات الصنوبر واحراجيه . خنافسها وريقاتها تعيش على الارق الذي يركب الصنوبر || جسمها صغير القد بطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السواد الباق . غنادها ثلاثيات القبع الصنابية . رأسها معتدل الجرم . عينها كبريتان . زباناها صقيان . فكاهما ضليخان . ظهورها مستدير الاطراف اللافة . غمداهما شديدتا الصلابة كيتفتا العمل . ارساغها رباعية المقل || اجسامها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من بيائها الشتوي في نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || الوجة سريعة النمو شبه اسطوانية الشكل تعلو عند الإدراك تمام نحو ٧ سم . ثوبها الى السمره القمعية يعلوها خلل اغبر || اما غنفسها الجبل الثالث فانها تقضي فصل الشتاء مختفية تحت الحجارة ولا تخرج من مكانها الا عندما تدب الحرارة في اواسط شهر نيسان .

١٨٩٤٤ - **عُكْسِيَّات** (S). *Céphides* (F). *Cephidae* (S). *Céphides* (F). *Cephidae*, *Stem sawflies* (E). *Halmwespen* (D). فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها نحيلة مستطيلة ، قرونها

تختلف باختلاف الحيوان وما هو مطلوب منه . لذلك فلا بد من معرفة مختلف نسب المواد الغذائية التي تتكون منها غذاء الاعلاف الطبيعية والمركزة || وقد وضعنا في الجدول التالى متوسط تركيب معظم الاعشاب والذئب والاعلاف مع ما يحويها من المواد المنهضة :

Aliment du bétail (F).

١٨٩٥٠ - علف

Aliment of cattle (F).

هو المادة او المواد الغذائية التي تقدم للحيوان في سبيل حفظ حيوانه. ونمو جسمه ونتاجه || يختلف العلف باختلاف نوعه وما يحوي من عناصر وبنود غذائية يمكن قسمها وتحميلها في الجسم || ولا كانت الغاية من العلف

### المشقة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماهية الغذاء	عناصر خام								عناصر منهضة			الحقن الغذائي بالنسبة الى الشاة	مواد الغذائية منهضة الشاة	النسبة في مئة جزء
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد غير ازوتية	خلاصات غير ازوتية	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد غير ازوتية	خلاصات غير ازوتية	سليلوز				
اعشاب المراعي قرب الازهار	٢٥٠	٢٣٠	٠٨	١٣٠	٦٠	٢٠	٤٠	٩٠	٢٠٩	٠٨٧	٥٠	١٣٠		
اعشاب المراعي السحوطة	٢١٨	٢١٠	٠٨	١٠٠	٤٠	٣٠	٠٦	٨٠	٢٠٨	٠٩٢	٢٠٣	١٣٠		
اعشاب المروج العادية	٢٠٠	٢٣٥	٠٨	٩٧	٤٠	٢٥	٠٤	٧٣	٢٠٦	٠٩١	١٧	١١٠		
اعشاب المروج المروية	١٩٢	٣٥	٠٧	٨٤	٤٠	٢٤	٠٤	٦٣	٢٠٢	٠٨٧	١٣	٩٠		
اعشاب المروج عند الازهار	٣٠٠	٢٣١	٠٨	١٤٨	٩٢	٢٠	٠٤	١٠٠	١٠٠	٠٧٩	١٣	١٣٧		
شوفان عند الاسبال	١٦١	٢٣٣	٠٥	٨٠	٣٨	١٧	٠٤	٢٢	٢٠٢	٠٨٩	١٤	٨٥		
شوفان اثناء الازهار	٢٣٢	٢٣١	٠٦	١٠٤	٨٥	١٤	٠٤	٦٥	١٤٣	٠٧٥	١٢	١٠٠		
شوفان بالغ	٤٦٤	٢٣٤	١٢	٢٠٤	١٨٦	٨	٠٨	١٢٦	١٢٦	٠٥٨	٢١	١٤٧		
دوسر	٢١٥	٢٣٤	٠٨	١٤٣	١٠٠	٢١	٠٤	٩٨	٢٠٢	٠٧٦	١٧	١٣٧		
دخن	١٣٠	١٣٣	٠٢	٦٢	٧	٠٧	٠١	٣٨	٢٣٢	٠٨٢	٤	٥٤		
دكتيل مكعب قبل الازهار	٢٠٤	٢٣٣	٠٧	١٠٧	٤٨	٥	٠٤	٧٦	٢٣٠	٠٨٩	٠٨	١٠٧		
دكتيل مكعب اثناء الازهار	٢٧٠	٢٣٥	٠٩	١٤٢	٧٣	١٥	٠٤	٩٥	٢٣٢	٠٨٣	١٠	١٢٩		
ذرة صفراء ككتلة امريكية	١٧٢	١٤٣	٠٤	٨٩	٥٠	٧	٠٢	٥٥	٢٣٧	٠٨٢	٣	٧٣		
ذرة صفراء ككتلة اوروبية	١٩٤	١٧٧	٠٥	١٠٤	٦٠	١٠	٠٣	٦٧	٢٣٠	٠٨٣	٦	٩١		
موها (دخن جبراني) عند الازهار	٢٧٠	٢٣١	٠٦	١١٩	٩١	٠٨	٠٣	٧٤	٢٠٢	٠٧٤	١٠	١٠٦		
زوان معمر اثناء الازهار	٢٤٨	٢٣٩	٠٧	١١٥	٧١	٠٨	٠٣	٧٤	٢٣٠	٠٨١	١٣	١٠٦		
زوان ايطالي اثناء الازهار	٢٥٠	٢٣٤	١٠	١١٦	١٢	١	٠٥	٧٧	٢٣٦	٠٨٥	١٣	١١٤		
شيلم قبل الاسبال	٢٣٣	٢٣٠	٠٩	١٠٣	٧٥	١	٠٥	٧٥	٢٣٠	٠٨٠	١٤	١١٣		
ذرة سكرية	١٩٩	٢٣١	٠٦	٩٦	٦٢	١٢	٠٢	٥٨	٢٣٢	٠٧٩	٧	٨١		
عصوية المروج اثناء الازهار	٣٣١	٢٣١	١٠	١٧٢	١٢	١٦	٠٥	١١١	٢٣٨	٠٧٩	١٠	١٤٠		
شعير عند الاسبال	١٩٠	٢٣٥	٠٥	٨٨	٦٥	٠٨	٠٣	٦٤	٢٣١	٠٨٠	١٥	٧٦		
شعير عند الازهار	٣١٤	٢٣٢	٠٥	١٦٨	٩٢	١٥	٠٣	١٢١	٢٣٤	٠٧٩	١٣	١٦٠		
نفل المروج الطري	١٧٠	٢٣٣	٠٦	٧٢	٢١	٢٤	٠٤	٦٠	٢٣١	٠٩٢	٢١	١٠٠		
نفل المروج قرب الازهار	١٩٠	٢٣٤	٠٧	٨٠	٢٤	٢٥	٠٥	٦٣	٢٣٠	٠٧٧	١٧	١٠٢		
نفل المروج اثناء الازهار	٢١٠	٢٣٤	٠٧	٩٤	٢٢	٢٥	٠٤	٧٧	٢٣٦	٠٨٣	١٧	٩٧		
نفل امجن قرب الازهار	١٧٨	٢٣٧	٠٧	٦٣	٥٥	٢٤	٠٥	٢٩	٢٣٩	٠٨٢	١٣	٧٩		
نفل امجن اثناء الازهار	١٨٢	٢٣٨	٠٧	٦٢	٧٠	١٦	٠٤	٣٠	٢٣٠	٠٧٩	١٠	٧٦		
نفل قريزي اثناء الازهار	١٨٥	٢٣٨	٠٧	٧٠	٦٢	٢١	٠٥	٢٢	٢٣٥	٠٨١	١٥	٩٠		
نفل ابيض قرب الازهار	١٨٥	٢٣٤	٠٨	٦٩	٢٣	٢٨	٠٥	٢٤	٢٣٦	٠٨٨	١٩	٨٨		
فضة طرية	١٨٩	٢٣٦	٠٦	٦٢	٢٤	٢٣	٠٤	٢٧	٢٣٠	٠٨٧	٢٧	٨٧		
فضة قرب الازهار	٢٤٠	٢٣٥	٠٨	٩٦	٦٨	٢٣	٠٤	٢٣	٢٣٩	٠٧٩	١٧	٩٧		
فضة اثناء الازهار	٢٤٠	٢٣٩	٠٨	٩٣	٧٨	٢٧	٠٤	٢٧	٢٣٥	٠٧٤	١٥	٨٤		
رن قرب الازهار	١٩٠	٢٣٦	٠٦	٧٩	٦٥	٢٦	٠٤	٢٤	٢٣٥	٠٨٥	١٩	٩٥		
رن اثناء الازهار	٢٠٠	٢٣٥	٠٦	٧٨	٦٥	٢٣	٠٣	٢٨	٢٣٢	٠٧٦	١٦	٧٦		
رييدان رموي قرب الازهار	١٣٣	٢٣٦	٠٦	٥٦	٢٢	٢٠	٤	٣٦	١٧٧	٠٨٨	١٥	٦٦		

## المدة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

مادة الغذاء	عناصر غذاء										الحقن الغذائي النسبة الن
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## ٢ - في الثمن المظورة

١٦,٧	٣,٤	١,٠	٥,٢	٥,٩	٢,٣	٥,٥	٣,٥	٢,٥	٠,٧٦	١,٣	٢,٢	عرن
١٦,١	٢,٥	١,٥	٥,٧	٤,٤	٠,٩	٠,٢	٣,٤	٢,٦	٠,٨١	٥,٥	٤,٦	شيلم
١٩,٤	٢,٠	٠,٨	٨,١	٦,٥	١,٤	٠,٤	٤,٧	٣,٨	٠,٧٨	٠,٩	٧,٩	حشائش مرموية
٢٣,٧	١,٩	٠,٨	١٠,٧	٨,٥	١,١	٠,٤	٩,٩	٥,١	٠,٧٢	٠,٦	٨,٩	غرضال
١٨,٥	١,٦	٠,٨	٩,٠	٥,٧	٠,٨	٠,٤	٦,٢	٢,٢	٠,٨٢	٠,٤	٨,٦	ذرة صفراء
٢٥,٥	٣,٢	٢,٧	٩,١	٤,٤	١,١	٠,٤	١,٧	١,٧	٠,٨٦	٠,٣	٨,٥	شن البطاطا
٢٠,٠	٣,٤	١,٥	٧,٢	٦,٠	٢,٢	٠,٥	١,٣	٢,٣	٠,٨١	١,٣	٨,٦	حشائش كلثية نجيلية وقطانية
١٨,٠	٢,٢	١,٦	٤,٠	٥,٩	١,١	٠,٨	٣,٥	٢,٩	٠,٨٠	١,١	٨,٠	ترمس
١٦,٩	٢,٧	١,٤	٤,٨	٥,٠	٢,٥	١,٧	٣,٣	٢,١	٠,٨١	١,٥	٦,٦	برسيم
٢١,٧	٤,٤	١,٢	٦,٩	٦,٥	٢,٩	٠,٦	٤,٠	٣,٥	٠,٨١	١,٧	٩,٢	نفل المروج
٢٢,٤	٣,٠	١,١	١٠,٠	٣,٢	٠,٢	٠,٥	١,٨	٠,٨٧	٠,٧	٠,٩١	٧,٢	ورق الشندر
٢٣,٠	٢,٤	١,١	٣,٤	١,٥	٢,٣	١,٥	٧,٢	٢,٥	٠,٩١	٠,٢	٩,٥	ورق واقراص الشندر السكري
١٩,٧	٢,٤	٠,٨	١٦,٥	٧,٨	١,٥	٠,٤	١٠,٧	٣,٩	٠,٨١	٠,٧	١٢,٠	نغم

## المدة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

مادة الغذاء	عناصر خام					عناصر منهضمة					الحزن الغذائي بالنسبة إلى النشا	مواد أخرى منهضمة في مئة جزء	القيمة الغذائية التقوية في مئة جزء
	مواد جافة	مواد أزوتية	مواد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز	مواد أزوتية	مواد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز				
ريبدان مرموي	٣٤,٧	٧,٠	١,٥	١٣,٥	١,٠٩٤	٤,٥	٠,٧	٩,٤	٦,٢	٠,٧٦	٢,٢	١٤,٥	
جلبان	٣,٥٠	١,٠٣	٢,٥	١,٠١	٨,٩	٧,٦	٢,٢	٦,٧	٤,٥	٠,٨٠	٠,٣	١٤,٨	
باقية	١٨,٧	٣,٤	٠,٨	٦,٢	٥,٥	٢,٥	٠,٤	٤,٠	٢,٥	٠,٧٨	٠,٨	٦,٧	

## ٣ - في اللبن

ن المروج الكفيفة	٨,٥٧	٧,٥	١,٥	٣٨,٢	٣٣,٥	٣,٤	٠,٥	١٩,٣	١,٥٦	٠,٤٩	٢,٥	١٨,٩
ن المروج المتوسطة	٨,٥٧	٩,٢	٢,٠	٣٩,٧	٢٩,٢	٤,٦	٠,٦	٢١,١	١,٥٣	٠,٥٨	٣,٢	٢٣,٧
ن المروج الحسنة	٨,٥٧	٩,٧	٢,٥	٤١,٤	٢٦,٣	٥,٤	١,٠	٢٥,٧	١,٥٠	٠,٦٧	٣,٨	٣١,٠
ن المروج الجيدة	٨,٥٠	١١,٧	٢,٨	٤١,٦	٢٩,٩	٧,٤	١,٣	٢٧,٩	١,٣٨	٠,٧٥	٥,٠	٣٦,٢
ن المروج الفاتحة	٨,٤٠	١٣,٥	٣,٠	٤٠,٤	١٩,٣	٩,٢	١,٥	٣٠,١	١,٢٧	٠,٧٨	٤,٠	٤٠,٦
رجيع المراعي غير المروية	٨,٥٢	١١,٥	٣,٤	٣٩,٤	٢٢,٥	٦,٩	١,٦	٢٢,٤	١,٤٠	٠,٧٣	٥,٥	٣٥,٧
رجيع المراعي المروية	٨,٥٠	١٢,٤	٤,٠	٤٠,٦	١٩,٧	٧,٤	١,٢	٢٧,٢	١,٢٢	٠,٧٧	٦,٠	٣٧,٧
ن المناطق الجبلية	٨,٥٥	١٢,١	٣,٦	٣٩,٧	٢٦,٦	٨,٢	١,٢	٢٧,٠	١,٥١	٠,٧٤	٦,٤	٣٨,٥
ن المراعي الترابية	٨,٩٠	٩,٣	٢,٤	٤٤,٢	٢٦,٧	٥,١	١,٣	٢٨,٣	١,٥٨	٠,٦٩	٣,٧	٣٤,٧
رجيع المراعي الترابية	٨,٥٠	١١,٤	٢,٥	٤٠,٤	٢٦,٣	٧,٠	١,٢	٢٥,٤	١,٤٥	٠,٧٢	٥,١	٣٣,٨
ن الأحراج	٨,٥٠	٨,٧	٢,١	٤٣,٢	٢٦,٠	٥,٠	١,٠	٢٥,٦	١,٥٣	٠,٦٩	٤,٨	٣٣,٧
ن المراعي للمالحة	٨,٨٣	٨,١	٢,٧	٤١,٧	٢٨,٤	٤,٣	١,٤	٢٤,٦	١,٦٤	٠,٦٥	٣,٠	٣٠,١
ن المراعي الحامضية	٨,٧٠	٨,٧	٢,٤	٣٧,٣	٢٦,٨	٥,٨	١,٣	٢١,٨	١,٥٠	٠,٥٢	٣,٠	٢٠,٩
ن الحظائر	٨,٨٥	٧,٥	٢,٤	٤٢,٤	٣٠,١	٥,٦	١,٧	٢٦,٧	١,٨١	٠,٦٧	٤,٨	٣٥,٢
ن المواج	٨,٦٦	١٠,٨	٢,٢	٣٨,٥	٢٩,٤	٦,١	١,٤	٢٣,٤	١,٧٦	٠,٦٤	٣,٠	٣٥,٣
ن الزران المسمر	٨,٥٧	١٠,٢	٢,٧	٣٦,١	٣٠,٢	٥,١	١,٨	١٩,٩	١,٥٤	٠,٦١	٣,٣	٢٢,٥
ن البوسر	٨,٥٧	١١,٢	٢,٧	٣٢,٦	٢٩,٤	٥,٦	١,٨	١٧,٥	١,٥٦	٠,٥٥	٣,٥	٢١,٠
ن الزران الاصطالي	٨,٥٧	١١,٢	٢,٣	٢٩,٤	٢٢,٩	٧,١	١,٤	٢٦,٦	١,٤٩	٠,٧٣	٤,٩	٣٥,٦
ن الشيلم	٨,٥٧	١٠,٤	٢,٥	٣٩,٠	٢٨,٥	٧,٣	١,٥	٢٧,٣	١,٧١	٠,٦٩	٦,٢	٣٦,٦
ن الصوبة	٨,٥٧	٨,٥	٢,٤	٢٨,٥	٢٨,٥	٤,٠	١,٠	٢٥,٥	١,٥١	٠,٦٤	٣,٢	٢٩,١
ن نفل المروج المتوسط	٨,٢,٥	١٣,٥	٢,٩	٣٧,١	٢٤,٠	٨,٥	١,٧	٢٦,٠	١,١٣	٠,٧٠	٥,٥	٣١,٠
ن البرسم قبل الانزعار	٨,٤٠	١٦,٢	٢,٤	٣١,١	٢٧,٠	١,٢	١,٢	٢١,٣	١,١٣	٠,٦٣	٨,١	٢٦,٥
ن البرسم أثناء الانزعار	٨,٢,٥	١٤,٢	٢,٦	٢٩,٢	٢٩,٥	٩,٧	١,٢	٢٥,٢	١,٢٢	٠,٥٧	٩,٢	٢٢,٤
ن العرن قبل الانزعار	٨,٤٢	١٥,٤	٢,٢	٣٤,٠	٢٤,٩	١٠,٩	١,٢	٢٥,٢	١,٠٧	٠,٧٠	٧,٨	٣٢,٩
ن العرن أثناء الانزعار	٨,٣,٥	١٣,٢	٢,٥	٣٢,٥	٢٨,٠	٩,٦	١,٦	٢٥,٣	١,١٨	٠,٦٦	٧,٥	٣١,١
ن القصب	٨,٤٠	١٥,٤	٢,٤	٣٣,٢	٢٤,٥	١١,٨	١,٦	٢٣,٢	١,٠٨	٠,٦٩	٨,٦	٣١,٠
ن اللطس القرمي	٨,٧,٥	١٣,٥	٣,٠	٤١,٧	٢٥,٥	٧,٤	١,٥	٢٧,١	١,١٢	٠,٧٢	٥,١	٣٣,٠
ن النفل القرمي	٨,٢,٣	١٢,٠	٢,٤	٣٥,٥	٢٦,٢	٩,٣	١,٠	٢٣,١	١,٢٣	٠,٦٤	٥,٥	٣٧,٤
ن القصة	٨,٢,٣	١٥,٢	٣,٠	٢٨,٩	٣٠,١	١١,٧	١,٢	٢٠,٢	١,٢٩	٠,٦٠	٨,٣	٢٥,٨
ن النفل النيلي	٨,٤٠	١٣,٦	٢,١	٣٤,٥	٢٥,٧	٨,٣	١,٣	٢٣,٨	١,٣١	٠,٦٧	٥,٦	٢٩,٨
ن الريبدان المرموي	٨,٤٠	١٢,٢	٣,٠	٣٣,٢	٢٥,٦	١١,٤	٢,٠	٢٠,٩	١,٢٨	٠,٦٨	٩,٢	٣١,٤
ن الحنثوق الأبيض	٨,٤٣	١٦,٧	٢,٨	٢٧,٩	٣٠,٣	٨,٥	١,٦	١٨,١	١,٣٦	٠,٥٥	٤,٤	٢١,٤
ن النفل الأبيض	٨,٤٠	١٤,٩	٢,٦	٣٥,٧	٢٣,١	٥,٥	٢,١	٢٥,٠	١,١٨	٠,٧١	٤,٩	٣٣,١
ن الجلبان قرب الانزعار	٨,٤٠	٢٨,٨	٢,٨	٢٣,٣	١٦,٧	١٨,٦	١,٧	٢٨,٠	١,٠١	٠,٧١	٢,٦	٣٢,١
ن الجلبان أثناء الانزعار	٨,٣,٣	١٤,٣	٢,٦	٣٤,٤	٢٥,٢	٩,٤	١,٦	٢٠,٥	١,٢٦	٠,٦٦	٦,٦	٢٧,٨
ن الباقية قرب الانزعار	٨,٣,٣	١٩,٨	٢,٣	٢٨,٥	٢٣,٤	١٥,١	١,٤	١٨,٥	١,٢,٦	٠,٦٩	١٠,٨	٣٠,٤
ن الباقية أثناء الانزعار	٨,٣,٣	١٤,٢	٢,٥	٢٣,٨	٢٥,٥	٩,٤	١,٥	١٩,٧	١,٢٨	٠,٦٥	٦,٦	٢٦,٩
ن البرسم الاسفر أثناء الانزعار	٨,٤٠	١٨,٥	٢,٣	٣٤,٦	٢٦,٥	١٣,٧	١,٢	١٩,٦	١,٢٦	٠,٦٥	٨,٥	٣٣,٨
ن الكرسنة	٨,٤٠	٢٢,٥	٢,٢	٢٨,٩	٢٥,٤	١٨,٩	١,٤	٢٢,٨	١,٥٥	٠,٧٣	١٣,٧	٣٩,٢
ن الصوبة	٨,٤٠	١٧,٢	٢,٢	٢٨,٩	٢٥,٤	١٩,٩	٠,٧	١٩,١	١,٥٦	٠,٦٦	٨,٥	٢٧,٠
ن الدندران	٨,٣,٥	١٧,٣	٢,٠	٣٤,٦	٢٥,٣	١٢,١	٠,٩	٢٥,٢	١,٢,٢	٠,٦٩	٨,٠	٣٣,٠
ن السبرغولة	٨,٥,٥	١٢,١	٢,٣	٤١,٨	٢١,٨	٧,٧	١,٢	٢٧,٢	١,٣,٠	٠,٧٤	٦,٣	٣٥,٨



## المنحة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماهية الغذاء	عناصر غذاء									
	عناصر غذاء					عناصر غذاء				
	مواد جافة	مواد أزوية	مواد دهنية	مواد غير أزوية	سليلوز	مواد جافة	مواد أزوية	مواد دهنية	مواد غير أزوية	سليلوز
نُ التضم	٨٦,٠	١,٠٥	٢,١	٣,٥٦	٣,١٤	١,٠	٦,٢	١,٠	٢,٢٢	١,٧٣
نُ السليم	٨٦,٥	١,٥٧	٤,٤	٣,٤٥	٢,٠٥	١,١٠	١,١٠	٢,٢	٢,٤١	١,١٣
نُ الخردل	٨٥,٠	١,١١	٢,٨	٣,٧٢	٢,٦٣	١,٤	٦,٣	١,٤	٢,٢٠	١,٤٥
نُ الزوال	٨٥,٠	٩,٠	٢,٠	٢,٨٧	٤,١٨	٣,٦	٣,٦	٠,٩	١,٧٢	١,٦٧
نُ الصفوان	٨٥,٠	٢,٠٧	٢,٧	٣,٥١	١,١٥	١,٢٠	١,٢٠	١,٨	٢,٩٧	٢,١
ورق القراميس	٨٨,٦	١,٨٣	٧,٧	٣,٨٠	١,٠٦	١,٢٨	١,٠٦	٤,٩	٣,٠٠	٦,٠
ورق ورق الجنبيل	٨٩,٤	١,٢٥	٣,٥	٣,٨١	٢,٤٥	٨,٠	٨,٠	٢,٥	٢,٧١	٧,٦
شمن البطاطا	٩٠,٠	٩,٤	٢,٤	٤,٠٦	٢,٦٠	٢,٨	٢,٦٠	٠,٦	٢,٤١	٩,٦
ورق الانجار المنشرة (في الاواخر تموز)	٨٤,٠	١,٠٥	٣,٠	٤,٩٣	١,٤٢	٦,٢	١,٤٢	٢,٤	٣,٢٥	٣,٧
ورق الحور في تشرين الاول	٨٤,٠	١,٠٨	٨,٧	٣,٩٦	١,٧٤	٦,٠	١,٧٤	٦,٠	٢,٦٢	٥,٦
ورق الكرنبة في الحريف	٨٨,٠	١,١٤	٥,٧	٥,٢٩	٨,٠	٦,٧	٨,٠	٤,٥	٣,٤٤	٣,٠
ورق الاكاسيه في الحريف	٨٧,٦	٩,٨	١,٧	٤,١٠	٣,١٥	٥,٥	٣,١٥	٠,٦	١,٩٣	٦,٦
شمن الطرطوف	٨٧,٥	١,٢٧	٢,٢	٤,٨١	١,٤٢	٧,٦	١,٤٢	١,١	٣,٢٦	٤,١
ورق التردار	٨٨,٠	١,٥٩	٢,٩	٤,٩٩	٨,٦	١,١٠	١,١٠	١,٧	٤,٠٧	٤,٩

## ٤ - في القش

قش الخندروس	٨٥,٧	٢,٧	١,٤	٣,١٨	٤,٤٠	٠,٨	٤,٤٠	٠,٤	٢,٢٠	١,١٨
قش الشير الريبي	٨٥,٧	٣,٥	١,٤	٣,٥٩	٣,٩٥	٠,٩	٣,٩٥	٠,٥	١,٩٠	٢,١٣
قش الشير الشوي	٨٥,٧	٣,٢	١,٤	٣,٣٥	٤,٢٠	٠,٧	٤,٢٠	٠,٤	١,٢٧	٢,١٠
قش الشوان	٨٥,٧	٣,٨	١,٦	٣,٥٩	٣,٨٧	٠,٣	٣,٨٧	٠,٥	١,٦٥	٢,٠٩
قش الدخن	٨٥,٠	٤,٨	٢,٣	٣,٦٤	٣,٥٢	١,١	٣,٥٢	٠,٢	٢,٠٠	١,٩٤
قش القردة الصفراء	٨٥,٠	٥,٠	١,٥	٣,٤٥	٣,٩٢	١,٧	٣,٩٢	٠,٥	١,٧٢	٢,٣٥
قش الارز	٨٦,٨	٢,٢	٢,٢	٣,٣٥	٣,٥٣	٢,٥	٣,٥٣	١,٠	١,٠٧	٢,٠١
قش الشلم	٨٥,٧	٣,٨	١,٢	٣,٣٢	٤,٤٠	٠,٦	٤,٤٠	٠,٤	١,٢٩	٢,٢٠
قش الخنطة	٨٥,٧	٣,٠	١,٢	٣,٥٩	٤,٠٨	٠,٢	٤,٠٨	٠,٤	١,٣٣	٢,٠٤
قش القلق المصري	٨١,٦	٨,١	١,١	٣,١٠	٣,٦٠	٤,٠	٣,٦٠	٠,٥	٢,٠٥	١,٥٥
قش الحصن	٨٦,٤	٩,٠	١,٦	٣,٣٧	٣,٥٥	٠,٧	٣,٥٥	٠,٧	١,٨٥	١,٣٧
قش البالية	٨٦,٧	٩,٠	١,٧	٢,٩٨	٤,٠٩	٤,١	٤,٠٩	٠,٨	١,٤٤	١,٦٤
قش العس	٨٤,٠	١,٣٩	١,٧	٢,٨١	٣,٣٦	٦,٨	٣,٣٦	٠,٨	١,٦٨	١,٣٧
قش القرس	٨٤,٠	٩,٠	٤,١	٣,٠٨	٤,١٤	٢,٥	٤,١٤	٠,٤	٢,٠٠	١,١٠
قش الفضل المربي	٨٤,٠	٩,١	١,٨	٢,٢٨	٤,٤٦	٠,٢	٤,٤٦	٠,٦	١,١١	١,٦٤
قش الكرنبة	٨٤,٠	٦,٧	١,٢	٣,٢١	٣,٩٩	٢,٨	٣,٩٩	٠,٤	١,٦٢	١,٥٥
قش الصوجه	٨٤,٠	٧,٤	٢,٠	٣,٨٣	٢,٦١	٣,٧	٢,٦١	١,٢	٢,٥٢	٣,٠
قش الجلبان	٨٥,٢	١,٣١	١,٧	٢,٩٠	٣,٧٠	٠,٨	٣,٧٠	٠,٥	١,٥٠	١,١٠
قش التضم	٨٤,٠	٤,٨	١,٢	٣,٤٦	٣,٨٢	٢,٢	٣,٨٢	٠,٥	١,٨٠	١,٧٢
قش الخشخاش	٨٤,٠	١,١	٤,١	٣,٣٩	٣,٣٩	٢,٨	٣,٣٩	٠,٦	١,٨٤	١,٥٢
قش السليم	٨٤,٠	٢,٥	١,٢	٣,٨٧	٣,٧٨	٠,١	٣,٧٨	٠,٥	٢,٠٤	١,٤١

## ٥ - عصاة الحبوب

الذرة	٩٤,٣	٣,٩	٣,٩	٥٥,٧	٢,٥٨	١,٥	٢,٥٨	٠,٤	٣,٣٤	١,٢٩
الخندروس	٨٥,٧	٢,٥	١,٣	٣,٢٦	٤,٠٠	١,١	٤,٠٠	٠,٤	١,٢٩	٢,٠٠
الشعر	٨٥,٥	٢,٩	١,٥	٣,٨٤	٢,٩٩	٠,٨	٢,٩٩	٠,٥	١,٧٣	١,٤٤
الخرفاط	٨٦,٢	٥,٠	٢,٥	٤,١٥	٢,٦٧	٩,٩	٢,٦٧	٠,٨	١,٩٩	١,٣٧
الدخن	٨٨,٠	٤,٨	٢,٢	٢,٩٠	٤,٠٨	١,٧	٤,٠٨	٠,٧	١,٣٦	١,٥١
الذرة الصفراء	٨٦,٩	٣,٥	٠,٩	٤,١٣	٣,٨٩	١,٦	٣,٨٩	٠,٤	٢,٢٢	١,٢٩

## المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماهية الغذاء	عناصر خدام										عناصر منقصة				الحين الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد أسية منقصة في مئة جزء	القيمة الطاقة التقوية في مئة جزء
	مواد جافة	مواد أزوتية	مواد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز	مواد أزوتية	مواد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز	مواد أزوتية	مواد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز				
الارز (الثلث)	٩٠,٠	٣,٧	١,٤	٣٢,٣	٣٨,١	٤,٢	٠,٩	١١,٣	٠,٤	٠,١٩	٠,١	٢,٥	٢٢,٥				
الشيلم	٨٥,٧	٣,٥	١,٣	٢٩,١	٤٤,١	١,١	٠,٥	١١,٣	٠,٤	٠,٦٣	٠,٧	٢,٢	٢٢,٥				
الحنطة	٨٤,٠	٤,٧	١,٧	٣٧,١	٣٠,٤	١,١	٠,٥	١٦,٧	١,٤	٠,٧٤	٠,٩	٢,٤	٢٤,٣				
الفاصوليا واللوبيا	٨٥,٠	١٠,٧	٢,٠	٣٢,٥	٣٣,٥	٥,٢	١,٠	٢١,١	١,٤	٠,٥٣	٤,٠	٢١,٨	٢١,٨				
الحمص	٨٦,٠	٩,٨	١,٢	٣٣,٧	٣٤,٤	٩,٩	٠,٥	٢٠,٢	١,٥	٠,٥٠	٢,٧	٢,٠	٢,٠				
البنس	٨٥,٠	١٨,٣	١,٨	٣٨,٤	١٩,٥	١٠,١	١,٠	٢٢,٢	١,٠	٠,٧٣	٨,٣	٣,٠	٣,٠				
الترس	٨٥,٠	٦,٨	٠,٧	٤٠,٥	٣٠,١	٢,٦	٠,٢	٢٥,٣	١,٤	٠,٤٥	١,٨	١,٤	١,٤				
الصنوبر	٨٨,٠	٦,٣	١,٥	٤٢,٠	٣٠,١	٢,٨	٠,٨	٣٠,٧	١,٥	٠,٦٥	٢,٠	٢,٠	٢,٠				
الباقية	٨٥,٠	١٠,٤	٢,٢	٣١,٨	٣٢,٣	١,١	٠,١	١٩,١	١,٤	٠,٥٢	٢,٩	٢,٠	٢,٠				
النم	٨٦,٨	٤,٦	١,١	٣٥,٤	٤٣,٥	٢,١	٠,٥	١٤,٨	١,٤	٠,٥٩	١,٦	١,٧	١,٧				
الكتكان	٨٨,٤	٣,٥	٣,٤	٣٥,٠	٤٠,٧	١,٤	١,٧	١٣,٠	١,٢	٠,٦٠	١,٠	١,٧	١,٧				
السج	٨٤,٠	٣,٥	١,٦	٣٤,٤	٣٧,٤	١,٥	٠,٧	١٦,٦	١,٤	٠,٣٧	١,٠	١,٢	١,٢				

## ٦ - في الجلولر والعاسقل

٢٥,٠	٢,١	٠,١	٢١,٠	٠,٧	١,١	—	١٨,٩	—	١,٠٠	٠,١	١٩,٠	١٩,٠	١٩,٠			
١٧,٠	١,٦	٠,١	١٣,٩	٠,٦	٠,٩	—	١٢,٥	—	١,٠٠	٠,٢	١٢,٧	١٢,٧	١٢,٧			
٢٦,٠	٢,١	٠,١	٢١,٩	٠,٨	١,١	—	١٩,٧	—	١,٠٠	٠,٢	١٩,٨	١٩,٨	١٩,٨			
٣٢,٠	٢,٥	٠,٢	٢٧,٣	٠,٩	١,٣	—	٢٤,٦	—	١,٠٠	٠,٢	٢٤,٨	٢٤,٨	٢٤,٨			
٣٨,٤	١,٦	٠,١	٣٤,٨	٠,٨	٠,٩	—	٣١,٣	—	١,٠٠	٠,٢	٣١,٥	٣١,٥	٣١,٥			
٢٦,٥	٢,٢	٠,٥	٢١,٧	٠,٧	١,١	٠,١	١٨,٤	٠,١	٠,٩٥	٠,١	١٧,٧	١٧,٧	١٧,٧			
٨٨,٠	٢,٤	٠,٤	٧٤,٠	٢,٣	١,٥	—	٦٨,١	—	١,٠٠	٠,٧	٦٨,٨	٦٨,٨	٦٨,٨			
١٢,٠	٢,٣	٠,١	٧,٢	٤,١	١,٢	—	٦,٥	٠,٦	٠,٩٠	٠,٤	٦,٧	٦,٧	٦,٧			
١٣,٠	١,٢	٠,٢	٠,٣	١,٣	٠,٨	٠,١	٨,٩	٠,٧	٠,٨٧	٠,٤	٨,٧	٨,٧	٨,٧			
١٦,٨	١,١	٠,٣	١,٣	١,٣	٠,٩	٠,١	١٢,٥	٠,٨	٠,٨٦	٠,٥	١١,٦	١١,٦	١١,٦			
١٥,٠	١,٣	٠,١	٠,٧	٠,١	٠,٩	—	٦,٤	٠,٣	٠,٧٤	٠,١	٥,٠	٥,٠	٥,٠			
١٣,٥	١,١	٠,١	١٠,٦	٠,٨	٠,٨	—	١٠,١	٠,٣	٠,٧٠	٠,١	٧,٤	٧,٤	٧,٤			
١٢,٠	١,٢	٠,١	٨,٧	٠,٩	٠,٨	—	٨,٣	٠,٣	٠,٧٢	٠,١	٦,٣	٦,٣	٦,٣			
٨,٥	٠,٩	٠,١	٦,٠	٠,٨	٠,٦	—	٥,٥	٠,٣	٠,٧٧	٠,٢	٤,٦	٤,٦	٤,٦			
٢٠,٤	١,٢	٠,٢	١٦,٩	١,٠	٠,٨	—	١٥,٨	٠,٢	٠,٩٢	٠,٤	١٦,٤	١٦,٤	١٦,٤			
٢٥,٠	١,٢	٠,١	٢١,٤	١,٥	٠,٩	—	٢٠,٣	٠,٥	٠,٧٥	٠,٣	١٥,٨	١٥,٨	١٥,٨			
٩,٢	١,٢	٠,٢	٥,٩	١,١	٠,٨	—	٥,٤	٠,٤	٠,٧٨	٠,٣	٤,٨	٤,٨	٤,٨			

## ٧ - في الحبوب والثار

٨٨,٩	٩,٦	٣,٨	٧١,٢	١,٩	٧,٧	٣,٠	٦٠,٥	١,٠	١,٠٠	٩,١	٧٤,٢	٧٤,٢	٧٤,٢			
٨٦,٣	١٠,٩	١,٤	٥٦,٢	١,٥	٨,٢	١,٠	٤٢,١	٦,٨	٠,٢٢	٧,٢	٥٧,١	٥٧,١	٥٧,١			
٨٦,١	١٣,٩	٢,٧	٦٥,٢	٢,٦	١١,١	١,٩	٦٠,٠	١,٣	١,٠٠	١٠,٠	٧٤,٣	٧٤,٣	٧٤,٣			
٨٥,٧	٩,٤	٢,١	٦٧,٨	٢,٩	٦,٦	١,٩	٦٦,٤	١,٣	٠,٩٩	٦,١	٧٢,٠	٧٢,٠	٧٢,٠			
٨٥,٧	٨,٨	٧,٢	٧٠,٢	٢,٧	٦,٣	١,٦	٦٦,٧	١,٢	٠,٩٩	٥,٩	٧٥,٨	٧٥,٨	٧٥,٨			
٨٥,٧	١٠,٢	٢,٥	٦٣,٧	٦,٥	٧,١	٢,٢	٥٦,٧	١,٣	٠,٩٧	٦,٥	٦٦,٤	٦٦,٤	٦٦,٤			
٨٦,٧	١٠,٣	٤,٨	٥٨,٢	١٠,٣	٨,٠	٤,٠	٤٤,٨	٢,٦	٠,٥٥	٧,٢	٥٩,٧	٥٩,٧	٥٩,٧			
٨٦,٧	٨,٢	٤,٢	٦٣,٢	٨,١	٦,٢	٢,٥	٥٠,٦	١,٢	٠,٩٦	٤,٦	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤			
٨٦,٧	١٢,٧	٤,٩	٤٠,٩	١٥,٠	١٠,٢	٤,٦	٣٧,٠	٢,٧	٠,٣٣	٩,٢	٥٤,٨	٥٤,٨	٥٤,٨			
٨٧,٥	١٠,٦	٣,٩	٦١,١	٨,١	٨,٠	٣,١	٤٥,٨	٢,٧	٠,٥٥	٧,٤	٥٩,٧	٥٩,٧	٥٩,٧			
٨٧,٠	٩,٩	٤,٤	٦٩,٢	٢,٢	٧,١	٣,٩	٦٥,٧	١,٣	١,٠٠	٨,١	٨١,٥	٨١,٥	٨١,٥			
٨٧,٤	٩,٧	٠,٤	٧٨,٠	١,٥	٥,٨	٠,٢	٧٥,٨	٠,٧	٠,٣٠	٥,٥	٨٢,٠	٨٢,٠	٨٢,٠			
٨٦,٦	١٠,٥	١,٧	٦٩,٥	١,٩	٩,٦	١,١	٦٣,٩	١,٠	٠,٩٥	٨,٧	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣			

ذره

خنثوس

خنثوس

شمبر (معدل وسطي)

شمبر كلي الحب

شمبر مبسط الحب

خرطال (معدل وسطي)

خرطال مقل الحب

خرطال مبسط الحب

دخن

ذره صفراء (معدل وسطي)

ارز بقشور

شيلم (معدل وسطي)



## الفة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

مادة الغذاء	عناصر محام								عناصر منهضة				الحقن الطائي بالنسبة الى النشا	مواد آسية منهضة الى مئة جزء	النسبة النشوية الى مئة جزء
	مواد ازوية	مواد حديثة	مواد غير ازوية	سليلوز	مواد ازوية	مواد حديثة	مواد غير ازوية	سليلوز	عناصر منهضة						
									مواد ازوية	مواد حديثة	مواد غير ازوية	سليلوز			
سنت الحمص	٨٨٠	٣٠٢	١٠٢	٣١٩	٤٤٧	٤٠٤	١٦٦	٢٢٣	٧٠	١٠٢	١٦٦	٢٢٣	٧٠	٤٠	٣٠٨
نخالة الحمص	٨٨٣	١٦٨	١٠٢	٤٦٢	٢٠١	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	٤٠
دقيق الحمص	٨٦٥	٢٣٤	٢٠	١٠٢	٧٠	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	٣٠٨
قشور القسق السوداني	٨٩٩	٧٢	٢٩	١٨٥	٥٩١	٢٦	٢٨	٧٢	٢٠	٧٢	٢٨	٧٢	٢٠	٢٠	١٠
نخالة القسق السوداني	٨٩٥	٢١٨	١٨١	٢٤٧	١٩٥	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	٧٣٧
نخالة الشعير	٨٩٥	١٤٨	٣٦	٥٧٦	٨٥	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	٥٧٥
دقيق الشعير	٨٦٨	١٢٦	٢٩	٦٥٤	٣٠	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	٦٧٣
عصارة الخرمال	٨٦٠	١٩	٠	٤٥٨	٣٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٣
دقيق الخرمال الخشن	٩٠٠	١١٧	٤٧	٥٢٤	١٥٠	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٥٥٩
دقيق الخرمال الناعم	٩٠٠	١٦٢	٦٦	٥٥٤	٧٥	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	٦٤٢
نخالة الخرمال	٩٠٤	٧٦	٢٧	٥٣٨	٢١٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٥٣
نخالة الذرة الصفراء	٨٧٥	٩٩	٣٦	٦١٥	٩٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٤٧
دقيق الارز	٨٧٤	١٢٠	١٢٠	٤٢٥	٨٠	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨٤
دقيق الشيلم	٨٧٤	١٤٥	٢٨	٦٣٥	٣٦	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	٧٧٥
نخالة الشيلم	٨٧٥	١٦٧	٣١	٥٨٠	٥٢	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	٤٦٩
دقيق الحنطة	٨٧٤	١٤٣	٣٢	٢٢٩	٤٣	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٧٣٠
نخالة الحنطة الناعمة	٨٧٨	١٥٥	٤٨	٥٤٠	٨٠	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	٤٨١
نخالة الحنطة الخشنة	٨٧٨	١٤٣	٤٢	٥٢٢	١٠٢	١١٣	١١٣	١١٣	١١٣	١١٣	١١٣	١١٣	١١٣	١١٣	٤٢٦

## ب - الصناعات النشوية

١٤٠	٠٦	—	١١٥	١٥	—	—	٨٠٨	٨٠٨	٠٢	٠٩٥	—	٨٠٦	—	٠٩٥	٠٩٥
٨٦٠	٣٤	٠١	٦٨٢	٨٠٨	—	—	٠٢٥	٠٢٥	١٠٢	٠٩٥	—	٠٢٥	—	٠٩٥	٠٢٥
٢٤٨	٣٦	١٦	١٦٦	٢٨	٢٩	١٤	١٥١	١٥١	١٠٢	٠٩٢	٢٢٢	١٩٥	٢٢٢	١٩٥	١٩٥
٨٧٢	١٤٠	٥٧	٦١٣	٤٢٣	١٤٨	٢٥	٥٦٩	٥٦٩	١٠	٠٩٠	١٠٢	٦٥٠	١٠٢	٠٩٠	٦٥٠
٩١٩	٢٣٧	٢٥	٥٦٨	٦٨	١٩٩	١٠٩	٤٧١	٤٧١	٢٥	٠٩٠	١٨٤	٦٣٨	١٨٤	٠٩٠	٦٣٨
٤٧٧	١٣٦	١٠٢	٢٨٧	٦٦	١١٢	١٠٢	٢٦١	٢٦١	٠٤	٠٩٢	٨٥	٣٢٨	٨٥	٠٩٢	٣٢٨
٨٦٠	٢٦٢	٢١	٥٥٢	١٠٢	٢١٥	١٠	٥٠٣	٥٠٣	٠٧	٠٩٠	١٦٣	٦١٤	١٦٣	٠٩٠	٦١٤
١٥٤	٢٠	٠٩	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	٠٨	٠٩٠	١٠٢	١٠٧	١٠٢	٠٩٠	١٠٧
٨٧١	٨٧	١٧	٧٤٦	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	٠٩	٠٨٨	٥٦	٦٤٤	٥٦	٠٨٨	٦٤٤
٧٠	٠٦	—	٤٧	١٠٤	٠٣	—	٤٠	٤٠	١٠	٠٩٤	٠٣	٥٠	٠٣	٠٩٤	٥٠
١٥٥	١٣	٠١	٩٩	٣٠	٠٧	٠٧	٨٥	٨٥	٢٢	٠٩٤	٠٦	١٠٦	٠٦	٠٩٤	١٠٦
١١٦	١٠	٢٢	٧٢	٢٣	٠٥	٠١	٤٤	٤٤	١٢	٠٩٠	٠٣	٦٥	٠٣	٠٩٠	٠٣
٨٨٨	٨٠١	٠٦	٥٨٥	١٧٦	١٠٤	١٠٤	٠٤	٠٤	٠٤	٠٧٨	٣٦	٥١٩	٣٦	٠٧٨	٥١٩
٧٨١	١٠٥	—	٦٠٤	—	٤٠٤	—	٤٠٤	٤٠٤	—	٨٧	—	٤٨٠	—	٨٧	٤٨٠
٩٠٠	٨٧	٠٣	٦٠٨	١٣٨	٤٦	—	٥٢٠	٥٢٠	٨٢	٠٨١	٢٧	٥٠٥	٢٧	٠٨١	٥٠٥
٩١٨	٦٧	٠٤	٦٨٩	١٢١	٣٤	—	٥٨٧	٥٨٧	٨٧	٠٨٠	٢٠	٥٥٢	٢٠	٠٨٠	٥٥٢

## ج - الصناعات التخيرية

٢٢٨	٥١	١٧	١٠٦	٥١	٣٧	١٥	٦٦	٢٠	٠٨٦	٣٥	١٢٧	٢٢٨	٣٥	٠٨٦	١٢٧
٩٠٥	٢٠٦	٧٠	٤٢٢	١٥٩	١٤٦	١٢٢	٢٥٣	٢٥٣	٧٦	٠٨٤	١٣٧	٤٨٤	١٣٧	٠٨٤	٤٨٤
٩٢٢	١٩٥	٧٢	٤٨٣	١٤٦	١٣٨	١٣٨	٢٩٩	٢٩٩	٧٠	٠٨٤	١٢٩	٤٨٤	١٢٩	٠٨٤	٤٨٤
٨٩١	١٥٣	٦٨	٣٩٧	٢١٠	٤٧	٤٧	١٩٠	١٩٠	٢٠	٠٨٣	٢٠	٢٨٧	٢٠	٠٨٣	٢٨٧
٨٧٩	٤٩٣	٢٩	٣٠٤	٠٦	٤٢٧	١٠١	٢٤٨	٢٤٨	—	١٠٠	٤٠٥	٦٥٠	١٠٠	٤٠٥	٦٥٠
٥٧	١٢	٠١	٢١	٠٦	٠٦	—	٢٢	٢٢	٠١	٠٩٣	٥٠	٢٢	٥٠	٠٩٣	٢٢
٩٠٠	٢٤٢	٣٧	٤٠٨	٩٥	١٢٢	١٢٢	٢٠٤	٢٠٤	٢٠	٠٩٠	٩٤	٣١٢	٢٠	٠٩٠	٣١٢
٨٧	٢٠	٠٩	٤٥	٠٨	١٣	٠٨	٣٢	٣٢	٠٤	٠٩٠	١٠	٥٥	١٠	٠٩٠	٥٥
٩٠٠	٢٧١	١٢٦	٣٥٦	٩١	١٨٢	١٢٠	٢٥٣	٢٥٣	٢٩	٠٨٨	١٥١	٦٠٦	١٥١	٠٨٨	٦٠٦
٥٢٠	٦٥	١٢	٣٨١	٤٨	٢٢	١٠١	٣٣١	٣٣١	٢٩	٠٩٠	٣٩	٣٩٩	٢٩	٠٩٠	٣٩٩
٩٢٥	٩٥	٢٥	٦٩١	٩٠	٧٦	١٠٩	٦٠١	٦٠١	٤٥	٠٩٦	٥٧	٧١٠	٥٧	٠٩٦	٧١٠

## المثقة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماهية الغذاء	عناصر غذاء										الحقن الغذائي بالنسبة الى النشا	مواد آمنة منهضة في مئة جزء	القيمة الغذائية التغذية في مئة جزء
	عناصر خضام					عناصر منهضة							
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد غير ازوتية	سليلوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد غير ازوتية	سليلوز				
ثقل التيلم الطري	٧,٨	١,٧	٠,٤	٤,٦	٠,٧	١,١	٠,٣	٣,٧	٠,٤	٠,٨٧	٠,٩	٤,٨	
ثقل التيل الجاف	٩,٠	٢,٢٧	٠,٥	٤,٧	٠,٥	١,٤	٠,٩	٣,٧٧	٠,٣	٠,٨٤	١,١	٥,٣٢	
ثجير الضاح الطري	١٩,٨	٠,٧	٠,٧	١,٣٢	٤,٥	٠,٤	٠,٣	٩,٢	٠,٣	٠,٩٢	٠,٣	٩,٥	
ثجير الضاح الجاف	٩,٠	٤,٥	٣,٢	٥,٩	٢,٠	١,٦	١,٦	٤,١٤	١,٣	٠,٧٨	١,٢	٣,٦٦	
ثجير الثوب الطري	٣,٠	٣,٤	٢,٤	١,١٩	٩,٤	٥,٥	١,٣	٤,٣	٠,٨	٠,٣٢	٠,٣	٢,٥	
ثجير الثوب الجاف	٩,٠	١,٥	٧,٣	٣,٦	٢,٨٢	١,٦	٠,٤	١,٣	١,٣	٠,٢٢	١,١	٧,٥	
د - الاكسية													
كسب القطن غير المشور	٨٩,٥	٢,٤	٦,٥	٢,٦٣	٢,٥	١,٨١	٦,١	١,٣٤	٤,٥	٠,٨٤	١,٧	٣,٩٢	
كسب القطن المشور	٩١,٢	٤,٩٢	٩,٧	١,٩٢	٦,٣	٤,٢٣	٩,١	١,٢٩	١,٨	٠,٩٨	٤,٥	٧,٣	
كسب القطن السوداني	٩,٠	٤,٥	٩,٢	٢,٣٨	٤,٥	٤,٠	٨,٣	٢,٠	٠,٨	٠,٨٨	٣,٨٢	٥,٥٧	
كسب اللطام (القنيز)	٨٨,٥	٣,١٨	١,٥	١,٨٠	٢,٥٢	٢,٣٩	٩,٥	١,٥٣	١,٦	٠,٨٩	٢,٢٦	٤,٩٥	
دقيق اللطام المزيت	٨٩,٥	٣,٦٨	٣,٣	٢,١	٢,١٠	٢,٧٦	٢,٦	١,٥٧	١,٧	٠,٨٦	٢,٥	٣,٥٨	
كسب الكاكار	٩,٠	١,٨٨	١,١٢	٣,٦٤	٥,٥	٠,٨	٩,٤	١,٧	٣,٣	٠,٩٠	—	٣,٩	
كسب جوز الارطى	٩١,٥	٤,٥	١,٧	٢,١٢	٤,١	٣,٩٧	١,١	١,٩	١,٦	٠,٩٩	٣,٨٢	٨,٢	
كسب جوز الكايرك	٨٦,٧	٢,٦٣	٥,٨	١,٩٩	٢,٨٢	١,٩	٥,٢	١,٣٥	٠,٦	٠,٨٢	١,٨٨	٣,٧٧	
كسب جوز التارجيل	٨٩,٥	٢,١٤	٨,٥	٣,٨٧	١,٤٧	١,٢٧	١,٢	٢,١	٠,٣	١,٠٠	١,٣٢	٧,٥	
كسب زور البطين	٩,٠	٣,٦	٢,٢٧	١,١	١,١	٣,٣	٢,١	١,١	١,٦	٠,٩٦	٣,١٤	٩,٤	
كسب زور النصار	٨٩,٥	٣,٣٥	٩,٧	٢,٩	١,١٢	٢,٦٤	٩,٢	٢,٣٣	٥,٥	٠,٩٦	٢,٥	٧,٠٧	
كسب زور الكتان	٨٩,٥	٣,٣	٨,٦	٣,١٧	٨,٧	٢,٨٨	٧,٩	٢,٥٤	٤,٣	٠,٩٧	٢,٢٦	١,١٨	
دقيق زور الكتان المزيت	٨٩,٨	٣,٧٤	٣,٨	٣,٣٧	٩,١	٣,٣٢	٣,٤	٢,٦٢	٣,٤	٠,٩٦	٣,١٤	٦,٤٨	
كسب الصوجه	٨٩,٥	٤,٥٢	٥,٢	٢,٥٩	٦,٥	٤,٥٧	٤,٦	٤,٤٣	٤,٥	٠,٩٦	٣,٩٩	٧,٤٩	
دقيق الصوجه المزيت	٩,٠	٤,٧	٢,٢	٢,٧٣	٧,٥	٤,٢٣	١,٥	٢,٦٢	٦,١	٠,٩٦	٤,٤٤	٧,٢	
كسب الفوز	٨٩,٥	٤,٠٨	١,٦	١,٨٩	٢,٢	٢,٧	١,٥٧	١,٥١	٢,١	٠,٩٧	٣,٤٣	٧,٢	
كسب الخشخاش	٨٨,٥	٣,٥٧	١,٢٢	١,٨٤	١,١٢	٢,٨٢	١,١٢	١,١٨	٠,٦	٠,٩٥	٢,٦٦	٦,٦٢	
كسب الزيتون	٨٨,٣	٧,٢	١,٣٨	٢,٨	٣,٣٧	٤,٣	١,٣١	١,٩٧	١,١	٠,٨٥	٤,٥	٥,٦٤	
كسب السلم	٩,٠	٣,٣	١,٠٢	٢,٣٩	١,١	٢,٥٤	٢,١	٢,٢٣	٠,٩	٠,٩٠	٢,٣٠	٦,١	
دقيق السلم المزيت	٩,٠	٣,٤٨	٥	٣,٠٤	١,١٧	٢,٨٩	٤,٥	٢,٤٣	٠,٩	٠,٩٤	٢,٤٤	٥,٣٣	
كسب الانيسون	٩٢,٦	١,٨	١,٩٩	٢,٧٣	١,٦	٩,٨	١,٨٧	١,٨٦	٠,٢	٠,٩٦	٨,٩	٦,٩٢	
كسب الثمار	٩,٥	١,٧	١,٣٩	٢,٨٧	٦,٧	١,٢٩	١,٢٩	١,٢٩	١,٠	٠,٩٠	٦,٢	٥,٥٣	
كسب الكزبرة	٩,٠	١,٤	١,٨	٣,٠٢	١,١٣	١,٧٥	٢,٥	٢,٠٥	٤,٥	٠,٩٣	١,٠٨	٨,٠٤	
كسب الكمحون	٩,٠	٢,٠٧	١,٧	٢,٥٨	١,٨٢	١,٤٤	١,٧٥	١,٩٦	١,٥	٠,٩٤	١,١٣	٨,١	
كسب البربر	٩,٠	٤,٥	١,٧	٣,٥٣	٢,٩٨	١,٦٣	٢,٤٧	٢,٤٧	٧,٥	٠,٨٨	٢,٢	٦,٥	
كسب البعتر	٩,٥	١,٦٧	٢,٤٤	١,٦٥	١,٢٤	٢,٢٣	٦,٧	٢,٢٣	٥,٣	٠,٨٠	١,٢٨	٧,٢٣	
كسب البسم	٩,٥	٣,٩٨	١,٢٦	٢,٠٦	٦,٨	٣,٥٨	١,١٣	١,١	٢,١	٠,٩٧	٣,٤٢	٧,١	
كسب الطرندول	٩,٠٨	٣,٩٤	١,٢٦	٢,٠٧	١,١٧	٣,٥	١,١	١,٤٧	٢,٥	٠,٩٥	٣,٣٤	٧,٢	
كسب الجوز	٨٦,٦	٣,٥	١,٢٢	٢,٧٦	٦,٧	٣,١	١,١٦	٢,٢	١,٧	٠,٩٨	٢,٩	٨,٥	

## ٩ - في بعض المواد الحيوانية المصدر

دم جفنف	٩,١	٨٣,٩	٢,٥	—	—	٧٧,٢	٢,٥	—	—	١,٠	٦٨,٥	٦٧,٧
دقيق السمك القليل الدهن	٨٧,٢	٥,٢	٢,١	—	—	٤,٧٣	١,٦	—	—	١,٠	٤٣,٦	٤,٥
دقيق السمك الزئير الدهن	٨٩,٢	٤,٨٤	١,١٦	—	—	٤,٣٦	١,١	—	—	١,٠	٤,١	٦,٤٢
دقيق اللحم	٨٩,٢	٧,٢٣	١,٣٢	—	—	٦,٧٢	١,٢	—	—	١,٠	٦٣,٦	٨,٩
حليب البقر	١٢,٣	٣,٥	٣,٤	—	—	٣,٣	٢,٤	—	—	١,٠	٣,٢	١,٤٧
حليب البقر المخفوض	١,٢	٤,٥	٠,٨	—	—	٣,٨	٠,٨	—	—	١,٠	٣,٨	٩,٥
مضارة الزبدة	٩,٩	٤,٥	١,١	—	—	٣,٨	١,١	—	—	١,٠	٣,٨	٩,٢
مصل اللبن	٧,٣	١,٠	٠,٨	—	—	٠,٨	٠,٨	—	—	١,٠	٠,٨	٦,٥
دقيق الحوت القليل النظام	٩٢,٧	٦,٢٣	٢,٥	—	—	١,٦	٢,٢٣	—	—	١,٠	٤,١	١٠٠
دقيق الحوت الكثير النظام	٩٤,٤	٥,١	٢,١٩	—	—	٤,٦	٢,٠٨	—	—	١,٠	٣,٨٦	٨,٦٤

## ١٨٩٦٤ - عِلْم البحار ، حَضَامَة ٥

Océanographie (F). Oceanography (E).  
علم يبحث في علم البحار ونبوتها وما هي عليه من مختلف الأحوال الطبيعية .

## ١٨٩٦٥ - عِلْم التاريخ الطبيعي ، عِلْم المواليد

Histoire naturelle (F). Natural history (E).  
علم يبحث في وصف الاشياء وتصنيفها .

## ١٨٩٦٦ - عِلْم التربة ، أَغْرُولُوجِيَة

Agrologie (F). Agrology (E).  
دراسة التربة حكمياً وكهياً وبكتائياً وبيولوجياً .  
وهو أيضاً دراسة الاتربة الزراعية وصلاحيتها بالزروع .

## ١٨٩٦٧ - عِلْم التصنيف

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).  
هي للتداسة ، اطلبه .

## ١٨٩٦٨ - عِلْم التعاقب ، تَرَاتُوجِيَة

Tératologie (F). Teratology (E).  
علم يبحث في اسباب غرائب المخلوقات ومن دواصها .  
كالاعداخ في اللوب والشملة في النبات والاعراب الخ .

## ١٨٩٦٩ - عِلْم الثدييات

Mammalogie, Mammologie (F). Mammalogy (E).  
قسم من علم الحيوان يبحث في الثدييات دون غيرها .

## ١٨٩٧٠ - عِلْم الحشرات ، أَنتُومُولُوجِيَة

Entomologie (F). Entomology (E).  
قسم من علم الحيوان يبحث في تصنيف الحشرات وبنيتها  
وأطوارها وطبائنها واضرارها .

## ١٨٩٧١ - عِلْم الحفريات القديمة

Paléontologie (F). Palaeontology (E).  
هو الااحة ، اطلبه .

## ١٨٩٧٢ - عِلْم الحيات ، حَنَاشَة ٥

Ophlographie, Ophiologie (F). Ophiography, Ophiology (E).  
علم يبحث في وصف الحيات وتصنيفها .

## ١٨٩٧٣ - عِلْم الحيوان ، زُولُوجِيَة

Zoologie (F). Zoology (E).  
فرع من التاريخ الطبيعى او علم المواليد يبحث في  
الحيوان .

## ١٨٩٧٤ - عِلْم الحيات الزراعية ، زُولُوجِيَة

Zoologie agricole (F).  
Agricultural zoology (E).  
الدراسة المفصلة الواقة لجميع الحيوانات المفيدة والمضرة  
بالزراعة .

## ١٨٩٧٥ - عِلْم الخمر ، صُهْبَة ٥

Oenologie (F).  
Oenology (E).  
دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعتها وتخليطها وحفظها  
وامرارها الخ... .

## ١٨٩٧٦ - عِلْم الخيل ، خَيْالَة

Hippologie (F).  
Hippology (E).  
علم يبحث في الخيل يشمل كل ما يخص بها من جميع  
الوجوه .

## ١٨٩٥١ - عُلف ، عُلف

العلف والعلف : شجر ياتي ورقة الكلب يتنع ويحف  
ويطبخ به اللحم عوضاً عن الخل (١. م).

## ١٨٩٥٢ - عُلفاس \*

Ablepharus (S).  
Abléphare (F). Ablepharous (E).  
جنس زحافات صغيرة من العظائيات وفصيلة السقنقوريات.  
انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الحارة من العالم  
القديم || اجسامها صغيرة ، متدلة الشخانة || تطول من  
١٠ الى ١٥ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . عيونها  
صغيرة عادمة الحواجب . اذانها دقيقة || جميعها ناعمة ،  
قوتها اللدنان والحشرات .

## ١٨٩٥٣ - عُلفَة

هي السفة ، اطلبه .

## ١٨٩٥٤ - عُلفِيَة

هي ثريل الحقل ، اطلبه .

## ١٨٩٥٥ - عُلفى

هو الجلع ، اطلبه .

## ١٨٩٥٦ - عُلفَة \*

Hirudo (S).  
Sangus (F). Leech (E).  
علقة ج علق : اسم شامل يطلق على اجناس وانواع كثيرة  
من اللق الماس . يعيش في الماء ، قوته الدم يمتصه حينما  
يستطيع .

## ١٨٩٥٧ - عُلفَة الخيل \*

Hoemopsis vorax (S).  
Sangus du cheval, S. verte, Voran (F).  
علقة صغيرة القذ اسفينية الشكل خضراء الملامح ، تعيش  
في الماء والوحل وقد تركب الحيوان اذا اقرب منها وهي  
تؤذي الخيل اذا دخلت افواهها وصلقت في اسنانها لذلك  
يجس انزعاجها عند رؤيتها قبل تقاطع شراها .

## ١٨٩٥٨ - عُلفَة السمك \*

Sangus piscicole (F).  
علقة صغيرة القذ تحيلة الجسم تعيش على مختلف الاسماك  
البحرية والبرية تمتص الدم وقد تسبب الموت .

## ١٨٩٥٩ - عُلفَة نهريَة \*

Aulostome (F).  
علقة صغيرة القذ اسفينية الشكل سمراء اللون ، تعيش في  
المياه العذبة تركب الاسماك والقشريات .

## ١٨٩٦٠ - عُلفى

نبت قصبانه مذاق عسر رضعها يتخذ منه الكائنس ويشرب  
طبيخه لاستسقاء (اللسان) .

## ١٨٩٦١ - عُلفِيَات

Hirudinae (S).  
Hirudinées (F). Hirudinae (E).  
طائفة من الديدان الحلقية لها رتبتان العرطويات والحكيات  
اكثرها من الديدان المائية ومنها الارضية التي تعيش  
على الاجزاء . مهدها المناطق الاستوائية . تتميز باجسامها  
المتقطعة الاسطوانية التي تبدو كأنها خالية من الرووس  
قوتها المواد الحيوانية . معطها ماس يمتص الدم .

## ١٨٩٦٢ - عِلْم الاحياء ، عِلْم الحيات

هي البيولوجية ، اطلبه .

## ١٨٩٦٣ - عِلْم الاصداف ، كُنُتُولُوجِيَة

Conchyliologie (F). Conchology (E).  
علم يبحث في الاصداف والحار واشباهها .



علفاس



علقة



علقة الخيل



علقة نهريَة

والنواحي والفيزيولوجية . وعلم النبات الخاص الذي يبحث في التحليل والتصنيف والجغرافية وتختلف المعطيات والتطبيقات الزراعية والطبية والصناعية .

#### ١٨٩٩٢ - علم النبتات البحرية ، فيكولوجية

Phycologie (F). Phycology (E).

#### ١٨٩٩٣ - علم النسيج ، إستولوجية ، نساجة

Histologie (F). Histology (E).

علم يبحث في التسج العضوية وأخلايا النشوية في الأحياء .

#### ١٨٩٩٤ - علم النواة ، كاريولوجية

Caryologie (F). Karyologie (E).

#### ١٨٩٩٥ - علم الهواء ، علم طبقات الهواء

Aérologie (F). Aerology (E).

#### ١٨٩٩٦ - علم أمراض الحيوان

Zoopathologie (F). Zoopathology (E).

#### ١٨٩٩٧ - علم حياة النبات

Phytobiologie (F). Phytobiology (E).

#### ١٨٩٩٨ - علم قوة السوائل

Hydrodynamique (F). Hydrodynamics (E).

هو علم قوة الموائع من مائية وغيرها .

#### ١٨٩٩٩ - علم وصف النبات

Phytographie (F). Phytography (E).

راجع تجلية .

#### ١٩٠٠٠ - علمانية

Sécularisme (F). Secularism (E).

الميلانية مذهب فلسفي إنكليزي ينفي الفكرة الدينية في المصير البشري .

#### ١٩٠٠١ - علمية

Scientisme (F). Scientism (E).

العلمية مذهب فلسفي يمان التفوق المطلق للعالم في كل شيء .

#### ١٩٠٠٢ - علمية

هي العنقب . أما كلمة علمية فهي من وضع الاثير مصطفي الشهابي .

#### ١٩٠٠٣ - علم

Hippotragus, Egceros (S). Hippotrague, Egocère (F). Sable antelope (E).

جنس حيوانات لبونة عجمية بأهمية الاختلاف من بقري الوش . انواعه الحالية ثلاثة جميعها كبيرة القذ قريبة الشبه من الارح . قريبا طويلة حذباء كالكسوف العربية وهي في الذكور اكبر مما هي عليه في الاناث . اذناها كبيرة مستطيلة . اذناها قصيرة او متوسطة القذ . اعطائها البلاد الافريقية . تأري القبايلي والبروج والاحراج . تعيش بأكسها متوسطة العدد اجلها براوح بين ١٠ و ٥٠ ، رئيسها غلب ذكر مانع رافقه من الذكور الى الحسة ذكور ياقعة لا تمحص بعد . اما الذكور المستة فتنتغل عن القطعان وتجمع الى بعضها او تعيش على انفراد .

#### ١٩٠٠٤ - علم أروق

Hippotragus leucophaeus (S). Hippotrague leucophe (F).

نوع من الملعب وهو اكبرها جنه وانسها قوفاً واجلها شكلا يعلو نحو ١٦٥ سم . ثوبه الى الزرقه اللامعة . رأسه اسود الجبهة والسيالة العريضة . محمره الى الياض

#### ١٨٩٩٧ - علم النواحي ، ذجانية

Zootechnie

علم يبحث في أنسال وسلالات النواحي ووسائل تربيتها وطرق استغلالها الخ...

#### ١٨٩٩٨ - علم الزراعة

Agronomie (F). Agronomy (E).

هي العلوم الزراعية او الاخرى هي دراسة قواعد الفنون الزراعية التي تسمح بتطبيق العلوم على الزراعة .

#### ١٨٩٩٩ - علم الزواحف ، زحفية

Erpétologie, Herpétologie (F). Herpetology (E).

علم يبحث في وصف الزواحف وتصنيفها واحوالها الطبيعية .

#### ١٨٩٨٠ - علم الشرايين

Artériologie (F). Arteriology (E).

#### ١٨٩٨١ - علم الصحة

Hygiène (F). Hygiene (E).

علم يبحث في حفظ الصحة ووقايتها .

#### ١٨٩٨٢ - علم الصخور ، صتامة

Péetrographie (F). Petrography (E).

علم يبحث في الصخور وركبتها .

#### ١٨٩٨٣ - علم الصناعات الزراعية ، تكنولوجية

Technologie agricole (F). Agricultural technology (E).

درس جميع الوسائل العلمية والعملية المختصة بالصناعات الزراعية كصناعة السكر والكدول والزيت والخمر والخبز .

#### ١٨٩٨٤ - علم الطير ، طيريات

Ornithologie (F). Ornithology (E).

علم يبحث في الطير من جميع نواحيه الطبيعية والتأشيشية والاقتصادية .

#### ١٨٩٨٥ - علم الغدد

Adénologie (F). Adenology (E).

#### ١٨٩٨٦ - علم الكائنات

Ontologie (F). Ontology (E).

علم يبحث في الكائنات وباعيتها .

#### ١٨٩٨٧ - علم المعادن ، معدنيات

Minéralogie (F). Mineralogy (E).

#### ١٨٩٨٨ - علم المعنولات

Métaphysique (F). Metaphysics (E).

علم يبحث في اصول المبادئ وفي العلل الموجبة الأولى .

#### ١٨٩٨٩ - علم المفاصيل

Arthrologie (F). Arthrology (E).

#### ١٨٩٩٠ - علم الميكروبات ، ميكروبيولوجية

Microbiologie (F). Microbiology (E).

علم يبحث في تصنيف الميكروبات ووصفها وخصائصها وبيئاتها واهوارها وبكافحتها .

#### ١٨٩٩١ - علم النبات ، بوتانيك ، فينولوجية

Botanique, Phytologie (F). Botany, Phytology (E).

درس العلوم الطبيعية الذي يتناول النبات وهو قبان : علم النبات العام الذي يبحث في الشوزية والايستولوجية

٣٠٠ منها الحولية والمحولة والمصرة . أعطائها نسيحة الارباء تشمل جميع الاسعاق المنتحلة الحرارة . معطها بري وبعضها زُرْبِيَّي ولبني . سقها فراءه . اوراقها كاملة ، متعابلة ، سنائية النصل . ازهارها مستطيلة الزناد ، لاقبائية التجميع والارتكاز || اشهر انواعه ما يتبع .

### ١٩٠١٣ - عَلُوكُ أَحْمَر \* ، سِيلَان طاق ، صَمْع

#### الذباب

Silene armeria (S). Silène à bouquet, Attrape-mouches (F). Common catchfly (E). Gartenleimkraut (D). Silene a mazzetti, Aclachappa mosche (I). عشية حولية برية طيبة بذولة . ساقها فراءه تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها حاضرة . نصلها يقضي الشكل جامد الصفة ، عاقب الخضار . ازهارها عطقية التجميع ، حر البتلات || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ١٩٠١٤ - عَلُوكُ أَخْضَرُ الزَّهَر \* ، سِيلَان أَخْضَرُ الزَّهَر

Silene viridiflora (S). Silène à fleurs vertes (F). عشية معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها عشية . اوراقها سنائية . ازهارها ابليبة الارتكاز . بتلاتها ثنائية التفصيص خضراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٩٠١٥ - عَلُوكُ بَحْرِي \* ، سِيلَان بَحْرِي

Silene maritima (S). Silène maritime (F). عشية برية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . مهدها شطوط المتوسط ، ساقها ليفية فراءه . اوراقها يقضي الشكل ، بحرية اللون ، ازهارها عشكولية التجميع . بتلاتها الى البياض الاصفر المالح || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول . يقال انها طيبة تفيد المعدة والامعاء .

### ١٩٠١٦ - عَلُوكُ سَحْلَبِي \* ، سِيلَان سَحْلَبِي

Silene orchidea, S. atocion (S). Silène orchidée (F). عشية حولية تربينية مهدها الشرق الاوسط . ساقها فراءه زياه لزجة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها عصفية الشكل ، خفيفة النصل الخليل البشرة . ازهارها ودية اللون . بتلاتها مقطوعة الاطراف المسنة المفلوقة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٩٠١٧ - عَلُوكُ شَقَطَة \* ، سِيلَان شَقَطَة

Silene schafta, S. inflata (S). Silène schafta, S. enflé, Behen blanc, Cornillet (F). Bladder campion, White bottle, White ben (E). Kropfleimkraut (D). Bubbo-line, Mazzettini, Stritolli (I).

عشية رديئة معمرة تملو من ٨ الى ١٥ سم . ساقها وفروصها نخلة . اوراقها يقضي الشكل تطلو من ١٠ الى ١٥ سم . ازهارها حراء اللون او بيضاء ، بتلاتها مقطوعة الاطراف المسنة || ازهارها يستمر من آب الى ايلول . وفي من البتلات العلية . يقال انها تفيد المعدة والامعاء .

### ١٩٠١٨ - عَلُوكُ عَدِيمُ السَّاق

هو حشيشة الذباب ، أطبا .

### ١٩٠١٩ - عَلُوكُ قَرْشِي \* ، سِيلَان الذُّبَاب ،

Silene gallica (S). Silène de France, S. à cinq plaies (F). Little brown pigs, Small flowered catchfly (E). Französische leimkraut (D). Silene cinque plaies, S. salvatico, Mazzettino (I).

نبات عشبي طيب محول ، ساقه فراءه زياه تملو من ٣٠

الايهر || موطنه احراج ومراعي الترانسفال . إجله قليل المدد يراوح بينه ١٥ و فرداً .

### ١٩٠٠٥ - عَلَبْ أَسْوَد \* ، أَبُو عُرْفُ الْأَسْوَد

Hippotragus niger, Egcoceros niger (S). Hippotrague noir, Egocère noir (F).

نوع من العلهب كبير الجثة يملو نحو ١٢٥ سم . قرنه يطول ١٠٠ سم . وهو غليظ الانتشاب ، ذرب الطرف ، حديدي الجسم ، مائل الزايم الاخير . ثوبه الى السواد اللامع . يطنه وعصره ولجاءه ييش . موطنه فسح الارباء يمتد من الحبشة الى الترانسفال . إجله يراوح بين ٢٠ و ٤٠ فرداً .

### ١٩٠٠٦ - عَلَبْ أَغْبَر \* ، أَبُو عُرْفُ الْأَغْبَر

Hippotragus equinus, Egcoceros equinus (S). Hippotrague chevalin, H. équin, Egocère chevalin (F). نوع من العلهب كبير الجثة جسمه يطول نحو ٢٢٦ سم . ويملو نحو ١٥٠ . قرنه لا يفرق عن قرن العلهب الاسود شيئاً . ثوبه الى البنية السمره ، يياض رأسه قليل الانتشار ، جلي التعطيل ، يكتنف العين من مقدمها ومؤخرها . موطنه فسح الارباء يمتد من ضفاف بحيرة فيكتوريا - نيازا الى اطراف السنغال || إجله لا يقاسي المدد يختلف باختلاف اعطائه وسلالاته ، يراوح بين ١٠ و ٥٠ نفراً .

### ١٩٠٠٧ - عَلْتَج \* ، Eomecon (S). Eomécone (F).

نبس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الحشائشيات . انواعه قليلة المدد ، سقها فراءه تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها قلبية الشكل ، مستديرة القاعدة . نصلها متموج الصفة ، مسن الحافة ، جميل الخضار الزاهي . ازهارها ابليبة وهابية الارتكاز ، قطرها نحو ٥ سم . لون بتلاتها يختلف باختلاف الانواع منها الياض والودي والبفسجي والوشج . اما اسديتها ففسفر || ازهارها يستمر ثلاثة شهور تمتد من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

### ١٩٠٠٨ - عَلْهَز \* ، Psoroptes (S). Psoropte (F).

جنس حشرات ذرية من فصيلة الجربيات ورتبة القراديات انواعه عديدة تتطفل عل الخليل والغنم والابقار والارانب تقسب لها الجرب الرطب (Gale humide) الذي يكاثف باستعمال بعض الادعان الكبريتية التركيب .

### ١٩٠٠٩ - عَلُو ، إِرْنِقَاع

المباقة السودوية من القاعدة الى القمة .

### ١٩٠١٠ - عَلُوب \* هو سد الحصر ، اطبا .

### ١٩٠١١ - عَلُوكُ \* ، Desmodus (S). Desmode (F).

Desmodus (E). جنس غشائيش من فصيلة الورقيات . انواعه قليلة المدد . اجسامها صغرة القند ، طولها يراوح بين ٧٥ و ٨٠ سم . ويسبقها الى ٣٥٠ الى ٣٦٠ م . فرأطيسها اسفينية قصيرة . ازوارها الى الرتبة المخللا . الصناعية . جلودها خلية الملمس . موطنها ييم المكسيك والبرازيل والشيبي . تعيش منفردة . ذكرورها تقرب انابها عند الكرم فقط . قوتها الدم تمصه ايها استطاعت . تألف الاشجار الحرجية وابقاب الصخور .

### ١٩٠١٢ - عَلُوكُ ، سِيلَان ، سِيلَنُوس ، تَمَنُوعَة

Silene (S). Silène (F). Campion, Catchfly (E). Leimkraut (D). Silene (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات ، انواعه زوا



عَلَبْ أَسْوَد



عَلَبْ أَغْبَر



عَلْهَز



عَلُوكُ احمر



عَلُوكُ اخضر الزهر



عَلُوكُ سَحْلَبِي



عَلُوكُ شَقَطَة



١٩٠٢٧ - عُلُوكٌ كَيْدٌ

المليث : ان يَخلطُ الشَّعيرَ بالبرِّ لزرارة ثم يحدان ويحدان ممّا .

١٩٠٢٨ - عُلُوكٌ كَيْدٌ

المليث نبت يؤتد به ويتخذ منه المرق (السان) .

١٩٠٢٩ - عُلُوطٌ

Otolithe (F).

مكة بحرية تدعى عليلط ، اطلها .

١٩٠٣٠ - عُلُوطٌ

Parrotia (S). Parrotie (F).

جنس اشجار ونباتات برية ويزينة من فصيلة المشركات . انواعه المعروفة اربعة اوراقها شتاقية عابله . ازهارها عقودية التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها عادمة البتلات ، سباعية الاعدية ، وسيدة المياض ، مزدوجة غريقات المبيض || اعرفها واشهرها العليلط القاري .

١٩٠٣١ - عُلُوطٌ قَارِصِي

Parrotia persica (S). Parrotie de Perse (F).

نوع من العليلط ، مهدد بلاد ايران . ثمرته تملو من ٦ الى ١٢ م . اوراقها عابله تشبه اوراق الزان تطلو من ١٠ الى ١٠ م . نصلها جامد التسج خلي العروق . ازهارها بنفسجية اللون يملوها موج زقوي . ثنائياتها خلية . اشدتها الى الحمرة القانية || ازهارها يسمر من نيسان الى ايار .

١٩٠٣٢ - عُلُوطَةٌ

هي القبرة السراء ، اطلها .

١٩٠٣٣ - عُلُوطٌ ، مَدِيدٌ ، عُلُوطٌ

Coupage (F). Cutting (E).

تهتة الملف قبل تقديده الى الحيوان وقد يكون اذ يخلط الحبوب المحروشة مع التخلالة والكسب والتبن الخ . او يقطع الاعشاب والكلأ للقصير والقشب . او بتشيف الجذور والمسائل كالجزر والشوذر والبطاطا الخ .

١٩٠٣٤ - عُلُوطٌ هو الوسج ، اطله .

١٩٠٣٥ - عُلُوطِيَّاتٌ

سبط من فصيلة الورديات يدعى الوصبيات .

١٩٠٣٦ - عَمَّاتَةٌ

الماء المسحب المرتفع الكثيف .

١٩٠٣٧ - عَمَّاتَةٌ فَيْجَه \* Amata phegea (S).

Amate phégée (F). Amata phegea (E).

حشرة من فصيلة العايات وربة حشرقات الاجنحة . موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها غاشلة ناهمة تعيش على اوراق النبات ولها الانجبار || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ م . بسطها نحو ٣٥ م . رأسها اسود عينها كيرتان . زيانهاا غيلاني . سرقتها مستطيل . جوشنها وبعطها الى الكسني الاسود الموالج || رواشن الذكر الى الجوة السوداء الموالج يتخللها في الزوج الاسامي رقة من ست بقع ويتخللها في الزوج المثلثي بقعة يضاء وتغطتان || رواشن الانثى الموالج الى الكسب الموالج المدام الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة



عُلُوكٌ فرنسي



عُلُوكٌ نجيل



عَمَّاتَةٌ فَيْجَه

الى ٥٠ سم . اوراقها اعليلجية الشكل مستطيلة الزام الاخير نصلها خلي البشرة للزجة . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون ، علقية التجميع || ازهاره يسمر من تموز الى آب .

١٩٠٢٠ - عُلُوكٌ كَيْدٌ ، سِيلَانٌ كَيْدٌ

Silene compacta (S). Silène compact (F).

عشة زريينية حولية ، مهدد الشرق الاوسط . ساقها فروع تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها اعليلجية الشكل متدخمة القاطعة ، ذرية الزام الاخير المذهب القصة . نصلها جامد التسج ، بحري اللون . ازهارها عابله الارتكاز ، علقية التجميع ، ليدة . بتلاتها بنفسية الشكل وردية اللون . ازهارها يسمر من تموز الى آب .

١٩٠٢١ - عُلُوكٌ مُزْعَبٌ ، سِيلَانٌ مُهْدَبٌ

Silene hispida (S). Silène hérissé (F).

عشة حولية يونانية المهد ، ساقها فروع تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها سانية النصل خلية البشرة . ازهارها عقودية التجميع ثنائية الانقسام وردية اللون || ازهارها يسمر طول فصل الربيع .

١٩٠٢٢ - عُلُوكٌ مَقْدُونِي ، سِيلَانٌ مَقْدُونِي

Silene asteris (S). Silène Astérie (F).

عشة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مقعونية وهي من النباتات الشائعة الانتشار الزبني . ساقها قوية لزجة عادمة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها صغيفة الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ م . ازهارها ارجوانية اللون ، علقية التجميع . ازهارها يسمر طول شهر حزيران .

١٩٠٢٣ - عُلُوكٌ نَحِيلٌ \* ، سِيلَانٌ نَحِيلٌ

Silene delicatula (S). Silène gracile (F).

عشة حولية دقيقة ، مهدد الشرق الاوسط . ساقها نحيلة فروع تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها صغيفة الشكل دقيقة . ازهارها فردية التجميع يضاء اللون || ازهارها يسمر طول فصل الصيف .

١٩٠٢٤ - عُلُوكٌ زَرَّاعِيَّةٌ

Sciences agronomiques (F). Agronomic sciences (E).

العلوم الزراعية دراسات شاملة تبحث في الاربة والنباتات والحيوانات والحشرات والفطور والامراض الحيوانية والاصوام النباتية والكيمياء والفيزياء والاقتصاد والصناعات الزراعية وربية الدواجن والابنية الريفية واستثمار التربة واستعمال المدات الآلية الخ .

١٩٠٢٥ - عُلُوكِيَّاتٌ

Paraneoptera (S).

Paranéoptères (F). Paraneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المهنجات اصلاً تشمل ثلاث طبقات وست رتب والعديد من الفصائل || طبقاتها تفرم بالقلبيات وعدديات الجناح ونصفيات الجناح . اما رتبها فهي القلبيات والفليذيات والقمقيات وعددية الاجنحة وتنجانسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة .

١٩٠٢٦ - عُلُوبَةٌ ، يَكْسِيدٌ

Pyxide (F).

Pyxidium (E).

ثمرة كالجوز او كالحق تفتح بالررض فيفصل جزواها الاعل كانه غطاء علبه .

عماش

١٩٠٦٨ - عَمُودِي قَفْرِي، صُلب، سلسلة الفقار  
Colonne vertébrale (F). Vertebral column (E).

١٩٠٦٩ - عَمُودِي كَهْرَبَائِي، نَابِعَة كَهْرَبَائِيَة  
Pile galvanique, Pile voltaïque (F). Voltaic or galvanic battery (E).

١٩٠٧٠ - عَمُودِي  
Orthogonal  
نعت تعريفي توصف به الخطوط المستقيمة العمودية المساقط.

١٩٠٧١ - عَمُودِي، قائِم  
Perpendiculaire, Vertical (F). Perpendicular, Vertical (E).

١٩٠٧٢ - عَمُودِي السِّنْ  
Orthognathe (F). Orthognathous (E).

نعت تعريفي توصف به الاسنان القليلة الانحناء او اللانحنية.

١٩٠٧٣ - عَمُودِيَّات ٥  
Ammonitidae (S). Ammonitidés (F).

مرتبة من الرغويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم . فصائلها وانسابها وانواعها كثيرة العدد الذي يتجاوز ٤٠٠٠ || جميعها من متحجرات المعصور الغابرة . احافيرها نفيسة من الوسيطة الجيولوجية لانه تدل على توالي طبقات الارض عبر الزمن .

١٩٠٧٤ - عَمُودِيَّات ٥  
Ammonites (S). Ammonite (F). Ammonites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات رباعيات الخياشيم ومرتبة المعشويات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الاذنبة الغابرة ، انحصار الاباج الساني || اصداها مستديرة ، مبطلة ومحلزنة .

١٩٠٧٥ - عَمِي الدَجَاج  
١٩٠٧٥ - عَمِي الدَجَاج  
هو الخفاش المشور ، اطليه .

١٩٠٧٦ - عَمِي  
Couvain en état d'œufs (F). Eggs of bees (E).

بيض ملكة النحل في عيون الشهد ، التخاريف ، قبل ان ينقف .

١٩٠٧٧ - عَمِي عَدْنِي مَعَك  
١٩٠٧٧ - عَمِي عَدْنِي مَعَك  
هو الارقطيون ، اطليه .

١٩٠٧٨ - عَمِيَت  
Amite, Ammite (F).  
كل جاد مكور الحبيبات كا في الرمل .

١٩٠٧٩ - عَمِيَتَة ، لِفَافِيَة  
Diploaena (S). Diploène (F).

جنس نباتات جينية برية معمرة من فصيلة الذبايبات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحارة || سوقها وفروعها غفالية . اوراقها متناقية ، خلية النصال الصغيرة . اثمارها ورثسية التجميع محورية الاذناكاز ، عطرية العرف || اما اسم لفافية فهو من وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٩٠٨٠ - عَمِيرَة ، جَزَع ، مَنَحَلَة  
Rucher (F). Stand or shed for bees (E).

مجمع قنران او خلايا النحل . ج حمار وأجزاء ومناسل.

وكان كذئب السوء اذ قال مرة  
لمرسوة والذئب غرثان  
ألئت التي من غير ذئب شفتي  
فقلت من ذا قال ذا عام اول  
فقلت ولدت الان بل رست غدره  
فلنوك كلتي لا هنا ك مأك  
ومنهم من قال هو الحسل اذا بلغ الزو .

١٩٠٥٢ - عَمُوش ، عَرْمُوش  
Rafle (F). Grape-stalk (E).  
هو المتعود انترع عنه .

١٩٠٥٣ - عَمُش هو الفريون الخزني ، اطليه .

١٩٠٥٤ - عَمَل  
Travail (F). Labour (E).  
هو نتيجة ما يصرفه المحرك من طاقة حيا كان او آليا .

١٩٠٥٥ - عَمَلَس  
Amalthee (F).  
السلسل كوكب سيار من الخنس .

١٩٠٥٦ - عَمَلَس  
١٩٠٥٦ - عَمَلَس  
كلب الصيد الخيش .

١٩٠٥٧ - عَمَلَقَة  
Géantisme, Gigantisme (F). Giantism, Gigantism (E).

١٩٠٥٨ - عَمَلِيَّات حَصَمِيَة  
Opérations volumétriques (F). Volumetric operations (E).

١٩٠٥٩ - عَمَلِيَّات كَمِيَة  
Opérations quantitatives (F). Quantitative operations (E).

١٩٠٦٠ - عَمَلِيَة  
Opération (F). Operation (E).

١٩٠٦١ - عَمَلِيَة عَكْسِيَة  
Opération inverse (F). Inverse operation (E).

١٩٠٦٢ - عَمِيد ٥  
Emenadia (S). Éménadie (F). Emenadia (E).

جنس حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفضيلة الزفاليات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار العالم وانحصار المعتدلة الحارة || اجسامها وقوائمها مستطيلة . رؤوسها مستعرضة كواثلها نصف مخروطية . اثمارها قصيرة مائلة . قربها الاستشعاري مقوس . اثارها شبيهة الاثران تكثر فيها الشقعة والسمة المتفاوتة الخشبا والماجما .

١٩٠٦٣ - عَمُهُوج كل نبات غص .

١٩٠٦٤ - عَمُود الثِقَل  
Pile à gravité (F). Pile of gravity (E).

١٩٠٦٥ - عَمُود الحَرَكَة  
Pile thermo-électrique (F). Thermo-electric pile (E).

١٩٠٦٦ - عَمُود الصَلْبِي  
Rotaney  
نجم نير من كوكبة الدلفين . ويدي ايضا ذئب الدلفين .

١٩٠٦٧ - عَمُود جاف  
Pile sèche (F). Dry cell (E).



عنيد



عنيت

الى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب خفيفة ذرية تطول من ٦٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ١ الى ٣ سم. نصالها اسفنجية الصفحة || ازهارها حامية الارتكاز متخلطة الالوان واشكال التجميع || اشهر انواعه الزينية المناز الصيواني .

### ١٩٠٩٣ - عَنَاق صَيَوَانِي \*

*Butomus umbellatus* (S). *Butome en ombelle*, *Jonc fleuri* (F). *Flowering rush*, *Lily grass* (E). *Doldiger Wasserflesch*, *Blumen-Rohr* (D). *Butomo*, *Biodo*, *Giunco fiorito* (I).

نوع من المناز وهو نبات متعقي سبروتي معمر. اوراقه تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم. شراخه الزهري يملو نحو ٨٠ سم. ازهاره صيواني التجميع. ازهاره كثيرة العدد وريدي الفصل واليتلات ، قطر الزهرة الواحدة نحو ٣ سم || ازهاره يشمر من حزيران الى آب .

### ١٩٠٩٤ - عَنَاقِيَّات

*Butomaceae* (S).

*Butomacées* (F). *Butomaceae* (E).

فصيلة نباتية من سحيدات الفلقة بلورها عادمة الاسحين . اصلها وانواعها قليلة العدد جميعها متعقية او مائية . اشهر اجناسها المناز.

### ١٩٠٩٥ - عَنَاسَة \*

*Porthetis elephas* (S).

*Porthète* (F).

نوع من الجنابذ من مستقيبات الاجنحة وفصيلة المراءيات. اصلها جميع المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها كبير القدر يطول نحو ٤٥ سم. عند الذكر ، ويطلق من ٧٠ الى ٧٥ سم. عند الانثى . ثوبها الى الكهبة الحمراء . رأسها كبير الحجم . زباناها قلايدي الشكل . كوسلها متين اللدغ رفيع الخمار النجيب يشرف على قمة الرأس . قوائمها الخلفية كبيرة ، مستطيلة ، مشفارية القنايب ، معدة للقفز || تجوب المراعي والمواقع الرطبة حيث تكثر الاعشاب . مسرحها نهاري . تظهر في حزيران وتبقى حتى اواخر آب .

### ١٩٠٩٦ - عَنَاصِر

*Éléments* (F). *Elements* (E).

العناصر هي المواد البسيطة التي يمتزجها العلم الحالي غير قابلة التجزؤ الا بسط || يعرف منها نحو ٩٠ تقسم الى فئتين : فئة العناصر الفلزية المعروفة بالمعادن وفئة العناصر اللافلزية .

### ١٩٠٩٧ - عَنَاصِرْ غِذَايَة

*Éléments nutritifs* (F). *Nutritive elements* (E).

هي العناصر التي يتركب منها غذاء النبات والعناصر الغذائية تقسم الى اربع فئات : - الاول : العناصر الرئيسية وهي الازوت ، وصامض السفسور والبوتاس . الثانية : العناصر الاولية وهي الكلسيوم والمنجنيزيا والحديد والكريت - الثالثة : العناصر الثانوية وهي الصوديوم والسليسيوم والكلور - الرابعة : العناصر الثالثية وهي البورق والمنجنيزيا والنحاس والزنك والزرنيخ والرساس الخ .

### ١٩٠٩٨ - عَنَاق

النجم الثاني ، اي الذي يلي القائد ، من كوكبية بنات نمش الصغرى . والى جانبه قائد صغير وثانيه ايضا عناق والى جانبه الصليق وهو سهى والثالث الحور .

### ١٩٠٨١ - عَمِيس ٥

*Aphotique* (F). *Aphotic* (E).

عميس م . عمية . تمت تعريفه يطلق ، في الجيولوجية ، على كل منطقة عادمة النور ككلية البحر العمية الغور .

### ١٩٠٨٢ - عَنَ طَرِيق

*Via*

### ١٩٠٨٣ - عَنَاب \*

*Zizyphus sativa*, *Z. vulgaris*, *Rhamnus zizyphus* (S). *Jujubier*, *Gingeoller* (F). *Jujube tree*, *Zizyphus*, *Indian jujube* (E). *Jujubebaum* (D). *Giuggiolo* (I).

شجرة مشمرة شائكة من فصيلة النبقيات . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، صغيرة ، بيضيه ، لامعة ، مسنة . ازهارها صغيرة الشكل واللقد ، لمساء البشرة ، عنابية اللون عند النضج ، مأكولة ، لها الى البياض الاسفر وهو كثير المنافع الصحية ويقيد الصدر .

### ١٩٠٨٤ - عَنَاب بَرِّي

هو الضال ، اطلبه .

### ١٩٠٨٥ - عَنَابِيَة

*Jujube* (F).

ثمرة العناب وهي مأكولة جزيلة النفع الصحي وتفيد الصدر .

### ١٩٠٨٦ - عَنَاق السَرْمَق ٥

*Plesma quadrata* (S).

حشرة من المنجابات ، طولها نحو ٢ سم . جسمها مبطل الشكل المستطيل . ثوبها الى الخشن الاخير . بطنها ويدها الى الحمرة || تظهر الحشرة الكاملة في نيسان فتكدم وتمتص مكها في ايار على مختلف اوراق السرمقات واصعبها الشولندر فينقت بمد متحه بابوسيين || اجسامها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة . برقانها نهمه تنمض عصارة الالواق فتصمها ويحبسها وقد تنخر الجلود فتصلبها .

### ١٩٠٨٧ - عَنَاق الشُّوك ٥

*Tingis cardui* (S).

*Tingis des chardons* (F).

حشرة من المنجابات ، طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثوبها حشطي اللون يملو تسليج وتخطيط . منها اسود . تعيش على مختلف انواع الشوك ونباتات فصيلة المركبات .

### ١٩٠٨٨ - عَنَاق مَلَطَح

*Galéate maculé* (F).

حشرة من البيريات تدعى بيري ملطح ، اطلبها .

### ١٩٠٨٩ - عَنَاقِيَّات ٥

*Tingidae* (S).

*Tingidés* (F). *Tingidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة تصفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . تتميز بصغر قعها وبروانها النمدية التركيب ، الشبكية اللؤلؤ . ارساغها ثلاثية الفواصل . امتلاكها لاطلة تنور في اخاديد عميقة || جميعها من الحشرات الحاملة تعيش على اوراق النبات وجذوره .

### ١٩٠٩٠ - عَنَاق

*Cocher* (la) (F).

المناز كوكبية نجوم شمالية الموقع تدعى ذو الاعنة ، اطلبها .

### ١٩٠٩١ - عَنَاق

هو القلق الحشي ، اطلبه .

### ١٩٠٩٢ - عَنَاب

*Butomus* (S). *Butome* (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المنازيات . انواعه قليلة نحو خمسة : ثلاثة منها متعقية واثنان مائتان . جذورها جلومورية مدادة . سوقها شمرانية منتصبه تملو من ٥٠



عناب



عناق السرمق



عناق الشوك



عناب صيواني



عناسة

## ١٩٠٩٩ - عَنَاقُ الْأَرْضِ

عناق الارض نجم من كوكبة المرأة المسلسلة .

## ١٩١٠٠ - عَنَاقُ الْأَرْضِ \*

*Lynx caracal*, *L. melanotis* (S). *Lynx caracal*, *L. a oreilles noires* (F). *Caracal* (E).

ومن اسمائه: المنقط والمنجل والحجل والفراتق . نوع من الشوق من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس . موطنه فصيح الاجزاء يمتد من تركيا الى سورية والجزيرة والبراق وأيران والافغان والهند ومن الحيشة الى افريقية الشمالية . وهو كبير الجثة رقيق القوام، طوله يراوح من ٧٠ الى ٩٠ سم. ارتفاعه من ٤٥ الى ٥٥ سم. أما ذنبه فن ٢٣ الى ٣٥ سم || ثوبه يختلف بالنسبة الى البلاد التي يعيش فيها وهو دائماً سوي اللون المرقوش بالاعبر الاسمر والاسمر المرقوش . بطنه الى البياض الاسفر . اذناه كبيرتان ذلقتان تملأهما خصلة من الشعر الاسود المنتصب || يألف الكهوف والادغال واحراج البسط والضرور .

## ١٩١٠١ - عِنَاقِيَّةٌ هِي الْقَضَابُ ، اَطْلِبْ .

*Aranides* (F). *رَتَبَاتُ* *Araneida* (E).

رتبة من التكبوتيات فصائلها واجناسها كثيرة العدد ، اشهرها المنكب المرفقة .

## ١٩١٠٣ - عَنَاقِبُ ذُبَيْبَةٍ هِي الْخَنَزَقُ ، اَطْلِبْ .

*Aranéux* (F). *عَنْكَبُوتِي* *Cob-webby* (E).

نعت وصفي يطلق على بعض اجزاء النبات التي تشبه المنكائب او شها .

## ١٩١٠٥ - عِنَانٌ هُوَ سِرُ اللَّجَامِ .

*Rêne* (F). *Rein* (E).

*Impotence sexuelle* (F). *Sexual impotence* (E).

خلل في الجهاز العصبي يمنع الحيوان عن اداء فريضة الكوم الطبيعية . وفي كثيرة في الذكور قليلة في الاناث .

## ١٩١٠٧ - عَنَبٌ ثَمَرُ الْكُرْمَةِ . جِ اعْتَابُ الْوَاحِدَةُ عَنَبَةٌ .

*Raisin* (F). *Grapes* (E).

هو البلد المزودج السنايل ، اطلبه .

## ١٩١٠٩ - عَنَبُ التَّفَكِّ

*Raisin de table* (F). *Table grapes* (E).

هو العنب المأكول من اي ضرب كان تمييزاً لاصناف الحور والكحول .

## ١٩١١٠ - عَنَبُ التَّعَلُّبِ هُوَ الْغَنَاءُ ، اَطْلِبْ .

*Liquidambar* (F). *Sweet-gum tree* (E). *Amberbaum* (D). *Liquidambar* (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة القليبات . انواعه قليلة . سوقها جالسة منتصبة دماعة . اوراقها عابلة ، كبيرة اللند ، معتقة ، متعاقبة ، عديدة التفصوص . ازهارها وحيدة المسكن ، قدية التجميع . ثمارها جزام سباعية الاخنية ، يزورها صغرة جمجمة || يستخرج من خام سوقها ، بالخز ، ميمة عنبرية ذكية اللون ، طيبة ، عريزة الاستعمال تلشت الشيق وتقوي البياه || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

## ١٩١١٢ - عَنَبُ الدَّبِّ هُوَ الْبِيسْرَانُ ، اَطْلِبْ .

*Liquidambar styraciflua* (S). *Liquidambar à styrax*, *Capome d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanscher Amberbaum* (D). *Storace liquida* (I).

شجرة هريئة الشكل تملو من ١٥ الى ٤٠ م . اصلها البلاد الامريكية . اوراقها خالصة التفصوص خالصة الاعتاق . شباوقها الزهرية صفراء اللون ، غصنها المواج . ميعتها فاخرة الصنف شائعة الاستعمال .

## ١٩١١٥ - عَنَبُ الْغُرَابِ هُوَ الصَّخْرَةِ ، اَطْلِبْ .

*Liquidambar styraciflua* (S). *Liquidambar à styrax*, *Capome d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanscher Amberbaum* (D). *Storace liquida* (I).

جنس اشجار بحرية من شالكتات الزعانف وفصيلة القرعيات . انواعه المرفقة ثلاثة ، اصلها احوار مصبات الانهر الهندية || اجسامها اعليجية الشكل ، صغرة القد ، اولها تراوح من ١٢ الى ٢٢ سم. رؤوسها مقطوعة الاغصان ، كبيرة الميون الجاحطة . زعانفها الظهرية شبه هريئة الشكل . زعانفها الذيلية فاخرة . اولها تراوح من الطحلة الذهنية المواج الى الطحلة الفضية || طولها فاخرة الصنف مرقوب فيها .

## ١٩١١٧ - عَنَبُ الْهِنْدِ هُوَ الْبَيَا ، اَطْلِبْ .

*Ambassis* (S). *Ambasse* (F). *Ambassis* (E).

جنس اسماك بحرية من شالكتات الزعانف وفصيلة القرعيات . انواعه المرفقة ثلاثة ، اصلها احوار مصبات الانهر الهندية || اجسامها اعليجية الشكل ، صغرة القد ، اولها تراوح من ١٢ الى ٢٢ سم. رؤوسها مقطوعة الاغصان ، كبيرة الميون الجاحطة . زعانفها الظهرية شبه هريئة الشكل . زعانفها الذيلية فاخرة . اولها تراوح من الطحلة الذهنية المواج الى الطحلة الفضية || طولها فاخرة الصنف مرقوب فيها .

## ١٩١٢٠ - عَنَبَرٌ مَادَةٌ وَرَتَبِيَّةٌ حَجَرِيَّةٌ صَلْبَةٌ تَقَعُ فِي عَدَّةِ اشْكَالٍ وَالْوَانُ اغْصَانُ الْأَصْفَرِ وَالْأَشْبِ .

*Ambre* (F). *Amber* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحيات ذات الانسان . اجسامها عادمة الملقق ، وشعية الشكل ، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م . رؤوسها مخفية ، محيطها يراوح بين ٧ و ٩ امتار . اسنانها كبيرة القد ، صفراء اللون . طول السن الواحدة نحو ٢٤ سم . وضع رتيبتها من ٥ الى ٦ سم . اولها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج ، تعبق مع اقترابها من الظهر وتغير عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش جماعات كبيرة ، سرها يمد من عشرة ازواج الى مئة زوج .

## ١٩١٢٢ - عَنَبَرٌ بُولٌ هُوَ حَبُّ الْمَسْكِ ، اَطْلِبْ .

*Physerer* (S). *Cachalot* (F). *Spermwhale* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحيات ذات الانسان . اجسامها عادمة الملقق ، وشعية الشكل ، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م . رؤوسها مخفية ، محيطها يراوح بين ٧ و ٩ امتار . اسنانها كبيرة القد ، صفراء اللون . طول السن الواحدة نحو ٢٤ سم . وضع رتيبتها من ٥ الى ٦ سم . اولها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج ، تعبق مع اقترابها من الظهر وتغير عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش جماعات كبيرة ، سرها يمد من عشرة ازواج الى مئة زوج .

## ١٩١٢٣ - عَنَبَرٌ دَمَاعٌ \* شَجَرَةُ الْمِيعَةِ

*Liquidambar* (F). *Sweet-gum tree* (E). *Amberbaum* (D). *Liquidambar* (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة القليبات . انواعه قليلة . سوقها جالسة منتصبة دماعة . اوراقها عابلة ، كبيرة اللند ، معتقة ، متعاقبة ، عديدة التفصوص . ازهارها وحيدة المسكن ، قدية التجميع . ثمارها جزام سباعية الاخنية ، يزورها صغرة جمجمة || يستخرج من خام سوقها ، بالخز ، ميمة عنبرية ذكية اللون ، طيبة ، عريزة الاستعمال تلشت الشيق وتقوي البياه || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

## ١٩١٢٤ - عَنَبَرٌ دَمَاعٌ أَمْرِيكِي ، عَنَبَرٌ سَائِلٌ ،

*Liquidambar styraciflua* (S). *Liquidambar à styrax*, *Capome d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanscher Amberbaum* (D). *Storace liquida* (I).

شجرة هريئة الشكل تملو من ١٥ الى ٤٠ م . اصلها البلاد الامريكية . اوراقها خالصة التفصوص خالصة الاعتاق . شباوقها الزهرية صفراء اللون ، غصنها المواج . ميعتها فاخرة الصنف شائعة الاستعمال .



عناق الارض



عناب



عنبر



عنبر دماع

المروفة قليلة المدد اعطائها بعض اصقاع المالن القديم والجديد . ترغب في المواقع الرطبة اخصها حوائث المائق ويجاري الماء || سوفها لينة او خشوية ، منطبعة ، فراء اوراقها صغيرة ، متعاقبة ، منعقة ، ستانية اتصال ، رباعية اللون || انوعها طرية مستطيلة المالحق ، رباعية التلات ، يضاء اللون . ثمارها عنبية ، مكورة ، حمراء اللون ، حامزة الطعم قبل النضج التام || ثمارها الناضجة ترب .

#### ١٩١٢٣ - عَبُوث \* Tricholoma (S). Tricholome (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفارغونيات . انواعها المروفة زعاه ٤٠ . اعطائها معظم اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يوقها ابيض اللون . اطراسها حادة الاطراف ، معظمها لبد التجيع وبعضها فارق . تعيش عل المواد النباتية المنحلة . معظم انواعها كاعن الصف .

#### ١٩١٢٤ - عَبُوث اَبْيَض \* Tricholoma album (S). Tricholome blanc (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصف . يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه منتفخة القاعدة ، غبراء اللون . اروسه يضاء ، عاجية المواج ، قطرها نحو ٩ سم . اطراسها متقاربة يضاء اللون .

#### ١٩١٢٥ - عَبُوث اخْر لَامِع \* Tricholoma rutilans (S). Tricholome rutilant (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصف . يوجد على جنوع الاجار النخرة . ساقه الى الحمرة الصفراء المواج . اروسه حمراء اللون يملوها مواج اسفع ، قطرها نحو ١٠ سم .

#### ١٩١٣٦ - عَبُوث جَبَّار \* Tricholoma colossus (S). Tricholome géant (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصف . يوجد في الغابات . ساقه ضخمة ، سراد اللون . اروسه كبيرة ، قطرها نحو ٢٠ سم . لونها الى الشحنة السراء يملوها مواج اصفر .

#### ١٩١٣٧ - عَبُوث دَكْمِي \* Tricholoma columbetta (S). Tricholome petite colombe (F).

نوع من العنبوث المأكول . يوجد في الغابات وحراج السديان . ساقه يضاء تملوها ، عند قاعدتها . رفقة خضراء . اروسه يضاء اللون او وردية ، قطرها نحو ٨ سم .

#### ١٩١٣٨ - عَبُوث رَقِيع السَّاق \* Tricholoma strictipes (S). Tricholome à pied élané (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصف . يوجد في المراعي . والغابات . ساقه رفية متصببة لونها الى البياض الاخير . اروسه مظلية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض العاجي .

#### ١٩١٣٩ - عَبُوث صَابُونِي الرَّابِحَة \* Tricholoma saponaceum (S). Tricholome à odeur de savon (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصف . يوجد في الغابات والحراج . اروسه لاقباسة القطر ، مظلية الشكل ، لونها الى الربة الخضراء المواج . طعمه ورائحته كصابون .

#### ١٩١٢٥ - عَبُوث دَمَاع شَرَقِي Liquidambar (S). Liquidambar oriental (F).

شجرة كبيرة القد تملو من ١٠ الى ٢٥ مترًا . اعطائها بلاد الشرق الاوسط . اوراقها خاسية التفصيص . فصوصها قليلة الشكل ، مدامة التتبين . نصلها مالن البشرة يصفر عند الاحمال دين ا ينكتفه الاخراخ المموي . شبارها الزهرية يضاء اللون يملوها مواج اصفر || ميمها غزيرة الماددة متوسطة الصف .

#### ١٩١٢٦ - عَبُوث دَمَاع فُرْمُوزَا Liquidambar formosana (S). Liquidambar de Formose (F).

شجرة كبيرة القد تملو من ١٥ الى ٣٠ م . اعطائها الصين واليابان . اوراقها ثلاثية او خاسية او سباعية التفصيص . فصوصها مستنة الحافة . اعناقها وعروقها خلية البشرة . شبارها الزهرية يضاء اللون يملوها مواج وردي || ميمها غزيرة الماددة متوسطة الصف .

#### ١٩١٢٧ - عَبُوث كَشْمِيرِي هُو الْفَرْدِيَا ، الطلها Succinea (S). Ambrette (F). Succinea (E).

جنس حيوانات قازبة وبرية من الرخويات مديات الاجرل وفضيلة المخرنويات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . بعضها قازب ويميش على النباتات المائية وبعضها بري يعيش بين الطعالب قرب صفات مجاري الماء || اصداها شبه بضيصة اللون ، صغيرة القد ، رحية القوفا ، دقيقة الاقواب المخرنة ، تتميز بعدم استطاعتها استيعاب الاجسام .

#### ١٩١٢٩ - عَبُوث رِيَات Physeteridae (S). Physétérídes (F). Physeteridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة مائلات الاسنان ورتبة المخرنويات || اجناسها المروفة ستة منتشرة في جميع انحاء المناطق المعتدلة الحارة . ملجها الحياني جامعي . اجسامها تجد من ١٠ ازاوج الى ١٥٠ زوجًا || اجسامها ضخمة ، شبه وشية الشكل ، تطول من ٣ امتار الى ١٨ مترًا || اعرف اجناسها العنبر والأعظم والموية .

#### ١٩١٣٠ - عَبُوثِين \* Ambréine (F). العنبرين مادة يضاء تستخرج من العنبر الاشهب ، عادمة الرائحة والطعم ، لا تلوث في الماء ، تدوب في الكحول والايتر .

#### ١٩١٣١ - عَبُوثِيَس \* Anableps (S). Anableps (F). Anableps (E).

جنس اسماك نهريه سرلوة من مفتوحات المائنة ليات الزعانف وفضيلة البعنايا . انواعها المروفة قليلة المدد اعطائها اشر امركة الاستوائية . تعيش في المواق التي يقل فيها انسياب الماء وتكثر فيها النباتات المائية . اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها سفيرة وزعانفها كذلك باستثناء الخوضية والذيلية الكبيرة القد السانية الشكل || ويتميز العنبريس بعينه الكبيرتين المقسوتين ، اقنبا ، الى قسم علوي يشاهد ما يجري فوق سطح الماء ، وقسم سفلي يشاهد تحت سطح الماء .

#### ١٩١٣٢ - عَبُوثِيَب \* Oxycoccus (S). Oxycoccus (F).

جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة الخلتجيات . انواعها



عنبرة



عنبريس

عنوث  
احمر لامععنوث  
ابيضعنوث  
دليعنوث  
جبار

عنوث

صابوني الرائحة



عنوث

رفق الساق

ويوجدوا في المناطق والقبائل اجسامها متفاوتة القد ،  
يكثر فيها الصغر . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متقاربة  
عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ،  
مركبة من ١٦ فصلة . مراشعها قصيرة ، ملاسها مستطيلة ،  
رباعية العقول . كواسلها محمودة . بطونها مدققة الشكل .  
رواشنها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها مستطيلة .  
يرقاتها دودية الشكل ، تعيش كامل طورها البرقي في المناطق  
اشهر اجناسها العنيد .

١٩١٤٠ - عُثُوبُ قَارَسٍ \*  
Tricholoma  
aestruum (S). Tricholome équestre (F).  
نوع من العنوب المأكول . يوجد في جراج الصنوبريات .  
اروسته الى الصفار المنش بالاسمر ، قطرها نحو ٨ سم .  
اطراسها الى الصفار اللامع .

١٩١٤١ - عُثُوبُ كَبْرِيَّيْنِ اللَّوْنِ \*  
Tricholoma  
sulfureum (S). Tricholome couleur de soufre  
نوع من العنوب الكاعن الصف . يوجد في الغابات .  
اروسته كبريتية اللون ، قطرها نحو ٤ سم . اطراسها  
متباينة . رائحته تشبه رائحة الغاز .

١٩١٤٢ - عُثُوبُ مُدْعٍ \*  
Tricholoma  
portentosum (S). Tricholome prétentieux (F).  
نوع من العنوب المأكول . يوجد في الغابات . اروسه  
الى الريدة الاسمر بطورها ملوح بنفسجي ، قطرها نحو  
٩ سم . اطراسها الى البياض الغامر .

١٩١٤٣ - عُثُوبُ الْخَمَانِ \*  
Clytra  
aeraphaxidis (S).  
Clytre des sureaux (F). Clytra aeraphaxidis (E).

حشرة واشمة خاضعة من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات  
الاجنحة . تألف البراري والمواقع الرطبة وضفاف مجاري  
الماء . خنافسها تعيش على ازعاج الخان والصفصاف .  
يرقاتها تعيش على عصف النجيليات واوراق الصفصاف  
والخان . جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٩ سم .  
يرتقلى اللون اسود الرأس والتفتيح الكسلي والتجذيع الشدي .  
راسها صغير الحجم . عينها صغيرتان ، زيانها خيطيان .  
ظهورها ثنائي التجذيع ورباعي النقط السود . غمداه متباينة  
التجزير الى الفتيق . اسرافها رباعية العقول الظاهرة .  
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل  
حزيران ويتهي حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت  
في الليل . البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو  
١٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقويس ، اسمر  
سداسي الرواجب ، حنطي اللون ، اصفر المواج ، اسمر  
الرأس والرواجب . طور الاكمال الذي يتفقي في التربة  
يشتد نحو اربعة اشابيع .

١٩١٤٤ - عُثُوبُ \*  
Psychoptera (S).  
Psychoptère (F). Psychoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة العنوبليات ورتبة ذوات الجناحين .  
انواعها المعروفة عشرة اشاعتها بعض مناطق البلاد المتدنة  
الحارة والمنخفضة نحو البادية . اجسامها تطول من ٧ الى  
١٢ سم . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عند  
الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١٦  
فصلة . مراشعها قصيرة . ملاسها شديدة الطول ، رباعية  
العقول . كواسلها محمودة . بطونها مدققة الشكل .  
رواشنها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها بالغة الطول .  
تألف المناطق وضفاف مجاري الماء ، قوتها رقيق الازعاج .  
يرقاتها دامة تعيش كامل طورها البرقي في المناطق والامسال  
على المواد النباتية المنحلة .

١٩١٤٥ - عُثُوبِيَّاتٌ \*  
Psychopteridae (S).  
Psychoptéridés (F). Psychopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجسامها وانواعها  
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم . يكثر



عنوب قارس



عنوب النحال



عثادة

١٩١٤٦ - عُنْبِيَّ \*  
Baccifère (F). Bacciferous (E).  
كل نبات ثماره عنبية الشكل .

١٩١٤٧ - عُنْبِيَّ \*  
Uval  
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالعنب .

١٩١٤٨ - عُنْبِيَّ \*  
Baie (F). Berry (E).  
الثمرة العنبية ثمرة لحمية غير متفتحة لا نواة لها بل تحوى  
بذرة او عدة بذور كالحبة .

١٩١٤٩ - عُنْبِيَّ \*  
Impuissance (F). Impotence (E).  
عجز ذكر الحيوان عن القيام بوظيفته التناسلية .

١٩١٥٠ - عُنْبِيَّ \*  
Stalle (F). Stall, Box (E).  
الحظيرة من خشب تعمل للخيول .

١٩١٥١ - عُنْبِيَّ \*  
Entada (S).  
Entada (F). Entada (E).

جنس نباتات معمرة برية وتربيتية من فصيلة القرنيات  
وسبط السطيات . انواعها المعروفة عشرة منها الشجيرات  
والجنايات المتسلقة . منبها الاسفاج الحارة . اوراقها  
متعاقبة مركبة ريشية شفعية . ازهارها سنابل متباينة  
عقودية التجميع تاجية الارزكار . ثمارها صغرى لينة  
متباينة ، لينة ، صفراء اللون . ثمارها بزور طيبة مقيحة  
تغلغلها مادة غابية لزجة تشتمل في الهند لتنظيف شمر  
الرأس .

١٩١٥٢ - عُنْبِيَّ \*  
Asile (F). Robber-fly (E).  
جنس حشرات قانصة مفترسة من فصيلة العنتريات .  
انواعها عديدة منظها متوسط القد جزيل النفع بقضي  
على الحشرات الضارة . اشهر انواعها ما يتبع

١٩١٥٣ - عُنْبِيَّ الشَّوْاطِيَّ \*  
Philoniscus albiceps (S).  
Asile des sables (F).  
حشرة من العنتريات ، طولهاراوح بين ١١ و ١٤ سم .  
نوعها حنطي اللون ، اطحال المواج . عيونها خضراء ،  
حلب جسمها واربلها بياض . تكثر في الاماكن القاحلة  
وفوق دمال الشواطئ . من ايار الى ايلول . تقترس مسا  
استطاعت قنصه من الحشرات .

١٩١٥٤ - عُنْبِيَّ السَّكَّاسِ \*  
Machimus pyraea (S). Asile pyraea (F).  
حشرة من العنتريات ، طولهاراوح بين ١١ و ١٥ سم .  
نوعها الى السرة . حلبها ابيض اللون . تكثر في الاماكن  
الطليقة . تقترس السكاس للباباب .

١٩١٥٥ - عُنْبِيَّ النَحْلِ \*  
Dasypogon teutonius (S). Asile teuton (F).  
حشرة من العنتريات ، طولهاراوح بين ١٢ و ١٦ سم .  
جسمها اسود اللون ، جوشها اصفر . يكثر ويوجدوا من



عنتر الشواطئ



عنتر النحل



عتر زبوري



عتل



عتل نثيط



عتجد



عتجد جميل



عنجوس

ايار الى آب . تفتس معظم غشائيات الاجنحة اخصها النحل وهي بلك تختلف من ريقاتها الناعمة .

#### ١٩١٥٦ - عَتَر زَبُورِي \*

**Asilus crabroniformis (S). Asile frelon (F).**  
حشرة من الشتريات ، طولها يراوح بين ١٦ و ٣٠ سم .  
نوبها الى الجلوة السراء . رأسها اصفر . زباناها الى  
السواد . ارجلها الى الصبغة الصنائية . مسرها الحقول  
والبساتين . تكثر من حزيران الى ايلول . تفتس الذباب .

#### ١٩١٥٧ - عَتَرِيَّات

**Asilidae (S). Asilidae (F).**

فصيلة حشرات قانصة مقترنة من رتبة ذوات الجناحين .  
اجناسها وانواعها عديدة جميعها متوسطة الحجم ، قوية الاربجل  
الزباد ، مستطيلة البطن ، غليظة الصدر والرأس والعناتين ،  
قصيرة الخطم ، قوية التأثير ، نشطة الحركة ، سريعة  
الطيران || مكثها ونحي الشكل ، اغبر اللون ، تمتحه  
بدون انتظام على الاشباب والاخشاب وسنايل الزروع  
وانصاف الشجر واوراقها وفي الزبل واللدن || ريقاتها  
غاشية ، خاضعة ، دامنة وقد تكون واجمة تعيش في التربة  
تفضل الدبال والرمال ويكثر وجودها تحت الحطب اللدن .

#### ١٩١٥٨ - عَتَلَّة ٥

**Gonomothelydie (F). Gonomothelydy (E).**  
تصابل فزري ، ذكور اذناه عقبة اما اناثه فتفورة .

#### ١٩١٥٩ - عَتِيل \* ، نُهَيْد

**Trochus (S). Trochus, Topp-shell (E).**  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديبات الاربجل  
وفصيلة التثليات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
اسطفاها بحار البلاد الحارة . تعيش على الصخور المغصوة  
قرب الشطوط || اصداها غروطية كبيرة القصد بحيلة  
الترؤيق الخارجية ، للؤلؤة الصفحات الداخلية . اجناسها  
عائلة كبيرة . رؤوسها صلبة ثنائية اللواس المميونة .  
اربجلها مهدبة الحمار . اسطفاها قزينة المادة || اصداها  
صناعية وطوبها مأكولة .

#### ١٩١٦٠ - عَتِيلِيَّات ، نُهَيْدِيَّات

**Trochidae (S). Trochidés (F). Trochidae (E).**  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديبات الاربجل  
اماميات الخياش . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد  
اسطفاها بحار البلاد الحارة || اصداها غروطية شبه هربية  
الشكل متبانية الاحجام والترؤيق الخارجية . صفحاتها  
الداخلية سالمة ناعمة للؤلؤة اما الخارجية فخشنة || اعرف  
اجناسها واشهرها التنتيل .

#### ١٩١٦١ - عَتِيلِيَّات ٥

**Anabatidae (S). Anabatidae (F).**  
فصيلة طير من الجواث منيات المتأثير . اجناسها وانواعها  
المعروفة قليلة العدد شائعة الانتشار في معظم اقطار البلاد  
الاستوائية والحارة || اجناسها رشيقة ، متوسطة القد او  
صغيرة مثاقيلها مستطيلة قليلة التفوس . اذناها مستطيلة  
وتأجبه الرقار .

#### ١٩١٦٢ - عَتِيل نَثِيط \*

**Melanotus robustus (S). Mélanote robuste (F). Melanotus robustus (E).**  
حشرة ناعمة مقترنة من فصيلة السالوليات ورتبة مدمدات

الاجنحة . تألف الحقول المزدوعة والادغال . خنافسها  
تعيش على اوراق النباتات البرية . ريقاتها تركب جطور  
النباات الحولية من الاعشاب البرية الى الذرة ودوار  
الشس والبطاطا والشوندر والجزر ولا تمتف من الحشرات  
الدنيا فتفتسها || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى  
١٧ سم . فويها الى الكستني اللامع . رأسها متوج بانثار  
هلاكي الشكل . فكها كبيران . زباناها غيظيان . عيناها  
صغيرات . ظهورها يبلغ التحزيز الغدي . اسرافها خامية  
المقل || جيلها رباعي الحقول . تظهر الحشرة الجملدة في  
اوائل ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل .  
تسافد في حزيران . اناثها تترز اناثيب الممكن تحت لحاء  
الاجنار او في سراديب الحشرات الخاضعة او في التربة ||  
البرقة عنه بلوغها الادراك التام تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم .  
جسمها ملكي الشكل ، اصفر اللون امفر الموج .

١٩١٦٣ - عَتَجْد  
Raisin sec (F). Raisin (E).  
هو الزبيب وقيل الاسود من الزبيب .

#### ١٩١٦٤ - عَتَجْد \* ، شَوَلَكَة بَيْضَاء ، لَبَانَة

**Euphorbia resinifera (S). Euphorbe à résine, E. résinifère (F). Euphorbium gum-plant (E). Wolfsmilchgunmi (D). Euforbo (I).**  
نوع من الفربيون وهو نبات لحمي برقي ممرر يعلم من  
٥٠٠ الى ٢٠٠ سم . غرابيه مسلفة ربابية الزوايا ، لونها  
الى الاخضر الفاتح الاطحل الموج . لباتته غزيرة المادة  
الحماية الشديدة الفاعلية الشائعة الاستعمال الطبي .

#### ١٩١٦٥ - عَتَجْد جَمِيل \* ، بَيْت الْقَصَل

**Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima (S). Euphorbe superbe, E. écarlate, Fille de consul (F). Poinsettia, Easter flower, Flame-leaf (E). Weihnachtsstern (D). Poinsettia (I).**  
نوع من الفربيون وهو جنبة زرقية معمرة تاجل من ٦٠  
الى ١٢٠ سم . اوراقه حراء اللون غنية الصبغة منعقة ||  
نصلها يبغي الشكل ، اذنيها القاعدة ، ذرب الزام الاخير .  
ازهارها نجمية الشكل ، كبيرة القد ، ارجوانية اللون || يتكاثر  
بالتعجيل . يرغب في المواقع الدافئة وفي الارربة المتوسطة  
الانسجام الصيقة الدور .

#### ١٩١٦٦ - عُنَجُل ، عُنَجُول

جنس حشرات من فصيلة الشجرليات ، اطلب عنجول .

١٩١٦٧ - عُنَجُوج  
Coursier (F). Charger (E).  
الجداد الصبور الرائع من خيل الميدان .

#### ١٩١٦٨ - عَتَجُوس \* ، حَالِيْش ، مَالُوش ، حَرَّالَة

**Gryllotalpa gryllotalpa, Gr. vulgaris (S). Courtillière Taupé-grillon, Taupette (F). Mole cricket (E). Maulwurfsgrille (D).**  
حشرة دجوية مقترنة من فصيلة الجديديات ورتبة مستقيبات  
الاجنحة . طولها عنه كمال بلوغها اي بعد انسلخها  
الحامس لا يقل عن ٥ سم . فويها الى السرة الكستنية .  
ظهورها خلي النشاء . بطها الى الجلوة . رأسها غروطي  
الشكل ، شديد الانعاف يرتكز على حلقة صمدية شبه  
اسطوانية . عيناها غريزتان بارزتان . زباناها غيظيان  
محينا الطرف . جوشها وظهورها مفلغان بشفاء واق صلب .  
قوامها ست . فاقمتها الاماميات مسلحان بمبرفتين  
مستنيتين تحفر بها التربة || تألف الارربة الرطبة .



تميش في دهاليز سطحية تسردبها في جميع الاتجاهات. حياتها طول من ٢٢ إلى ٢٤ شهراً تمر في اثنتائها جنس انسلخات || قوتها الديدان والحشرات والجملور التي تتعرض طريقها || اغراضها كثيرة لانها لا تقتصر على الدورات والجملور التي تلتهمها او تشوها بل تتصلها الى جميع الشئ التي تحلل تربتها فتبويها وتبيتها || اثباتها اكبر قدماً من ذكرها وهي تنجح مكبتها الذي يراوح عدده بين ٣٠٠ و ٥٠٠ في الزيل والخمير وفي اجوار تخلفها في التربة على اعماق يراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. مكبتها ابيض اللون الملبس الشكل يطول من ٢ الى ٣ سم. وهو ينقث بعد مئته بنحو ٣٠٠ ساعة || تكاثره باستمال احد الحواشير الفعالة كالأكرودي وفيلوسيليكات البارودي وغيرها.

١٩١٦٩ - **عُنْجُولُ الْبَطَاطَا \* ، لَاحِظَةُ الْبَيْعِ**  
Phthorimaea operculella (S). Teigne de la pomme de terre, Mineuse des feuilles de tabac (F). Potato tuberworm (E). Kartoffelmotte (D).

فراشة صغيرة احد من فصيلة المنجوليات . طولها نحو ٨ سم . بطنها يراوح بين ١٦ و ١٨ سم . وراشها خفيفة طلاء اللون ، وراشها الاسمان مبقمان بالاسمر والخلفيان مبهديا الخمار || مكبتها ذري القند ، كروي الشكل ، اسمر اللون . وقتها غبار الجسم ، وردية الملمح ، طولها نحو ١٠ سم . خادرتها بنية اللون تتلحف فيلجة حورية الناس تقم بين الارزاق الجافة للمساكن على التربة او في الخازن بين طيات الاكياس وطليا || اغراضها بالغة لان اجسامها الحولية عديدة تراوح بين ٦ و ٧ وأكثر ولان وقتها تامة تركيب البطاطا والباذنجان والتبغ والبننوره . اذاها يبتاع في الورقة التي تقتها ويمتد الى الساق التي تمطها وينتهي بالدرنة التي تقترها وتدهنها فتعيش على ما تحوي من مواد نشوية || وتمطب اوراق التبغ لانها تتحللها وتسردب نسيجها بين البشترين يندو شفاهاً غالباً من المواد النشوية الممطرة . تكاثره عند ظهورها باستمال احد الحواشير الفعالة المتمركزة على الاروتيون .

١٩١٧٠ - **عُنْجُولُ الْخُبُوبِ \* ، طَبُور ، أَلُوبِيْت \* ، حَنْطَبُ الْحِطَّة \***

Stotrogra cerealella (S). Alucite des céréales (F). Grain moth (E). Getreidemotte (D).

فراشة صغيرة القند من فصيلة المنجوليات . طولها نحو ٦ سم . بطنها يراوح بين ١٢ و ١٤ سم . جسمها وراشها الاسمان الى السطح اليرداه تشوها صفرة باهتة . وراشها الخلفيان الى السمر ، اعدادها رصاصية || مكبتها ذري القند ، بيضي الشكل ، يرتقالي اللون . وقتها غبار الجسم طولها نحو ٥ سم . خادرتها حطية اللون تكن في الفيلجة التي تنسجها داخل الحية || اغراضها محصورة بما تنسبه اليرقة من عطب في الحبوب المخزونة لانها تقتها وتميش في داسنها على المواد النشوية .

١٩١٧١ - **عُنْجُولُ الْقَنْطَر \* ، دَوْدَةُ قَرْقَنْفَلِيَّةِ دَوْدَةُ الْوَرْدِ الْقَرْقَنْفَلِيَّةِ**

Platyedra gossypiella, Gelechia gossypiella (S). Platydre, Géléchie du coton, Ver rose du cottonnier (F). Pink bollworm (E). Roter kapselwurm, Baumwollmotte (D).

الحشرة الكاملة فراشة صغيرة القند من فصيلة المنجوليات . طولها يراوح بين ٧ و ٧ سم . بطنها نحو ١٥ سم . جسمها

حطلي عاين . وراشها الاسمان الى الصبهة الصنائية يملؤها عنه قاعدتها وفي طرفها تدبج اسمر تقطع مسرته مع ابتاده . وراشها الخلفيان الى الكهبة اليرداه تملوها مشقة فضية . اما الاهداب فرصاصية اللون || مكبتها ذري القند ، بيضي الشكل ، الازاري اللون عند راسه ثم يبدو ويخضر ويستقر على الازاري القرقنلي ، تنسج الاثني فرداً او مجموعاً على اي جزء من النبات || وقتها تدريجياً الى ان تستقر على القرقنلي . رأسها كسني اللون دورقها الصدرية بيضاء زاهية اما الشرجية فلباقية . ظهورها احر اللون جزوي التبغ . مدنها اصفر حطلي . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم || خادرتها صفراء ، طولها رقيقة ناعمة نسجها كالكولاس || وقتها تركب الفصيلة الحمازية انحصها القطن . تميش في بده عهدها على البرام الزهرية فتنتج وتقتات من محتوياتها ثم تنبع عنها في الكنتاج لتلتهم اللزور ، في الطواير النشوية الاولى ، قبل جفاف لبانها ولا تنأخر عن قرض القليل الجديده قبل اكتمال نموه وصلاحه .

١٩١٧٢ - **عُنْجُولِيَّات \* Gelechiidae (S). Géléchidés (F). Gelechiidae (E).**

فصيلة حشرات مؤذية من رتبة شرجيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ١٥٠٠ جميعها صغيرة الحجم . وراشها مستطيلة ملونة وبيدية الاطراف . حادها الخلفي مهدب الحافة . ملاسها الشفوية طويلة ذرية ملونة نحو الملاد . قرونها الاستفشارية غشبية مجعنة . مكبتها ذري القند ، لاقياسي الشكل والتجميع . وقتها ملونة ، صفراء ، رقيقة ، سرية الحركة ، خاضعة ، تركب الازهار والثمار والحبوب .

١٩١٧٣ - **عُنْجِيل \* Trachypterus (S). Trachyptère (F). Trachypterus (E).**

جنس اسماك بحرية من فصيلة البشجيات انواعه المعروفة نحو ١٠ اسماها بحار البلاد الحارة من المالين القدم والجديد . اجسامها مردنية الشكل مبطة . تتميز زعانفها المسطيلة الانقباسية كما يبدو في الرسم . اثرها ثنائية اللون يملؤها تدبير جزوي وهي فضية الشطر الاعلى عاجية الشطر الاسفل

١٩١٧٤ - **عُنْجِيلِيَّات**

Taenioides, Trachypteridae (S). Tenoïdés, Trachyptéridés (F). Taenioides, Trachypteridae (E). فصيلة اسماك بحرية من البطيات شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن يكثر وجودها في بحار المناطق الاستوائية || اشهر اجناسها المنجبل والشرياط والقفوت

١٩١٧٥ - **عُنْدَرِيل**

المنجبل غرب من العصافير (بحر المحيط) .

١٩١٧٦ - **عُنْدَرِيس \* Indris brevicaudata (S). Indris à queue courte (F).**

حيوان لبون وسيد الجنس والنوع من البومويات . موطنه جزيرة مدغشكر . يألف الغابات الرطبة . ملجئه الحيائي جماعي . جماعته تمد من خمسة الى عشرة ازواج || جسمه ابيض الشكل يرتفع نحو ١٥٠ سم . وهو اكبر اجناس البومور . شكله وألوانه قريب الشبه بشكل الانسان . ثوبه



عُنْجُولُ الْبَطَاطَا



عُنْجُولُ الْبَطَاطَا



عُنْجُولُ الْقَنْطَر



عُنْدَرِيل



عُنْدَرِيس

Bukkum-wood (E). Sapanbaum, Rotes Brasilienholz (D). Brasiletto dell'Indie (I).

نوع من العندم، شجرته سريرية شائكة تملو نحو ٨ أمتار. أوراقها مركبة عابلة، ووريقاتها سنائية صغيرة. أزهارها عشقودية التجميع، يرتقالية اللون، خافتة العنبر المطري. أخشابها شديدة الصلابة، قوية المتانة، جيدة الصنف. خضباها أحر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٥ - **عُندَم قارح \***، **أطموط**، **بُنْدُق هندي**

Cesalpinia bonduc (S). Césalpinie bonduc, Bonduc, Chiquier, Chiquier, Chlcot du Canada (F). Bonduc, Nicker tree, Gray bonduc (E). Nickerbaum, Gemeiner Schüsserbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

نوع من العندم شجرته سريرية قليلة الشوك تملو من ٣ إلى ٤ أمتار، أوراقها مركبة، ووريقاتها بيضية النصل. أزهارها عشقودية التجميع صغيرة القد، صفراء اللون. ثمارها طيبة وصياغة حواء الغضاب. أخشابها صلبة متينة جيدة الصنف.

١٩١٨٦ - **عُندَم هندي \***

Cesalpinia pulcherrima, Poinciana pulcherrima (S). Césalpinie superbe, Flamboyant, Poincillade magnifique (F). Indian flower-fence, Peacock flower (E). Paradiesblume (D). Poinciana Indiana (I).

نوع من العندم الزينة. شجرته شائكة، رفة، تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها مركبة عابلة، ووريقاتها اعليجية صغيرة. أزهارها كبيرة القد، حواء اللون، عطرية العنبر، هريسة التجميع || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٩١٨٧ - **عُندَمِيَات**

Caesalpinia (S). Césalpinie (F). Césalpinieae (F). Césalpinia (E). بسيط من فصيلة القرنيات وأجناسه وأنواعه زهاء ٦٠. فيها الأشجار والشجيرات والجنبايات البرية والصناعية. أشهر أجناسه العندم.

١٩١٨٨ - **عُنُرُوس أَمَلَس** (S). Aneuris laevis (S). Aneuris lisse (F).

حشرة دامت من فصيلة العروسيات. جسمها صغير بسيط. يطول نحو ٥ سم. عند الذكر رفقو ٧ سم. عند الأنثى || ثوبها إلى الجؤوة. ظهورها كامل الحنجبة، بنفسجي اللون، أسود المواج، وريشها شفانان. رأسها مكور. غطلمها صغير، طليق. عيناها صغيرتان. عنقها قصير. كوسلها مقطوم القاعدة والطرف. حجبها نصف دائرية. ظهورها يلحف البطن دون الحار. حمار بطنها مجاع بالاسود. قوائمها صغيرة || تألف البراري الغدلة. تعيش تحت القشور وفي الجحالة على المواد النباتية المنسلة.

١٩١٨٩ - **عُنُر** (F). Capella (E). Chèvre, Capella (F).

النمر نجم من كوكبية مسك الأعنة. مركزه على المرقق الأسير. يعتبر من نجوم البؤرة الأول. يبرد من الأرض نحو ٥٠ سنة ضوئية.

١٩١٩٠ - **عُنُر**، **عُنُرَة** (E). She-goat (F). Chèvre (F).

الأنثى من الماعز أو انثى الليس. ج أمز وعوز وشاز.

١٩١٩١ - **عُنُر**

Ibis هو الحارص، اطلبه.

إلى السمرة السوداء. رأسه وكفاه وظهوره وساعده وفخذاه إلى السواد الفحمي. أذناه كبيرتان كاسيتان. جبهة وخذاه وصعته إلى الكهبة. يدها وريلاه سود. ذنبه شديد القصر، يطول نحو ٥ سم. || الأنيث ثنائية الثدي، يحملها يدم نحو ١٤٥ بيوتا تضع في غمده جروا واحدا وتزعمه نحو ثلاث أشهر || قوته الثأر والزعمات والجذور يسى إليها في الليل من القرب إلى الدبر ويبيت في الثأر على أفضان الأشجار الرقيقة الورقة الظل.

١٩١٧٧ - **عُندَلَة**

Bas ventre (F). Lower part of the abdomen (E).

المنطقة أسفل البطن.

١٩١٧٨ - **عُندَلَة**

Chant du rossignol (F). تغريد العندليب.

١٩١٧٩ - **عُندَلِكِب \*** (S). Luscinia megarhyncha (S). Rossignol chanteur (F). Nightingale (E).

طائر من الحزار وفضيلة العندليات يتميز بحسن عدلته ورقة صوته وانسجام انغامه. طوله نحو ١٥ سم. ثوبه إلى السمرة الشقراء يبق عند الرأس والظهر ويبيض عند البطن || وهو من الطوائف يحوب البلاد في طلب الزرق والمصيف والمشي. يأت الحداثق والغابات والادغال. قوته الحشرات والديدان والتمل || يدمن في العوسج والجنبايات الفناء الشائكة. انثاه تضع من ٥ إلى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٣ إلى ١٤ يوما.

١٩١٨٠ - **عُندَلِكِب اليابان** (F). Rossignol du Japon (F).

طائر ياباني المهج جميل الثوب، يدعى بَهْدُل، اطلبه.

١٩١٨١ - **عُندَم**

Cesalpinia (S). Césalpinie (F). جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات. أنواعه نحو ١٠ منها الأشجار والشجيرات والجنبايات. أخشابها ناعمة الزرقمة، صلبة العود، فائرة الصنف، شائعة الاستعمال ويستخرج منها صبغات حر وصفر مرغوب فيها تصلح في تخفيف الصوف والقطن || أشهر أنواعه مايتج.

١٩١٨٢ - **عُندَم بَرَازِيلِي**، **خُشَبَ فِرْتَمِبُوك**

Cesalpinia echinata (S). Bois du Brésil, B. de Fernambouc (F). Brasil-wood, Braziletto-wood, Lima-wood (E). Brasilienbaum, Brasilienholz (D). Poinciana rosso, Legno del Brasile (I).

نوع من العندم. شجرته سريرية شائكة تملو نحو سبعة أمتار، أوراقها مركبة عابلة. أزهارها إلى الصفرة. أخشابها شديدة المتانة، فائرة الصنف. خضباها أصفر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٣ - **عُندَم مَحَالِي**، **فُوقَلَة**

Cesalpinia coriaria (S). Dividivi (F). Dividivi tree, American sumach (E). Dividivistrauch (D). Sommaco d'America (I).

نوع من العندم، شجرته سريرية شائكة تملو نحو ٥ أمتار. أوراقها مركبة عابلة. ووريقاتها بيضية الشكل صغيرة القد. أزهارها متوسطة الحجم، عشقودية التجميع. أخشابها جيدة الصنف صناعية. غام سوطها وثمارها دباغية وصياغية.

١٩١٨٤ - **عُندَم صَبَان \***، **بَقَم هندي**

Cesalpinia sappan (S). Césalpinie sappan, Bois de sappan, Brésillet des Indes (F). Sapan-wood tree,



عندليب



عندم مَحَالِي



عندم صبان



عندم قارح



عندم هندي



عَرَّ الماء



عَرَّ



عَس



عَصَر



عَنَصِيفٌ

Micro-élément (F). عُنْصُرٌ مَكْرِي ١٩٢٠٢

هو كل عنصر غذائي جزئي النسيب يسبب اتمامه او شأته في التربة ما يدفعه الجفن او العوز الذي تظهر عوارضه في النبات والآخر.

١٩٢٠٣ - عُنْصَرَةٌ هي الملعق اللهب ، اطلبه .

Racial ١٩٢٠٤ عُنْصُرِي نعت تعريفي توصف به الاجناس المتحدرة من اصل واحد.

Scille (F). ١٩٢٠٥ عُنْصُلُ هو الاشقييل نبات دوفسي طيب ، اطلبه .

Scille d'automne (F). ١٩٢٠٦ عُنْصُلُ جَرَسِيّ هو اشقييل الخريف ، اطلبه .

Jacinthe sauvage (F). ١٩٢٠٧ عُنْصُلُ مَنَحْنُ هو اشقييل القاب ، اطلبه .

Jacinthe étoilée (F). ١٩٢٠٨ عُنْصُلُ تَجَسِيّ هو الاشقييل النجمي ، اطلبه .

١٩٢٠٩ - عُنْصُلُ \* ، جَوْنُ المُرُوجِ

Endymion (S). Endymion, Agraphide, Jacinthe des prés (F). Blue hyacinth (E). نبات يصل من فصيلة اليرنيقيات . مهد غابات البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروبة . اوراقه مستطيلة مزاوية التصل الجميل الخضار . ثمراعه اعوج الانتصاب ينتهي بشلة من الازهار المتتابعة المتحبة العرف ، الجيلة الشكل ، السداسية البتلات الزرق || تنويره ربيعي .

Felicia (S). ١٩٢١٠ - عَنَصِيفٌ \*

Félicie, Pâquerette bleue (F). Blue daisy, Blue Marguerite (E). Felicia, Kapaster (D). Felicia (I). جنس نباتات برية وريينية من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها المشية واللينة والحولية والمعمرة . اوراقها لا قياسية الارتفاع . ازهارها مختلفة الالوان يندب فيها الازرق . معظمها نبات سروي يمش ويوجد في جميع الاروبة || اشهر انواعه التريينية ما يلي .

١٩٢١١ - عَنَصِيفٌ سَمْتَحْرِي

Felicia coelestis (S). Félicie azurée (F). عشبة ليلية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متقابلة ، لاطئة ، بيضية الشكل ؛ نصلها خالي البشرة ، ملتف الاطراف . ازهارها هالية الارتفاع ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، سمنجية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

Felicia tenella (S). ١٩٢١٢ - عَنَصِيفٌ لَطِيفٌ

Félicie délicate (F). عشبة معمرة تملو نحو ٣٥ سم. اوراقها متقابلة خيطية ، نصلها عادم الصلم ، خالي البشرة ، باحت الخضار . ازهارها هالية الارتفاع ، فردية التجميع ، لها بين الازرق والبيكلي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Cigogne noire (F). ١٩١٩٢ - عَنَرٌ هو اللقلق الاسود ، اطلبه .

Balistes (S). ١٩١٩٣ - عَنَرُ الماء \* ، قَتَفَرٌ

Baliste (F). Trigger-fish (E). جنس اسماك بحرية من رتبة ملحومات الفك . انواعه عديدة . اصطناعا بحار مناطق البلاد الحارة . جميعها من الاسماك المأكولة تتميز بالكلها البيضية المبطلة المادية الانعاق . رؤسها مسلحة زعانف مهاذبة الشكل مدبة الطرف تستقر وتنتصب عند الحاجة .

Baliste caprisque (F). ١٩١٩٤ - عَنَرُ الماء المَلَوْنُ سمكة بحرية تدعى قَتَفَرُ المتوسط ، اطلها .

١٩١٩٥ - عَنَرَبٌ ، عَنَرُبٌ هو سماع اللك ، اطلبه .

Astragale (F). ١٩١٩٦ - عَنَرَزُوتٌ هو الاسطرغالوس ، اطلبه .

Eragrostis (S). Eragrostide, \* ١٩١٩٧ عَنَزَرُ

Eragrostis (F). Love-grass, Tickle grass (E). Grasses Liebesgras (D). Eragrostis, Gramignone (I). جنس نباتات عشبية برية من المعكشيات وفصيلة النجيليات انواعه عديدة نحو ٢٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها حولي وبعضها معمر . يكثر وجودها في المراعي الليلية وفي الاراضي البور . سوقها نخلة . عصفها مشويب التصل ، خيطي الزام الاخير . ازهارها عقودي منتصب . رعاها للماشية وتسمى عليها .

١٩١٩٨ - عَنَزِيْعَةٌ هي التفت النسي ، اطلبه .

١٩١٩٩ - عَنَسٌ \*

Aquila audax, Uroaetus audax (S). Uraète, Uraète audaceux (F).

المنس ، جمه عناس ونسوس ، طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . كبير الجث طولهُ نحو ١٠٥ سم . ويسطه ٢٦٠ سم . منسر قوي الهرة الحادة . ذنبه رتاجي الريش مقطوم الطرف . ثوبه ال السرة الخلفية تملوا مشعة من الصبهة يتخللها ثوب من السرة الجذوية السوداء المالح . عناء عرونييتا اللون . منسر وعخاله صفر || عيشته جاعية ، سربه يعدن زوجين الى خسة ازواج . يألف الجبال والسهول والاراج . قوته كل ما استطاع اليه ميلا من الحيوان والطير والزحافات والاسماك . يرغب في الثم والمناظر والظلام ولا يخف من الجيف || يندن وكته في الانشجار الرقيقة النائية . انشاء تحضن سدها زنتين كبيرتين طول الواحدة راجح بين ٨ و ٩ سم . ويرضعها من ٦ الى ٧ سم . وهو من العقبان التي تألف حياة الاسر بسهولة .

Myrobalan aillé (F). ١٩٢٠٠ - عَنَصٌ هو الاملج المجح . من النباتات الطبية ، اطلبه .

Élément (F). Element (E). ١٩٢٠١ - عُنْصُرٌ هو التعريف الوصفي لكل مادة بسيطة لم يستخلص منها ، حتى الآن ، مواد ايسل منها .

## ١٩٢٢٢ - عَنْقُورَانَةٌ كَثِيفَةُ السَّنْبَلَةِ

*Liatris pycnostachya* (S). *Liatride à épi dense* (F).  
بجلة تزيينية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها السفلى  
خاسية أو سباعية العروق طولها نحو ٣٠ سم. وتعرض  
١٥ م. أوراقها العليا خطية التصل الذرب الجامة. أزهارها  
روسيات صغيرة متتامة كثيفة التجميع أرجوانية اللون.  
أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

## ١٩٢٢٣ - عَنْقُورَانَةٌ تَحْيَلِيَّةُ الْأَوْرَاقِ

*Liatris graminifolia* (S). *Liatride à feuilles de graminée* (F).  
بجلة تزيينية تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. أوراقها نجمية  
صغوية الشكل، خفيفة التصل. أزهارها روحيات صغيرة  
متتامة، متباعدة، بيضاء اللون أو حراء || أزهارها  
يستمر من آب إلى أيلول.

١٩٢٢٤ - عَنْقُورُبٌ \*  
*Lucanus* (S). *Lucane*,  
Cerv-ant (F). *Stag-beetle* (E). *Hirschkäfer* (D).  
يقال للذكر عنقلان والآنثى عنقلبة. جنس حشرات نافعة  
من فصيلة المنطوريات. الذكر أكبر قدماً من الأنثى وهو  
كبير الحجم، غليظ الرأس، عظم التأثير، مستطيل  
الزبان، كسني الاغداد السفن الموجب. اما الانثى فصغيرة  
الحجم والرأس والتأثير. اتخذها الى السمرة المابقة العادة  
الموجب || البرقة غرواء اللون، محمودة الشكل، تمشي  
على جلوج الاشجار اليابسة.

## ١٩٢٢٥ - عَنْقُورُبُ الصَّكَّافِ

*Dorque des saules* (F). هو الدرقس، اطلبه.

## ١٩٢٢٦ - عَنْقُورُيَاتٌ

*Lucanidae* (S).  
*Lucanids* (F). *Lucanidae* (E).  
فصيلة حشرات نافعة من رتبة عذبات الاجنحة. اجناسها  
وانواعها عديدة تمشي على جلوج الاشجار اليابسة تحت  
قلفها وفي محيط انتشاب جلورها. اكثرها صغيرة ومتوسطة  
القد وبعضها كبير جداً يراوح طولها بين ٧٠ و ٨٠ م.  
اثوابها مختلفة الالوان يلفب فيها الاسود والكسني المايق.  
قرونها الاستشعارية ورقية الشكل، حشائية المفاسل.  
رووسها مستعرضة، اتخذها سلبية، اجناسها قوية.  
ذكورها اكبر حجماً من اناثها واضخم جثة واغلظ اعضاء  
وتأثيراً.

## ١٩٢٢٧ - عَنْقَمَةٌ

*Interligne* (F). *Space-line*, *Lead* (E).  
العنفة في المسافة بين خطي الزرع.

## ١٩٢٢٨ - عَنْقَمَةٌ

*Turbine*  
دولاب مائي محرك بمحور عمودي أو ممتد. والعنفة  
اشكال اسمها استعمالاً:

*T. radiale* (F). *Radial T.* (E). عنفة شعاعية

*T. hydraulique* (F). *Hydraulic T.* (E). عنفة مائية

*T. axiale*, *T. parallèle* (F). عنفة محورية

*Axial T.*, *Parallél T.* (E).

*T. mixte* (F). *Mixed T.* (E). عنفة مختلطة

١٩٢٢٩ - عَنْقُطٌ هو عنق الارض.

## ١٩٢٣٠ - عَنْقَلُولٌ

هو السلق، اطلبه.

## ١٩٢١٣ - عَنَصِيفٌ مُنْكَحِسٌ

*Félicie reflexa* (S). *Félicie réfléchie* (F).

عشبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها متناقية،  
معقفة، بيضبة الشكل، ذلقة الزايم الاخير. تصلها  
جميع العقد، مالم البثرة، منعقفة الطرف، باعث  
الخضار البحري. أزهارها حامية الارتكاز، فردية التجميع  
حراء اللون || أزهارها يستمر من شباط الى أيلول.

## ١٩٢١٤ - عَنَصِيفٌ

هو السون البجلي، اطلبه.

## ١٩٢١٥ - عَنْطُسٌ

*Anthistira* (S). *Anthistirie* (F).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات. انواعها  
المعروفة قليلة العدد اعطائها البلاد الحارة || والعنطس من  
النباتات الطويلة على الساحل اللبناني. سنباله عذكويلة  
التجميع محفوفة بقنبيات دقيقة تجعلها كالقلمعة.

## ١٩٢١٦ - عَنْطُظٌ بِلَّالٌ \*

*Onitis belial* (S). *Onite belial* (F). *Onite* (E).

حشرة جاسة نائلة من فصيلة الجمليات ورتبة مفدمات  
الاجنحة. تألف المزارع والبساتين والبراري وكل مكان  
يكثر فيه ائني والروث والسلح || جسمها متوسط القد  
يطول من ٢٠ الى ٢٦ م. ثوبها الى السواد اللامع. رأسها  
بلسي الجرم، قصير الازار والخطم. زباناها صغيران،  
صغيفيا الاطراف. عيناها صغيران. ظهرها مقنوم  
الطرف، لا يلمس كامل البطن. غداها خديتة الصلابة،  
قليلتا التنجيز || الاثني اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً  
منه || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة  
في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. سرسها  
دجوي || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول  
من ٤٠ الى ٥٠ م. جسمها مستطال الجرم، منثني  
الشكل، ضليع التأثير، قصير الراجب، اغبر اللون،  
اسود الرأس || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع.

## ١٩٢١٧ - عَنْطٌ

العنط: تغير النبات من الحرق.

## ١٩٢١٨ - عَنْطُظٌ

*Sauterelle malle* (F). *He locust* (E).

المنطب الذكر من الجراد. ج. عنطاب.

## ١٩٢١٩ - عَنْطَلٌ

بيت العنكبوت.

## ١٩٢٢٠ - عَنْقُورَانٌ

*Liatris* (S). *Liatride* (F).  
جنس نباتات عشبية سبروتية معمرة من الفصائل  
المركبات. انواعها عديدة منطها بري وبعضها تزييني.  
جلورها دوفضية كروية. سوقها بسيطة جالسة. أوراقها  
صغيفة الشكل متناقية. أزهارها سنبل التجميع. يزورها  
قزمية القنة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

## ١٩٢٢١ - عَنْقُورَانَةٌ أَنْيَقَةٌ

*Liatris elegans* (S). *Liatride élégante* (F).

نوع من العنقوران وهي بجلة تزيينية تملو من ٦٠ الى  
١٢٠ سم. أوراقها مستطيلة التصل، خفيفة الصلابة  
الجامة. روحياتها اعليعية الشكل. أزهارها أرجوانية.  
أزهارها يستمر من آب الى تشرين الاول.



عنطيط ببال



عنطوب ذكر



عنطوب ائي

١٩٢٣١ - عقيد السنديان \*، قزبة السنديان

الجرارة \*، بمبيكس السنديان

Cnethocampa

processionea, Thaumetopoea processionea (S).  
Processionnaire du chêne (F). Procession moth,  
Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Prozessionspinner (D).

حشرة من فصيلة الثورليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم والجديد . فراشاتها صفيقة تعيش على غزونها الاسمانى . سرقتها تعيش على اوراق الشجيرات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م . بسطها نحو ٣٠ م . رأسها حنطي اللون . عيناها صغرتان . زباباها مشطيان مزويجان عند الذكر ، مشطيان بسطيان عند الانثى . جوشها حنطي اللون اسمر الموالج بطنها اشبه اللون ، اصمر الموالج || روشنها الاسمانى الى الكهية تملؤها زركشة وخطوط متعرجة الى الغيرة السراء . روشنها الخلفيان الى الشبهة التبراء تملؤها مشمة حنطية خفيفة . اهدابها الى الحنطي الاكلف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب . تسرح في الليل . تماثل بمد ظهورها بمد تراوح من ٤ الى ١٦ ساعة . تمتع المكان صفتا على لها الجلوع والافصان || السرة تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبا الملوي الى الشبهة الزرقاء الموالج . جانباها الى الشبهة التبراء تحمل في كل سكة من سكها البطنية ثمة حراء تملؤها ضمة من الحلب السريع الانفصان يشري الجله اذا لاسه ويهيج كالقرص . رأسها اسود || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن غلاف رقيق داخل الجراب الجماعي الذي تأوي اليه جميع اساريع العشرة .

١٩٢٣٢ - عقيد الصنوبر \*، قزبة الصنوبر

الجرارة \*، بمبيكس الصنوبر الجرارة

Cnethocampa pityocampa, Thaumetopoea

pityocampa (S). Processionnaire du pin (F). Pine processionary caterpillar, Procession moth (E).  
Pinien-Prozessionspinner (D).

حشرة مبدولة من الثورليات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشاتها جارية ثوبا رقيق الزهار . سرقتها تعيش على اهداب الصنوبر || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م . بسطها نحو ٣٢ م . رأسها اكلس اللون . عيناها معتدلتا الحجم والثنشوز . زباباها مشطيان عند الذكر خطيان عند الانثى . جوشها اكلس اللون ، اسمر التشيج . بطنها الى الشبهة المقلوبة بالاسمر || روشنها الاسمانى الى الكهية الدنسة المزهجة بثلاثة خطوط حنطية . روشنها الخلفيان الى البياض الاغبر تملؤها بقعة شهاب في حدود الزاوية الخارجية السفلى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران . تسرح في الليل . تماثل بمد ظهورها بنحو اربعة اسابيع و تمتع المكان على البناق واصول الاهداب || السرة تطول من ٣٠ الى ٤٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، كثيف الحلب ، كسني اللون مبيج بالجوزي . رأسها اسود . مدبا اسفر . ملها حنطي يشري الجله اذا لاسه . والسرقة قبل دخولها في طور الاكمال يوبين تهرج غياه العشرة وتبتعن في الجلالة نحو اربعة اسابيع الى أن ينتهي هذا الطور .

١٩٢٣٣ - عُنُق ، عُنُق

Cou (F). Neck (E).  
عق وعق . ج اعناق .

١٩٢٣٤ - عُنُق

Encolure (F).  
Neck and shoulders of a horse (E).

جزء من جسم الفرس يمتد من الرأس الى الصدر والكتفين .

١٩٢٣٥ - عُنُق

Pétiole (F). Petiole (E).  
علاقة نصل الورقة .

١٩٢٣٦ - عُنُق الحية

عق الحية نجم نير من كوكبة حور وسية . مركزه على عق الحية .

١٩٢٣٧ - عُنُق الفرس

عق الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

١٩٢٣٨ - عُنُق

Phénix (F). Phoenix (E).  
العقاء كوكبة نجوم موقعها الجنوب .

١٩٢٣٩ - عُنُق مغرب هي الفرس ، اطلبه .

١٩٢٤٠ - عُنُق ، علمية ، فاصليا مهتازية

Centrosema (S).  
Centrosema (F).

جنس نباتات عشية حولية من الفاصليات وفصيلة القرنيات الفراشية . انواعه نحو ٢٥ مظهرها بري وبضها علي رتيبي .

١٩٢٤١ - عُنُق

Beryx (S). Bérýx (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة العقديات الشالكات الزعانف . انواعه المعروفة خمسة موطنها بحار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، زاهية الالوان الجليدة اللامعة . عيونها كبيرة مستديرة ، زعانفها الظهرية مستطيلة شائعة ، زعانفها الشرجية فارقة || يعتبر من الاسماك العادية البسة .

١٩٢٤٢ - عُنُق

Oncodes (S).  
Oncode (F). Oncodes (E).

جنس حشرات من فصيلة العقديات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة قليلة المدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستضخمة الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة ، متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . مراشفها ولباسها شديدة الصغر . كواسلها شبه مكورة . شبنغاتها تلحف الارزعة . بطنها انائية الشكل . مرزاتها صغيرة . رواشها مستعرضة . قوائمها معتدلة الطول || تألف البراري والمواقع الغلة . يرقاتها تنطلق على بعض انواع الناكب .

١٩٢٤٣ - عُنُق يات

Oncodidae (S).  
Oncodidae (F). Oncodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد باستثناء المناطق الباردة || اجسامها شبيهة القد ، مستضخمة الشكل . رؤوسها صغيرة عيونها كبيرة ، متقاربة عند الشقين . قرونها الاستشعارية ثنائية او ثلاثية الفصل ،



عقيد السنديان



عقيد الصنوبر



عقد



عقد

رارعها نائفة . اوراقها مركبة ، عابطة ، ورتية التجميع . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها يضيئ الشكل ، ذلق الزايم الاخير ، سنن الحافة ، عابق الحصار على صفته العليا ياحته على السفلى . ازهارها منتبضة كمنحولة التجميع . ثمارها جراء حراء اللون ، ثلاثية الفلق .

Grappe, Racème (F).

١٩٢٥١ - عَفْشُود

Bunch, Racem (E).

شكل ازهار بسيط غير محنود تكون فيه الازهار ذاتاار محنولة على علاقات قصيرة متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك . مثاله عنفود النبق والكشمش .

Uniforme (F).

١٩٢٥٢ - عَفْشُودِي

Grape-shaped (E).

نمت تعريفه يطلق على ما كان شكله كمنعقد النبق .

Racémeux (F).

١٩٢٥٣ - عَفْشُودِي الشَّكْلِ

Racemose (E).

ماكان ترتيبه او تجميعه شبيه بالمنعقد .

Enicurus (S).

١٩٢٥٤ - عَفْشُور \*

Enicure (F). Enicurus (E).

جنس طير من الجولام سنيات المناقير وفصيلة الذعريات . اجنوس المعروفة نحو عشرة . اعطائها تمتد من الهند الى ماليزية وجاوا . تألف الغابات وصفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها رفيقة هيفاء تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . تتميز باذنانها المستطيلة الفارقة . اوتواها مبقلة بالاسود الاسم اللامع والابيض التاسع || تدن اعشاشها في افاحيص تقيمها في صدوع الصخور القريبة من مجاري الماء . اناتها تحضن من ٥ الى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تناوب الاناث في الترخيم .

Spermophagus

١٩٢٥٥ - عَفْشُوس ناعم \*

sericeus (S). Spermophage soyeux (F).

Spermophagus sericeus (E).

حشرة واسعة حابية من فصيلة المندوسيات ورتية مفدمات الاجنحة . تألف الموائل التي يكثر فيها الابلاب . خنافسها تعيش على ازهار النباتات المختلفة الاجناس والفضائل . يرقاتها تعيش ضمن كبابر الابلاب || جسمها صغير اللد يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى السواد البوري يطلو خل كثيف اشهب . رأسها مستدل الجرم . جنيها صغيرتان . زباناها صوفانيان . فكها ذريبان . ظهرها لا يلفح كامل السكة الشرجية . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في البهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ١٥ يوما . تمتع الممكن ميحاذيا على الكبابر تغلفه مادة غروية لاصقة || البقرة عند بلوغها الإدراك التام تطول نحو ٤ سم . جسمها مقبوس الشكل ، نولي والرباج ، حنطي اللون ، أغبر المراج ، قوائها نضيفة ، كثيفة الحلب الشائك || تألف اثمار السديان والمفصس اينا كانت . قوتها التسع تنحصه من الاوراق .

Anilloca (S).

١٩٢٥٦ - عَفْشُوس \*

Anilloce (F). Anilloca (E).

جنس دويبات بحرية من فصيلة مستناريات الاريل وفصيلة الغريبسيات . انواعها المعروفة قليلة اعطائها اليسر

بعضها مهذب الاطراف . ملاسها نجيلة او ضامرة . كراسلها شبه مكورة . شيفاتها منبسطة تلحف الارزنة . بطونها انائية الشكل . رواشها صغيرة ، شافقة || يرقاتها صغيرة ، وضعية الشكل ، مجهزة بتأثير ثاقبة تمكها من التفلل على النواكب || اشهر اجناسها المنعد .

Béryclides (F).

١٩٢٤٤ - عَفْشُودِيَّات \*

Beryclidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة موطنها مجار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد مأكلة تتميز بالزواها الزاوية الالوان ، بكبر عيونها المستديرة . بزاعفها الظهريه للامامونة الشكل وبزاعفها الشرجية الفارقة || اعرف اجناسها واشهرها المنعد والسفوق والجبس والطيرة .

Verge de l'âne (F).

١٩٢٤٥ - عَفْشُور

هو جردان الحار .

١٩٢٤٦ - عَفْشُورَة

انثى الباشق .

١٩٢٤٧ - عَفْشُورِيَّات \*

Argonauta (S). Argonaute (F). Argonaut (E).

جنس حيوانات حلابية رأسية الارسل من الاخطبوطيات . انواعها عديدة منتشرة في جميع مجار البلاد الحارة . تتميز بالفرار الشكلي الشاسع الذي يبدو بين الذكور والاناث . ذكورها صغيرة القد اخطبوطية الشكل عادمة الصدفة قصيرة الملاصق باستثناء الرأس المستطيل . اناتها مستديرة الشكل نصفية الغلاف الصفي التركيب الرقيق الصفعة . اشهر انواعها المعروفة :

Argonauta argo (S).

عَفْشُورِيَّات الموصط

Argonauta tuberculata (S).

عَفْشُورِيَّات المحيط الهندي

Empusa (S).

١٩٢٤٨ - عَفْشُوس \*

Empuse (F).

جنس حشرات من فصيلة السرفويات ورتية مستقيبات الاجنحة . انواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . اخلاقتها اخلاق الشرافيف اما اشكالها فغريبة .

١٩٢٤٩ - عَفْشُوسِيَّات يان \*

Oncopsis lanio (S).

حشرة من فصيلة اليزيديات ورتية متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ سم . || ثوبها متباين الالوان بين الشقين . فهو عند الذكر أسود الرأس وتياويل والحيفة ، جزوي الظهران ، اسمر البطن والقوائم . وهو عند الانثى جزوي الرأس والكويول والحيفة ، اخضر الظهران ، حنطي البطن والقوائم || رأسها مستعرض ، قليل التتو . اجنوس مستدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها نجيلان ، قصيران . كراسلها مستطيل الشكل . حجبها كبيرة ، عرسية . ظهرها كامل الحنجرة ، لاصف روشادها غشائيان ، شفافان . قوائها نضيفة ، كثيفة الحلب الشائك || تألف اثمار السديان والمفصس اينا كانت . قوتها التسع تنحصه من الاوراق .

Euscaphis (S). Euscaphie

١٩٢٥٠ - عَفْشُودِيَّات

جنس نباتات معمرة من فصيلة النبئات . انواعها قليلة العدد منسجها بري وبمضها زريبي . جنيهاها ومجربها تملو من ٢٠٠ الى ٦٠٠ سم . فروصها وانفانها غليظة ،



(ذكر) (انثى)  
عَفْشُورِيَّات



عَفْشُوس



عَفْشُور



عَفْشُوس ناعم



عَفْشُورِيَّات

Analges (S).

Analgé (F). Analges (E).

جنس حشرات جلدية من الحفليات وفضيلة الجربيات .  
انواعه الممرقة قليلة المدد جميعها صغيرة الحجم ، مؤذية .  
تتطفل على الكثير من الطير اعصاها الجوارثم .

١٩٢٦٧ - عَتَم هو الحفصا ، اطليه .

١٩٢٦٨ - عَتَم اُرُوْبِي هو البتويه ، اطليه .

١٩٢٦٩ - عَتَمَة Palmette, Cordon horizontal  
هي شكل من اشكال التقليم الاقمي يستعمله الحدوة لبعض  
انواع الانهار للتمسرة القوية الانتفاخ رغبة بهم في الحصول  
على حمار باكورية .

١٩٢٧٠ - عَتَمِي Vrillé (F). Bored (E).  
نمت وصي نباتي يدل على شكل خاص من الانواع يشبه  
الحائق او المطفة .

Loranthaceae (S).

Loranthacées (F). Loranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زمام  
٥٠٠ تنتمي الى سبطين : سبط الحفاليات الذي يتميز  
بازهاره الوردية الشق . وسبط البذقيات الحثوي الزئاد .  
جميع نباتاته طفيلية تركب فروع وافصان الاجنار والخشب  
فهيأ مرافقها وتعيش على ما تنمسه من السخ . سفها  
مدادة طفلة . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، يضيء النصل  
الحلدي التسج . ثمارها عينية دقيقة الصير .

١٩٢٧٢ - عُنْفَه Staphylea (S). Staphylyer (F).  
الغنة جمها الهم . جنس جنات يرية زراعية ثنائية  
من فصيلة الغنديات . انواعها عديدة . اوراقها مركبة متعاقبة  
عابلة ، ازهارها عقدوية او عشكولية التجميع طويلة الزئاد .  
ثمارها جراء كروية الشكل ، يزورها غنة صغيرة جامدة .  
يستخرج منها زيت للذية الطعم مأكول || اشهر انواعها  
ما يتبع .

١٩٢٧٣ - عُنْفَه الصين Staphylea holocarpa (S).  
Staphylyer de Chine, S. à capsule entière (F).

شجرة جامدة ، تملر من ٥ الى ٧ امتار . اوراقها مركبة  
ثلاثية . وريقاتها اعليجية النصل ، تطلو من ٦ الى ٩ سم .  
ازهارها عقدوية متدلية يضيء اللين . ثمارها جراء اعليجية  
الشكل مقطوعة الطرف || ازهارها يستمر طوال شهر  
ايار .

١٩٢٧٤ - عُنْفَه اليابان Staphylea bumalda (S).  
Staphylyer du japon (F).

جنية سبروتية تملر نحو ٢٠٠ سم . اوراقها مركبة  
ثلاثية ، وريقاتها اعليجية النصل ، مسنة الحافة ،  
حشكية الانسان . ازهارها عشكولية التجميع متدلية ،  
ثمارها جراء ثنائية الفلق المتعاقبة || ازهارها يستمر طوال  
شهر حزيران .

١٩٢٧٥ - عُنْفَه بُولَنْدَر Staphylea bolanderi (S).  
Staphylyer de Bolander (F).

شجرة سبروتية تملر من ٣٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها  
مركبة ثلاثية . وريقاتها يضيء النصل ، ذلقة الزام الاخير ،  
تطلو نحو ٦٥ سم . ازهارها عقدوية ، متدلية ، وردية  
اللون ، خضراء النصل . ثمارها جراء متساوية الطول  
والعرض || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

الايفس المتوصل || اجسامها صغيرة القدة اعليجية الشكل  
تطلو من ٥ الى ١٢ مم . اعظامها مجزأة بعدة ماسة ||  
تتطفل على الاسماك تنقصت بها ولا تقارفا .

Collaire (F).

Pertaining of the neck (E).

نمت تمريني يطلق على كل ما له صلة بالمرق .

Cervical

Araignée (F). Spider (E).

جنس دوبيات من رتبة العناكب او الرتيلاوات . انواعه  
عديدة متباينة الاجسام والاحجام والاشكال والالوان .  
ذكر العنكبوت يضيء عنكب والاثنى عشكية . ومن اسمائه  
العنكابة والعنكابه والعنكب . ج عناكب وعنكبوتات وعنكابت .  
وقد جاء ليدع الزيان :

« فسيان بيت العنكبوت ويومق  
رفيع اذا لم تنقص فيه الحوائج »

١٩٢٦٠ - عُنْكَبُوت المَنَازِل \* ، فُدَس

Tegenaria domestica, T. parietina (S). Tégénarie,  
Araignée domestique (F). House-spider (E).  
Winkelspinne (D).

نوع من العنكبوت الميزول يكثر في المنازل الاملة والحرة  
طوله نحو ٩ سم . ثوبه الى المؤرة الحطية . يطنه الى الياض  
تطلو زراكل عابطة السرة . شمه لقي الارتكاز ينسجه  
في الزوايا .

١٩٢٦١ - عُنْكَبُوت يَبِيّ Araignée labyrinth (F).  
راجع عبشوة التيه .

١٩٢٦٢ - عُنْكَبُوت سَلَطَعُورِيّ Araignée crabe (F).  
راجع ذبولة الانهار .

Arachnida (S).

Arachnides (F). Arachnida (E).

صف حيوانات صغيرة دابة يشمل العناكب والقاربان  
والقمل والقراد ، الخ .

Adenostyles (S).

Adénostyle (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الفلقتيات وفضيلة  
المركبات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي ،  
تتميز بياها الكبيرة الحجم . سفها تملر من ٦٠ الى  
١٢٠ سم . اوراقها متعقة ، متعاقبة ، نصالها ثلجية الشكل ،  
فضفاضة السفحة ، خلية البشرة . ازهارها عديدة الروؤسات ،  
وردية اللون . بولورها صغيرة القدة ، وتدلية الشكل ، قُرعية  
القسة .

١٩٢٦٥ - عُنْكُوس \* Inachus (S).

Inachus (F). Inachus (E).

جنس دوبيات بحرية من الفشريات عشاريات الارابل  
قصار القليل وفضيلة المناجيات . انواعه المعروفة قليلة المدد  
اسطها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والمتحرقة نحو الباردة ||  
اشكالها كشكل بعض العناكب . دروعها محرمة ثمانية  
التشواك . كثيفة الملب اللين . ماثها مثلثة قصيرة .  
ارجلها مستطيلة . ملاقطها فليجية . اقواها الى السرة  
المختلفة المجات .



عنكبوت المنازل



عنكبوس



عُثَي

بحري السفلى ، عناقيدها نحاحية صغيرة القد || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

### ١٩٢٨٣ - عُنْبِيَّةٌ مَبْدُولَةٌ

*Parthenocissus vitacea* (S). *Parthénocisse commune, Vigne vierge commune* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها نحاسية الوريقات . تصالها سنانية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . عناقيدها مجهرية الارتفاع ، مقابلة مع الاوراق . ازهارها مغفرة . حبا اسود اللون ، ازرق المواج . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

### ١٩٢٨٤ - عُنْبِيَّةٌ مُتَسَلِّقَةٌ

*Parthenocissus quinquefolia* (S). *Parthénocisse grimpeante, Vigne vierge grimpeante* (F).

جنبة عارضة متسلقة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية حراء اللون . اوراقها باهتة الخضراء ، خلية البثرة على مسطحها . حولها ثنائية السلف ، سداسية او سباعية الخيوط المحجة . عناقيدها طرفية كبيرة القد || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

### ١٩٢٨٥ - عَنِيَس ٥ *Crotophaga* (S). *Ani* (F).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من امريكا الاستوائية الى الوسطى || ملجئها الحياتي جماعي اسرابها متفاوتة العدد . تألف الغابات والفياني وتقترب من الاماكن المأهولة ولا تبعد عن قطمان البقر لانها تنظفها من دي القرد والطلع والتمر وغيرها من الحشرات الجلدية || قوتها جميع انواع الحشرات الدابة والمخنة . تتميز بخلطة المتقاد الذي لا يقل طوله عن طول الرأس . اجنحتها معتدلة الحجم . اذناها مستطيلة . ريشها لبد التيج . ارسافها نشطة . اصابعها قوية بحجة الاظافر || ومن ميزات ان الاناث ترخم البيض في محاضن كبيرة تقيها بالاشتراك مع الذكر في اعالي الاجنار الدامحة . تاري من ٥ الى ١٥ اثني || اعراف انواعه واشهرها النوزان التاليان :

### ١٩٢٨٦ - عَنِيَس السَّيَّاسِب ٥ ، عَنِيَس صَغِير ٥

*Crotophaga minor* (S). *Ani des savanes* (F).

نوع من العنيس قريب الشبه بالمتعلق بالسناء استنادا . موطنه امريكا الاستوائية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وبسطه نحو ٥٠ سم . نوبه الى الزرق العابقة البنفسجية المواج . منقاده وزفده وقامتاه الى السواد القاتم . حدقة عينه شهابه اللون || سربه كبير العدد . قوته الحشرات .

### ١٩٢٨٧ - عَنِيَس الشُّورَى ٥ ، عَنِيَس كَبِير ٥

*Crotophaga major* (S). *Ani des palétuviers* (F).

نوع من العنيس كبير القد موطنه امريكا الوسطى . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . بسطه نحو ٦٠ سم . نوبه الى الزرق العابقة . صدره اخضر المواج . ذنبه بنفسي . منقاده وزفده وقامتاه الى السرة السوداء . حدقة عينه صفراء اللون || قوته الحشرات وبعض الثار اليامنة .

### ١٩٢٨٨ - عَنِيَس ٥ *Eunices* (S).

*Eunice* (F). *Eunices* (E).

جنس دوبيات بحرية من الخليات وفصيلة النسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها دودية الشكل ، سلقية التركيب

*Staphylea colchica* (S). *عَنْهٌ كَلْبِيْد* (F). *Staphyller de Colchide* (F).

جنبة سبروتية تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية او نحاسية الوريقات . نصلها يبيضي الشكل ، مالم الصفحة ، جبل الخضار . ازهارها عنقودية ، منتصبه ، بيضاء اللون . ثمارها جراء مستطيلة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

### ١٩٢٧٧ - عَنْهٌ مُشَطَّةٌ \*

*Staphylea pinnata* (S). *Staphyller penné, Patén-trier, Faux pistachier, Nez coupé* (F). *Common bladder nut, Anthonymut* (E). *Echte Pimpernuss* (D). *Stafliodendro, Nasotagliato, Fusaria, Falso pistachio, Noce di St. Antonio* (I).

شجرة سبروتية مبذولة تملو من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة نحاسية او سباعية الوريقات . نصلها يبيضي الشكل ، ضيق الزام الاخير ، سنن الحافة ، بطول نحو ١٣ سم . ويعرض ٥ . ازهارها عنقودية منتصبه ، بيضاء اللون . ثمارها جراء متساوية الطول والمرض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٩٢٧٨ - عَنْهٌ نَقْلِيَّةٌ ، عَنْهٌ اَمْرِيْكِيَّةٌ

*Staphylea trifolia* (S). *Staphyller d'Amérique* (F). شجرة جادة ، تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها اهليجية النصل المستدير القاعد ، المنشاري الحافة || ازهارها عنقودية التيج ، قصيرة القد ، بيضاء اللون . ثمارها جراء كوية مستطيلة . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

### ١٩٢٧٩ - عَنْهِيَّات

*Staphyleaceae* (S). *Staphylacées* (F). *Staphyleaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة المتالات . اجنسها وانواعها كثيرة العدد قريبة الشبه من السبنتيات . ازهارها نحاسية الاجزاء . ثمارها حقة . يزورها نية الشكل صغيرة . اشهر اجنسها ثلاثة : عَنْهٌ والعنقوت والمعلملان .

### ١٩٢٨٠ - عُنْبِيَّة

*Parthenocissus* (S). *Parthénocisse* (F).

مزة من الجفنة المذراء . انواعها المعروفة ثمانية . جميعها جنات سرية عارضة . اوراقها كفية ثلاثية او نحاسية التيج الاسبي . تتميز بمخولها النحسية الاطراف وبازهارها العادم الحواقي || الواحدة منها عنبة . اشهرها ما يتبع .

### ١٩٢٨١ - عُنْبِيَّةٌ الْيَابَان

*Parthenocissus tricuspidata* (S). *Parthénocisse du Japon, Vigne vierge du Japon* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ٥ الى ١٠ امار . اوراقها كفية عادية التيج ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها يبيد اخضر الصفحة العليا المائلة للالحة ، اغبر السفلى الحلية البارزة المروق ثم ينحرف الى الحرة التي تمتد في الخريف . ازهارها مغفرة . عناقيدها كبيرة القد ، كثيرة الحب || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٩٢٨٢ - عُنْبِيَّةٌ حَمَلَايَا

*Parthenocissus himalayana* (S). *Parthénocisse de l'Himalaya, Vigne vierge de l'Himalaya* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ٣ الى ٦ امار . وريقاتها ثلاثية اهليجية . الوسطى منها تطول نحو ١٢ سم . نصلها مدبب المقصة ، بارز المروق ، جويي الصفحة العليا ،



عَنْهٌ مُشَطَّةٌ



عَنِيَس الشُّورَى



عَنِيَس



Echter Brandschopf, Hahnenkamm (D). Sciamito cressa di gallo, Fior di velluto (I).

عشبة سروتيّة تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها كبيرة القند أهليجيّة الشكل. نصلها متنجع الصفحة، غائر العروق، خلي البشرة، جبل الحفاد المادي. سبلها الزهرية خلية المس، لا قياسية الشكل الذي يختلف باختلاف الاصرام، يكثر فيها المهي وعرف الديك والبعكوري. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٩٢٩٧ - **عُورَة فُصِيَّة** \* Celosia argentea (S). Célosie argentée (F).

عشبة سروتيّة هريّة الشكل تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ساقها رفاه شميّة. أوراقها شبيّة النسل، خلية البشرة. ازهارها يضاء اللون، سبلة التجميع، غروطيّة الشكل. سبلها تطلو نحو ٨ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٩٢٩٨ - **عُورَة** Aoulement (F). Ripening (E). غايّة نمرّ القضيان في الكرم والاشجار.



عُورَة خلية

١٩٢٩٩ - **عُورَة، بَقَار، راعي الشتاء** le Bouvier (F). Bottes, the Herdsman (E).

العُورَة والبَقَار وراعي الشتاء ثلاثة اسماء لكوكبة شمالية تقع بالقرب من القطب. مركزها بين المذراء والقشيرة. عدد نجومها اثنان وعشرون في الصورة وواحد خارجها. وفي صورة رجل يده اليمنى عصا || وتسمى العرب النجم الذي على الرأس «القطربوس». والذي على الكتفين «عصا الضباب». والذي على يده اليسرى وعصا الساعد من هذه اليد وما حول اليد من النجوم «اولاد الضباب». وهناك ايضا «الازار» و«مراق الازار» او «المزور». والخارج في الصورة نجم احمر نير بين فخذه يدي «السكّ الرابع». والسكّ يسمى مفرداً حارس السماء وحارس الشال لانه يرى ابدأ في السماء لا ينيب تحت شعاع الشمس || والعُورَة ايضا منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الثالثة عشرة. وقيب العُورَة يدعى فرع الدلو المؤخر.

١٩٣٠٠ - **عُورَة، لِيَساح، وَعُورَة** Jappement (F). Yelping (E). صوت الكلاب والذئاب وما اشبه.

١٩٣٠١ - **عُورَة** هي الرواكس اسد قسي العليز.

١٩٣٠٢ - **عُورَة قَنَسَلِيَّة** Conduits génitaux (F). Genital ducts (E). هي المسالك التناسلية في الحيوان.

١٩٣٠٣ - **عُورَة، مَعَارِم** Avaries (F). Damage, Avarage (E).

المواريات قد تكون خاصة وعينية وبشركة وفراد بها ملاك بعض البضائع اثناء نقلها بحراً او برّاً.

١٩٣٠٤ - **عُورَة، عُورَة** الموار والمواري: شجرة يفتد جروها قشاش ثم تيس ثم تلدى ثم تحمل في الأوعية الى مكة فذراع ويتخذ منها عائق (السان).

١٩٣٠٥ - **عُورَة** هو سماعة السرود، اطلها.



مُورَة فضية

مستطيلة، ورؤسها صنيّة، خاسية اللوامس العقيّة. اوتابها قسطنطين الاوان البية || اشهر انواعها عنيّة المحيط الهندي الذي يبلغ طولها نحو ١٥٠ سم. وعرضها ٣ سم. ثم عنيّة المتوسط الذي يبلغ طولها نحو ١٠٠ سم. وعرضها ٣ سم. ثم العنيّة المبذولة التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط والتي لا يتجاوز طولها ٦٠ سم. وعرضها ٢٥ سم.

١٩٢٨٩ - **عُورَة** Psyche (S). Psyché (F). Psyche (E).

جنس حيوانات بحريّة من الرغويات ينجمات الاصل وفصيله الاوريبويات. انواعها المعروفة ثلاثة اطلها معظم المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي. اسرارها شديدة الكثافة وافرّة العدد || اصداها غشائية، شفافة، جرابية الشكل، مدببة الاعقاب، متساوية المصاريع، معتلة التبيط. اجسامها صنيّة، تنيبة اللون. زمانها اقنية الانتشاب، مهذبة رقيقة السلوح المستطيلة، مقطوعة الاطراف، مهذبة الحثار.

١٩٢٩٠ - **عُورِيَّات** Euniciidae (S). Euniciidae (F).

فصيلة دوبيات بحريّة من الحلقيات النائية او الجوالّة. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها حلقيّة مركبة يكثر فيها التبيط، تطلو من ٧ سم. الى ١٥٠ سم. || اشهر اجناسها العنيس.

١٩٢٩١ - **عُورِيّ** هو الرجلية، اطلها.

١٩٢٩٢ - **عُورِيّ** Uniola (S). Uniole (F).

جنس نباتات عشبيّة، بريّة، مرعويّة، حوليّة او معمرة من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة ستة، ثلاثة منها اسبويّة منبتها يمتد من ايران الى الهند فالصين. وثلاثة امريكية منبتها يمتد من الارجنتين الى المكسيك || جميعها مرعويّة شكلها قريب الشبه بالمكرش.

١٩٢٩٣ - **عُورَة** Caution, Garantie (F). Security, Guarantee (E).

هو الكفالة او الضمانة التي تقدم تنفيذاً للتمهّد.

١٩٢٩٤ - **عُورَة** Celosia (S). Célosie (F).

جنس نباتات عشبيّة حوليّة تريبيّة من فصيلة الطيفيات. انواعها قليلة، اعطائها البلاد الحساسة. أوراقها معتقة متعاقبة. ازهارها سبلة التجميع، ليدة، مرامسة، لا قياسية الشكل || اعرف انواعها واعها مالملي.

١٩٢٩٥ - **عُورَة جَاوَر، عُورَة هُوَطُن** Celosia hutsoni (S). Célosie, de Java, C. de Hutson (F).

عشبة سروتيّة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقها يضيّة ذلقة. نصلها احمر اللون ينلو ملوّج ازرق. سبلها الزهرية اسطوانية الشكل ليدة. ازهارها حر القاعدة، ييض الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٩٢٩٦ - **عُورَة خَمَلِيَّة** \* Celosia cristata (S).

جمل الحمر Celosie crête de coq, Crête de coq, Passe-velours (F). Cock's comb, Coxcomb, Woolflower (E).

تميش على الرمال وفيها . قوتها الحويئات والحشرات والديدان . تتميز بسرعة الانتقال والانتفاخ في الرمل || أشهر اجتيازها العويز والجلبسيم .

#### ١٩٣٢١ - عَوَلَك السِنْدِيَان \* ، عَوَلَك شَرِيف ٥

*Anthaxia nobilis* (S). *Anthaxie noble*, *Anthaxie des chènes* (F). *Anthaxia nobilis* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبويات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اوروبا . تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الانجار . خنافسها تميش على بتلات الازهار وعلى الاوراق الفتية . يرقاتها تسردب لجاء الافناد شكرها || جسمها صغير القد يطول من ٩ الى ١٥ م . ثوبها الى الخضار الاسفع الجليل . الاثنى اصفر قدأ من الذكر وتتميز باحمرار الكوسل الذي تقطبه في وسطه من الرأس الى الجناحة جعدة خضراء عابقة . رأسها مستدل الجرم يفور بمعظمه تحت الكوسل . عينها كيرتان . زباناها خيطيان . عدها قليتا التحزيز . ارساغها جامدا القشار الصلب الذي لا يخترقه الديدوس . ارساغها خماسية المعقل || جيلها الحولي واحد . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواسط تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها التام تطول نحو ٢٥ م . جسمها سكي التركيب ، مستطيل المقدم ، مستند المؤخر ، تبي اللون ، كسني الرأس والشرح ، ضليع التأثير الفكية . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائدة قرنية منشعة الى شطرين || طور الاكمال الذي ينتهي في آخر نفق تحتفره البرقة ، يستمر نحو ١٥ يوما .

#### ١٩٣٢٢ - عَوَلَك لَمَاع \* ، عَوَلَك نِيدُلَا *Anthaxia nitidula* (S).

*Anthaxie luisante* (F). *Anthaxia nitidula* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبويات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اوروبا . تألف الجناث والحدائق والبراري . خنافسها تميش على اوراق نباتات الفصيلة الوردية . يرقاتها تسردب افناد واغصان انجار الفصيلة ذاتها كالتفاح والاباص والمشمش والفوخ والزعرور والوزر والورد والتسرين || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ م . ثوبها اخضر الظهران ناري الكوسل والرأس ، اسمر البطن والجرايز والزباني . رأسها صغير الجرم يفور بمعظمه تحت الكوسل . عينها كيرتان . زباناها خيطيان || ظهرها ذلق المؤخر اللاحت المستدير الطرف عدها مستابعتا متتابعتا التحزيز الدقيق . ارساغها خماسية المعقل || الاثنى اصفر قدأ من الذكر وابت ثوبا منه واقتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اوائل تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || تترك البرقة الكال الجمسوري في اواخر شهر كانون الاول . فيصبح طولا عند ذاك نحو ١٢ م . جسمها متتابع الحيد ، مستطيل المقدم ، كاعن المؤخر المستدق ، اغبر اللون ، اسمر الرأس والشرح . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائدة قرنية جزلة فاقرة الطرف || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوما وينتهي فسن صلبة خاوية الفشاء .

#### ١٩٣٢٣ - عُوْد أَحْمَر *Armérie* (F).

هو البيقان ، اعليه .

#### ١٩٣٠٦ - عَوَارِض جَوِّيَّة

*Perturbations atmosphériques* (S). *Atmospherical perturbations* (E).

اضطراب سير الحوادث الطبيعية الجوية بسبب بعض العوامل الطارة الخلة .

#### ١٩٣٠٧ - عَوَاشِب

هي العاشبات ، الحويئات التي تميش على المشب .

#### ١٩٣٠٨ - عَوَاشِر

المواشر : قوام ريش الطائر وكذلك الأعشار .

#### ١٩٣٠٩ - عَوَامَة *Flotteur* (F). *Water-gauge* (E).

اسطوانة صغيرة من خشب السنديان تقوم على المياه الجارية لقياس سرعتها فصيها .

#### ١٩٣١٠ - عَوَامِل التَغْذِيَّة

*Facteurs trophiques* (F). *Trophic factors* (E).

#### ١٩٣١١ - عَوَامِل تَنْوُخِيَّة

*Facteurs œcologiques* (F). *Ecological factors* (E).

#### ١٩٣١٢ - عَوَامِل جَوِّيَّة ، عَوَامِل مَنَاحِيَّة

*Facteurs climatiques* (F). *Climatic factors* (E).

#### ١٩٣١٣ - عَوَامِل مَاحِدَة

*Facteurs inhibiteurs* (F). *Inhibitory factors* (E).

#### ١٩٣١٤ - عَوَامِل مُحدِّدَة

*Facteurs limitateurs* (F). *Limiting factors* (E).

#### ١٩٣١٥ - عَوَانَة \* ، سَمْتَشُوس ٥

*Sminthus* (S). *Sminthe* (F).

جنس حيوانات لبونة قافسة من فصيلة اليربويات . اولوعه عديدة . موطنها البلاد الاسوية والاروبية جميعها صغيرة القد تطول من ٦ الى ٨ سم . واذنابها كذلك . اقواها الى الكحة تسمر وتبقى مع اقترابها على ثيج الطير وتضفر وتبيض عند البطن . اذنانها حرشفية اطواقها تعد من ١٤٠ الى ١٧٠ . قوتها الاعشاب والجنور .

#### ١٩٣١٦ - عَوَالِد ٥

*Sous-produits* (F).

*By-products* (E).

هي المواد الثانوية الممكن استعملها او استخلاصها بعد تصنيع المواد الرئيسية . مفروها عائدة .

#### ١٩٣١٧ - عَوَالِد

الموائد اربعة كواكب في وسطها كوكب يدعى الزبح . والموائد تنتمي الى كوكبة التنين .

#### ١٩٣١٨ - عَوْبَة

هي الافرنجية ، شجرة من السروبيات ، اعطابها .

#### ١٩٣١٩ - عَوْبَر

جرو النهل لا يزال برقة امه .

#### ١٩٣٢٠ - عَوْبَرِيَّات

*Ocypodidae* (S).

*Ocypodidés* (F). *Ocypodidae* (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الاربيل ، قصيرات الذيل ، لامتساويات للملاط || اجتيازها وانواعها المرفوعة متوسطة العدد . اعطابها شطوط بحار البلاد الحارة .



عَوَانَة



عَوَلَك السِنْدِيَان



عَوَلَك لَمَاع

Wurz (D). Acoro, A. vero, Canna odorifera, Calam aromatico (I).  
نبات عشبي جذموري معمر من فصيلة القلقاسيات.  
جذاميره ممددة. ذكية الرائحة تستعمل في الطب وتدخل  
في تحضير بعض الطيوب. أوراقها صفية الشكل جامدة  
التصل متصبة. غراسه ينبت بيضا في الإزهار الخشوية.  
وهو من نباتات المطور المقدسة التي ورد ذكرها في التوراة.  
يستخدم في معالجة الرمد والثرلث الصدرية. ويقال إن  
جلوده مقوية للأعصاب.



عود الأنبياء

١٩٣٥ - عَوْسَجُ ، مُبَالِل  
Métamère (F).  
Metamere, Somite (E).

نعت تعريفي يطلق على بعض أعضاء الجسم المتساوية  
المتتابعة كما هي الحال في سحيد المفصليات.

١٩٣٦ - عَوْسَجُ ، مُبَالِلَة  
Métamérie (F).  
Metamery (E).

هفة الأعضاء أو الأجزاء الممثلة.

١٩٣٧ - عَوْزَوْرَ هو القثاء البري ، اطبله .

١٩٣٨ - عَوْزَ Carence (F). Deficiency (E).  
شائبة أو عارض بيض نقص في تمثيل عنصر غذائي تقتصر  
إليه التربة أو يفقر إليه ثلث الحيوان .

١٩٣٩ - عَوْسَجُ ، عُلُقُيقُ ، بَامُشُ ، شَوْكَل  
Rubus (S). Ronce (F). Bramble (E).

جنس نباتات دظلية برية وزراعية من سبط الفروليات  
وفصيلة الورديات. أنواعه زهاء ٣٠٠ منتشرة في جميع  
أصقاع العالم . معظما بري وبعضها زراعي . ثمارها  
شجائيل مأكولة تسمى «المنقع» وقد تربب أو يستخرج  
منها بصل التخمر والتقطير فتأدي كحولية لذينة الطعم .  
أشهر أنواعه ما يتبع .



عود الحية

١٩٤٠ - عَوْسَجُ أَخْمَرُ الْهَتَبِ

Rubus phenicolicolus (S). Ronce à poils rouges (F).  
نبات دخلي معمر أزغب اللحاء ، أحسن الشوك . ساقه  
فراعه تملو نحو ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه ثلاثية التفصيص ،  
بيضية الشكل ، خلية البشرة || أزهاره عقدوي التجميع ،  
لبد الإزهار الوردية اللون . ثماره لذينة الطعم والترف  
بتقالية اللون .

١٩٤١ - عَوْسَجُ أَسْوَدُ  
Bourgène (F).  
هو التبق الأسود ، اطبله .

١٩٤٢ - عَوْسَجُ أَصْفَرُ  
Rubus xanthocarpus (S). Ronce jaune (F).  
نبات دخلي سبروتي معمر أحسن الشوك . ساقه فراعه  
مدادة . أوراقه مركبة ثلاثية الوريقات المسنة الحافة .  
أزهاره نوردية التجميع ، بيضاء اللون . ثماره سكرية الطعم  
عامة العرف ، صفراء اللون .



عود الراج

١٩٤٣ - عَوْسَجُ الشَّالِ  
Rubus occidentalis (S). Ronce d'Occident (F).

نبات دخلي معمر أحسن الشوك . ساقه فراعه مستطيلة  
السروغ تملو نحو ٣٠٠ سم . أوراقه مركبة ثلاثية أو  
خماسية الوريقات . نصلها مسن الحافة ، أخضر الصفحة  
العليا ، اطبل السفلى الخملية البشرة || أزهاره نوري  
التجميع . أزهاره مستطيلة الأذن ، بيضاء اللون . ثماره  
إلى السوداء اللاصق .

١٩٣٤ - عَوْدُ الْأَنْبِيَاءُ \* ، عَيْكَلُ مَحْزَنِي

Gualac officinale (S). Gaïac officinal, Bois de gaïac  
(F). Official gualacum gum tree, Lignum-vitæ (E).  
Guajakbaum, Pockholzbaum (D). Gualco officinale,  
Gelsomino, Legno santo (I).

نوع من العيالك وهو شجرة متوسطة القد من فصيلة القديسيات.  
أصلها البلاد الأمريكية . أوراقها مركبة متقابلة  
وريقاتها أبيض ، شفعية ، بيضية التصل الجامدة الصفعة ،  
الباقين الخضار . أزهارها أبيلية الإرتكاز ، فردية التجميع ،  
زقاء اللون . ثمارها جلدية اللب . بزورها صفراء اللون ،  
دهنية اللباب || خشبها ناعم الرقة ، شديد الصلابة  
تقليل الوزن ، فاقس الصنف وقد يستخرج منه بالتقطير  
مادة راتنجية ، راتنجها رائحة اللوز المر ، تدخل في عدة  
مستحضرات طبية أعصها علاجات السفلس .

١٩٣٥ - عَوْدُ الْبَرَقِ هو القندول ، اطبله .

١٩٣٦ - عَوْدُ الْحَيَّةِ \*

Ophioxylon serpentum (S). Ophioxyle, Ophioxylon,  
Serpentine (F). Serpentine, Serpent wood (E).  
Marderwurzel, Schlangenholz (D). Serpentina,  
Legno serpentino (I).

جنينة برية من فصيلة الفطليات منبها الهند . ساقها فراعه .  
أوراقها أبيض ، متقابلة ، اهليلجية التصل ، ممعقة .  
أزهارها نوردية التجميع ، تاجية الإرتكاز || يستخرج  
من حيدانها وجلفورها عصارة مضادة لس الحيات  
ويجالح التئال .

١٩٣٧ - عَوْدُ الْخَيْثَرِ

هو الزايرن اللبناني وهو بنشية البديق . اطبلها .

١٩٣٨ - عَوْدُ الرِّبْعِ هو البرباريس ، اطبله .

١٩٣٩ - عَوْدُ الصَّلْبِ هو القلاواتيا ، اطبله .

١٩٣٠ - عَوْدُ الطِّيبِ هو الأندروج ، اطبله .

١٩٣١ - عَوْدُ الْقَرَحِ Anacycle pyrethre (F).  
هو الماتر قرحا ، اطبله .

١٩٣٢ - عَوْدُ الْمَاءِ هو صفصان الماء ، اطبله .

١٩٣٣ - عَوْدُ النَّدِّ ، عَوْدُ هِنْدِي ، أَغْلَاجُونُ

Excoecaria agallocha (S). Agalloche, Arbre aveuglant,  
Bois d'Aloès, Bois de Calambac (F). Agallochum,  
Indian aloe tree, Calambac tree (E). Agallochaubum,  
Alderholzbaum (D). Agallocha, Calambucco, Falambo (I).

شجرة برية صغيرة القد من السوسيات تكثر في الهند  
الشرقية وسرنديب . تنبت عند مصب الأنهر وفي الاغوار  
التي تنمها المياه الحارة والبحرية . عصارتها حارة كاثوية  
تقلع منها تدش اللبن وتقلطها . خشبها راتنجي المادة  
مرغوب فيه . يستخرج منه أدهان عطرية تدخل في صناعة  
الطيوب واخرى طبية تدخل في عدة مستحضرات وعلاجات.  
اشتعال خشبها ويعداها عطري البية ، فواح الرائحة الذكية  
الاعصادة .

١٩٣٤ - عَوْدُ الْوَجِّ \* ، عَرَقُ أَكُورُ ، وَجَّ ،

قَعْبُ الذَّرِيَّةِ ، إِيكِرُ

Acorus calamus, A. aromaticus (S). Acore, A. vrai,  
Calamus, Roseau odorant (F). Sweet-flag, Sweet-sedge,  
Myrtle sedge (E). Echter-Kalamus, Acorus-

أزهاره بيضاء اللون ، ثنائية التجميع أو فردية ، محورية الارتكاز ، مستطيلة الاذن . ثماره الى السوداء البنفسجية . يزروع من اجل ثمره المستحب الطعم الشائع الاستعمال .

Rubicole (F).

١٩٣٥٣ - عَوَسَجِي

نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على العوسج .

Crécerelle commune (F).

١٩٣٥٤ - عَوَسَقْ

هو الماسوق ، اطلبه .

Perotis chlorana (S). \* عَوْقِدْ أَصْفَرْ ١٩٣٥٥

Perotis jaune (F). Perotis chlorana (E).

حشرة خاضعة خاشبة من فصيلة الزنبقيات . اعطائها نظم اصقاع الشرق الاوسط واروبية الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية . تألفت البراري والارحار والمواقع التي يكثر فيها الورد والزعفران . خنافسها تعيش على ما تقتضيه من نصال الاوراق . يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون ان تتصل على الشجر وفي ترطب في الورد والزعفران والحوخ || جسمها متوسط القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الصفراء الخططي المجاج . رأسها صغير الحجم ، ينور بمظهره تحت الكويل . زباناها غيطيان ، منشاريا الشكل . كويلها محدودب الصفحة . الانثى اكبر قدماً من الذكر واقصر زبانا واكد ثوباً || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى اوائل تموز . تسافد بعد ظهورها بسابوح . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تتطور ببطء ويبلغ طولها عند الادراك الثام نحو ٢٤ سم . وفي مرحلة ، جسمها سحبي التركيب ، مستطيل القمد ، كامن الخصر ، حنطي اللون ، اسمر الرأس والشرح . وين ميزانها انها تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشر زائدة قرنية خفيفة بالملءاء تنتهي بثلاث اصابع || تدنسل اليرقة في طور الكمال عند منتصف نيسان وتظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار .

Venturia (S). ١٩٣٥٦ - عَوْطَب ٥ ، تَبْعْ

جنس فطور مجهرية من السخايات وفصيلة المشويات . اعصابها مستديرة منخفضة المسام الحامطة بالار من الحلب الاسمر اللون . تكاثفها منصوبة بتكاثر غيطية . يعضها اصفر اللون شغبي التركيب تفصله ويرة متمزعة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

١٩٣٥٧ - عَوْطَبُ الإِجَاصِ ٥ ، تَبْعْ الإِجَاصِ

Venturia pirina, Fuscladium pirinum, F. virescens, Megadactylidium pirinum, Cladosporium pyrom, C. dentriticum (S). Tavelure du poirier (F). Pear scab (E). Birnenschorf (D).

فطر مجهرية شديد الاذى يصيب الاجاص في اوراقه وفناده وثماره || مظهره الخارجي يختلف باختلاف المضيف وتركيب النصل على صفحته السفلى والعليا || وهو في الانثان والافناد والانصان يقع قرسية لا قياسية الشكل تعطب البشرة والقشرة والشجر || اما في الثار فهو يقع غنظلة الاشكال لونها الى البصرة تركب البشرة تنحرف الى سفن لب صلب يتسع بسرعة ويمتلئ البصرة فيهب تشقيها || اثماره جسيمة لانه يعطب هيكل الشجرة بعد ان يسبب يباس الانثان والافناد وبه ان يقضي على

Framboisier (F).

١٩٣٤٤ - عَوَسَجْ إِئْدَه

هو القرامبوز ، اطلبه .

١٩٣٥٥ - عَوَسَجْ ثَمَاحِي الْوَرَقْ

Rubus malifolius (S). Ronce à feuilles de pommier (F). نبات دغلي معمر شائك . ساقه فرعاء فناء مستطيلة السروع ، تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه بسيطة تقاسية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ || ازهاره عقودي التجميع ، صغير القد ، عاصي الازهار البيض القصيرة الاذن . ثماره الى الحمرة البنفسجية .

Framboisier (F).

١٩٣٤٦ - عَوَسَجْ جَوِي

هو القرامبوز ، اطلبه .

Rubus spectabilis (S).

Ronce élégante (F).

نبات دغلي معمر شائك . ساقه متراكبة السروع والافناد تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته سنائية مدببة ، نصلها خلي البشرة ، يسارز السروع || ازهاره ثنائية التجميع أو فردية ، كبيرة القد ، جميلة الحمرة الزاهية . ثماره صفر أو حر .

١٩٣٤٨ - عَوَسَجْ زَعُورِي الْوَرَقْ

Rubus crataegifolius (S). Ronce à feuilles d'aubépine (F).

نبات دغلي معمر شائك . ساقه فرعاء فناء تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه زردية الشكل ، ثلاثية أو خاشبة التفصيص الانشعاري || ازهاره عقودي التجميع كثير الازهار الوردية المشدة . ثماره برتقالية اللون مستحبة الطعم .

١٩٣٤٩ - عَوَسَجْ شَالَعْ \*

Rubus fruticosus (S). Ronce commune, R. sauvage, R. frutescent (F). Common bramble, Black-berry (E). Brombeerstrauch (D). Rovo, Rogo, Roveto (I). نبات دغلي شائك معمر ميلول يكثر في الاماكن الرطبة . ساقه فرعاء متدلية . اوراقه مركبة . عاصيها القنية الثانية طيبة قابضة . ثماره شولية مأكولة مستحبة الطعم .

Rubus odoratus (S). ١٩٣٥٠ - عَوَسَجْ عَطِير

Ronce odorante (F).

نبات دغلي عادم الشوك معمر . ساقه فرعاء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشبة التفصيص ، نصلها يعرض من ١٠ الى ٣٠ سم . وهو خلي البشرة على صفحته || ازهاره عقودي التجميع . عناقيله مستطيلة ، مشعبة ، كثيرة الزهر . ازهاره كبيرة القد عطرية العرف ، حراء اللون . ثماره حازنة الطعم شديدة الحمرة .

١٩٣٥١ - عَوَسَجْ لَدِيدِ الشَمَلْ

Rubus deliciosus (S). Ronce à mûres délicieuses (F). نبات دغلي عادم الشوك ، سرح ، معمر . ساقه فرعاء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشبة التفصيص . نصلها يعرض من ٦ الى ٧ سم . وهو خلي البشرة على صفحته . ازهاره كبيرة القد ، بيضاء اللون ، فردية التجميع ، مستطيلة الاذن احمر . ثماره شولية بنفسجية اللون لذيدة الطعم والورف .

Rubus procumbens (S). ١٩٣٥٢ - عَوَسَجْ مَدَادْ

Ronce rampante (F).

نبات دغلي سروتي معمر . ساقه فرعاء مديدة . اوراقه ثلاثية أو خاشبة التفريق ، خضراء البشرة العادمة الحمل .



عوسج شائع



عوصد اسفر



عوطب الاجاص

التَّار || يكالغ باستعمال احد الادوية الفاطورية واعضابها سائل يورود على الوجه التالي : - (١) قبل الايلال بمعدل يراوح بين ١ و ٢ ٪ - (٢) بعد سقوط التوجعاس الزهرية بالسرور بمعدل ٠.٨ ٪ - (٣) بعد المكافئة السابقة بثلاثة اسابيع يضاف اليه ١ ٪ من الزرديخات.

### ١٩٣٥٨ - عَوَظَبُ النَّفَّاح \*، تَبَعُ النَّفَّاح

Venturia inaequalis, Venturia chlorospora mali, Fusicladium dendriticum, Napicladium soraneri (S). Tavelure du pommier (F). Apple scab (E). Apfelschorf (D).

فطر مجهرى واسع الانتشار شديد الاذى يصيب التفاح في جميع اقسامه الهوائية || مظهره الحاربي يختلف بالنسبة الى العضو المتضرر، فهو على الورقة يقع سحر لا قياسية تركب شغل النصل يورقوه في الصفة العليا || وهو في الاضغان والالاند يقع قرصية لا قياسية الشكل تمطب القشرة والشكر اما في التار فهو يقع بقع مستديرة يملوها سفن لبد مرامس مشقق صلب المادة اضر اللون || اضراره جسيمة لانه يطمب هيكل الشجرة بعد ان يقضي على ثمارها. يكالغ باستعمال احدى الادوية الفاطورية القليلة المنصر النحاسي.

### ١٩٣٥٩ - عَوَظَبُ الْحَزْوَ \*، تَبَعُ الْحَزْوَ

Venturia populina, V. tremulae, Didymosphaeria populina, Pollacia elegans, Napicladium tremulae, Fusicladium radiosum, Stigmima radiosa (S). Tavelure du peuplier (F). Poplar scab (E).

فطر مجهرى يصيب الحور فيؤذيه. مظهره الحاربي يقع مقرنة الزوايا تركب الاوراق والنوامي فيؤذي نسج النصل وتقود الاوراق الى الاصيل الباكر ثم تمطب النوامي فتصحبها وقد تسبب يباسها || يكالغ بقطع النوامي المورودة وسرقها مع الاوراق الساقطة.

### ١٩٣٦٠ - عَوَظَبُ الدَّوَسَر \*، تَبَعُ الدَّوَسَر

Venturia graminicola (S). Tavelure du fromental (F). False oat scab (E).

فطر مجهرى يركب الدوسر فيؤذيه. مظهره الحاربي يقع حنطية تركب الشراف وقد تتدها الى السنايل وذق ان ظروف خاصة وموامل جوية معينة || اضراره زهيدة ان انحصرت الاصابة بالشراف وجسيمة اذا زلت بالسنايل. مكافئته جديده لكنها مكلفة. لذلك يجدر الاقلاع من زرع الدوسر في تربة يكثر فيها العوذب.

### ١٩٣٦١ - عَوَظَبُ الزُّعُرُور \*، تَبَعُ الزُّعُرُور

Venturia crataegi, V. chlorospora, Megacladosporium crataegi, Fusicladium crataegi (S). Tavelure de l'aubépine (F). Hawthorn scab (E).

فطر مجهرى يطمب التار ويؤذي الاوراق || مظهره الحاربي يقع لا قياسية الشكل والحجم تصيب التار فتطمبها وتركب نصل الاوراق على صفحتها السفلى فتؤذيها. اضراره محصورة على انتشاره على التار || يكالغ باستعمال احدى الادوية الفاطورية.

### ١٩٣٦٢ - عَوَظَبُ الصَّرْبَةِ \*، عَوَظَبُ الْغُيْبَرَاة

Tubercaria viciae, V. aucupariae, Fusicladium orbiculatum (S). Tavelure du Sorbier (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار قليل الاذى يقدم زين

الاصبال ولكنه لا يؤثر في ادراك الثمر || مظهره الحاربي يقع تظهر في الربيع على صفحة النصل العليا عند انتساب المروق ثم تمتد وتتسع الى ان يستقر لونها على السرة ويليه توجعاس النسيج || اضراره محدودة العواقب بسيطة لا تستوجب العناية.

### ١٩٣٦٣ - عَوَظَبُ الصَّفَصَا \*، تَبَعُ الصَّفَصَا

Venturia chlorospora, Fusicladium saliciperum, Septoglossa saliciperum (S). Tavelure du saule (F). Willow scab (E).

فطر مجهرى يركب جميع انواع الصففاس فيؤذي الاوراق ويطمب الاثنان || مظهره الحاربي يكون على شكلين : اما يقع صغيرة لونها الى السرة تركب نصل الاوراق الفتية على صفحتها السفلى في اوائل الربيع ثم تمتد الى الاثنان فتطمبها وتسبب يباس نولها. ولما يقع سحر تركب زام النصل الاخير على صفحته وجانبى الصلع ثم تنتشر حتى المصمة || يكالغ بقطع الاثنان المورودة وسرقها مع الاوراق.

### ١٩٣٦٤ - عَوَظَبُ الْكَرَز \*، تَبَعُ الْكَرَز

Venturia cerasi, Asteroma cerasi, Fusicladium cerasi, Megacladosporium cerasi, Cladosporium cerasi, Acrosporium cerasi (S). Tavelure du cerisier (F). Cherry scab (E).

فطر مجهرى يصيب التار فيطمبها ويصيب الاثنان والاوراق فيؤذيها || مظهره الحاربي يكون : في التار فروع مبكرة قطرها من ١ الى ٢ سم. تتحول الى يقع سحر مهدية الاطراف تتسع مع كبر حجم الثمرة || وفي الاثنان فروع صغيرة مرصوفة بدون انتظام تتحول بسرعة الى يقع طبل مرامسة قرصية || اما في الاوراق فانه يقع مهدية تركب نصل الصفة السفلى || اضراره محصورة على انتشاره على التار || يكالغ كثيره من العوالم.

### ١٩٣٦٥ - عَوَظَبُ الْمُرَّان \*، تَبَعُ الْمُرَّان

Venturia fraxini, Fusicladium fraxini (S). Tavelure du frêne (F). Ash scab (E).

فطر مجهرى قليل الاذى يركب الاوراق فيصيب سقوطها. مظهره الحاربي يقع صغيرة تبدو على الاوراق مقرنة الزوايا طلاء اللون ثم تتسع وتشتد ويستقر لونها على السرة فتصيب جفاف النسيج ويباه || اضراره محدودة لا تستلزم المكافئة.

### ١٩٣٦٦ - عَوَظَبُ عَقِيقَةٍ، عَوَظَبُ عَقِيقَةٍ

Osmanthus (S). Osmantha (F). Devil wood (E). Amerikanischer Ölbaum (D). Osmante (I).

جنس عجيرات وجنيات برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات. انواعه المروفة ٨ منها الشرق. اوراقها ابيدة، معققة، متقابلة، زيتونية الشكل او رفيعة. نصلها جلدي الصفحة جبل الخضار. ازهارها غمي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها رباعية التركيب، ثنائية الالوية، صغيرة القد، يضاء اللون، ذكية اللفف المستحب. تستعمل في تجميل الشاي || اشهر انواعه الزراعية الصناعية ما يلي.

### ١٩٣٦٧ - عَوَظَبُ أَسْوَد \*، عَوَظَبُ أَسْوَد

Osmanthus Delavayi (S). Osmante du Père Delavay (F).

جنية سريرية دفلة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعه واثنائها مراكبة. اوراقها يضيئة الشكل تطول نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفحة، منشاري الحافة. زهرها مستطيلة الانبوب قصيرة الفلقة. ثمرتها زرقاء اللون، سمر المراج. ازهاره يستمر طوال شهر نيسان.



عوطب النفاح



عوطب الحور



عوطب الزعرور



عوطب الكرز



عوطب الكرز على الثمرة

## ١٩٣٧٦ - عَوَلْتُ - Fuirena (S), Fuirène (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السديديات . أنواعه المعروفة نحو ٤٢ مظهرها في نباتات البلاد الحارة والاستوائية || يوجد منها في لبنان العولب الازرق (Fuirena pubescente) منته بهض بعض أمقصة الوصول حيث لا تتقطع الرطوبة . قصبه ساقه مستطيلة ، بسيطة ، عادية القعد ، زياة البشرة .

## ١٩٣٧٧ - عَوَلْتُ الأَدْعَال -

Boarmia cinctaria (S).

Boarmie bandede (F). Boarmia cinctaria (E).

حشرة من فصيلة الايفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . شرقها تعيش على اوراق النباتات النضلة || جسمها متوسط القد ينحو طول ١٢ م . بسيطها نحو ٢٨ م . رأسها اشهب اللون . عينها كيرتان . زباناها شطيان مزدوجان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى الشبهة || روشناها الاماميان الى الشبهة السراء المراج يتوسطها بقعة بيضاء وتعلوها سرجته وزوزقة كستنية . روشناها الخلفيان الى الشبهة الخطية تعلوها زركشة كستنية وتضيق اسر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن مبيحادي على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة طول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ماس القشار . قوتها الى اغضار البحري تملوه خمسة خطوط قاطبة كستنية || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

## ١٩٣٧٨ - عَوَلْتُ العَوَسَج -

Boarmia repandata (S).

Boarmie repandée (F). Boarmia repandata (E).

حشرة من الايفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من سوس البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . شرقها تعيش على اوراق العوسج والتسرين || جسمها متوسط القد ، اهيف ، يطول نحو ١٩ م . بسيطها نحو ٤٨ م . رأسها احمر اللون . عينها كيرتان . زباناها شطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى العطلة السراء المراج || روشناها ، عند الشقين ، الى العطلة الخطية يطولها في الزوج الامامي تضيق اسر ويتعلوها سرجته كستنية . ويعلوها في الزوج الخلفي تضيق اريد وزوزقة حدادية سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن مبيحادي على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة طول نحو ٣٨ م . جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار قوتها بمان البيتة التي تعيش فيها لذلك فهو يراوح بين الاغضار الجبس والاسر الجروي المراج تملوه ثلاثة خطوط قاطبة : جسمها شديدة السمر . رأسها جوي اللون . رواجها البطينية الوسطى ماصعة ما يعود بها الى التقوين والشب عند الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

## ١٩٣٧٨ - عَوَلْتُ بَهْشِي -

Osmanthus aquifolium (S). Osmanthe à feuilles de houx (F).

شجيرة سبروتية دغلة تعلو من ٣ الى ٦ امتار . فروعها وانفانها مزاكية . اوراقها بيضيه الشكل تطول نحو ٥ سم . نصلها جامد الصفحة يحمل في كل شطر من شطريه ثلاثة اسنان او اربعة جميعها غليظة القاعدة مدبة الطرف . ازهارها خافتة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



عوف بهشي

## ١٩٣٦٩ - عَوَلْتُ عَطِير -

Osmanthus fragrans (S).

Osmanthe odorant (F).

جنية باحداة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروعها وانفانها منسجبة الارتكاز ، معتدلة الكثافة . اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ ، نصلها جامد الصفحة ، لامع البشرة ، مسن الحافة . زهرها قصيرة الانبوب ، كيرة الفلقة ، فواصة العرف المستحب الاخذ || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .



عوسج

## ١٩٣٧٠ - عَوَلْتُ مُسَلِّح -

Osmanthus armatus (S).

Osmanthe armé (F).

شجيرة سبروتية دغلة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها سنانية ذرية تطول نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصفحة ، مسن الحافة ، شائك الاسنان والمقصية . ازهارها عطرة مستطيلة المالميق ، متدلية || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .



عوككة

## ١٩٣٧١ - عَوَلْتُ -

Theropitèque gélada (F).

فرد من فصيلة الهيرسيات مشهور باسم جلادة . اطلبه .

## ١٩٣٧٢ - عَوَلْتُس -

Welwitschie

جنس نباتات معمرة عارشة من فصيلة العلديات . أنواعه المعروفة ثلاثة اصلها البلاد الاستوائية . شرقها وفروعها عقداء . اوراقها متعاقبة ، قدية ، مستطيلة ، جامدة النصل الماس البشرة . ازهارها رسيمة المسكن . ثمارها عتية . بزورها مأكولة . عصارة سوقها لبنية مرطبة . لحاء فروعها صناعية لتسيجية .



عولط الاداغل

## ١٩٣٧٣ - عَوَلْتُس ، مَبْنَح -

Microclimat (F).

Microclimate (E).

هو المناخ الموسمي وقد يختلف من المناخ الاقليمي . ويصير الموكل من العوامل الرئيسية في التوجيه الزراعي النباتي وفي مكافحة الحشرات .



عولط العوسج

## ١٩٣٧٤ - عَوَلْتُسَة -

Ctena (S).

Ctène (F). Ctena (E).

جنس عتاك صغيرة من فصيلة الذكيمات . أنواعه المعروفة نحو ١٥ . اصلها البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تعيش في اللبية والهايزلر اجسامها صغيرة القد . بطونها قلبية الشكل . رؤوسها تركب سدورها وتقدمها قليلاً . جوارمها مستطيلة ، نحيلة الاطراف . اثوابها الى الصفرة الجليضة بالاحمر والاسمر . رؤوسها قوامية الاطواق السود .

## ١٩٣٧٥ - عَوَلْتُ ، صِيَانَة ، تَعَهْد -

Entretien (F).

Keeping, Preservation (E).

القيام بالمحافظة على سلامة الشيء .

ظهورها اصفر تملوه رقعة كستنية وتمشج بني. وروشاها غشائيان. الصفحة العليا من بطنها صفراء توسطها بقعة سوداء. الصفحة السفلى سمراء || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٦ - عورق Serpent court (F). Short snake (E). الحية القصيرة الغليظة

١٩٣٨٧ - عورقة Synergie (F). Synergy (E). تعاون عدة اعضاء للقيام بوظيفة.



عقلة غصير

١٩٣٨٨ - عورقيات Notonectidae (S). Notonectidés (F). Notonectidae, Back swimmers (E). Rückenschwimmer (D).

فصيلة حشرات مائية من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، قلب فيها الاستطالة. رؤوسها مستعرضة. اخطاؤها قصيرة. عيونها كبيرة جاحطة. قرونها الاستشعارية صغيرة ، رباعية الفصل. كواسلها شبه متساوية الطول والعرض. حجابها مزوانية ، لاقبائية اللحم. ظهورها كامل الخنجرية الغضروفية. رواشها، عند وجودها، شفافة ، كبيرة. بطونها مجهزة باكتافز تقميد الاكتراز ، مهدية. قوائمها المياه الراكدة. جميعها تعوم على ظهورها. قوتها كل ما تستطيع قصه من حشرات وسويديات وقوام.

١٩٣٨٩ - عورق القبطية الثامنة الخلق التي في حقوبها غطتان سوداوان.



عورق

١٩٣٩٠ - عورق Scopus umbretta (S). Ombrette (F). Umbrette, Hammer-head (E).

طائر من فصيلة القلقيات وحيد الجنس والزوج. اعطاه البلاد الافريقية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه كبير الجرم. منوج القفص بكشفة صغيرة. منقاد غرزي الشكل ، غليظ المقطع ، منتفج الملقط العلوي || يتميز بقصر عنقه الذي يبعده من سائر اجناس فصيلته || ثوبه الى السمرة المابقة الجوزية المزاج. بطنه اقل سمرة من ظهره. مناكب جناحيه والحوالي والاياهر والكلر شديدة السمرة الجوزية السفاه. ذنبه قصير القد، مستعرض الشكل. حذقة عينه خزنوية اللون. منقاد اسود. رجلاه الى السمرة المابقة || يألف النياغس ويجاري الماء والمنابع. قوته الامساك والحيات والزورغ والظلاء والبنفادع والزنونيات والديدان || مسرعه من الفجر الى الشروق ومن العصر الى المسق || يدئن عشه في السند. اثناء تضع اربع بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ثلاثة اسابيع ، تنقف الجلايط عادمة الزغب وتبقى في العش بهدأة ابورها الى ان تكسيها انحر نحو خمسة اسابيع.



عورق

١٩٣٩١ - عورقكاف الموقعان كوكبان الى جنب الفردين على نسق طريخاها بما يلي القطب.

١٩٣٩٢ - عورق Tinnunculus cenchris (S). Crécerelle crécerine, Crécerellette, Créserine (F). Lesser kestrel (E). طائر من الصقريات وهو نوع من الماسوق صغير القد

١٩٣٧٩ - عورق Diphylia (S). Diphylle (F). جنس غفاقيش من فصيلة الرقيات. وحيد النوع. موطنه البرازيل. جسمه صغير القد، ابيض. طولهُ نحو ٧٠ م. بسطه ٣٠٠ م. فرطسته اسفينية قصيرة. ثنائيا ثنائية مدبية حادة. ثوبه الى الصبغة الصنائية يملوه مزاج اصفر. يعيش بجاهات قليلة العدد. قوته الدم يمتصه ابنا استطاع. يالذ الانجار الحرجية اللغفة والمناور والكهوف.

١٩٣٨٠ - عورقة غصير

Oourouparia Gambir (S). Oourouparia Gambir (F). شجيرة حرجية من فصيلة الفويات. منتها يتد من الهند الى ماليزيا || ساقها منتصبه فراع تملو نحو اربعة امتار. اوراقها متعابلة. منققة. نصلها اعليلية الشكل ، مدببة الاطراف ، ناشرة الضلوع والورق. ازهارها رؤسي التجميع ، ابلي الاكتراز. ازهارها صغيرة مستطيلة الكوروس ، خالية البيلات الصفرة ، خافتة العرف المانوس || يستخرج من سوقها بالخز عصارة رائحية قابضة تستعمل استمال الكاشر.

١٩٣٨١ - عورقيات Vampyrellae (S). Vampyrellés (F). Vampyrellae (E).

فصيلة تطور مجهرية من رتبة السرثيات ورتبة البيضيات.

١٩٣٨٢ - عورقة Cogia breviceps (S). Cogia à tête courte, Cachalot nain (F).

نوع من العنبر وهو من الحيات الصغيرة القد ، طولهُ نحو ثلاثة امتار. ثوبه الى الزرقة السمراء. موطنه المحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر الاحمر. سر به كثير المدد يراوح بين ٥٠ و ١٥٠.

١٩٣٨٣ - عورقة بحيرية اللون

Notonecta glauca (S). Notonecte glauque (F). حشرة مائية مفترسة من فصيلة العميات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٥ م. رأسها مستعرض ، بحري اللون. غطماها نفيط. عينها كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران ، غيلاان. ظهورها بحري اللون يملوه تمشج اسمر. وروشا غشائيان ، شفافان. بطنها اسود الصفحة العليا ، بحري السفلى. حنار بطنها متكاثف الملب || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٤ - عورقة خضراء Notonecta viridis (S). Notonecte vert (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة العميات. جسمها معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٤ م. ثوبها اخضر اللون. رأسها مستعرض. غطماها قصير. عينها كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران. حجبها مزوانية سوداء. وروشا كيرتان غشائيان. حنار بطنها مرقوش بالاسود || تعيش في المياه الراكدة.

١٩٣٨٥ - عورقة دكسة

Notonecta maculata (S). Notonecte maculé (F). حشرة مائية مفترسة من فصيلة العميات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٦ م. رأسها عريض. اصفر اللون. غطماها قصير. عينها كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران ، غيلاان. كواسلها اصفر اللون تملو نمشة سمره لامتساوية الكثافة. حجبها مزوانية ، كستنية اللون.

## ١٩٣٩٩ - عَوَيْقِيَّةٌ سَمَرَاءُ ٥

*Gibberella baccata*, *Calonectria varians*, *Fusarium fructigenum* (S).

فطر مجهرى يركب عدة اشجار مشرة وسرجية اخصها اللينين الحامض واليوسين والكرز والدارق والتفاح والاجاص والزعرور والورد والسنب والصفصاف والصفراء والورد والمان واليوكا || يصيب ثمار الكرز والدارق والتفاح والاجاص فيطعمها من البشرة الى البزرة المغالبة . مظهره الخارجى بقعة غنية سمراء اللون تنقسم وتنفور في اللب . وهو في اللينين الحامض واليوسين يقع سم مسطيلة ، تركب الجدوع والسوق تنسب الصرم || وهو في الجزر والزعرور والورد يقع صغيرة مستديرة لونها الى السواد اللامع تمعلب اللحاء وتقرحه || اضراره منطقة بطوئة التربة وموزرة العوامل الجوية || يكافح كثيره من الفطور

١٩٤٠٠ - عَيْبَابٌ هو الافساد ، اطلبه .

١٩٤٠١ - عَيْبَاكَةٌ ٥ *Marée* (F). *Tide* (E).

حركة دورية تأخذ مياه البحر قوتلح وتنخفض مرتان يومياً في اوقات شبه معينة لاصحورة . استمرارها يدم ١٢ ساعة ٢٥ دقيقة ، اندفاع المياه وارتفاعها يدنى المد اما انخفاضها وتقلصها فيدى الجزر والتقيص || ارتفاع مياه المد في البحر الابيض المتوسط يراوح من ١٠ سم الى ١٠٥ سم . وارتفاعها على شواطئ الاطلسي يراوح من ٣ امتار الى ١٣ متراً || اما نشاط الباجرة وارتفاع مياهها فانه منوط بمدار الشمس وبمنازل القمر الذي يمرض المجاذبية .

١٩٤٠٢ - عَيْبَاكِيٌّ ٥ *Synodique* (F). *Synodic* (E)

نعت تعريفي يطلق على الدورة الكاملة التي تقوم بها الكواكب بالنسبة الى الشمس . ففترة القمر الباجية تستمر ٢٩ يوماً و١٣ ساعة و١٣ من الدورات الفلكية .

١٩٤٠٣ - عَيْبَارٌ ٥ *Titre* (F). *Title* (E).

هو مقدار العنصر الحر الصرف الذي تحويه مادة معينة . فقولك مثلاً سبرتو عيار ٨٥ معناه ان هذه المادة تحوي ٨٥ ٪ من الكحول || وهو ايضاً مقدار المعدن الثمين من ذهب او فضة الذي يوجد في العملة المسكوكة او الخلل . ومن هذا التليل قولهم ذهب عيار ثمانية عشر اى بالنسبة الى اربعة وعشرين من الذهب الخمر .

## ١٩٤٠٤ - عَيْبَاةٌ غِذَائِيَّةٌ ٥

*Substitution alimentaire* (F). *Alimentary substitution* (E).

العبارة الغذائية او عياضة الاغذية هي تبديل بعض الاغلاف بغيرها بشرط ان تحوي الوحدات الغذائية نفسها .

١٩٤٠٥ - عَيْبٌ ٥ *Vice* (F). *Fault*, *Defect* (E).

النقصية او الوصمة في الشيء .

## ١٩٤٠٦ - عَيْبٌ رَاجِعٌ اُسْدٌ ٥

١٩٤٠٧ - عَيْبُ الْوَكْرِ *Tendon failli*, *Nerf-ferrure*

اقتراب وتر الوظيف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . وهو من عيوب الخيل .

## ١٩٤٠٨ - عَيْبٌ يَبْبِيعُ الرَّدِّ ، عَيْبٌ مُبْطِلُ الْبَيْعِ ٥

*Vice rédhibitoire* (F). *Redhibitory defect* (E).

عيب غني يجعل المبيع غير قابل للاستهلاك او يحد من

طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الجؤرة السراء ، انمر الريش ، اغبس القوام والاباهر والكل || قوته الجانبد والمقلاء ، يكتر حيث يحل الجراد وقد يرافقه في رحاله .

## ١٩٣٩٣ - عَوَيْقِيَّاتٌ ، لُبُوثٌ عَفِيرِيٌّ ٥

*Myrmeleionidae* (S). *Myrmelionidae* (F). *Myrmeleionidae* (E).

فصيلة حشرات من عصيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة ، قربها الاستشادية قصيرة متنتية . اناتها تمتج مكبها في التراب والويلل ينثف من دمايص ، خضة الجفة ، قوة التأثير ، كثيفة الحلب ، تنخر في التربة ، حل بمرات التل ، سحراً صغيرة قيمة الشكل يسقط فيها التل وتفسره .

## ١٩٣٩٤ - عَوَيْقَةٌ هي الحيوان الرتي ، اطلبه .

١٩٣٩٥ - عَوَيْبَةٌ ٥ *Gibberella* (S).

جنس فطور مجهرية من المناخيات وفصيلة المشوفيات . اعصابها شمية الانتشاب الينسي . قسمها اسم اللوذ يملو مراح ازرق || طوبها البوغي كطور الكن . يوغها اعليبي مستطيل عديد الاخبية المتساوية الوثيرة الانقسام المتعرض || انواعه عديدة منها اربعة مؤذية وهي ما يتبع .

## ١٩٣٩٦ - عَوَيْبَةٌ الثَوْتُ ٥

*Gibberella moricola*, *Fusarium lateritium*, *F. utriculatum* (S).

فطر مجهرى يصيب افئاد الثوت فيؤذيها . مظهره الخارجى يقع قرحية لا قياسية لونها الى الزرقة السراء تلو تشور الانفاذ تنسب ذبول الاوراق ثم يبساها ويباس التقصان والانتاد يمد اسرار خشبا || يكافح بقطع الاغصاء المربوبة فور ظهور المرض ثم تطهيرها بأحد الفوطير القفان المركزة على التماس .

## ١٩٣٩٧ - عَوَيْبَةٌ الزَّرْعِ ٥

*Gibberella zeae*, *G. saubinetii*, *Fusarium graminearum*, *F. roseum*, *F. rostratum* (S).

فطر مجهرى يصيب ٣٦ نوعاً من النبات تنتمي الى عدة فصائل . اعصابها الحنطة والشوفان والشعير والارز والذره . كما انه يركب جذور البطاطا والولياء ويصيب مشائل البتونه ويؤذي الكتان والقمح والقفل واخيار والقول . مظهره الخارجى مقر يحل بالزروع وبالنباتات المائلة فيؤخر نموها او يموت وقد يسبب عدم الاسبال او الاسبال خفيفة الخالي من الحب || اضراره منطقة يمد انتشاره العائد الى وطوئة التربة وملامحة العوامل الجوية || يكافح بتطهير البذار .

## ١٩٣٩٨ - عَوَيْبَةٌ حَرَاءٌ ٥

*Gibberella moniliformis*, *Ustilago Fuijii*, *Fusarium moniliforme* (S).

فطر مجهرى يركب عدة نباتات اعصابها قصب السكر والارز والذره ولا ينف عن الحنطة والشوفان والشعير . مظهره الخارجى على قصب السكر خطوط حر تملو القصبة عند طرفها يقابلها بقع سمر توشم نصل عصف الترابي فتلوه . وهو على الارز يقع حر تركب الساق في اباها خبها تنسب نحوها واستعلاها غير الطبيعية تم ذبولاً قبل الاسبال او قبل الاضرار . وهو على الذره يقع خنطية تركب الجذور فتصلب وتيب اصفرار الاوراق وذبولاً || يكافح بتطهير البذار وباستجاب المواقع الرطبة والازرة الكثيرة القوية الانقسام .



استعماله فيجوز حبيته الشاري فسح البيع وسطالية البائع بالتعويض || والصوب التي يبتعها القانين مبيحة لرد هي : القدام والتسعة وفالج الحنجرة للزمن والبررة والعرج القديم المتوارث والرماد المعاد ودا الخنازير.

#### ١٩٤٠٩ - عُيُون \* (Atonia (S), Atonie (F).

جنبة برقة وتزيينية من فصيلة السبديات . مهدا بعض مناطق افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التزيينية في معظم اقطار البلاد المحتلة الحارة || ساقها قصيرة فروع اوراقها معتقة ، ضنية التجميع ، سنانية اتصال الفصقة . ازهارها جميلة الشكل ، ليلكية اللون ، خاسية البتلات ، كثيرة الاسدية عادمة العرف .

#### ١٩٤١٠ - عُيْتَام (Platane (F).

العياثم هو الدلب . واسدته عياثمة .

#### ١٩٤١١ - عُيُوث \* (Clambus (S).

Clambe (F), Clambus (E).

جنس حشرات من فصيلة الميشتيات وربة مخدات الاجنحة . انواعها المعروفة ستة منتشرة في بعض مناطق البلاد المحتلة الحارة || اجسامها شديدة الصغر لا تتجاوز ١ سم . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قربها الاستعمارية غيبطة . كولسلها مستعرضة . اتحادها لاحقة قوائمها نشيطة . اثنائها وحيدة اللون السوي وهي الى الشقعة او السمرة || تعيش على المواد النباتية المختصرة وفي الاخشاب النخرة وفي الروث والخثي .

#### ١٩٤١٢ - عُيُوثِيَّات \* (Clambidae (S).

Clambidés (F), Clambidae (E).

فصيلة حشرات من مخدات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، لا تتجاوز ١ سم . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . تآشيرها وفكوكها نظامية . قربها الاستعمارية سداسية الفصل . كولسلها قصيرة مستعرضة . اتحادها لاحقة . ارسافها رباعية المقبل || تعيش في التدي النباتي وفي الاخشاب النخرة وفي الروث والخثي وفي جميع المواد النباتية المختصرة || أشهر اجناسها الميوث .

#### ١٩٤١٣ - عُيُوثُم (Isogamie (F), Isogamy (E).

المعيدة احدى طرائق الانسال الشقي ؛ تتميز عداقياً بمساواة الغامات الروائية الذكرية والانثوية .

#### ١٩٤١٤ - عُيُوثُوس \* (Scardinius erythrophthalmus (S), Red-eye (E).

سمكة من السبديات . تعيش في المياه العذبة لا تفرق عندها بين البحيرة والنهر والجور . اقليمها البلاد الباردة والمتلدة الحارة || جسمها ايليجي الشكل ، معتدل التبييط ، يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . سهفها مستدير كبير . يؤمها الى الخضار الازرق المزاج يبق في الظهور ويزعم في الجانبين وينصرف الى القففي في البطن . رأسها معتدل الحجم ، قصير الخلف ، صغير الشفق . عيناها مستديرتان ، صغيرتان ، جميلتا الحمرة الغريزية || زعانفها وردية اللون حمراء المزاج ، الظهرية وبيدة مزوانية الشكل ، تملو مؤخر الظهر . الذيلية فارقة || لحمها كامن الصنف ، قل من يرغب فيه .

#### ١٩٤١٥ - عُيْد

العبد : شجر جبلي ينبت عيداناً نحو الدراع اغبر لا ورق له ولا نور ، كثير اللحاء والمقد يفسد بلحاءه الجرح الطري فيلثم (اللسان) .

#### ١٩٤١٦ - عُيْدَانُ الْحَيَّة (Ophioxylées (F).

سبط من فصيلة الدفليات . اشهر نباتات عود الحية .

#### ١٩٤١٧ - عُيْدَانُ كَثَّة (Ophioxylées (F).

هي كل شجرة سلية قديمة لها عروق نافذة الى الماء (اللسان) .

#### ١٩٤١٨ - عُيْدُسُ مُيْدُو \* (Idus vulgaris (S).

Idé commun (F).

سمكة نهريه يروض من مفتوحات المائنة وفصيلة السبديات . اصطنائها معظم انهر وبحيرات الشرق الاذوي واروية || جسمها ايليجي الشكل ، يطول نحو ٣٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الشكل ، قصير الخلف ، صغير الشفق . تؤمها الى الركبة السمر السمر السمر السمر السمر السمر في الظهر وتنف في البطن . زعانفها معتدل الاجسام ، الظهرية واحدة شبه هرية الشكل . الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

#### ١٩٤١٩ - عُيْدُشُون \* ، عُيْدُشُونُ \* (Iguana (S), Iguane (F), Iguana (E).

جنس حيوانات زسافة من فصيلة السبديات . انواعها المعروفة اثنان يتيزان بذكر الجئة واصطنائها التي تراوح بين ١٢٠ و ٢٠٠ سم . اصطنائها وتيج ظهورها منغلقة بخمار من الهلب غضروي التركيب ، مشطي الشكل ، اسود اللون . اثنائها الى الزقعة الخضراء يطولوا وتجدع وتديج تراوح الوانها من الصفرة الى السود || وما من الحيوانات الخافضة الحاشرة التي تألف مخفاف الانهر ويجاري الماء . تعيش على الاجبار . لحمها مأكولة ويروضها كذلك .

#### ١٩٤٢٠ - عُيْدُشُونِيَّات \* (Iguanidae (S).

Iguanidés (F), Iguanidae (E).

فصيلة حيوانات زسافة من ربة المظليات السبعيات الانسة ، الرباعيات القوائم ، المستطيلات الانذاب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطنائها البلاد الحارة . اشهر اجناسها الميشتون .

#### ١٩٤٢١ - عُيْدُكَّة \* (Isogamie (F), Isogamy (E).

المعيدة احدى طرائق الانسال الشقي ؛ تتميز عداقياً بمساواة الغامات الروائية الذكرية والانثوية .

#### ١٩٤٢٢ - عُيْدُم (Isogamie (F), Isogamy (E).

هو اللادن الاكريمي ، اطله .

#### ١٩٤٢٣ - عُيْر (Isogamie (F), Isogamy (E).

هو الضلع ، اطله .

#### ١٩٤٢٤ - عُيْر ، حَمَارُ الشَّيْثِي (Baudet (F), Ass (E).

هو الحمار اللحل المنتخب الصالح للزور على الحجير واللاتان . ج احياء ويعار ويصور ويصور .

#### ١٩٤٢٥ - عُيْر

العير : الايل . وقال ابو الهيثم : العير كل ما يتير عليه من الايل والحجير والبعال فهو عير .



عيتون



عيجوس



عيس مبدول



عيشون

cile (F). Jerusalem sage (E). Jerusalemssalbei (D).  
Salvia arborea, S. di Gerusalemme, Salvione (I).  
بجلة سريوية معمرة تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ساقها  
خشيشية. فروصها فرقة متباعدة كثيفة الزغب القطعي  
الشكل واللون. اوراقها اهليلجية النصل، خلية البشرة  
ازهارها الى البياض الاخير. قناباتها مزينة برماد اللون.  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. يقال انها من  
النباتات الطبية النافعة.

19435 - عَيْرَازَة مُدْهَبَة  
Phlomis aurea (S).  
Phlomis dorée (F).  
بجلة سريوية معمرة مزينة كثيفة الخمل الاصفر. تملو من  
٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل مقطوعة الطرف.  
ازهارها الى الصفار المذهب الموجع || ازهارها يستمر  
طوال فصل الصيف.

19436 - عَيْسُوسُ  
Dromadaires blanchâtres (F).  
Whitish dromedaries (E).  
البس : الابل البيض يخالط بياضها شي من الشقرة.  
واحد اعمى والاثنى عيساء.

19437 - عَيْسَاء  
Sauterelle femelle (F).  
المَيْسَاء : الجرادة الاثني.

19438 - عَيْسَرَكَن  
Arctostaphylos (S).  
Busserole, Bousserole (F).  
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخلتنيات. انواعها  
عديدة جميعها بري. ساقها دقيقة نحيلة مدادة. فروصها  
منسببة. اوراقها كاملة صغيرة القد منعقة مقطوعة القاعدة  
مسننة النصل. ازهارها عقدوية التجميع. ثمارها متينة  
الشكل حراء اللون او سواد || اشهر انواعها عيسران  
عنب الدب او عنب الدب.

19439 - عَيْسَرَكَن عَنْبِ الدَّب \* ، عَنْبِ الدَّب  
Arctostaphylos uva-ursi (S). Busserole raisin  
d'ours, Raisin d'ours, Bousserade (F). Bear-berry,  
Bear's grape, Uva-Ursi (E). Gemeine Bärentraube  
(D). Uva ursina, Eva ursina, Orsella (I).

نوع من البسران ساقه مدادة، فروصها تملو نحو ٣٠ سم.  
اوراقها كاملة ابيدة. نصلها جاند الصفعة مائل البشرة.  
ازهارها وردية اللون. عقودها الزهري يضم من ٥ الى  
١٢ زهرة. ثمارها متينة حراء اللون يقال ان الدبة تأكلها.

19440 - عَيْسَكَلَن  
هو الاشقيال النجسي، اطلبه.

19441 - عَيْسُوسُ رَباعِي البَيْج \*

Allonyx quadrimaculatus (S). Allonyx à 4  
macules (F). Allonyx quadrimaculatus (E).  
حشرة واسعة قانصة من فصيلة الزوحنيات وردية مغمدة  
الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض  
المتوسط. خنافسها تعيش على رقيق ازهار النباتات الطوية  
التي تكثر في غابات الصنوبر واخراجه. يرقاقها مقترنة  
تقضي على امداح الحشرات الماشية التي تركب الصنوبر ||  
جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ سم. لونها اسود  
الفراس والبطن والظهران، اجر الكويل. ظهورها ثنائي  
التبجيج الفندي الابيض. زباناها صوبلياني. عيناها  
بارزتان. ارساغها خاسية القفل. || الاثني امير قدأ من  
الذكر وابنت ثوبا منه واقصر زبانا || لها جيل واحد

19426 - عَيْرُ السَّراة  
طائر كهيئة الحمامة قصير الرجلين مسروها اصفر المنقار  
اكمل العينين صافي اللون الاخضره اصفر البطن وما  
تحت جناحيه وباطن ذنبه كانه بارد وشي. يزعمون انه  
ياكل الثمن والعنب. ج. ميويد السراة (السان).

19427 - عَيْرُ قَبْزَان  
هو حمار قبان، اطلبه.

19428 - عَيْرَن \*  
Irena (S). Irène (F). Irena (E).  
جنس طير من الجوارم سنيات التأثير وفصيلة الذكرويات  
انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها تمتد من الهند الى ماليزية  
والفيليبين. تألف الادغال والبراري. قوتها الحشرات  
والدويبات من المناكب الى المقارب والوزغ والعظاء  
الصغيرة || اجسامها ربعة تطول من ١٨ الى ٢٢ سم.  
متألفها عضلية. اجنتها مستدلة الطول، ذلقة الاطراف.  
اذنابها مقلوبة. اطيولها تراوح من الركة السوداء الى السواد  
القاسم || تدث اعشاشها في الاشجار المائية عند انتشاب  
الافصان او الانقاد. اناسها تحضن نحو اربع بيضات  
على مرتين في الحول. الذكور تزين لها الحاية والقفاء.

19429 - عَيْرَازَة ، فُلُومِيس  
Phlomis (S).  
Phlomis (F).  
جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة الشفويات. انواعها  
عديدة جميعها اشباب وجنيات. منها اقليم البحر المتوسط.  
اوراقها متناحية لاطنة. ازهارها ختلفة الالوان فيها الابيض  
والاحمر والوردي والاصفر || اعرف انواعها واشهرها مائي.

19430 - عَيْرَازَة الخَمَل  
Phlomis agraria (S).  
Phlomis des champs (F).  
بجلة معمرة مزينة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضيه  
الشكل، قلبية القاعدة. ازهارها ضمية متباعدة كالتنديد.  
فصها تمل نحو عشر زهرات بنفسجية اللون. قناباتها  
وفصل كؤوسها غرزوية الشكل || ازهارها يستمر من  
حزيران الى آب.

19431 - عَيْرَازَة سَامِيَة  
Phlomis samia, Phlomis superba (S). Phlomis de  
Samos, Ph. superba (F).  
بجلة زيينية معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها  
بيضيه الشكل، قلبية القاعدة. نصلها مائل البشرة  
خلل الصفعة السفلي. ازهارها سفلية التجميع متباعدة  
الرصف. تيلو صفراء اللون ثم تتحول الى الحمرة.  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19432 - عَيْرَازَة عَسْقُولِيَة  
Phlomis tuberosa (S). Phlomis tubéreuse (F).  
بجلة سريوية زيينية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم.  
جذورها عسقولية كروية الشكل. اوراقها قلبية النصل.  
عقودها الزهري يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. صفاته الزهرية  
عديدة. الواحدة منها تجمع من ٢٠ الى ٤٠ زهرة، لونها  
الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19433 - عَيْرَازَة لَرَجَة  
هي الاذينة، اطلبها.

19434 - عَيْرَازَة مُخَشَوَشِيَة ، فُلُومِيس  
فلسطيني، قرفيه

Phlomis fruticosa (S). Phlomis sous-ligneuse, Ph.  
de Palestine, Sauge en arbre, Bouillon blanc de Si-



عيرن



عيسران عنب الدب



عيسوس رباعي البيج

اجناسها وانواعها عديدة تكثر في البلاد الحارة والاستوائية. جميعها قانصة. اعراف انواعها واشهرها العيىس .

### ١٩٤٤٨ - عَيْقَمَان \* عود أجتر ، أرميريا

Armeria (S). Arméria, Armérie (F). Thrift, Pink (E). Grasnelle (D). Armeria (I).

جنس نباتات عشبية معمرة برية طيبة وزراعية تزيينية من فصيلة الرصاصيات. انواعها عديدة بعضها شمرخايرة تحمل الازهار تملو من ١٠ الى ٦٠ سم. اوراقها صغيفة الشكل ، مختلفة الاجسام وعدد الروق . ازهارها كثيرة الالوان فيها الالبيىس والوردى واللبلىكى والاحمر والاربعوانى والجلوى || ازهاره يستمر من الشهرين الى الاربعة شهور.

١٩٤٤٩ - عَيْق Taxus  
وقد يأتي بمعاني مختلفة اخصها السمر المعدل .



عيسم ثلاثى البقع

### ١٩٤٥٠ - عَيْقَة Rivage (F). Bank, Side (E).

الْعَيْقَة: ساحل البحر والشاطئ والشاطئ. وصفة النهر تدعى عيقة. ج عيقات .



عيس

### ١٩٤٥١ - عَيْقَة

هي الركعة اي ساحة المزرعة او المزرع وكل فناء من الارض احتجزت جوانبه الاربعه .

### ١٩٤٥٢ - عَيْقَمَان

نبات كالرفج له سفة كسفة الفقا (اللسان) .

### ١٩٤٥٣ - عَيْكَم ٥ ، عَيْكَمَة

Spermatophore (F). Spermatophore (E).

ج عياكم . البكعة حق صغير القند لقياس الشكل قدره عند بزره الفجل او بزره الكتان يلفق رزقة من الشلق عند ذكره بعض الحيوانات الزحافة القارضة والمعديات الرئوية والراسيات الارجل الخ ...



عيفقان

### ١٩٤٥٤ - عَيْلَاء \* Illa (S). Illa (F). Illa (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذليل وفصيلة القصوصيات . انواعها المروقة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتلة الحرارة || اجسامها صغيرة نصف كروية الشكل ، محدبة الظهر ، منبسطة البطن ، مفرضة المقدم والمقبع ، محرمة الاعظام ، حادة التأثير ، قوائمها دقيقة مستطيلة باستثناء الزوج الاسامي المستفخم ، التكبير الملاحظ المسنة الشغار الداعلية || اقربها عديدة تكثر فيها الجلوة والجلوة البنفسجية والسمره الحليدية المواج .

١٩٤٥٥ - عَيْلَام Hyène (mâle) (F).  
Hyena (male) (E).  
الضبع الذكر .

### ١٩٤٥٦ - عَيْلَم

العلم اسم الضفدع ولبئر الكثرة الماء او للملحة . ج عيال .



عيلاء

### ١٩٤٥٧ - عَيْشَن Celi (F). Eye (E).

هي عضو البصر في الحيوان . تتكون من المقلة والجفون والجهاز الدمى والاعصاب البصرية .

في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل شهر ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة التي تبلغ الكمال الجسودى بمر ستة اشهر تتحول الى حورية في اوائل شهر نيسان . جسمها عند تمام ادراكها يطول من ٧ الى ٩ م . وهو مردي الشكل ، مستطيل المقدم والرأس ، مستطيل الطرف الذلق ، سداسي الارباج ، ضليع التأثير ، اسمر اللون ، اسود الرأس .

### ١٩٤٥٢ - عَيْشُوم Phellodendron (S).

Phellodendron (F).  
جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة السلايات . انواعها قليلة ، اشجارها سرسة ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها متعاقبة مركبة ريشية عابلة . ازهارها عكوكلي التجميع ، لطري الارتكاز . ازهارها صغيرة القند عطرية العرف عديدة الفصل والبيلات والاسدية .

### ١٩٤٥٣ - عَيْشُ Broussailles (F).

Bushes, Brushwood (E).  
المرج والنباتات الغلة الشائكة التي تعيش بين الاشجار الحرجية .

### ١٩٤٤٤ - عَيْسَم ثلاثى البقع \*

Macroslagon tricuspidata (S). Macroslagon tricuspidata (F).

حشرة واشمة شافرة من فصيلة الزناليات روية مندقات الانجسة . تألف جمع الاماكن التي تكثر فيها الازهار والزناوير والشفاوير . خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات والشفاوير . يرقاتها تعيش على جذب الزناوير من النسوة الى الشفور والديدور || جسمها صغير القند ، يطول من ٧ الى ١٠ م . ثوبا متدلج الالوان اسها وكسلها ويطها الى الحمرة المازجية . صدرها الى السرة السوداء غمداهما الى الحمرة الصائبة يملوها ثلاث بقع سود . اسها صغير الحجم زبابانا خطياني . عيناها صغيرتان . غمداهما مقلقان ، ورشناها شفافان ، بارزان تحت الظهران || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تصافد في اوائل تموز . الانثى تهريق الممكن مباحدا قرب خشاوات الزناوير على النبات والحجارة والتربة || البرقة عند الادراك التام تعول نحو ١٦ م . جسمها بسيط الشكل ، سداسي الارباج ، ضليع التأثير الفكية ، حنطى اللون ، اسمر الرأس والارباج والشرج || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما ينتهي في التربة تحت الجلالة .

١٩٤٥٥ - عَيْطَل Lisse (F). Smooth (E).  
الشجر العيطل ما كانت لحاء سوقه واغصانه سرسة ناعمة البشرة .

### ١٩٤٤٦ - عَيْقَس \* Belostoma (S).

Belostome (F).  
جنس حشرات قازبة من فصيلة العيىسات . انواعها المروقة قليلة اعطائها البلاد الاستوائية . تعيش في مناهقها وانهارها . جميعها مفرسة كبيرة القند طويلا يراوح بين ٦ و ٨ م . قربها الحيوانات الدنيا والحشرات المائية . لسها مؤذ غيف.

### ١٩٤٤٧ - عَيْسِيَّات Belostatoidae (S).

Belostatoidés (F). Belostatoidae (E).  
فصيلة حشرات قازبة من نصفيات الانجسة المختلفة .

١٩٤٧٨ - عَيْنَة ، عَيْنِيَّة ، مَسْرَطَة

Echantillon (F). Sample (E).

١٩٤٧٩ - عَيْنُوم \* Rhinopomes (S).

Rhinopome (F).

جنس غفائش من حمارة الرسات. انواعه قليلة جميعها صغيرة القد. اوراقها من الريادي الاصل الى الكتكتاني الاسمر. رؤوسها صغيرة، اذناها كبيرة، فرائسها ذلقة، زوائدها ناعمة اسطوانية متراكبة. اذناها مستطيلة دقيقة || موطنا فسح الاجام يمتد من الفريقة الشالية الى الشرقية وحوض البحر الاحمر وسندنب والهند. يكثر وجودها في وادي النيل. تعيش منفردة او جماعات متوسطة العدد. تسرح في الليل. قوتها الحشرات على اختلافها. تألف الكهوف والمغاور وراقب الصخور وتجاوفا الانجار.

١٩٤٨٠ - عَيْنُون Globularia (S). Globulaire (F).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة العينويات. انواعها المعروفة ١٢ فيها الاشباب والجنبايات اللغيسة المحشوشة. اوراقها بسيطة، القرصية منها غمية التجميع والشراعية متعاقبة. ازهارها رؤوسية كروية الشكل قريبة الشبه من ازهار المركبات. لبونها الى الزرقه زهره وتتم حسب الانواع || وهو من النباتات التي ترغب في الاراضي الصخرية وتجدد في الاربة الكلسية.

١٩٤٨١ - عَيْنُون عَيْطِي الزهر

Globularia trichosantha (S). Globulaire à fleurs filiformes (F).

نوع من العينون وهو عشية برية وتربينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها القرصية اهليجية الشكل، وحيده الشرق، ثلاثية الاسنان. اوراقها الشراعية ستائية التصل متعاقبة. ازهارها كبيرة القد مستعرضة البتلات الخيطية التخصيص.

١٩٤٨٢ - عَيْنُون عَيْطُر

Globularia alypum (S). Globulaire alype, Alype, Herbe terrible, Séné sauvage (F). Globularia, Alypo globe daisy (E). Strauchartige Kugelblume (D). Globularia alypum, Erba terribile (I).

نوع من العينون وهو بحلة ذليلة معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها ابيدة، متعاقبة، لمعية الشكل، جامدة التصل. رؤوسها الزهرية لاطئة، عطرية العرف المستحب. وهو من النباتات الطبية العديدة المتألف يوجد بين الصخور وفي المواقف القاحلة وعلى جوانب الاحراج واطراف الغابات.

١٩٤٨٣ - عَيْنُون عَيْطَل Globularia nudicaulis (S).

Globulaire à hampe nue (F).

نوع من العينون وهو عشية جبلية، معمرة، برية وتربينية تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها قرصية، غمية التجميع، كبيرة القد، مقطوعة القاعدة، عادمة التنين. شراستها عيطلي اللحاء. رؤوسها الزهرية كبيرة القد، قطرها يراوح بين ٢ و ٣ سم.

١٩٤٨٤ - عَيْنُون قَلْبِي الْوَرَق

Globularia cordifolia (S). Globulaire à feuilles en coeur (F).

نوع من العينون وهو عشية جبلية معمرة برية وتربينية تملو نحو ١٥ سم. اوراقها قرصية، غمية التجميع، قليلة الشكل، ثلاثية التنين الطرفي. شراستها عادم الاوراق، ازغب اللحاء. رؤوسها الزهرية كثيرة العدد، صغيرة القد، قطرها نحو ١ سم.

١٩٤٨٨ - عَيْن ، عَيْنُوم Source (F). Spring (E).

مياه تخرج من جوف الارض وتساب على سطحها.

١٩٤٨٩ - عَيْنُوم

«الحافس من كل شيء» وقد شاع استعمال لفظة عين للدلالة على الاموال الثابتة فقط.

١٩٤٩٠ - عَيْنُوم Boufs sauvages (F). Wild oxen (E).

الدين: بقر الوحش.

١٩٤٩١ - عَيْنُوم اَذْكِيَّة Stipulaire (cell)

زعمة ثانوية تظهر في ابط الاذنة.

١٩٤٩٢ - عَيْنُوم الْإِفَالَة Bourillon

زعمة في اسفل سرج الكرة تفتح وتغلق اذا جد.

١٩٤٩٣ - عَيْنُوم الْبَرْ Schaeus (S).

Choin (F). Bog-rush (E). Kopfried (D). Scaeno (I).

جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة السعديات. انواعها عديدة معظمها متفرقة وبعضها ينبت في الاراضي الرطبة. اوراقها عصفية الشكل جامدة التصل تشبه اوراق الاسل.

١٩٤٩٥ - عَيْنُوم التَدْرُج

هو الادونيس المغربي، اطله.

١٩٤٩٦ - عَيْنُوم الثَّور

هو اثومان الصباغين، اطله.

١٩٤٩٧ - عَيْنُوم الثَّور

عين الثور نجم ثير من كوكبة برج الثور.

١٩٤٩٨ - عَيْنُوم الْحَجَل

هو الادونيس المصري، اطله.

١٩٤٩٩ - عَيْنُوم الدِّلِك

هو الشمش، اطله.

١٩٥٠٠ - عَيْنُوم الشَّمْس

هو عباد الشمس، اطله.

١٩٥٠١ - عَيْنُوم الطَّائُوس

هو البيرة، اطله.

١٩٥٠٢ - عَيْنُوم الْفَرْاب

هو الفقيس نبات من الفديات، اطله.

١٩٥٠٣ - عَيْنُوم الْقَطْطُ

هو الاتحوان الاسفر، اطله.

١٩٥٠٤ - عَيْنُوم الْهَدَّاد

هو اذان الفأر، اطله.

١٩٥٠٥ - عَيْنُوم الْهَرِ Opale, Œil de chat (F).

Opal (E).

١٩٥٠٦ - عَيْنُوم مَحْسُوسَة Corps certain (F).

هي مادة الشيء التي تلمس وترى.

١٩٥٠٧ - عَيْنُوم مُرْكَبَة Œil composé (F).

Compound eye (E).



عينوم

## ١٩٤٨٥ - عُيُونٌ مَبْدُول \*

*Globularia vulgaris* (S). *Globulaire commune*, *G. vulgaire*, *Marguerite bleue* (F). *Blue daisy*, *Globe daisy* (E), *Kalk-Kugelblume*, *Blaue Kugelblume* (D). *Margherite azzurra*, *Vedovelle turchine*, *Morine* (I). نوع من البتون وهو عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها القرصية خماسية المروق، لا قياسية للتشريح. اوراقها الشراخية سائبة النصل، عابكة الخمار. ازهارها متوسطة القد، كثيرة العدد، مشرقة البتلات المفصصة. وهو نبات متغلفه الماشية فيفيدها ولا يخلو من بعض الحواس الطبية التي تنفع الصدر والدم.

## ١٩٤٨٦ - عُيُونِيَّات

*Globulariaceae* (S). *Globulariacées* (F). *Globulariaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات مرتفعة البنيش.

## ١٩٤٨٧ - عُيُونِيَّ، طَيِّق

*Identique* (F). *Identical* (E).

## ١٩٤٨٨ - عُيُونِيَّة، تَمْدُوج

*Spécimen* (F). *Specimen* (E).

## ١٩٤٨٩ - عُيُونَرَان

*Gorille* (male) (F). *Gorilla* (male) (E).

هو ذكر النولاء اي الغول، ج صاير.

## ١٩٤٩٠ - عُيُونِيَّ

*Chocard des Alpes* (F). الميق م. عبققة هو زمت الجرد، طائر من الغربان، اطلبه.

## ١٩٤٩١ - عُيُون

*Eau douce* (F). *Fresh water*, *Soft water* (E).

يقال للمين المذبة عين عُيُونِيَّ ويقال للمين الماخلة عين زَيْتَم || والميم هو القيل الذكر.

## ١٩٤٩٢ - عُيُونِيَّ

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات تتميز بويضة مهدبة تبتدئ رنية بفضاء اللون ثم تجمد وتضفر وتقتصر على الحمرة النارية. اهداها اصاها. يوفها غبلي شفات لا يخلو من بعض النقط النعمية البراقة. انواعه قليلة منها نوع واحد غار يلبي عيوم التجليات.

## ١٩٤٩٣ - عُيُونِيَّ التَجْلِيَّات °، مَغْزَل

التجليات °

*Epichloë typhina*, *Sphacella typhina* (S). *Quenouille des graminées* (F). *Cattail fungus of grasses* (E). *Erstickungsschimmel der Gräser* (D).

فطر مجهرى يركب بعض التجليات البرية والمعلقة فيؤذيها. مظهره الخارضي غلاف اللون ثم يرتقالي. ينقل كابل الفم من الميرة الى انتشار نمل الصفة. يظهر في حزيران ويبتدئ خلياً رنياً ثم يكثف ويتصلب فيسب ذبول الصفة ويمرل نحو الساك والازهار || وبهم من قال انه يؤذي الخليل والابقار التي تأكله مع الملف المصاب به.

## ١٩٤٩٤ - عُيُون

*Pelargonium* (S). *Pelargonium*, *Pélaronier* (F). *Pelargonium* (E).

جنس نباتات عطرية معمرة من فصيلة الفرونيات. انواعه نحو ١٥٠ وضروبه زهاء ٥٠٠ معظمها لبني وبعضها

جنبي عشويش. جميعها تريينية واكثرها يستعمل لاستخراج العطر. عطرها دهن اصفر اللون، فواح العرف الاخاذ يدخل في صناعة معظم الطيوب || اشهر انواعه الرئيسية التي تحدث منها جميع الصروب المعروفة وما استجد من اسرام، هي ما يتبع.

## ١٩٤٩٥ - عُيُونُ الْعِطَر، عِطَر، لَقْلَقِي

*Pelargonium capitatum* (S). *Pélaronium rosat*, *Géranium rosat* (F).

عشبة معمرة زياها اللحاء. ساقها فراء متصبعة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة ومفرصة. تصلها هلي البشرة، وردي الراجحة عند اللمس. ازهارها نورية التجميع، صفيرة القد، وردية اللون، ارجوانية التجميع، فواحة الراجحة العطرية || ازهارها ربيي. زراعتها صناعية يستخرج من ورقها وازهارها عطر الورد.

## ١٩٤٩٦ - عُيُونُ إلهيَّيَّ الْوَرَق

*Pelargonium oblongatum* (S). *Pélaronium à feuilles oblongues* (F).

عشبة نجيمة معمرة عسقلية الجعنة، عامدة الساق، عديدة الفروع تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل، ذرية الزايم الاخير || ازهارها الى البياض الاصفر يعلو تمريق احمر || ازهارها صيني.

## ١٩٤٩٧ - عُيُونُ بَهِيَّ

*Pelargonium fulgidum* (S). *Pélaronium éclatant* (F).

عشبة معمرة عسقلية الجعنة. ساقها غليظة نامية اسطوانية زياها اللحاء تملو نحو ٧٥ سم. اوراقها مفصصة، خلية البشرة القفصية المواج. ازهارها نورية التجميع مستعرضة البتلات العادمة التفرش والتشريح، الارجوانية اللون. ازهارها يستمر طوال الصيف.

## ١٩٤٩٨ - عُيُونُ ثُنَائِيَّيَّ الْوَرَق

*Pelargonium bicolor* (S). *Pélaronium bicolore* (F).

عشبة معمرة عسقلية الجعنة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها مفصصة، غمرولية، مسنة. ازهارها عامدة العرف العسري ثنائية اللون البنفسجي والاسمر الكسني || ازهارها يستمر طوال شهر تموز.

## ١٩٤٩٩ - عُيُونُ جَعْدِيَّ

*Pelargonium crispum* (S). *Pélaronium crépu* (F).

عشبة معمرة زياها اللحاء. ساقها فراء متصبعة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة متجمعة. تصلها عشال اللمس فواح الراجحة التجلياتية. ازهارها مستطيلة الاذن والبتلات الوردية اللون، الارجوانية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

## ١٩٥٠٠ - عُيُونُ حَبَب

*Pelargonium gibbosum* (S). *Pélaronium gibbeux* (F).

عشبة معمرة عسقلية الجعنة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروها غليظة العقد. اوراقها بحرية اللون، مفصصة، غمرولية القصوص. ازهارها الى الصفرة الخفساء المواج السوية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الاول.

## ١٩٥٠١ - عُيُونُ سِنْدِيَّيَّيَّ الْوَرَق

*Pelargonium quercifolium* (S). *Pélaronium à feuilles de chêne* (F).

عشبة معمرة ذكية العرف. ساقها فراء متصبعة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سنديانية الشكل متجمعة الاطراف.



عُيُونٌ مَبْدُول



عيوم التجليات (١)



عيوم التجليات (٢)

نصلها خلي البشرة، عطري العرف الاخاذ المستحب .  
أزهارها صيوانية التجميع ، صغيرة القند ، متساوية البتلات  
الوردية اللون || أزهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

### ١٩٥٠٨ - عُيُونُ نَدَفِ الْقُصْنِ

*Pelargonium tomentosum* (S). *Pélaronium tomentoux* (F).

عشبة معمرة زباد اللحاء . ساقها فروع منتصبه ، تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقها عطرية ، منعنية العرف ، مستديرة الشكل ، متمسكة ، مهمة التفصيص . نصلها خلي البشرة وهو ابيض الحبل الكثيف المستطيل . أزهارها الى البياض الاغبر يملو تدليج وسطى قافى الحمرة || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

### ١٩٥٠٩ - عُيُونُ

التيق ويدي رقيب الشريتا نجم من كوكبية مسك الاعنة .  
مركزه على المكتب الايسر . يعتبر من نجوم العبرة الاولى  
يعد عن الارض نحو ٤٥ سنة ضوئية .

*Hydrophasianus chirurgus* (S). \* *عُيُونُ* .

*Hydrophaisan de Chine, Chirurgien, Pana* (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وقصيلة التفلقيات  
اعطائه تمتد من الهند الى الصين وجزر الزايج وسرنديب .  
يألف صفات البحيرات والاهوار والمنابع . قوته الرغويات  
والبلابلط . جسمه كبير القند يطول نحو ٥٠ سم . عند  
الذكر ونحو ٥٥ سم . عند الانثى . رأسه ويقدم عنقه واصل  
جوشه الى البياض التاسع . مؤخر عنقه الى البياض  
الاصفر يفصله عن بياض المقدم خط اسود . ظهره وذنيه  
الى السمرة الزرقية المائقة يملوها موج ارجواني . جوشه  
الى السمرة السوداء . جناحه الى البياض العاجي باستثناء  
القوامد السود . حذقة عينه حطية . منقادته ازرق  
الانتشاب ، اخضر الملقط . رسافه الى الخضار البحري ||  
يذئن عشه في محافل الارز او على اوراق النيلوفر وغيرها  
من الاوراق التي تملو سطح الماء . الانثى تضع من ٣  
الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

*Ochne* (F). \* *عُيُونُ التَّحْمَرِ*

هو الحززيل ، اطلبه .

### ١٩٥١٢ - عُيُونُ ثَائِرِيَّةٌ ، عُيُونُ عَرَضِيَّةٌ

*Sous-yeux* (F). *Sub-eyes* (E).

زعمات تنمو حول الزيمة الاصيلة فتخلفها اذا تلفت .

*Ommatidie* (F). \* *عُيُونِيَّةٌ*

*Ommatidium* (E).

العينية ، عند المفصليات ، هي العين الصغيرة البسيطة  
التي تتألف من مجموعها العين المركبة .

أزهارها وردية اللون مجلعة ومدججة بالاحمر || أزهارها  
يستمر طوال فصل الصيف .

### ١٩٥٠٢ - عُيُونُ عَشِيٍّ \*

*Pelargonium peltatum* (S). *Pélaronium lierre* (F).  
عشبة معمرة ليلية الساق المارشة المشقة . فروعها مضلعة  
متدلية تطول نحو ١٠٠ سم . أوراقها خماسية التفصيص ،  
خلية البشرة . أزهارها كبيرة القند يبيض اللون او حمراء .  
أزهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

### ١٩٥٠٣ - عُيُونُ كَبِيرُ الزَّهَرِ \*

*Pelargonium grandiflorum* (S). *Pélaronium à grandes fleurs* (F).

عشبة معمرة مزغيرة اللحاء . ساقها منتصبه ، ليلية ،  
عشوشية ، جامدة ، تملو نحو ٤٠ سم . أوراقها قلبية او  
كلوية الشكل ، خلية البشرة ، بحرية اللون . أزهارها  
كبيرة القند ، قفها رايوح من ٧ الى ٨ سم . لونها الى  
البياض المخلج بالاحمر والبنفسجي || أزهارها يستمر  
طوال فصل الصيف .

### ١٩٥٠٤ - عُيُونُ مُجَدِّعٍ

*Pelargonium cordatum* (S). *Pélaronium cordé* (F).  
عشبة معمرة زباد اللحاء . ساقها فروع منتصبه ، تملو نحو  
٧٥ سم . أوراقها عادية العرف ، قلبية الشكل ، مسنة  
الحافة . نصلها ازغب البشرة ، اطحل اللون . أزهارها  
كبيرة القند ، وردية اللون المخلج بالاحمر || أزهارها  
يستمر طوال فصل الصيف .

### ١٩٥٠٥ - عُيُونُ مُحَطَّطٍ \*

*Pelargonium zonale* (S). *Pélaronium zoné* (F).

عشبة معمرة مزغيرة اللحاء . ساقها منتصبه ، ليلية ، جامدة ،  
تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقها سطحية التفصيص . نصوية  
الخط الاسمر الكسبي . أزهارها نوروية التجميع ، ضيقة  
البتلات المستطيلة ، لونها رايوح من الابيض الى الارجواني  
والقرنيزي || أزهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

### ١٩٥٠٦ - عُيُونُ مَشْرُومِ الْبَتَلَاتِ

*Pelargonium schizopetalum* (S). *Pélaronium à pétales déchiquetés* (F).

عشبة معمرة عشقوية الجعنة . ساقها لحية غليظة تملو  
من ٣٥ الى ٥٥ سم . أوراقها مضفصة وشمرة التصل .  
أزهارها مستطيلة الاذن ، مستعرضة البتلات المشرومة .  
الصفراء اللون ، المخلجة بالاحمر || أزهارها يستمر طوال  
فصل الصيف .

### ١٩٥٠٧ - عُيُونُ مَعَطَّرٍ

*Pelargonium odoratissimum* (S). *Pélaronium très odorant* (F).

عشبة معمرة مسحة . ساقها فروع منتصبه ، تملو نحو  
٥٠ سم . أوراقها مستديرة ، شبه قلبية ، مهمة التفصيص .



عيون عشق



عيون كبير الزهر



عيون محطط



عيون

# غ



غاب البحر



غادس

## ١٩٥١٩ - غادُس أسْمَر (S). Gadus aeglefinus (S).

Egle fin, Morue noire (F).  
نوع من الغادس المتوسط القد. طوله براوح بين ٤٠ و ٧٥ سم. أعطائه شطوط بحار العالم القديم وهو لا يتعدى المياه الاقليمية لانه يعيش على اعماق تراوح بين ٢٠٠ و ٥٠٠ م.

## ١٩٥٢٠ - غادُس اُطْحَل (S). Gadus luscus (S).

Gade tacaud, Baraud, Godde, Mollet (F).  
نوع من الغادس المتوسط القد. طوله براوح بين ٢٠ و ٥٠ سم. يكثر في البحر المتوسط. سر به كبير العدد. يألف المياه الاقليمية التي براوح عمقها بين ١٠٠ و ٣٠٠ م.

## ١٩٥٢١ - غادُس العُمُق (S). Lota molva (S).

Morue barbut, M. longue, Molva (F).  
نوع من الغادس الكبير القد. طوله براوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. أعطائه معظم بحار العالم. يألف الاعماق البعيدة الدور التي تراوح بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م.

## ١٩٥٢٢ - غادُس صَغِير (S). Gadus minutus (S).

Gade capelan, Capelan (F).  
نوع من الغادس صغير القد. طوله براوح بين ١٥ و ٣٥ سم. سر به كبير العدد يحجب معظم البحار. يألف المياه الاقليمية.

## ١٩٥٢٣ - غادُسِيَّات ، غَدُسِيَّات (S). Gadidae (S). Gadidae (F). Gadidae (E).

فصيلة اسماك من المسارات. اجناسها وألوانها عديدة تتميز باستطالة اجسامها التحلية الحراشف الرقيقة الناعمة. أعطائها معظم بحار العالم. تألف الحياة الجماعية. سر بها يعد بمض ثنات الأولوف || اشهر اجناسها : الغادس والنبر والبقلة والفنلان واللط.

## ١٩٥١٤ - غاب البحر \* ، غَابِيَّة (S). Millepora (S). Millepore (F). Millepora (E).

جنس مديخ هدي من فصيلة الغايبات. انواعه المروفة قليلة العدد، أعطائها بحار البلاد الحارة. جميعها قريبة الشبه من المرجان يكثر فيها اللون الرخامي الاصفر المواج والاخر الباهت والاصفر الخنطي.

## ١٩٥١٥ - غَابِيَّة (S). Futaie, Bois (F).

Forest of high trees (E).  
الغابة هي الاجرة او الحرجة التي سوكت اشجارها فبست وداحت وصارت صالحة لل صناعة. ج غاب وغايات. وهي بمنائها الشامل مجموعة نباتية تميزت ببيئتها ومختلف نباتاتها الطولية.

## ١٩٥١٦ - غَابِي (S). Forestier, Sylvicole (F).

Pertaining to forests, Living in woods (E).  
ما كان مختصاً بالغابات.

## ١٩٥١٧ - غَابِيَّات (S). Milleporidae (S).

Milleporidae (F). Milleporidae (E).  
فصيلة مديخ هديرية تعيش وتتكاثر في بحار البلاد الحارة. اشهر اجناسها غاب البحر.

## ١٩٥١٨ - غادُس \* ، غَدُس ، غَدُسِيَّات (S). Gadus (S). Gade, Morue (F). Cod, Codfish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات. لحوها ماأكولة ويستخرجون من اكبادها زيت السمك || انواعه عديدة تتميز باجسامها الاهدلية الشكل التي براوح طولها من ١٥ الى ١٥٠ سم. فتركها وحيدة المذبة الطولية. عيونها كبيرة جاسطة. اشهر انواعه ما يلي.

الدواء. وبعضها مسنن بخطوط قاطبة فضية || هوها متوسطة الصنف، مأكولة.

Ulmaceae

١٩٥٣١ - غَارُهَاَجِيَّات

هي الانجريات، اطلمها.

Lauraceae (S).

١٩٥٣٢ - غَارِيَّات

Lauracées (F). Lauraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة الثمرات. انواعها المعروفة زهاء ٩٠٠ تنتمي الى ٢٤ جنساً تنسب الى ثلاثة اسباط. اشجارها ونجيرات. اشخاصها صلبة صناعية. اوراقها ابيدة كاملة، بسيطة، متعاقبة، معققة، جامدة التصل. ازهارها عتقودية او عثكوية او عثقية التجميع، محورية الاوتكاز. ثمارها زيتونية او نووية الشكل منها المأكولة والطبية والصناعية.

Trigonelle (F).

١٩٥٣٣ - غَارِيَقَات

هي الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات.

Agaricus (S).

١٩٥٣٤ - غَارِيْقُون

Agaric (F). Agaric (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات. انواعه زهاء ١٠٠٠، اعطائها العالم على اختلاف اقاليمه الممتدة من خط الاستواء الى القطبين الشمالي والجنوبي. تعيش على الزبل والعلب وتختلف الاعضاء النباتية المنحلة وعلى خلاء السوق وقلفة الجفود... منطها جمالي يذو ويميت وبعضها لذيذ الطعم مأكول || اشهر انواعه ما يتبع.

١٩٥٣٥ - غَارِيْقُونُ احْمَد

Agaricus annularis (S). Agaric annulaire, Tête de méduse (F).

نوع من الغاريقون البري المؤذي الجمالي المادة الفعالة. يكثر في غابات واحراج جبال المناطق المعتدلة. يعيش ويتكاثر على اللحاء والاشخاش السائرة نحو الانحلال.

١٩٥٣٦ - غَارِيْقُونُ اغْرَش

Agaricus colubrinus (S). Agaric couleuvré, Couleuvrée (F). Toadstool (E).

نوع من الغاريقون البري المأكول. يكثر في اسراج البلاد المعتدلة. يعيش على مختلف المواد النباتية المنحلة.

١٩٥٣٧ - غَارِيْقُونُ عَسَلِي

Armillaire de miel (F). هو الطرخم، اطلمها.

١٩٥٣٨ - غَارِيْقُونُ قَتَال

Agaricus necator (S). Agaric meurtrier, Morton (F). نوع من الغاريقون البري الجحالي. مادته الفعالة شديدة الاذى تسمت. يعيش ويتكاثر على المواد المضوية المنحلة.

١٩٥٣٩ - غَارِيْقُونُ كِبْرِيَّي

Agaricus sulfureus (S). Agaric soufré (F). نوع من الغاريقون البري الجحالي المؤذي. يكثر في الغابات الظليلة. يعيش على المواد العضوية المتخمرة. لونه الى الصفار الكبريتي ويقع ويور عند اكال نمو.

١٩٥٤٠ - غَارِيْقُونُ مَحْرُزِي

Polyporus officinalis (S). Polypore officinal (F). فطر من السميات، يعيش على لحاء شوك واغصان الاشجار الحرجية.

Laurus nobilis (S).

١٩٥٤٤ - غَار \* رُتَد

Laurier d'Apolon, L. franc, L. commun, L. des poètes, L. sauce (F). Laurel, Roman laurel, Sweet-bay (E). Edle lorbeer, Ebler lorbeerbaum (D). Alloro, Lauro franco, L. regio, L. poetico (I).

نوع اشجار برية وتزيينية من فصيلة الفاريات. غروبها عديدة. سويتها تملو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها ابيدة، متعاقبة، معققة، سنائية الشكل. نصلها جاكه الصفحة الامنة، عايق الخصار، يطول من ٥ الى ١٤ سم. ويعرض من ٢ الى ٥ سم. ازهارها صفيرة القند، فضفية اللون، عثكوية التجميع، محورية الاوتكاز. ثمارها زيتونية الشكل والحجم، زرقاء اللون، سواد المواج، يستخرج منها زيت فاخر الصنف يدخل في صناعة الطوب. اوراقها قواسة العرف المعطري وهي طيبة، نقيها منه ومنشط اما كثره فمخدرة || وقد مثل النار دوراً مرموقاً في الزمان الغابر اذ كانت تضفر من افانها واوراقه اكاليل الحيد للفرقة الفاتحين.

١٩٥٤٥ - غَارُ احْمَر

Persée borbonica, P. carolinensis (S). Laurier Bourbon, L. rouge, Persée de Caroline (F). Borbon laurel (E).

شجرة برية وتزيينية من فصيلة الناريات. هيكلها جميل الشكل. ساقها تملو من ٨ الى ١٠ أمتار. اوراقها اعليجية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جامد الصفحة الامنة الشديدة الخصار القواسة العرف المنسحب. ازهارها جرسية الشكل، عثكوية التجميع، محورية الاوتكاز، فضفية اللون، ثلاثية التركيب، حليلة القمل والبلات. ثمارها حمضية الشكل والقند، زرقاء اللون، سود المواج، حمر الاذن || وهي من الاشجار البروتية التي تجود في جميع الارضية العميقة الغور، للمتوسطة الرطوبة.

١٩٥٤٦ - غَارُ شَيْخِي

Rosage d'Orient (F). هو عصلة الشرق، جنبة برية وتزيينية.

Persée indica (S).

١٩٥٤٧ - غَارُ هِنْدِي

Persée des Indes (F). شجرة برية وزراعية من فصيلة الفاريات. اشخاصها صلبة تصلح للصناعة. ساقها تملو من ٦ الى ٨ أمتار. اوراقها بيضيه مستطيلة؛ نصلها جامد الصفحة، جميل الخصار اللامع. ثمارها عنابية الشكل والقند، مأكولة، للذبة الطعم، تنفع الصدر.

١٩٥٤٨ - غَارُ وَرْدِي

هو المصل، اطلمها.

١٩٥٤٩ - غَارِب

Garrot (F). Withers (E). عضو من جسم الحيوان يكون ما بين العنق والصدر في الخيل وما بين العنق والسنام في البير. وهو الذي يقلى عليه خظام البير اذا ارسل ليرعى حيث شاء. ج غراب.

١٩٥٥٠ - غَارَاة

Sillago (S). Sillago (F). Sillago (E). جنس اسماك بحرية من شالكاك الزعانف وفصيلة الترخونيات انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها تمتد من البير الاجر الى الخليج والمحيط الهندي الى اجسامها مستطيلة الشكل، كبيرة القند، تطول من ١٠ الى ٩٠ سم. رؤوسها صفيرة اسفينية الشكل. عيونها صفيرة صامخة. زعانفها الظهرية الاول شرعية الشكل تحمل شعماً بالغة الطول. زعانفها الذيلية مقعرة. اثنائها الى الشقعة السوداء او الرمكة



غار



غار احمر



غاريقون احيد



غاريقون اغرش



غاريقون قتال



غاريقون كبري



غاريقون محزني





غاريقون مري



غاسترولوب



غاسول رومي



غافة



غاف



غاث غولاني



غاث

## ١٩٥٥١ - غاريقون مريه \*

الدالية من الكرم طالت ساقها وصمت وانتشرت .

## ١٩٥٥٢ - غافة \*

Galathea (S).

Galathea (F). Galathea (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات صفيحات الحياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ بعضها نهري والاخر يعيش عند مصبات الانهر . يكثر وجودها في النيل والنيجر || اصنافها شبه قيمة الشكل ، كبيرة القد ، متساوية المصاريع . ثامها ثنائية ، طويلة ، صنفرة || لها كاعة الصنف قل من يرغب فيها .

## ١٩٥٥٣ - غافة \*

Aristolochia (F).

هي الزراوند ، نبات يشبه المربون . ج غاف .

## ١٩٥٥٤ - غاف \*

Prosopis (S).

Prosopis, Prosopis (F). Musquit bean, Serew bean (E). Prosopis, Ahrenscheffe (D). Prosopis (I).

جنس الشجار ونجيرات برية ودرّانية من فصيلة القرزيات الفرافشة . انواعها عديدة ، مهددا الهند . سوقها فراء شائكة . اوراقها مركبة ، ريشية . وريقاتها شائعة سنانية . انوارها سبلي التجميع ، محوري الاوتكار . ازهارها صنفرة القد ، خافتة اللون ، مختلفة الالوان . ثمارها قرون رقيقة مستطيلة ، شبه مستديرة . بزورها بيضيه مفلطحة .

## ١٩٥٥٥ - غاثف \*

Agrimonia (S). Algreimolne,

Soubrette (F). Agrimony, Cockle bur, Liverwort (E). Kleiner Odermennig, Leberkraut, Agremomen (D). Agrimonia, Erba da audata (I).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البليات وفضيلة الزوديات . انواعها قليلة جميعها طيبة تفيد الالتهابات وغشاة العين || اشهرها الغاثف الغولاني .

## ١٩٥٥٦ - غاثف غولاني \*

Agrimonia eupatoria (S).

Algreimolne eupatoire (F).

نوع من الغاثف وهو نبات طبي بري معمر مبدول . اوراقه متعاقبة ، حركية ، وريته التجميع . وريقاته بيضيه الشكل ؛ نصلها بارز المروق ، من الحافة . ازهاره سبيلية ، حامية ، صفراء اللون ، تفيد غشاة العين والالتهابات انحصها التهاب الحنجرة .

## ١٩٥٥٧ - غاثق \*

Phalacrocorax (S). Cormoran (F). Cormorant (E).

جنس طير من فصيلة البجيمات وريته كليات القدم ، انواعه نحو ٤٠ منها الكبيرة الجثة والمتوسطة . طولا وروح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . الوانها عديدة الالوان تكثر فيها السمرة الخضراء المولج . مناقبها جالسة مستطيلة محدبة الجبهة الحادة || جميعها من طيور البلاد الباردة ولتندلة تعيش قرب الماء تألف الاخوان والشلوط السمرية . قوتها الاسماك الصغيرة . تدن بين السمور وفي الانجار انثاها تنضع من الى ه يبيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع .

## ١٩٥٥٨ - غاثق \*

Gallicthys (S). Dik البحر (F). Sea-cock (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفضيلة الاسقمريات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بحار

## ١٩٥٥١ - غاريقون مريه \*

Agaricus edulis, A. campestris (S). Agaric comestible, A. champêtre, Champignon de couche (F). Field agaric, Mushroom (E).

نوع من الفاريقون المأكول المشهور ، واسع الانتشار يزرع في المظفر . اسرامه عديدة ، الوانها مختلفة يكثر فيها الاصفر والاحمر .

## ١٩٥٥٢ - غاريقونيات \*

Agaricaceae (S).

Agaricaceae, Agaricinées (F). Agaricaceae (E).

فصيلة الفطور الغاريقونية من رتبة الدعاميات . اجناسها وانواعها عديدة منها المأكولة كالغاريقون ومنها المؤذية زراعي كالطمر والرائع والسلمة والشفيسة والكلوبية والكلتوبيب || تتميز بكمال شكل ظهورها التي ترتكب من قاعدة كروية تملوها ساق اسطوانية تكلها ارسية مستديرة . متبجها غزير المادة ، ليد التجميع ، وافر الحيف ، يتكاثر ويعد طولا كالحيطان المنفولة تملوها دمال صنفرة عدية الشكل تؤلف نواة الفطر وقاعدة اوتكارها .

## ١٩٥٥٣ - غاز \*

Gaz (F). Gaz (E).

هو احدى حالات المادة الثلاث . تتميز الغازات عن السوائل والاجسام الصلبة بقدرتها المطلق على التمدد . وهي تتأثر بالضغط والحرارة ولكل منها وزن وكثافة .

## ١٩٥٥٤ - غاز الكربون \*

ومن اسماه غاز كربونيك وحامض كربونيك ، هو ثاني اكسيد الكربون ، اطلبه .

## ١٩٥٥٥ - غاسترولوب \*

Gastrolobium (S). Gastrolobe (F).

جنس نباتات جنينية سرورية معمرة من سبط البدياريات وفصيلة القرزيات الفرافشة . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منها استراليا . معظها بري وبعضها ترابي . حياكلها جيلة القالب . سوقها فراء . اوراقها صنفرة مملقة متعاقبة . ازهارها عتقونية التجميع صفراء اللون او حمراء .

## ١٩٥٥٦ - غاسول \*

هو اثنان ابو ساق ، اطلبه .

## ١٩٥٥٧ - غاسول الفرنسي \*

هو الظهيرة البلبورية ، اطلبه .

## ١٩٥٥٨ - غاسول زمني \*

Euphorbia spinosa, Tithymalus diffus (S). Euphorbe épineux, Hippochaetes des grecs (F). Hippo-phalton (E). Pituisa (I).

جنبة برية طيبة من فصيلة البتونيوات ، صهارتها لبينة حارقة تحترق الشعر وتقتصد التمول . اعطائها جبال حوض البحر المتوسط || ساقها خشوية فراء . فروعها منتصبة شائكة . اوراقها حاشنة ، رعية الشكل ، صنفرة القد ، جامدة التصل . ازهارها فردية ، حامية ، غبراء اللون . بزورها مستطيلة ، مفلطحة ، حنطية اللون ، ناعمة القشرة زائدة التبدية .

## ١٩٥٥٩ - غاسول مصري \*

هو الظهيرة العنقية ، اطلبه .

## ١٩٥٥٠ - غاضيف \*

Chien de chasse (F).

Sporting dog (E).

الغاضف هو كلب الصيد من اي عرق كان . ج غضف .

الى الصفرة الزاوية . يكثر في المروج وفي المراعي الطبيعية . يقال انه يفيد الدرد وينشط السنن . وهو ينمّر الحليب ويستعمل في الصناعات الصباغية . صباغه احمر اللون .

### ١٩٥٦٦ - غَالِيُون صُتَيْبِي \*

Galium cruciata (S). Gailliet croisetete, Caille-lait croisetete, Croisette (F). Crosswort bedstraw, Maywort (E). Kreuzabakraut (D). Pittimbrosa, Croce delle macchie (I).

نوع من الغاليون البري الطبي . ساقه وفروعه واوراقه زباد . ازهاره صفراء اللون دقيقة الزناد . يستعمل في الصناعات الصباغية . صباغه احمر اللون .

### ١٩٥٦٧ - غَامَكة

Gamète (F). Gamete (E).

هي الجعطة اي الحلية التناسلية البسيطة الجبلية .

### ١٩٥٦٨ - غَالِط

Gadoué (F). Night-soil (E).

هو البراز او العذرة من الاسعد الضوية النشطة الخصبية .

متوسط ما يشمل من مواد رئيسية :

٩٠٪ . ازوت .

٧٠٪ . حاضن فسفوري .

٢٥٪ . بوتاس .

### ١٩٥٦٩ - غَالِيَّة

Téléologie (F). Teleology (E).

نظرية فلسفية ترتكز على الغاية . وكل عمل سببه الهدف .

### ١٩٥٧٠ - غَالِيْدِيَّة \* ، عَتْبَر كَشْمِيرِي ، نَاعُورَة

Gaillardia (S). Gaillardie, Gaillarde (F). Blanket flower (E). Malerblume, Kokardenblume, Burgunder (D). Galardo (I).

جنس نباتات عشبية زينة معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه وضروبه كثيرة العدد . اوراقها متعاقبة صغيرة القد سنانية النصل الضيق . ازهارها متراكبة الابوابي والاصفر . زراعتها التريينية شائعة ، تصلع في جميع الارربة والمواقع .

### ١٩٥٧١ - غِيَادَة

Téphrosie toxique (F).

Fish poison plant (E). هي الحوراء المسكرة ، اطمها .

### ١٩٥٧٢ - غِيَارِيَّة \*

Mespilus pyncnoloba (S).

Mespilus, Mespilier, Néflier des bois (F). Mespilus (E).

Mispel, Mispelbaum (D). Mespulo, Nespulo (I).

نوع من الاكيدنيا البرية من فصيلة الورديات . اعطائها بعض جبال البلاد الممتدة الحارة . يكثر ويدهوا في ارجاء الكريات وهي شجيرة شائكة تملو من مززين الى ستة امتار . اوراقها عاتلة ، اهليجية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ فصلها جامد النسيج ، بارز المروق ، خلي البشرة على صفحته السفل . ازهارها كبيرة القد ، صفر المأبر ، يفضى البتلات . ثمارها بنية اللون ، لحية السوذك ، حازنة الطعم ، تؤكل بعد المزاراة .

### ١٩٥٧٣ - غَبَّاش ٥

Photophobe (F).

Photophobus (E).

نعت تعريفي يطلق على كل من يخشى النور .

### ١٩٥٧٤ - غَبَّاش

Opatrum (S). Opatre (F).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة الدفشيات . انواعه نحو ٣٠ طوطا يراوح بين ٥ و ٨ سم . ثوارها عابقة يكثر فيها الاسود والاسمر والاغيث . ريقاتها طامسة ، غاشبة ،

للمناطق الحارة || اجسامها شبه معينية الشكل ، مبطلعة الجرم ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها شبه يرمية الشكل ، ماعمة الانعظام ، صغيرة الاشدائ . زناقتها الظهرية والشربية متعاقبة يملؤها مع الزناقات الحوضية بعض الالياف الخيطية المستطيلة الضفروية المادة . زناقتها الذيلية غارقة || حلوها كاعنة السنت ، قل " من يربب فيها || اعرف انواعها واشهرها الثوران التاليان :

### ١٩٥٥٩ - غَالُ الْمُتَوَسِّط

Gallichthys aegyptiacus (S).

Gal de la mediterrannée (F).

طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الشهية القضية . يكثر وجوده قرب الشطوط المصرية .

### ١٩٥٦٠ - غَالُ كَبِير

Gallichthys major (S).

Gal major (F).

طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الشفقة الذهبية الموج . يكثر وجوده قرب الشطوط الهندية .

### ١٩٥٦١ - غَالُ

الغال نبت . والغال ارض مطشنة ذات شجر . ج غلان .

### ١٩٥٦٢ - غَالِيُون

Galium (S).

Gailliet, Caille-lait (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية او معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منها البالية المرموعة والصباغية . ساقها مضلمة . رباعية . اوراقها ضمية ، متعاقبة ، صغيرة القد ، ضيقة النصل ، مدنية المقصة . ازهارها رباعية التركيب ، ابعية الارتكاز ، مستطيلة الزناد ، يكثر فيها اللون الاصفر || اشهر انواعه ما يتبع .

### ١٩٥٦٣ - غَالِيُون اَبْيَض \* ، لُصْفِي ، حَفِيْشَة

Galium aparine (S). Gailliet aparine, Grateron, Aparine, Rieble (F). Catch-weed, Cleavers, Goose grass (E). Klebelabkraut (D). Aparine, Asprella, Cappello daognosi (I).

نوع من الغاليون البري الطبي . ساقه فروع زباد . فروع

دقيقة ، منتصبية ، لينة . اوراقه جامدة النصل ، خلية

البشرة . ازهاره بيضاء اللون مستطيلة الزناد النحيل .

### ١٩٥٦٤ - غَالِيُون المَنَاقع \*

Galium palustre (S). Gailliet des marais, Caille-lait des marais (F). Marsh bedstraw, Water bedstraw (E). Sumplabkraut (D). Stellina ruvida (I).

نوع من الغاليون المروي البري يقال انه ينمّر الحليب .

يكثر في المنافع ويوجد في المروج الرطبة ، ترعاء الماشية

بشوة فيسبها ويسمن دودها .

### ١٩٥٦٥ - غَالِيُون حَقِيْقِي \* ، غَالِيُون اَصْفَر ،

بَقْلَة البَبْن

Galium verum (S).

Gailliet jaune, Caille-lait jaune (F). Cheese rennet, Yellow bedstraw (E). Echte Labkraut (D). Gaglio giallo, Erba zoffina, Erba nocca (I).

نوع من الغاليون المروي البري يقال انه ينمّر الحليب .

يكثر في المنافع ويوجد في المروج الرطبة ، ترعاء الماشية

بشوة فيسبها ويسمن دودها .



غال



غاليون ابيش



غاليون المنافع



غاليون حقيقي



غاليون صليبي



غاردييه



فبارية



غياش الكرمة



غير



خبرور



غير ون



غيشة التبغ



غيشة الدقيق



غيشة المالحان

١٩٥٨٥ - غشيس، غشيس Goniosoma (S).

Goniosome (F). Goniosoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلونيات مفتوحة المائدة. انواعه انواعه المروقة قليلة العدد جميعها صغيرة القند مستطيلة الشكل، فضية اللون او وردية || اعطائها بحار البلاد الحارة والمتحدة الحرارة اعصها البحر الاحمر والخليج || اشهر انواعها النيص الغفي الذي يكثر في التوتس.

١٩٥٨٦ - غشيشة Tenebrio (S). Ténébrion (F).

جنس حشرات خاضعة مؤذية من فصيلة النيشيات. انواعه نحو ٢٠ اشكالها واحجامها واثرها مختلفة. تعيش على بعض المواد النباتية منها الحبوب والبقول والجذور || اعرف انواعه واضرها ما يلي.

١٩٥٨٧ - غشيشة التبغ \* Platyscelis gages (S).

Ténébrion du tabac (F).

نوع من الغشيشة وهي خنفساء فضية الشكل مفلطحة طولها نحو ١٠ سم. ثوبها سوي السواد، فضي المواجه الاعم. تركب شتول التبغ الفتية تفرق السورق عند سطح التربة. تكافح باستعمال اسد الحواشير الفعالة تمفيرا على التربة والنبات.

١٩٥٨٨ - غشيشة الدقيق \*، تريولوم ميهمة

Tribolium confusum (S). Tribolium confus, Ténébrion confus (F).

حشرة من الغشيشات صغيرة القند مفلطحة. طولها نحو ٤ سم. لونها الى الكسني المايق يطولو موج احمر. تعيش على المواد المضوية في المساحن وتخازن الحبوب والبقالة. رقتها دقيقة، غراء، مستطيلة، حليبة الجسم تعيش كالشجرة على الدقيق والحبوب المكسوة.

١٩٥٨٩ - غشيشة المالحان \*

Tenebrio molitor (S). Ténébrion meunier, Ver de farine (F). Mealworm (E). Mehlkäfer (D).

خنفساء من الغشيشات، جسمها مستطيل الشكل مبسط، طولها نحو ١٥ سم. ثوبها الى البني الاسفع المالح. تعيش في المالحان والافران. رقتها تسمى دودة الدقيق.

١٩٥٩٠ - غشيشة ٥ Pellicuda (F). Pellucid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو نصف شفاف.

١٩٥٩١ - غشيشة ٥ Pellicudité (F).

Pellucidité (E).

اللبشرة صفة ما هو غشيش او منفيش.

١٩٥٩٢ - غشيشات

Tenebrionidae (S).

Ténébrionidés (F). Darkling beetles (E). Schwarzkäfer, Schattenkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ منظمها من الحشرات غير المؤذية. اشكال خنفساها مختلفة تكثر فيها الاستطالة ويختلف اللون الاسود. قربها الاستعمارية مركبة من ١١ فصلة. اراسع جرمها الامامية والوسطى خماسية المقل اما الخلفية فرباعية || تألف الاماكن والمواقع المظلمة والاقبية وما اشبه. تعيش على بقايا المواد المضوية والنباتية. رقتها دودة الشكل تعيش في التربة على المواد النباتية والمضوية المتحللة او في دور الاغفل. اشهر اجناسها الازيدا والنباش والديني والنباش والافيتوفاغوس والشلوس والميلازيا.

تعيش على جلور بعض النباتات البرية والزراعية اعصها الكرمة || اشهر انواعها غياش الكرمة.

١٩٥٩٥ - غشيش الكرمة \*

Opatrum sabulosum (S). Opatre sablonnier (F).

نوع من الغياش طولها نحو ٨ م. ثوبه الى السواد الداكن. يعيش في الارربة الرملية القليلة الانساج. يركب مع رقاته جلور الكرمة فيؤذيها.

١٩٥٩٦ - غشيان، ريان Scarus ghobban (S).

Scaré vert (F). Ghobban scar-fish (E).

سمكة بحرية من بنات مصقار. توجد في المتوسط وفي بحار البلاد الحارة. ثوبها الى الربيعة الخضراء الزاوية. يقال انها لا تتوكل في زمن مرض المرجان لما قد يحويه لحمها من مواد سامة مؤذية.

١٩٥٩٧ - غشيب، غشيب، بلدوم Fanon (F).

Dewlap (E).

ثني جلدي تحت عتق البقرة.

١٩٥٩٨ - غشير \* Merlangus (S).

Merlan (F). Whiting (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النادسيات. انواعه المروقة حصة تتميز باجسامها المستطيلة الشكل ويحرفها النحلة الرقيقة. طولها ما كولة. اكبادها وافر الماددة الزيتية. جميعها من الاعاكن القترسة البهمة. تألف السمق وتعيش اسرابا وافر العدد || اشهر انواعه الثلاثة التالية.

١٩٥٩٩ - غشير المتوسط \* Merlangus puntassu (S).

Merlan pontassou, Pontassou (F). Pollack (E).

نوع من الغشير يكثر في بحار البلاد الافريقية اعصها المتوسط والاطلس.

١٩٥٩٠ - غشير شائع Merlangus vulgaris (S).

Merlan commun (F). Common whiting (E).

نوع من الغشير يوجد في معظم بحار العالم. يكثر في المحيط الاطلسي قرب الشواطئ الافريقية والاوربية.

١٩٥٩١ - غشير قشحي \* Merlangus carbonarius (S).

Merlan noir, Charbonnier (F). Coal-fish (E).

نوع من الغشير يكثر في مياه بحار الشمال وفي البحر الاسود وفي المياه الاقليمية الممتدة من اليونان الى اسبانية.

١٩٥٩٢ - غشيرة هي الارلنتيوم، اطبله.

١٩٥٩٣ - غشيرور \* Endrepanis (S).

Endrepanis (F).

جنس طير من الجوارم رقيات المناقير وفصيلة المغريات. انواعه المروقة قليلة العدد. اعطائها جزر الفيليبين || اجسامها صغيرة القند، مستطيلة المائدة الرقيقة، صغيرة الاساغب الدقيقة والاذان المستديرة الاطراف. اثارها تختلط بين الذكور والاناث || اشهر انواعها واجلها غرور صنتير. ثوب الذكر الى الصفار المذهب. جناها وذنبه الى البنفسجي. راسه الى الخضراء الاسفع. قفنه الى الحمرة الارجوانية.

١٩٥٩٤ - غشيرون \*

Exale factoria (S).

Caillie naine (F). Dwarf quail (E).

جنس طير من عمارة الحجلبات وفصيلة الطيوريات. انواعه المروقة اربعة مظهرها الشرق الانسي. تشبه الباني بشكلها وثوبها غير اشيا اصفر قدا وافتح ثوبا واقل طيرا، تألف السهل والادغال وتدن في الفصوص كالسائي.

## ١٩٦٠ - عُصْفَاء الهِنْد (F). Sorbier des Indes

شجرة من الفيراء مشهورة باسم عُصْفَى ، الحلبا .

## ١٩٦١ - عُصْفَاء اليابَان (S). Sorbus japonica

Sorbier du Japon (F).

نوع من الفيراء وهي شجرة حرجية سرىوتية مهددا باليأس .  
تتلون من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها مفصصة ، بيضبة ، ذلقة .  
تطوّل من ٧ إلى ١٢ م . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . نصوصها  
صغيرة ، ضيقة ، مسنة الحافة . نصلها خلى الصفعة  
السفل ، كبير المروق التي يراوح عددها بين ١١ و ١٣  
زويبا || أزهارها بيض . ثمارها بيضبة الشكل ، ارجوانية  
اللون ، منشرة بالاييض .

## ١٩٦٢ - عُصْفَاء امْرِيكَة (S). Sorbier d'Amérique

(F).

نوع من النيراء وهي شجرة سرىوتية حرجية وريضية . أصلها  
بلاد امريكة الشمالية . تتلو من ٤ إلى ١٠ أمتار . أوراقها  
مركبة وريعية التجميع . وريقاتها احليجية ذلقة تطوّل  
من ٢ إلى ١٠ م . وعددها يراوح بين ٩ و ١٧ .  
أزهارها كبيرة القذ ، غبراء اللون . ثمارها حامزه الطعم .  
زاهية الحمرة الارجوانية ، كروية الشكل ، قطرها يراوح  
بين ٨ و ١٠ م .

## ١٩٦٣ - عُصْفَاء بَرْيَة \* ، عُصْفَاء مُنْصَحَصَة

Sorbus torminalis (S). Sorbier torminal, S. alster, Alster (F). Wild service tree, Chequer tree (E). Wilder Elsbeerbaum (D). Sorbezzolo, Ciavardello (I).

نوع من الفيراء وهي شجرة حرجية سرىوتية شائعة تتلو من  
١٠ إلى ٢٠ م . أوراقها مفصصة ، مائلة للبشرة ، عديدة  
المروق . نصوصها ضيقة لا متساوية العمق . عددها  
يراوح بين ٥ و ٩ || بتلات أزهارها فائقة ، بيضاء  
اللون . ثمارها كروية ، مقطوعة الطرف ، حمراء اللون ،  
قطرها نحو ١٥ م .

## ١٩٦٤ - عُصْفَاء ذَرِيْعَة

Sorbus cuspidata, Sorbus vestita (S). Sorbier cuspidé (F).

نوع من الفيراء وهي شجرة سرىوتية برية وريضية ترغب  
في الموامع الباردة . تتلو من ٣ إلى ٥ أمتار . ساقها  
واغصانها وفانداها وفانثها مزرقية البهاء ، زغبها لبد التجميع  
قطني الشكل والون || أوراقها احليجية ذرية تطوّل من  
١٠ إلى ٢٣ م . وتعرض من ٤ إلى ١١ م . نصلها خلى  
البشرة عل صفحتي . حثاره ثنائي القستين ، عادم التضصيص .  
ثمارها كروية الشكل ، مقطوعة القاعدة والطرف ، ارجوانية  
اللون ، صفراء المواج .

## ١٩٦٥ - عُصْفَاء سَوْدَاء الثَّمَر

Sorbus melanocarpa (S). Sorbier à fruits noirs (F).

نوع من الفيراء وهي جنبة معمرة برية وريضية تتلو من  
١٠٠ إلى ١٥٠ م . انثادها وانثانها زهاب السماء . أوراقها  
بيضبة مستطيلة . نصلها جامد التسج ، مسن الحافة .  
خلى الصفعة السفلى . ثمارها كروية الشكل مقطوعة  
القلطين ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١١ م . لونها ال  
السواد اللامع .

## ١٩٦٦ - عُصْفَى فَيْحِي \* ، رُوْبَاص

Goniosoma sphaerana, Argentina sphaerana (S). Goniosoma argentin, Argentine vulgare (F). Common argentine, Silver-fish (E).

نوع من البص . سمكة بحرية بيض من السلونيات .  
أصلها من مناطق البحر الاييض المتوسط || سرسها  
الانواط . لا تقرب من الشطوط والمجاذب الا في زين  
السرقة الذي يمتد من اوائل شباط الى اواخر آذار || جسمها  
شبه ريشي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . رأسها  
عروطي التورن . لها واسع الشدق الذي ينتهي تحت العين .  
منعشها البليظة غارقة . سفها كبير القذ ، ناضض تحسه  
كل عام . ثوبها فضي اللون يلمع كمرق القز . ظهرها  
زيتي الفشار || لها متوسط الصفن ، مأكول || تصاد  
من أجل الشحاشح القزوي الذي يملو جسمها وثانها لانه  
يدخل في صناعة تقليد القز .



عُصْفَى

## ١٩٥٤ - عُصْبَط ، عُصْبَط (E). Loose sheaf (F). Javelle

بضع قبضات مجومة من الزرع المحصد . والنطوب المكسدة  
تدعى علم ، راجعها .

## ١٩٥٥ - عُصْبَب هو البلمد ، الحلبه .

١٩٥٦ - عُصْبَن ، عُصْبَن (F). Fraude, Tromperie

(E). Fraud, Cheat

الغب والغب : الخديعة في البيع والشراء .

## ١٩٥٧ - عُصْبِيْدَة

Lonchocarpus (S).

Lonchocarpus, Cubé (F).

جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة القرنيات  
القرافية . منبها البلاد الحارة والاشترافية . يستخرج من  
جلورها مادة الروتينون التي تستعمل في اباداة الحشرات .

## ١٩٥٨ - عُصْبِيْرَاء ، صَرْبِيَة (F). Sorbus (S).

جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات  
انواعه عديدة مهددا بالام . أوراقها عابلة متعاقبة . أزهارها  
نورية التجميع . ثمارها تفاحية الشكل . صغيرة القذ ،  
مرجانية اللون ، حامزة الطعم ، يستخرج منها بعد التخثير  
والتعطير مشروبات كحولية لا بأس بها || اما متوسط  
ما تحويه ثمارها من عناصر مفيدة فهو .

مواد ازوتية % ٧

غلوكوز % ١١

نضفات % ١

حامض تفاحي % ٠,٦٤

فيتامين ث % ٢,٥

... % ٢,٥

اغصانها صلبة خضراء ، ناعمة الرقعة تستعمل في صناعة  
التزييل || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

## ١٩٥٩ - عُصْبِيْرَاء الحَاطِلِيْن \* ، شَجَرَة السِّمْن

Sorbus aucuparia (S). Sorbier des oiseleurs, S. des oiseaux, S. sauvage, Cochène (F). Mountain ash, Rowan (E). Gemeine Eberesche, Eberesche Vogelbeere (D). Sorbo salvatico, Sorbastrello, Timolina (I).

نوع من الفيراء وهي شجرة سرىوتية برية شائعة تتلو من  
١٢ الى ١٦ م . انثادها وانثانها واراقها خلية . أوراقها  
مركبة وريعية التجميع ، وريقاتها سنانية ، ذلقة ، مسنة الحافة  
عددها يراوح بين ١١ و ١٧ || أزهارها كروية الرائحة .  
لثائية أو رباعية الاقلام . ثمارها ارجوانية كروية ، قطرها  
نحو ١٠ م .



غير ارم الحاطلين



غير ارم برية



غُيَّرَاءٌ مَبْدُولَةٌ



غُيَّةٌ



غُرْفَانٌ



غُرْدَةٌ



غُفَيْتٌ

## ١٩٦١٤ - غُفَيْتَةٌ \*

Fontinalis (S).  
Fontinale (F). Fontinalis (E).

جنس طحاب من فصيلة المرنجيات . أنواع المروقة قليلة العدد منها مجاري الماء والناتق في البلاد المحذلة الحارة . جميعها من الطحاب الشطئية الممر . سقها دقيقة كاسية فراء . اكياس بولها تاجية الارتكاز .

## ١٩٦١٥ - غُفَالٌ \*

Ecallure (F). Scaling (E).

التال القشار الادمي او الحرفشي الذي يلف الجسم عند بعض الحيوانات اخصها الزحافات .

## ١٩٦١٦ - غُفْرَافٌ \* ، طَائِرُ الْغَيْثِ \*

Saurothera (S). Saurothère, Oiseau de pluie (F).  
يدعونه طائر الغيث لانه يبشر بقرب المطر عندما يسبح البطاح الى الغابات والاشراج الطويلة || جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المروقة ستة موطنها يمتد من الهند الى جزر الانتيل . ملجها الحياتي جماعي . بعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والديدان والثمار واليزور || اجسامها طول من ٤٢ الى ٤٨ سم . بما فيه الذنب || رؤوسها مستدلة الجسم . مناقدها مستطيلة ، بيضاء الاحدياب . اجنتها ذلقة . اذناها بالغة الطول ، مستديرة الاطراف ، مجذعة بثلاثة خطوط سود معترضة يتالحها يتيج ابيض . اوتها متراكبة الاوران فيها الاخضر والاصفر والاشفق والابخر والايض والاسيد || تفتح اعشاشها في الاشجار الرقيقة . اناثها تحسن من ٣ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما تقوم بها الاناث دون الذكور التي تكون لها الغذاء .

## ١٩٦١٧ - غُفْرَدَةٌ \*

Guettarda (S).  
Guettarde, Guettardie (F).  
جنس طيور وجنبا برية طيبة من فصيلة الغريات . انواعها المروقة ١٥ اطلانها بعض المناطق الاستوائية الاسيوية والارريقية || سقها فراء . اوراها متقابلة ، معتقة ، اذنية . نصالها جامدة يضيئ الشون او سناية . ازغارها محوري الارتكاز . ازغارها زنادية ، ثنائية او ثلاثية التجميع ، انبوية الكأس ، فارشة البتلات ، عطرية العرف . ثمارها نوية ناشفة . اشهر انواعها الثلاثة التالية :

## ١٩٦١٨ - غُفْرَدَةٌ اَنِيْقَةٌ \*

G. formosa (S).

قشورها مطهرة تستعمل لدمل الجروح والقروح .

## ١٩٦١٩ - غُفْرَدَةٌ لَنَالِيَّةُ الْمَسْكَنِ \*

G. dioica (S).

تقع قشورها دافع لسمي .

## ١٩٦٢٠ - غُفْرَدَةٌ مُلَقِيَسَةٌ \*

G. ambigua (S).

تقع قشورها مقو منشط .

## ١٩٦٢١ - غُفَيْتٌ \*

Corœba cyanea (S).  
Guil-guit bleu, Oiseau bleu (F). Guil-guit, Bluebird (E).

طائر من فصيلة المغريات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يأنف الحياة الجماعية . يبشر في الاحراج ويسطر على الثار الناضجة في الجنان والحدائق || جسمه مثير اللد ، رشيق القوام ، يطول نحو ١٢ سم . توبه جميل

## ١٩٦٠٦ - غُيَّرَاءٌ صَيَوَالِيَّةٌ

Sorbis umbellata, Pirus meridionalis (S). Sorbier en ombelles (F).

نوع من الغيراء وهي شجرة سروية برية وتزيينة تملو من ٣ الى ٦ امتار . هيكلها صيواني الشكل . اوراها مفصصة مستعرضة تطول من ٥ الى ٧ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ سم . نصلها خلي الصفة الغفل ، حثاره ثنائي التنسين || ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

## ١٩٦٠٧ - غُيَّرَاءٌ فِنْلَنْدِيَّةٌ

Sorbis fennica (S). Sorbier finlandais (F).

نوع من الغيراء وهي شجرة برية وتزيينة مهدا فلندة . ترغب في الاقاليم الباردة . تملو من ٥ الى ١٢ م . اوراها مركبة تطول من ٨ الى ١١ سم . وتعرض من ٤ الى ٧ سم . نصلها عديد المروق خلي البشرة ، اريد الصفة السف . ثمارها مأكولة ، قليلة الحموضة ، برقالية اللون ، كروية الشكل ، قشورها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم .

## ١٩٦٠٨ - غُيَّرَاءٌ مَبْدُولَةٌ \* ، غُيَّرَاءٌ مَعْرُوفَةٌ

Sorbis domestica (S). Sorbier domestique, Cornier (F). Common service tree (E). Echter Spierling (D). Sorbo domestico, Sorbo gentile (I).

نوع من الغيراء وهي شجرة سروية برية مبدولة تملو من ٣ الى ١٢ م . براعمها لزجة . اوراها مركبة وتريه التجميع وريقها سناية ذلقة تطول من ٤ الى ٥ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢١ سم . نصلها يبلو خلي البشرة ثم يفقد الخمل مع العمر || ازغارها غيراء اللون ، خلسية الاقلام . ثمارها اجاصية الشكل مأكولة ، تطول من ٥ الى ٣٠ سم . لوها الى الصفرة يعلوها توشيح احمر ونشة سمره .

## ١٩٦٠٩ - غُيَّرَاءٌ مَعْتَبِيَّةُ الْوَرَقِ

Sorbis alnifolia (S). Sorbier à feuilles d'aune (F).

نوع من الغيراء وهي شجرة حرجية سروية مهدا اليابان . تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراها بيضية ذلقة ، تشبه اوراق المثلث . تطول من ٦ الى ٨ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها اخضر الصفحتين ، مسن الحافة . ازغارها يبيض . ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية اللون صفر المولج . تطول نحو ١٢ سم .

## ١٩٦١٠ - غُيَّرِيَّةٌ

Spore

هي البوغ ، اطلبه .

## ١٩٦١١ - غُيَّرِيَّاتٌ

Sporozoa (F).

Sporozoa (E).

هي البويضات ، اطلها .

## ١٩٦١٢ - غُيَّرِيَّاتٌ بُوْغِيَّةٌ

Microsporidies

هي البويضات الطفيلية التي تمش على الحشرات والقشريات .

## ١٩٦١٣ - غُيَّرِيَّةٌ \*

Eremobium (S).

Eremobie (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المروقة قليلة العدد جميعها من نبات بعض مناطق حوض البحر الاييض المتوسط || سقها قصيرة ، فراء ، كثيفة الزغب المستطيل . اوراها متراكبة ، ضيقة النصال ، شبه صفيصة الشكل . ازغارها صغيرة ، وردية اللون . تنويرها ديبسي .

الآتربة الجصية وتُزَعَن فيها العمل والطمع || اجسامها قريبة الشبه بأجسام ذكور النحل. قرونها الاستشعارية مستطيلة. ظهورها وبطنها كثيفة الزغب. أنوثها تختلف مع اختلاف الأنواع.

### ١٩٦٢٨ - عُثْرِي

الثعري والعثري من الزرع هو الذي تسقيه السماء. ويدعى العذي.

### ١٩٦٢٩ - عُجُوم

Gobio (S).  
Goujon (F). Gudgeon (E).  
جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات. أنواعه قليلة جميعها بُنْمَةٌ قُرْبُها الديدان والدماعيس والقشريات وهي مستطيلة الشكل والمذبات. اعطائها بحيرات البلاد الاسيوية والاروپية تنجهرها الى الانهار في زمن السرم وقد يكون ذلك في اواسط الربيع ثم تعود اليها في اواخر الصيف || اشهر انواعه النجوم الشائع.

Gobio fluviatilis (S).  
Goujon commun (F). Common gudgeon (E).  
نوع من النجوم وهو سمكة نهريه تطول نحو ٢٠ سم. جسمها مستطيل الشكل، زعانفها كبيرة، عذيتها متدليتان. ثوبها الى الريدة القفصية، ظهرها متتابع التجذيع الاسمر. ترطب في المياه العذبة الصافية. سرورها يستمر من ايار الى اواخر تموز. تنزع بانفاتها فوق الصخور فتلتصق بها وتبقى الى ان يتم التقف وقد يكون ذلك بعد السرم باربعة او خمسة اسابيع. لحمها اللذيذ الطعم مرغوب فيه.

١٩٦٣١ - عُذْكَار \*، عُزْز \*، قَرْدَبِ المتافع،  
عَصَا الراعي الزبابة  
Polygonum lapathifolium (S). Renouée à feuilles de patience (F). Pale persicaria, Willow weed (E). Ampferknöterich, Filzknöterich (D). Persicaria, Erba pepe (I).  
نوع من القردب وهو نبات بري متقبي ممر. ساقه فروع تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. فروعه دقيقة زبابة اللحم. اوراقه سنانية حماضية الشكل تطول من ٣ الى ٨ سم. نصلها خلي البشرة، احمل الحصار. ازهاره سنبل التجميع. سنابله تطول من ٨ الى ٨ سم. ازهاره وريدي اللون.

١٩٦٣٢ - عُذْكَارَة \*  
Apistus (S). Apiste (F).  
سمكة بحرية من شاذكات الزعانف وفصيلة الطرغيات. اعطائها تشمل جميع بحار المناطق الاستوائية والحرارة || جسمها بطول من ٣ الى ٥٠ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها ممتاحتان. شقها متدلل الرخابة. عذيتها صغيرتان. ثوبها الى الريدة القفصية المتفاوتة الامجات الاسمر. زعنفتان الظهرية كبيرة، مستطيلة، شاذكة المناخس. الذيلية مستديرة الطرف. الشرجية ثلاثية المناخس الحادة. الصدوية مستطيلة كالجناب وهما اثنتان تسعين بهما القفز فوق الماء || لحمها متوسط الصفت، مأكول.

١٩٦٣٣ - عُذْكَاف \*، عُذْكَاف، عُزْوَاب القيط  
Corvus frugilegus (S). Corbeau freux, C. chauve, Freux (F). Rook (E).  
غذاف وغذاف ج غذفان. طائر من الغربان متوسط الحجم طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السواد الالامع المبرج، ريشه يلس بحمرة. منقاره ورجلاه الى الرمادي الاسمر || وهو

الاولان الساطعة. وداؤه الى الزرقعة الجسيلة. جناحاه وذنبه واعلى ظهره الى السواد الاسمر الالامع. عوافي قوادمه وياهره زرقا الصغار الزاهر. منقاده دقيق مستطيل. حلقه عينه زرقا اللون. جناحه ذلق الطرف. ذنبه قصير الجرم، فارق الطرف. ريشه دقيق المحلل اللون || طيرانه خفيف الحركة. قوته السمل والحشرات الصغيرة والبار الياينة || يذئن مثل في الاشجار الغناء الاربعة الطل. الاثنى تقص ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

### ١٩٦٢٢ - عُثِل

يقال عُثِل الحرج اذا كثر فيه الشجر وكذلك الخديقة واي مكان كان.

### ١٩٦٢٣ - عُثْ

نبت يتخيز حبه ويؤكل في الجذب. حبه يشبه الجالورس. وهو من تجيل السباغ (اللسان).

### ١٩٦٢٤ - عُثْكَاء

هو الحسا، الحلبه.

### ١٩٦٢٥ - عُثْكَات \*٥

Capito (S).  
Capito (F). Capito (E).  
الاسم العلمي من اللاتيني يعنى غليظ الرأس. جنس جميع من فصيلة الثنائيات. انواعه المعروفة نحو ١٧ جميعها من علم امريكا الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٧ سم. رؤوسها غليظة. مناتها عذرية غزوية الشكل. شليمه. سبالها كثيفة. تتميز بنباتين الاتواب بين الذكور والاناث. اثواب الذكور متراكبة الاولان الجسيلة، يكثر فيها الاخضر ثم الاحمر والاسود والاصفر. الاثاب عادمة الاحمر الاخضر والاصفر اجتمعت صغيرة، ذلقة الاطراف. اذناها مقطوعة || قوتها الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها || تدئن اعشاشها في تجاويف الاشجار وصدوعها. اناثا تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوما.

### ١٩٦٢٦ - عُثْكَائِيَّات \*٥

Capitonidae (S).  
Capitonidae (F). Capitonidae (E).  
فصيلة طير من المتشقات. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية والحرارة من المالحين القديم والجديد || طيورها صغيرة القد او متوسطة، جملة الاولان المتناحلة والمتراكبة. تتميز بكثافة سبالها التي تمتد، في بعض الانواع، حتى الزور. مناتها غليظة تمتد غزوية الشكل. اجتمعت محدلة الطول او قصيرة. اذناها مقطوعة او مستديرة. قوتها قصيرة، شديدة النشط || طيراتها قصيرة الشوط. تتساق الاشجار خفة اما انتقاما على الارض فيطير. || تدئن اعشاشها اما في تجاويف الاشجار او في محاجر تحفرها في التربة || اشهر اجناسها الثغاث والبربكان والقطرطوف.

### ١٩٦٢٧ - عُثْكَارَة \*٥

Eucera (S).  
Eucera (F). Eucera (E).  
جنس حشرات جارسة لافعة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النورديات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. قوتها رقيق الازهار ويكبرها. مليتها الحياتي جماعي، جاعاها قليلة العدد تتألف من ذكور واثان تشمل سوية في سبل الحياة والبقاء. تنهي عشائوها على الحيطان وفي



عُثَات



عجوم شائع



غذاف



عُذْكَارَة



غذاف

١٩٦٥ - غُدَّة سَعْتَرِيَّة ، غُدَّة صَعْتَرِيَّة  
Thymus (F). Thymus gland (E).

هي غدة العنق السفلى في الحيوان .

١٩٦٥١ - غُدَّة سِفَاتِيَّة  
Glande copulatrice (F).  
Copulatory gland (E).

١٩٦٥٢ - غُدَّة شَرَجِيَّة  
Glande anale (F).  
Anal gland (E).

١٩٦٥٣ - غُدَّة شَعْرِيَّة  
Bulbe pileux (F).  
Hair-gland (E).

١٩٦٥٤ - غُدَّة صَيَّاء  
Endocrine, Glande close (F).  
Endocrine, Ductless gland (E).

١٩٦٥٥ - غُدَّة صَنْوَبَرِيَّة  
Apophyse (F).  
Apophysis (E).

هي الشرنوب ، اطليه .

١٩٦٥٦ - غُدَّة صَرَعِيَّة  
هي البدة اللثوية .

١٩٦٥٧ - غُدَّة عِجَالِيَّة  
Glande périnéale,  
G. périnéenne (F). Perineal gland (E).

١٩٦٥٨ - غُدَّة قَلَوِيَّة  
Glande alcaline (F).  
Alkaline gland (E).

١٩٦٥٩ - غُدَّة كُنُوبِيَّة  
Glande conglobée (F).  
Conglobate gland (E).

١٩٦٦٠ - غُدَّة كِلْسِيَّة  
Glande calcifère (F).  
Calciferous gland (E).

١٩٦٦١ - غُدَّة لَاحِقَة  
هي الغدة الاضافية .

١٩٦٦٢ - غُدَّة لُعَابِيَّة ، لَوْزَة الرُّضَاب  
Glande salivaire (F). Salivary gland (E).

١٩٦٦٣ - غُدَّة لُفَافِيَّة ، غُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة  
Glande lymphatique (F). Lymph gland, Lymphatic  
gland, Lymphaden (E).

١٩٦٦٤ - غُدَّة مَحْبِيَّة  
Glande vitelline (F).  
Vitelline gland (E).

١٩٦٦٥ - غُدَّة مَخَاطِيَّة  
Glande muqueuse (F).  
Mucous gland (E).

١٩٦٦٦ - غُدَّة مَرِيئِيَّة  
Glande œsophagienne (F). Oesophageal gland (E)

١٩٦٦٧ - غُدَّة مَصْلِيَّة  
Glande séreuse (F).  
Serosus gland (E).

١٩٦٦٨ - غُدَّة مَعِدِيَّة  
Glande gastrique (F).  
Gastric gland (E).

١٩٦٦٩ - غُدَّة نُحَامِيَّة ، غُدَّة بَلْعَمِيَّة  
Glande pituitaire, Hypophyse (F). Pituitary gland,  
Hypophysis (E).  
هي غدة قاعدة اللقح .

١٩٦٧٠ - غُدَّة نَسَالِيَّة  
Glande du byssus (F).  
Byssus gland (E).

١٩٦٧١ - غُدَّة نَكْفِيَّة  
Glande parotide (F).  
Parotid gland (E).

١٩٦٧٢ - غُدَّة هَضْمِيَّة  
Glande digestive (F).  
Digestive gland (E).

١٩٦٧٣ - غَدَد  
الغدد هو طاعون الايل .

من القواطع يجوب الشرق الادنى واروپة وافريقية الشمالية والشرقية . يأتلف الحقل والسهول المزروعة الميمنة الانجار . قوته الحشرات والديدان والحبوب . يذفن عشه في الانجار . اثناء نضج من ٣ الى ٥ بيضات تحفظها وسعها . يعتبر من الطيور الغارة لانه يلتهم البذار ويتقيى على الحب الناتش .

١٩٦٣٤ - غُدَّة كَالِه ٥  
Anisogamie (F).  
Anisogamy (E).

الندافة احلى طرائق الانسال الشقي ؛ تتميز ؛ عذافياً ، بتباين الفامات الودائية الذكرية والانثوية من حيث الشكل والحجم والرتل .

١٩٦٣٥ - غُدَّة  
Glande (F). Gland (E).  
عضو في الجسم يفرز مواد خاصة كالكباب والدمع والعرق والحليب الخ .

١٩٦٣٦ - غُدَّة اِضَافِيَّة ، غُدَّة لَاحِقَة  
Glande accessoire (F). Accessory gland (E).

١٩٦٣٧ - غُدَّة الرِّحِيْق ، غُدَّة المِغْثَر  
Nectaire (F). Nectary, Honey-cup (E).

عضو غدي يتميز به بعض الازهار يفرز عصارة سكرية تدعى الرحيق او مغثر الزهر يجربها النحل .

١٩٦٣٨ - غُدَّة العَرَق  
Glande sudorifère, G. sudoripare (F). Sudoriferous  
gland, Sudoriparous gland (E).

١٩٦٣٩ - غُدَّة اِنْتِجَارِيَّة  
Glande lysigène (F).  
Lysigenous gland (E).

١٩٦٤٠ - غُدَّة بَلْعَمِيَّة  
هي البدة النخامية .

١٩٦٤١ - غُدَّة تَسَالِيَّة  
Gonade (F). Gonad (E).

هي المنسل ، اطليه .

١٩٦٤٢ - غُدَّة ثَوْبِيَّة  
Glande moriforme (F).  
Moriform gland (E).

١٩٦٤٣ - غُدَّة ثَدِيَّة ، غُدَّة صَرَعِيَّة  
Glande mammaire (F). Mammary gland (E).

١٩٦٤٤ - غُدَّة حَمْضِيَّة  
Glande acide (F).  
Acid gland (E).

١٩٦٤٥ - غُدَّة دَبْرِيَّة  
Glande uropygiale (F).  
Uropygial gland (E).

١٩٦٤٦ - غُدَّة دَرَقِيَّة  
Glande thyroïde (F).  
Thyroid gland (E).

١٩٦٤٧ - غُدَّة دُهْنِيَّة  
Glande sébacée (F).  
Sebaceous gland (E).

١٩٦٤٨ - غُدَّة ذَمَطِيَّة  
Glande uropygiale (F).  
Uropygial gland (E).

البدة النسلية غدة ، مركزها في الزنك اي القطن ، تفرز مادة دهنية يستعملها الطائر في سقل ريشه . وتسمى ايضاً غدة دبورية .

١٩٦٤٩ - غُدَّة رَحِيْقِيَّة  
Glande nectarifère (F).  
Nectariferous gland (E).

انواعه عديدة . سوقها فراء . فروها زيباء اللحم . اوراقها منقطة ، ضمية ، ثلاثية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل . مقر الصفحة . انزهارها سبيل التجميع ، طرفي الأبركار . انزهارها خشوية ، صغيرة القد ، صفراء اللون ، خضراء الملمح .

Scyllium (S). **عُرَاب** ١٩٦٨٨  
Roussette, Chien de mer (F). Dog-fish (E).  
جنس اسماك بحرية من القرشيات . انواعه المعروفة قليلة . اجسامها مستطيلة رشيقة . جلودها خشية مدببة الحراشف . لحوبها مأكولة متوسطة الصنف || اعرفها واشهرها الفراء المنشقة والفراء المدبجة .

Scyllium catulus (S). **عُرَابٌ هُدْبَجَة \*** ١٩٦٨٩  
Roussette à grandes taches (F). Lesser spotted (E).  
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الصبغة الصفراء ، يملؤها تديج لا يقاسي الرقشة واللون تكثر فيه الاستدارة والسواد البنفسجي المواج .

Scyllium canicula (S). **عُرَابٌ مُنْمَشَة \*** ١٩٦٩٠  
Roussette à petites taches (F).  
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . تقول نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الصبغة المنشقة بالكحس .

١٩٦٩١ - **عُرَابِيَّات ، كَوْصَجِيَّات**  
Scylliorhinidae, Orectolobidae (S).  
Scylliorhinidae, Orectolobidae (F). Scylliorhinidae, Orectolobidae (E).  
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاق . اجناسها المعروفة قليلة العدد منها البيوض والسرلود . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة وشعية الشكل . اعظامها ذلقة شارقة . اسنانها مشاربة حادة تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . تتميز بزعانفها الزيلية المملوطة اللامتناهية الجرم اذ يفوق حجم الفلقة العليا ضعف حجم الفلقة السفلى || اشهر اجناسها الفراء والكوسج .

١٩٦٩٢ - **عُرَاب ، عُمِيَاء يَمَّانِي** (F). le Corbeau (F).  
Corvus (E).  
الغراب والحياء الباني اسمان للكوكبة الجنوبية الموقع مركزها خلف الباطية على جنوب السك الاوزل || عدد نجومها سبعة والعرب تسميها حلة « عجب الاسد » او « عرش السك الاوزل » او « الاحال » . ومن هذه الكوكبة نجمان مزدوجان الاول يدعى « عُمِيَاء » او « سبا » او « مقار الغراب » . والثاني يدعى « الجتلج » او « جتلح الغراب الايمن » .

١٩٦٩٣ - **عُرَاب**  
Corvus (S).  
Corbeau (F). Crow (E).  
سبي غراباً لسواده . ج غرابان واغربة واغرب واغرب واغربان . كنيته ابو حاتم وابو جحاف وابو الجراح وابو حذر وابو زيدان وابو زاهر وابو الشؤم وابو غيث وابو القمعقق وابو المرقال . ويقال له ابن الارض وابن برع وابن داية . جنس طير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجوارح . انواعه ١٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . اشهرها الغراب الاسم والايقم والاصمم والاكسل والاورق والراغ والنداد . معظمها من القواطع وبعضها من الاوابد . قوتها الحشرات والديدان واللوبيات والاسماك والقرشيات وبذر الزروع والحبوب الناتئة . تدن في الاجمار الطيلة . اناتها تصع من ٣ الى ٥ يبيضات تحضنها وحدها .

١٩٦٧٤ - **عُدَّة تَسْلِيَّة ، عُدَّة شَقِيَّة**  
Glandes génitales, G. sexuelles (F). Genital glands, Sexual glands (E).  
هي التند التي تفرز المواد التناسلية من شلج وبويضات .

١٩٦٧٥ - **عُدْرَانِي ، عُدْرِي ، مَنَعِي**  
Palustre (F). Paludal (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش في الندران .

١٩٦٧٦ - **عُدَقَة**  
Testa  
الغلاف الخارجي للبيضة والبزرة .

١٩٦٧٧ - **عُدَق**  
Pluie (F). Rain (E).  
التقد هو المطر فاذا كثر قطره فهو غادق . وغدقت الارض : ابتلت بالندق فأغصبت .

١٩٦٧٨ - **عُدَق**  
Très fertile (F). Very fertile (E).  
نمت تعريفي يدل على الفزارة .

١٩٦٧٩ - **عُدِّي**  
Glandulaire, Adénoïde (F).  
Glandular, Adenoid (E).  
١٩٦٨٠ - **عُدْرِي ٥**  
Limnétique (F).  
Limnetic (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالندران والمناقع والاهوار والبحيرات . كتوكك التنبوت العُدْرية .

١٩٦٨١ - **عُدَّا**  
Urine du chameau  
الغذا هو بول الجمل .

١٩٦٨٢ - **عُدَاء**  
Aliment  
هو ما به تجمد الجسم والحفاظ عليه وهو جزء المادة الغذائية الذي يتحول عند الحيوان ، في جهاز الهضم ، الى مائع ينقل الى الدم فيغذي الجسم . وهو عند النبات ما يتحول الى الورقة من نسج صاعد باهل الى نسج حيوي كامل . (راجع علف) .

١٩٦٨٣ - **عُدَامَة**  
Brasenia (S). Brasénie (F).  
غُدَامَة ج غُدْم وغُدَام . نبات وسيد الجنس والنوع من فصيلة السيلوفريات . اعطائه منافع العالم القديم . ساقه فراءه تكسوها غمضة لزبية . اوراقه منقطة ، سنائية تقول من ه الى ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مالمس البشرة اللامعة ، احر الصفحة السفلى وسنار العليا . انزهاره صفيرة القد ، قلعها نحو ١٠ سم . لونها الى الياض الاخضر || انزهاره يستمر من تموز الى اواخر الخريف .

١٩٦٨٤ - **عُدِّي ، عُدْوِي**  
Foetus  
الذي والندوي : كل ما في بطون الحوامل انصهها الشاء .  
١٩٦٨٥ - **عُدْر**  
Abecquer (F). To feed (E).  
غر الطائر فرخه اي زقه . الفرار : الزق .  
١٩٦٨٦ - **عُدْر**  
قال الانهري : الفرّ طير سود يبيض الرووس من طير الماء . الواحدة غرة . الذكر والاني في ذلك سواء (ابن سيدة) . والفرّ الجليل هو الاختفوره ، الحلبيا .

١٩٦٨٧ - **عُرَاب \***  
Peperomia (S).  
Pépéromie (F). Pepper elder (E). Pfeffergesicht (D).  
Pepe porporino (I).  
جنس نباتات جنبيه عشوية معمرة من فصيلة الفلقليات .



غرَاب



غرَاب مدبجة



غرَاب منشقة



١٩٧٠٤ - غُرَابِيَّات المَنَافِير (F). Coraciostres  
رؤية من الطيور الجوارح تشمل بعض القمائل . اشتهر  
الغرابيات والزردريات .



غراب أبعق

١٩٧٠٥ - غُرَامَة  
الفرادة ج غراد . ضرب من الكدابة (اللسان) .

١٩٧٠٦ - غُرَاو ، قَدْرَة (F). Interligne  
Space-line, Lead (E).

المسافة بين الرزق والرزق او بين السريف والسريف  
او بين الخط والخط في الفرس المنسق المطر .



غراب اعم

١٩٧٠٧ - غُرَاو  
الغُرَاو هو نجم الصباح لانه يفر بطول القمر .

١٩٧٠٨ - غُرَابِيْلَة (F). Gratiola (S). Gratiola  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخنازيريات .  
انواعها نحو ٢٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحارة .  
اوراقها متقابلة خاسية ثلاثية أو خاسية العروق ، اهلجية  
التصل المسن الحافة . اغبارها قروية ابلية ثنائية اللون  
ينقلب فيها الاصفر والوردي || اشهر انواعها الغرابيول  
الحفزية .



غراب اعم

١٩٧٠٩ - غُرَابِيْلَة مَغْرِبِيَّة \* ، حَفِيْصَة  
الْفَرَاة ، عَشْبَة الْفَرَاة

Gratiola officinalis (S). Gratiola officinale, Herbe  
au pauvre homme (F). Hedge hyssop, Poor-man's  
herb (E). Echte Gnadenkraut (D). Gratiola, Piccola  
digitalis (I).

نوع من الغرابيول وهو نبات عشبي بري معمر جلمووي  
يعيش في المناطق وعلى شفاف الماء يعلو من ٢٠ الى ٦٠سم.  
اوراقه اهلجية خفيفة التصل . اغبار ابلية معتقة ، صفراء  
البوق ، ودية الصفحة || يستعمل كاسم نافع مع العلم  
انه من النباتات السامة التي توجب الحذر .



غراب الدرع

١٩٧١٠ - غُرَام  
وحدة وزنية ، الألف منها يساوي كيلوغرام .

١٩٧١١ - غُرَامَة  
جزاء نقدي يفرض بصفة عقوبة (E). Amende, Pénalité  
Fine, Penalty (E).



غراب لبناني

١٩٧١٢ - غُرَامَة إِجْرَائِيَّة  
Amende de procédure (F). Fine of procedure (E).  
نوع من الترامات المدنية تفرض لقضاء سير الإجراءات  
سيراً منتظماً .

١٩٧١٣ - غُرَامَة جِنَائِيَّة  
Amende pénale (F). Penal fine (E).  
عقوبة مالية تكون اقسانية في الجنايات . واصلية أو اقسانية  
في الجنح . دائماً اصيلية في المخالفات . وهي تلزم المحكوم  
عليه ان يدفع مبلغاً من المال الى الخزنة العامة .



غرابيول غزنية

١٩٧١٤ - غُرَامَة مَدِينَة  
Amende civile (F). Civil fine (E).  
هي الغرامة التي تحكم بها احدى المحاكم المدنية بناء على ما  
نص عليه القانون المدني .

١٩٦٩٤ - غُرَاب أَبْعَق \* ، غُرَاب التَيْن ، قَاقِ  
Corvus cornix (S). Corneille mantelée, C. cendrée,  
Corbeau mantelé (F). Hooded crow, Grey-back  
crow (E). Nebelkrähe (D).

طائر من الغربان القواطع . جسمه متوسط القد ، يعلو  
نحو ٥٠ سم . رأسه وصدره ومنقاره وسفطاه وذنبه ورجلاه  
الى السواد المايق . ظهره وبطنه الى الرمادية الضلواء . سره  
كثير البند . يألف الخمول والسهول وصفان الانهر  
وشاطئ البحار .

١٩٦٩٥ - غُرَاب اسْتَحْم \* ، غُرَاب نُوحِي  
Corvus corax (S). Corbeau commun, Grand cor-  
beau (F). Common crow, Common raven (E).

طائر من الغربان الأوابد جسمه كبير القد ، طوله نحو  
٦٥ سم . ويسلته نحو ١٠٠ سم . ثوبه اسود اللون السوي  
اللامع يعلو موج متداخل الحفرة والحفرة || يألف  
الاجراع والجبال . يعيش اوزاجاً لما مرتمها تحمي من اعتداء  
غيرها . قوته الحشرات والدواب والفضاء والفئران والصفاد  
ويش الصائير والحيوب والذباب الناتش .

١٩٦٩٦ - غُرَاب اسْعَم \*  
Pyrrhocorax pyrrhocorax (S). Corbin crave (F).  
Carrion-crow (E).

طائر من الغربان القواطع متوسط الجثة ، طوله نحو ٤٢ سم .  
ثوبه اسود اللون السوي اللامع . منقاره ورجلاه الى الحمرة .  
يألف سرود الجبال وهو حزين الجود قيل فيه : « اعر  
من الغربان الاصم » .

١٩٦٩٧ - غُرَاب الزَّوْع \* ، غُرَاب أَوْرَق ، شُوكَة  
Corvus monedula (S). Corbeau chouchas, Chou-  
cas (F). Jackdaw (E).

طائر من الغربان القواطع صغير الجثة طوله نحو ٢٦ سم .  
رأسه وظهوره وسفطاه وذنبه الى السواد الفضي اللامع . عنقه  
وصدره وبطنه الى الكهية الضلواء || يعيش جماعات كبيرة .  
سره كثير العدد . يألف الاجراع المبهرة الشجر والبيوت  
الحربة والمواقع الصخرية . قوته الحشرات والدواب والحيوب  
والذباب الناتش .

١٩٦٩٨ - غُرَاب القَيْطِط هو الغداف ، اطله .

١٩٦٩٩ - غُرَاب اللَّيْل هو واق الشجر ، اطله .

١٩٧٠٠ - غُرَاب الماء هو الداق وقال الماء .

١٩٧٠١ - غُرَاب لُبْنَانِي \* ، زَمَتْ  
Pyrrhocorax graculus (S). Corbin chocard (F).  
Chough (E).

طائر من الغربان الأوابد صغير الجثة ، طوله نحو ٤٠ سم .  
ثوبه اسود اللون يلمع بمخضرة وزرقة . منقاره الى الصفرة .  
رجلاه الى الحمرة . موطنه البلاد اللبانية وجوارها . يألف  
الجبال في الصيف ويعيش على الشطوط في الشتاء . سره  
متوسط العدد . قوته الحشرات والدواب والذباب والحيوب  
الناثثة .

١٩٧٠٢ - غُرَابِي  
Coracoide (F). Coracoid (E).

١٩٧٠٣ - غُرَابِيَّات  
Corvidae (S). Corvidés (F). Corvidae (E).

فصيلة الغربان من الجوارح الثمانية المنانير . فيها الغراب  
والغداف والطاق ، الخ .

١٩٧٢٦ - غرانيث

Granit (F). Granite (E).  
هو الأمل، حفر بلوري شديد الصلابة متجان الإلوان يتكون من الفلسباة والفلق والرور .



غريوط الصنوبر

١٩٧٢٧ - غرانيث

Granitic (F). Granitic (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما هو صواني التركيب .

١٩٧١٧ - غرَب  
هو المحور الفرائي ، اطلبه .

١٩٧١٨ - غَرَب

الغرب : داء يصيب الشاة فينقطع غرطوها ويسقط منه شعر العين (السان) .

Cancellaria (S).

Cancellaire (F). Cancellaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الاريل وفصيلة الغريليات . انواعه المرفوعة كثيرة المدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والطحاشيرية والبعض الآخر الذي ينأثر المنة مامر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه بيضية الشكل او برجية ، ذلقة الاعقاب ، مفضنة الاريفة ، فريضة القوقعة ، مشبكة الصفحات الحارابية المبضة بالالوان الباقية .

Cancellariidae (S).

Cancellariidés (F). Cancellariidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الاريل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . جميعها رابطة تعيش على التبت البحرية || اصداها شبه بيضية الشكل ذلقة الاعقاب المهلزة ، صغيرة الاجسام المستطيلة ، قصيرة الرؤوس ، ثنائية الواس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الاريل المزوانية الشكل || اعرف اجناسها الغريل .

١٩٧٢٩ - غرة \* ، سيمسون

Sison amomum (S). Sison amome, Berle aromatique (F). Bastard stone parsley, Hedge sions (E). Amomlein, Würziger Herrukümmel (D). Sisonne, Amomo falso (I).

عشبة برية من فصيلة السيوليات . جلدورها وبماها عطرة طيبة ، كانت ولا تزال تستعمل كقوية . منها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . توجد بين الزروع وقرب السياجات ويجاري الماء || اوراقها متعاقبة ، مركبة . وريقاتها وريّة التجميع ، مفرصة التصل . ثمارها جراء غدة مكورة الطرف .

١٩٧٣٠ - غرة

Fulica (S). Foulque (F). Coot (E).  
الغرة والقرع غر . جنس طيور مائية من فصيلة التفلقيات . انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تتميز بمقاومتها القوية للمدبة الطرف . رؤوسها مدببة الجبهة . اجناسها فائرة وقصيرة . اذنانها صغيرة مستديرة . اسرارها قوية . غالبيتها مستطيلة || اشهر انواعها الغرة السوداء والغرة المتوجة .

١٩٧٣١ - غرة جميلة \* ، انثوسكريس

Anthocharis eupheno (S).

Anthocharis des crucifères, Aurore de Provence (F).

Anthocharis eupheno (E).

حشرة من فصيلة الكرنبيات وريّة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الايض المتوسط . فراشها واسعة قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الصليبيات البرية والزراعية || جسمها مستدل القد يطول نحو ١٤ م . يسطها نحو ٤٢ م . رأسها اريد . عيناها كيرتان . زباناها صولجانيان . جوشها الى الطحلة الرصاصية الملاج . يطها الى الريداء السمره || وثنائها الاماميان ، منه الذكر ، الى الصفرة يملوها من الزام الثا الى الطرف مشمة برتقالية نارية يطوها اطار اسود .

١٩٧١٩ - غرَبَال

Crible (F). Sieve, Riddle (E).  
مسرد غنيق التواب .

١٩٧٢٠ - غرَبَالِي

Cribiforme (F). Cribiform (E).

١٩٧٢١ - غَرَبَلَة

Criblage (F). Sifting (E).  
تفريق الحبوب عن الفلت والاجرام الغريبة .

١٩٧٢٢ - غَرَبُون

Cymothoa (S).

Cymothodé, Poux de poisson (F).

جنس دوبيات بحرية من القشريات متساويات الاريل وفصيلة القريوسيات . انواعه المرفوعة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه مبطلة ، قريّة شبه بالمدية ، طولون ٣ الى ٥ م . منها انواع تتطفل على الاسماك .

١٩٧٢٣ - غَرَبُونِيَّات

Cymothoidae (S).

Cymothoidés (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات متساويات الاريل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها اهليجية مبطلة شبيهة باجسام المدية طولون ٥ الى ٥٠ م . اخطامها مجهزة بعدة ماسة || بعض اجناسها يتطفل على الاسماك .

١٩٧٢٤ - غَرَبُونُ الحِراج

Grypotes silvestris (S). Grypote des forêts (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات وريّة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ م . || رأسها مستعرض ، قليل النتوء ، اصفر اللون . خطها مستدل الطول . عيناها كيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كوسها بيضي الشكل ، اصفر اللون اصفر الملاج . حشفها مزوانية ، صفراء . ظهورها كامل الحنجبة ، لاحف ، اخضر اللون ، بني الطرف . وثنائها ششائيان ، شفافان . يطها الى الخطي الاسمر . قوائمها كثيفة الحلب الشاك || تألف الحراج اخصها حراج الصنوبر .



غرة

١٩٧٢٥ - غَرَبُونُ الصَّنُونِير

Grypotes puncticollis (S).

حشرة من فصيلة الوزيديات صغيرة القد ، طولها نحو ٤ م . جسمها متناهي الشكل . زباناها غيطة مستطيلة . ثوبا الى الصغار الخطي الباقي . مرتها الصنوبر على اختلاف انواعه ، يكثر وجودها من تجوز الى تشرين الاول . اضرارها زعيدة لا تستوجب العناية .



غرة جميلة



غُرَّة سوداء

الناطق الحارة . أوراقها ابيدة ، متعاقبة ، منقطة ، نصلها جامد الصلابة وإزهارها . أزهارها فردية التجميع ، جميلة الشكل ، بيضاء اللون ، فواصة العرف الطوري المستتب . ثمارها صباغية ، غصائبا احمر اللون أو اصفر || أشهر أنواعها الزينية ما يلي :

### ١٩٧٣٨ - غُرْدُونِيَّة تَشْمَرْجِيَّة

*Gardenia thunbergia* (S). *Gardénia de Thunberg* (F).  
جنية جاسدة ، مهدبا بلاد افريقية الجنوبية . نصلها عايق تملو نحو ٣٠٠ سم . أوراقها سائبة الشكل ، نصلها عايق الأخضر اللامع . أزهارها طرفية الاذنكاز . عطرية الرائحة ، ثمانية البتلات البيض ، توجها اسطواني الانبوب ، خماسي او سداسي التشرير الطرفي || أزهارها يستمر من كانون الثاني الى آذار .

### ١٩٧٣٩ - غُرْدُونِيَّة رُصَالِيَّة

*Gardenia rothmannia* (S). *Gardénia de Rothmann* (F)  
جنية سبروتية مهدبا بلاد افريقية الجنوبية . ساقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . أوراقها اطيحية الشكل ، نصلها فستني الأخضر الزاهي . أزهارها متوسطة القد ، عطرية الرائحة المنحبة ، سداسية البتلات البيض || أزهارها يستمر طوال شهر تموز .



غُرْبِيل الصفصاف

### ١٩٧٤٠ - غُرْدُونِيَّة كَبِيرَةُ الزهر \* ، غُرْدُونِيَّة

*Gardenia jasminoides*, G. *ياسمينيَّة*  
*florida* (S). *Gardénia à grandes fleurs* (F).  
جنية سبروتية شائعة الاستعمال الزيني . مهدبا الصين . تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها اطيحية تملو من ٧ الى ٩ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها جبل اخضر اللامع الزاهي . أزهارها فواصة العرف الطوري ، تبار بيضاء اللون ثم تتحرف الى الصفرة وهي كبيرة الحجم قطرها نحو ١٠ سم || أزهارها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

### ١٩٧٤١ - غُرْدُونِيَّة مَجْدُورَة

*Gardenia radicans* (S). *Gardénia radicans* (F).  
مجلة صغيرة القد شائعة الاستعمال الزيني . مهدبا اليابان . تملو نحو ٦٠ سم . ساقها مجذورة . أوراقها سنائية لامة النصل . أزهارها فواصة العرف الطوري . توجها اسطوانية ، بتلاتها عاجية ، منها البسيطة ومنها المكسبة || أزهارها يستمر من آذار الى حزيران .



غُرْدُونِيَّة كَبِيرَةُ الزهر

١٩٧٤٢ - غُرْدُونِيَّة (F). *Gordonia* (S). *Gordonie* (F).  
جنية نباتات معقودة التعريف على اسم الشاغل الاذنكازي « غردون » وهي من فصيلة الكامليات . أنواعها المعروفة ١٠ مهدبا الشرق والبلاد الامريكية . منها البرية والزارعية والزينية . أوراقها ابيدة او عايلة ، متعاقبة ، منقطة ، جامدة النصل الجملدي . أزهارها فردية التجميع ، لا قياسية الاذنكاز ، بيضاء اللون ، مستحبة العرف الطوري || أشهر أنواعها ما يلي :

### ١٩٧٤٣ - غُرْدُونِيَّة حَمَلِيَّة الزهر \*

*Gordonia lasianthus* (S). *Gordonia à fleurs velues* (F).  
نوع من التردونية وهي جنية سبروتية شائعة الاستعمال الزيني تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . أوراقها ابيدة سنائية الشكل تملو من ٨ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مالمس البشرة ، منشاري الحافة ، باحت الأخضر الفاتح . أزهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . بتلاتها خلية البشرة . عرفها ذي الرائحة القواصة || أزهارها يستمر من آب الى تشرين الثاني .



غُرْدُونِيَّة حَمَلِيَّة الزهر

ورما عند الاثنى الى البياض الاغبر الاصفر تملو في الزام الرابع مشقة طحلا يقابلها هلال صغير اسود . وروشنا الخلفيان ، عند الشئين ، الى البياض الاغبر الاصفر المواج تملو رقة طحلا خفيفة وست تقط سود هاشية الاذنكاز || لها جبل واحد في الحول . تظهر القفاشة في نيسان . تسرح في النهار . تعالظ بعد ظهورها ستة اسابيع ويمتلك المكن لطفًا مستطيلة على نصال الاوراق || السرعة تملو نحو ٣٤ سم . جسمها اسطواني الجرم ، مالمس القشار ، يملو خل قصير . ثوبها الى الطحلة السبروتية المواج يملوها خطان جانبانيان ابيضان وعشرة اطواق تحيلة تنتهي عند الملب . اطواقها الى السمرة السوداء . رأسها ومذنها ورواجها الى الربة السمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعًا ينقضي ضمن غشاء متين داخل لفاقه من الاوراق المقطوعة .

### ١٩٧٣٢ - غُرَّة سَوْدَاء \*

*Fulica atra* (S).  
*Foulque noire*, F. morelle, Macroule (F). Common coot (E).  
طائر من الغر ، موطنه فسيح الارحام يمتد من الشرق الى اربية وافريقية . يعيش جماعات كبيرة العدد . سريره يشل عدة مئات . طول جنته يراوح بين ٣٥ و ٤٥ سم . رأسه ومنقه الى السواد الباق . ظهره وجناحه وذنبه الى السواد الرصاصي المواج . بطنه وغوافه الى السواد الازرق . جيته غبراء الدجج . منقاره ودي اللون ، عيانه قرني يثان . ساقاه راديثان طولها سلفة مستعرضة جزئية اللون خضراء المواج || يالفت المنافع والبحيرات . قوته الحشرات والنباتات المائية . يمش في عش يقمه على سطح الماء بين القصب والغاز والاسل وما اشبه . انشاء تصع من ٧ الى ١٥ بيضة تحضنها وبعدها نحو ثلاثة اسابيع .

### ١٩٧٣٣ - غُرْبِيل الصَفصَف \*

*Gracilla minuta* (S). *Gracille de l'osier* (F).  
حشرة غاشية من فصيلة القرنيثيات . طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مستطيل الشكل سوي اللون الاخر الاسمر المواج || تظهر الحشرة الجملاء في شهر تموز وتضع مكها بعد التعاطل ، في خلال شهر آب ، على مختلف البسائد المقطوعة من فصيلة القدييات والورديات واعصها المصغصاف والكستناء . يرقها غبراء اللون سمره الاراس تميش على قفبان ويبدان النباتات المذكورة قطعها وتمنع استعمالها الصناعي .

### ١٩٧٣٤ - غُرْبُولِيَّة

هي الجندم جنس أشجار من الكلوزيات .

### ١٩٧٣٥ - غُرْدَة

*Gazouiller* (F). *To chirp* (E).  
غُرْد الطائر أو زَقَزَق: رفع صوته وطرب به أو عند

### ١٩٧٣٦ - غُرْدَقَة

*Pharmacologie* (F).  
*Pharmacology* (E).  
علم اصول الادوية ونظريات قواعدها وطرق استعمالها .

### ١٩٧٣٧ - غُرْدُونِيَّة ، غُرْدُونِيَّة

*Gardénia*, *Gardénia*, *Jasmin du Cap* (F). *Cape-jasmine*, *Gardenia* (E). *Alütenreiche gardenie* (D). *Gardénia* (I).  
جنية نباتات برية وزينية من فصيلة القويبات . أنواعها نحو ٤٠ منها الشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات

اختلفة ، يكثر فيها الطيبان الاصفر والليسانت الوردية التي تعتبر كأساس النوع || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ١٩٧٥٠ - عُرْدُونِيَّة يَحْضُورِي

*Pyrethrum tchihatchewi* (S). *Pyréthre gazonnant* (F).  
نوع من الفرديب وهو عشبة معمرة عادمة الساق ، خلية الاعضاء تملو من ٥ الى ١٥ سم . اوراقها خيطية التفريض . رؤيساتها الزهرية فردية التجميع تقوم على شراخ قرصي الانتفاخ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

**١٩٧٥١ - عُرْدِيل ٥**  
*Garidella* (S). *Garidelle* (F). *Garidella* (E).

جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مغترية من فصيلة الفقيقيات . انواعها المروفة قليلة المدد منها يتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || سوقها عادمة الفروع او قليلتها تنتهي بالازهار . اوراقها متعاقبة ، مفصلة الى غرق خيطية او شمعية . ازهارها لحاسية التركيب . بتلاتها كلوية الشكل ، متجمعة ، صفراء اللون || تنموها ربيعي

**١٩٧٥٢ - عُرْدُونِيَّة**  
*Gardénia* (F).

هي الفردية ، اطلبها .

**١٩٧٥٣ - عُرْد**  
*Aléa* (F). *Chance* (E).

هو احتمال حدوث شيء غير مضمون .

**١٩٧٥٤ - عُرْد** هو العلم ، اطلبه .

**١٩٧٥٥ - عُرْد** هو القفاد ، اطلبه .

**١٩٧٥٦ - عُرْدَكَة**  
*Equisetum* (S). *Equisette* (F). *Horsetail* (E).

هي الكنبات ينبت على شواطئ الأنهار لا ورق له وهو ذو اماسيح ابوية ، الواحدة في جوف الاخرى فاذا اجتلبتها غرست كأنها عفاص اخرج من مكله . ج عُرْد .

**١٩٧٥٧ - عُرْدَكَة**  
*Implant* (F).

اسم يطلق على المنهات القوية وعلى مركبات الهرمون التي تستعمل في النسيج الخلوي تحت الجلد .

**١٩٧٥٨ - عُرْدُون \* ، هُورْدَن ، هِيْرَكَر ٥**

*Galictis barbara* (S). *Grison talra*, *Huron*, *Hyrae* (F).

حيوان لاسم مفترس من فصيلة السورديات . موطنه بعض مناطق امريكة الوسطى والبرازيل . يألف الاحراج والسحاب الرقيقة العشب . ملجئه الحيواني جماعي . جماعته تعد من ٦ ازواج الى ١٢ زوجاً || جسمه اهيف الشكل مستطيل . طوله نحو ١١٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . رأسه معتدل الجرم والخط . عيانه واذناه صغيرتان مستديرتان . سباله معتدل الكثافة والطول . قوامه قصير . براءته حادة الاطراف القليلة التجميع . غذته الشرسية تفرز مادة دهنية سكية العرف . وبره نام وقصير . ثوبه الى الشبهة السمره السوية || الانثى تضع من جريون الى ثلاثة جراء مرة واحدة في الحول || مسرعه دجوي . يولد بسرعة فائقة ويتسلق الاجمار بحفنة . قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والطي .

**١٩٧٤٤ - عُرْدُونِيَّة زَيَّاء** (*Gordonia altamaha* (S). *Gordonie de l'Altamaha* (F).

شجرة من الفردونية تملو نحو ٥ امتار . مهدا البلاد الامريكية . اوراقها عابلة اهليجية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، طول من ١٠ الى ١٥ سم . وتفرس من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحافة ، ازغب الصفحة السفلى ، يحمر في الحريف . ازهارها كبيرة القند مستعرضة ، قطرها نحو ٨ سم . عرفها بنفسجي الرائحة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

**١٩٧٤٥ - عُرْدُونِيَّة محْوَرَّة الزهر**  
*Gordonia axillaris*, *G. anomala* (S). *Gordonia à fleurs axillaires* (F).

نوع من الفردونية وهي جنبه سبرونية صغيرة القند تملو نحو ١٠٠ سم . مهدا الصين . اوراقها ابيدة سنانية النصل . طول من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القند ، محورية الارتكاز ، ذكية العرف || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الثاني .

**١٩٧٤٦ - عُرْدُونِيَّة \* ، كالفورنِيَّة ، حَشِيْشَة الحَمْصِي**  
*Pyrethrum* (S).

*Pyréthre* (F). *Pyrethrum*, *Fever-few* (E). *Bertrame*, *Bertramswurz*, *Rote wucherblume* (D). *Piretro* (I).  
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الابوية الزهر . انواعه عديدة تشبه الاتحمان منها الطبية والزهرية والسماعية التي يستخرج من بزورها بعد طحنها مسحوق جعالي المادة شديد الفاعلية يستعمل في القضاء على الحشرات . ومن قائل ان الانواع الطبية تستعمل في علاج بعض الحيات اغصها المماودة . جذورها غزيرة المادة الفعالة ، شائعة الاستعمال الطبي || اشهر انواعه ما يلي .

**١٩٧٤٧ - عُرْدُونِيَّة شَرْوِي**  
*Pyrethrum cinerariaefolium* (S). *Pyréthre à feuilles de cinéraire* (F).

نوع من الفرديب وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كبيرة القند ، قوية العرف ، ثلاثية التفريض والتسعين ، رباعية العروق المتوازية المخطوط . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فصي اللون . رؤيساتها الزهرية كبيرة القند قطرها يراوح بين ٤ و ٦ سم . بزورها كثيفة القند الدهنية يحمر منها مسحوق الفرديب الذي يدخل في تركيب بعض الحواشير || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

**١٩٧٤٨ - عُرْدُونِيَّة مِثْخَلَر**  
*Pyrethrum uliginosum* (S). *Pyréthre tardif* (F).

نوع من الفرديب وهو بجملة معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . سابقا قرياه فناء . اوراقها سنانية ذلقة طول من ٦ الى ١٠ سم . نصلها لدن الصفحة المتشارية الحافة . رؤيساتها الزهرية صوبانية التجميع ، كبيرة القند ، قطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

**١٩٧٤٩ - عُرْدُونِيَّة وَرْدِي**  
*Pyrethrum roseum* (S). *Pyréthre rose* (F).

نوع من الفرديب وهو نبات عشبي معمر شائع الاستعمال الزهبي . غروبه الزراعية زهاء ٧٠٠ تملو من ٣ الى ٧٥ سم . اوراقه لا قياسية التفريض . نصلها ماس البشرة اخضر اللون . رؤيساته الزهرية عديدة الالوان المتباينة



عُرْدُونِيَّة



عُرْدُون



غرشاة

من الحلب الغليظ الجائد تحت مكان الرعة وبلوط من الریش المتشعث ركب قاعدة المتق. ثوبه الى السواد اللامع ، يعلو توشم ابيض محبوب.

#### ١٩٧٦٧ - عُشْرُون قُتْبَرَايِي \* *Numida cristata* (S).

طائر من الغرغر . مولده حوض الزبير ، يتميز بقبترته السوداء وبثوبه الأزبد الرصاصي اللامع القليل التوشم .

#### ١٩٧٦٨ - عُشْرُون مُتَقَلِّس \* *Numida mitrata* (S). *Pinde mitrée* (F).

طائر من الغرغر يتميز برفه القرني اللحمية المخوي الشكل . ثوبه الى السواد اللامع يعلو توشم ابيض يكاد يكون تبيجيا || مولده افريقية الوسطى والشرقية .



غرغار الزوال

#### ١٩٧٦٩ - عُشْرُون مَعْرُوف \* *Numida meleagris* (S). *Pinde vulgaire*, P. commune (F).

طائر من الغرغر البري والداجن . سلالاته عديدة فوارقا الثوب والحجم وكثرة البيض . منها الأبيض والبيضي والاحمر والاسود والأزبد والمزقش . جميعها سهلة التربيـة . منها سلالات تبيض في السنة نحو ٨٠٠ بيضة || يتناسل مع الدجاج والحشيش والعلفوس . هجته جملة الاشكال لا تخلو من الانسجام اللوني المألوف .



غرغر متقلس

#### ١٩٧٧٠ - عُشْرُون تَسْرِي \* *Numida vulturina* (S). *Pinde vautour*, P. royale, P. vulturine (F).

طائر من الغرغر ، حجمه حجم الدجاجة الكبيرة ، رأسه لامط الجلد الامحد الازرق اللون ، يحمل عند فنته طرة من الريش التامم النقيق القصير . جوشه ملتحص برداء من الريش الطويل الازرق المفضل بالايض . ثوبه الى الزبدة الزرقاء يعلو توشم ابيض || مولده شمالي شرقي افريقية .



غرغر معروف

#### ١٩٧٧١ - عُشْرُون غُرِيَّات \* *Numididae* (S).

فصيلة طير وحشية الجنس من رتبة الانجديات . طيورها ربة الجلف ، دقيقة المتق ، صغيرة الرأس المتوج ، قوية المنقار الحاد الطرف ، صغيرة الجانح والذيل المكور الساقط ، متندلة الريش الاملط العادم الصبيـة . ثوبها سوي اللون الموشم || مولدها افريقية والجزر الجارية كدفسكر وغيرها . تألف بعضها بالافروج . اسرارها متوسطة البدن . قوتها الجيوب والثآليل والتنامي والخمرات . بعضها الاشجار والصخور الثلاثة الزرقية || انثاها تبيض نحو ١٢ بيضة تحضنها وسنداها في انصوص رصمه بالحشيش والورق .



غرغور

#### ١٩٧٧٢ - عُشْرُون \* *Gerrhonotus* (S).

جنس عثاء من فصيلة الجبروريات . انواعه المروعة نحو ١٠ ، طولها يراوح بين ٢٠ و ٣٠ سم . انثاها الى السمرة يملونها بتجديد اسود ورفقة بيضاء || مولدها البلاد الحارة . تألف الاساكن الصخرية .

#### ١٩٧٧٣ - عُشْرُون \* *Gorgonia* (S).

جنس حويئات بحرية ركنية راحة من فصيلة الغرغويات || انواعه المروعة قليلة العدد لكنها منتشرة في معظم محار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مستمراتها قريبة الشبه



غرغون

#### ١٩٧٥٩ - عُشْرُون ، نَصْب \* *Plantation* (F).

هو زرع الغراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال : زبدقة ومرمعات ونحسات .

#### ١٩٧٦٠ - عُشْرُون ، عُشْرُون ، نَصْب ، شَتْلَة \* *Plant, Plante* (F). *Plant, Slip* (E).

كل نبات قتي صغير له جذور يمكن نقله وفسره في مستقره .

#### ١٩٧٦١ - عُشْرُون \* *Anisosticta novemdecim punctata* (S).

*Anisosticta à dix-neuf points* (F). *Anisosticta novemdecim punctata* (E).

حشرة عاثلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى واروبـة . تألف الموناق الرطبة وضفاف مجاري الماء . غناصها ويرقاتها تعيش على الارق والقرمزيات والمنغريات || جسمها صغير القه يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى الصفار الباهت الاصهب الملوأ يعلو تنقيط اسود في الكوليل والظهران . الكوليل يحمل ٦ نقط سود والظهران يحمل ٢١ نقطة منها ١٠ نقط في كل غمد ونقطة حشفية مشتركة تلصق الجناحة . رأسها صغير القه . عينها كبيرتان . زباناها صغيتان . اسرارها رباعية المتق || الانثى اميز قدام من الذكر وانصر زباناها وراكد ثوبا || لها ثلاثة اجيال في الحول . تخرج الحشرة الجبلانة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٥ سم . ثوبها الى السمرة القاتمة يعلوها خل اصهب .

#### ١٩٧٦٢ - عُشْرُون ، عُشْرُون \* *Gargara genistae* (S). *Gargara du genêt* (F).

حشرة من فصليات الاجنحة المتجانسة وفصيلة الشدليات . يكثر وجودها في البلاد الحارة || جسمها صغير القه ، شبه غرغوي الشكل ، اسمر اللون . رأسها محدد عريض . متكها قصير . ذئب الاطراف . عينها مكورات . ناشترتان . كولسها شبه جلوي الشكل تملو اطراف جانبية مدبية . ورأسها لامعة تنية اللون . قوائمها فضيلة تمكها من القفز || تعيش على الزوال وتماكن كل موضع تقيم فيه .

#### ١٩٧٦٤ - عُشْرُون جَبْكِي \* *Numida* (S).

هو البقوصا البيضاء . اطلبا .

#### ١٩٧٦٥ - عُشْرُون ، دَجَاج فِرْعَوْنِي ، دَجَاج سِنْدِي \* *Pinde* (F). *Guinea-fowl* (E).

جنس طير من الغرغريات . انواعه خمسة جميعها افريقية للمه متشابة الحجم ، متقاربة الشكل . اجسامها ربة . مناقيرها ذرية ، حادة الطرف . اجنحتها واذناها قصيرة . انثاها سوية اللون موشمة وجملة .

#### ١٩٧٦٦ - عُشْرُون الحَشَشَة \* *Numida ptilonorhyncha* (S). *Pinde ptilorhynque*, P. à pinceau, Poule africaine (F).

طائر من الغرغر . مولده افريقية الشرقية . يتميز بلـة

ثمارها مختلفة الاشكال || اشهر انواعها غُشْب الانبياء وغُشْب القديسين والقرنق والغلاب .

### ١٩٧٨٥ - غُرُوبَات

غُرُوبَات البَيْضَة : مذرت . والبليخ فسد ما في جوده .

١٩٧٨٦ - غُرُوبَات \*  
Garrulax (S). Garrulaxe (F). Garrulaxe (E).

طائر من فصيلة التيطليات لاقتات النمل ورتبة الجوارثم . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى الادمق وافريقية الشرقية والجنوبية ، تتجوز ذهاباً واياباً في سبيل الصيد والشتى . تألف الادغال والاحراج الميترية الانجرار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم . نوها العلوي الى الشقعة الموشحة بالاسمر . رأسها متوج بكشكة معتدلة الحجم ، عاجية اللون . عنقها وصدرها الى البياض اللامحي . بطنها وزينكاها الى البياض الاغبر . متقادها دقيق الجرم ، معتدل الطول ، شديد السرة . عينها صغيرتان عسيتان . جناحها معتدل الطول ، ذلق الطوف . ذنبها مستدير الطوف . رسناها دقيقان ، اسمران || طيرانها خفيف الحركة ، بيه الشوط . قوتها النمل والاساربع والديدان والثمار العنبية || تدنن عشها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين من سطح الارض . الاثنى تقسم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

١٩٧٨٧ - غُرُوبَات \*  
Grammistes (S). Grammiste (F). Grammistes (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الغرغيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلها بعض بحار المناطق الحارة اصعبها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد ، اهليجية الشكل ، معتدلة التيطيط ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . اولياها تراوح من الرمكة الى الخضار الالامس ، يطولها تحطيط قاطب ثلاثي الخطوط الغفيرة او الدخية . رؤوسها كبيرة . اشتداتها رسية الانفراج . حيوتها جاحظة . زعانفها الظهيرة الاولى شائكة المتناسخ . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف || لحومها كاعنة الصفت قل من يرطب فيها .

١٩٧٨٨ - غُرُوبَات  
Corbeau (mâle) (F). Crow (male) (E).

هو الغرباب الذكر .

١٩٧٨٩ - غُرُوبَات ، غُرُوبَات \*  
Corvulur (S). Corbivau, Corbeau-vautour (F). Corvulur (E).

جنس طير من الجوارثم سيات الناقير وفصيلة الغرغيات . له نوعان ، الغرباب الابيض النقي والغرباب الغليظ اللقَاد . موطنها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . يتميزان بكمي الجسم وارتفاع القوائم وغلظة المنقذ واسود اللون || قوتها الجيف والغذاء والورز والجردان والفكران والصفادوع والحشرات والديدان .

### ١٩٧٩٠ - غُرُوبَات غَلِيظ اللِّقَاد \*

Corvulur grossirostris (S). Corbivau à gros bec, C. d'Abyssinie (F). Abyssinian corvulur (E).

نوع من الغرباب . اصطلها فصيلة الاكروا تمتد من حوض البحر الاحمر الى الكنتو . جسمه كبير القد يطول نحو ٨٥ سم . بسطه لا تقل عن ١٥٠ سم . متقاد ضخم غليظ . قوته الى السواد القضي يطول موج اخضر وازرق .

بمستمرات المرجان . اللونه تراوح من الابيض الدنسي الى المرجاني الباهت ، ومن الابيض الاطلمل الى الاخضر الالامس .

١٩٧٧٤ - غُرُوبَات \*  
Gorgonidae (S). Gorgonidés (F). Gorgonidae (E).

فصيلة حويئات بحرية من المزاريات الهلوانية . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها من الحويئات الرابكة الرابطة على الصخور اصعبها صخور اللقَاد || اشهر اجناسها الغرغون .

١٩٧٧٥ - غُرُوبَات  
Feuilles caduques (F). Deciduous leaves (E).

ورق الشجر عامة وورق الانجرار النخيفة خاصة .

١٩٧٧٦ - غُرُوبَات شجر يدنغ به (اللسان) .

١٩٧٧٧ - غُرُوبَات التجاركة  
Chambre de Commerce (F). Chambre de Commerce (E).

منطقة مؤلفة من مثل التجار وارباب الصناعات تتلقى بلسانهم لدى السلطات العامة وتجميع لهم المعلومات الدقيقة عن التجارة والصناعة في الداخل والخارج .

١٩٧٧٨ - غُرُوبَات الزراعة

Chambre d'Agriculture (F). Chamber of Agriculture (E).

غرفة الزراعة ، ندوة تقسم بعض الزراوع المستخين لخدمة المصالح الزراعية الوطنية . والغرف الزراعية تابعة للدولة ولها قوانين خاصة .

١٩٧٧٩ - غُرُوبَات المقاصدة

Chambre de compensation (F). Clearing-house (E).

هو مركز اجراءات مثل المصارف ويمارسه المصنف لاجراء عمليات مقاضاة التحويلات والاوراق المالية .

١٩٧٨٠ - غُرُوبَات

Gorfo (F).

جنس طير من عديمات الريش ، كفيات القدم ، مشهور باسم غُلُفَات ، اطلبه .

١٩٧٨١ - غُرُوبَات ، غُرُوبَات ، قِيَقَة  
Chorlon (F).

هو غلاف البَيْضَة الداخلي مركزه تحت القيش .

١٩٧٨٢ - غُرُوبَات . بياض البيض فوق الملح .

١٩٧٨٣ - غُرُوبَات ، قَرَاك  
Nitraria (S). Nitrare (F). Nitre bush, Saltree (E). Salpeterstrauch (D). Nitraria (I).

جنس نباتات برية من فصيلة النترديات . اصطلها بعض المناطق الاسيوية والافريقية الشمالية والوسطى . انواعه شجيرات صلبة شائكة او سرحة . اوراقها كاملة ، متعاقبة جامدة التصل . ازهارها بياض اللون ، فردية او عثكولية . ثمارها عنبية او نووية ، مديبة الطوف ، حر او سود .

١٩٧٨٤ - غُرُوبَات ، قِدْبِيَّات

Zygophyllaceae (S). Zygophyllacées (F). Zygophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القنات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها عثبي وبعضها شجري وجنبي . اوراقها لا قياسية الترتيب والشكل فيها المتناوبة والمتعاقبة وفيها البسيطة والمركبة . ازهارها خماسية التركيب عثوية .



غرلوة



غريس



غرباب غليظ اللقَاد



غرُتاف عادي

قراء خشوية الساق تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. فروصها طاقية التجميع. اوراقها متعاقبة ، لائفة ، صغيرة . نصلها سناني الشكل ، حذب الضفحة ، جسامد النسيج ، كثيف اللسان والقدم ، لونه الى الخضر الاصفر || رؤوسها الزهرية مستدلة الجسم ، قطرها نحو ٤ سم. تطورها لسنات كبيرة مستطيلة صفراء اللون || يستخرج منها عصارة تقيد ضيق التنفس والالتهاب الرئوي .

Ebourgeoisement (F).

١٩٧٩٧ - غُرُوقَة

Nipping of buds, Dis-budding (E).

تقليم او ازالة الفرائق والبرام العرضية الزائدة .

١٩٧٩٨ - غُرُوقُ هو البرعم ، اطليه .

١٩٧٩٩ - غُرُوقُ ، جِيرَانِيُومُ

Geranium (S), Géranium, Géraniar, Bec de cigogne (F), Geranium, Shepherd's needle, Crane's bill (E), Storchschnabel, Geranium (D), Geranio, Becco di cigogna, Becco di grua (I).

جنس نباتات عشبية عطرية من فصيلة الغرنوقيات . انواعه عديدة منها البرية والعلبية والزراعية التزيينية . ازهارها غنقلية التجميع والالوان فيها الالبيش والوردي والاسمر والبنفسجي . ثمارها تشبه مغار الفروق او الرمو . اعرف انواعه واشهرها ما يلي



غرندلية ضليعة

١٩٨٠٠ - غُرُوقُ أُرْمَنِي ، جِيرَانِيُومُ أُرْمَنِي

Geranium armenum (S), Géranium d'Arménie (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها زباه الحاء ، فروصها مزريفة . اوراقها خالصة الاقسام . فصوصها متبادلة مستنقة الحافة . ازهارا كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيضيه الشدة ، جزوية اللون ، بنفسجية المواج ، سود البقعة الوسطى || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



غرُوق الجداول

١٩٨٠١ - غُرُوقُ أَسْمَر ، جِيرَانِيُومُ أَسْمَر

Geranium phaeum (S), Géranium brun (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبه . ساقها تقاو نوع من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خالصة او سباعية الاقسام السنانية الشكل ، المستنقة الاطراف . نصلها شديد الخضار . يطو بتجميع اسمر . ازهارها جزوية اللون او بنفسجية . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٩٨٠٢ - غُرُوقُ الْجَدَاوِلُ \* ، جِيرَانِيُومُ

Geranium rivulare (S).

الصخور

Geranium des ruisseaux (E). نوع من الغرنوق وهو عشبة معمرة منتصبه ترتب في الاربعة الرملية . ساقها تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها سباعية الاقسام المتبادلة التفصيص واللتشرج . نصلها خلل البشرة ، جزوي اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



غرُوق الروابي

١٩٨٠٣ - غُرُوقُ الرَوَابِي \* ، جِيرَانِيُومُ حَصْبِي

Geranium collinum (S), Géranium des collines (F).

نوع من الغرنوق وهو عشبة طيبة برية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها خالصة الاقسام . نصلها خلل البشرة ، باعث الخضر . ازهارها مهدبة البتلات لونها الى الازرقوي البنفسجي المواج || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

عقته ابيض القفن || طبائعه وعاداته لا تختلف عن طابع وعادات الغراب الاصم الا انه اثبت طيرانا واطول شوطا . وهو عجاج ، نهم ، قذر || يذن وكته في الاذغال ويل الاجار المتصلة الارتفاع . وكته يرتكز على مصاديق متصاليين وهو كالصاج تقريبا . حياكه قضبان دقيقة متداخلة يملعها قام ناس . اثناء تحضن وحدها ثلاث بيضات بيضا اللون يبنها بينن لما الغذاء .

Corbivau (F).

١٩٧٩١ - غُرُوتاف

جنس طير من الغربان يدعى غُرُتاف ، اطليه .

١٩٧٩٢ - غُرُتاق ، غُرُوقُ ، غُرُوقِي

Balearica (S), Balairique (F).

جنس طير من الكراكي ، موطنها البلاد الافريقية . انؤها جميلة الالوان الزاهية اللتيانية . رؤوسها خلية الريش الاسود المنتصب . تيجانها التقنية ذهبية اللون . اعناقها وسياقها طويلة . مناتيرها غرنوبية الشكل ذلقة . اجنسها مستطيلة متفرقة الزوايا . اذناها قصيرة مقطعية . ارسافها دقيقة سرديفة || تألف ضفاف الانهر والبحيرات والاصراج المبعثرة الاجار . قوتها الحبوب والبار والبرام والخشرات || تدن في افاحيص تحضرها في التربة . اناها لها حفتان في الس و في كل حفنة يبعثان || ولها الجلس نوصا لا غير الفراق الطاووسي والفراق العادي .

١٩٧٩٣ - غُرُوتاق طَاوُوسِي ، غُرُوقُ طَاوُوسِي

Balearica pavonina (S), Balairique pavonine, Grupeau, Oiseau trompette (F).

طائر من الفراق موطنه يمتد من مجاهل افريقية الوسطى الى شطوط المتوسط وجزر الباليار || طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قفنه ذهبي اللون مستطيل الريش الخيطي الخرزوني . عمصراه وقلته الى الحمرة المرجانية . ثوبه الى الشدة ، يمتد ويسمر عنه الظهر ويغير عنه البطن . جناحاه مجلمة بالالبيش والاسود . مغاره وساقاه سود .

١٩٧٩٤ - غُرُوتاق عادي \* ، غُرُوقُ عادي

Balearica regulorum (S), Balairique commune (F).

طائر من الفراق اصطناعه فسيحة الاجزاء تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية . طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قفنه اصفر اللون ، مذبح المواج ، قصير الريش الخيطي الجالس . عمصراه وقلته الى الحمرة المرجانية . مغاره وساقاه الى السمرة . ثوبه الى الزبدة الرصاصية . جناحاه يبيض القوادم . ذنبه اسود .

١٩٧٩٥ - غُرُتْدَلِيَّة \* ، غُرُتْدَلِيَّة

Grindelia (S), Grindelle, Chrysophthalme (F), Grindelia (E).

جنس نباتات برية طيبة وزراعية تزيينية من الاسطريات وفصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاعشاب الحولية والجنات المعمرة جميعها امريكية المنيث || اوراقها متعاقبة . ازهارها رؤوسية صفراء اللون قروية الشكل بازهار دوار الشمس || اشهر انواعها واعرفها الغرنديلية الضليعة .

١٩٧٩٦ - غُرندلية ضليعة \*

Grindelia robusta (S), Grindelle robuste (F).

نوع من الغرنديلية البرية الغلبة المعمرة . مهدبا بفس اصقاع امريكية الشالية انحصا كاليغورني والتكسان والمكسيك . تثبت طوعيا في المناطق السبعة || جنبها

١٩٨١ - غُرْنُوقُ عَطِرٍ \* ، جِيرَانِيُومُ عَطِرٍ ،  
إِيزَةُ الرَّاهِبِ

Geranium Robertianum (S). Herbe à Robert, Aiguille, Géranium de Robert (F). Adder's tongue, Herb Robert, Fox geranium (E). Ruprechtstorchschnabel, Robertskraut (D). Geranio Robertino Erba Roberta (I).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة برية طيبة شائعة الاستعمال تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مستندة السلاحيات. أوراقها خاسية أو سباعية الأقسام. أزهارها لآحامية الانتظام فيها الفردية والثنائية والثلاثية التجميع. لونها إلى الأبيض إلاغبر يملو توشيح ليلى || أزهارها وأوراقها عطرية يقال أنها لا تخلو من بعض الخواص الطبية النافعة.

١٩٨١١ - غُرْنُوقُ فِضِّي \* ، جِيرَانِيُومُ فِضِّي  
Geranium argenteum (S). Géranium argenté (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة مستطيلة. ساقها مثدنة تملو من ٧ إلى ١٢ سم. أوراقها خاسية أو سباعية الأقسام الثلاثية التشرع. نصلها خلى البشرة، فضي الموالج، أزهارها فردية التجميع، عطرطية البتلات الوردية اللون. أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

١٩٨١٢ - غُرْنُوقُ كَبِيرِ الزَّهَرِ ، جِيرَانِيُومُ  
كَبِيرِ الزَّهَرِ

Geranium grandiflorum (S). Géranium à grandes fleurs (F).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة نجيلية الساق مثدلية الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها مستطيلة المالحق الغدية اللحماء، نصلها خلى البشرة، بحري اللون، خاسي الأقسام اللآحامية التتسبن. أزهارها كبيرة القد، متعادلة النصل والبتلات. لونها إلى الأبيض الوردى الموالج. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

١٩٨١٣ - غُرْنُوقُ مُطْمَئِح \* ، جِيرَانِيُومُ مُطْمَئِح  
Geranium maculatum (S). Géranium maculé (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة منتصبية. ساقها مضلعة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خاسية الأقسام المسننة نصلها قليل الحمل، شديد الحفصة. أزهارها منبسطة البتلات المستعرضة، قطرها براوح بين ٣ و ٤ سم. لونها إلى الأبيض الباهت || أزهارها يستمر من نيسان إلى تموز.

١٩٨١٤ - غُرْنُوقِيَّات  
Geraniaceae (S). Geraniacées (F). Geraniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين أجنتها ٢٠ وأنوعها ٧٠٠ أكثرها من النباتات العشبية البرية المعمرة، وأوراقها متماثلة منقطة، نصلها مفصصة أو مشرمة. أزهارها غنثوية مختلفة الألوان، عديدة الأشكال، لا قياسية الارتكاز والتتبع.

١٩٨١٥ - غُرْنِس \*  
Agrimonia (S). Agrimonia (F). Agrimonia (E).

جنس طير من الجوامث مشرويات المنائق وفصيلة الغصويات أنواعه المعروفة خمسة. موطنها بعض مناطق أمريكا الاستوائية. قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها وإشكالها وبعض الطار المعنية البرية || أجسامها ربة تطلو من ١٦ إلى ٢٢ سم. تتميز بكبر أذنانها المقنطرة الطرف. أجنتها صغيرة، ذلقة تلحف قاعدة الذنب. مناقبها شليمة، مشرودة الأطراف. أثوابها متباينة الألوان تكثر

١٩٨٠٤ - غُرْنُوقُ الْعِزْهْلِ \* ، جِيرَانِيُومُ يَمَامِي  
إِيزَةُ الرَّاهِبِ

Geranium columbinum (S). Géranium colombin, Pied de pigeon (F). Long stalked crane's bill, Pigeon's toot crane's bill (E). Stelzstorchschnabel (D). Becco di piccione, Geranio colombino (I).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة برية طيبة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فراء، دقيقة، مستطيلة السلاحيات. أوراقها خاسية أو سباعية الأقسام البقيقة، المسنة الحافة، المنطرية الارتكاز. نصلها عايق الحصار، نام الحمل القصير. أزهارها فردية أو ثنائية التتبع. وردية اللون ليلى الموالج || يقال أنها لا تخلو من المنافع الطبية وقد تفيد الصدر.

١٩٨٠٥ - غُرْنُوقُ الْمُرُوجِ \* ، جِيرَانِيُومُ مَرْجِي

Geranium pratense (S). Géranium des prés (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة برية وزيينية معمرة. ساقها منتصبية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها سنائية الأقسام اللآحامية العدد. نصلها خلى البشرة عايق الحصار البحري. أزهارها مستعرضة البتلات الكبيرة لونها إلى الزرقاء الأرجوانية التوشيح || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول.

١٩٨٠٦ - غُرْنُوقُ دَمَوِي \* ، جِيرَانِيُومُ دَمَوِي

Geranium sanguineum (S). Géranium sanguin (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة منتصبية تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها بزرعها خالية اللحماء. أوراقها سباعية الأقسام ثلاثية أو خاسية التشرع المستطيل. أزهارها فردية، دقيقة الامن، حشكية النصل، قلبية البتلات الحمر || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول.

١٩٨٠٧ - غُرْنُوقُ رَمَادِي \* ، جِيرَانِيُومُ رَمَادِي

Geranium cinereum (S). Géranium cendré (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة مستطيلة. ساقها مثدنة تملو من ٨ إلى ١٥ سم. أوراقها خاسية أو سباعية الأقسام الثلاثية القصوص. نصلها بحري اللون، راريد الزغب. أزهارها ثنائية التتبع، بيض البتلات الحمر || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

١٩٨٠٨ - غُرْنُوقُ شَقَارِي الْوَرَقِ \* ، غُرْنُوقُ  
عَسْقُولِي

Geranium anemonefolium, G. tuberosum (S). Géranium à feuilles d'anémone, G. tubéreux (E). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة عسقلية الارومة. ساقها تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها خاسية الأقسام تشبه اوراق الشقائق. نصلها مالى البشرة عايق الحصار. أزهارها ثنائية التتبع، مستطيلة المالحق الحملية اللحماء. بتلاتها كبيرة القد حراء اللون.

١٩٨٠٩ - غُرْنُوقُ عَرِيضِ الْبَتَلَاتِ ، جِيرَانِيُومُ  
عَرِيضِ الْبَتَلَاتِ

Geranium platypetalum, G. ibericum (S). Géranium à larges pétales, G. d'Ibérie (F).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة منتصبية تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم. ساقها بزرعها زباء اللحماء. أوراقها خاسية أو سباعية الأقسام الإلحالية الشكل، المنشارية الحافة. نصلها خلى البشرة، بحري اللون. أزهارها صوبائية التتبع. بتلاتها مستعرضة، مقمرة الأطراف، زرقاء اللون أو بنفسجية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.



غرُنُوقُ الزَّهْلِ



غرُنُوقُ الْمُرُوجِ



غرُنُوقُ شَقَارِي الْوَرَقِ



غرُنُوقُ عَطِرٍ



غرُنُوقُ فِضِّي





غرتوق ملطخ



غريس



غرويل شائعة



غرياق



غريب



غروب

## ١٩٨٢٣ - غريب \* ، كسور

Isora (S). Isora, Jasmin sauvage (F). Wild jasmine (F). Isora (D). Isora, Gelsomino salvatica (I).  
جنس نباتات شجرية وجنية من فصيلة الفويات. أنواعه نحو ٢٠٠ أصلها المناطق الاستوائية. معطها بري وبشها زراعي ربي. أوارها متعقة متعاقبة. انزهارها عشكولي التجميع. تاجي الارتكاز، أزهارها صغيرة القد؛ صطرية العرف، يضاء اللون أو حراء.

## ١٩٨٢٤ - غريب \* ، مي الاثينا، اطبا.

Garrya (S). Garrya (F).  
جنس نباتات معمرة ربينية من فصيلة القرانيات. أنواعها ثمانية. مهدها البلاد الأمريكية. جميعها جنبات صغيرة أو متصلة القد. أوارها أبيض متعاقلة. فصلها احليجي الشكل. جلدي الصفحة، منخفض الحار، عابسة الحصار || أزهارها شريفة التجميع، غصراء اللون أو صفراء أو غراء.

١٩٨٢٦ - غريب \* ، غريباء ، غريباء ، زبوتب  
Meles (S). Blaireau (F). Badger (E). Dachs (D).  
جنس حيوانات لبونة لاح من فصيلة السرعوبيات ورتبة الواحم. أنواعه ستة قدرا بين الكلب والسنور. خلفها بين الدب والسنور. أصلها عالم القدم. جميعها قصيرة القوائم السود، كازة اللحم، غبراء الثوب، يفس الحاسر تحمل على كل ايطل من ايطيلها جدة سواد. ورونها غروطية الشكل. أصلها مستطيلة. اذنانها قصيرة.

## ١٩٨٢٧ - غريب \* ، Instinct

١٩٨٢٨ - غريب \* ، غريباء ، غريباء ، غريباء  
Instinct gréaire (F). Herd instinct, Gregarious instinct (E).  
هي غريبة التجمهر في الحيوان والنبات.

## ١٩٨٢٩ - غريب \* ، Plant (F).

كل نبات في تمكته جلوره من استمرار الحياة.

## ١٩٨٣٠ - غريب ، اغريف ، Pollen (F).

الفريش والاغريف واللعل والصالح واحد. راجع صلب.

## ١٩٨٣١ - غريب ، Rosellera de bambou (F).

اجة الفريش طيعية كانت ام صنية.

## ١٩٨٣٢ - غريب ، Dendrocalamus (S).

جنس نباتات قصية برية زراعية من عمارة الحيزانيات وفصيلة النجيليات. أنواعه قليلة رغب في الاربة الخفيفة الدبالية الرملية. اشهرها غريب هندي.

## ١٩٨٣٣ - غريب هندي ، Dendrocalamus henonis (S).

نوع من الفريش يملو من ٣ الى ٥ انتار. سلاماته متوسطة الطول باعته الحصار الخنطي. اوارها تطول من ٦ الى ١٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. فصلها لاص الحصار على صفحتيه || يرغب في الاربة الدبالية الخفيفة الرملية.

## ١٩٨٣٤ - غرييلة ، Grévilée (F).

هي الغرويل ، اطليها .

فيها الكبة والشحة. جواشها منشة دائما بالاسد || تميز بجاعات متوسطة العدد. تدن اشعاشها في الاشجار المتوسطة الارتفاع. انابها تحضن وسعها من ٤ الى ٥ بيضات مرتين في الحول.

## ١٩٨٦ - غريب ، Baléarique (F).

هو الفزناق ، اطليها .

## ١٩٨١٧ - غرويل ، غرييلة ، Grévilée (S).

Grévilée (F). Silky oak (E). Grévilée, Seide neiche (D). Grévilée (I).  
جنس اشجار وشجيرات برية ورتيية من فصيلة الفصيات. أنواعها عديدة. أوارها ابيدة متعاقبة لا قياسية الشكل. ازهارها ترواية مختلفة اللونان يكثر فيها الاصفر والاحمر. ازهارها سنبل أو عشكولي التجميع ، محوري الارتكاز. اشهر أنواعها ما يتبع.

## ١٩٨١٨ - غرويل جبيلة ، Grévilée alpina (S).

Grévilée alpina (F).  
نوع من الغرويل وهي جنبه معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. أوارها سنابية التصل مقنونة القاعدة. ازهارها حمر البتلات ، صفر الانابيب ، خلية البشرة ، عشكولية التجميع || ازهارها يستمر طوال شهر ايار.

## ١٩٨١٩ - غرويل شاحبة ، Grévilée robusta (S).

Grévilée géante (F).  
نوع الغرويل وهي بلة معمرة تملو نحو ٩٠ سم. أوارها سرخسية الشكل تطول نحو ٢٠ سم. فصلها خلي الصفحة السفلى. ازهارها برتقالية اللون ، حر الموج ، عشكولية التجميع || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

## ١٩٨٢٠ - غرويل عرعرية ، Grévilée juniperina (S).

Grévilée-Génévrier (F).  
نوع من الغرويل وهي بلة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. فروصها زياء القماء. أوارها هدية شاككة تطول نحو ٢ سم. ازهارها صفر البتلات حر الانابيب ، صبيانية التجميع || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

## ١٩٨٢١ - غرويل مرطاعة ، Grévilée glabrata (S).

Grévilée glabra (F).  
نوع من الغرويل وهي جنبه معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وفروصها عادمة الزغب والخلل. أوارها بالغة التفريش ، ثلاثية الفصوص المدية الشاككة الاطراف. ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون ، عشكولية التجميع. ازهارها يستمر طوال شهر ايار.

## ١٩٨٢٢ - غريباق \* ، سقاوة صغرية ، Archibuteo (S).

Busale, Archibuteo, Buse pattue (F). Rough-legged buzzard (E).  
جنس طير من عمارة السقاوات وفصيلة السقريات. أنواعه ثلاثة شديدة الشبه بالسقاوة الا انها اكبر جنة. طولها رايوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. سواقها كبيرة القد، ذققة الاطراف، تلحف معطر الاذنان. ارسانها مسرولة. القواها الى السمة الموشة بالاييض والاثير والاسهب والاطمل. جميعها من القواطع التي تجوب البلاد المتدلة الحرارة. تدن في شقوق الصخور الرقيقة الشاركة النائية عن كل عران. انابها تحضن وسعها من رقتين الى ثلاث رقات. قوتها القروغم والمظا، والاغني والخشرات على اختلافها.

## ١٩٨٤٤ - غَزَّانُ عَيْنِ الطَّاوُسِ

*Gazania pavonia* (S). *Gazanie cell de paon* (F).  
نوع من الفزان الممر . ساقه غشوشة فراء تملو نحو ٦٠ سم. فروصها كثيرة العدد ، قصيرة القد ، متراكبة . أوراقها الجذرية والجزعية متوسطة الحجم ، ريشية التشرج . نصلها انخسر اللون بمطر الزئبق . رؤوساته الزهرية متوسطة القد ، اقراصها يرتقالية اللون ، نارية الملمح . حناياها شديدة السواد اللامع || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

## ١٩٨٤٥ - غَزَّانُ قُرْدِي الْهَرَّةِ

*Gazania uniflora* (S). *Gazanie uniflore* (F).  
نوع من الفزان الممر . ساقه غشوشة متدلية الفروع . أوراقها اهليجية مساوية . نصلها مائل الصفحة العليا ، خلي السفل الذرياء اللون . رؤوساته الزهرية فردية التجميع كبريتية الصفار || تنوره يستمر من تموز الى آب .

## ١٩٨٤٦ - غَزَّةٌ ٥

*Gazza* (S). *Gazza* (F). *Gazza* (E).  
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي . جنس اسماك بحرية من فصيلة الشيميات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة ثلاثة . اعطائها البحر الاحمر والخليج العربي والحيط الهندي || اجسامها شبه بيضية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوتابها السائلة الى الريدة الفضية تبق عند الظهر وتضفر عند البطن . رؤوسها شبه اسفينية الشكل . اعطائها علوية الارتكاز متدعة . عيونها مستديرة ، كبيرة ، ماصة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة متعابله . زعانفها الذيلية فارقة || طوبها جيدة الصنف مرغوب فيها .

## ١٩٨٤٧ - غَزَلٌ ، تَشْبِيهُ ، غَلَاخَةٌ

*Erotisme* (F). *Erotism* (E).  
شهوانية متطرفة مشيرة . وقد تكون حالة مرضية .

## ١٩٨٤٨ - غَزَلِيٌّ ، غَلَاخِيٌّ ، تَسْبِي

*Erotique* (F). *Erotic* (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحب العذري او الخلاعي او الجنسي .

## ١٩٨٤٩ - غَزِيلٌ . هو ابرة العجوز ، اطلبا .

## ١٩٨٥٠ - غَسَّاسٌ ٥

*Cudonia confusa* (S). *Cudonie confuse* (F).  
فطر كاعن الصنف لا مأكول من فصيلة الفشاريات وربة الزقيات . يكثر وجوده في ارجح السنبور . يعيش على المواد النباتية المنحلة . نكهته مجموعة من الريدات الصغيرة قشرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الاسمر الملمح . معناه مصراعي الانغلاق . ساقه معتدلة الارتفاع مبطة الشكل يطولها اخدود يمتد من القاعدة الى الاطراف .

## ١٩٨٥١ - غَسْتَوْكَةٌ ٥

*Gastrochaena* (S). *Gastrochène* (F). *Gastrochaena* (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مصفحيات الحياشيم وفصيلة المستقيبات . انواعها النابتة المتجسرة عديدة اما الحالية فنحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || وهي من الهوييات الثابتة تعيش ضمن انبوب صدي المادة تغلفه المواد الكلسية .

## Boue (F). Mud (E).

هو الطين يحملة السيل فيتي على وجه الارض متشققاً رطباً كان او يابساً || رمو التفل في اسفل القارورة .

## ١٩٨٣٦ - غَرِيْنٌ ، غَرِيْنٌ ، طَعْيٌ

*Alluvion, Limon* (F). *Alluvium, Silt, Ooze* (E).  
ومن اسمائه التضاوة والطلح والفلح . والغرين راسب من الاترية والبقايا الغصوية حمله المياه المكرة فرسبت .

## ١٩٨٣٧ - غَرِيَّاتٌ

*Garryaceae* (S). *Garryacées* (F). *Garryaceae* (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة الفلوات . كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة القرانبات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطائها البلاد الامريكية || نباتاتها جنبات سبروتية معمرة ، تملو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها ابيدة ، متعابله . نصلها جامدة حيلة الخضار الالمنس . انفراسها شبري التجميع . انفراسها ثنائية المسكن ، صغيرة الجرم ، خضراء اللون . ثمارها فردية البزرة او ثنائيتها || اشهر اجناسها الغرية .

## ١٩٨٣٨ - غَزَّارٌ . هو قصب الرمل ، اطلبا .

## ١٩٨٣٩ - غَزَّالٌ

*Gazelle* (F).  
اسم شامل يطلق على بعض الحيوانات من ذوات الاطلاف المحيطة القرون منها الظبي العربي والرثم والاريل والادم الخ . ج غزلة وغزلان .

## ١٩٨٤٠ - غَزَّالٌ

*Bonite à ventre rayé* (F).  
سمكة بحرية تسمى || يوتيت مشيرة البطن ، اطلبا .

## ١٩٨٤١ - غَزَّانٌ ٥

*Gazania* (S). *Gazanie* (F).  
جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة اعطائها معظم اصقاع العالم القديم . سوقها زيباء لانظمة التفرع . اوراقها حليلة لاقبسية الترتيب منها الجذرية والجزعية المتعابله . رؤوساته الزهرية كبيرة القد صفر اللون . قبايات قلافاها ملتحمة ، عديدة الصفوف ، قيمة الشكل . نخوتها عريانة . بزورها نائية الثغور المتتامة اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

## ١٩٨٤٢ - غَزَّانٌ لَنَجِيٍّ

*Gazania nivea* (S). *Gazanie neigeuse* (F).  
نوع من الفزان الممر . ساقه غشوشة فراء تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوراقها الجذرية والجزعية متوسطة القد مسطوية الشكل . نصلها اخضر الصفحة العليا ، ابيض السفل بياضها كالثلج . رؤوساته الزهرية كبيرة القد قشرها براوح بين ٧ و ٩ سم. اقراصها الى الصفرة البرتقالية الملمح . حناياها اسمر اللون اسفع || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ١٩٨٤٣ - غَزَّانٌ رِيْشِي الْوَرَقِ

*Gazania pinnata* (S). *Gazanie pennée* (F).  
نوع من الفزان الممر . ساقه غشوشة فراء . اوراقها الجزعية متوسطة القد ريشية التشرج . اوراقها الجذرية كبيرة النصل المهذب الاطراف المنطة . رؤوساته الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ، كبريتية الصفار . تنوره يستمر من حزيران الى آب .



غَزَّانٌ



غَزَّةٌ



غَسَلٌ



غَسْتَوْكَةٌ

19809 - عُشْبِيَّة الْجُنْبُل \* *Hypera rostralis* (S).

Noctuelle du houblon, Toupet (F).

فراشة صغيرة القذ طولها نحو ١٢ سم. ثوبها الى الصهبة  
الصنابية المشبعة المواج. رواشتها مهدبة الخواش الحماشي.  
لها جيلان في الحول. يرتقا طول نحو ٢٢ سم. ثوبها الى  
الخضرة يملوها تسليج اسمر. رأسها اسود || تركيب  
الجنبل فتؤذي اشد الاذى.



عشيل

19810 - عُشْبِيَّة الْحَصِيد \* ، لَيْلِيَّة الْحَصِيد ،

قَرَاة الْحَصِيد *Agrotis segetum*,

*Euxoa segetum* (S). Noctuelle des moissons (F).  
Turnip dart moth (E). Wintersaateule (D).

فراشة كبيرة القذ سمراء اللون مهدبة الرواشن طولها نحو ٢  
سم. ويصلها ٤ سم. رواشتها الامايمان الى الصفار الخطني  
اما الخلفيان فال بيض الاخير يتصله عروق عابقة .  
جيلها يستمر نحو الستين . تمتع مكها ابتداء من اوتائل  
الربيع فينتفد بعد اسبوعين || يرتقا طول نحو ٥ سم.  
وهي شبيهة اللون يملوها مواج زيتوني وضمان اصفران قاطبان  
يتخللها في كل مفصل من مفاصلها اربع نقط سود .  
تركب القمح والسلق والذرة والتبليات المرعوية والبطاطا  
والشوندل والكرمة والتبغ والملفوف والبصل الخ ...



عشبة الارضي شوكي



عشبة البقول

19811 - عُشْبِيَّة الدُّورَة الصَّفْرَاء \* ، لَيْلِيَّة

الدُّورَة الصَّفْرَاء ، دُرْدَة الدُّورَة

*Noctua Zeae*, *Agrotis zeae* (S). Noctuelle du  
maïs (F).

فراشة متوسطة القذ ثوبها الى الصهبة الوردية المواج .  
اكبر قدا واعيق ثوبا في ذكورها . لها جيلان في السنة .  
تظهر في حزيران وفي آب || يرتقا سمراء اللون وردية  
المواج طول نحو ٤ سم. تألف الموائل الربطة . تركيب الدرة  
وسائر التبليات الملقية .



عشبة الجنبل

19812 - عُشْبِيَّة السَّكَّ

Noctuelle du seigle (F).

حشرة تدعى هذينة الشيلم ، أطلها .



عشبة الحصيد

19813 - عُشْبِيَّة السَّوْبَر \* *Panolis piniperda*,

*P. flammea* (S). Noctuelle du pin (F).

فراشة من النسيقات صغيرة القذ. ثوبها الى السرة الخضرة،  
تبيجها وزراكتها الزرقونية جيلة الشكل والانتظام .  
يرتقا خضراء اللون مخملية بالايض تركيب السووبر من  
حزيران الى تموز فتلهم اوراقه .



19814 - عُشْبِيَّة النَّصَب *Sésamie* (F).

هي السبزامية ، أطلها .



عشبة الدرة الصفراء

19815 - عُشْبِيَّة الصَّمَح \* ، لَيْلِيَّة الحِنَطَة ،

قَرَاة الحِنَطَة

*Agrotis tritici*, *Euxoa tritici* (S). Noctuelle du blé  
(F). White-line dart moth (E).

فراشة من النسيقات صغيرة القذ ثوبها الى الوردية رواشتها  
الامايمان مبيجان بالاسمر . جيلها يستمر نحو الستين .  
تمتع مكها خلال شهر حزيران فينتفد بعد اسبوعين .  
يرتقا كبيرة القذ طول نحو ٥ سم. ثوبها الى الصهبة  
الخضراء يملوها مواج اغبر وضمان اصفران يتخللها في  
كل مفصل من مفاصل جسمها اربع نقط سود || تركيب  
الحنطة والشيلم والذرة وتختلف الببئات التبيلية المرعوية  
والمملوف والكرمة .



عشبة السووبر

19802 - عُشْبِيَّات \* *Gastrochaenidae* (S).

*Gastrochaenidae* (F). *Gastrochaenidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات صليحيات الخواشيم .  
اجناسها وانواعها الممارسة عديدة منتشرة في جميع بحار  
العالم . اما النابرة من متحجرات الحقبلة الثالثة ||  
اشهر اجناسها العنققة والرافشة والفستولة .

19803 - عُشْبِيَّة \* *Glycyphila* (S).

*Glycyphila* (F).

جنس طير من الجوارث يرققات المناخير وفصيلة القثريات .  
انواعه المعروفة ١٢ موطنها يمتد من جزر الزاباج الى  
أستراليا . ملجئها الحيالي جماعي . قوتها الحشرات الصغيرة  
والذباب والحمام وسيق الازهار || اجسامها صغيرة تطول  
من ١٢ الى ١٥ سم. مناقيرها مقوية . اجنحتها تلتحف  
الافتيك . اذناها خفيفة ، طويلة ، مقوية الاطراف .  
الثوب ملون جيلة الغمام الزاهي || تلتن في الانحجار  
المعتلة الارتفاع . تحضن مرتان في الحول وفي كل مرة  
من ٤ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما  
تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

19804 - عُشْبِيَّة *Crépusculaire* (F).

*Crepuscular* (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالفسح .

19805 - عُشْبِيَّات ، لَيْلِيَّات

*Noctuidae*, *Agrotidae* (S). *Noctuidae*, *Agroti-  
des* (F). *Noctuidae*, *Agrotidae*, *Owlet* moths,  
*Cutworms* (E). Eulen (D).

فصيلة حشرات من مخلفات القرون ورتبة حشراف  
الانجمنه . انواعها زهاء ٢٠٠٠٠ معلوما دجوي وبعضها  
يسرح في البهار . اجسامها متوسطة القذ . قوتها  
الاستعمارية شديدة الشكل او خيطية || يرتقا مالة  
البشرة داكنة الالوان . خادراتها تقم في التربة تلتحف  
بجلباب من البين .

19806 - عُشْبِيَّة ، لَيْلِيَّة *Noctuelle* (F).

*Noctua* (E).

اسم شامل يطلق على عدة حشرات افراشة من فصيلة  
النسيقات || اشهر النسيقات ما يتبع :

19807 - عُشْبِيَّة الارضي شوكي \*

*Gortyna ochracea* (S). Noctuelle de l'artichaut (F).

فراشة صغيرة القذ طول نحو ٢ سم. ثوبها الى الصفرة  
الذهبية . رواشتها مهدبة الاطراف يملوها زراكتي  
وتمايز متباينة الالوان || يرتقا غراء اللون، سوداء  
الرأس طول نحو ٤ سم. تركيب الارضي شوكي والبطاطا  
قلم السروق وتقضي عليها .

19808 - عُشْبِيَّة البَقُول \* *Hadena oleracea*,

*Polia oleracea* (S). Noctuelle potagère (F). *Bright-  
line brown-eye* (E). *Gemüseaula*, *Salataule* (D).

فراشة صغيرة القذ طولها اللب مدجة الرواشن بالخطني  
والاسمر . تظهر من حزيران الى تموز . تمتع مكها على  
نصال الاوراق دون تميز بين النصفه العليا او السفلى .  
ينتفد المكن بعد عشرة ايام من رقات دقيقة سمراء اللون  
تتطور بسرعة من انسلاخ الى انسلاخ حتى يبلغ طولها  
نحو ٥ سم . ويستمر ثوبها على السرة الخضراء الزرقية  
المواج || وهي في جميع اطوارها البرقية لا تنقطع عن التهام  
اوراق البقول على اختلاف انواعها ونسائلها .

الاقباسي الترتيب || ايجالها الحولية ثلاثة تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها غيرة اللون تطول من ٢٢ الى ٢٧ م. تركب البطاطا والجذر والملفوف والكرمة .

### ١٩٨٧٤ - عَشَائِيَّةُ مُلَوَّنَةٌ

Noctuelle colorée (F).  
حشرة تدعى ذبيلة دقيقة ، اطباها .

١٩٨٧٥ - عَسَلُ  
Pédiluve (F).  
الفسل او غسل القوائم عمل تفرسه الطيابة البيطرية ، قواه غسل قوائم الخيول ببعض المحاليل الملوّنة لانتقاء الحمى القلاعية وغيرها من الامراض .

### ١٩٨٧٦ - عَسَلُج

نبات مثل القفصاء . ترتفع قدر الشبر . لها ورقة لزجة وزهرة كزهره المرو الجبلي (السان) .

### ١٩٨٧٧ - عَسَوَةُ \* ، غلاديشيا

Gleditschia (S). Févier, Carouge à miel (F). Three thorned acacia (E). Gleditschbaum (D). Gledizia (I).  
جنس اشجار برية وتربينية من فصيلة القرنيثيات القراقشية ، انواعها المعروفة خمسة جميعها شائكة . سوقها منتصبه . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية . ازهارها محورية الارتيكاز . ثمارها قرون غرنوبية مخشوشة لا تخلو من السكر . يستخرج منها بعد التخمير والتقطير قنديل كمولي لا بأس فيه || اعرف انواع الفسو واشهرها ما يلي .

### ١٩٨٧٨ - عَسَوَةُ المَنَاقِعِ ، غلاديشيا المَنَاقِعِ

Gleditschia aquatica, G. monosperma (S). Févier des marécages (F).  
شجرة برية وتربينية ترغب في المستنقعات وسائر الاراضي الرطبة . ساقها تعلو من ٦ الى ١٢ م. شوكها دقيق الجسم ، مقطوع القاعده . اوراقها مستطيلة ، وريقاتها شقية اراوح عددها بين ٢٠ و ٢٨ ، تصلها سناني الشكل مالمس البرية || قرونها بيضيه مبطله تطول نحو ٤ م. وتمرض ٢ سم. وهي وصيدة البزرة عديمة اللباب السكري . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٩٨٧٩ - عَسَوَةُ اليابَانِ ، غلاديشيا يابانية

Gleditschia japonica, G. horrida (S). Févier du Japon (F).  
شجرة سبروتية تعلو من ٨ الى ٢٠ م. اشواكها متشعبة تطول من ٥ الى ١٠ سم. اوراقها مستطيلة . وريقاتها تمد من ١٦ الى ٢٠ تصلها اطيالجي الشكل ، مقطوع القاعده ، مالمس البشرة بطول نحو ٥ سم. ويمرض ٢ سم. قرونها كبيرة القد متنوعة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. وتمرض نحو ٦ م. لباها غزير المادّة السكرية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٩٨٨٠ - عَسَوَةُ ثَلَاثِيَّةُ الشُّوكِ ، غلاديشيا ثَلَاثِيَّةُ

Gleditschia triacantha (S). الشوك  
Févier à trois épines (F).  
شجرة سبروتية برية وتربينية تعلو من ١٠ الى ٤٠ م. ساقها منتصبه . اشواكها ثلاثية التركيب حادة الحمة . اوراقها تطول من ١٤ الى ٢٠ سم. وتقص من ٢٤ الى وريفة تصلها مالمس الصلصمة محز الحنار || قرونها عنبية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. لباها غزير المادّة السكرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

### ١٩٨٦٦ - عَشَائِيَّةُ الكَلَاءِ ، ثَلَاثِيَّةُ الكَلَاءِ

Neuronion popularis, Epineuronion popularis, Helio-phobus popularis (S). Noctuelle des fourrages (F).  
فراشة صغيرة القد حنطية اللون وروشناها الاماميان الى السمرة تمرضها عروق بيض . روشناها الخلفيان الى الفبره الحنطية يحويها حنار مهذب الاطراف || سرحتها دجوي يستمر من تموز الى ايلول . الانثى تمتع مكثها على سوق واوراق الاشباب البرية فيتفتق من رقات دقيقة سريعة التطور يبلغ طولها نحو ٤٥ م. في اقل من شهر . ثوباها الى السمرة يميلها من كلتي جانبيها ثلاثة خطوط قاطبة صفراء اللون || تخبئ في النهار تحت الحجارة وترسح في الليل . قوتها اوراق الاشباب النجيلية ان برية او مروعية وانحصا الذرة .

### ١٩٨٦٧ - عَشَائِيَّةُ المَلْفُوفِ \* ، ثَلَاثِيَّةُ الكُرْبِ دُرُودَةُ الثَّلَبِ

Barathra brassicae, Mamestra brassicae (S). Noctuelle du chou, Brassicaire, Ver du cœur (F). Cabbage moth (E). Kohleule (D).  
فراشة صغيرة القد مطلقا اللون . رواشنا متناخلة الاولان مبقجة ومزركشة . لها جيلان في الحول . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القد تطول من ١٦ الى ١٨ م. تعيش على اوراق الملفوف والنس والقره والتبع وقد تقرض سوق شتول الملفوف قطعها وتقضم اوراق التبغ فتشورها .

### ١٩٨٦٨ - عَشَائِيَّةُ حَلَسَاءِ

Noctuelle baie (F).  
حشرة تدعى اغروتيس أحلس ، اطباها .

١٩٨٦٩ - عَشَائِيَّةُ رَمْدَاك  
Acronycta rumicis (S).  
Noctuelle cendrée, Cendrée (F). Dark knot-grass moth (E). Ampferule (D).  
فراشة صغيرة القد رداء الثوب مبقجة بالابيض . ايجالها الحولية ثلاثة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القد ثوبا الى السمرة العاقبة ، طولها اراوح بين ١٤ و ١٨ م || تركب الجنبيل والملفوف والشيك .

### ١٩٨٧٠ - عَشَائِيَّةُ زُنْجِيَّةِ

Noctuelle basanée (F).  
حشرة تدعى اغروتيس زنجي ، اطباها .

### ١٩٨٧١ - عَشَائِيَّةُ عَجَبِيَّةِ \* ، ثَلَاثِيَّةُ عَجَبِيَّةِ

Agrotis exclamatonis, Feltia exclamatonis (S). Noctuelle point d'exclamation, N. double tache, Double tache (F). Heart and dart moth (E). Kreuzkrautackereule, Ausrufungszeichen (D).  
فراشة صغيرة القد حنطية اللون وروشناها الاماميان الى الشقار الصانعي يملوها بتبقيج ثنائي الشكل . ايجالها الحولية اربعة وخسة || يرتبها كدراء اللون تطول من ١٦ الى ١٩ م. تركب الفصح والسلت والشعير والذرة ويختلف النجيليات المروعية والشندير والبطاطا والملفوف واللفت والكرمة والتبع .

### ١٩٨٧٢ - عَشَائِيَّةُ قَارَصَةِ

Noctuelle ypsilon  
هي فراشة البودة القارصة ، اطباها .

### ١٩٨٧٣ - عَشَائِيَّةُ مُصَاحِبَةِ

Tryphaena pronuba (S). Noctuelle pronubée, Fiancée (F). Common yellow underwing moth (E). Hausmütterchen (D).  
فراشة صغيرة القد ، صفراء اللون ، فضية التبقيج الدقيق



عَشَائِيَّةُ القَمَحِ



عَشَائِيَّةُ المَلْفُوفِ



عَشَائِيَّةُ عَجَبِيَّةِ



عَشَائِيَّةُ مُصَاحِبَةِ



عَسَوَةُ

## ١٩٨٩٩ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hyménoptères symphytes (F). Hymenoptera symphytes (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . اجناسها وانواعها زهاء ٨٠٠٠٠٠ اجسامها متباينة الاجسام تراوح بين ٣ و ٤٠ م. جميعها كاملة التطور ، رباعية الاجنحة العشائية . عادمة الانفصال الحسري ، بطونها لاصقة بجوانبها . اخطاها قارضة او لاصقة . ممرات انثاء مسننة كاللشار تحترق اصبل الحاء وهي تستعملها في الحفر والخز والروخ || اشهر فصائلها : العليسات والحظاريات والنطرفيات .

## ١٩٩٠٠ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ الْمُخَصَّرَةِ

Hyménoptères apocrites (F). Hymenoptera apocrites (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠٠٠٠٠ اجسامها متباينة الاجسام والاولان . جميعها كاملة التطور . خصورها دقيقة واضحة منها الانبوبية الشكل والمردنية . اجنحتها عُشَائِيَّةُ رباعية . اخطاها قارضة او لاصقة . اشر انثاءها مسننة كاللشار تستعمل الحفر والخز والروخ || فصائلها كثيرة العدد ، اشهرها الآبرات والذحوريات والدلكيات والزبوريات والنعليات والنمليات والصغريات والنسيات .

## ١٩٩٠١ - عُشْمِيرِيَّة

Hyperparasite (F).

كل كائن طفيلي يعيش على طفيل آخر .

## ١٩٩٠٢ - عُشَوَة

ثمرة السدر . ج. غشو .

## ١٩٩٠٣ - عُصَب

هو الاعتصاب ، اطلبه .

## ١٩٩٠٤ - عُصَص

Gallsoga (S). Galinsoga, Galinsogée (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة : جميعها برية . اوراقها متقابلة ، ناعما مالة او زياه . ازهارها حامية الارتكاز ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الانواع . وهو جميع انواعه من النباتات المرعوية لكنه ينتمي من الاعتصاب القصرة التي تستنزف الثروة وتؤذي الزروع والزرعات .

## ١٩٩٠٥ - عُصَن ، تَعْصِين

Ebranchage (F). Pruning, Lopping, Trimming (E).

هو اقتطاع الاغصان وقد يكون السبب حث الشجرة على الارتفاع أو تغيير هيكلها أو تجديد شبابها .

## ١٩٩٠٦ - عُصْن

Branche (F). Branch, Bough (E).

الفصن هو الفرع على الساق غلط او دق .

## ١٩٩٠٧ - عُصْن تَمَرِيّ

Branche fruitière (F). Limb (E).

عصن يكون عادة اذق من الاغصان المألفة الاخرى يحمل الثمر مباشرة .

## ١٩٩٠٨ - عُصْنَة ، عُصَيْن

الفصنة والعصين هو ما استند من الاغصان بلغ المحول او لم يبلغه .

## ١٩٨٨١ - عَسَوَل

هو إثنان ابوساق ، اطلبه .

## ١٩٨٨٢ - عَسَوِيل

نبت من السباخ (السان) .

## ١٩٨٨٣ - عَشِيّ

Falsification, Fraude (F). Falsification, Fraud (E).

خدع الشاري بتبديل ماعية المشتري أو تبديل صفاته . وفي القانون المدني هو الخداع المقرون بسوء النية للاضرار بالغير ككشف البذار والاسمعة والادوية الخ ...

## ١٩٨٨٤ - عَشَاء ، عِلَاف

Tégument, Membrane (F). Membrane, Tégument (E).

ما يغطي أو يلف جسم الحيوان والنبات كالجلد والوبر والريش واخراف والحاء .

## ١٩٨٨٥ - عَشَاءُ جَرْوُلِيّ ، عَشَاءُ رَحْمِيّ

Membrane germinale (S). Germinal membrane (E).

## ١٩٨٨٦ - عَشَاءُ خَلِيَوِيّ

Membrane cellulaire (F). Cell membrane (E).

## ١٩٨٨٧ - عَشَاءُ سَنَخِيّ ، عَشَاءُ ثُخْرُوِيّ

Membrane alvéolaire (F). Alveolar membrane (E).

## ١٩٨٨٨ - عَشَاءُ عَصَلِيّ

Myolemm, Sarcolemme (F).

كل عشاء يلف العضلات الرئيسية .

## ١٩٨٨٩ - عَشَاءُ غُرْبَالِيّ

Membrane criblée (F). Sieve membrane (E).

## ١٩٨٩٠ - عَشَاءُ عَطَائِيّ

Membrane recouvrante, M. tectoria (F). Tectorial membrane (E).

## ١٩٨٩١ - عَشَاءُ قَاصِل

Membrane limitative (F). Limiting membrane (E).

## ١٩٨٩٢ - عَشَاءُ مُخَطَّاطِيّ

Muqueuse, Membrane muqueuse (F). Mucosa, Mucous (E).

مادة غاطية تلتف بغض اجزاء اعضاء الجسم الحيواني .

## ١٩٨٩٣ - عَشَاءُ مَصَلِيّ

Membrane séreuse (F). Serous membrane (E).

## ١٩٨٩٤ - عَشَاءُ نَافِض

Membrane caduque (F). Deciduous membrane, Decidua (E).

## ١٩٨٩٥ - عَشَاءُ نَوَوِيّ

Membrane nucléaire (F). Nuclear membrane (E).

## ١٩٨٩٦ - عَشَائِيّ

Membraneux (F). Membraneous (E).

## ١٩٨٩٧ - عَشَائِيَّات ، فَطُورُ عَشَائِيَّة

Hyménomycètes (F). Hymenomyces (E).

مجموعة من الفطور العفامية من ذوات الغلفة البوفية .

## ١٩٨٩٨ - عَشَائِيَّاتِ الْجَنَاح

Hyménoptéroïdes (F). Hymenopteroides (E).

طبقة حشرات من شعبة المسدليات وطائفة الاجنحات اصلا . تشمل كل من رتبتي عُشَائِيَّةِ الاجنحة وعشائيات الاجنحة المصغرة . اما انواعها فنحو ٢٠٠٠٠٠ تتجمع في ٩٦ فصيلة .

ظهور الصوم باستعمال سائل يورده الحجل من ١ الى ١٥ ٪

١٩٩١٥ - غُصَاة  
Tamaris de Syrie (F).  
هو الاثل السوري شجرته تملو نحو عشرة امتار اشخاشها صلبة مغروبة فيها . ج غضا .

١٩٩١٦ - غُصَار ، دُغَان (F). Glaise, Argile verte  
Clay (E).

تراب صصالي لازب حر شديد الاندماج والصلابة لونه الى الخضار الداكن . يستعمل في صناعة الفخار والخلف .

١٩٩١٧ - غُصَارَة (F). Paragéésie (F).  
Paragenesy (E).

الغضارة تهجين تكون فيه المجين عقيمة ان تصالبت فيها بينها وتكون ثنورة فيها لو تصالبت مع كل من ابويها .

١٩٩١٨ - غُصَارَة (F). Pléthore (F).  
Plethora (E).

الغضارة هي فرط التنو في النبات .

١٩٩١٩ - غُصَارِي ، دُغَانِي (F). Glaiseux (F).  
Clayey, Loamy (E).

الذي يحتوي على الغضار او الذي يشبه الغضار او الدلغان .

١٩٩٢٠ - غُصَارِي  
نوع من الجراد ويسمى الجراد المبارك (السان) .

١٩٩٢١ - غُصَان (F). Avortement (F).  
Abortion (E).

هو لاقاء الاثني الحامل ولدعا لغير تمام .

١٩٩٢٢ - غُصَانَة \* (S). Tunica (S).  
Tunique (F).

حشية برية معمرة من فصيلة القرنفلبات . ساقها دقيقة فروعها تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اولواها جذعية الانتشاج فضية ، متراكبة . فصلها مستطيل الصغمة القصيفة البحرية اللون . ازهارها صغيرة القند ، فردية الارتكاز ، مخلفة الالوان منها اليبض والبيكي والوردي والموشج . ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٩٩٢٣ - غُصْرَاء (F). Pelouse (F).  
Lawn, Greensward (E).

كل ارض يفسحها العشب الاخضر ان طويها او مزرجها . ج غضاريا .

١٩٩٢٤ - غُصْرَة  
الغصرة نبات دقيق الورق الاخضر يفرش الارض .

١٩٩٢٥ - غُصْرَم (F). Silicate d'alumine (F).  
Silicate of alumina (E).

مركب طبعي يحوي بعض الالومين . الغضارم كثيرة العدد لا مجال لذكرها جميعها انما تختص منها الفلسفاة والميكا والغضار والكولان .

١٩٩٢٦ - غُصْرُوف (F). Cartilage (F).  
Cartilage, Gristle (E).

مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يبيض اللون تكثر غصاصة عند اطراف الطعام .

١٩٩٢٧ - غُصْرُوف العظم (F). Cartilage des os (F).  
Bone cartilage (E).

## ١٩٩٠٩ - غُصُوب جُور \*

Tyrannus intrepidus (S).

Tyrann intrépide, Pipiri (F). Tyrant, King-bird (E).

طائر من القواطع من فصيلة الغصوبيات . موطنه بعض

مناطق امريكا الجنوبية يرحل منها الى امريكا الشمالية

في اواسط آذار ويوجد اليها في اواسط ايلول . يأت

خفاف البحرات ويجاري الماء ويقترّب من الجنائن

والخدائق والبساتين || جسمه متوسط القند يملو نحو ٢٠ سم .

قوته متباين الالوان المتداخلة . رأسه وظهوره الى الوردية

الزرقاء المزاج . زوره وعتقه الى البياض الناطع . صدره

وبطنه الى الوردية الشهباء . ويلغو في كل من صغفه

شرطي يرتقالي يمتد من قاعدة المتفاد الى القفن . جناحه

وذنيه الى الوردية السوداء المزاج . ذنبه مستدير الطرف .

رصافه واصابعه الى السمر || قوته الحشرات المختلفة من

الكبيرة الى الصغيرة والزناير والنحل || يئن شته في

الاجنار الرقيقة على الاغصان المنبسطة . الاثني تقع من

اربع الى خمس يبيض لونها الى البياض المرقوش بالاحمر

والاسمر . الحفن يستمر نحو اسبوعين تقوم به الاثني

بمناوبة الذكر .

١٩٩١٠ - غُصُوبَات (S). Tyrannidae (E).

Tyrannidés (F). Tyrannidae (E).

فصيلة طير من الجوامئ شيات المناقير . اجناسها وانواعها

المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الامريكية

اغصنها امريكية الجنوية || اجسامها متوسطة القند .

مناقلها يطول رؤوسها . اجنتها ذلقة . اذناها قصيرة

متباينة الاشكال . ارساغها دقيقة متفلة الطول . اولها

ملونة زاهية الخضاب || قوتها الحشرات عسل اختلاف

فصائلها || اعرف انواعها واشهرها الغصوب الجور .

١٩٩١١ - غُصِين (F). Polyclade (F).

Polycladous (E).

الغصين من النباتات ما كانت اغصانه وفاداه اكثر من

الماثول .

١٩٩١٢ - غُصَامَة ، أَنْتُمْسُورِيُوم \* (S). Entomosporium (S).

Entomosporium (S). Entomosporiose (F).

جلس فطور مجهرية من فصيلة المذكيات . يكنهاته

منقطة ، سوداء اللون ، فرجية الانفلاق . جوطها نحيل الحافة ،

غليظ القاعدة . شقيراته سبية لاحقة ، بويغاته ثنائية

الحلية || اشهر انواعه الغضاء اللامخ .

١٩٩١٣ - غُصَامَةُ النخل \* (F). Entomosporium thuenenii (S).

Entomosporiose du dattier (F).

آفة للنخل الكالبار يقع على البسر فينحج الادراك ويسبب

التجتمج والنشاف || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل

يورده الحجل من ٨ الى ١٠ ٪

١٩٩١٤ - غُصَامَةُ لَامَخ \* (S). Entomosporium maculatum (S).

Entomosporiose maculée (F).

فطر مجهرية يصيب ورق الزعرور والارونة والمشملة

والاكيدنيا . وقد يصيب في بعض ظروف خاصة الاغصان

والثار غير المرضة لاشمة الشمس || مظهره الخارجي

يقع صغيرة مستديرة مبيضة على كامل نصل الاوراق ،

تبدو بنية اللون ثم تحرف نحو السمر فتعطب البشرة

والنشح المتحارة وتشل التبادل التنسي || يكافح عند



غُصُوب جُور



غُصَامَةُ لَامَخ



غُصَامَةُ

## ١٩٩٣٩ - غُضْرُوفُ الْبَيْدَاءِ ، جُوفِي الْبَيْدَاءِ

Syrnhaptes paradoxus (S). Syrrhapte - paradoxal, Poule des steppes (F). Black-bellied (E).

طائر من النصف طول نحو ٢٤ سم. يعيش أستراليا كبيرة تجوب فيافي آسية الشمالية والوسطى. قَلْبًا مخلق في سماء لبنان.

## ١٩٩٤٠ - غُضْرُوفُ الثِّبَتِ \* ، جُوفِي الثِّبَتِ

Syrnhaptes thibetanus (S). Syrrhapte du Thibet (F).

طائر من النصف طول نحو ٢٢ سم ثوبه ال أبيض. أسياره قليلة الدم. موطنه مرتفعات التبت وجبالها.



غضفة التبت

## ١٩٩٤١ - غُضْرُوفَات

Pteroclididae (S). Pteroclididae (E).

فصيلة من الطير من رتبة الدجاجيات تعرف بالجوئيات.

## ١٩٩٤٢ - غُضْن

Tunlike (F). Tunica (E).

## ١٩٩٤٣ - غُضْنُ الْعَيْنِ

Tunique de l'oeil (F).

## ١٩٩٤٤ - غُضْنُ حُبْبِيّ

Tunique granuleuse (F). Granulosa tunica (E).

## ١٩٩٤٥ - غُضْنُ خِرَاجِي

Tunique adventice (F). Adventitia tunica (E).

## ١٩٩٤٦ - غُضْنُ لِيْمِي

Tunique fibreuse (F). Fibrosa tunica (E).

## ١٩٩٤٧ - غُضْنُ مُتَوَسِّط

Tunique moyenne (des artères) (F). Media tunica (E).

## ١٩٩٤٨ - غُضْنُ مُخَاطِي

Tunique muqueuse (F). Mucosa tunica (E).

## ١٩٩٤٩ - غُضْنُ مُنْعَطَف ، غُضْنُ أَعْوَج

Pli déjeté (F). Asymmetrical fold (E).

## ١٩٩٥٠ - غُضْرُوفٌ ، غُضْرُوفَةٌ

نبات يشبه الصمغ واللّحم. وقيل شجرة غبراء معطر. وقيل هو نبات لا يعقد عليه غم (السان) ج. غُضُور. وغُضُور.

## ١٩٩٥١ - غُضْرُوفٌ

Sacopteryx (S). Sacoptéryx (F).

جنس غُضْرُوفٌ من عارة الراسات موطنه أمريكا الجنوبية والنيوان. أنواعه قليلة الدم تتميز بشاشة رؤوسها وبقصم أذناها المنفصلة || يعيش جماعات كثيرة العدد. يسرح طوال الليل. قوته الحشرات. يألف الأشجار المرحية. لا يتخلى المطر.

## ١٩٩٥٢ - غُضْبِير

Pléthorice (F). Plethoric (E).

النبات الغضير ما كانت أعضائه غضة وأوراقه غضراء سائنة زائجة. وهو قلما يزهر ويشمر.

## ١٩٩٥٣ - غُضْيُفٌ

ولد البقرة الوحشية.

## ١٩٩٥٤ - غُضْيُفٌ \*

Sistotrema confluens (S). Sistotreme confluente (F).

فطر من فصيلة السميات. يوجد في غابات الصنوبر. يعيش بمجموعات متماسة على المواد النباتية || ساقه قصيرة حزنية متدبة الفروع غبراء اللون. تكتم نافذة. متعدة الجوانب لونها ال الصفرة يعلمها موج اسمر || لحيته جامدة المكسر. يبيضه اللون، مرة المذاق، لا تاكل.



غضيف

## ١٩٩٣٨ - غُضْرُوفٌ حَلَقِيّ

Cartilage cricoide (F). Cricoid cartilage (E).

## ١٩٩٣٩ - غُضْرُوفٌ ضَلْعِيّ

Cartilage costal (F). Costal cartilage (E).

## ١٩٩٣٠ - غُضْرُوفٌ لِيْمِيّ

Fibrocartilage (F). Fibro-cartilage (E).

## ١٩٩٣١ - غُضْرُوفٌ مُتَكَلسّ

Cartilage calcifié (F). Calcified cartilage (E).

## ١٩٩٣٢ - غُضْرُوفِيّ

Cartilagineux (F). Cartilaginous, Gristly (E).

ما كانت نسجه غضروفية التركيب.

## ١٩٩٣٣ - غُضْرُوفِيَّاتُ الرِّعَافِيّ

Chondropterygiens (F).

صف اسماك كبيرة القد كالخ تميز بجملها من الميكل العظمي. جاجها وسلاسلها الفقارية غضروفية التركيب. فصائلها وأنسجها وأنواعها كثيرة العدد تنتمي الى رتبتين: السفنقيات وكاملات الرؤوس.

## ١٩٩٣٤ - غُضْرِيَّات

Alzooceae (S). Alzooceae (F).

فصيلة نباتية من مستحلات القمالات. أجناسها وأنواعها عديدة، معظمها بري.

## ١٩٩٣٥ - غُضْصٌ

Samyda (S). Samyde (F).

جنس نباتات برية من فصيلة الفصصيات. أنواعه المروعة قليلة العدد، أعطائها المناطق الحارة من المالمين القديم والجديد. جميعها شجيرات وجنات معتدلة الجرم. أوراقها ابيضة سنجية النصال. أزهارها طرفية الارتكاز، يضاء اللون أو وردية.

## ١٩٩٣٦ - غُضْصِيَّات

Samydaceae (S). Samydaceae (F).

فصيلة نباتية من مستحلات القمالات مرتفعات الميضي. أعطائها البلاد الحارة. أجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها اشجار وشجيرات منتصب السوق. فوارثه الاغصان. أوراقها ابيضة، متعاقبة، جامدة النصال المتباينة الاشكال، مميّزة القدد الراتنجية. أزهارها سنجية العرف عديدة الاوران، يكثر فيها الابيض ثم الوردية ثم الاسفر والاخضر.

## ١٩٩٣٧ - غُضْفٌ

قبل في وصفه: « حجر يالند كالنخل سواء غير ان نواه مقشر بغير مله ومن اسفله ال اعلاه سمف اخضر. م. غضة ».

## ١٩٩٣٨ - غُضْفٌ ، جُوفِيّ

Syrnhaptes (S).

جنس طير من فصيلة الغضفيات قريب الشبه من الحمام. يتميز باستطالة ردة قوائم السقط وريشتين من الاثنيك. ثوبه ال القهبة الصفراء تعلوها رقشة سمراء معتزة. راسه الى القهبة السهباء. عينه مكحلة بالجوؤة. ساقه مسرولة سبي الخالب || وهو شديد الطيران. يطير مسافات شامة في طلب الرزق والماء. يقم في الغياي. قوته الجيوب والبرور على اختلافيها. يعيش أسراباً كبيرة. عشه الغصون ترسمه الاثني على الارض قرب دغلة او عومجة تبيض فيه اربع يبيضات صغيرة مرقطة مخضبة ٢٤ يوماً || له لومان معروفان خضفة البيداء وفضفة التبت.

## Argyronète (F).

## ١٩٩٦٢ - غَطَّاسَة

هي الفمسة المائية، اطلها .

## Podicipidae (S).

## ١٩٩٦٣ - غَطَّاسِيَّات

## Podicipidés (F). Podicipites (E).

فصيلة طيور مائية من رتبة كفيات القدم تتميز بأجسامها البيضية الشكل . أعتاقها دقيقة مسطيلة . رؤسها صغيرة . أذناها رياتة . أرساغها خفيفة . أصابعها غليظة أظفارها عريضة مبيلة . ريشها ناعم . حرري . مصقول . أجنحتها قصيرة ذلقة . أذناها مثقوبة رطلة . أشهر أجناسها الغطاس .

## Pterocles senegalensis (S).

## ١٩٩٦٤ - غَطَّاط

## Pterocle du Sénégal (F). Singed sandgrouse (E).

قال السمرى : « ضرب من القطا غير الظهور والبطون والابدان سود بطون الأجنحة طول الابريل والاعتاق لطاف لا تتجمع أرسابا وأكثر ما تكون ثلاثاً أو اثنين الواحدة غاططة كذا قاله الجبري وقال ابن سيده الغطاط القطا وقيل القطا غربان فالقصار الابريل الصغر الاعتاق السود القوادم الصهب الخولاني هي الكدرية والجوفية والظواول الابريل البيض البطون الأبيض الظهور الرأسية البيون هي الغطاط . وقيل الغطاط غرب من الطير ليس من القطا . »

## Neotragus pygmaeus (S).

## ١٩٩٦٥ - غَطَّاف \*

## Guevi (F).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الغزلان . موطنه يمتد من ليبيريا الى افنديه . يألف الغابات . ملحنه الحياني جماعي || جسمه صغير القد يطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع نحو ٤٥ سم . قوامه دقيقة . القفائات الاماميات أقصر من الخلفيتين . ثوبه الى الشفعة السوداء المولج . صدره وبلطنه الى البياض الاغبر . قرنا الذكر قصيرا دقيقان . الاثني جاه ثنائية الاخلاف || يعتبر من اسرع انواع الغزلان وانقرها .

## Vipère tigrée (F).

## ١٩٩٦٦ - غَطْرَب

الغطرب سحّية غيبية تدعى انفى نمره اطلها .

## Vipère noire (F).

## ١٩٩٦٧ - غَطْرَب أسود

سحّية غيبية تدعى انفى سوداء . اطلها .

## ١٩٩٦٨ - غَطْرَب الحَمْصِيَّات \*

## Aleurotrachilus citri (S). Aleurode des citrus (F).

ويدهى ذبابا الموالج البيضاء . حشرة من الغفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . حوريتها بيضية الشكل محدودة الظهر الاسود . حنار صفحتها كيف الاهداب الشمعية البيض . تركيب جميع انواع الحَمْصِيَّات فتؤذيها لأنها تعطب الاوراق بعد ان تمتص صارتها .

## ١٩٩٦٩ - غَطْرَب الرُّمَّان \*

## Siphoninus granati (S). Aleurode des grenadiers (F).

حشرة من الغفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . جسمها اسمر اللون ، اغبر المادة الشمعية . تمتص مكها حل اوراق النباتات السميكة فيقتل من حوريات مغلطة اللون الاسمر ، بيضية الشكل ، كثيفة الاهداب الشمعية البيض || تركيب اوراق وانفان الريان والاجاص والسفرجل .

## Plicatula (S).

## ١٩٩٥٥ - عُصْفِيَّة \*

## Plicatule (F). Plicatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وقصيلة القفاحات . انواعها الماصرة المبروة قليلة العدد منتشرة من المحيط الهندي الى اطراف المحيط الهادي || اصداها صغيرة الجرم ، مروحية الشكل ، منقطة القدم ، شماعة التخديد ، لاشاوية المصاريع ، المصراع الانسي محذوب الصلعة قليل التخديد || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة الغور .

## Gange brûlé (F).

## ١٩٩٥٦ - غَطَّاة

طائر من القطا يعرف بالقطاة الصحراوية .

## Podiceps (S).

## ١٩٩٥٧ - غَطَّاس ، غَوْاص

## Grèbe (F). Grèbe (E).

جنس طيور مائية من فصيلة الغطاسيات . انواعه نحو ٣٠ اطلها العالم . جميعها من القواطع . ترطب في المياه العذبة . تتميز باستطاعة أعتاقها ، غاطسها جالسة . أجنحتها قصيرة ذلقة . يعي تجيد الوم والوقوس . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات والحشرات والصفاد والنباتات المائية . تدنر في القصب والقرار والاسل حل صفات البحيرات والابهار || انها تقع من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها بمثابة الذكر مدة ثلاثة اسابيع . أشهر انواعها الغطاس والنج والمطوق والآنذ والصنبر .

## Podiceps auritus (S).

## ١٩٩٥٨ - غَطَّاس آذِن

## Grèbe oreillard (F).

طائر من الغطاس متوسط الجثة طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاغبة . غطله اسود الجسم ، اجر الملقط . اعلانه فسيحة الاجزاء تشمل معظم بحيرات الشرق واروبية التي يتفقد أكثرها في كل حوله .

## Podiceps minor (S).

## ١٩٩٥٩ - غَطَّاس صغير

## P. fluviatilis (S). Grèbe castagneux, Plongeur nain, P. des fleuves... (F).

طائر من الغطاس صغير الجثة طوله نحو ٢٤ سم . ثوبه متباين الالوان الزاغبة . ظهره الى السمرة يملوفاً موج زيتوني . صدره الى الوردية السوداء المولج . بطنه اسهب اللون . عتفه الى الشقرة الكتيتية . زفده ابيض . غطله اصفر الجسم ، اسود الملقط || اعلانه بحيرات وبتاتق وانهار العالم القديم يتفقد معظمها كل عام .

## ١٩٩٦٠ - غَطَّاس مُتَوَج \*

## Podiceps cristatus (S). Grèbe huppé (F).

طائر من الغطاس كبير الجثة طوله نحو ٥٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الالامية . ظهره الى السمرة السوداء المولج . رأسه متوج القفن بقترعتين اقفية الاوتكار . محسره وعتفه بيض اللون ، سود الخنار الداعلي ، شقر الاهداب الخارجية . زوره وبلطنه وخوافيه فضية اللون ، صناعية الزففة . زفده وبتياه جر . غطله اصفر الصلعة البليا ، اجر السفل ، ابيض الملقط . قفائته الى السمرة الخضراء . اعلانه العالم يحجب جميع البلاد متفقداً مياحه العذبة .

## ١٩٩٦١ - غَطَّاس مُطَرَّق (S).

## Podiceps nigricollis (S).

## Grèbe à cou noir (F).

طائر من الغطاس متوسط الجثة طوله نحو ٣٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاغبة ، عتفه اسود . بطنه ابيض . وهو يمتدب المناطق الباردة ويحجب مياه البلاد الممتدة دون سواها .



عُصْفِيَّة



غطاس متوج



غَطَّاف



غَطْرَب الحَمْصِيَّات



غَطْرَب الرُّمَّان



۱۹۹۷ - غطوف السند بان \*



**Aleurodes quercus (S). Aleurode des chênes (F).**  
حشرة من العنطريات طولهاراوح بين ١ و ٢ مم . لونها  
الى الصفار الباهت الشفاف المنمش بالاسود || حورياتها  
مسنجة بنقط لامعة متتابعة قاطبة . وهي تركب اوراق  
السديان فتضربها .

١٩٩٧١ - غَطَرَفُ الْفَلَّاحِ \* ٥



*Dialeurodes kirkaldyi* (S). *Dialeurode* (F).  
حشرة صغيرة من العنطريات طولها يراوح بين ١ و ٥ ملم.  
جسمها اسمر اللون. مكثا اغبر. حورياتها تركب  
الاوراق على صفحاتها السفلى وهي صفراء اللون، خضراء  
المواج، يضاء الاهداب الشمعية الدقيقة القصيرة.

١٩٩٧٢ - غَطَفِ الْقُطْبُ: ٥ \*



**Bemisia gossypiperda (S).** Bemisie, آلهودة الدقون (F).  
حشرة من المنطريات طولها نحو ١ مم. لونها الى الصفرة  
الصنابية المائلة || حورياتها مستديرة الشكل ، زيتية  
اللون ، مغبرة الخار المهبه. تركب اوراق القطن  
والبنورة والنخلان.

١٩٩٧٣ - غَطَفُ الْمَلْفُف \* ٥



Aleurodes brassicae (S). Aleurode du chou (F).  
Greenhouse white fly (E).  
حشرة من النطريات طولها أراوح بين ١ و ١.٥ مم. ثوبها إلى الصفرة تعلوه رقة سوداء. حورياتها مستطيلة الشكل، سمراء اللون، هليمة الفاصل، تركب أوراق شتول الملفوف في أول عهدها فتؤذيها ذات الأذى .

١٩٩٧٤ - غَطِّفِ النَّعْنَمةَ ٥ \*



**Aleurodes menthae (S). Aleurode de la menthe (F).**  
حشرة من الطفريات طولها يراوح بين ١ و ١,٥ مم.  
اجنحتها محجمة العروق الوسطى || حورياتها بيضيه  
الشكل ، محدودة الظهر القليل المادة الشمعية . اهداب  
شعارها هليية ، ثنائية التجميع || تركب أوراق النعنع  
فتتلفها

١٩٩٧٥ - غطّ فسات ٥



**1٩٧٥ - غير قيات ٥**  
**Aleurodidae (5).**  
**Aleurodidae (F). Aleurodidae (E).**  
فضيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة . اجنحتها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القدر سريعة الطيران يكثر وجودها في البلاد الحارة . تتميز بروسها المستعرضة .  
منها كبريت . قربها الاجنحية مركبة من عدة فواصل تراوح بين ٤ و ٧ . اجنحتها بارزة زرقاء - جرشها عريضة .  
منظرها اسطوانية . اجنحتها مستطيلة .  
كبيرة . مستطيلة الاطراف . اجسامها واجنحتها مغطاة بمادة شمعية طليعية الشكل بيضاء اللون || حورياتها مبطنة الجسم ، يميز الشكل او مستدرة .  
فهرها موشة بنفاه .  
شخص مختلف فوه باختلاف الاجناس .

١٩٩٨٦ - غَفَاتِ أَسْمَاءَ

Eupatorium atrorubens (S), Eupatoire brune (F).  
جنية سبر وئية معمرة تعلق نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها  
زباء اللحاء ، زغبها جئوي اللون. اورانها معنقة كبيرة  
القد تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض من ١٦ الى ٢٠ سم. نصلها

١٩٩٧ - غَطَسَ ، غَطَسَ

Immerger (F). غَطَسَ ، غَطَسَ  
To immerse (E). انغمس في الماء غَمَسَ

١٩٩٧٨ - غُطُطُ

الغطنط ، ح غطاغط : السخال الإناث .

١٩٩٧٩ - غَطَلَس

١٩٩٧٩ - غَطْلَس الغطلس هو الذئب .

١٩٩٩٤ - **غَفَّر ، غَفَر ، تَيْل ، ظَبِي أسود**  
Cervicapra (S). Cervicapre, Eléotrague, Antelope des marais (F).

النفرج أعفار وغفرة وغفور. والآنثى غفرة. جنس حيوان من ذوات الظلف المجترات الخيوانات القرون || أنواعه خمسة قرنية الشيه من الفزلان والظباء. اجسامها ربة ، ظهورها جالسة. قوائمها نخيلة. اذانها معتدلة الطول. اناتها جها الرووس ، رباعية الاختلاف || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٩٩٥ - **غَفَّر البوص** (S). Cervicapra arundineum (S). Cervicapre des roseaux (F).

نوع من الغفور يشبه البأورد غير انه اهيث الجسم ، رشيق القوام وقصير الذنب ، ثوبه الى الربة السمره . يهلك الى البياض الاخير . طوله نحو ١٢٥ سم. وعلوه ٩٠ سم. موطنه فسيح الارياض يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى شواطئ المحيط الهادي || يأنف النائمات والاولدية الرحية الكثرية البوص . اجله مؤلف من ٥ افراد : الفحل مع اثنتين وشادتين .

١٩٩٩٦ - **غَفَّر الحَبَشَة \* ، بَهَار**

Cervicapra bohor (S). Cervicapre bohor, Bohor (F). نوع من الاغفار كبير الجثة الهيفاء . ثوبه الى الربة السمره تملوه ماجة حنتلية ترهو وتبقى مع فصول السنة . يهلك الى البياض الاخير . طوله نحو ١٤٠ سم. وعلوه ١٠٠ سم. قرنه اسود اللون ، احسين الطرف المذهب || موطنه بلاد الحبشة وسواها يأنف الغابات والاولدية . اجله مؤلف من ٥ او ٧ افراد : فحل و ٣ اناث و ٣ شواذن .

١٩٩٩٧ - **غَفَرِي** (F). Pubescent (F). تمت وصفي للدلالة على كون لاه الشجرة يملوها الغفار اي الزغب .

١٩٩٩٨ - **غَفَرِيَّات** (S). Anobidae (S). Anobidés, Anobidés (F). Anobidae (E). فصيلة حشرات من رتبة غدييات الاجنسة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القند تغلب فيها الاشكال الاسطوانية والالوان السمره والبيضاء . اغامدها حافسة . قربها الاستعمارية منفرجة الاركان خيطية ، او مرسية ، مركبة من ١٠ او ١١ فاسلة . ارسافها خماسية القمل . رقاتها خاشية تعيش في الانفاق التي تحفرها في تخلف الاخشاب وتحت السماء وصل المواد النباتية المصنوعة كالحبز وما اشبه .

١٩٩٩٩ - **غَفْرِية الصَّبغ** . هي النخيرة ، اطلبا .

٢٠٠٠٠ - **غَفْرِية الخَبْز** (S). Anobium paniceum, Stegobium paniceum (S). Anobion du pain, Vrillette du pain (F). Powder post-beetle (F). Totenuehr (D). حشرة مبدولة من النفرات طولها من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الخشنى الاحمر المواج . ظهورها مخدق القند || يرقاتها دامت تركب الخبز والقيق والكتب والمعاطب .

٢٠٠٠١ - **غَفْرِية الخَشَب** (F). Vrillette opiniatre (F). هي كسوية الخشب ، اطلبا .

٢٠٠٠٢ - **غَفْرِية الصَّوْبِر \*** (S). Ernobilus mollis (S). Ernobilus, Vrillette des pins (F). حشرة من النفرات جسمها اسطواني الشكل يطل من ٦ الى

تلقبي الشكل ، عابق الخضار الاسمر المواج ، احمر البروق ، اذنب البشرة ، مهدب الحافة || ازهارها مختلفة الالوان منها الاحمر الزاهي والوردي والبيكلي || ازهارها يستمر من آذار الى آب .

١٩٩٩٧ - **غَفَّت رَفِيع**

Eupatorium altissimum (S). Eupatoire élevée (F). جنية معمرة سبروتية تملو من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها لاطئة . نصلها خيوط الصفحة ، ثلاثي البروق ، مسنن الزام الاخير || ازهارها علفية التجميع . رؤسائها خماسية الازهار البياض || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٩٩٩٨ - **غَفَّت سَمَنْجُونِي**

Eupatorium coelestinum (S). Eupatoire azurée (F). بجلة معمرة زبابة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها السفلى متعاقبة والعليا متعاقبة يحي معتقة تملو من ٥ الى ٨ سم. وترض من ٢٠ الى ٣٥ سم. نصلها رشي الشكل مقطوم القاعدة || ازهارها سمنجونية اللون ، حطرية الرائحة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٩٩٩٩ - **غَفَّت صَغِير الزَهَر**

Eupatorium micranthum (S). Eupatoire à petites fleurs (F). بجلة سبروتية سرحة مرطاه تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها معتقة اعليجية مقطوعة || ازهارها صغيرة القند . رؤسائها تمتد من ٦ الى ١٣ زهرة لونها الى البياض الوردي المواج || ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

١٩٩٩٠ - **غَفَّت عَطَر**

Eupatorium aromaticum (S). Eupatoire aromatique (F). جنية سبروتية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معتقة . نصلها ثلاثي البروق ، يضي الشكل ، قلبي القاعدة ، يطلو من ٤ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٤ || ازهارها علفية التجميع عديدة الرؤوسات المتراكبة البيضاء اللون المعطرية العرف || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٩٩٩١ - **غَفَّت مَلَطَّح**

Eupatorium maculatum (S). Eupatoire maculée (F). بجلة سبروتية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. ساقها غنددة زبابة ، اغاديدها حمر . اوراقها السفلى ضمية ، ثلاثية او عسافية التجميع . اوراقها العليا متعاقبة . جميعها معتقة . نصلها سنائي الشكل ، سميكة الصفحة ، ثنائي البروق الخليلية || رؤسائها تقص من ٥ الى ٨ ازار وردية او بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

١٩٩٩٢ - **غَفَتِيَّات** (F). Eupatoriées (F). بسيط من فصيلة المركبات اجناسه وانواعه عديدة اشهرها الغفت والغزلان والغظلم والغظوان والعتكك والميكانيه .

١٩٩٩٣ - **غَفَّر**

الغفر منزل من منازل القمر البائية . وفي ثلاثة انجم صغار شبه غفية . تهيث غفراً لان عند طلوعها تستتر نضارة الارض وزينتها || وقيب الغفر يدعى الشرطين .



غفر الحيشة



غفرية الخبز



غفرية الصنوبر

٢٠٠١٢ - **غُفْلَة** \* شَقَشَش. Umbra (S). Umbra (F).  
Umbra, Mud-minnow (E).

جنس اسماك هُبرية من مفتحات المثانة. اجسامها اهلجية الشكل، قصيرة، القد، مقطوعة. زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة الحجم اما الصدرية والبطنية صغيرة. فلوها خشن مَرَاكِي. اولياها الى السرة البراء يطولها يتقيج عاب. اشهر انواعها المعروفة اثنان.

٢٠٠١٣ - **غُفْلَة المتافع**، شَقَشَش المتافع Umbra crameri (S).

سمكة من الغلاف تعيش في البحيرات والمتافع والياه الراكدة. طولها نحو ١٥ سم. ثوبا الى السرة البراء الداكنة. تتميز بكثرة تناسلها وقوة احتالها تقلبات درجات الحرارة.

٢٠٠١٤ - **غُفْلَة ليمي**، شَقَشَش ليمي. Umbra limi (S).

سمكة من الغلاف تعيش في بحيرات المياه الباردة، طولها نحو ١٢ سم. ثوبا الى السرة الخلفية يعيق عنه الظهر. هي النسوة شجرة من القرينات القرشية، اطلها.

٢٠٠١٦ - **غُفْلَة** \* Glaucus (S). Glaucus (F). Glaucus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الارجل حلقيات الخياشيم. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || جميعها يمة. اسرارها وافرة المدد. اجسامها عريضة، مسطحة، هلاية، تنتهي باذنان دقيقة. رؤوسها رباعية الالوان الحمراء والبيضاء والبنية. خياشيمها جانبية الارتفاع، كفية، رباعية الازواج المتقابلة. اولياها جميلة الالوان الزاهية. يكثر فيها الازرق والاصفر والامس والاعبر القلوي.



غلاف

٢٠٠١٧ - **غُفْلَة** Tégument (F). Tegument (E).

هو ما يغطي بعض الاغضاء النباتية كالقشاة في الحيوان.

٢٠٠١٨ - **غُفْلَة**، **غُفْلَة**، **غُفْلَة**، **غُفْلَة** Gaîne (F). Sheath, Ocrea (E).

هو ما يلفف الشيء. رَاسِعَ غُد. **غُفْلَة التمركة**، **جُثْ** Péricarpe (F). Pericarp (E).

يعركب غلاف الثمرة من ثلاثة اجزاء: الخارجي والمتوسط والداخلي. فالخارجي يدعى الحلة والمتوسط السوط والداخلي اللندوكرب.

٢٠٠٢٠ - **غُفْلَة الغُفْرُوف** Périchondre (F). Perichondrium (E).

٢٠٠٢١ - **غُفْلَة حَيَوِيَّة** Biosphère (F). Biosphere (E).

الغلاف الحيوي اسم يطلق على قشرة الارض السطحية حيث يعيش الانسان والحيوان والنبات.

٢٠٠٢٢ - **غُفْلَة مائي** Hydrosphère (F). Hydrosphere (E).

٢٠٠٢٣ - **غُفْلَة مَحْرَم** Pericycle (F). Pericycle (E).

اسم يطلق على النسج الخشبية، ان في الساق ام في الجذر، الكائنة بين الحزم الوصلية والشكير.

٧ م. ثوبها حطلي اللون، اسمر الموج. ريقها ركب الصنوبر المعمر يفترض اللحاء والشكير.

٢٠٠٠٣ - **غُفْلَة** Métal cru (F). Raw metal (E).

حالة المدن كما هو في الطبيعة.

٢٠٠٠٤ - **غُفْلَة** Inertie (F). Inertia (E).

٢٠٠٠٥ - **غُفْلَة** هو رَجَس الثمراء، اطلها.

٢٠٠٠٦ - **غُفْلَة** Melothria (S). Mélothrée (F). Melothria (E).

جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القرعيات. مهدا بعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة. حولتها طويلة لانسجية. اوراقها كبيرة قلبية الشكل او اهلجية. ازهارها وحيدة المسكن مختلفة الالوان. ثمارها بيضيه او مستديرة || انواعها المعروفة قليلة المدد، اشهرها التالية.

٢٠٠٠٧ - **غُفْلَة مُتَدَلِّي الثمار** Melothria pendula (S).

نوع من الفُفُور المعمر. مهد بعض المناطق الامريكية. ساقه متسلقة قصيرة. جنته مدرة. اوراقه قلبية الشكل، ثلاثية او خاسية الفصوص المسنة الحمار. ازهارها وحيدة المسكن، المتكية منها ضمية التجميع، الملقية فردية، مستطيلة المالحق. لونها الى البياض الاخضر الموج. ثمارها بيضيه الشكل لونها الى الخضر الاصفر، طولها نحو ٢ سم. وعرضها ١ سم.

٢٠٠٠٨ - **غُفْلَة مَدْرَاس** Melothria madraspatana (S).

نوع من الفُفُور الحولي. مهد بعض مناطق الهند. ساقه متسلقة طويلة نحو خمسة امدار. اوراقه اهلجية الشكل، ثلاثية او خاسية الفصوص. نصالها قاسية، مهدبة الصفحات السفلى. ازهارها صفراء اللون، المتكية منها ضمية التجميع، الملقية فردية. ثمارها نصف مستديرة الشكل، حجمها حجم البرتقالة الصغيرة. قشورها مضلمة بالاصفر والاحمر. تؤكل مطبوخة.

٢٠٠٠٩ - **غُفْلَة هَاتِكُ الزُوق** Melothria heterophylla (S).

نوع من الفُفُور المعمر. مهد يمتد من الهند الى اليابان. ساقه متسلقة معتدلة الطول. اوراقها هاتكة متباينة الاشكال، منها الاهلجية المنصصة ونها المسنة والسنانية. نصالها قاسية، عروقها حاملة بزغب ابيض فضي الموج. ازهارها ثنائية المسكن، يضاء اللون. الذكرية علقية التجميع، الانثوية فردية. هناك الذكرية رباعية الجيوب.

٢٠٠١٠ - **غُفْلَة هَاتِكُ الزُوق** Melothria heterophylla (S).

نوع من الفُفُور المعمر. مهد يمتد من الهند الى اليابان. ساقه متسلقة معتدلة الطول. اوراقها هاتكة متباينة الاشكال، منها الاهلجية المنصصة ونها المسنة والسنانية. نصالها قاسية، عروقها حاملة بزغب ابيض فضي الموج. ازهارها ثنائية المسكن، يضاء اللون. الذكرية علقية التجميع، الانثوية فردية. هناك الذكرية رباعية الجيوب.

٢٠٠١٠ - **غُفْلَة** Inerte (F). Inert (E).

٢٠٠١١ - **غُفْلَة**، **إِغْتِيَاد**، **إِغْتِيَاد** Invagination

دخول جزء من نسج في نسج آخر. وهو ان حصل في المصراع كان قتالاً.

## ٢٠٠٣٣ - غُلُوفِي

شجرة مرة قيل ثمرها يهلك السباع (السان) .

## ٢٠٠٣٤ - غُلُوفِي ٥ ، غُلُوفِي ٥

Galeruca (S). Galérucque (F).

جنس حشرات من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، غشيبة الزنابق زاهية الالوان || رقاتها غاشقة تركب اوراق النباتات فتفخها || اشهر انواعها ما يتبع .

## ٢٠٠٣٥ - غُلُوفِي الدَّرْدَار ٥

Galerucella luteosa (S). Galérucque de l'Orme (F).

حشرة من الغلروق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٧ مم . ثوبها الى الصفار الخشن يعلو موج الحمل . ايجيالا الحولية اثنان || رقاتها صغيرة القد تركب اوراق الدردار فتقرض النصل وتقضي عليه .

## ٢٠٠٣٦ - غُلُوفِي الشَّام ٥

اطلب نضارية القرعيات .

## ٢٠٠٣٧ - غُلُوفِي الشَّيْلَك ٥

Galerucella tenella (S). Galérucque du fraisier (F). Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (D).

حشرة من الغلروق جسمها يغطي الشكل يطول نحو ٤ مم . ثوبها خشن اللون ، اغبر الموج . جيلها الحولي واحد . رقاتها تركب اوراق الشيك فتلتهم النسيج وتمتد عن العروق .

## ٢٠٠٣٨ - غُلُوفِي المَفَث ٥

Agelastica alni (S). Galérucque de l'aulne (F).

حشرة من الغلروق طويلا نحو ٦ مم . ثوبها الى الزرقة البنفسجية . وحيدة الجيل الحولي . رقاتها صغيرة القد تعيش مجتمعة على اوراق المَفَث فتلتهم الواحدة بعد الاخرى الى ان يتم اتساعها فتترك الارواق وتستقر في التربة حيث تتخذ وتبيض .

## ٢٠٠٣٩ - غُلُوفِي التَّرْجِس ٥

Malacosoma lusitanica (S). Galérucque des narcisses (F).

حشرة من الغلروق طويلا نحو ٧ مم . ثوبها الى الصبغة الصنافية البرتقالية . تركب وتؤدي يرانم وازهار الترجس والزئبق وسائر النباتات السكرية || رقاتها تعيش في التربة عادمة الاذى .

## ٢٠٠٤٠ - غُلُوفِي ٥

ساف من البقلة الباشريية يعرف بالابسي ، اطلبه .

## ٢٠٠٤١ - غُلُوفِي

Pivot (F). Tap-root (E). الفلفل عرق الشجرة اذا أمن في الارض . ج غلاغل . راجع جنث .

## ٢٠٠٤٢ - غُلُوفِي

Galago (F). حيوان لبون من الليموريات يدعى دغفوس ، اطلبه .

## ٢٠٠٤٣ - غُلُوفِي ٥

Galgulus (S). Galgule (F). جنس حشرات دامت من نصفية الاجنحة المختلفة . انواعه المعروفة نحو عشرة تعيش على شغاف المناقع وبحاري الماء غائرة في الاسماء والارصال || اجسامها صغيرة القد ،

Lithosphère (F).

Lithosphere (E).

## ٢٠٠٤٤ - غُلُوف يَابِس

Galalithe (F). Galalith (E).

جبين صناعي صاف يستخرجون منه مادة قاسية كالقطن كبيرة الاستعمال الصناعي .

## ٢٠٠٤٦ - غُلُوفِي

Gadiculus (S). Gadicule (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة الغاداسيات المسلمات . انواعه قليلة . اعطائها بحار البلاد للمتدلة الحرارة انصهها شرقي وجنوبي المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، احليلجية الشكل ، عديدة الزمائف ، سفلية الشدق ، كبيرة العين المستديرة البارزة || احرف انواعها واشهرها التلان الفضي .

## ٢٠٠٤٧ - غُلُوفِي فِصِي ٥

Gadiculus argenteus (S). Gadicule argenté (F).

سمكة من التلان اعطائها بعض مناطق البحر المتوسط . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . ثوبها وردي اللون . بطها وصهرها الى الفضة ، زماعتها ريادة || لحمها مستحب الطعم .

## ٢٠٠٤٨ - غُلُوبِي ٥

Galbula (S). Galbule (F).

جنس طير من فصيلة الغلبوليات ورتبة الجواثم واهانت المتأثير . انواعه المعروفة ستة جميعها من طيور البرازيل وفنزويلا || اجسامها ريمية رقيقة تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . تتميز باستطالة المناقيد المحززة الشكل . اجنحتها قصيرة . اذنانها مستطيلة ، وتاجية الرقاع . اثارها متراكبة الالوان الصفراء المواج . بعض انواعها ابيض الزور || تألف الثبايات دون سواها ، قوتها الحشرات وبعض الثآير العنينة البرية .

## ٢٠٠٤٩ - غُلُوبُولِيَّات ٥

Galbulidae (S). Galbulidés (F).

فصيلة طير من الجواثم واهانت المتأثير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها من طيور البلاد الامريكية اشهر اجناسها القمار والغليول .

## ٢٠٠٣٠ - غُلَّة ، فَرْكَل

Produit, Revenu (F). Produce, Revenue, Income (E).

هي الدخل او الربح وقد شاع استعمالها على حاصلات الارض الزراعية .

## ٢٠٠٣١ - غُلُوبُولِيَّات ٥

Galtonia (S). Galtonie (F). جنس نباتات زربينية من فصيلة الزنقيات . مهدسا افرقية الجنوبية . انواعها المعروفة قليلة . ودوسها مستديرة الشكل . ساقها اسطوانية تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها قرصية الانتشاب ، عصفية ، تطول نحو ٧٥ سم . وتمرض من ٥ الى ٧ سم . نصلها الى الحصار المابق الازرق المواج . انزعارها اعتقدي التجميع يطول نحو ٣٠ سم . يحمل من ١٠ الى ٣٠ زهرة قمية الشكل ، كبيرة القد ، بيضاء اللون ، متدلية . تنورهما يستمر من تموز الى ايلول .

## ٢٠٠٣٢ - غُلَث ٥

Criblure (F). Siftings (E). ما ينفية الغربال او يبقى بعد الفرلة من حبوب صغيرة ويزور غريبة واجرام . والثلاث يصلح طعاما لطيور الدواجن .



غلروق الدردار



غلروق الشيك



غلروق المَفَث



غلروق الترجس

Golunda

٢٠٠٥٤ - غُلُوْدُس ٥٥

جنس دوبيات لبونة قاضمة من الجوزيات وفضيلة الفأريات. انواعه قليلة موطاة افريقية والهند وباكستان. جميعها صغيرة القد. اوراقها الى السمة المنشة بالاصفر والاراضى بطوبيا الى البياض الاغبر. صوفها خشن الملمس || تألف الحقل والمراعي وزراعات البن. قوتها الخيل وزمات البن واوراقه وقد تهب الرز وتخزنه في اجمارها .



غلف

Glinus (S).

٢٠٠٥٥ - غُلُوْدُس ٥٥

Gline (F), Glinus (E).

جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مرعوية من فصيلة المعبريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منهاها حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستطيلة . اوراقها ملوقة او بيضيه مقلوبة . ازهارها ابلي الاركان . ازهارها صفراء او بيضاء اللون . تنويرها صيفي || اعرف انواعه غلنوس بشنبي وغلنوس دقتموني .

٢٠٠٥٦ - غُلُوْدُس ٥٥

Glinus lotoides (S), Gline lotoides (F).

نوع من الغلنوس . ساقه مستطيلة ، منشعبة ، مستقيمة . اوراقه شبه بيضيه النصال . ازهارها ابلي . ازهارها بيضاء . تنويرها صيفي .

٢٠٠٥٧ - غُلُوْدُس ٥٥

Glinus dictamnoides (S), Gline dictamnoides (F).

نوع من الغلنوس يرطب في المواق الرطبة . ساقه منشعبة ، مستطيلة . اوراقها صغيرة النصال ، ملوقة . ازهارها صغيرة ، قديمة اللون . تنويرها صيفي .



غلف

Aglaonema (S).

٢٠٠٥٨ - غُلُوْدُس ٥٥

Aglaonema (F).

جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلقاسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق الهند وجزر الترازج || سوقها قصيرة . اوراقها متنامية ، منقطة ، محفوفة الاعناق ، سنانية النصال المنقطة الاطراف . ازهارها محوري الانتشاب ، ضمي التجميع . ازهارها صغيرة ، شبه انبوية الشكل . منها الاحمر والاصفر والوردي . اوراقها فواحة العرف الطري المستحب || تزروع في المراكب للزئين .

٢٠٠٥٩ - غُلُوْدُس ٥٥

Globuline (F).

Globulin (E).

مادة آسية تكون في كريات الدم .

٢٠٠٦٠ - غُلُوْدُس ٥٥

Gluten

هي المادة الازوتية في الدقيق ويركب الفلورن من الفلورين والجليين .

٢٠٠٦٢ - غُلُوْدُس ٥٥

Gluténine (F), Glutenin (E).

مادة ازوتية ثانوية توجد في دقيق الحبوب .



غلنم

Glaodes

٢٠٠٦٣ - غُلُوْدُس ٥٥

جنس فلور مجهرية من فصيلة المدركيات. يتميز ببيكيداته المجنبة الشكل ، المبيضة او النصفية التجميع ، السطحية الاركان . انواعه التي هم الاقتصاد الزراعي قليلة اعرفها غلوس التفاح .

شبه بيضيه الشوزن ، مبطلة الشكل . تتميز ببيوتها النائرة الكبيرة وبامتلاة قوائمها الخلفية التي تمكها من القفز . اوراقها مزيج من الشقة والشبهة يعلوها تجميع اسر وشفة خضراء . قوائمها ملوقة بالاصفر .

٢٠٠٤٤ - غُلُوْدُس ٥٥

Galgulidae (S).

Galgulidés (F), Galgulidae (E).

فصيلة حشرات من نصفية الاجنحة المختلفة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من القارتين القديمة والجديدة || معطر انواعها يعيش قرب الماء او متنسأ في الامثال والاحوال . بعضها خاضل والبعض الآخر دامن || اعرف اجناسها واشهرها الغللول .

٢٠٠٤٥ - غُلُوْدُس ٥٥

Stapelia, Caralluma (S), Stapelie (F), Carrion flower (E), Asplume, Stapelie (D), Stapelia, Fior di rosopo (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الصقلابيات . انواعه نحو ٧٥٠ جميعها من نباتات المناطق الصحراوية يقال ان مهدا الاصيل كان بعض قباني افريقية الجنوبية اوراقها سيقان لحمية ريمية الاضلاع السنة . ازهارها لحمية كبيرة القد تملو الاوراق .

٢٠٠٤٦ - غُلُوْدُس ٥٥

Hyménium, Volve (F), Hymenium, Skin (E).

غلاف بشروي رقيق يحيط ببعض الفطور عندما تكون في طورها النشوي .

٢٠٠٤٧ - غُلُوْدُس ٥٥

نبت في الماء ورفه عريض || وهو ورق الكرم ما دام على مجمره || وهو الطحلب وكل خضرة على رأس الماء .

٢٠٠٤٨ - غُلُوْدُس ٥٥

Clé de voûte (F).

Keystone of a vault (E).

حجر شبه مخروطي الشكل يلقب به قوس البعد .

٢٠٠٤٩ - غُلُوْدُس ٥٥

Vincetoxicum officinal (S).

Vincetoxicum officinale, Asclépiade officinale, Domppe-venin (F), Tamepoison (E), Echte Schwalbenwurz (D), Vincetossico, Bozoli (I).

جنية طبية معمرة من فصيلة الصقلابيات . ساقها منتصبه غزيرة العصارة اللبنة الطيبة والمضادة للسموم . اوراقها متغابلة ، كاملة ، اهلجية . نصلها شديد الخضرة . ازهارها علقية التجميع ، بيضاء اللون يعلوها مواج فتى .

٢٠٠٥٠ - غُلُوْدُس ٥٥

Galactase

خيرة لبنة تذيب الجبين في اللبن .

٢٠٠٥٢ - غُلُوْدُس ٥٥

Galactose

عرب من الفلوكروز يتصل من تحول اللبوز .

٢٠٠٥٣ - غُلُوْدُس ٥٥

Nymphomania (F).

Nymphomania (E).

ازدياد شهوة السناد في اناث الحيوانات . اسبابها عديدة منها طبيعية ومنها طارئة . فالاسباب الطبيعية تقود بمعظمها الى المقعد الدائم . اما الاسباب الطارئة فمعظمها وقتي . والاثي في هذه الحالة تنمى فلام . راجع اختلام .

Glycérine (F). - ٢٠٠٧٦ - غَلِيسِيرِين

Glycerin, Glycerinum (E).

سائل متادل لا لون له يذوب في الماء ويحسّن من تصيين المواد الدهنية .

٢٠٠٧٧ - غَلِيسِين هي البليعة ، اطلمها .

٢٠٠٧٨ - غَلِيسِين عَسْثُولِيَّة \*

Apios tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F).

نبات عشبي عارض معمر من فصيلة القرنيات الفراشية .  
جلوده عسقلية، اجاسية الشكل، مأكولة . ساقه ممددة ،  
عارشة . تطلو نحو ٤ امتار . اوراقه مركبة . وريقاته  
وترية التجميع ، بيضية الشكل، مستدقة العنقة || انزعاه  
عطرية الرائحة ، حراء اللون ، ازهاره عنائقة محورية  
الارتكاز .

Crassiceps (F). - ٢٠٠٧٩ - غَلِيطُ الرَأْس

نمت تعريفني يطلق على كل حيوان او حشرة مستفظة  
الرأس .

Crassicole (F). - ٢٠٠٨٠ - غَلِيطُ العُنُق

نمت تعريفني يطلق على كل حيوان مستفخم العنق .

Crassicorne (F). - ٢٠٠٨١ - غَلِيطُ القَرْن

نمت تعريفني يطلق على كل حيوان مستفخم القرون .

Eudothèque (F). - ٢٠٠٨٢ - غَلِيفَةٌ

الغليفة غشاء داخلي يلف فص المتك .

Glycose - ٢٠٠٨٣ - غَلِيكُوز

الغليكوز اي سكر العنب مادة يضاف سكره قابلية  
للاختبار تكون في الثآليل والسائل ويغرها .

Pipe - ٢٠٠٨٤ - غَلِيُون

غلين ج . غلايين ، اداة تستعمل لتدخين التبن المفرور .

٢٠٠٨٥ - غَمَ ، غَمَل ، غَمَن

Ensachage, Capuchonnage (F). Putting a hood (E).  
تغليف الازهار بالاكياس منمنّا تهيئها . وتغليف الثآليل  
لصانيتها . ويقال لليلود والثآليل الناجمة عن هذه العملية  
بلود او ثمار ممدولة او ممدونة .

Plafond (F). Celling (E). - ٢٠٠٨٦ - غَمَي ، غَمَاة

هو سقف البيت . ج اغمية واغلاء . ويقال غمى البيت  
ويغنيه . غطاء بالحشب والطين .

Colymbus (S). - ٢٠٠٨٧ - غَمَاس

Plongeon (F). Diver (E).  
جنس طيور مائية من فتيات القدم موطنها البلاد الباردة  
تخرج عنها في الشتاء نحو الاقاليم المعتدلة . انواعها المعروفة  
اربعة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة العنق، جالسة المنظم .  
انواعها رائقة . اجنحتها صغيرة . اذنانها جدعة . ارسافها  
سردية || تألف البحار والبيصيرات ولاظهر على السواء .  
قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات . تدثر في افهيس  
ترتها على الشطوط وصفات الجيرات واعواد الانهار .  
اناثها تضع بيضتين تحضنها بتناوبة الذكور ثلاثة  
اسباع || اشهر انواعها غمامه الحسن وغمامة القطب .

٢٠٠٨٤ - غَلْدُوسُ التَّفَاح \* ، بَلُطُش دُخَانِي

Gloeodes pomigena (S). Blotch fumeux, Maladie de la suie (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهرى يركب افئاد وفمار التفاح والاجاس . مظهره  
المحارجي على الافئاد يقع كالدخان هيئة ولونا ، لا قياسية  
الشكل والحجم ، متتابعة الاتصال تسبب انصداع البشرة  
وبعض الاذى || وهو على الثآليل يقع سمر لا قياسية الشكل  
والحجم تركب البشرة قشوها دون ان تطلب الب .  
يتكاثر ويغفل في الاماكن الحارة المرتفعة الرطوبة النسبية .  
يكتاح بانتظام حول بوردو المركز من ٠.٦ الى ١ ٪  
بشرط ان تحصل المكافئة في اياتن ظهور الوصم .

٢٠٠٦٥ - غَلُوسِيْد

اطلب هيدرات الكربون .

Glucinum - ٢٠٠٦٦ - غَلُوسِيْنِيُوم

هو البريليوم ، اطلمه .

Glouton (F). - ٢٠٠٦٧ - غَلُوثُن

هو الثرة حيوان من السرمويات ، اطلمه .

٢٠٠٦٨ - غَلُوكْسِيْنِيَّة \* ، سَلُطَان

Gloxinia (S). Gloxinie (F). Gloxinia (E). Gloxinien (D). Gloxinia, Ligieria (I).

جنس نباتات عشبية سنوية معمرة من فصيلة  
المجسريات . انواعها المعروفة ١٢ اما غربها وبعضها  
فكثيرة العدد . جميعها زينة . سوقها جلمورية . اوراقها  
معنقة متعاقبة كبيرة القد . نصلها جيل الخضار، خل  
البشرة ، بارز المروق والثرابين . ازهارها فردية ، طويلة  
الزناد ، بوقية الشكل ، جميلة الالوان الزاهية .

٢٠٠٦٩ - غَلُوكُوزُ ، سَكَّرُ العَنْبِ

Glucose  
مادة سكرية يضافها قابلية للاختبار تكون في الثآليل والسائل  
ويغرها .

٢٠٠٧٠ - غَلُوكُوزِيْد

Glucosides (F). Glucosid (E).  
مركبات نباتية تحوي الكثير من الغلوكوز فيستخرج منها .

٢٠٠٧١ - غَلُوم \* ، غَلُومِيَّة

Galeomma (S).  
Galeomma (F). Galeomma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم  
وفصيلة الغلوميئات . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة  
في معظم بحار العالم القديم اخصها البحر الابيض المتوسط ||  
اجسامها ملحوة باصداف شبه هرمية الشكل تشب في  
الصخور البحرية وتنتشر عليها .

٢٠٠٧٢ - غَلُومِيَّات \*

Galeommidae (S).  
Galeommidae (F). Galeommidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم  
اجناسها وانواعها المعروفة من غائرة ومعاصرة كثيرة العدد  
منتشرة في الطبقة البسيانية وفي معظم بحار العالم . اصدافها  
صغيرة ، شبه مستديرة ، ثنائية المصارع عادمة التستين ||  
اشهر اجناسها اللوم والسنتيل والميزابية ...

٢٠٠٧٣ - غَلِيْدَايْن

Gladiine (F). Gladin (E).  
مادة البوتينية اي آحبة تكون في الدقيق .

٢٠٠٧٤ - غَلِيَان

Ebullition

٢٠٠٧٥ - غَلِيْسِيرِيْد

Glycérides (F). Glycerid (E).  
اسم شامل لاثريات الغليسرين من زيتين ومرجرين وتغلين  
ويغرها بما يدخل في تركيب الادهان .



غلؤدس التفاح



غلوكسينية



غَلُوم



غلين عسقلية



غِمامَةُ الحُسْن



غِمامَةُ القُطْب



عُمر



غُمر



غُمر



غُمرُوس

## ٢٠٠٨ - عُمرُوسِيَّاتُ الأَجَنَّة، مُعَمَّدةُ الأَجَنَّة

Coléoptères (F). Coleoptera (E).  
رتبة حشرات من طبقة مُعَمَّدات الجناح. أجناسها وأنواعها زهاء ٣٠٠٠٠٠ منتشرة في جميع أقطار العالم، تجمعها ١٦ لمة والمزيد من الفصائل || جميع حشراتنا تامة التطور قارضة، بمنجته. أجناسها مؤلفة من زوجين الزوج العلوي المعروف بالظهران وهو مركب من عضلين قويين يملكان الزوج السفلي الفشائي التركيب الذي ينتشر عند الطيران. معظمها من الحشرات المفترسة وبعضها يفتني بالزوائد العضوية || رقاتها مغترسة أو عاشية. سورياتها طبقة القيد. طغها مكونة من أفراتاز خاصة تجمع إليها بعض المواد العضوية وتغلافها || أشهر فصائلها، الموجد من أجناسها وأنواعها في لبنان وماتر البلاد العربية، هي التالية: البطريشيات، الجليات، البصويقات، السالوليات، السرفانيات، السويات، الظلاميات، العثيات، المرققيات، القززيات، الكراشيات، الككجيات، المتلصبات، التاصعات، التفناريات، والروشيات.

٢٠٠٩٩ - عُمر  
Eprouvette graduée (F).  
Graduated gauge (E). ويرمز أيضاً بالناطل. ج أعمار.

٢٠١٠٠ - عُمر  
Chaos (F). Chaos (E).  
الغمر هو الخواء، اطلبه.

٢٠١٠١ - عُمر، قَطُوس، تَرَبِيس  
Submersion  
هو الإسقام بالنمر أو التلوس.

٢٠١٠٢ - عُمرَة  
هو الورس، اطلبه.

٢٠١٠٣ - عُمرَة  
Zostera (S). Zostère (F).  
Eel grass, Turtle grass, Grass warck (E). Zwergeasgras (D). Zostera, Alga del vetral (I).  
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء. أنواعها المعروفة ثلاثة. سوقها مدادة. أوراقها خيطية مستطيلة، قواعدها مخدبة. أطرافها خيطية، جيوبها تغلق من سنايل مكونة من صف واحد من الأجزاء البسيطة.

٢٠١٠٤ - عُمرُوس  
Gammarus (S).  
Gammarus (F). Gammarus (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات اللبسية وفصيلة الغمرُوسيات. أنواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها يعيش في بحار وأهـر البلاد الباردة || أجناسها صغيرة القد. أطوالها تراوح من ٢ الى ٣ سم. زياتها مركبة ثلاثية الفصل. الزوج الأول من قوائمها ملتصق بالراس وينتهي بملاقط فكية. الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلابات قافضة. أطولها مبيانة الألوان وسها الأبيض الشفاف.

٢٠١٠٥ - عُمرُوسِيَّات  
Gammaridae (S).  
Gammaridés (F). Gammaridae (E).  
فصيلة دوبيات مائية من القشريات العليا مزدوجات الأرجل أجناسها وأنواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر يعيش في مياه البحيرات والأهر. معظمها من البلاد الباردة || أجناسها متباينة الأبعاد يكثر فيها الصغر. جميعها عادمة الحاف. عنبرها بسيطة. زياتها ثلاثية الفصل. الزوج الأول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط فكية || أشهر أجناسها الغمرُوس.

## ٢٠٠٨٨ - غِمامَةُ الحُسْن \*

Colymbus stellatus. C. septentrionalis (S). Plongeon cas-marlin (F). Red-throated diver (E).  
طائر من الفاس كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم. رأسه وشفقه الى الريدة الجلجل. ظهره الى السرة القاعة وكذلك سائر صفته العليا من القفن الى الذنب. صدره وبلطه وإبطاه الى الأبيض الناصع. غطه أسود اللون || يترج من البرد من الشمال الى الجنوب نحو المتوسط وشاطئ الهند.

## ٢٠٠٨٩ - غِمامَةُ القُطْب \*

Colymbus glacialis (S). Plongeon imbrin, P. glacial (F). Great northern diver (E).  
طائر من الفاس كبير الجثة طوله نحو ١٠٠ سم. رأسه وظهوره الى السواد القاتم. بلطه وسدره وإسفل عقه بيض. إبطاه مجنمة ومبقجة بالاسود || يترج من البرد من الشمال الى الجنوب نحو الشطوط الأروية.

## ٢٠٠٩٠ - غِمالِج

نبات على شكل الذآتين ينبت في الربيع.

## ٢٠٠٩١ - غِمْبَكار هو الأريان، اطلبه.

## ٢٠٠٩٢ - غِمْبَر، قُمرُوس رَشِيق

Gnatophyllum elegans (S).  
Gnatophylle élégant (F).  
حيوان بحري من القشريات عشاريات الأرجل طول الذليل ينتهي الى فصيلة القريدسيات. إعطانه البحر الأبيض المتوسط || جسمه اهليلجي الشكل، منطلف الذليل، يطول نحو ٧ سم. متكه قصير القد، سنن اختار. ثوبه الى الشقعة المنقطة بالاصفر الذهبي || يعتبر من الأنواع الفاعرة الصفن المروغب فيها.

٢٠٠٩٣ - غِمْبَر \*  
Ourouparia gambir (S).

Gambier (F).  
شجرة برية معمرة من فصيلة الفويات منبها الملايو. يستخرج من أوراقها بعد تقمها بالماء وغليها مادة صمغية ولاتنجية تشبه الكاشو لها استعمالها الطبي والسناعي.

## ٢٠٠٩٤ - عُمرَة، ظَهْران، عُمرَة آف

Elytre (F). Elytron (E).  
عمر. ج أبعاد. والأخاد هي الأجنة العليا لخشرات رتبة مُعَمَّدات الأجنة وهي صلبة قزينة المادة مهمتها حفظ الأجنة الزقية الموجودة تحتها المعروفة بالرواش.

٢٠٠٩٥ - عُمرَة  
Gaine (F). Sheath, Ocrea (E).  
قاعدة معلق الورقة وهي تحيط بالساق قليلاً أو كثيراً وقد تكون طويلة نائبة في التجليات.

٢٠٠٩٦ - عُمرَة مَكَامِي  
Etu médullaire (F).  
Medullary sheath (E).

## ٢٠٠٩٧ - عُمرُوسِيَّاتُ الجَنَاح

Coléoptéroïdes (F).  
Coleopteroides (E).  
طبقة حشرات من شبة الحسدليات وطائفة الجنجات أصلاً. تشمل رتبة واحدة تدعى عُمرَة الأجنة. حشراتنا تعرف بالخنفساء أو الخنفساء جميعها خنافس والمعداء تدعى حورية جمعاً حوريات.

## Crossarchus (S). \* ٢٠١١٥ - عُشَمُولَاتُ

Crossarque, Mague (F).

جنس حيوانات قرضابة من فصيلة الزباديات . أنواعها المعروفة ستة موطنها بعض مناطق افريقية الشرقية والشمالية والوسطى . تأثف الرياض والغابات وضفاف مجاري الماء والقفور . تأثف الحياني جاعي . جامعاتها تمد من ٢٠ الى ٣٠٠ زوج وأكثر || أجسامها صغيرة ، شوبزا شوزن ، النمس ، أطولها تراوح من ٦٠ الى ٧٥ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ١٧ الى ٢٥ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها وإذناها صغيرة مستديرة . اعنتها معتدلة الطول . قوائمها قصيرة ، خاسية الاصابع . اوبارها قصيرة غشنة . ضفاب أنولها يختلف مع النوع تكثر فيه الكمية والشبهة والتجنيج المعترض || تعيش في اوجار تحضرها في التربة او في الوعان المهجورة من النمل والارضة . قوتها الحيوانات والحشرات والثار والجوبوب . اشهر أنولها المعروفة التالية :

Crossarchus fasciatus (S). عُشَمُولَاتُ مَجْعَع

Crossarque rayé (F).

Crossarchus obscurus (S). عُشَمُولَاتُ مَعْمَم

Crossarque obscur (F).

Crossarchus gambianus (S). عُشَمُولَاتُ غَمْبِيَا

Crossarque de Gambie (F).

Crossarchus somalicus (S). عُشَمُولَاتُ الصُولَا

Crossarque de Somalie (F).

Dard (F). Dart, Sting (E). عُشَمُولُوج

نامية او ابنة شجرة تكون في بعض الاشجار اخصها التفاح والاجاس . ج عماليخ .

## Megaspira (S). \* ٢٠١١٧ - عُشَمُولُوط

Mégaspire (F). Megaspira (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الاربجل وفضيلة المثارات . أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق امريكا الجنوبية اخصها البرازيل || تعيش في المواقع الظليلة الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها اسطوانية ، برجية الشكل ، مستطيلة ، مقاربة الولة .

## Acantholimon (S). عُشَمُولُوج

Acantholimon (F). Prickly thirt (E). Stachelgrasnelke (D). Acantholima (I).

ج. ثماليل . جنس اشباب برية وزراعية معمرة من فصيلة الرصاصيات . أنواعها عديدة ، مهددا مرقعات حوض البحر المتوسط جميعها صغيرة القد ، مثندة ، شائكة . اوراقها لا تقياسية الشكل . ازهارها سنبلية التجبيج || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

## Acantholimon venustum (S). Acantholimon

élégant (F).

نوع من الفولول وهو بجلة سريرية صغيرة القد ، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها منبسطة الصفحة ، حوشية التصل . سلبها تملو نحو ٨ سم . ازهارها وردية اللون مرقاة || ازهارها يستمر طوال الصيف . وهي من البقول المسقية ، تبكر في اول الربيع وتؤكل مطبوخة .

## Gamassus (S). Gamase (F). \* ٢٠١١٦ - غَمَشَس

جنس قراد من فصيلة الغشيات . انواعه عديدة جميعها عياء صغيرة القد ، طولها نحو مليمتر واحد . وهي من الاشرات الثالثة قوتها المواد الفضوية المنحلة || تتطفل على الحشرات اخصها نخدية الجناح لتتلقها من مكان الى آخر .

## Gamassidae (S). غَمَشَسِيَّات

Gamassidés (F). Gamassidae (E).

فصيلة حشرات من القراديات . اجناسها المعروفة اربعة اما أنولها فعددية جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١ الى ٢ سم . وهي عياء عادمة العين . أنولها سوية الالوان المابقة التي تراوح من الاصفر القاتم الى الاسمر الجوزي || تتطفل على الطير والحيوانات والحشرات .

## Gomphidius (S). غَمْفِيدِي

Gomphide (F).

جنس فطور من فصيلة السيمات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها اقليم الصنوبريات في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الجلوع واللدبال والمواد النباتية المنحلة . بعض انواعه مأكول والبعض الآخر كاعن الصف غير مرغوب فيه || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

## Gomphidius glutinosus (S). Gomphide gluant

نوع من الفمفيد المأكول . يعيش في المواقع الرطبة . ساقه مستقيمة ، دقيقة الغشاء ، صفراء القسم السفلي غبراء العلوي . اروسه كبيرة القد ، شبه قلنسوة الشكل ، قطرها نحو ١٢ سم . لوئها الى الكسني البفسجي الموج || لحيتة جامدة ، لذينة الطعم ، مستحبة اللذاق .

## Gomphidius viscidus (S). Gomphide visqueux (F).

نوع من الفمفيد الكاعن الصف . يعيش في المراعي على الدبال . ساقه معتدلة الغلاظة والارتفاع ، سمراء اللون ، صفراء الموج . اروسه لزجة ، قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم . لوئها الى المغرة النحاسية الموج . اطراسه الى الفبرة الصفراء الموج .

## Gomphidius roseus (S). Gomphide rose (F).

نوع من الفمفيد الكاعن الصف . يعيش في احرار الصنوبر على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة مستقيمة العنق ، بيضاء اللون ، غبراء الغشاء . اروسه ثلاثية الفلق قطرها نحو ٥ سم . لوئها الى الودي الفليكي الموج . اطراسه ليدة ، لوئها الى البياض الافر .

## Rosée (F). Dew (E). غَمَق

المن هو الندى . تحمت الارض ركبها الندى فهي نغمة . ونمق النبات نبي او فسد من كثرة الانداه عليه . والنمق المكان الذي يركبه الندى .

## Capuchonnage (F). غَمَل

هو الضجمان عارض يصيب الزرع . هو الغم ، راجعه .



عش



غمفيد ديق



غمفيد لرج



غمفيد ودي



عشلا



عشلول



## ٢٠١٢٠ - عُمَلُول سَبْطِي

Acantholimon glumaceum (S). Acantholimon en épi (F).

نوع من الفللول وهو بجلة سريرية صغيرة القذ، تملو الشوك تملو نحو ١٥ سم. اوراقها هدية الشكل خضراء اللون. سبتيها مستطيلة، ازهارها حر البتلات، بيض الكرويس، سود المروق || ازهارها يستمر طوال الصيف.

## ٢٠١٢١ - عُمَلُول شَالِك

Acantholimon acerosum (S). Acantholimon aculaire (F).

نوع من الفللول، وهو بجلة سريرية صغيرة القذ، تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها رحيمة الشكل طول من ٥ الى ٩ سم. وتعرض عند قاعدتها نحو ٥ سم. اشواكها كثيرة. سبتيها تفلول من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها قرمزية. ازهارها يستمر طوال الصيف.

## ٢٠١٢٢ - عَمْن - هو القم، اطلبه.

Goémon (F). Seaweed (E).

هو سباد الانغ، اطلبه.

## ٢٠١٢٤ - عَمِيَسَة

Argyroneta (S). Argyroneta (F).

جنس عناكب من فصيلة الفميسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها مائية تعيش في البحيرات والاهوار والانهر الراكدة المياه || ملاجئها عكادب من التواس وفيه الشكل متينة الحبلت تنبها في الاشعاب المائية وتنقل الى الهوا بواسطة الفتاقي التي تجمعها بين حلب صدارها وبطنها كذا علت سطح الماء وفاضت || اجسامها صغيرة القذ، فضة الثوب، رصاصية الجرامز الكثيفة الحلب.

## ٢٠١٢٥ - عَمِيَسَة مَائِيَة، عَطَاسَة

Argyroneta aquatica (S). Argyroneta aquatique (F). Water-spider (E). Wasserspinne (D).

دوية من العناكب الساعية القانصة من فصيلة الفميسيات. موطنها منظر مياه البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها صغير القذ يطول نحو ٩ سم. عند العنكب ونحو ١٤ سم. عند التنكبة. صدارها احمر اللون اسمر المواج. عينها مركبتان زرقائتان. شمسها صغيران. فكها مستطيلان. جرامزها دقيقة، كيفية الحلب. بطنها بيضي الشكل، اخضر اللون، نفي المواج || قوتها الحشرات المائية لتلتفها عاتمة على سطح الماء او فائصة فيه || تتمر نحو ثلاث سنوات وتساعد قبل نهاية اجلها بثلاثة اشهر || تعتبر من الدوييات النافعة.

## ٢٠١٢٦ - عَمِيَسِيَّات

Argyronetidae (S). Argyronetidae (F).

فصيلة من العناكب الساعية القانصة رباعيات الرايا والمشتان. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها صغيرة القذ تتميز باستتالة حلب جرامزها الحلقية || اشهر اجناسها الفميسية.

## ٢٠١٢٧ - عَمِيَسَمَاء

الفيضاء احدى الشرعين، من منازل القمر. اطلب شمر شامية.

## ٢٠١٢٨ - عَمْن - يقال غن اذا ادرك ثمره.

## ٢٠١٢٩ - عَشَّاج \* Pitta (S). Brève (F).

جنس طير من الفنايات الجواثم مشروبات المناقر. انواعها المعروفة حسة اصلاها البلاد الاسيوية والافريقية || جميعها صغيرة القذ، قصيرة الذنب، مستطيلة الساق. اوتابها مختلفة الالوان، جميعها مطوقة الحامس، منشة الصدر والبطن || قوتها الحشرات والبرور البرية. تدثن بين الاذغال في افاحيص قليلة السمق. حشبتها تراوح من ٥ الى ٧ بيضات ترخمها الانثى بمثابة الذكر نحو ١٥ بيضا.

## ٢٠١٣٠ - عَشَّاجِيَّات \* Pittidae (S).

Pittidés (F). Pittidae (E).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل رقيات القدم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة المنحرفة نحو الاستوائية من العالم القديم || معظم طيورها صغير القذ وبعضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق || تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة والحفة والفتح || تألف الاجراج الدغلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج || قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبعض البرور البرية || اعرف اجناسها واشهرها العشاج.

## ٢٠١٣١ - عَشَّافِير - الضبمان الكثير الشعر.

Berger (F). Shepherd (E).

صاحب القم وراعيا.

## ٢٠١٣٣ - عَشَّان - الثنان : صوت الذباب.

## ٢٠١٣٤ - عَشَّيَّاش \* Blaps mucronata (S).

Blaps, Scarabée puant, S. funebre (F).

خنفساء من فصيلة النشيات، طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. قوتها الى السواد الباقي الشامل السوي. تعيش تحت الحجارة وفي الاقنية والتعايزر المظلمة. راعتها منتنة كريمة. قوتها المواد النباتية والعنوية المنحلة.

## ٢٠١٣٥ - عَشَّيَّاط، مَرَح Rhinobatis (S).

Rhinobate, Guitare, Violon de mer (F). Guitare (E).

جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة الغنباقيات. انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها كبيرة، وشية الشكل. رؤوسها مستعرضة، منبسطة، مطوقة بالزناكل الصدوية، مخروطية الشوزن. افواهما سفلى الارتكار. اشدها كبيرة. اسنانها مسطحة، متكاثفة الرصف || اوتابها تختلف مع الانواع، تكثر فيها الكهبة الزيتية المواج. زعانفها الذيلية نافذة، كبيرة القلق العليا، صغيرة السفلى. مسرهما اسام الجواج. قليا تشاهد قرب الجاحد والشطوط || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

## ٢٠١٣٦ - غُبَاط الجُزُر اليونانية \*

Rhinobatis colonnae (S). Rhinobate des îles grecques (F). Rhinobatis colonnae (E).

نوع من الغنباط. يكثر في بحر اليونان والجزر. قوته القشريات والرخويات والشوكيات || جسمه وشي الشكل، يطول نحو ١٠٠ سم. رأسه مسطع الجرم، مخروطي الشوزن. عيناه سطحيتان. فه سفلى الارتكار واسع الشفق || ثوبه الى الكهبة الزيتية المواج رقيقة سمراء في الظهر ومشيح ابيض في البطن || لحمه كامن الصنف، مأكول.



عَشَّاج



عَشَّيَّاش



غُبَاط البحر اليونانية

او غيرها وما تبقى فلوله يختلف مع النوع او يعيش ارباباً كبيرة العدد قوته البلور والحويوب اصحابها شلب الارز.

### ٢٠٦٤٢ - غُثَيْلِ اسود الزباني \*

*Podagrica fuscicornis* (S).

*Podagrica à antennes noires* (F).

حشرة خاملة من فصيلة النصاريات ورتبة غديات الاجنحة. تألف البراري حيث تكثر نباتات الفصيلة الخبازية. خنافسها تعيش على بتلات الازهار. يرقاتها تلتهم الاوراق وتمشي في داخلها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها ثنائي اللون. رأسها وكوسلها وبطنها وجرامزها الى الحمرة البرتقالية. ظهورها الى الزرقه السفاه. قليل الاحديداد، مستدير الطرف الاثلاث. زباناها غبيطيان اسودان || لها جيل واحد في الحول. تظهر الجملانة في ايار ويتبقى حتى ايلول. تمتع الاثنى المكن زبناً تلتصقها بتصال الاوراق || البرقة تطول نحو ٧ م. جسمها وشعي الشكل، سداسي الرواجب. ثوبها الى الصفرة القاتمة يعلوها غطان جابليان اسودان. رأسها وشريحها ورواجبها الى السمرة || طول الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة ضمن جراب من التراب والحواد الصغوية والنباتية.

### ٢٠٦٤٣ - غُثُفُوسُ اقْرَن \*٥

*Gnathocerus Cornutus* (S).

*Gnathocère cornu* (F). *Gnathocerus cornutus* (S).

حشرة ناهمة مؤذية من فصيلة الغنثيسات ورتبة غمدعات الاجنحة. موطنها يشمل جميع الاقطار المكنونة. تألف مخازن التيق والبقالة وبيوت السكن. خنافسها وبقاتها تعيش على التيق وبركاته المكنونة وعلى المواد السكرية والثمار المجففة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السمرة الكستنية الصنائية المواج، ذكرورها يكتنفان التأثير الفككي. عينها ناضرتان. زباناها مجهزة بزوائد رأسية فارقة تميزها عن الاثلاث وعن غيرها من الحشرات. رأسها مستقيم الجرم مجهز بقرنين متقابلين يكتنفان التأثير الفككي. عينها ناضرتان. زباناها صوبطانيان صفيان. فكاهها ذريان. ظهورها لا يلحف كامل السكة الشرجية. غمداهما متابعتا التحزيز القاطب والتفتيط التيق || لها جيلان في الحول. تسرح في التراب وفي الليل || والبرقة عند بلوغها الادراك التام، تطول من ٦ الى ٧ م. جسمها اسطواني الجرم. ثوبها الى الصفار الباهت. رأسها الى السمرة. سكبتها الشرجية مجهزة بركين ذريين || طول الاكمال الذي يستمر من ١٤ الى ٣٠ يوماً يتقضي طليقاً من كل غلاف.

*Hérissonne* (F).

*She-hedgehog* (E).

*Lynx caracal* (F).

*Gongyle ocellé* (F).

### ٢٠٦٤٤ - غُثَجَة

هي القنفذة اثني القنفذ.

### ٢٠٦٤٥ - غُثَجُل

هو عنق الارض، الحلبه.

### ٢٠٦٤٦ - غُثَجِيل

هو الدساسة النرة، الحلبا.

### ٢٠٦٤٧ - غُثَدُصُولِي \* ، زَنْبَقُ زَنْجَبِيلِي

*Hedychium* (S). *Hédychie* (F). *Ginger lily, Garland flower* (E). *Schöne krauzblume* (D). *Coronaria* (I). غُثَدُصُولِي هو الاسم الهندي لهذا النبات. جنس نباتات

### ٢٠١٣٧ - غُثَبَاتُ الْمُتَوَسِّط \*

*Rhinobatis rhinobatis* (S). *Rhinobate de la Méditerranée* (F). *Rhinobatis rhinobatis* (E).

نوع من الغنباط. اصطناه معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. مسرعه اساطم الحجاج. قوته القشريات والرخويات والشوكيات || جسمه وشعي يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ م. رأسه مبسط الجرم، مخروطي الشوزن. عيناه مسطحتان. فم سفلي الارتكاز، واسع الشفق. اسنانه مسطحة، متكاثفة، متراسة. زعنفته الذيلية فارقة، كبيرة الفلقة العليا || ثوبه الى الكهية الزيتية المواج تملؤها شحة سمراء في الظهر، و تبنية في البطن || لحمه كاعن الصف، مأكول.

### ٢٠١٣٨ - غُثَبَاتُ جِدَّة

*Rhynchobatus djiddensis* (S). *Rhynchobate de Djedda* (F). *Rhynchobatis djiddensis* (E).

سمكة من الغنباط. اصطناه البحر الاحمر والخليج. مسرعه اساطم الحجاج || جسمها شبه وشعي الشكل، مستعرض المقدم، مستقيم المقعر، يطول من مترين الى ثلاثة امتار. رأسها مبسط الجرم، مخروطي الشوزن. عيناه مسطحتان. فم سفلي الارتكاز، واسع الشفق. اسنانه مسطحة متراسة || ثوبه الى الربة السمراء يعلوها تبيج اخضر في الظهر وفي الزعانف || لحمها كاعن الصف، مأكول.

### ٢٠١٣٩ - غُثَبَاتُ طَيَّات \*٥

*Rhinobatidae* (S). *Rhinobatidés* (F). *Rhinobatidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السفنقيات ورتبة الاشفاق. اجناسها وانواعها المروفة نحو ٢٥ جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها وشعية الشكل تطول من ١٠٠ الى ٥٠٠ م. رؤوسها منبسطة، مخروطية الشوزن، مطوقة باكتاف فارقة ناتجة عن التحامها بالزعانف الصدرية الرحية. اقوالها سفلية الارتكاز، واسعة الاشفاق. عيونها سطحية صغيرة. اسنانه مسطحة، متراسة، كثيرة العدد. اصكاهما الخيشوية سفلية الارتكاز كالاقلام. زعانفها الذيلية فارقة، كبيرة الفلق العليا || اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.

*Rhamphocenus* (S).

*Rhamphocène* (F).

جنس طير من الجواثم وفصيلة الجربليات. انواعه المروفة ستة اصطناه امريكا الاستوائية. ملجئها الحياتي جماعي الا في زين التصادف والحفاضة. تألف الغابات. قوتها التمل والحشرات الصغيرة والذباب والارواح || اجسامها صغيرة. مناقبها مستطيلة. اذنانها مخروطية نصيرة. ألوانها متراكبة الالوان تكثر فيها الشقمة والطحلة والشهية. عيونها مكحلة. محاررها سطحية بالاسود. صدورها موشة || تدثر في الاشجار المتوسطة الارتفاع. انثاها تنقع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول. التزويج يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الاناث بمناوبة الذكور.

### ٢٠١٤١ - غُثَبِيل \*

*Paddas, Munia* (S).

*Padda, Calfat* (F). *Paddas* (E).

جنس طير من الجواثم المخروطيات المناقير. انواعه عديدة جميعها اسيرة وافر يقية الاصطاف. ألوانها متداخلة الالوان المختلفة. رؤوسها سود. محاررها بيض. بطونها وردية



غنباط المتوسط



غنبور



غنبول



غنبل اسود الزباني



غنثوس اقرن



غنثدصولي

القد بطول نحو ٢٤ سم. رأسه متوج بقزعة مستطيلة الریش المتصل على القفن والعنق. منقاده مخززي الشكل ، قليل الاحديداب . جناحاه عريضان قصيران . ذنبه مستدير الطرف . ساقاه معتدلتا الارتفاع . ثوبه الى الشبهة القلوية المتفرض يلما توبيع انبوي مستطيل ينهي بثلاث صفحات ثنائية التخصيص . مآبرها هدية تملوها سمات دقيقة || تجرد في جميع الازربة الغنية بالمواد الصبوية لكنها تختفي المواق الباردة || اشهر انواعها ما يلي :



غندي

٢٠١٥٥ - غُثُثُويَات \* Rhinchoetidae (S). Rhinchoetidae (F). Rhinchoetidae (E). فصيلة طير من طول الساق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور قلدونية الجديدة || اعرف اجناسها واشهرها الغنثوش .

٢٠١٥٦ - غُثُثُوس \* Gnathoncus (S). جنس حشرات مفترسة من فصيلة المستيريات ، انواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها صغيرة القد يضيئة الشكل طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . اثنائها الى السرة السوداء المواج || ريقاتها مفترسة تعيش على المزابيل لتلهم الحوام ويمكن الحالوش .



غنثوش

٢٠١٥٧ - غُثُظ الغنظ : تنير النبات من الحر .

٢٠١٥٨ - غُثُفَاسَة \* Gnaphosa (S). Gnaphose (F). Gnaphosa (E).

جنس عناكب ساعية قاصصة من قزلاوات وفصيلة الكواكيات . انواعها المعروفة نحو ٥٥ منتشرة في معظم اقطار البلاد الممتدة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد ، متكاثفة الجمل ، ممرار اللون . قوائمها مستطيلة عقائية . تعيش في البراري اللغلة وفي الغابات . تسرح في النهار . عندها ستة لوزية الشكل تشبهها تحت الحجارة وفي تجاويف الاشجار وفي الجحاة || قتيها الحشرات الصغيرة ومنها الذباب الذي تفضل على كل حشرة .



غنطوس

٢٠١٥٩ - غُثُفَال غنثفاله

هو الكرمية ، اطلها . ومنها الحمراء والجليلة .

٢٠١٦٠ - غُثُفَر سِيلَان \* Uropeltis grandis (S). Uropeltis de Ceylan (F). Uropeltis (E).

نوع من الثعابين ، حية يبيض جلد من فصيلة الثعابين . موطنها جزيرة سيلان . طولها نحو ٦٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، جامد السهف . رأسها صغير . سطحها مخرومي . عيناها صغيرتان . ذنبها مقطوع الطرف ، ازور الحلف يبدو كالعين . ثوبها اللوي الى الصفرة يملوها تدرج لولبي اسمر . ابطاها وبدها الى الصفرة الباهية المنمشة بالابيض والاخير || تألف المروج والغابات . قوتها القار والمظاء والثعابين الصغيرة والحشرات والديدان .



غفاسة

٢٠١٦١ - غُثُفُريَات \* Uropeltidae (S). Uropeltidae (F). Uropeltidae (E).

فصيلة حيات يريضة ، جاسة ، عادمة السموم ، لامتؤنية . اجناسها المعروفة سبعة ، اما انواعها نحو ٦٠ اعطائها تحت من الخليج الى الهند والهند الصينية وجزيرة سيلان وجزر الزانج || اجسامها اسطوانية تطول من ٣٥ الى

جملورية معمرة من فصيلة الزنجيبليات . انواعها المعروفة ٢٥ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . قريبة الشبه من القنا . اوراقها ساجسة متعاقبة . ازهارها سنبل ، هابي ، كبير القد || ازهارها عديدة الالوان ، انبوية الشكل الثلاثي المتفرض يلما توبيع انبوي مستطيل ينهي بثلاث صفحات ثنائية التخصيص . مآبرها هدية تملوها سمات دقيقة || تجرد في جميع الازربة الغنية بالمواد الصبوية لكنها تختفي المواق الباردة || اشهر انواعها ما يلي :

٢٠١٤٨ - غُثُثُوي أُرْجُوَانِي

Hedychium coccineum (S). Hédychie écarlate (F). نبات ترابي يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . بما فيه السنبلة الزهرية . اوراقه شبيهة خزامية خالية النصل تطول نحو ٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ || ازهاره ارجوانية اللون ، شريفاتها صغيرة مستندرة ، قصورها خيطية تطول نحو ٣ سم || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠١٤٩ - غُثُثُوي غُرْدِير

Hedychium gardenianum (S). Hédychie de Gardner (F). نبات ترابي يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه شبيهة مستطيلة مدنية الزام الاخير . نصلها مالى البشرة يطول نحو ٥٠ سم || ازهاره صفراء اللون شريفاتها مستطيلة ، مآبرها وسماتها حر || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠١٥٠ - غُثُثُوي تحيل

Hedychium gracile (S). Hédychie grêle (F). نبات ترابي يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقه دقيقة نحيلة . اوراقه سنانية النصل تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم || سنبلة الزهرية متدلية تطول نحو ١٦ سم . لون ازهاره الى اليباض الموشح بالاخضر ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .

٢٠١٥١ - غُثُثُوَانَة \* Gondwana (F). Gondwana (E).

اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة فرضية كانت في الازمنة السحيقة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغشقر واسرائيل فانشقت وانقسمت عن بعضها في الاباج الثاني واصبحت كما هي الآن .

٢٠١٥٢ - غُثُثُدي \* Ctenodactylus gundl (S). Ctenodactyle, Gundl (F).

حيوان لبون قاصم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات . موطن اطراف الصحراء الكبرى من الغرب والشرق . جثته جنة الارب الصغير . يآلف المناطق الصخرية الوعرة اذناه صغيرتان . ذنبه جمدية كاسية . جرامزه رباعية الاسباع اظافره قوية ذرية . ثوبه الى الوردية الصهباء بيله ابيض || قوته الاعتشاب والجلود .

٢٠١٥٣ - غُثُثَس Gnels حشر متيلور ثوري المصدر يكثر في الاراضي الاصيلة .

٢٠١٥٤ - غُثُثُوش Rhinchoetus (S). Rhinchoète (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغنثوشيات . موطنه قلدونية الجديدة . تألف البراري والاحراج المبتعة بالاشجار . ملجئه الحياتي جامعي جماعاته قليلة العدد . قوته الحشرات واللوبويات وبعض اثار النية والبزور || جسمه متوسط

**٢٠١٦٧ - غُتُوج \* Melopittacus undulatus (S).**  
**Melopitte, Perruche ondulée (F).** **Budgerigar (E).**  
 طائر وسيد الجنس والنوع من الببغاوات. موطنه بلاد  
 أستراليا. تربيته منتشرة في معظم أقطار العالم || يألف  
 القفص لكنه لا يعيش منفرداً وأن عاش فلو تم بحمد ||  
 جسمه صغير القد مستطيل الذنب الدقيق. ثوبه جميل  
 الألوان، متركب الاخضر والأحمر والأصفر بانسجام  
 في لا ميل له يتحلى بأشكال الأذواق || قوته الضع  
 والقنبر والثار الناضجة والمفوف والخبس || الاثنى تثنى  
 عشها في تجويف جلع. حشنتها من ٤ الى ٦ بيضات  
 تستمر نحو ١٥ يوماً.

**٢٠١٦٨ - غُتُورَه \* Melopittacus (S).**  
 غي الطير، اطلبه.

**٢٠١٦٩ - غُتَيَاتِي \* Goniates (S).**  
**Goniatie (F).** **Goniates (E).**  
 جنس حيوانات من الرغويات وأسيات الاربل وراعيات  
 الخياشيم وفصيلة الغنياتييات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠  
 جميعها من المتحجرات. احادها تستمر من الحقبة  
 الديفونية الى اواخر الكربونية || اصداها مكورة الشكل  
 او مبطة. قربة الشبه بالثويات.

**٢٠١٧٠ - غُتَيَاتِيَّات \* Goniatitidae (S).**  
**Goniatitidés (F).** **Goniatitidae (E).**  
 فصيلة من الرغويات وأسيات الاربل، وراعيات الخياشيم.  
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، جميعها من متحجرات  
 الحقبة الديفونية والكربونية من الاباج الاول المعروف  
 بالقديم || اعرف اجناسها الغنياتيت والتكليميت.

**٢٠١٧١ - غُتَيْمَة \* Gouania (S).** **Gouanie (F).**  
 سمكة بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الشحاريات.  
 اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها  
 صغير القد، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير،  
 مستدير الخط المقعر. عيناها ماحتان. زعانفها الظهرية  
 والشرجية ضيقة، مستطيلة. الذيلية صغيرة، مستديرة  
 الطرف. ثوبها الى الشقعة المتقطعة بالاحمر || تتميز  
 بمحسنتها البياضية الاحليجية الشكل التي تمكثها من  
 الالتصاق بالملس الصخور حيث تكمن واحدة قدم  
 فرائسها.

**٢٠١٧٢ - غُوتَاجِيَّات \* Cryptobranchidae (S).**  
**Cryptobranchidés (F).** **Cryptobranchidae (E).**  
 فصيلة حيوانات قازية من صف الصفديعات ورتبة  
 السرفوتيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم  
 اقطار العالم || جميعها منقطة الخياشيم، قازية، تميش  
 في البر والماء || اجسامها مستطيلة، رباعية القوائم  
 والاصابع، اسفينية الرؤوس، مستديرة العيون الصغيرة.  
 امودها امود السندل || قوتها اللدنان والحشرات  
 واللوبيات.

**٢٠١٧٣ - غُوارَانَه \* Paullinia cupana, P. sorbilis (S).**

**Paullinie, Guarana (F).** **Guarana (E).**

جنبة معمرة عارضة ملتفة من فصيلة البينديات. مهذها  
 بعض اصقاع امريكة الجنوبية انحصا البرازيل حيث  
 يدومها «غوارانه». منبتها الطوري شفاف الامازون

٦٠ سم. رؤوسها صغيرة. اعطائها متباينة الاشكال،  
 منها المقنطرة والمستديرة والمخروطية. عيونها صغيرة. فكلها  
 مستنة. اعانها مدوية. اذنانها قصيرة. اثنائها مرقوشة،  
 متراكبة الألوان || اشهر انواعها غنفر سيلان.

**٢٠١٦٢ - غُفَلَة \* Fierasfer (S).**  
**Fierasfer (F).** **Fierasfer (E).**

التفلة ج غفل وغفال جنس اسماك بحرية من الملسوات  
 انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض بحار البلاد  
 الحارة والمتلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط ||  
 اجسامها مبطة مستطيلة قدية الشكل تطول من ١٠ الى  
 ١٥ سم. زعانفها الظهرية قليلة المرض، قاطية، تمتد  
 من الق الى طرف الذيل. اثنائها تختلف مع الانواع منها  
 الاصفر والاحمر والاصفر والاصفر والاصفر الباهت ||  
 تستطيل على كواكب البحر وقثايات البحر وتعيش في  
 اقنيتها الحفصية.

**٢٠١٦٣ - غُفُوسِ أَقْتَم \* Gnophos obscurata (S).**  
**Gnophos obscurata (F).** **Gnophos obscurata (E).**

حشرة من فصيلة الافريات ورتبة حشرقيات الاجنسة.  
 موطنها معظم الاصقاع المعتلة الحرارة من الشرق الاوسط  
 والاندل واربوة. فرائسها جارية قوتها رقيق الارزمار.  
 سرتها خاضعة قوتها اوراق النبات || جسمها نحيل خفيف  
 يطول نحو ١١ مم. بطنها نحو ٣٠ مم. رأسها ابد اسمر.  
 عيناها صغيرتان. زباناها غصيان. جوتها وبطنها الى  
 الرتبة السراء الموالج || رؤسها الاماميان الى الرتبة  
 يطولها تمشج اكهب وثلاثة خطوط منقطة وسط متقطع  
 جميعها الى السرة. حناها الخارجي مفرسج سباعي الاسنان.  
 رؤسها الخلفيان الى الرتبة يطولها خطان منقضان اسمران  
 وسط حناي شديدة السرة. حناها الخارجي خاصي  
 الفروس || لها جيل واحد في الحول. تظهر القزاة في  
 تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح من مصر الى فحة النيل.  
 تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان مبيادياً  
 على الصفحات السفلى من نصال الأوراك || السرعة تطول  
 نحو ٢٤ مم. جسمها شبه مردني الشكل. ثوبها يمتد  
 البيت التي تمش فيها وهو يراوح بين الاخضر الاحمر  
 والاربد المرقوش بالاحمر تطول ثلاثة خطوط قاطية جميعها  
 الى الجوزة. رأسها اسود. وراجه البنية الوسطى ماحتة  
 مما يجعلها تنقص عنه الانتقال || طور الاكمال الذي  
 يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في الاجلثة ضمن صلجة  
 متدلة الشباك.

**٢٠١٦٤ - غُتَم \* Calliophanes (S).**  
**Calliophanes (F).** **Calliophanes (E).**

قال الجوهري: «الغتم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع  
 على الذكور والاناث». والغتم لا واحد له من لفظه  
 والجمع اقنام واغنام وغنوم. اطلب شأن.

**٢٠١٦٥ - غُتَمَاتِي \* Ovidae (S).**  
**Ovidés (F).** **Ovidae (E).**

فصيلة من مزدوجات الاصابع المقتربة يقسمونها الى قسمين  
 الفأنية والمزمية.

**٢٠١٦٦ - غُتَمِيلِد \* Ganymède (F).** **Ganymede (E).**  
 احد اقد المشتري. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون  
 الثاني ١٦١٠ دورته الكاملة حول المشتري تستمر ٤ أيام  
 و٤٢ دقيقة ٣٦ ثانية.



غنفس اقم



غُتُوج



غنياتيت



غنية

بارزة العروق المتوازية . نصلها مالم بشرة الصفحة العليا ،  
خلى السفلى ، طري الرائحة ، يستعمل كالشاي وينشط  
الحضن || ازهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف المستحب .  
ثمراها اجاصية الشكل تقطع من ٣ الى ١٠ سم . لها اصفر  
اللون وقد يكون ابيض او وردي او برتقالي في بعض  
الفرواب || غروبها عديدة . زراعتها منتشرة على الساحل  
الليثاني من صور الى طرابلس .



غواصة

### ٢٠١٧٨ - غَوَافَةُ تَفَاحِيَّةٌ ، غَوَافَةُ حَمْرَاءُ

*Psidium pomiferum*, *P. guayava pomifera* (S). *Goyavier pomme*, *G. rouge* (F). *Apple shaped guava*, *Red guava* (E). *Apfeltrager guava*, *Rote Guava* (D). *Guajava rosso* (I).

نوع من الغواطة الزراعية المنتشرة . ثمرتها تملو من ٣ الى ٦ اثمار . تعيش في مختلف الارربة الرملية والطينية . ثمراها تفاحية الشكل مأكولة لكها اقل جودة واغزر مادة راتنجية من الغواطة الاجاصية .

### ٢٠١٧٩ - غَوَافَةُ \*

حشرة من الغواطات صغيرة القدد تنشط مع ريقاتها على دبا الذباب . جسمها مغزلي الشكل ، ازرق اللون عند الذكر ، اسود عند الانثى . رأسها مستطيل . زباناها دقيقان صولجانان . اجنحتها خفيفة ، قليلة العروق والاعصاب ، قزحية اللون عند الذكر ، وردية عند الانثى . جوشها مسنم . بطنها مستطيل مركب من سبع حلقات وترجتها تنتهي بالزوائد التسالسية . اشربتها مستقيمة مدبية الوحز .



غواطة مقطع النثرة

### ٢٠١٨٠ - غَوَافُو

سماد ازوتي فسفوري حصل من تجميع وتراكم سلح الطيور البحرية رذعة من الزن من بلاد الشيل والپيرو وغيرها من بلدان امريكا الجنوبية . وهو من انشاء الاسمعة الازوتية وقد عجز وجره الاذن بعد استنزاف معظم وكماله .

### ٢٠١٨١ - غَوَافُو الخَفَافُش

*Guano de chauve-souris* (F). *Guano of flitter-mouse* (E).

نوع من الغوانو يوجد في الفاور والكهوف ، يكثر في الجزائر والاندلس .

### ٢٠١٨٢ - غَوَافُو السَمَكِ

*Guano of fish* (E).  
نوع من الغوانو يصنع بمعالجة بقايا الاسماك بالمخاض الكبير يتي .

### ٢٠١٨٣ - غَوَافِيَّاتُ \*

*Agaonidae* (S). *Agaonidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشايات الاجنة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نائمة تنشط على بعض الانواع النباتية اعصها اللين وصل بعض الحشرات الصارة من ذوات الجنانين || حشرات صغيرة القدد طويلا يراوح من ١ الى ٥ ميليمتر . اجسامها ربة . زباناها صغيرة دقيقة . اسواها رباعية العقل . اوثابها متباينة الاولان بين الذكور والاناث || اشهر انواعها الغواطة ذككار التنين .

### ٢٠١٨٤ - غَوَافُو \* ، مَسْكُوبُ \*

*Mystacops* (S). *Mystacine* (F).

خفاش وسيد الجنس والنوع من عارة المغيرات . موطنه زيلنده الجديدة يتميز بطاوي جسمه المستطيلة التي تمكته



غواطة

وقد انتشرت زراعتها في بعض المناطق الحارة الرطبة ||  
ساقها مستطيلة كثيرة الااليان المتينة . اوراقها متعاقبة ،  
مركبة ، وريقة التجميع . وريقاتها اعليجية النصال  
الجامدة ، ناشرة الصلوع والعروق . ازهارها عذوقية  
التجميع ، محورية الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ،  
خامسة الفصص ، رباعية الثلاث ، ثمانية الاسدية . ثمراها  
جرا محرمة . ثلاثية الزوايا والثلث المستطيلة تحضن من  
عصية الى ثلاث عصيات شبه مكورة الشكل تقطع نحو  
١٥ م . وهذه العصيات التي تحوي نحو ٥ ٪ من الكافيين  
تستعمل بعد التجميع استعمال البن او لتخضير بعض  
انواع الشرب المنشئ الشائع الاستعمال في البرازيل .

### ٢٠١٧٤ - غَوَافُ \*

*Gnatus* (S). *Gnatus* (F). *Gnatus* (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات وراسيات  
الارجل . مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامن وفصيلة  
الطردوسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار  
القطبية || اجسامها اسطوانية مستطيلة . زعانفها طرفية  
كلوية الشكل . رؤوسها شبه مكورة . عيونها مائعة .  
جبرامها بحجمه متساوية الطول باستثناء الزوج القريب الذي  
يبلغ طوله ضعف طول الجسم والذي ينتهي برسي سنانية  
الشكل تملوها الكلابيب في الزام الاول ، والمخام في  
الزائمين الثالث والاخير .

### ٢٠١٧٥ - غَوَافُ

هو الغواص من طير الماء وكيفية سيده انه يغوص في الماء  
منكبس بقوة شديدة ويمكث تحت الماء بعض الوقت ،  
نحو ٨ دقائق ، الى ان يرى شيئاً من السمك فيأخذه  
ويصمده به || قال بعضهم : رأيت غواصاً غاص فطلع  
بسمكة ففله غراب عليها فأخذه من ففاس مرة اخرى  
وطلع بسمكة اخرى فأخذه من الغراب ثم الثالثة كذلك  
فلما اشتغل الغراب بالسمكة وثب الغواص فأخذ يرجل الغراب  
وغاص به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج هو من  
الماء .

### ٢٠١٧٦ - غَوَافَةُ \*

*Psidium guayava* (S). *Goyavier* (F). *Guava tree* (E). *Grosse gelbe Guayava* (D). *Guajava*, *Psidio* (I).

جنس اشجار وشجيرات مشرة برية وزراعية من فصيلة  
الآسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ مهدها الاسلي امريكة  
الاستوائية وبزير الانليل . اوراقها كاملة متعاقبة بارزة  
العروق . ازهارها محورية الارتكاز ثنائية او ثلاثية  
التجميع . قصيرة الزناد ، خامسة البتلات البيضاء . ثمراها  
نوعية عطرية راتنجية مأكولة ورتب || تنكث بالبر  
والتمثيل والتطعيم . الفرة الناجمة عن برة تضر بعد غرسها  
في مستقرها بادرع سنوات ويستمر نموها حتى عمر ١٥  
سنة ثم يستقر حلالا الى ان تبلغ ٢٥ سنة حيث ينتهي  
دور الانحطاط والبقعة || وهي ترغب في الارربة  
المتوسطة الانسجام للينة بالناصر الغذائية والمواد البديلة .  
اشهر انواعها الزراعية : الغواطة الاجاصية والتفاحية .

### ٢٠١٧٧ - غَوَافَةُ اجَاصِيَّةٌ ، غَوَافَةُ بَيْضَاءُ

*Psidium piriferum*, *P. guayava pirifera* (S). *Goyavier poire*, *G. blanc* (F). *Pear shaped guava*, *White guava* (E). *Bruforsuige Guava*, *Weisse Guava* (D). *Guajava blanco*, *Guayabo* (I).

نوع من الغواطة الزراعية المنتشرة . ثمرتها تملو من ٤ الى ٨ اثمار . فروصها واقدانها مضلمة . اوراقها سنانية الشكل



غوترة

من جمع جناحيه في ثناياها . يطير ويسير على الارض ويطبق الاجنار بدون تردد || يعيش منفرداً . الذكر لا يقرب الانثى الا عند الكوم . يسرح في اوائل وواخر الليل . قوته الحشرات . يالغ تجاوبف الاجنار وارباب الصخور والمغاور والكهوف .

# ٢٠١٨٥ - غُوتَرَة \* Scolopsis (S). Scolopside (F). Scolopsis (E).

سمكة بحرية يبرهن من شالكات الزعانف وفصيلة الفرغيات . اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي . قلبا تقرب من الشطوط الرملية اما يكثر وجودها قرب المجاذع || جسمها اهليجي الشكل يطول نحو ٢٢ سم . رأسها صغير القد وعظمها كذلك . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زعنفتها الظهرية وسيدة ، مستطيلة ، متساوية الارتفاع . زعنفتها الذيلية فائقة . ثوبا الى الريقة الفضية يبق في الظهر ويغير في البطن . ويملأ ثلاثة خطوط وريدية جانبية قاطبة وعط ابيض ملقى السرار تمتد من مقدم الحطم الى قاعدة الزعنفة الصدرية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

## ٢٠١٨٦ - غُوتَرَة

هو الوثير : نبات من الخلجيات ، اطله .

## ٢٠١٨٧ - غُوتَرَة ثَلَالِيَّة النُط

Limnobia tripunctata (S).  
Limnobia tripunctuée (F).

حشرة لافؤنية من فصيلة الغوتريات . جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ سم . رأسها شبه مكور الشكل . زباناها خيطيان ، اسمران . صدرها صناعي تملو جده نغمة سمراء . يطها الى السرة الصناعية . روشاها ثلاثيا النط السمر || الانثى اكبر قدماً من الذكر . ترز مكها في التربة فينثف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة .



غوتل

# ٢٠١٨٨ - غُوتَرَة صَفْرَاء Limnobia lutea (S). Limnobia jaune (F).

حشرة لافؤنية من فصيلة الغوتريات . جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٩ سم . رأسها شبه مكور الشكل . زباناها خيطيان ، اسمران . ثوبا الى الصفرة الصناعية المواج . روشاها كبيرات مخضيات بالاصفر والوردي والاخضر || مرتها المواق الدغلة والحدائق والبساتين || الانثى اكبر قدماً من الذكر . ترز المك في التربة فينثف عن يرقات تعيش على المواد الفسوية والنباتية .

# ٢٠١٨٩ - غُوتَرِيَّات \* Limnobiidae (S). Limnobiidés (F). Limnobiidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المرفقة عديدة ، منظها من عظم الاقاليم الباردة . تعيش على رقيق الازهار والفرزات الازراق . يكثر وجودها في الغابات وقرب مجاري الماء . اجسامها نحيلة . رؤوسها مكورة ، صغيرة ، قرونها الاستنساوية غيطة . قوائمها مستطيلة ، قمسية || يرقاتها خاضلة او داتة او زائجة . جميعها تنتمن في التربة في زين الاكمال وتلتحم بصلجة تفرز نواسها غدد خاصة في مقدم الجسم .



غوجمة صغيرة

# ٢٠١٩٠ - غُوتَل \* Aegothales (S). Aegothèle (F). Aegothales (E).

جش طير من فصيلة البديفوسيات . انواعها المرفقة حسة

موطها بمض مناطق الشرق الاوسط والاقصى . تسرح في الليل وتبيت في التبار على الاجنار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها مستعرضة مغلطحة . عينها كبيرة . سبالها كيفية . مناقبها غرومية الشكل ، واسعة الاشداد . اعنتها قصيرة . اجنحتها متدلة الطول ، ذلقة الاطراف . اذنانها مقلوية . اثوابا الى الريقة تملوا رقة سمراء وتنسج اسود تمتد حتى اطراف الاجنحة || قوتها الحشرات وبعض الثار والبزور || تدثن في تجاوبف الاجنار . اناتها تفيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضها بمنابرة الذكر نحو ١٧ يوماً .

## ٢٠١٩١ - غُوتَجَة صَغِيرَة \*

Trachys minutus (S). Trachys menu (F).  
Trachys minutus (E).

حشرة خاضلة من فصيلة التزنبقيات ورقة مفدمات الاجنحة . تألف المواق الرطبة وزغاف مجاري الماء . خناقها تعيش على اوراق الحور والصفصاف . يرقاتها مرقالة تلم نصال الازراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ سم . ثوبا الى السرة السوداء يملوا مواج ينسجي . رأسها غرومي الشكل . عينها كبيرتان جاحظتان . زباناها صغيران دقيقان . ظهرها مخمور الوسط ، مستدير الطرف للاسف . ارساغها خاضة المقل || لما جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالدة في اوائل الربيع وتمش حتى اواسط الصيف . تسرح في التبار . تتافد بمد ظهورها بثلاثة اسابيع . ترز المك في نصال الازراق || البرقة عند بلوغها الاذراك التام تطول نحو ٥ سم . جسمها اسطواني الشكل ، عامد الراجب ، نشيط التأثير الشفوية ، تبي اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينثقي في الجلالة ضمن صلبة خاوية النشاء المركب من مواد نباتية ممجولة بالريال .

## ٢٠١٩٢ - غُودِيَّة \*

Godetia (S).  
Godétie (F). Godetia (E).

## ٢٠١٩٣ - غُودِيَّة كَبِيرَة الزَهَر \*

Godetia grandiflora (S).  
Godétie à grandes fleurs (F).

نوع من الغودسية . عشبة تزيبية سبروتية مغالية هرمية الشكل . سوقها موقفة تملو نحو ٤٠ سم . ازهارها سنائية ضيقة . ازهارها سنبلل التجميع . ازهارها كبيرة القد ، تطرها من ٨ الى ١٠ سم . ثوبا الى الحمرة الصفراء المواج ونها ضروب ييضا . ويرقوشه باليلكي || تنويرها صيفي .

## ٢٠١٩٤ - غُودِيَّة مُسْتَحَبَّة \*

Godetia amcna (S). Godétie plaisante (F).

نوع من الغودسية . عشبة تزيبية سبروتية مغالية . سوقها موقفة ترتفع من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقها سنائية النصال ، مسنة الحمار . ازهارها سنبلل التجميع . ازهارها عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب منها اليلكي والاحمر والخمري والوردي والابيض والمرفوش بالابيضوي || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .



غور

يجب نف البزور في مستقرا وقد تم ذلك خلال شهر نيسان || اشهر انواعها الزينية غوره فيرجينية وغوره ليندهيمر .

### ٢٠٢٠٠ - غُورَة فيرجينية \*

Gaur de Virginie (F).

نوع من الفورة . عشيّة عولة نوع من ١٣٠ الى ١٦٠ سم . اوراقها سنانية النصال الجيلة الحصار العابق . عروق النصال واعصابها الى البياض الاخير . ازهارها صغيرة القد ، جيلة الشكل تبدو حراء اللون ثم تحترق مع مرور الايام الى الودي وتنتهي بالايض . بتلات ازهارها تتبلج عند الغروب وتطلق عند الشروق || زراعتها لا تتوجب عناية خاصة اما تقضي بنف البزور في مستقرا .

### ٢٠٢٠١ - غُورَة ليندهيمر \*

Gaur de Lindheimer (F).

نوع من الفورة المصرة الزينية . تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . || ازهارها كبيرة جيلة بياض الدامل ، حر الخارج || زراعتها توجب نف البزور في مستقرا .

### ٢٠٢٠٢ - غُورَة ، غُورَة ، غُورَة ، طُغْمُوس

Gorilla gina (S). Gorilla (F). Gorilla (E).

حين لين ، وحيد الجنس والنوع ، من فصيلة اشياء الانسان ورتبة القوديات || وهو اكبر الترد جنة واشهرها خلقاً واشدها قوة وبلشاً . قامه الاكر نحو ١٨٠ سم . بيتا الاثني لا يتجاوز ١٢٥ سم || جسمه كثيف الشعر القصير . انفه اقلس الشكل . اذناه صغيرتان . عتقه بالغ القصر || موطنه الاسرارح الافريقية الواقعة بين الدرجة الثانية من خط العرض الشمالي والدرجة الخامسة من خط العرض الجنوبي || يعيش جماعات قليلة العدد . يالفت البابات الكثيفة الانجارح التي يتسلقها بفتح قوته الثار حل اختلاف انواعها .



غورة فيرجينية



غورل

### ٢٠٢٠٣ - غُوريت \*

Gorytes (S). Goryte (F).

جنس حشرات قانصة مقرعة من عشائيات الانجنته الحمويات وفصيلة الفينوسيات . انواعها المرقوة نحو ٣٠ متشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شبيهة بالنسوج اونها الى السرة السوداء الجمعة بالاصفر || جميعها جاسة تقم خشاوتها في التربة .

### ٢٠٢٠٤ - غُوش ، غُوشيرة الهند

Sorbus indica (S). Sorbier des Indes (F). Indian service tree (E).

نوع من الفيرار . منبتها الطوسي يمتد من الهند الى ايران . ثمرها تملو نحو عشرة امتار . خشها صلب ، فاخر الصنف ، تمل منه آلات الطرب .

### ٢٠٢٠٥ - غُوشَار \*

Steatornis caripensis (S). Guacharo de Caripe (F).

مائل وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغشاريات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى . يالفت الحيا الجامة . سره يمد من ١٠٠ الى ٥٠٠ زوج . يسرح في الليل ويبيت في النبار في الكهوف والمغاور || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٥ سم . ثوبه الى الشفعة البنية تيق الطهر وتختف في الصدر والبطن وتلمو بقشة بياض وسود متبانية الاشكال تمتلئ كامل الثوب . حلقه عيه الى



غوريت



غوشار

### ٢٠١٩٥ - غُودَن \*

Goodenia (S). Goudénie (F). Goodenia (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومصرة من فصيلة الفودنيات . انواعها المرقوة نحو ٧٠ بعدها استرالية || جميعها عشبية . المصرة منها عشبية الساق . اوراقها متعاقبة ، مستطيلة . معظم انواعها علقية .

### ٢٠١٩٦ - غُودَنِيَات \*

Goodeniaceae (S). Goodeniaceae (F). Goodeniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين متحدة القناتل منخفضة المبيض . اجناسها المرقوة ١١ اما انواعها فاكتر من ٣٠٠ اصلاتها بعض الاصقاع الحارة الاسوية والامريكية والاسترالية || نباتاتها عشبية حولية وبحولة ومصرة . اوراقها متعاقبة ، بسيطة ، ازهارها متدغة الراسات . ثمرجاتها لعينة ، مزدوجة ، خماسية الاجزاء . مقلتها جازلة . مبيضا ثنائي الخدر ، عديد البويضات . اقلام السيات فريدة ، يتكون تحت ميسمها الثنائي الفص تزايد بلوطي الشكل يطوق اطراف من الزغب الحليي التركيب والشكل || اشهر اجناسها الفودن .

### ٢٠١٩٧ - غُور \* ، جُور

Bibos gaurus (S). Gaur, Bouf gaur (F). Gaur, Indian bison (E).

نوع من ابغار الرشح ، موطنه يمتد من بورما الى شبه جزيرة ملقة . يعيش في الاجرارح الدفلة الكثيرة العشب . طوله يراوح بين ٣٠٠ و ٣٢٠ سم . وارتفاعه من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبه الى السرة المابقة . قوامه بياض . حاروكه مستطيل دقيق بارز . اجله لا يقاسي العدد يراوح من ٥ افراد الى ٢٥ فرداً .

### ٢٠١٩٨ - غُورامي \*

Osphronemus olfax (S). Osphronème de la Sonde, Gourami (F).

غورامي هو الاسم الملايزي . سمكة متعقبة من شاكيات الزعانف البلمويات البنية وفصيلة الحساكيات . اصلاتها المتلفع والبحيرات والاهوار الكثيرة في ماليزية وجاوا وصيترا || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٠٠ سم . رأسها شبه غروملي الشكل ، فيق الخط الصغير . وزعنفتها الظهوية كثيرة المناسخ ، مستطيلة الشكل ، تمتد الى الوار . وزعنفتها الحوريتان صغيرتان مجهزتان بحسكتين غضروفيتين يالفتا اللول . الشرجية مستطيلة ، شاكلة . اما الذيلية فبسيه مريية . ثوبها الى السرة الحمراء الذهبية المالح يملو في ظهرها تتجمع معترس اسود . بعلتها فضي اللون منقط بالاسمر || لحمها فاخر الصنف مرغوب فيه رغب كثرة الحساك .

### ٢٠١٩٩ - غُورَة \*

Gaura (S). Gaura, Gaure (F). Gaura (E).

جنس نباتات عشبية وحولية ، حولية وبحولة ومصرة ، فصيلة الاغديات . انواعها المرقوة نحو ٢٠ . جميعها امريكية المهد . معظمها بري وبعضها تربيي || سرقها منتسبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها دقيقة جالمة . اوراقها متعاقبة ؛ السفلى منها ريشية خرمه ، الوسطى اعليجية عرزة ، اما العليا فسنانية النصال المابقة الحصار . ازهارها مجموعة من الشاكل الطرية الازتكاز . ازهارها رباعية البتلات المتساوية . اسديتها ثلاثية او رباعية الازراج . مآبرها قرزية اللون . ثنوبرها غريفي || قرقب في الاتربة المتوسطة الاندماج وتختفي التشثيل ما



عُثَيَّة



عُثَيَّة مَرْحِيَّة (١)



عُثَيَّة مَطَالَة (٢)



عُثَيَّة مِجْدَة (٣)



غُرْلَان



غُرْلَانَا



غُرْلَانَة

القد ، طويلة الزغب ، زرقاء اللون أو بيضاء || يزور  
الزئير ، يتكاثر بالبذور والعقل . تكثر مثله في أذار  
ونيسان وتنتقل الشتول إلى مستقرها في أواخر أيار فتعرس  
بعد قوف رؤوس سوها . أما العقل فتعرس في آذار ونيسان .  
والقنلان يرغب في الأثرية الطينية الجصية المعرصة للشمس .  
وهو لا يتطلب عناية خاصة وجل ما يجب الانتباه إليه  
هو مكانة الارق عند ظهوره لانه يتخصن نسخ الأوراق  
ويؤذي النبات . يكافح باستعمال مركبات النيكوتين  
وغيرها من الحواشير القاتلة .

٢٠٢١٤ - غُرْلَان طَيَّاسِي Agnerum conyzoides (S).  
Agnerum fausse-conyze (F).

نوع من القنلان ، وهو عشبة زرقية حولية جادة .  
ساقها فروع ، هرمية الهيكل ، وقديمة الجذر . أوراقها  
بيضية التصل المسن الحافة . أزهارها صغيرة القد ، زرقاء  
اللون || أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين .

٢٠٢١٥ - غُرْلَان فِرْدَوَسِي Agnerum corymbosum, A. celestinum (S).  
Agnerum celestinum (F).

نوع من القنلان ، وهو عشبة سرورية زرقية تملو  
٨٠ سم . أوراقها معتقة . فصلها قلبي القاطعة ، بيضي  
الصفحة المائلة . أزهارها خلية البشرة ، زرقاء اللون .  
أزهارها يستمر من حزيران إلى الاخر تشرين .

٢٠٢١٦ - غُرْلَانَا ، وَيَغُون Lama vicugna (S).  
Vicogne (F). Vicuna (E).

غُرْلَانَا هو الاسم الشائع في بوليفيا والبيرو . نوع من  
اللاذلة ، حيوان لبون عاش من فصيلة الجمليات . موطنه  
جبال بوليفيا والبيرو من ارتفاع ٣٠٠٠ م . فصاعداً ||  
جسمها رقيق بطول نحو ٢٠٠ سم . ويرتفع نحو  
١٠٠ سم . وبرها فاخر الصنف ، غالي الشين || الاثن  
ثانية الاخلاص . يحملها يدوم نحو ١٧٠ يوماً .  
من القنلان يستعمل لدر الحليب ولنقل الاتقال .

٢٠٢١٧ - غُرْلَانَة \* Gunnera (S). Gunnere (F).

جنس نباتات عشبية دماغة معمرة عديدة الساق من فصيلة  
الغونيريات . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق  
الحارة . أوراقها قرصية الانتشاب ، معتقة ، كبيرة القد ،  
مقصصة ، قلبية القاطعة فصلها بطول من ٣٠٠ إلى ٣٠٠  
سم . أزهارها صغيرة القد ، سبيلة التجميع ترتكز على  
شراخ يعلو من ٦٠ إلى ٤٠٠ سم || جميع انواعه دماغة  
غريبة النسخ . جذورها وأوراقها مضادة للجفاف . تنموها  
صبغية . صباغها اسود اللون .

٢٠٢١٨ - غُرْلَانِيَّات Gunneraceae (S).  
Gunneracées (F). Gunneraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

٢٠٢١٩ - غِيَاب ، غِيَابِي Contumace (F).  
Contumacy, Default (E).

هي حالة الملكف بالمحسور أمام المحكمة وقد تختلف أما  
جهل أو عداً فاعتبر في حالة غياب رسمك عليه غيابياً .

٢٠٢٢٠ - غِيَابَات Pognophora (F).  
Pognophora (E).

الغياطات فئة حيوانات بحرية دودية الشكل كثيرة القوس .

الزرقاء السوداء . سباله كثيفة مستطيلة سوداء اللون .  
مفاد ذرب المقلم المحجن ، واسع الشدح الربح ، لونه  
الى الطلحة تملوها مابة حراء . ساقه الى السمة الزرقية  
المراج || طيرانه خفيف الحركة ، معتدل الشوط ، كثير  
التحليق || قوته الثار والبذور وبعض الحشرات الكبيرة ||  
عنه افعوس يذره اينا كان بين تخاليف حضور الكهوف  
والقارور . الاثن تنصح من يبيضن الى اربع ببيضات  
تحضنها بمناوية الذكر نحو ١٨ يوماً .

٢٠٢٠٦ - غُرْلَانِيَّات (S).  
Stéatornithidés (F). Steatornithidae (E).

فصيلة طير من الجوان مشقوقات المناقير . اجناسها وانواعها  
المروقة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكة الوسطى ||  
طيرها كبيرة القد تتميز بتأقيدها الفضية الشبه مشورية  
الشكل ، وباجنيتها المسطلة || مسرحها دجوي يستمر  
من الغروب الى الشجر . قوتها الثار والبذور || اعرف  
انواعها واشهرها الفشار .

٢٠٢٠٧ - غُرْلَانَا \* Amblypyge, Phryne (F).

جنس عنكب واحة من الزوفيات . تتميز بخلوها من  
مؤخر الجوف ويطنها المركبة من ١١ سكة . اجسامها  
صغيرة ، مطيلة ، عادمة الهديّة ، تطول نحو ٤٥ م . ||  
موطنها يشمل معظم اقطار البلاد الحارة .

٢٠٢٠٨ - غُرْلَانَة \* Helvela phalloides, Morchella esculenta (S). Hel-

velle, Morille, M. de moine (F). Morell, Bishop's  
mitra mushroom (E). Speisemorchel (D). Spugnola (I).  
جنس فطور مأكولة من فصيلة الحشاريات ورتبة الزقيات .  
انواعه عديدة : بعضها صالحة للأكل لكنها تختلف حسن  
بعضها بمجدة الطعم ومقدار الحجم .

٢٠٢٠٩ - غُرْلَان Benthos (F). Benthos (E).

غُرْلَان اسم يطلق على الاعماق البحرية المختلفة  
الابداد وعلى الكائنات الحية الثابتة والمتحركة التي تعيش  
في هذا المحيط . فن الكائنات الثابتة تذكر الخليات  
والاسفنجيات والشوكيات والعلمليات ... ومن الكائنات  
المتحركة نخص بالذكر البديدان والمُشْرِطَات والصفيحيات  
الحياشيم والمديات والنجوميات ...

٢٠٢١٠ - غُرْلَانِيَّات Benthique (F). Benthic (E).

نعت تعريفي يطلق على الاعماق البحرية وعلى الكائنات  
الحية التي تعيش وتتكاثر في هذا المحيط .

٢٠٢١١ - غُرْلَانَا هو البليط الخريفي .

٢٠٢١٢ - غُرْلَان هو النورل ، اطلها .

٢٠٢١٣ - غُرْلَان \* ، أُجِيرَانُوم ، قَتِيَّة

Ageratum (S). Agérate, Agératum, Célestine (F).  
Goat weed, Bastard agrimony, Floss flower (E).  
Leberbalsam (D). Agerato, Celestina (I).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من سبط الغنفيات  
وفصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها بري . سوها  
فروع . أوراقها السفلى والوسطى متقابلة اما العليا فتناقية .  
أزهارها شكلية التجميع ، هامي الارتكاز ، طويل الامة  
يدوم من اول الصيف الى اواخر الخريف . أزهارها صغيرة





غيل باهت

زبانها مشطيان قصيران . جوشها مستطال المؤخر . بطنها اسطواني الشكل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في البهار . تماثل بعد ظهورها بمدة وميزة فراوح من يمين الى اربعة ايام . تمتع طول الحول مباحداً على سوق النبات وفرويه || السرعة تقابل نحو ١٢ سم . جسمها اسطواني الشكل ، اسمر اللون يعلو تنقيط اسود ورشفة صفراء . رأسها كسني اللون . رواجبها الصدرية شريطية . رواجبها البطنية شديدة القصر عجمية الاطراف . تلحف بطنها باغشية غروية للمادة تأخذ شكل القرباب لتلتصق بها فئات الصالح والارواق والقشور . طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً ينتهي ضمن قرباب السرعة . الذكر يترك القرباب ويطير اما الانثى المرأة فلا تخرج القرباب الا عند التماثل ولا تمود اليه .

#### ٢٠٢٢٩ - عَيْدَة انبِيَاء \* Psychidae (S).

Psychidae (F). Psychidae (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في معظم اسواق العالم . تسرح في البهار . طليانها خفيف الحركة ، كثير البرقعة والحرم || اجسامها صغيرة ، ضيقة . ذكورها بجنية اناثها معار . عينها جرداء . قرونها الاستعمارية مشطية مزدوجة . ملابسها شديدة القصر . مراشها افروسة . حذائنها غير موجودة . بطنها كثيفة الخمل . ورأسها صغيرة ، مستديرة الاطراف ، قليلة الحراشف البهيرة ، سوية الاالوان . جرابها تامة النمو ، غلظايتها الخلفية ثنائية التماثل أو رابعيتها || اساريها عراطة انما يلحف بطنها اغشية غرائية للمادة تخرج منها فئات الصالح والارواق وكل ما يلتصق بها || عاداتها طليقة تتحور ضمن غلاف السرعة || اشهر اجناتها العبدانة والكنتورة .



عبدانة سوية اللون

#### ٢٠٢٣٠ - عَيْدَة المتوسط \* Gadus mediterraneus (S). Gade méditerranéen (F).

Mediterranean gadefish (E). سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغاديات رتبة المسلمات . أعطانها معظم اقالم البحر الايضي المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك البنية . لا تقترب من الشطوط والمجادح الا في زين التسفرة . ملجئها الحياتي كرسوسي . اسرابها وافرة العدد || جسمها اهليلجي الشكل ، متدل التبطيط يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم . حراشها صغيرة رقيقة . ثوبها الى الرتبة الرصاصية الضفيرة المواج تبقي في الظهور وتغير وتبيض في البطن . زعانفها الى اخضار البحري . غلظها الجانبي جالس الابتعاد الانثى || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخمل . فكها الاعلى يحمل في مقدمه عذبتان دقيقتان . والفك الاسفل يحمل عذبة واحدة عينها كبيرتان بارزتان ، ارجوانيتان . زعنفتا الظهرية واحدة ، مستطيلة ، رقيقة المقدم || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

#### ٢٠٢٣١ - عَيْدَة كفة Libéralité (F). Libéralité (E).

الثديقة العطاء بسخاء وبصيرة .

#### ٢٠٢٣٢ - عَيْدَة كة Parthénogenèse (F).

Parthenogenesis (E). الفيدلة وتدعى ولادة العذارى ، منفع تناسل تقوم به بعض عذارى الحشرات والثدييات الدنيا في زين معين من حياتها اذ ان بويضاتها تتحور وتقتف ك لو انها كانت



غيدس المتوسط

#### ٢٠٢٢١ - عَيْدَة كة هو غشب القديمين ، اطبله .

#### ٢٠٢٢٢ - عَيْدَة تخفري هو عود الانبياء ، اطبله .

#### ٢٠٢٢٣ - عَيْدَة تان Scarus stellatus (S).

Scare étoilé (F). سمكة بحرية من بنات مصفار يقال ان لحمها يؤذي في بعض فصول السنة وذلك عندما ترى زيمات المرجان . وهي من اسماك المتوسط والخليج .

#### ٢٠٢٢٤ - عَيْدَة باهت \* Polyplaca diluta, Asphalia diluta (S).

Asphalie délayée (F). Polyplaca dilute (E). حشرة من فصيلة الشروقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والافراد واروبه . فراشها جاسرة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الشتيان || جسمها صغير تنقيص يطول نحو ١٢ سم . بطنها نحو ٢٣ سم . رأسها اسمر . عينها كبيرتان . زبانها عظيمتان مستطيلتان . جوشها وبطنها الى الطحلة الخطيئة المواج || ورشها الامانيات الى الطحلة الخطيئة ثلثوها جذتان مترعزتان بينتان وخسة خطوط متعرجة خطية . ورشها الخلفيان الى الطحلة التبرء البيضاء المواج . اهدابها الى الصبهة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب . تسرح من القرب الى فحة الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتج الممكن مباحداً تحت القشور اوبين شقوق اللحاء || السرعة تقابل من ٢٤ الى ٢٧ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطال الرأس والسكة الصدرية الاول . ثوبها الى الطحلة السوداء يملؤها غداً ليجي قالب اسود وخسة خطوط جانبية ، نجيلية ، معززة ، صفراء اللون . رأسها بيضي الشكل ، كسني اللون ، مدهس . رواجبها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن صلجة تحبكه السرعة بين شقوق اللحاء .

#### ٢٠٢٢٥ - عَيْدَة Pluie abondante (F).

Abundant rain (E). النيث : المطر الجود الكثير .

#### ٢٠٢٢٦ - عَيْدَة تخفري \* Orbicole (F). Orbiculaire (E).

نعت ترميضي يطلق على ما هو موجود في جميع اقطار العالم .

#### ٢٠٢٢٧ - عَيْدَة كافي

هو ولد القصب وهو اكبر من الحسل .

#### ٢٠٢٢٨ - عَيْدَة كة سوية اللون \* Psyche unicolor (S). Psyche unicolore (F).

Psyche unicolor (E). حشرة من فصيلة العبدانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها عجمية تعيش على مخزونها الاملائي . حرقها خاضلة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية والمحولة || ذكورها بجنية اناثها معار . جسم الذكر صغير تنقيص يطول نحو ٦ سم . بطنها نحو ١٩ سم . رأسه الى الخمل الاسمر . عينها صغيرتان . زبانه مشطيان مزدوجان . جوشه وبطنه الى الخمل الاسمر المواج . وراشته خطيئة اللون ، صمراء المواج || الانثى معززة تقابل نحو ٩ سم . ثوبها الى الخمل تملوء ورشفة سوداء . رأسها صغير الجرم . عينها صغيرتان .

Glaucomyidae (S). ٢٠٢٤٧ - غَيْشَرِيَّاتٌ ٥

Glaucomyidés (S). Glaucomyidae (E).

فصيلة حيوانات مائية بحرية ونهرية من الرغويات صفيحية الخياشيم. انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ يجمعها جنس واحد || أعطائها مصبات أنهر الخند والصين واليزيا. تعيش منعقة في الاسمال والريال. اجسامها صغيرة. اصداؤها ثنائية المصارع ، شبه اهلبيجية الشكل ، عابقة الالوان التي يكثر فيها الاخضر المتفاوت الماجات || جنسها الوحيد يدعى الغيشر .

٢٠٢٤٨ - غَيْشُص ، نَقْصُ الْقِيَمَةِ

Moins-value (F). Inferior value (E).

هو انخفاض قيمة الشيء بين زمتين .

Tare (F). Waste, Damage (E). ٢٠٢٤٩ - غَيْشُص

غيفض اللواجن من خيل ويقر وغيرها كثيرة اهمها ما يمتري قوائم الخيل وسببه تمدد الغشاء الآسي في المفاصل . وهي عل نوعين :

Tares molles (F). Soft wastes (E). ٢٠٢٥٠ - غَيْشُص الْحَوْشَبِ

غيفض راحفة تحصل من تمدد الغشاء الآسي في المفاصل . منها غيفض الحوشب والعروقوب .

Tares dures (F). Harsh wastes (E). ٢٠٢٥١ - غَيْشُص الرُكْبَةِ

تزيدات او انتشارات تعود لذات السبب . منها الجرد والدخش والعرن والمشش .

Molette (F). ٢٠٢٥٢ - غَيْشُص الرُكْبَةِ

Wind-gall (E). انتفاخ رخو مفصلي او وري سببه الاجهاد .

Vessign of the genu (F). ٢٠٢٥٣ - غَيْشُص الرُكْبَةِ

Vessignon of the knee (E). ورم رخو مفصلي او وري يحصل في بعض اتجاه الركبة .

Vessign of the jarret (F). ٢٠٢٥٤ - غَيْشُص الرُكْبَةِ

Vessignon of the hough (E). ورم رخو مفصلي او وري يحصل في بعض اتجاه العروقوب .

Eponge (F). Heel (E). ٢٠٢٥٥ - غَيْشُص المِرْقِ

هو انتفاخ رأس المرق عند الخيل .

٢٠٢٥٦ - غَيْشُصَة

غاية تكثر فيها الرطوبة او جداول الماء .

٢٠٢٥٧ - غَيْطُط

هو الخغل ، الحلبه .

٢٠٢٥٨ - غَيْطَل

اطلب هرقية ناعمة .

٢٠٢٥٩ - غَيْطَلَة

الغيطلة : البقرة الوحشية . وقيل البقرة مطلقاً تدعى غيطلة في زمن الدر . ج غيطاطل .

Bande d'oiseaux (F). ٢٠٢٦٠ - غَيْشُص

Flight, Flock (E). الغيف جماعة الطير . والرف كذلك والسرب ايضاً .

Fourré (F). Thick (E). ٢٠٢٦١ - غَيْشُص

شكل من اشكال المراج .

Coléoptile (F). Coleoptile (E). ٢٠٢٦٢ - غَيْلَف

غند زبارة بعض بلور الاعشاب .

مزكوبة || من هذه الحشرات والدويبات نخس بالذكر الدورات والاريقات وبرايث الماء والآبرات والصدفيات .

٢٠٢٢٣ - غَيْرُ جَائِزٍ

Illicite (F). ما لا يبيحه القانون .

Illicit, Unlawful (E).

٢٠٢٢٤ - غَيْرُ شَرْعِيٍّ

Illegitime (F). ما كانت حالته غير شرعية .

Illegitimate (E).

٢٠٢٢٥ - غَيْرُ قَابِلٍ لِلْإِنْقِطَالِ

Main mortable (F). Mort main (E).

هي حالة الاموال الموقوفة التي لا تباع ولا توهب ولا يمكن انتقالها الى الورثة .

٢٠٢٢٦ - غَيْرُ مُتَحَوِّلٍ

Inconverti (F). Unconverted (E).

٢٠٢٢٧ - غَيْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْأَوْرَاقِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ الْأَوْرَاقِ

Anisophylle (F). Anisophyllous (E).

٢٠٢٢٨ - غَيْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْبَتَلَاتِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ الْبَتَلَاتِ

Anisopétale (F). Anisopetalous (E).

٢٠٢٢٩ - غَيْرُ مُتَشَابِهٍ الْأَجْزَاءِ ، لَا مُتَشَابِهٍ الْأَجْزَاءِ

Anisomère (F). Anisomeric (E).

٢٠٢٣٠ - غَيْرُ مُتَنَاسِقٍ

Anisométrique (F). Anisometric (E).

٢٠٢٣١ - غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ

Indéfini (F). Indefinite (E).

٢٠٢٣٢ - غَيْرُ مُسْتَعَيِّنٍ ، غَيْرُ وَاجِبٍ

Indu (F). Undue (E).

هو دفع مبلغ لا يقابله التزام وقد يحول القانون حق استرداده .

٢٠٢٣٣ - غَيْرُ مُقَدَّرٍ

Indéterminé (F). Indeterminate (E).

٢٠٢٣٤ - غَيْرُ مُنْهَضَمٍ ، طَالَعٍ

Indigeste (F). Undigested (E).

٢٠٢٣٥ - غَيْشَتَكَة ٥

Abræus globus (S). Abrée sphérique (F).

حشرة وانجة من مفدمات الاجنحة ، دبوسيات القرون ، خماشيات الاجزاء . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا || جسمها صغير القد ، نصف كروي الشكل ، جويي اللون ، اسفح المراج . قرونها الاستعمارية خماشية الفصل ، دبوسية الأطراف || قوتها كل ما استطاعت قنصه من الدويبات الصغيرة والديدان .

٢٠٢٣٦ - غَيْشَر ٥

Glaucomya (S). Glaucomye (F). Glaucomya (E).

غيفشر هو الاسم الهندى . جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحية الخياشيم لفصيلة الغيفشرييات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ موطنها اخوار الانهر الهندية والصينية والماليزية .. تعيش منعقة في الاسمال . جميعها صغيرة القد ، تافهة اللعوم اللاسكولة .



غيشة

٢٠٢٦٧ - غَيْثُومِيَّةُ الشَّاي \*  
Guignardia theae (S). Brown blight (E).

فطر مجهري يركب أوراق الشاي فيؤذيها ، مظهره الخاربي يقع خطية اللون يابسة المحور الاطمل . وهي سريعة الانتشار والاذى فيا لو ساعدتها العوامل الجوية || لم تكافح حتى الآن خوفاً على اوراق الشاي من المواد المعدنية .



غَيْثُومِيَّةُ الشَّاي

٢٠٢٦٨ - غَيْثُومِيَّةُ الْعَرِيشِ \*  
Guignardia baccae, Physalospora baccae, P. reniformis, Phoma flaccida, Ph. reniformis, Ph. Cookel, Macrophoma flaccida (S). Excoriose de la vigne (F).

فطر مجهري واسع الانتشار يركب الجفنة والمتعدد . مظهره الخاربي يقع صغيرة بيضيه الشكل خطية اللون تنتشر على قشور الجفنة وعلى العنب قرب ادراكه تسبب احمرار البشرة ثم ييبسها || يكافح باستعمال اسد الفوطاير النعالة على رشتين او ثلاث رشات قبل حصرمة العنب .



غَيْثُومِيَّةُ الْعَرِيشِ

٢٠٢٦٩ - غَيْثُومِيَّةُ يَدُولُو \* ، بلاك روت الكرمية ، عَقْنُ اسود  
Guignardia bidwellii, Sphaeria bidwellii, Physalospora bidwellii, Laetstada bidwellii, Phoma uvicola, Phyllosticta labrusae, P. ampelopsidis, Naemospora ampelicida (S). Black-rot de la vigne, Pourriture noire de la vigne (F). Black-rot of grape (E).

فطر مجهري يصيب اوراق الكرمة وساقها فيؤذيها ويعيقها || مظهره الخاربي بقعة او يقع جزوية اللون خطية الموجع شبه مستديرة الشكل تملو نصل الاوراق السفلى ثم تمتد الى ما فوقها وتركب العناقيد قرب حصرمتها فتسقطها وتذويها || تتكاثر في ظروف طبيعية معينة تمضداه العوامل الجوية الملائمة || تكافح مثل الميليديو باستعمال ذات الفوطاير .



غَيْثُومِيَّةُ يَدُولُو

٢٠٢٧٠ - غَيْثُومِيَّةُ غَيْثُومِيَّةُ \*  
Cnemidophorus (S). Cnemidophore (F). Cnemidophorus (E).

جنس حيوانات زحافة من العظاء وفصيلة التيدييات . افواحه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق الجنوب الشرقي من امريكا الشمالية || تألف البراري والقيمان . تتميز بسرعة الحركة والانتقال . قوتها الحشرات والديدان الطواها وحيدة الالوان السوية . تكثر فيها الريدية السمراء والسمرة .



غَيْثُومِيَّةُ

## Tortue (mâle) (F).

## Turtle (male) (E).

البنيلم : ذكر السلاحف ويدعى الابيس والديلم ، ويقال لهاها البليل .

## Nuage (F). Cloud (E).

## غَيْثُومِيَّةُ ، غَيْثُومِيَّةُ

الغيم او السحاب بخار ماء علا في الجو ويتكاثف . ويكون عادة نتيجة التيارات الهوائية الصاعدة من الارض الى طبقات السكاك . وتعتبر الغيوم من عوامل المناخ الهامة لانها مصدر الامطار والتلوج وسبب الضغط وانخفاض الحرارة || والغيم عديدة الاشكال ولكل منها اسم يميز خاص يدل على نوعها ومتوسط ارتفاعها التقريبي عن سطح الارض . اعرفها واشهرها ما يلي :

## Nimbus

## Cumulo-nimbus

## Stratus

## Cirro-stratus

## Cumulus

## Cirrus

## Cirro-cumulus

## Nuage artificiel (F).

## Artificial cloud (E).

دخان كثيف يحصل من حرق بعض المواد المعدنية وغيرها يستعمل لمنع جله الربيع عن بعض النباتات ، اغصنها الاشجار المثمرة .

## ٢٠٢٦٤ - غَيْثُومِيَّةُ

النبات : الشجرة الخضراء الورق اللطيفة الاغصان .

## ٢٠٢٦٥ - غَيْثُومِيَّةُ

النبات هي الاجبة .

## ٢٠٢٦٦ - غَيْثُومِيَّةُ

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشوفيات تتميز باصباحها البسيطة المستديرة التي تفرز في نسج النبات النحار . تكاثرها عديمة النكات ، بوضها شفاف وحيد الخلية || انواعها الاقتصادية الزراعية ثلاثة وهي .

## Guignardia (S).



ف

prunier, Tordeuse verte du prunier (F).  
Argyropluce pruniana (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الفانلات حرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها عجيقة . سرقها خاضلة تركب اوراق الخوخ والزعرور فتفتلها وتميش عليها || جسمها صغير اللد يطول من ٦ الى ٧ م . بسطها تراوح من ١٢ الى ١٦ م . رأسها معتدل الجرم اسمر اللون . عينها زيتان صغيرتان . زبابها خيطيان . ملابسها قصيرة . مرشها جذعة . جوشها ويطلها الى الكهبة السراء الموج || روشاها الامايان الى الثبرية يعلوها تبقيج وتوشم اسمر . روشاها الخلفيان الى الريدة السراء . اهداها فسية || الاثنى اميز قدأ من الذكر واغلف بطناً منه واطول روشاً || لها جيل واحد في الحول . تسرح من الغروب الى فحة الليل ومن القجر الى الشرق || الاثنى تلقى المكن ميحادي على الصفحات العليا من نصال الاوراق . الطور البري يستمر نحو عشرة اسابيع ويتقضي على اوراق الاجنار التي تقتلها السرعة وتميش من غصينها وخلاياها . والسرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٦ م . جسمها مستدق المقدم والمؤخر ، اخضر اللون ، زيتي الموج . يعلو ثلاثة صفوف قاطبة من الثعلل السمر المتوجة بقلب دقيق || رأسها ودونها الصدرية الى السرة القامة . وراجبها الى الخفسار الاطلل || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً ينقضي ضمن صلبة تنسجها السرعة بين شقوق اللحاء او تحت القشور الصلبة .

\* ٢٠٢٧٧ - قاتلة الدراقين الشرقيّة

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse orientale du pêcher (F). Oriental fruit-moth (E). Pfirsichtriebbohrer (D).

حشرة من الفانلات . فراشها صغيرة اللد ، بسطها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . روشاها الامايان الى الكهبة يعلوها

Tortricidae (S).

Tortricidés (F). Tortricidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها وانواعها تمتد نحو ٤٥٠٠ جميعها صغيرة اللد . رواشها عريضة ، قائمة الزوايا الخارجية . قرونها الاستشعارية خيطية الشكل . اخطامها ظاهرة : عويناتها بارزة . اثوابها متراكبة الالوان المزركشة || رقاتها قازنة قازنة تقضم البراعم والاوراق والافنان وتقترض السوق والثمار والحبوب .

\* ٢٠٢٧٣ - قاتلة الأبيسة

Evetria hercyniana (S). Tordeuse de l'épicéa (F).

حشرة من الفانلات . رواشها صغيرة اللد حطامه اللون بسطها تراوح بين ١٥ و ١٢ م . رواشها مهدبة الختار ، غبراء اللون ، مبقجة بالاسمر || رقاتها دقيقة الجسم ، حنطية اللون ، تركب بناتق الابيسة تنقضي عليها بمد ان تغلفها بخيوطها الحريرية .

\* ٢٠٢٧٤ - قاتلة الأشجار الحرجية

Cacaecia podana (S). Tordeuse des arbres forestiers (F).

حشرة من الفانلات . فراشها صغيرة اللد حنطية اللون . رواشها مبقجة بالاسمر || رقاتها تركب مختلف الاجنار الحرجية وقد لا تعف عن بعض الاجنار المثمرة فتفتل الاوراق وتفسحها وتقترض البراعم والافنان النامية .

\* ٢٠٢٧٥ - قاتلة الجتنان

Tordeuse des vergers (F).

فراشة صغيرة تدعى بيرونة ملوانة ، اطلها .

\* ٢٠٢٧٦ - قاتلة الخوخ المخفساء

Argyropluce pruniana (S). Argyropluce du



قاتلة الاشجار الحرجية



قاتلة الخوخ المخفساء



قاتلة الدراق الشرقية



فأثلة السرو



فأثلة السنايل



فأثلة السنديان



فأثلة العنب



فأثلة القرغل



فأثلة الكرم (البقرة)



فأثلة الورد



فأثلة الورديات



فأثلة خضره

تركب نواحي القرغل ففتلها وتقضمها وقد لا تدف عن الورد والياباب وغيرها .

#### ٢٠٢٨٣ - فأثلة الكرمة \* ، يبرال الكرمة \*

*Sparganothis pilleriana*, *Tortrix pilleriana*, *Aenoph-thira pilleriana*, *Aenactra pilleriana* (S). *Tordeuse de la vigne*, *Pyrale de la vigne* (F). *Sparganothis pilleriana* (E). *Springwurm*, *Springwurmwickler*, *Laubwurm* (D).

حشرة من الفاتلات . فراشتها حطية اللون سمراء الرأس . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها الاماميان الى الصفرة تملوها زركشة حراء . ورشها الخلفيان الى الصفرة المذبة المواج || ورقها سود الروس ، خضر الظهور ، صفر الجوانب المتقطعة بالابيض مدنها اغبر اللون . ارجلها سمر || تركب برام الكرمه واروقها تفتل البرام وتقتل الاوراق وتقضمها . وقد تركب بعض النباتات الاخرى كالزمن والورد والوجع والشيك . لكنها لا تؤذيها اذهاها للكرمة .

#### ٢٠٢٨٤ - فأثلة الورد \* ،

*Tortrix bergmanniana* (S). *Tordeuse du rosier* (F). *Bergmann moth* (E).

حشرة من الفاتلات . فراشتها حطية اللون ، بسطها تراوح بين ١٢ و ١٥ م . ورشها الى الحفرة يملوها بتجميع اصفر || ورقها خضره اللون تركب الورد ففتل الاوراق وتقطعها مع المروق وتقضم البرام والنواحي .

#### ٢٠٢٨٥ - فأثلة الورديات \* ،

*Cacaecia rosana* (S). *Tordeuse des rosacées*, *T. du poirier et du pommier* (F). *Rose twist moth* (E). *Heckenwickler* (D).

حشرة من الفاتلات فراشتها سمراء الجسم بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها حطية اللون ، الامامية منها مجعدة بثلاثة خطوط حر معمره || ورقها الى السمرة الخضراء المواج . وهي تقتل اوراق معظم اشجار الفصيلة الوردية اخضها التفاح والاجاص والسفرجل والموخ والمشمش والورد ، فتعطب بشرة الاوراق ويخايلها وقد تفتك بالبرام وبالشرا الفتية .

#### ٢٠٢٨٦ - فأثلة خضره \*

*Argyroprople variegans*, *Olethreutes variegans* (S). *Tordeuse verte des arbres fruitiers* (F). *Bud moth* (E). *Grauer Knospenwickler* (D).

حشرة من الفاتلات فراشتها حطية اللون ، بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها الاماميان الى الصفرة المذبة بالازرق . ورشها الخلفيان الى الوردية . اطرافها مهدبة فضية || ورقها خضره اللون تركب الانجار الشمرة اخضها التفاح ففتل الاوراق الفتية وتقضي عليها .

#### ٢٠٢٨٧ - فأثلة \* ،

*Hemerocallis* (S). *Hémérocalle* (F). *Yellow day-lily* (E). *Helle Taglilie* (D). *Giglio dorato*, *Bellezza di un giorno* (I).

جنس نباتات عشبية جمنومير من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرصية الانتشاب ، ثنائية الصف ، متعابلة . نصلها ضيق الصفحة مستطيلة || انوعاها هامة كبيرة القد تركت على شراخ قوي نشيط || انوعاها عديدة جميعا تريبتة سريوية ترعب في الاثر المتدلة الاندماج النزيرة المادة الدبالية || اشهرها ما يتبع .

تبيض ابيض . ورشها الخلفيان الى الوردية || لها جيلان في السنة . ورقها صغيرة نحيلة تركب الدراق وتؤذيها على الشكل التالي : ينمصر ضرر ورقات الجبل الاول يقرض ولم البرام والاقتان النامية . اما الضرر الناجم من ورقات الجبل الثاني فينمصر بقرض الار وسطها .

#### ٢٠٢٨٨ - فأثلة السرو \* ،

*Evtria buollana* (S). *Tordeuse des pouses du sapin* (F). *European pine shoot moth* (E). *Kiefertriebwickler* (D).

حشرة من الفاتلات فراشتها صغيرة القد بسطها تراوح بين ١٧ و ٢٠ م . ورشها الى الحفرة المبيجة والمذبة بالفضي ، اهداب اطرافها الخارجية كيفية التجميع غبراء اللون . ورقها مستدقة ، نحيلة ، بذية الثوب تقرض نبات السرو والصنوبر تعيش في داخلها فتسبب تحجيبها وقد تقودها الى الياس .

#### ٢٠٢٩١ - فأثلة السنايل \* ،

*Cnephasia pyrophagana* (S). *Tordeuse des épis* (F).

حشرة من الفاتلات . فراشتها صغيرة القد حطية الثوب . ورشها الى الصفرة يملوها توضح اخضر || ورقها خضره اللون مسدقة ، تاكل نحو ١٠ م . تركب سنايل القمح وتقتل على البر .

#### ٢٠٢٩٠ - فأثلة السنديان \* ،

*Tortrix viridana* (S). *Tordeuse du chène* (F). *Carnation tortrix* (E). *Grüner Eichenwickler* (D).

حشرة من الفاتلات بسطة فراشتها تراوح بين ١٥ و ٢٥ م . ورشها الاماميان الى الخضار القاتح الاصفر المواج ورشها الخلفيان الى الشبة البهراء || ورقها تركب البرام ثم الاوراق ففتلها وتلتهمها . يكثر وجودها من حزيران الى آب على السنديان والشرم والتبولا والمحوذ الجرجاج .

#### ٢٠٢٩١ - فأثلة العنب \* ، كوشيليس الكرمة

*Clysis ambigua*, *Cochylis ambigua* (S). *Cochylis de la vigne*, *Teigne de la grappe*, *Ver coquin* (F). *Grappe berry moths* (E). *Traubenwickler*, *Gosswurm*, *Henwurm*, *Sauerwurm* (D).

حشرة من الفاتلات بسطة فراشتها تراوح بين ١٤ و ١٦ م . ورشها مهدبة الخار . لون الامامية منها الى الوردية يملوها مواج اصفر وتجميع اسود . اما الخلفية فالروردية الفضية المواج || ورقها ذفينة ، تنقف حطية اللون ثم تتلون بعد كل اسلاخ الى ان تستقر على الاحمر الداكن || لها جيلان في السنة تركب في جيلها الاول انوعا الكرمة قبل ثابرها وبده . وتركب في جيلها الثاني حبوب العنب في غنفل ادوارها فتقرضها وتعضها .

#### ٢٠٢٩٢ - فأثلة القرغل \* ،

*Tortrix pronubana*, *Cacaecia pronubana* (S). *Tordeuse de l'aillet* (F). *Pink twist moth* (E).

حشرة من الفاتلات بسطة فراشتها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها غبراء اللون مهدبة الخار الخارجي . ورشها الاماميان مجذمان بالاسمر || مكها اخضر اللون شديد السمات تجتمع الاثني لطح مستطيلة على السورق والاوراق فينصف من ورقات ذفينة نحيلة نوحها الى الخضرة السمر .

## Phaeat ٢٠٢٩٧ - فَاَيْخَةُ ، نَيْسَرُ الْحَمَامَةِ

الفَاَيْخَةُ او نَيْسَرُ الْحَمَامَةِ نَجْمٌ نَيْسَرٌ مَزْجُوعٌ مِنْ كَوْكَبَةِ الْحَمَامَةِ .

## ٢٠٢٩٨ - فَاَيْخَةُ شَرْقِيَّةٌ

Zenaidinae orientalis (S). Mélépelle orientale (F).  
طَائِرٌ مِنَ الْفَاَيْخَاتِ جَمِيلُ الشَّكْلِ حَسَنُ الْمَنْدَامِ وَالصَّوْتِ  
كَتَيْبَتُهُ سِتُّ الرُّوْمِ وَيَا كَرِيْم . مَوْطَنُهُ الْمَنْدُ وَالْعِرَاقُ وَسُورِيَّةُ  
وَالْأَنْصُولُ . طَوْلُهُ نَحْوُ ٢٣ سَم . ثَوْبُهُ مِتْرَاكِبُ الْاَلْوَانِ  
فِيهِ الْاَصْفَرُ وَالْخَضِرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْبَيْضُجِيُّ وَالْاَخْضَرُ  
وَالْاَحْمَرُ وَالْاَسَدُ وَهُوَ مَطْلُوقُ الْعَنْقِ ۥ قُوَّتُهُ الْحُبُوبَ عَلَى  
اِخْتِلَافِهَا . يَنْشُرُ فِي الْاَدْعَالِ الْقَلِيلَةَ الْاِرْتِفَاعِ اِنَّهُ تَبْيَضُ  
بِضْطَيْنِ مَرَّتَيْنِ او ثَلَاثَ مَرَاتٍ فِي السَّنَةِ .

## ٢٠٢٩٩ - فَاَيْخُورٌ

تَبْتُ طَيْبِ الرِّيحِ . قَالَ ابُو حَنِيْفَةَ : هُوَ الْمَرْوُ الْمَرِيضُ  
الْوَرَقُ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ جَامِسُجٌ وَبَسَطَهُ كَانَتْ  
اَذْنَابُ الثَّغَالِبِ عَلَيْهَا نُورٌ اَحْمَرُ طَيْبِ الرِّيحِ . وَقِيلَ هُوَ  
رِيحَانُ الشَّيْخِ ج . فَيَاغِيْرُ .

## Potier (F). Potter (E). ٢٠٣٠٠ - فَاَيْخُورِي

هُوَ مِنْ سِنِّ الطِّينِ وَحَمَلُهُ فَنَارًا ۥ .

## Chamois (F). ٢٠٣٠١ - قَادَرٌ

هُوَ الشَّوْجَاءُ جُ قَوَادِرُ . وَقِيلَ الْقَادِرُ مِنَ الْوَسِيلِ الَّذِي قَدْ  
أَسْنَى وَهُوَ بِمِزْلَةِ الْقَارِحِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَازِلِ مِنَ الْاَيْلِ وَالْبَقْرِ  
وَالنَّمْرِ .

## ٢٠٣٠٢ - قَادِمٌ هُوَ الشَّاقُولُ ج . فَوَلَدِمُ .

## Niveau (F). Level (E). ٢٠٣٠٣ - قَادَنٌ

هُوَ الرِّهَاءُ اَي مِيزَانُ الْاِسْتَوَاءِ .

## Aulacode (F). ٢٠٣٠٤ - قَارُ الْبُوصِ

هُوَ الْقَبَاعُ ، اَطْلَبُهُ .

## Golunda (F). ٢٠٣٠٥ - قَارُ التَّيْلِ

هُوَ الْفَلَنْدَةُ ، اَطْلَبُهَا .

## Putois fétide (F). ٢٠٣٠٦ - قَارُ الْخَيْلِ

يَعْرِفُ بِأَيِّنْ عَرِسٍ مَشْنُ ، اَطْلَبُهُ .

## Ichneumon ٢٠٣٠٧ - قَارُ الْفِرْعَوْنِ

هُوَ النَّمْسُ الْمَصْرِيُّ ، اَطْلَبُهُ .

## ٢٠٣٠٨ - قَارَكَةٌ ، قَارَةُ الْبُيُوتِ

Mus musculus (S). Souris commune, S. domestique, S. ordinaire (F). House mouse (E). Hausmaus (D).  
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرٍ الْقَدِّ . مَوْطَنُهُ الْعَالَمُ ۥ ضَرْبُهُ عَدِيدَةٌ  
يُؤَيِّدُهُ مِنْهَا فِي الصَّيْنِ وَحْدَهُ نَحْوُ ٣٠ ضَرْبًا ۥ جَسْمُهَا  
وَشَقِيْقٌ يَطْلُوقُ مِنْ ٨ اِلَى ١٠ سَم . وَذَنُّهَا كَذَلِكَ . ثَوْبُهَا  
الشَّالِجُ اِلَى الرِّبْدَةِ الرَّصَاصِيَةِ يَطْلُوعُهَا مَوَاجٌ اَصْفَرٌ . ظَهْرُهَا  
اَعْيَقٌ مِنْ بَطْنِهَا الَّذِي يَمِيلُ اِلَى الصَّفْرِ . اَذْنَابُهَا كَبِيرَتَانِ .  
حِرَاشَتُهَا ذَهَبِيَّةٌ تَبْلُغُ ١٨٠ وَاَطْلَافُ الْاُنثَى ١٠ ۥ تَأَلَّفُ  
الْبُيُوتَ وَتَمْتَدُّ عَلَى جَمِيعِ الْمَأْكَلِ وَالْحُبُوبِ .

## ٢٠٣٠٩ - قَارَةُ اَرَبِيَّةٌ ، سَقَطْمٌ

Mus arianus (S). Souris arienne (F). Arian mouse (E).  
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرَةٍ الْقَدِّ مَوْطَنُهَا اَسِيَّةُ الْوَسْطَى حَتَّى الْعِرَاقِ .  
ثَوْبُهَا اِلَى الصَّهْبَةِ السَّمَرَاءِ يَطْلُوعُهَا اِلَى الْبَاضِغِ الْاَفْرِجِ . طَوْلُهَا

## ٢٠٢٨٨ - فَاَيْةٌ بُرْتَقَالِيَّةٌ

Hemerocallis aurantaca (S). Hémérocallee orange (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاَيْةِ اَوْرَاقُهَا تَطْلُوقُ مِنْ ٢٠ اِلَى ٥٠ سَم . وَتَعْرِضُ  
مِنْ ١٢ اِلَى ١٦ سَم . نَصْلُهَا اخْضَرُ الْوَلْنِ عَلَى صَفْحَتَيْهِ ۥ  
شُرَافُهَا الزَّهْرِيُّ يَطْلُوعُ مِنْ ٤٠ اِلَى ٦٠ سَم . اَزْهَارُهَا تَطْلُوقُ  
نَحْوُ ٧ سَم . وَهِيَ بُرْتَقَالِيَّةُ الْوَلْنِ عَادَةُ الْعَرَفِ ۥ اَزْهَارُهَا  
يَسْتَمِرُّ مِنْ تَمُوزَ اِلَى اَيْلُولِ .

## Hemerocallis flava (S). ٢٠٢٨٩ - فَاَيْةٌ صَفْرَاءٌ

Hémérocallee jaune, Lis jaune (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاَيْةِ اَوْرَاقُهَا تَطْلُوقُ مِنْ ٤٠ اِلَى ٦٠ سَم . وَتَعْرِضُ  
مِنْ ١٥ اِلَى ٢٠ سَم . نَصْلُهَا جَمِيلُ الْخَضِرِ الزَّاهِي ۥ شُرَافُهَا  
يَطْلُوعُ مِنْ ٦٠ اِلَى ١٠٠ سَم . اَزْهَارُهَا تَطْلُوقُ مِنْ ٧ اِلَى ١٠  
سَم . وَهِيَ جَمِيلَةُ الصَّفَرِ الْكَبْرِئِيِّ ، فَوَاسَةُ الْعَرَفِ الْمُسْتَحْبِ .  
اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَانَ اِلَى تَمُوزَ .

## Hemerocallis fulva (S). ٢٠٢٩٠ - فَاَيْةٌ صَيَانِيَّةٌ

Hémérocallee fauve (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاَيْةِ اَوْرَاقُهَا تَطْلُوقُ مِنْ ٦٠ اِلَى ٨٠ سَم . وَتَعْرِضُ  
نَحْوُ ٣٠ سَم . نَصْلُهَا يَجْرِي الصَّفْعَةُ السُّفْلَى ، اخْضَرُ الْعُلَايَا .  
شُرَافُهَا يَطْلُوعُ مِنْ ١٠٠ اِلَى ١٢٠ سَم . اَزْهَارُهَا تَطْلُوقُ نَحْوُ  
١٠ سَم . وَهِيَ صَفْرَاءُ الْوَلْنِ ، صَيَانِيَّةُ الْمَوَاجِ ، عَادَةُ  
الْعَرَفِ ۥ اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ تَمُوزَ اِلَى اَبِ .

## ٢٠٢٩١ - فَاَيْةٌ صَيَانِيَّةٌ

Hemerocallis graminea, H. minor (S). Hémérocallee graminée (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاَيْةِ اَوْرَاقُهَا عَصْفِيَّةُ الشَّكْلِ تَطْلُوقُ مِنْ ٣٥ اِلَى  
٥٠ سَم . وَتَعْرِضُ مِنْ ٥ اِلَى ٨ سَم . نَصْلُهَا اِلَى الْخَضِرِ  
الْبَاهِتِ ۥ شُرَافُهَا يَطْلُوعُ مِنْ ٤٠ اِلَى ٥٠ سَم . اَزْهَارُهَا  
تَطْلُوقُ مِنْ ٦ اِلَى ١١ سَم . وَهِيَ ذَهَبِيَّةُ الْوَلْنِ فَوَاسَةُ الْعَرَفِ  
الْعُلَى ۥ اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ اَيَّارَ اِلَى حَزْرَانَ .

## Facture (F). ٢٠٢٩٢ - فَاَيْةٌ ، فَيْدَقَاقُ

Invoice (E).  
الْفَاَيْةُ اَو الْبَيَّانُ بِالْاَلْمَانِيَّةِ هِيَ وَثِيْقَةُ حَسَابِيَّةٍ مَسْرُودَةٍ  
فِيهَا بِالْفَتْصَلِ بَيَانُ الْمِيْعَاتِ اَوْ مَخْتَلَفِ الْاَشْيَاءِ مَعَ اَتْمَانِهَا .

## ٢٠٢٩٣ - فَاَيْجٌ

الْبَاقَةُ الْحَامِلَةُ اَوْ الْبَاقَةُ الْحَامِلَةُ السَّيْنَةِ .

## Phalus (S). Phaje (F). ٢٠٢٩٤ - فَاَيْجٌ ٥

نَوَاجِدُ نَبَاتَاتٍ مَعْمُورَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ السَّحْلِيَّاتِ . اَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ  
قَلِيلَةٌ ، مِمَّا هُوَ الْمَنْدُ وَلِيْلِيَّيَا . سَوْقُهَا سَرِجَةٌ مَتَمَتَّةٌ عَادَةُ  
الْوَرَقِ ، تَطْلُوعُ مِنْ ٨٠ اِلَى ١٢٠ سَم . تَنْتَهِي بِاَزْهَارٍ عَشَقَوِيَّةِ  
التَّجَمُّعِ ۥ اَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ قَطْرُهَا رَافُوحٌ بَيْنَ ١٢ وَ  
١٥ سَم . يَتَلَاوُحُهَا بَيْضُ الصَّفْعَةِ الْخَارَجِيَّةِ حُرٌّ الْبَادِعِيَّةِ  
الَّتِي يَطْلُوعُهَا زَاوِيْقٌ مَخْتَلِفَةٌ الْاَلْوَانِ رَافُوحٌ مِنَ الْاَفْرِجِ اِلَى  
الْاَصْفَرِ وَالْخَضِرِ . اَوْرَاقُهَا فَاَرْشَةٌ جَلِيَّةٌ الْاِتْتِشَابِ تَطْلُوقُ  
مِنْ ٦ اِلَى ٩٠ سَم .

## Fagine (F). Fagine (E). ٢٠٢٩٥ - فَاَيْجِيْنٌ ٥

مَادَةٌ دَهْنِيَّةٌ تَسْتَخْرَجُ بِالْتَقَطِيرِ مِنْ ثَمَارِ شَجَرِ الزَّانِ .

## Castoreum ٢٠٢٩٦ - فَاَيْحَشَةٌ

هِيَ الْمَجْدَبَسْتَرُ ، اَطْلَبُهُ .



فَاَيْةٌ



فَاَيْجٌ



فَاَيْةٌ



فَاَيْةٌ اَرَبِيَّةٌ



فأرة الأذغال



قاسيات البطح



قاسيات البوصير



قاسيات الشليم



قاسيات القطن



قاسيات الملقوف

٢٠٣٢٣ - **قاس** Hache (F), Axe (E).  
أداة حادة النصل يقطعون بها الأشجار والنباتات والحطب.

٢٠٣٢٤ - **قاس** Hédysaron (F).  
هو الينوسارون، اطلبه.

٢٠٣٢٥ - **قاسخ، قسطل، منق** Résolutoire (F), Cancelling, Abrogating (E).

٢٠٣٢٦ - **قاسري** Bryone (F).  
هي القاشرا، اطلبه.

٢٠٣٢٧ - **قاسي** Sécuriforme (F), Securiform (E).  
نعت تعريفي توصف به الاشياء التي تشبه القاس.

٢٠٣٢٨ - **قاسيات، قاسية** Pentatome, Punaise (F), Bug (E).  
جنس حشرات من فصيلة القاسيات. أنواعه عديدة تتميز بأجسامها المشطاة بمادة دهنية كراتية الرائحة. أنواعها مزعزعة ومزركشة. أضرارها ثلاثية الفعل. قرونها الاستشعارية خاصة الفواصل، جميعها مؤلفة من عصارة النباتات التي تتركبها || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٠٣٢٩ - **قاسيات البطح** Aspongopus viduatus niger (S), Punaise du pastèque (F).  
حشرة من القاسيات جسمها متوسط القد مفلطح الشكل يطول نحو ١٦ مم. ويعرض نحو ٦ نوها إلى الزرقاء السراة المولج. قواعد أعماها إلى الجؤة || تركب أوراق ونوامي البطح وسائر النباتات القرعية والأزهر.

٢٠٣٣٠ - **قاسيات البوصير** Carporcoris verbasci (S), Punaise des molènes (F).  
حشرة من القاسيات طولها براوح بين ١٢ و ١٤ مم. نوها إلى الحمرة الجؤوية تعلوها الزغارف والزراكن السود. أرجلها سود المفاصل حر السيقان || أعطانها قسيمة الإرجاء تركب البوصير وسائر نباتات الفصيلة الخنازيرية وبعض النباتات الصناعية ومنها التبغ الذي تمتص عصارة أطرافه النامية وأوراقه الفتية.

٢٠٣٣١ - **قاسيات الشليم** Aelia acuminata (S), Punaise du seigle (F).  
حشرة من القاسيات صغيرة القد مفلطحة الجسم طولها براوح من ٨ إلى ٩ مم. وعرضها ٥ مم. نوها خضري اللون أطراف المولج. ظهرها ثلاثي الخطوط القاطية الصفراء اللون. تركب الشليم وبعض النباتات البرية.

٢٠٣٣٢ - **قاسيات القطن** Nezara viridula (S), Nézara verte, Punaise du coton (F).  
حشرة من القاسيات جسمها مفلطح الشكل أخضر اللون يطول من ١٢ إلى ١٦ مم. ويعرض نحو ٦ مم || أعطانها قسيمة الإرجاء تشمل جميع البلاد الحارة والمعتدلة || تركب القطن والبقول وبعض النباتات الصناعية كالبنج. تمتص عصارة النوامي والأوراق الفتية.

٢٠٣٣٣ - **قاسيات الملقوف** Eurydema oleracea, Peutotoma oleracea (S), Peutotome du chou, Punaise du chou (F).  
حشرة من القاسيات صغيرة القد مفلطحة الجسم طولها براوح

نحو ١٠ سم. وذنبها ١٤ || تعيش في الحقول وقرب البيوت. قوتها جمع المواد العضوية والنباتية.

٢٠٣٣٠ - **فأرة الأذغال** Mus agrarius (S), Souris agraire (F), Agrarian mouse (E).  
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها الشرق الأوسط وأروبة. نوها إلى الصبغة الصفانية. ثنج ظهرها اسود. بطنها وخواتي جرانزها بيض. طولها نحو ١١ سم. وذنبها ٩ سم. أذناها مستدلتان. حراشف ذنبها تبلغ ١٢، أطراف الأني ٨ || تعيش باعات كثيرة العدد. تألف الأذغال وجوانب الحقول المزروعة. قوتها الجبوب أخصها الحنطة ثم المسائل والجنور والبصل والخشراش والديدان.

٢٠٣٣١ - **فأرة البحر** Rat de mer (F).  
هو الراسون، اطلبه.

٢٠٣٣٢ - **فأرة الحراغ** Mulot (F).  
هي النديمة، اطلبه.

٢٠٣٣٣ - **فأرة الحصاد** Souris des moissons (F).  
هي الزبانة، اطلبه.

٢٠٣٣٤ - **فأرة الصحرا** Souris du désert (F).  
هي الفصام، اطلبه.

٢٠٣٣٥ - **فأرة القيط** في حكر الحقل، اطلبه.

٢٠٣٣٦ - **فأرة عنب** Spalax.  
هي الخلد، اطلبه.

٢٠٣٣٧ - **قارذ** هو الثور وهو كل شيء متفرد. والشجرة القارذ هي للمتخية عن غيرها.

٢٠٣٣٨ - **قارص** Agé (F), Aged (E).  
هو السن من الحيوان. كقوك « أنها بقرة لا قارص ولا يكر » أي لا سنة لا فتية.

٢٠٣٣٩ - **قارطان** القارطان كركبان متباينان أمام سرير نبات نش.

٢٠٣٤٠ - **قاروط، عسبط** Gaule (F).  
مصاولة تشتمل لنفس ثمار الشجرة.

٢٠٣٤١ - **قاربات** Muridae (S).  
Muridés (F), Muridae (E).

فصيلة حيوانات لينة قارضة من مرتبة قرقدنيات الثورب ورتبة القوام. اجناسها ٨٦ وأنواعها ٧٢٠ أما عارباتها فثلاث الجرذيات والقناديات والكبريات. جميعها حيوانات صغيرة القد، مهدبة الزلقوم، مستطيلة الذنب || موطنها العالم. تسرح في الليل. تركس على الأرض، تعوم في الماء وتنتقل الانجراج. قوتها ما استطاعت إليه سبيلا من مختلف المواد النباتية والعضوية الحيوانية. نثارها لا يفيقه غضب. أناتها تقع في العام الواحد من ٢ إلى خمس مرات.

٢٠٣٤٢ - **قازر** نمل اسود فيه حمرة.

٢٠٣٤٠ - **فَاشِرَاءُ اِفْرِيقِيَّة** (F). *Bryone africalne*  
هي الخلدوس ، اطليه .

٢٠٣٤١ - **فَاشِرَاءُ بَيْضَاءُ، كَرْمَة بَيْضَاءُ، حَالِقِ الشَّعَر**  
*Bryonia alba* (S).

*Bryone blanche*, *B. monoïque* (F). *White bryony* (E). *Gemeine Zauurübe*, *Zauurübe* (D). *Brionia bianca*, *Fescera* (I).  
نوع من الفاشرا المباشرة تكثر في الاحراج المنعلة والمواقع الرطبة . ثمارها عنية بيضاء اللون . جذاميرها غليظة مستطيلة تستعمل في الطب يستخرج منها عصارة حارقة ، منهجة ، مهيجة ومنقطة . وهي سهل شديد الفعل يستعمل في حالات الاستسقاء والصرع وفي المفض الناتج عن الدود وفي الحيات الصفراوية . وقد قال فيه ابن البيطار « انه يخلق الشعر من الجلود واما ثمره المتقوي فلدنيخ الجلود » .

٢٠٣٤٢ - **فَاشِرَاءُ حَبِيبِيَّة**  
*Bryonia abyssinica* (S). *Bryone d'Abyssinie* (F).  
نوع من الفاشرا موطنه الحبشة وهو نبات زراعي شائع الاستعمال . اوراقه كبيرة الحجم متناقبة . ازهاره غبراء اللون . ثماره عنية عادمة الفتح . جذوره دوفضية الشكل ، جامدة الجلب ، توكل بعد نقعها بالماء الساخن وتغيره مرتين او ثلاث مرات .

٢٠٣٤٣ - **فَاشِرَاءُ اسوداء ، عَنَبِ الحَبِية ، حَبِيبِيَّة**  
*Bryonia dioica* (S). *Bryone dioique*, *Vigne noire*, *Naveit du diable* (F). *White wild vine*, *Common bryony*, *Snake bryony* (E). *Rote Zauurübe* (D). *Barbone*, *Rapa del diavolo*, *R. di serpente* (I).  
نوع من الفاشرا ثنائي المسكن يكثر قرب السباحات وفي المواقع الرطبة اخصها البرية || ثماره عنية بيضاء اللون غنية بالمواد الفعالة المرة || جذوره غليظة صلبة مدبلة المنافع الطبية اخصها ما لها صلة بالصدر كذات الجنب وما يتبعه .

٢٠٣٤٤ - **فَاشِرَاءُ هِنْدِيَّة** (S). *Bryonia grandiflora*  
*Bryone à grandes fleurs* (F).  
نوع من الفاشرا موطنه الهند . وهو نبات حولي زراعي . يقط . اوراقه كبيرة القند مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ . ازهاره جميلة الشكل حمراء اللون . جذوره دوفضية غزيرة المادة النشوية .

٢٠٣٤٥ - **فَاشَرُشِينَ، شَفِيذَكَر، هَزَارَ جَشَّان**  
*Tamus* (S). *Tamier*, *Bryone douce*, *Racine vierge* (F). *Black bryony*, *Ladle's seal*, *Mandrake* (E). *Echte Scherwurz*, *Schwarzwurz* (D). *Tameroo*, *Radice vergine*, *Brionia nera*, *Cerasiola*, *Vite nera* (I).  
جنس نباتات عشبية طيبة معمرة من فصيلة الديوسقوريات . انواعه قليلة العدد سوقها عارضة فرعاء تتولد من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها قليلة الشكل مدنية الزام الاسير . جذاميرها خضراء اللون . ثمارها خضية الشكل والقند . جذورها حنارية غليظة سواء اللون . خصائصها الطبية كخصائص الفاشرا الا انها اضعف منها قليلا . اما الازراق فتشفي الحيوان وضدها ينفع التواء العصب .

٢٠٣٤٦ - **فَاشَرُشِينَ اِكْرِيتِي** (S). *Tamus cretica* (S). *Tamier de Crète* (F).  
نوع من الفاشرشين ، موطنه جزر البحر المتوسط ، يكثر في جزيرة اكريت || اوراقه ثلاثية الفصوص ، مستعمرية الفصن الجانبيين ، مستطيلة الفص الوسطي . نصلها لامة

بين ٦ و ٧ م . ثوبها اخضر اللون كثير الزراكن الحمر في الالات والبيض في الدكور || تركب معظم القبول اخصها الملفوف وقد لا تمتف عن الكرمة .

٢٠٣٤٧ - **فَاسِيَاءُ المَلْفُوفِ الحِمْرَاءُ**  
*Eurydema ornatum*, *Pentatoma ornatum* (S). *Punaise rouge du chou*, *Eurydème ornée* (F).  
حشرة من الفاسياء صغيرة القند مبطلة الجسم طولها براوح بين ٨ و ١٠ م . ثوبها متراكب الزواويق والزراكن احمر والبعد . اسرها مستعرض الشكل ، اسر اللون ، احمر المختار ، جوشها الى الحمرة تملو عشر نقط سود . تركب الملفوف والقت لا تمتف عن البطاطا .

٢٠٣٤٨ - **فَاسِيَاءُ زَمُرْدِيَّة**  
*Palomena prasina* (S). *Palomène verte* (F).  
حشرة من الفاسياء طولها نحو ١٢ م . وعرضها ٧ م . ثوبها الى الخضار الزمردية تملو عتمة حنطية خفيفة وستار خري براوح حمرة بين ١ و ٢ م || اسطالها تشمل جميع البلاد المستحلة الحرارة . تركب معظم نواحي الاشجار باستثناء الصنوبريات . وتركب التبغ وغيره من النباتات الصناعية كالخروع والكتان .

٢٠٣٤٩ - **فَاسِيَاكِيَّات**  
هي فصيلة خاسيات القواصل ، اطلبها .

٢٠٣٥٠ - **فَاسِيَّةُ العَاب** (S). *Pentatoma rufipes*  
*Punaise des bois* (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيائيات . جسمها مفلطح ، بجني الشكل بطول نحو ١٤ م . ثوبها اصفر اللون ، كثيف التغير الاسمر . بطنها احمر مجذع بالاسود ، وهو جناسي التبدل عن الذكر ، سبابية عند الاثنى . اسها غمريوي . غلظها مستطيل المك . عيناها صغيرتان ماصحتان . زباناها مستطيلتان ، اسمرتان ، كوسلها قليل العرض ، مقرن الجانبين . حنطتها حمراء الطرف . ظهرها حنطي اللون ، اصفر الخنجر . قشراتها شفاف . قوائمها الى الحمرة الزمردية الباهتة || تركب اوراق الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات || رانحتها كرمية .

٢٠٣٥١ - **فَاش** (S). *Dermanyssus* (S). *Dermanysse* (F).

جنس قراد من فصيلة النمشيات انواعه عديدة جميعها عمية ، صغيرة القند ، بيضية الشكل ، مبططة طولها نحو ملير واحد . انبائها الى الريدة ، ظهورها مزركشة بالاسمر والجوزي . تركب الطير والحفائش وقد لا تمتف عن الانسان .

٢٠٣٥٢ - **فَاشِرَاءُ، فَاشِرَاءُ، فَاشِرَاءُ**  
*Bryonia* (S). *Bryone* (F). *Bryony* (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القرعيات . انواعه المروقة ١٢ جميعها طيبة منها الماددة والمباشرة . اوراقها متناقبة كبيرة القند . نصلها مفروض الصفحة ، ازغب البشرة ، كرية الزائحة . ازهارها الى البياض الاخير . ثمارها نوية ، صغيرة القند ، صفراء اللون او حمراء او سوداء . جذورها نشوية التركيب ، جذمورية او دوفضية الشكل . اما ناعها فيقارب بجودتها نشا الحبوب وقد يستعمل استعمال ذلك بعد استزاف ما فيه من خواص مرة مسهلة يتم فصلها واستنفادها بواسطة الماء . بزورها زيتية ، زبها اصفر اللون . يصنع للصناعة || اشهر انواعها الفاشرا البيضاء والسوداء والحبشية والهندية .



فاسياء الملفوف الحمراء



فاسياء زمردية



فاش



فاشرا سوداء



جالة رضية ، بزورها صغيرة || انزهارها يستمر طوال شهر آب .

### ٢٠٣٥٥ - فاصولياء ليتا \*

*Phaseolus lunatus* (S). Haricot de Lima (F).

نوع من الفاصوليا الزراعية المعمرة . ضرورها كثيرة العدد . سوقها عارضة تطول من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها كبيرة القد وريقتها اعطليجية ، مستطيلة الزام الاخير الذروب المذهب . انزهارها صغيرة الحجم ، بيضاء اللون ، خضراء المواج . عناقيدها الزهرية صغيرة . سفاتها منجلية الشكل تطول من ٣ الى ٥ سم . بزورها كلوية يراوح طولها من ١٥ الى ٢٥ سم .



فاشربين مبدول

### ٢٠٣٥٦ - فاصولياء معروفة \*

*Phaseolus vulgaris* (S). Haricot commun (F). French beans, Kidney beans (E). Gartenbohne, Bohnen (D). Fagiolo, Fagiolo (I).

هي الفاصوليا الزراعية الغذائية المشهورة . ضرورها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها شائعة الاستعمال منتشرة في معظم اصقاع العالم || سوقها متباينة القد مختلفة الاشكال تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها بيضية متشعبة النصل المذهب المقصعة || انزهارها ليلكية او بيضاء اللون . عناقيدها كثيرة . سفاتها لاقياسية الشكل تطول من ١٠ الى ٣٠ سم . بزورها مختلفة الاشكال والااحجام ، غنية بالمواد الغذائية ، تركيبها الوسطي يشعل :

١٧,٤٥ ٪ من المواد الاوتوية .

١٥,٣٩ ٪ من المواد البعنية .

٥٩,٦٩ ٪ من هيدرات الكربون .

اما متوسط ما تشمله القرون الحضر المذعة لطبخ فهو

١,٨٥ ٪ من المواد الاوتوية .

٥,٢٠ ٪ من المواد البعنية .

٤,١٧ ٪ من المواد الاستخلاصية .



فاصولياء اسيانية

### ٢٠٣٥٧ - فاصولياء مهبازية \*

هي العلمية ، اطلبها .

### ٢٠٣٥٨ - فاصوليات \*

*Phaseolées* (F). بجارة من فصيلة القرنيات اجناسها وانواعها عديدة معظمها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة اشهرها الفاصوليا .

### ٢٠٣٥٨ - فاصول ، فضلة ، قيص

*Excédent de compte* (F). Excess account (E).

### ٢٠٣٥٩ - فاضول \*

*Surdent* (F). Irregular tooth, *Wolf's tooth*, (in horses) (E).

سن زائلة .

### ٢٠٣٦٠ - فاطيح \*

*Anémophile* (F). *Anemophilous* (E).

نعت تعريفية يطلق على كل نبات تثر الرياح طلع ازهاره .

### ٢٠٣٦١ - فاطور \*

*Fongicide, Anticryptogamique* (F). Fungicide, Anticryptogamic (E).

اسم شامل يطلق على جميع المواد والوسائل المركبة للخصملة في سكاكمة القطور الطفيلية .



فاصولياء معروفة

### ٢٠٣٦٢ - فاطوس

قال الجاسط والفاطوس ميكة عطية تكسر السفن والملاحون يعرفونها فيستلزون حرق الحيفض ويملقونها على السفينة فاتها نهبه و قال القزويني هذا هو حوت الحيفض .

شديدة الخضار || انزهاره صغيرة الحجم فستقية اللون . ثماره خصية القد والشكل لونها الى الاحمر الوردي تملو ماجة صفراء . جذره حزائي ، مخروطي ، اسود اللون ، جامد الباب يتحلل بجميع الخصائص الطبية المائدة الى الفاشربين المبدول .

### ٢٠٣٦٢ - فاشربين مبدول \* ، انبلس مالينا

*Tamus communis* (S). Tamier commun, Taminier, Tame, Tamne, Herbe aux femmes battues, Seau de Notre-Dame (F).

نوع من الفاشربين موطنه حوض البحر المتوسط . ساقه فراءه تطول نحو ٣٠٠ سم . اوراقه لمينة ومدرة للبل وهي قلبية الشكل مدببة الطرف . نصلها خاسي او سباعي المروق مالى البثرة الخضراء الالام . ثماره خصية القد ، حمراء اللون . جذره حزائي الشكل ، اسود اللون ، جامد الباب ، يستعمل استعمال الفاشرا .

### ٢٠٣٦٨ - فاشين \*

*Synchrone* (F). Synchronous (E).

نعت تعريفية يطلق على التواتر المتوازي زمنياً وقبلاً .

### ٢٠٣٦٩ - فاصل

*Clôture* (F). Enclosure (E). هو كل ما يفصل ارضين متلاصقتين . لذلك قد يكون حائطا او سياجا او خندقاً ، الخ .

### ٢٠٣٧٠ - فاصلة ، سلامية

*Mérithalle, Entre-nœud* (F). Internode (E).

هي الجزء من الساق النباتية الكائن بين عقدتين متتاليتين .

### ٢٠٣٧١ - فاصلة ، فضلة

*Article* كل جزء من الأجزاء المتشابهة المتتالية في العضو المركب .

### ٢٠٣٧٢ - فاصولياء ، فاصولية ، فضولية ، حنبل

*Phaseolus* (S). Haricot (F). Kidney-bean (E).

جنس نباتات زراعية حولية او معمرة من فصيلة القرنيات القرشاية . انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصنافها فسيحة الاجزاء تشعل جميع المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها غذائي يزرع لجلي ثماره القرنية الخضراء او لاستثمار حيويه الجافة . وبعضها زبيني يزرع لجمال زهره او لكثرة وكثافة خضرته وسرعة نموه || سوقها ملطفة ، عارضة . اوراقها مدققة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عقدوية . ثمارها قرنية . بزورها مستطيلة الشكل ، ثنائية الفلق ، عديدة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

### ٢٠٣٧٣ - فاصولياء إسبانية \*

*Phaseolus multiflorus* (S). Haricot-fleur, H. d'Espagne (F). Scarlet runner (E).

نوع من الفاصوليا السبروتية الزيبينية المعمرة . ساقها عارضة تطول من ٣ الى ٤ أمتار . اوراقها شديدة الخضار . عناقيدها الزهرية كثيرة العدد والازهار . الوانها مختلفة تختلف مع القسروب فيها الاربواني والايضف والثلاثي والاراني الالوان || انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ٢٠٣٧٤ - فاصولياء حنزلوية

*Phaseolus caracalla* (S). Haricot caracalla, H. limason (F).

نوع من الفاصوليا السبروتية الزيبينية المعمرة . ساقها عارضة تطول نحو اربعة أمتار . اوراقها كبيرة . وريقتها فستقية اللون . انزهارها عطرية الرائحة ، حنزلوية الشكل ، ليلكية اللون الاصفر المواج . عناقيدها محاسة . سفاتها

٢٠٣٧١ - فاليدنج جبلي هو قرطم المر، اطبله .

Activation

٢٠٣٧٢ - فاليس هو كنف السر، اطبله .

النشط الكامن .

٢٠٣٧٣ - فاليدات الأجيحية ٥

Aptérygotes (F). Apterygota (E).

فئة من الحشرات تشمل جميع التي لا جناح لها أصلاً أي المادمة الجناح طليحياً || جميعها من الحشرات الصغيرة والشديدة الصغر . فصائلها ورتبها وأنواعها عديدة مجتمعة أربع رتب : الكهديات ، الخيفانيات ، لاشئات المتك ، وعلات المتك . ورتبها هذه تنقسم إلى ثلاث شعب : الكهديات والخيفانيات وهدييات الأذنان .

٢٠٣٧٤ - فال Rachianectes glaucus (S).

Baleine grise, Rachianecte glauque (F). Grey whale (E).

حيوان بحري لبين من فصيلة الفاليت . موطنه البحر المحيط الهادي يحيط بها من الجنوب إلى الشمال || ثوبه إلى الكهية وهو كبير الجثة طوله يراوح بين ١١ و ١٥ م .

٢٠٣٧٥ - فالج هو الثلل ، اطبله .

٢٠٣٧٦ - فالج \* دهانج ، قيرمل ، قزعوس

Camelus bactrianus (S). Chameau, Ch. à deux bosses (F). Bactrian camel (E).

جل ذو ستامين موطنه أواسط آسيا ، يكثر في التبت وتركستان وإيران . وهو أضخم من الجمل العربي واكثر منه . يستعمل في نقل الإحمال . أما وبره فكثيف وطويل يستعمل استعمال شعر الماعز .

٢٠٣٧٧ - فالج الحنجرية المزمن

Cornage chronique (F). Chronic Rosting (E).

مرض في الحبل يعتبر من الجيوب المبيلة للبع يبرف بصوت خاص يسمع عند التنفس في أثناء العمل ويختفي في أثناء الراحة .

٢٠٣٧٨ - فاليتات ٥

Rachianectidae (S). Rachianectidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونية من مرتبة ريشيات الاحناك ورتبة الحوتيات || لها نوع واحد معروف يدعى الفال او البال الاشبه بال كليفورنية .

٢٠٣٧٩ - فالية ٥

Adesmus (F). Adesmus (E).

جنس حشرات قانصة مفترسة من مفدمات الاجنحة وفصيلة الفيشيات . أنواعها المعروفة عديدة اعطائها تقوم المناطق الصحرانية من العالم القديم - اجسامها مكرومة ، مخدبة ، ضيقة المؤخر الذرب . اطولها تراوح من ١٠ إلى ٢٢ سم . تتميز باستطالة القوائم الخلفية || اثنائها متباينة الألوان يكثر فيها الاسبود المنمش بالاطحل .

٢٠٣٨٠ - فاليركة زيبعة ٥

Phalera bucephala (S).

Phalère bucephale (F). Phalera bucephala (E).

حشرة مدترنة من فصيلة الفوشليات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادلى الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار .

Plein (F).

نمت تمريني يطلق على كل تبع يتصل بقاعدة الشم .

٢٠٣٨٥ - فالير ٥

Heloderma (S). Hélderme (F). حيوان وصيد الجنس والنوع من فصيلة الفاغرات . وينيز ببلاطة جته واستطالته . طوله نحو ١٠٠ سم . ثوبه إلى السمرة الكستنية المنمشة بالأصفر يعلوها زراكن سود . فته الحشرات والضفادع والوزع يقتنصها في الليل . يعيش في دهااليز فسيحة يحفرها على اعماق تراوح بين ٧٠ و ١٠٠ م .

٢٠٣٨٦ - فالير ٥

Fagara (S). Fagarier, Poivrier des nègres, P. du Japon (F). Tooth-ache tree (E). Faugarischeilbaum (D). Fagara (I). جنبة برية وزراعية من فصيلة البذائيات . مهدا بعض المناطق الحارة انحصاها الافريقية والهندية . اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها خيطية دقيقة تبدو كأنها شفاة . ازهارها عتيودية التصنيع ، محورية الإزكاك . ثمارها كبيرة صغرة تلتف حبوب سود مرة الطعم قابضة تقوي المعدة والحشم وتقطع الاسهال المزمن وتكسّن آلام الانسان . وقال ابن سينا ان غصارتها تستعمل مضففة وانها قابضة تقل الطعن وتعرف الجسم وتقضي على الديدان .

٢٠٣٨٧ - فاليركات ٥

Hélodermatidés. Helodermidés (F). Helodermatidae, Helodermidae (E). فصيلة حيوانات زساقفة من رتبة العظاليات المشقوقات الالسة الربايات القوام . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها غليظة الاجسام اللانديجة . اثنائها إلى السمرة تملوها زراكن مختلفة الاشكال والالوان || اشهر اجناسها الفاجر .

٢٠٣٨٨ - فالغوسيت

Phagocyte وتدعى حماسة ، خلية تحدد بالاجزاء العضوية وغير العضوية في الجسم وتبسمها .

٢٠٣٨٩ - فالية ٥

Balsamita (S). Balsamite (F). Costmary (E). جنس نباتات عشبية عطرية معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . أنواعها المعروفة ١٢ جميعها فراء السوق الزباه تملو من ٣٠ إلى ١٢٠ سم . اوراقها مستطيلة مسنة . نصلها ضيق الضفحة السبكة الجامدة الخيلية البشرة . عرفها فواح الرائحة التنعينة . رؤوساتها الزهرية مكورة الشكل ، مستطيلة المالحق ، ثاجية الارتكاك || اعرف انواعها واشهرها فالية الجنان .

٢٠٣٩٠ - فالية الجنان ٥

Balsamita suaveolens (S). Balsamite odorante, Baume des jardins, Menthe de Notre-Dame, Menhecoq (F). Astmary (E). Tanacetbaume (D). Balsamita Atanasia, Tanaceto, Erba di san Pietro (I).

نوع من الفالغية وهي جملة سمرة زباه . فروعها كثيرة العدد تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . اوراقها ضيقة التصل السبيك المستطيل . ازهارها بيض اللسنيات . ازهارها يستمر في تموز إلى آب || اوراقها وازهارها عطرية العرف الفواح المستحب .



فاغر



فالغة الجنان



فالج



فالية



فاليرة زيبعة

Intérêt de droit (F). **٢٠٣٨٩ - قَائِدَةٌ حَقَّةٌ**

Vested interest (E).

هي التي تحسب أما على أساس القانون أو على ما اتفق عليه المتعاقدون.

Avantage particulier (F). **٢٠٣٩٠ - قَائِدَةٌ خَاصَّةٌ**

Particular advantage (E).

هي في عقد الشركة حماية أحد الشركاء دون الآخرين بنسبة حقوق أوفر من حقوقهم. وقد لا يكون ذلك إلا بموافقة الجمعية التأسيسية.

Intérêt usuraire (F). **٢٠٣٩١ - قَائِدَةٌ رِبَوِيَّةٌ**

Usurious interest (E).

هي التي تتجاوز الحد الذي عينه القانون لسعر الفائدة.

٢٠٣٩٢ - قَائِدَةٌ غَيْرُ مُبَاشَرَةٍ

Avantage indirect (F). Indirect advantage (E).

هي التبرع بطريقة غير مباشرة. أو إخفاء حصة وراء عقد معاوضة. أو الإبراء من دين. أو التنازل عن حق الانتفاع، الخ.

Intérêt légal (F). **٢٠٣٩٣ - قَائِدَةٌ قَانُونِيَّةٌ**

Lawful interest (E).

هي التي يحدد القانون سعرها إذا ما فات المتعاقدان تعيينه في العقد.

Intérêt Judiciaire (F). **٢٠٣٩٤ - قَائِدَةٌ قَضَائِيَّةٌ**

Judiciary interest (E).

هي التي تسري منذ إعلان صحيفة الدعوى أو أذار رسمي.

Intérêt fixe (F). **٢٠٣٩٥ - قَائِدَةٌ مُخَدَّدَةٌ**

Set interest (E).

هي الفائدة الواجب تسديدها حتى لو لم تحقق الشركة أي ربح.

Intérêt composé (F). **٢٠٣٩٦ - قَائِدَةٌ مُرَكَّبَةٌ**

Compound interest (E).

هي التي تحسب على مبلغ أصلي فوائده مرة تلو مرة.

Intérêt échü (F). **٢٠٣٩٧ - قَائِدَةٌ مُسْتَحَقَّةٌ**

Due interest (E).

هي التي حان أجل دفعها وتقابلها غير المستحقة.

Axis (F). Axis (E). **٢٠٣٩٨ - قَائِي**

القائى هو قطب دورة الرأس المحورية وهو الفقرة الثانية من العقد تأتي بعد الفقرة وهي أول فقرة تلي الرأس. ويختلف القائى عن غيره من الفقرات المتبقية بتنوعه التعلولى الواضح.

Fabiana (S). **٢٠٣٩٩ - قَيْتَانِه ٥**

Fabiane (F). Fabiana (E).

جنبة معمرة، أبيلة، ولاتجبة، ولزجبة من فصيلة الباذنجانيات. معقودة التعريف على اسم الحاكم فبانيانو. ساقها صلبة تملو من متر إلى مترين. أزهارها لاطئة، بيضيه الشكل، منتصبه كالخراشف. أزهارها محورية الارتكاز، بيضاء اللون، قطرها نحو ٤ سم. طولها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز.

سرقها تعيش على أوراق الستديان || جسمها كبير القد يطول من ٢٤ إلى ٢٦ سم. يسلطها تراوح من ٦٠ إلى ٦٤ سم. رأسها أصفر صفاني المواج. هينها كبيرتان. زباناها مشطيان مزويجان عند الذكر، مخطيان عند الأنثى. مرشفاها معتدل الطول. جرشها وبعثها إلى الصفرة الخنطية المواج || ورشها الإماميان إلى الريدة البهراء تملوها خطوط ممرضة بيقة وبقعة طرفية صفراء. ورشها الخلفيان إلى اللبائس الساجي تملوه ماجة بيقة. تزنيها حنطى. اهدابها بيقة || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الأول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل، تماثل بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع وتحتج المكان للتحا على الصفحات المغل من نصال الأوراق || السرعة تطول من ٥٢ إلى ٥٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الهلب، مستنفظ البطن، مدبب السرج. ثوبها إلى الصفار الجليل يملو عند ثلاثي السكم غطوط سود وبقعة هراء ونقط بيض. رأسها كسفي اللون يملو خط أصفر قلبه ينشط عند الاقنكن. منبها إلى الصفرة السمرراء. وواجبها سود. هلبها كبريتي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلبة. تحببها السرة في شقوق البهاء أو تحت القشور.

Famennien (F). Famennian (E). **٢٠٣٨١ - فَامِنِي ٥**

نسبة إلى منطقة فامن البلجيكية. تمت تعريفها يطلق في الجيولوجية على الساف الاخير أي الاقل من الاراضي الديفونية المائدة إلى الحقبة الثالثة من الاياج القديم. جميع متحجرات هذا الساف من عضديات الارجل وفصيلة الكبحاليات.

Fongivore (F). Fongivorous (E). **٢٠٣٨٢ - فَانِيح ٥**

نعت تعريفى يطلق على كل حشرة أو دودية تعيش على الفطور.

Pénide (F). **٢٠٣٨٣ - قَانِيد**

نوع من سكر النبات كان يستخرج في الماضي من المرسوس وقد بطل استخراجه الآن.

Sambucée (F). **٢٠٣٨٤ - قَانُوَّة**

نعت تعريفى يطلق على النباتات التابعة إلى فصيلة القويوات أو القريةبة الشبه منها || وهو بسيط من فصيلة القويوات يشل بعض الاجناس والانواع.

٢٠٣٨٥ - قَالِيَّة

متسع من الارض بين مرتفعين ج. فوائج.

Intérêt (F). Interest (E). **٢٠٣٨٦ - قَائِدَةٌ مُرَدَّةٌ**

القائدة هي المرءة أي ريع الاموال المقرضة.

٢٠٣٨٧ - قَائِدَةٌ إِتْقَانِيَّةٌ

Intérêt conventionnel (F). Conventional interest (E).

هي الفائدة المشروطة صريحا في عقد الاتراض على ان لا تزيد على ما يحدده القانون.

Intérêt simple (F). **٢٠٣٨٨ - قَائِدَةٌ بِسِطَّةٌ**

Simple interest (E).

هي التي تسري على اصل الدين فقط وتقابلها الفائدة المركبة.



يفسر مع التسخ ويسתר في نصل الارواق || مظهره الخارجي ارتقاء في النصل يمشي شوب في الخشب ثم زوال اللون الاخضر من اطراف النصل واستبداله بالاحمر البنفسجي الذي يتحول فيما بعد نحو الاصفر المخفي وينتهي بالبذبل والبياس .



فتة

٢٠٤٣٤ - **فَتِيخِيَّات** (F).  
 فصيلة من فصيلة البقوليات . تشمل عدة اجناس اعرفها اقتصادياً الاربعة التالية : السهاد ، الشبكية ، الفتية ، والقنبية .

٢٠٤٣٥ - **فُتِيخِيَّات** (S).  
 Ampullariidae (F). Ampullariidae (E).

فصيلة من الرغويات معديات الارجل امانيات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها متوسطة العدد اعطائها انهر البلاد الحارة ومجرباتها ويتابعها واخصها افريقية || اصداها متباينة الاشكال والاحجام ، منها المغروطة والكروية والمستديرة والمبطلة || اعرف انواعها واشهرها الفتية .



فُتِيَّة

٢٠٤٣٦ - **فَتَّ**  
 الفت نبات يختبئ حبه ويؤكل في الجذب وتكون غيبته غليظة || وقيل هو الهيد || وقيل هو شجر ينبت في السهول والاكمام وله حب كالحصص .

٢٠٤٣٧ - **فُتَاغِيَّة** (S).  
 Helogale (F). Helogale (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة الزباديات . موطنه بعض مناطق السودان والحشة . يكثر وجوده قرب بحيرة نيترا . ملجته الحيائي جامعي ، جماعته تعد من ٣ الى ٦ ازواج || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . رأسه مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . عيناه واذا صفرتان ، مستديرتان . سباله كثيف الحلب الطويل . قوائمه قصيرة خاسية الاصابع . ثوبه الى الزبداء السمراء || يعيش في اوبار يجترها في التربة . قوته الاناعي والجردان والقران والعلاجيم .



فتية شائعة

٢٠٤٣٨ - **فُتَاغِيَّة** (F).  
 Cleistogamy (F). Cleistogamy (E).

الفائدة حالة كل نبات لا تفتح اكمام ازهاره في التحول الى اجربة مغلقة تضم الطليل والمدة .

٢٠٤٣٩ - **قَرَجِيل** (S).  
 Fothergilla (F). Fothergilla (E).

جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة المشتركات . سوقها منتصبة تملمن متر الى ستة امتار . اوراقها عابلة ، متشاذية ، بسيطة ، كاملة ، ملتوية الاطراف . ازهارها سنبل التجميع ، طرني الارتكاز || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :



قَرَجِيَّة

٢٠٤٤٠ - **قَرَجِيل قُلَانِي**  
 Fothergilla involucreta (S).  
 Fothergilla à involucre (F).

نوع من القَرَجِيل . موطنه يمتد من الهند الى ايران . ساقه شائعة ترتفع نحو ستة امتار . اوراقها اهلبيجية النصال تطول من ١٢ الى ١٨ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها رؤسية ، كتيرة الاسدية

٢٠٤٢٦ - **فَتَّة \*** ، **يَاسَمِين هِنْدِي**

Plumeria (S). Frangipani (F). Frangipani, Pagodana-tree, Temple-tree (E). Jasminum (D). Frangipana, Plumeria (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة النخلات . مهدا البلاد الحارة . انواعها نحو ٤٠ معظها بري وبعضها تزييني . سوقها هشة الخشب . اوراقها متماثلة منتنة . نصلها اهلبيجي الشكل ، جامد الصفعة ، عابك الخصار . ازهارها كبيرة القد ، حيلة الشكل منتصبة ، عشقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، عطرية الرائحة ، متعددة الالوان الزاهية من الالبيض البلق الى الاحمر القرمزي عصارها سامة يقال انها تقضي على الثمل .

٢٠٤٢٧ - **فُتُوح** (F). Claws, Clutches (E).  
 في الخالب ومنهم من قال برأى الاسد .

٢٠٤٢٨ - **فُتِيَّة**  
 في الاجبروتوم ، نبات تزييني ، امله .

٢٠٤٢٩ - **فُتِيخِيَّة \***  
 Ampullaria (S). Ampullaria (F). Ampullaria (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات معديات الارجل وفصيلة الفتيخيات . انواعها المعروفة قليلة العدد نحو ١٢ اعطائها انهر ومجرباتها البلاد الحارة || اصداها متباينة الاشكال والاحجام منها الكبيرة والكيرة ومنها الصغيرة جميعها بطيئة حلازة متفرجة الفوهات ، دقيقة الاعقاب .

٢٠٤٣٠ - **فُتِيخِيَّة \*** ، **فُتِيخِيلُوم** (S).  
 جنس طور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة البوليات . جرابه الكندي جالس القاعدة ، منتصب القوام ، لاقبسي الشكل . كتالده قائمة ، قاعدية ، عديدة الفروع الهدية الانقباسية الارتكاز || انواعه المؤذية قليلة ، اعرفها ما يلي :

٢٠٤٣١ - **فُتِيخِيَّة البُرُتُقَال**  
 Verticillium heterochadum (S).  
 فطر مجهري مركب ثمار البرتقال النابتة على الشجرة والمحفوفة في اماكن رطبة فيغتها ويغلبها || مظهرها الحارقة بقعة رماسية اللون تركب القشرة عند خاف الثمرة فتغتها بعد ان تقضي على جيوب الكحول والادهان الاثيرة .

٢٠٤٣٢ - **فُتِيخِيَّة الثُوت \***  
 Verticillium mori (S). Feu volant (F).

فطر مجهري مركب الثوت في جميع اصفاته من الجذور الى الاوراق . شبيهه سيال شديدة الميوعة يسير في الاربعة ويتغلف على التسخ الحليوية فيغلبها || مظهره الخارجي ذبول فجائي يحل بالاوراق والنواحي فيثويها ويسبب يلسها .

٢٠٤٣٣ - **فُتِيخِيَّة شائعة \***  
 Verticillium albo-atrum (S). Verticilliose, Maladie jaune (F). Potato wilt (E). Welkekrankheit der Kartoffel (D).

فطر مجهري عديم الانتشار يصيب عدة نباتات مختلفة اغصها الاحقران والايانلس والبطاطا والبن والتبوترة والبريقا والبنغونه والبنج والجزوز والخرق والدليله والزنان والنبام والشوندر والشيلاك والقطن والقيقب والكشش والبيك والشش والسمان والجزوز وحشيشة الديتار ، الخ . مركب الجذور فيقرح الجرداء ويبدل شبيهه على الاربعة

وتدية غليظة مأكولة انما يزرع خاصة من اجل خربلاته البقلة المأكولة التي تجني كاللوبيا الخضراء قبل دخوها في طور الادراك.

### ٢٠٤٣٣ - فجل بري \* ، فجلية

Raphanus raphanistrum (S). Radis sauvage, Rave-luche (F). Wild radish, White charlock (E). Hedrich Reticch, Wilder Reticch (D). Rafano rafanistro, Rafano salvatico (I).

نوع من الفجل البري المبدول ينبت في جميع الاربة والساكن وهو اذا كثر في الزروع والحقول، يعتبر من النباتات الضارة الواجب ابادتها || وهو ايضا من النباتات المرصوة التي تنتشظ الدر .

### ٢٠٤٣٤ - فجل حار ، فجل أسود

Raphanus niger (S). Radis noir, Rave noire (F). Black radish (E). Schwarzer Reticch (D). Rafanistro negro (I).

نوع من الفجل غروب عديدة بعضها زراعي شائع الاستعمال جذوره غليظة مستطيلة حريفة الطعم قشورها آلى الجذوة البنفسجية السوداء. وهي مفادة لداء الحفر || زيت بزوره يتحل بمخامس زيت الفجل نفسه .

### ٢٠٤٣٥ - فجل زراعي \*

Raphanus sativus (S). Radis cultivé (F). Common cultivated radish (E). Garten Reticch, Rettig, Radies (D). Rafano, Ramolaccio, Ravanello (I).

نوع من الفجل غروب كثيرة العدد. جميعها مأكولة الجذور المختلفة الاشكال والاحجام والالوان . وهو من النباتات السريعة النمو، بعض غروبوه تدرك بمدة ثلاثة اسابيع من بزرها || يرغب في الاربة البدالية، الغنية، القليلة الانتاج || وهو مشهور بمخامسه النافعة. جذوره واراقه تقوي المدة وتدر البول وتنشط لبن المرصعات وتزيد قدره . زيت بزوره يدعى خبيثة وهو ينفع من حصوات المرارة .

### ٢٠٤٣٦ - فجل ياباني \* ، ديكون

Raphanus acanthiformis, R. macropoda (S). Daikons (F). Daikons (E).

نوع من الفجل الزراعي المأكول . مهد اليابان . غروبوه كثيرة العدد مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . تكثر فيها الاستعالة . جذوره بعض غروبوه تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم. وروتها يراوح بين ٤ و ١٥ كيلو .

### ٢٠٤٣٧ - فجلية

Feijoa (S).

Feijoa (F). Feijoa (E).

شجيرة معمرة من فصيلة الآسيات. مهدها بعض مناطق البرازيل . ساقها فراء فناء، ترتفع من ٣ الى ٦ امتار . واراقها ابيدة، صغيرة القد، آسية الشكل، لامة الصفحات العليا، باحة السفلى . ازهارها محورية الاوتكاز فردية . فصلها وبتلاتها واسديتها حراء اللون . ثمارها عنبة بيضية الشكل، فستقية اللون، عابجة الب، مأكولة . ثلعها قريب الشبه بالشليك (الفريز) || تنويرها صيفي .

Vacuo

### ٢٠٤٣٨ - فجلية

الوفرة في الوجة اي البروتولابزه .

### ٢٠٤٣٩ - فجلية الشط \* ، بئيس الشط ، رشاد البحر

Bunias kakile (S).

Bunlade kakile, Roquette de mer (F). Common sea

الناشرة، نحو ١٥، تلوقها خمس او ست قنابات اهليجية الشكل، باحة الخضراء .

### ٢٠٤٤١ - فترجيل معني الورق \*

Fothergilla alnifolia (S).

Fothergille à feuilles d'aune (F).

نوع من الفترجيل . منته بعض مناطق امريكا الشمالية . ساقه ترتفع من متر الى مترين . اوراقه قريبة الشبه باوراق اللث تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ناعما كثيفة الزغب على الصفحات العليا، خلية الصفحات السفلى . سابلها الزهرية تطول نحو ٣ سم. ازهارها يضاء اللون، عطرية العرف، سرسة لا طوق لها .

Cléistogame (F).

Cleistogamous (E).

نعت تعريفي يطلق على الزهرة التي بدلا من ان يفتح كها للاخصاب، يتحول الى جراب اجوف مغلق يضم المعلق واللمقة تأيينا للاخصاب .

Gorge (F).

### ٢٠٤٤٣ - فج

الفتح هو عتق كاس الزهرة ج. فجاج .

### ٢٠٤٤٤ - فج

الفتح من الثار : ما لم يفتح . الثار كلها فجة من حين عتقها حتى نفسجها .

Mutation

### ٢٠٤٤٥ - فج

كل تبدل نباتي يحصل في الانتقال الوراثي لصفات نوع او ضرب من النبات .

### ٢٠٤٤٦ - فجل قطبي

Aurore boréale, A. australe (F). Polar lights (E).

Noix (F). Walnut (E).

### ٢٠٤٤٧ - فجل

الفجرم : الجوز الذي يؤكل .

Raphanus (S).

Radis (F). Radish (E).

جنس نباتات عشبية من الهضبات وفصيلة الصليبيات انواعها المعروفة ستة منها مناطق المعتدلة. منها البرية والزراعية والحولية والجملة . جلورها غليظة عديدة الاشكال. ساقها منتسبة فراء . اوراقها متعاقبة مستطيلة مسنة الحافة. السفلية منها مشعبة التفريغ والتشريح . ازهارها عنقودية التجميع هامة او تاجية الاوتكاز، صغيرة القد، يضاء اللون او سفراء او بنفسجية . ثمارها خربليات مستطيلة منلقة . بزورها كروية || اشهر انواعها ما يتبع .

Radis noir (F).

### ٢٠٤٤٩ - فجل أسود

هو الفجل الحار، اطليه .

Sisymbre, Vêlar (F).

### ٢٠٤٥٠ - فجل الجيمال

هو البسابة، اطلبها .

### ٢٠٤٥١ - فجل الخيل هو الهضبان، اطليه .

### ٢٠٤٥٢ - فجل الهند \* ، فجل جوا، هنري

Raphanus caudatus (S). Radis serpent, Mougri (F). Snake radish, Mougri (E).

نوع من الفجل الزراعي البقي مهد جارا والهند اقلية عند من شاطى البحر حتى ارتفاع ٥٠٠٠ م || جذوره



فترجيل معني الورق




فجل الهند



فجل بري



فجل زراعي



فجل ياباني



فجلية الشط

Charbon de bois (F).  
Charcoal (E).

القمم النباتي أو قِسم الخشب هو الخشب المحروق بمعدل من الهواء . يتم ذلك بالمشعة .



نحسية مرجانية

Erwinia aroidae

٢٠٤٧٢ - فَحْمَةُ السَّاقِ

وصم بكتيري شديد الالاف يدعى فرونيو عسقلية ، الملها .

Sphacelotheca

٢٠٤٧٣ - فَحْمِيَّة ٥

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراهوريات تتميز بجلو هيئها الماخر من الأريقات البارزة || انواعه عديدة جميعها مؤذية تصيب النجيليات اشهرها ما يتبع .



فحمية الدخن

٢٠٤٧٤ - فَحْمِيَّة الدَّخْن ٥

Sphacelotheca holci-sorghii, S. reiliana, Ustilago holci-sorghii (S). Ustilago reiliana, Sorosporium reiliana (S). فطر مجهرى يصيب ازهار الدخن والقمم على اختلاف انواعها || مظهره الخارجى ككل خيطية بوفية تنشئ التكون من رشاته الى زئيداته دون ان تقرب من الاغشية الزهرية . صفته البويجي سريع الانفلاق . بويجاته سمر اللون ، كروية الشكل ، خشككة البشرة ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ م . || يكالغ مكافئة فحمية الدخن .

٢٠٤٧٥ - فَحْمِيَّة الدُّرَّة ٥

Sphacelotheca sorghii, Ustilago sorghii, Sporisorium sorghii (S). Charbon couvert du sorgho (F). Covered smut of sorghum (E).

فطر طفيل مجهرى يصيب المطر والمكوك فيؤذيها ويعطب الازهار ويمسها عن العقد || مظهره الخارجى يثور بوفية لونها الى الغيرة ، بيضاء القاعدة ، خشككة القمة ، لسانا البشرة تنفلق عن غيرات كروية لونها الى السرة القائمة . يكالغ بتغير البذار بمسوحة كربونات النحاس او سلفات النحاس .



فحمية الذرة

٢٠٤٧٦ - فَحْمِيَّة الزَّهَر ٥

Sphacelotheca cruenta, Ustilago cruenta (S).

فطر مجهرى يصيب الزهر فيقيض عليه . يتميز أولاً بصفته البويجي الكروي الشكل السريع الانفلاق . ثانياً بقروسه الفحمية المستطيلة التي تتركب جميع اغشية الزهر عن زئيدات ورشاات وماليق المتكون . ثالثاً بأريقاته المنددة القائمة على متن البويجات بعد تحويلها الى بؤر بوفية || وهو من الاوصام المحددة الانتشار على كثرة اذاهما لانها تتطلب العديد من العوامل البيئية المواتية || يكالغ مكافئة فحمية الدخن .

Symptôme (F).

٢٠٤٧٧ - فَحْن ٥ ، عَرَض

Symptom (E).

ج فواخن واعراض .

٢٠٤٧٨ - فُحُومَة

هي الشقران الاسود ، وصم فطري يصيب الكروية .

٢٠٤٧٩ - فَحِيج

فحيج الانمى : صوباً من فيها وكشيش الانمى صوباً من جلدها .



فحمية الزهر

rocket (E). Echter Meersenf (D). Baccheroni, Ravastrello marittimo (I).

نوع من البلياس وهي عشبة بوية حولية يقال انها طيبة منها رمال الشطوط البحرية والبرية . جنوبها حترابية وتدية . سوقها وفروعها زيا . اوراقها خلية البشرة . ازهارها صغرة اللد ، بيضاء اللون . وهي عشبة مرعوية متوسطة المادة الغذائية تنشط الدر .

Spadice (F). Spadix (E).

٢٠٤٦٠ - فُحَال

هو ذكر النخل خاصة ينبغ به حواملها . ج . فصاحيل .

Symptomatologie (F).

٢٠٤٦١ - فَحَالَة ٥

Symptomatology (E).

النحانة علم يبحث في اعراض الامراض .

Test

٢٠٤٦٢ - فَحْص

Analyse du sol (F).

٢٠٤٦٣ - فَحْص التُّرْبَة

راجع تحليل التربة .

Fossette (F). Small cavity (E).

٢٠٤٦٤ - فَحْمِيَّة

النحصة نفرة صغرة تكون في بعض الجيوب والبؤر . والنفرة الموجودة عند رباط الاصداف البحرية من ذوات المصراعين تدعى ايضاً فحمة . ج . فحاص .

٢٠٤٦٥ - فَحْمِيَّة مَرَجَانِيَّة ٥

Embothrium coccineum (S). Embothrie écarlate (F).

جنبة تريينية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها متصصة فراء تملون ١٠٠ الى ١٥٠ سم . افنانها حشوية اللحم . اوراقها بسيطة ، متباعدة ، منققة ، قصيرة الزناد . نصلها اهليجي الشكل لامع الصفحة العليا باحت السفل . ازهارها عنقودية التجميع ، ثنائية الترتيب ، تاجسية الارتكاز ، حمراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Etalon (F). Stallion (E).

٢٠٤٦٦ - فَحَل

الذكر من كل حيوان . ج . فحول وافحل وفحال وفحالة وفحولة .

Carboniser (F). To carbonize (E).

٢٠٤٦٧ - فَحَم

حول الشيء الى فحم .

Charbon (F). Coal (E).

٢٠٤٦٨ - فَحْم

اسم شامل يطلق على بعض مركبات الكربون غير المتبلور . اشهر انواعه الحجري والنباتي .

٢٠٤٦٩ - فَحْم العظام

Noir animal, Charbon d'os (F). Bone-black, Animal charcoal (E).

سواد فسفوري يحصل من حرق العظام بطريقة خاصة .

Houille (F).

٢٠٤٧٠ - فَحْم حَجَرِي

Coal, Pit-coal (E).

مادة معدنية سوداء اللون تستخرج من الارض تستعمل وقوداً . انواعها متعددة تختلف باختلاف نسبة الكربون التي تحويه .

٢٠٤٩٣ - **فَدَادَة كَالِيَة \*** *Ulula nebulosa* (S).  
*Chouette nébuleuse* (F).  
طائر من الفداد كبير الجفّة طوله نحو ٦٠ سم. موطنه  
أمريكا الشمالية. يأوى إلى الإحراج الكثيفة. يصيد الجرذ  
والقار والأرانب والسنجاب والصفادع والأسماك.

٢٠٤٩٤ - **فَدَادَة** *Grenouille* (F).  
هي الضفدع، اطلبه.

٢٠٤٩٥ - **فَدَادَات** *Ululiers* (F).  
عمارة من فصيلة البويات تشمل ثمانية اجناس: الخُم  
والخبل والصدى والضوع والفداد والنهام والهرقع والهرذ.

٢٠٤٩٦ - **فَدَار** *Concassee* (F). *Breaker* (E).  
٢٠٤٩٧ - **فَدَارَة ٥** *Pratia* (S).  
*Pratie* (F). *Pratie* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوريبيات. ساقها  
منتصبية أو مستقيمة. أوراقها منتقة، متعاقبة. أزهارها  
محورية الارتكاز، فردية، مستطيلة المالحق. ثمارها  
عنينة متباعدة الخضاب يكثر فيها الآخر || أنواعها  
المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية.

٢٠٤٩٨ - **فَدَارَة ضَخْمَة التسنين ٥**

*Pratia macrodont* (S). *Pratie à grosses dents* (F).  
نوع من الفدارة. ساقها قصيرة منتصبية فراء. أوراقها  
محدبة مسطوية الشكل، شبه لحمية النصال، ضخمة  
التسنين اختاري. أزهارها عطرية العرف، قصيرة المالحق،  
صفراء اللون، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال  
فصل الصيف.

٢٠٤٩٩ - **فَدَارَة قَزَمَة ٥** *Pratia perpusilla* (S).  
*Pratie naine* (F).  
نوع من الفدارة. ساقها جذعة. أوراقها شديدة الصغر.  
أزهارها مستطيلة المالحق، صغيرة القد، بيضاء اللون،  
تخلية التويجات || تنويرها من حزيران إلى تموز.

٢٠٥٠٠ - **فَدَارَة مُحَرَّسَة ٥**

*Pratia angulata* (S). *Pratie anguleuse* (F).  
نوع من الفدارة. ساقها محرمة فراء تملو من ٢٠ إلى  
٣٠ سم. أوراقها منتقة، بيضية الشكل، نصلها مزرق  
البشرة. أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون، مرققة  
بالاجر. ثمارها عنينة حراء اللون || تنويرها يستمر طوال  
فصل الصيف.

٢٠٥٠١ - **فَدَارَة مَدَادَة ٥** *Pratia repens* (S).  
*Pratie rampante* (F).  
نوع من الفدارة. ساقها مدادة زائفة. أوراقها مستطيلة  
الاعتناق التي يتجاوز طولها طول النصال، نصلها شبه  
قلبية الشكل، عادمة التسنين. أزهارها مستطيلة المالحق،  
بيضاء اللون، شيرة بالبنفسجي. ثمارها عنينة مرجانية ||  
تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

٢٠٥٠٢ - **فَدَام** *Chausse* (F). *Filter* (E).  
مصفاة تمر بها السوائل لتنقي

٢٠٥٠٣ - **فَدَان**

*Bœufs de travail, Bœufs de labour* (F). *Oxen* (E).  
الفدان هما الثوران اللذان يقدن عليهما. ج. فدان وأقعدة.

٢٠٤٩٠ - **فَحِيل** *Raceur* (F). *Thorough* (E).  
نعت تعريفي يطلق على الحيوان الذي يطبع في النسل صفاته  
ذكراً كان أو أنثى.

٢٠٤٩١ - **فَحْ** *Happeau* (F). *Snare* (E).  
أداة تصاد بها الطيور والقواضم.

٢٠٤٩٢ - **فَحَار**  
الطين المطبوخ. وقيل الطبخ هو غرت وصلصال.

٢٠٤٩٣ - **فَحَتْ** *Clarté de la lune* (F).  
*Light of the moon* (E).  
الفتح هو ضوء القمر.

٢٠٤٩٤ - **فَحْد** *Cuisse* (F). *Thigh* (E).  
عضو من أعضاء الجسم الحيواني. وما فخذان. ج. اخفاذ.

٢٠٤٩٥ - **فَحْد الدب**  
نجم من كوكبة الدب الأكبر.

٢٠٤٩٦ - **فَحْر الثُلُوج** هي الثيونسوكا. اطلبها.

٢٠٤٩٧ - **فَدَاء** *Volume*  
الفداء: حسم الشيء.

٢٠٤٩٨ - **فَدَاء** *Oton*  
الانداء حيوب الخنط لا تزال عصاتها عالقة بها وتكون  
غالباً حيوب نخيلة أو ضعيفة.

٢٠٤٩٩ - **فِدَاء** *Grenier* (F). *Gransary*,  
*Store-house* (E).  
هو الإتيار، اطلبه.

٢٠٤٩٠ - **فَدَاد** *Chouettes* (F).  
*Screech-owls, Barn-owls* (E).

جنس طير من البويات وعمار الفداديات. أنواعه عديدة  
جميعها من الرؤاس الكواسر. كبيرة القد، غليظة الرأس،  
عريضة الخسر المستدير، قوية المنسر. أثوابها إلى السرة  
الموحدة تعلوها رشفة صغيرة البقعة وبعض التنازع.  
قوته القاريات على اختلافها والصفادع والظاء ... بين  
في تجاويث الأشجار القديمة المهد أو في الإحراج الكبيرة  
المزروكة. أناته تبيض مرة واحدة في العام. حفضتها  
تراوح بين ٤ و ٦ بيضات || أشهر أنواعه الثلاثة  
التالية.

٢٠٤٩١ - **فَدَادَة الشَّرْق \*** *Ulula noctua* (S).  
*Chouette chevêche* (F).

طائر من الفداد اعطاه فسيحة الإرجاء تمتد من الصين إلى  
أطراف أروبة ومن حضاب أفريقية الشرقية وبرتغعات  
إتوبية إلى تمام مراكش الأطلسية || وهو آبد، متوسط  
القد، طوله نحو ٤٥ سم. يأوى إلى الإحراج والخرائب.  
مسرعه يدم من النسق إلى الفجر. يصيد الجرذ والقار  
والظاء والصفادع وجميع أنواع الحشرات والديدان.

٢٠٤٩٢ - **فَدَادَة الشَّال \*** *Ulula lapponica* (S).  
*Chouette lapone* (F).

طائر من الفداد كبير الجفّة طوله نحو ٧٠ سم. يأوى  
إلى إحراج البلاد الباردة اخصها الشمالية || وهو يطي  
الطيران لا يصف من شيء يتمكن منه وقد يقتصر السنجاب  
والقوار.



فَدَادَة الشَّرْق.



فَدَادَة الشَّال



فَدَادَة كَالِيَة



٢٠٥٠٤ - فَدَر

Chamois (F).

الفدَر والقُدور هو السَمَواة . ج فُدور وفَدَر .

٢٠٥٠٥ - فَدَر

Concasser (F).

To bruise, To crush (E).

فَدَر الحِجَابَة : كسرها صَفَارًا .

٢٠٥٠٦ - فُدَس

Araignée (F).

هو العَنكبُوت . ج فُدسة .

٢٠٥٠٧ - فُدَسُ المَسَاكِين ، عَنكَبُوتُ المَاوِل

Tegenaria domestica (S). Tégénale domestique,

Araignée domestique (F). House-spider (E).

نوع من العناكب الساعية المتربصة الفانسة ثنائية الروايا سداسية المشاتين ينسحب الى فصيلة العنكبوتات || جسمه صغير القد يطول نحو ٨ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم عند الانثى . صدراؤه معتدل الجرم لونه الى الصبغة الحمراء المازج . عيناه زُمَيَّتان . شيفاه صغيرتان ذريبان . فكاه دقيقان حبيبتان . جرابزه غليظة كثيفة الحلب . بطنه ابيض اللون تملوه بعض الزراكش واللفظ || يألف الماسكين المأهولة والغرائب . قوته الحشرات الصغيرة والذباب والموام . يترسب لها في شدة ويسمى اليها ركضًا وقَفَرًا . شدة كبير القد ، اقني السطح ، قعي المركز ، يقبضه في الزوايا يلجأ اليه في التبار ويسرح في الليل || يياته الشتوي يستمر نحو ١٧ اسبوعًا يقبضها في عكدة بلوطية الشكل ينسحبها في شقوق الخشب او تحت الاخشاب ويبيتها || يعيش نحو ثلاث سنوات . ملجئه الحياتي لا يختلف عن ملجئ غيره من العناكب || يعتبر من الدويبات النافعة اللائودية .

٢٠٥٠٨ - قَدَش

Araignée (femelle) (F).

Spider (female) (E).

القَدَش انثى العناكب (كرواع) .

٢٠٥٠٩ - قَدَح

Distorsion (F). Distorsion (E).

القَدَح التواء يطرأ على عضو من الجسم او على قسم منه .

٢٠٥١٠ - قَدَحَم

القَدَحَم القَدَم : البقل الكثير الماء .

٢٠٥١١ - قَدَن ، مَهْد

Niveler (F). To level (E).

بسط الارض وسوؤها .

٢٠٥١٢ - قَرَا ، قَرَاه

Onagre (F). Onager (E).

حَمَر من الحمر الوحشية عديدة الانواع تتميز باذنانها الدقيقة واذانها الصغيرة واعرافها القصيرة السبب المنتصب وسوارفها القليلة الاستدارة || اعطائها بعض فياني وجبال العالم القديم . تعيش جامات . ارباعها لاقامية يراوح عدد افرادها بين ٥ و ٢٠ رأس الرجل فعل يقوده ومجده الى ان ينقلب على امره فينتحي . اعرف انواعه قَرَاه التبت واخذت والقَرَاه الاسوري .

٢٠٥١٣ - قَرَا اَسُورِي \* ، قَرَا الشام

Equus hemippus (S). Hémippe, Onagre de Mésopotamie (F). Syrian wild ass (E).

نوع من القَرَا ثوبه اغيس اللون موطنه يمتد من جبال ايران الى العراق السورية حتى تدمر . وهو متوسط القد يطول نحو ١١٥ سم . ويطول ٢٠٠ سم . بما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٤٥ سم . رعله يراوح بين ٥ و ١٢ .

٢٠٥١٤ - قَرَا التَبَت \* ، حَمَمِين

Equus hemionus (S). Hémione (F). Kiang (E).

نوع من القَرَا موطنه التبت وبعض فياني آسية الوسطى . وهو كبير الجفة يطول نحو ١٢٠ سم . ويطول ٢١٠ سم . بما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم || رعله يراوح بين ٨ و ٢٠ .

٢٠٥١٥ - قَرَا اَلْهَد ، قُولَان

Equus indicus (S).

Onagre de l'Inde, O. de Brisson, Koulan, Ghour,

Ghor-Khur (F).

نوع من القَرَاه موطنه الهند والافغان والتركيستان واران وهو متوسط القد حجمه حجم القَرَاه الاسوري الا انه افصح ثوبًا واعرض ثُجْبًا واطول اذنًا || عدد رعله يراوح بين ٨ و ١٥ .

٢٠٥١٦ - قُرَالَة

ما في كرش الحيوان من القُرث .

٢٠٥١٧ - قُرَاج

هو الفرقة نبات منقي ، اطليه .

٢٠٥١٨ - قُرَاج ، قُرَاج ، قُرَاج

Cépée (F).

Tuft of shoots (E).

جاء الترامي التي تفرح حول اربعة الشجرة المنقطعة .

٢٠٥١٩ - قُرَادَة

هي العائقة ، اطلبها .

٢٠٥٢٠ - قُرَار ، قُرَار

ولد النجسة والماعز والبقرة .

٢٠٥٢١ - قُرَارِيَة \*

Ferraria (S).

Ferraria (F). Tiger flower (E). Tigerblume (D).

Gladiolo indiano (I).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات انواعه قليلة جميعها زينة . سوقها ذائقة . اوراقها لاحقة زاهية الخضار مشربة اخضر بالاسمر والبي . انزعاجها بجلة الشكل كبيرة القد نورة وموشة لكها سريعة الذبول اما اسنيتها فتدغمة وصماتها كبيرة وهدبة || يستخرج من دوافصها مادة صمغية حريفة تستعمل في الطب || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠٥٢٢ - قُرَارِيَة سَوْدَاك

Ferraria atrata (S).

Ferrarie noirâtre (F).

نوع من القُرَارِيَة البرونية صماتها تملو نحو ١٥ سم . انزعاجها الى الحمرة الابروانية البترة الموشة بالاعصر والاصفر || انزعاجها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٣ - قُرَارِيَة مُمْتَاوَة

Ferraria undulata (S). Ferrarie ondulée (F).

نوع من القُرَارِيَة البرونية . صماتها تملو نحو ٢٠ سم . انزعاجها الى الخضار الاسمر تملو رشفة جزوية بتلاتها متباينة النصل ، مقطوعة الاطراف || انزعاجها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٤ - قُرَارِيَة

Ecrèmeuse (F). Separator (E).

آلة تفرز الكتانة عن الحليب عن يد القوة النابذة .

٢٠٥٢٥ - قُرَارِيَة فُرُوسِيَة

Equitation (F).

Horsemanship, Riding (E).

هو فن استظهار الخيل .

٢٠٥٢٦ - قُرَارِيَة اَلْجَو

Prévision du temps (F).

Prévision from time (E).

هو تشخيص الجو .

٢٠٥٢٧ - قُرَارِي كِين

هو اليبون الهندي ، اطليه .



فدس الماسكين



قَرَا اَسُورِي



قَرَاه التَبَت



قُرَارِيَة

٢٠٥٣٣ - قَرَاشَة (F). Butterfly, Moth (E).  
اسم شامل يطلق عل جميع الحشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. وبهم من شخص الاسم بحشرات الفصيلة القراشية دون سواها.

٢٠٥٣٤ - قَرَاشَة الحَصِيد (F).  
هي غشقة الحصيد، اطلبا.

٢٠٥٣٥ - قَرَاشَة الحِنطَة (F).  
هي غشقة القنص، اطلبا.

٢٠٥٣٦ - قَرَاشَة الزُعُرُو

هي كرنبية الزعرور، اطلبا.

٢٠٥٣٧ - قَرَاشَة السِمَم

Antigaster catalonialis (S). راجع دودة السم.

٢٠٥٣٨ - قَرَاشَة العَنَاقِيد

هي غلظت الكربة، اطلبا.

٢٠٥٣٩ - قَرَاشَة اللَّفَت

هي كرنبية اللقت، اطلبا.

٢٠٥٤٠ - قَرَاشَة المَلْفُوف (F).  
هي كرنبية الملفوف، اطلبا.

٢٠٥٤١ - قَرَاشَة جِرَاء القُطْن

Earias insulana هي دودة القطن الشوكية، اطلبا.

٢٠٥٤٢ - قَرَاشِيَّات

Papilionidae (S). Papilionidæ (F). Papilionidae, Swallowtails (E).

Ritter (D).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة، صولجانيات القرون. اجناسها وانواعها كثيرة المدد منتشرة في جميع اصقاع العالم.

٢٠٥٤٣ - قَرَاشِيَّة

Papilionaceae (S). Papilionacées (F). Papilionaceae (E).

سبط من فصيلة القزليات اجناسه نحو ٣٠٠ منها الاشجار والجنبات والمثلثات والاعشاب الحولية والمعمرة. معظمها زراعي غذائي او علي وصناعي.

٢٠٥٤٤ - قَرَاط \*

Coregonus fera (S).

Féra, Férat, Ferrat (F).

سمكة نهرية من السلمونيات. اعطانها بحيرات ميسورا وإيطاليا الشمالية وقد انتشرت تربيتها في الاخوار والاضواض الصناعية العميقة الفور. جسمها بطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى السمرة الخطية الخضراء المولاج. يعطها الى الفترة البيضاء. لحمها جيد الصنف مرغوب فيه كالمزور.

٢٠٥٤٥ - قَرَاغ ، قُرْعَة ، قَجْوَة

Lacune (F). Lacuna, Air-cell (E).

كل فراغ في النسيج النباتية.

٢٠٥٤٦ - قَرَاغ حُجْرَوِي

Vacuome هو في النسيج الحية جيوب دقيقة خالية من الهواء.

٢٠٥٤٧ - قَرَاغِي \*

Lacuneux (F). Lacunose (E).

نعت تعريفي يطلق عل النسيج النباتية التي يتخلل خلاياها فراغات مليئة بالهواء او بغيره من السوائل المختلفة. يقال نسيج فراغي.

٢٠٥٢٨ - قَرَاسِيُون ، بَازَاوَرْد

Marrubium (S). Marrube (F). Horehound (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة جميعها عطرية تميز برزها الصواع القريب الشبه من المسك. ساقها فراء غشوية مزنية. اوراقها متقابلة مستطبة بيضيه. نصلها كثيرة العروق، متجمعة الصفحة الحلقية البشرة، مسنة الحار. ازهارها صغيرة القد، ضمية التجميع. محورية الانتكاز || اعرف انواعه ما يلي.

٢٠٥٢٩ - قَرَاسِيُون اَبِيض \*، حَشِيَّة الكَلْب، قَلْبَة ، مَقْل الصَيْف

Marrubium vulgare (S). Marrube commun, M. blanc (F). Common white horehound (E). Maurandom, Weisse Andorn (D). Marrubio comune, Marrobio, Mentastro, Erba apiola, Prassine (I).

نوع من القراسيون وهو عشبة مبلولة تنبت في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات. تعلق من ٢٠ الى ٨٠ سم. ساقها فراء كثيفة الزغب الابيض. اوراقها صغيرة القد، بيضيه الشكل، سمكة التصل الحشن. ازهارها الى البياض الاخير || وهو قوي الرائحة المرصية، مر، حريف، لاذع وقابض. يدر البول ويخفف الحرارة ويفيد للتشنج ومعتل حالات السعال.

٢٠٥٣٠ - قَرَاسِيُون اَسْوَد \* ، بَلَطُوط اَلْأَرْض

Ballota nigra (S). Ballote fétide, B. noire, Marrube noir (F). Fœtid-horehound, Black horehound (E). Schwarze Bulte, Fenwibel, Zahnlose (D). Marrobio bastardo, M. nero, Ballota fetida (I).

نبات عشبي طيب ري من فصيلة الشفويات عطري الرائحة القوية، يدر البول ويبرد اللود ويزيل الحامض البولي ويفيد للتشنج || ساقه فراء. اوراقها متقابلة، اهليلجية، صغيرة القد نصلها خشن الصفحة، مسن الحافة. ازهاره دقيقة مستطبة ضمية التجميع، محورية الانتكاز لونها الى الجلوة.

٢٠٥٣١ - قَرَاسِيُون القَلْب \* ، بَقْلَة اَلْأَمْهَات

Leonurus cardiaca (S). Léonure cardiale, Agripaume, Cardiaque (F). Common mother-wort (E). Echtes Herzensspann (D). Cardiaque, Leonuro, Melissa salvatica (I).

عشبة برية طيبة مبلولة من فصيلة الشفويات. ساقها تعلق نحو ١٠٠ سم. اوراقها متعك متقابلة، نصلها مفرض الصفحة شديد الحشار. ازهارها صغيرة القد، ضمية التجميع، محورية الانتكاز لونها الى الحمرة تملوها رقة بيضاء || كان ولا يزال يستعمل في علاج امراض القلب عند الاطفال وبهم من قال ان مغلي نقيه يشفي الكلب.

٢٠٥٣٢ - قَرَاسِيُون مَائِي \*

Lycopus (S). Lycopo, Marrube aquatique, Pied-de-loup (F). Gipswort, Water horehound (E). Gemeiner Wolfstrapp (D). Licopo, Marrubio acquatico, Erba sega (I).

نبات عشبي طيب ري معمر من فصيلة الشفويات يكثر في المناطق والمواقع الرطبة. ساقه فراء. اوراقه متقابلة، لائقة، سنانية؛ نصلها منشاري الحشار، خلي البشرة. ازهارها بيضاء اللون، صغيرة القد، ضمية التجميع، محورية الانتكاز || يقال انه يظهر الجراح ويدملها وهو حريف لاذع يستعمل في التخفيف الاسود.



فَراسِيُون اَبِيض



فَراسِيُون اَسْوَد



فَراسِيُون القَلْب



فَراسِيُون مَائِي



قَرَاط

اينض الحنار || ازهاره خبيي الشكل ثلاثي الاطراف  
يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٠٥١٨ - **قَرَاغِيَّة** ٥. *Vacuisme* (F). *Vaculum* (E).  
القراغية مذهب فلسفي حكيم قديم المهد يقول بان الفراغ  
موجود في الطبيعة .

٢٠٥١٩ - **قَرِيُونُ الْأَقْدَمِين** \* ، **يَتَوَحُّ هِنْدِي**  
**زَكُوم هِنْدِي**

*Euphorbia antiquorum* (S). *Euphorbe des anciens* (F). *Ancient milk-wort* (E). *Wolfsmilch der alten* (D).  
*Euforbio indiano*, *E. triangolato* (I).

نوع من القريون البري الطبي المعمّر كان يستعمل في  
الماضي لعدة علاجات اخصها الاستسقاء والطحال وهو  
يستعمل الآن في الطب البيطري لانه سهل تنيف لا يتخلو  
من السموم الفعالة .

٢٠٥٢٠ - **فَرَامْبُوز** \* ، **عَوَسَجْ إِيْدَه** ، **عَوَسَجْ جُوي**

*Rubus idaeus* (S). *Framboisier* (F). *Red raspberry*,  
*Raspberry-bush* (E). *Echter Himbeerstrauch* (D).  
*Lampine*, *Lampone*, *Rovo ideo*, *Mora prugnola* (I).  
جنية مشمرة من جنس العليق وفضيلة الورديات . اوروبّا  
معمرة . سورها منتصبة بحول شائكة . اوراقها مركبة  
متعاقبة . وريقاتها لاقامية العدد الذي يراوح من ٢ الى  
٥ نسلها بارزة العروق سفنة الحافة ، مزينة الصفة  
الصل . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الانكاز ،  
مستطيلة المالبق ، يضاء اللون . ثمارها شاميل جزوية  
اللون او بتفسيجية عاقبة . وهي مأكولة مستحبة الطعم  
تعتبر من المرطبات اللينات || زراعتها تلوم في الموق  
نفسه من ١٠ الى ١٢ سنة . تتكاثر بالابلاخ التي تفرس  
على ابعاد ينيّة تراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ سم . وابعاد  
متخللة تراوح بين ١٢٠ و ٢٤٠ سم . وفي رغب في  
الآربة الحرجية القليلة الاندماج وفي المواق الظليلة الرطبة .

٢٠٥٦٠ - **قَرِيُونُ الصَّيَادِين**

*Euphorbia piscatoria* (S). *Euphorbe des pêcheurs* (F).  
نوع من القريون البري المعمّر . ساقه قرمها غليظة ،  
قطرها نحو ٢٠ سم . وطولها ثلاثة امتار . فروعه خرايب  
مستطيلة قطرها نحو ١٠ م . اوراقه لحية طول نحو ٥ م .  
وتعرض ٦ م . لوها الى الخفسار البحري . ازهاره  
خبيي التجميع ، خاسي او سبهي الاطراف . صهارته  
غزيرة المادة الجمالية الفعالة تستعمل في صيد الاسماك .

٢٠٥٦١ - **فَرَامْبُوزَة** ، **مَصَعَكَة**

*Framboise* (F). *Raspberry* (E).  
ثمرة الفرامبوز وهي غنية بالفيتامين « ث » للمئة غرام من  
لبها المأكولي تحوي من ٢٠ الى ٢٥ مغ . فيتامين « ث » .

٢٠٥٦١ - **قَرِيُونُ الصَّجَر** \* ، **يَتَوَحُّ السُّحُور** ،  
**رَمَادَه**

*Euphorbia helioscopia* (S).  
*Euphorbe hélioscope*, *Réveil matin*, *Herbe aux verrues* (F). *Sun spurge*, *Wort-grass*, *Wort-Wort* (E). *Sonnenwolfsmilch* (D). *Euforbio mirasole*, *Rogna*, *Titimalo elioscopio* (I).

نوع من القريون البري الطبي المعمّر . يقال  
ان ضباب اوراقه او عصارتها يقضي على التاتيل .

٢٠٥٦٢ - **قَرَان** ٥

*Fournier* (F).  
هو القران من البلور الامريكية ، اطلبه .

٢٠٥٦٢ - **قَرِيُونُ أَمْرِيَكِي** ، **قَرِيُونُ لَاقِيَايَ**  
**الْوَرَق** ، **يَتَوَحُّ الْمَكْسِك**

*Euphorbia heterophylla* (S). *Euphorbe hétérophylle*,  
*Poinsette d'Amérique* (F). *Mexican fire-plant* (E).  
*Poinsettia* (D). *Poinsettia d'America* (I).

نوع من القريون المحول . ساقه منتصبة تملو من ٣٠ الى  
١٠٠ سم . اوراقه منعقة ، السفلى منها بيضيه الشكل مدببة  
المنقصة ، نصلها مسن الحافة خلى الصفحة السفلى . اما  
الاوراق العليا فانها لا تقياسية الشكل والحجم منها البسيطة  
والممنقصة والمفرقة والمشرية . ازهاره قليلة العدد . ثنائياتها  
حر التفتح ، رباعية الانسان للثلاثة التجزي ، ازهاره  
يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٥٦٣ - **قَرَانَق**

*Tigre* (F).  
هو البر ، اطلبه .

٢٠٥٦٤ - **قَرَاوَلَة**

*Fraise* (F).  
هي الشيك ، اطلبه .

٢٠٥٦٥ - **قَرَاوَلِيَات**

سبط من فصيلة الورديات يعرف بالشليكيات .

٢٠٥٦٦ - **فَرَاوِيَة**

*Caille* (F). *Quail* (E).  
واحدة القرى اي السباقي .

٢٠٥٦٧ - **قَرِيُون** ، **يَتَوَحُّ** ، **تَاكُوت** ، **عُنْجُد**

*Euphorbia* (S). *Euphorbe* (F). *Spurge*, *Devil's milk* (E).  
*Wolfsmilch* (D). *Euforbio*, *Titimalo* (I).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الفربيونيات .  
انواعه نحو ١٦٠٠ منها الحولية والمعمرة ومنها المشية واليقبية  
والخشوشية والحسية الاوراق كالصبار || اعطائها البلاد  
الحارة . جميعها دماة لبنية العصارة . معظمها طليي جحالي  
للاداء || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٠٥٦٨ - **قَرِيُونُ أَيْبُسْ الْتَوَلِي**

*Euphorbia marginata*, *E. variegata* (S). *Euphorbe marginée* (F).  
نوع من القريون الحولي . ساقه منتصبة مزينة تملو من ٦٠  
الى ٩٠ سم . اوراقه الجمالية متعاقبة اما العليا والهامية  
فمتصالبة وهي لائقة ؛ نصلها بيضي الشكل ، ساجو الصفة ،



فَرَامْبُوز



فَرِيُونُ الْأَقْدَمِين



فَرِيُونُ الْفَجَر

٢٠٥٧٧ - قَرْجِي، خَلْقِي، أَصْلِي

Congénital (F). Congenital (E).

نمت تمرني يرادف الصفة الوراثية حسنة كانت أو سيئة .

٢٠٥٧٨ - قَرْجَانَة، قَطْر الحَقْل (F). Pulliete

جنس فطور يأكل من فسيلة الفاريفونيات . أشهر أنواعه الفاريقون المرئي .

٢٠٥٧٩ - قَرْج

ولد الطائر هذا الأصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والاني فرخة وجم القلة أفرغ وأفرغ والكثرة فراخ .

٢٠٥٨٠ - قَرْج، بَيْتِيلَة، وَكَزَة، وَلَد، طَنْب

Rejet, Rejeton (F).

Young shoot, Sprout, Offshoot (E).  
الفرخ والبَيْتِيلَة والكَزَة والولد والطنب والمرش قضبان تنشأ من براعم عرضية على موقع ما من ساق الشجرة ولا سبل الاربوية المقطوعة .

٢٠٥٨١ - قَرْج \* (F). Perche (F). Perca (S).

جنس اسمك من فصيلة القرشيات ورثة النظميات الشائكات الزعانف . أنواعه عديدة جميعها من اسمك المياه العذبة تعيش في الأنهر والبحيرات والايواض . طولها يراوح بين ٢٠ و ٤٠ سم . ألوانها تختلف مع فصول السنة ، يكثر فيها اللون الأخضر المذهب يطلو بتجديد معترض اسمر يحزم الظهر والايلايل وينتهي عند البطن || اعرف أنواعه وأشهرها :

الفرخ المذلول (F). Perca fluviatilis (S).

Commune (F). Common perch, European perch (E).

الفرخ الإيطالي (F). Perca italica (S).

الفرخ التركستاني (F). Perca schrencki (S).

Perche du Turkestan (F).

الفرخ الكندي (F). Perca gracilis (S).

Perche du Canada (F).

٢٠٥٨٢ - قَرْج نِيلِي

Latès du Nil (F).

هو لاسل النيل ، اطلبه .

٢٠٥٨٣ - قَرْج البَطْ

Caneton (F).

الذكر من صغير البط . Duckling, Young duck (E).

٢٠٥٨٤ - قَرْج النَحْل، فَرْج النَحْل

Essaim d'abeilles (F). Bee-swarm (E).

ثول من النحل هجر خليته لتسير خلية جديدة . والفرخ يتألف من ملكة وذكر وعاملات .

٢٠٥٨٥ - قَرْجَة البَطْ (F). Canette

الانثى من صغير البط . (E). Small duck

٢٠٥٨٦ - قَرْجَة خَصِيَة

Poularde (F).

فرخة تخصى وتسمن . وتسمى ايضاً مقطوعة . Fat pullet (E).

٢٠٥٨٧ - قَرْجَة سُلْطَانِيَة

Poule sultane (F).

هي البرهان السلطاني ، اطلبه .

٢٠٥٩٥ - قَرْيُون لَسِيرُس \*، قَرْيُون

مَنْصَلَب، حَبَّ المُلْك

Euphorbia lathyris (S). Euphorbe à pource, Eupurge, Catapuce, Catherinette (F). Capser-spurge, Myrle spurge, Wild caper (E). Springwolfsmilch (D). Catapuzza, Euforbio latiride, Gomitaria (I).

نوع من الفريون وهو نبات لين يري محول يكثر في الموالج الرطبة ويصير من النباتات الضارة || ساقه تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه متقابلة متصالية رباعية ، نعلها ساني الشكل وسيد الفلج . عادم المروق ، بحري اللون ، يطول من ٦ الى ١٢ سم . ويبرس نحو ٢ سم . ازهاره غيبية الشكل ، رباعي الاطراف الفرقة ، يستمر من حزيران الى تموز .

٢٠٥٩٦ - قَرْيُون مَخْرُوسِي \*، شَعْرُور، عَمَقْ

Euphorbia officinarum (S). Euphorbe officinale, E. des apothicaires, E. de juba (F). Poisonous gumthistle (E). Gebräuchliche wolfsmilch (D). Euforbio officinale, E. del spezierie (I).

نوع من الفريون البري الطبي الممر . ساقه منتصبية . غرابيه منسلقة تقطع نحو ٨ سم . لوها الى الحصار الباحت . حار ضلوصها قرني للمادة اغبر اللون || عصارته غزيرة المادة الجسالية الشائمة الانضمال الطبي .

٢٠٥٩٧ - قَرْيُون مَدَلِّي (S). Euphorbia pendula

Euphorbe pendante (F).

نوع من الفريون السروي الممر . ساقه منتصبية فراء . فروسه غرابية اسطوانية دقيقة اسلية الشكل ، متدلية . فواصلها تطول نحو ٥ سم . اوراقه حراشف لحمية مظنة الزوايا ، بحرية الحصار ، متقابلة الاوتكار .

٢٠٥٩٨ - قَرْيُونِيَّات، يَتْرُوبِيَّات

Euphorbiaceae (S). Euphorbiacées (F).

Euphorbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أنواعها نحو ٣٥٠٠ تنتمي الى ٢١٠ اجناس . جميعها من النباتات السامة للبيئة الصارة || اعطائها البلاد الحارة . معظمها بري وذيبي وبعضها طبي وصناعي .

٢٠٥٩٩ - قَرْث السرجين ما دام في كرش الحيوان .

٢٠٥٧٠ - قَرْج، قَرْجَة

Vulva (F). Vulva (E).

هو مجسمة الأعضاء التناسلية الخارجية في انثى الحيوان

يشمل الشفرين والزربية والبطانة والكنية .

٢٠٥٧١ - قَرْج الأرض هو سورنجان الجبل ، اطلبه .

٢٠٥٧٢ - قَرْجَار

Compas

هو البركار ، اطلبه .

٢٠٥٧٣ - قَرْجَارِي (E). En cercle (F). At circle

نعت تمرني توصف به الخطوط الدائرية .

٢٠٥٧٤ - قَرْجَة

Orifice (F).

أطلب فتحة .

٢٠٥٧٥ - قَرْجَة

Pansage (F). Grooming (E).

تنظيف جلل الحيوان بما عليه من ابراع واقدار وفبار...

٢٠٥٧٦ - قَرْجُون، مَحْسَة

Etrille (F).

إداة من حديد تستعمل لتنظيف جلل الحيوان . Curry-comb (E).



فريون ليسرس



فريون مخزي



فرخ

Individualité (F). **فَرْدِيَّة ، شَخْصِيَّة** ٢٠٥٩٨

Individuality (E).  
جَماع الصفات التي يتميز بها الفرد عن سائر المجموع .

Imparité (F). **فَرْدِيَّة ، وَتَرِيَّة** ٢٠٥٩٩

Imparity (E).  
كون الشيء غساً أو فرداً .

Troupeau de moutons (F). **فَرْد ، فَرْد** ٢٠٦٠٠

Flock of sheep (E).  
قطيع الغنم الكبير العدد .

Ecrémage (F), Skimming (E). **فَرْد الكَثَاة** ٢٠٦٠١

فرز الكَثَاة عن الحليب وقد يتم إما آلياً باستعمال الفرازَة  
وأما طبعياً يترك الحليب بعض الوقت لتطفو الكَثَاة تفتش .

Graines de coton (F). **فَرْدُوع** ٢٠٦٠٢

Cottonseed (E).  
حب القطن ، الواحدة فرضة .

Interspécifique (F). **فَرْدِي** ٢٠٦٠٣

Interspecific (E).

**فَرَس** ٢٠٦٠٤

نبت وقيل هو القمصاقر والبروق والجن .

Jument, Cavale (F). **فَرَس ، حُجْر** ٢٠٦٠٥

Mare, Brood-mare (E).  
أنثى الحصان .

Equus caballus (S). **فَرَس** ٢٠٦٠٦

Cheval (F), Horse (E).

للذكر والانثى . ج افراس . وجماعة الافراس تدعى الخيل  
جميعها خيول وواحدها خاتل . والذكر في الخيل يدعى  
حصان . ج احصنة وسمن والانثى تدعى حجرة . ج حجور  
وحجوره واحجار || وكنية الفرس ابو شجاع وابو طالب  
وابو مذك وابو المنهار وابو النجى وابو مضي .  
والفرس حيوان داجن ووحشي من فصيلة الخيليات ، ضرويه  
وسلالاته عديدة تختلف باختلاف اشكالها ورساقها ، اشهر ضرويه  
اجسامها وسرعة عدوها ومدى نشاطها الخ . اشهر ضرويه  
وسلالاته ما يتبع .

٢٠٦٠٧ **فَرَس آري ، فَرَس آسِيَوِي**

Equus caballus aryanus, E. caballus asiaticus (S).

Cheval arien (F), Aryan horse (E).

ضرب من الخيول الآرية او الآسيوية . اصرامه عديدة  
اشهرها العربي والمجسمي والقفقازي .

Pégase (F). **فَرَسْ أَعْظَم** ٢٠٦٠٨

Pegasus, Flying horse (E).

الفرس الاعظم كوكبة نجوم شمالية المفع لا تبد كثيراً  
عن الدب الاكبر . مركزها بعد كوكبة ذات الكرسي ||  
بنحوها المتيرة والخافتة عديدة . والعراب تسمي النجم الذي  
على السرة « سرة الفرس » . وتسمي الاربعة اُتيرة التي على  
المرجع « من الفرس » و « منكب الفرس » و « عتق الفرس »  
و « جناح الفرس » . والذي على جفئته « أنف الفرس » .  
وتسمي الاثنتين المتقدمين « العروة » والاثنين الذين في البدن  
« النائم » والكراب . والاثنين الذين على الرأس « سد  
الهام » . والاثنين الذين على العنق « سد الهام » .  
والاثنين المتقاربين بين الذين في الصدر « سد البار » .  
والاثنين الذين على الركبة اليمنى « سد المطر » .

Percidae (S). **فَرَسِيَّات** ٢٠٥٨٨

Percidés (F), Percidae (E).

فصيلة اسماك من العظمايات الشائكات الزعانف . اجناسها  
وانواعها عديدة ، اشهرها الفرخ .

Farad **فَرْد** ٢٠٥٨٩

وحدة قياسية كهربائية .

Individu (F), Individual (E). **فَرْد** ٢٠٥٩٠

كل شيء له وجود مستقل وبشكل نوعي معين وصفات خاصة  
تميزه عن غيره .

٢٠٥٩١ **فَرْد**

الفرد نجم يتر من كوكبة جماع اثني . مركزه في آخر العنق .  
وقد سمي فرداً لانفراده عن اشباهه .

٢٠٥٩٢ **فَرْدُوع**

Anaspis (S).

Anaspis (F), Anaspis (E).

جنس حشرات من فصيلة المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق  
الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق  
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيأة ،  
معتدلة التبليط ، طول من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ،  
قليلة التشويز . عيونها ماصة . تأثيرها وبلاستها نظامية .  
قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها مقببة الشكل .  
اغادها مستطيلة ، لاسفة . قوائمها نشيطة . اثنائها ثنائية  
اللون || الحشرة الجملانة واسعة مرتها ازهار الخبيات .  
البرقة خاملة .

٢٠٥٩٣ **فَرْدُوسِيَّات**

Anaspididae (S).

Anaspididae (F), Anaspididae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة  
الحرارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،  
معتدلة التبليط ، طول من ٣ الى ٧ سم . رؤوسها صغيرة ،  
قليلة البروز . عيونها ماصة . تأثيرها وبلاستها نظامية .  
قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها  
نصف دائرية الشكل ، اغادها لاسفة . قوائمها نشيطة .  
ارساعها ورباعية الشكل في الزوج الخلفي ، خامستها في  
الزوجين الامامي والارسط . اثنائها ملونة || جميعها خاملة  
وراشعة . تعيش خاصة على اوراق وازهار الخبيات ||  
اشهر اجناسها الفَرْدُوع .

٢٠٥٩٤ **فَرْدُود**

الفردود كواكب مصطفة خلف الثريا .

Jardin (F). **فَرْدُوس** ٢٠٥٩٥

هو البستان ، الحديقة .

Paradiseidae (S). **فَرْدُوسِيَّات** ٢٠٥٩٦

Paradisiens (F), Paradiseidae (E).

فصيلة من رتبة الجوامث تشمل طيور الفردوس .

Haploide (F). **فَرْدِي المتنطش** ٢٠٥٩٧

Haploid (E).

صفة الحجيرات الحيوانية والخللايا النباتية الوسيطة المتنطش .



فَرْدُوع

والسنتية بين الكواكب . وهو يعادل المسافة التي يجتازها النور بمدة ٣٢٥٠٠٠٠ سنة .

Perseé (F).

٢٠٦٢٠ - فرسأوس

كوكبة نجوم شمالية الموضع تدعى سيوس .

Lieue, Parasange (F).

League, Parasang (E).

الفرسخ وحدة قياسية مسافة قديمة كانت تساوي في الماضي نحو ٤٠٠٠ م. وتساوي الآن نحو ٥٢٥٠ م.

Parsec (F). Parsec (E).

الفرسخ الفلكي وحدة قياسية اصطلاحية تستعمل لتقدير عن المسافات الفلكية . طوله نحو ٣,٢٥٦ سنة ضوئية .

Actinostemma (S).

Actinostemme (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرعيات . مهدبا بعض مناطق الشرق . سوقها عارية ، جمالها مدونة . اوراقها كفية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن ، المتكبة منها عشقودية التجميع اما الملقية ففردية او ضمية التجميع . ثمارها اصبيحة الشكل ، تافهة العلم ، تستعمل كخللات || لها نوعان معروفان .

٢٠٦٢٤ - فرسُ عُنْكُوِي ٥

Actinostemma paniculatum (S).

Actinostemme paniculé (F).

نوع من الفرس . ساقها عارية تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كفية خماسية الفصوص الاصعية تطول نحو ١٠ سم وتعرض نحو ٧ سم . ازهارها عشقودية التجميع . ازهارها صفراء اللون . ثمارها اصبيحة الشكل مالة تطول نحو ٧ سم .

٢٠٦٢٥ - فرسُ مُقَصِّص ٥

Actinostemma lobatum (S).

Actinostemme lobé (F).

نوع من الفرس . ساقها عارية تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كفية ثلاثية او خماسية الفصوص تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٨ سم . تصالها خلية المروق على الصفحتين . ثمارها اصبيحة الشكل ، صغيرة القذ ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم .

Pêcher (F).

٢٠٦٢٦ - فرسك

هو الدراق ، اطلبا .

٢٠٦٢٧ - فرسين

الفرس : طرف خف البعير والشاة . ج فراس .

٢٠٦٢٨ - فرش

هو الشفنين المجوز ، اطلبا .

٢٠٦٢٩ - فرش الصَّبْع

هو الشاة الخشة ، اطلبا .

٢٠٦٣٠ - فرشاج

الارض الواسعة العريضة وقيل السحاب الذي لا مطر فيه .

٢٠٦٣١ - فرشة

Litière (F).

Stable-litter, Straw (E).

فراش من حشيش او قش او تبن وغيرها من المواد النباتية يفرش تحت الدواب في الاصطبلات لترقد عليه .

٢٠٦٠٩ - فرسُ النهر ، برليق

Hippopotamus (S).

Hippopotame (F). Hippopotamus (E).

جنس حيوانات لبونة من ذوات الحسافر عظيمة القذ ، سفينة الجلد ، ليس في جسمها شيء يشبه الفرس . رأسها وتوابعه منتهى الغلظة والكبر . جسمها بالغ الضخامة ، عنقها وقوائمها وذنبها قصيرة || مهدبا البلاد الافريقية الحارة . تعيش في مياه الانهار وتل سفانها . قوتها الاعشاب .

٢٠٦١٠ - فرس السباق الانكليزي

Pur sang anglais (F). English blood-horse (E).

هو الفرس الانكليزي الاصيل يعتبر اجود سلالات غيول السباق .

Cheval baroe (F).

African horse (E).

مصر من الجياد القوية الشيلة . مهدبا بلاد المغرب . يقال انها سلالات مختلفة نتجت عن تصالب الخيول العرب مع غيول المغرب الاصلية وذلك على اثر الفتح العربي .

Mante religieuse (F).

٢٠٦١٢ - فرسُ التَّيِي

هي السروقة ، اطلبا .

٢٠٦١٣ - فرسُ إنكليزي اصيل ، فرسُ السباق

Pur sang anglais (F).

English blood-horse (E).

الفرس الانكليزي الاصيل او الخقيق او الكرم هو اسبق الخيل كافة . نشأ من اب عربي وام انكليزية واصبح مرموا مرمجا مرمولا له كتب انسابه المصبوبة وله شهرته المالية التي تنفي عن كل تعريف .

٢٠٦١٤ - فرسُ بُونِي ، بُونِي

Poney, Ponet (F).

Pony (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جياد صغير القذ خفيف الوزن .

Cheval trotteur (F).

Trotter horse (E).

كل فرس ركض الخلب . والخيول الخبابة سلالات تميزت بهذا النوع من السير السريع الخاص .

Petit cheval (F).

Equuleus (E).

الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية الموضع مشهورة باسم قطرة الفرس ، اطلبا .

٢٠٦١٧ - فرسُ عربي اصيل ٥

Pur sang arabe (F). Arabian blood-horse (E).

هو الفرس العربي الخقيق الكرم وهو اصيل الخيل واجلها واصحها لفرس || سلالاته المشهورة عديدة اغصها كخيول المجوز والمقلويات وام عروق والشويمات والبيات والمعتيات ولها ابيات والجلف .

٢٠٦١٨ - فرساج

الفراخ : الارض العريضة الواسعة . ج فراشج .

Mégaparsec (F).

Megaparsec (E).

الفراخ وحدة قياسية تستعمل في تحديد الابعاد الفضائية



فرس البحر



فرس عربي اصيل

اتار. هيكلا هيكل الفار. اوراقها معتقة مستطيلة الزناد  
تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٣. نصلها  
احليبي الشكل، ذلق الزنم الانخير || ازهارها وردية  
او قرمزية اللون. عناقيدها لبدة قرينة من الاستدارة.  
ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٠٦٤٥ - **فَرْصَاخ كَثِيرُ الزَّهْرِ** (F).  
*Hakea florida* (S).  
*Vaubier multiflora* (F).  
نوع من الفرضاخ وهو جنية ترينية سريرية تملو من ١٥٠  
الى ٢٠٠ سم. اوراقها صغيرة خفيفة. نصلها عادم العروق.  
مسن الحافة، مدبب العقصة || ازهارها صغيرة عطرية  
البرق، بيضاء اللون. عناقيدها كثيرة العدد، متوسطة  
الحجم || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٠٦٤٦ - **فَرْصَاخ مُهَدَّب** (F).  
*Hakea acicularis* (S).  
*Vaubier à aiguilles* (F).  
نوع من الفرضاخ وهو جنية ترينية سريرية تملو من ١٠٠  
الى ٢٠٠ سم. اوراقها عطية غندة الصفحة السفلى،  
شاذلة المقصدة المهدبة || ازهارها غبراء اللون، عشوية  
التجميع. ثمارها جرابية عمودية، ثنائية التلوغس الطرفية.  
ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٠٦٤٧ - **فَرْصَاخ الشَّوْطِي** (F).  
*Garypus littoralis* (S).  
*Garypus des rivages* (F). *Garypus* (E).  
دودية من الفراضاخ تنتمي الى فصيلة الكرنسيات ورتبة  
العقريات الكاذبة. جسمها صغير القند يطول من ٥ الى  
٧ م. ثوبها الى الرتبة العلوية. صدرها مزواني الشكل،  
ملطو تحطيد اسمر. مقنباها مستطيلان يهتبان بملقطين  
كلاط المقارب لوتها الى السرة. يعلها احليبي الشكل  
مقطوم الطرف، عادم الذنب، واضح التقسيم السعبي.  
عينها مركبتان، صغيرتان. جرابها دقيقة، مبعرة  
الحلب. الذكر اصغر قدماً من الانثى || تألف الشواطئ  
البحرية. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات الصغيرة والحوام.  
تتمر نحو خمس سنوات || تقتر من النبويات النافمة  
الامؤدية.



فرض الشواطئ

٢٠٦٤٨ - **فَرْص** (F).  
الشاة الفارسي اي المسنة وقيل المكسورة القرنين.

٢٠٦٤٩ - **فَرْصِي** (F).  
*Hypothétique* (F).  
*Hypothetic* (E).

٢٠٦٥٠ - **فَرْط**، **تَفْطُش** (F). *Gaulage* (F). *Beating* (E).  
جني الثآير بواسطة الضرب بالمصاوي على وكتر استعمالها  
في الزيتون والجوز واللوز. وهي مفرقة لانها تحفش وتعتل  
الثآير وتحت الارواق وتكسر الاناثن وقد تؤذي الاغصان.

٢٠٦٥١ - **فَرْطُ التَّطَوُّر** (F).  
*Hypermétamorphose* (F). *Hypermetamorphosis* (E).

٢٠٦٥٢ - **فَرْطُ القَتْل** (F).  
*Blanc-estoc* (F). *Thrust* (E).  
هو قطع الشجر الحربي بأسراف.

٢٠٦٥٣ - **فَرْطُوس** (F).  
*Pénis de l'éléphant et du porc* (F). *Penis of the elephant and pig* (E).  
هو قضيبة الفيل والخنزير.

Noyaux de balsamé (F).  
الفرض : نوى للملح.

٢٠٦٥٣ - **فَرْصَاد** (F).  
*Mûrier* (F).  
هو التوت، المطلب.

٢٠٦٥٤ - **فَرْصَادِي** (F).  
*Mûriforme* (F).  
نمت وصني تعرف به الاشكال الشبيهة بشاميل التوت.

٢٠٦٥٥ - **فَرْصِيد**، **فَرْصِيد** (F).  
*Pépin de raisin* (F). *Grape-stone* (E).  
الفرضيد والفرضيد: عجم العنب والزيزيب.

٢٠٦٥٦ - **فَرْصِيدِي** (F).  
*Acineux* (F). *Acinose, Acinous* (E).  
ما كان شكله شكل الفرضيد.

٢٠٦٥٧ - **فَرْصِيدَات** (F).  
*Arbres à pépins* (F). *Stone-trees* (E).  
هي الاججار الفرضيدية البذور كالكرومة والتفاح والاجاص  
والفجل الخ...

٢٠٦٥٨ - **فَرْصُصِي** (F). *Acinetic* (E).  
*Acinétique* (F). *Acinetic* (E).  
نمت تمريني يطلق على كل ما يقف حركة القلب.  
البيجيتال الاجزائي نبات فرضصي.

٢٠٦٥٩ - **فَرْصُش** : فرض : تمر الدوم ما دام احمر.

٢٠٦٦٠ - **فَرْصُ الصَّرِيْبَة** (F).  
*Imposition* (F).  
هو اتباع نظام تقني لاجل تقدير الاموال وما يكسبها ان  
تتمثل من الضرائب.

٢٠٦٦١ - **فَرْصَاخ** (F).  
*Hakea* (S). *Vaubier* (F).  
جنس الاجار وجنات برية وزراعية ترينية من فصيلة  
الفصيات. انواعها عديدة. اقليمها اقليم الزيتون. سوقها  
فرما. اوراقها متعاقبة، جلدية النصل. ازهارها صغيرة  
القد، عشوية التجميع، بشارزة الادمية المنحرفة.  
اشهر انواعها ما يتبع.

٢٠٦٦٢ - **فَرْصَاخ صَفْصَافِي الْوَرَق** (F).  
*Hakea saligna* (S). *Vaubier à feuilles de saule* (F).  
نوع من الفرضاخ وهو جنية ترينية سريرية تملو من ٢٥٠  
الى ٣٥٠ سم. اوراقها وحيدة الفص، عادمة العروق  
تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢. نصلها  
مالس البشرة، بحري اللون، ابري العقصة || ازهارها  
غبراء اللون متقوية التجميع، محورية الارزكان || ازهارها  
يستمر من نيسان الى تموز.

٢٠٦٦٣ - **فَرْصَاخ عَطِر** (F).  
*Hakea suaveolens* (S). *Vaubier à odeur suave* (F).  
نوع من الفرضاخ، وهو جنية ترينية سريرية تملو من ١٠٠  
الى ٣٠٠ سم. فرومها خلية اللحاء، ففدية اللون. اوراقها  
مفردة، عطية التشرج : نصلها جامد التسج، شاذل  
الاطراف المهدبة || ازهارها بيضاء اللون، صغيرة القند،  
فواحة العرف العطري || ازهارها يستمر من ايار الى  
تموز.

٢٠٦٦٤ - **فَرْصَاخ عَاَرِي** (F).  
*Hakea laurina* (S). *Vaubier laurier* (F).  
نوع من الفرضاخ وهو شجرة ترينية تملو من ٤ الى ١٠

Phryganeidae (S). ٢٠٦٦٤ - فَرْغُونِيَّات \* ٢٠٦٦٤

Phryganéides (F). Phryganeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تعيش قرب مجاري الماء || اجناسها لاقائية الشكل والحجم، تطول من ٢ الى ٦ سم. اثارها مزرقة || اشهر اجناسها الفرجون.

٢٠٦٦٥ - فَرْقَار

شجر صبور على النار تتخذ منه المساس والقصاص.

20666 - فَرْقَارَة ، دِيكُ الرِّيح (F). Girouette

هي الدرة جهاز يدل على جهة مهب الريح.

20667 - فَرْقَارَة Tussilage (F).

هي حشيشة السعال، اطليه.

20668 - فَرْقَحِين Pourprier (F).

هو البقلة الحقة، اطليه.

٢٠٦٦٩ - فَرْقَح \* ، لُبَيْبَة ، حَبِيْبَا

Euphorbia peplus (S). Euphorbe des vignes, Esule (F). Wild purslane, Purple spurge (E). Gartenwolfs-milch (D). Euforbio delle vite, Calenzuola piccola, Peplio (I).

نوع من الفربيون وهو نبات عشبي بري طلي معمر. يرغب في الاراضي الملاحية وفي الآخرة الرملية. يكثر في الكروم وحل جوانب الطرقات. ساقه فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. عصارته لينة، لزجة، يبيضا اللون، حريفة، ناعمة، تستعمل في القضاء على التآكل. اوراقه متعاقبة، رعيّة الشكل، صغيرة القد، مدببة المقصّة. ازهاره عكوكلية التجميع وردية اللون.

20670 - فَرْفُر Poule d'eau (F).

هو برهان فرفور، اطليه.

20671 - فَرْفَرَان Guttier (F).

هو الجندب الحنطي، اطليه.

20672 - فَرْفُور هو البيراء الزياء، اطليه.

20673 - فَرْفُورَة \* ، فَرْفُورَا Purpura (S).

Pourpre (F). Purpura (E).

جنس اصداف بحرية كثير الانواع جميعها متشابهة الاشكال متباينة الاحجام يستخرج منها الابروان. اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة يكثر ويوجد في المتوسط.

20674 - فَرْفُورَة Mulle brun (F).

سمكة بحرية تدعى طرستوج اسمر، اطليه.

20675 - فَرْق Delta Céphée, Alfirk (F).

Alfirk, Alphirk (E).

الفريق نجم من كوكبة قيفاس يدعى ايضا «دلتا قيفاس» وهو من النجوم النابضة للاستقارة الومع. يبدو ان حجمه يفوق حجم الشمس نحو عشرة آلاف مرة.

20676 - فَرْقِي Dichotome (F).

Dichotomous (E).

نمت وصي يستعمل دلالة على السوق المزودة والافصان والافنان ؛ فتقول ساق فرقة وفن فرق .

Groin (F). ٢٠٦٥٤ - فَرْطُوسَة ، فَرْطِيسَة

Snout (E). هو عظم الخنزير ويعرف بالفتلية .

20655 - فَرْطُوش Sparassis (S).

جنس فطور من فصيلة الدبوسيات . انواعه قليلة تتميز بقصر وفلاظة سويقها ، بسخامة نكهتها الفارشة الخددة التي يبلغ قطرها نحو ٤٠ سم. ويتنديدها المتركب الموج. لوها الى البياض اللبني ونها الى الصفرة ، لحيتها يبيضا المقطع خاتفة العرف || تركيب جلدوه الصنوبر تقبب عن الخشب وانحراف لونه نحو الجوزة المابقة ثم انقرض وانحلت الحواجز الخليلوية التي تنهي دقيقة كالفينار .

20656 - فَرْع Branche (F).

Branch, Bough, Limb (E).

كل غصن غلط وحل اقصائاً حلت اقصاءاً .

20657 - فَرْع ، عَقَب ، سَكِيل

Descendant (F). Descending (E).

هو كل من ولد من اصل في حبل القنب المنحدر. الاولاد هم الفروع والاباء هم الاصول .

20658 - فَرْعَة \* ، قَمَلَة الرّاس

Pediculus capitis (S). Pou de tête (F). Louse (E).

حشرة من الفرجيات، طولها براوح من ٣ الى ٣ م. تركيب الرأس. مكها يدعى صتيان وهو ابيض اللون تنحمة الاثنى على الشعر فينقب بعد ستة او سبعة ايام. والفروعة تعيش نحو ٧ اسابيع وتبيض نحو ٣٠٠ مكنة.

20659 - فَرْعُؤَل Hyenon (F). Young hyena (E).

صغير الضبع ويدعى بهلد؛ والاثني فرولة. ج فراصل وفراغلة.

20660 - فَرْعِيَّات Pediculidae (S).

Pédiculidés (F). Pediculidae (E).

فصيلة من القملقيات، اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد مغلطة الجسم المبطل، صغيرة الرأس، كبيرة المويينات، ثوبا الى الطحلة المابقة || اشهر اجناسها الفرعة والسمة والبطيوخ.

20661 - فَرْعِ اَوَّل

الفرغ الاول او فرغ الدلو المقدم منزل من منازل القمر البائية. الدلو اربعة كواكب، اثنان منها هما الفرغ الاول، واثنان الفرغ المؤخر || رقيب الفرغ الاول يدعى الصرقة.

20662 - فَرْعِ ثَان

الفرغ الثاني او فرغ الدلو المؤخر منزل من منازل القمر البائية. وهما الشطر المؤخر من الدلو || رقيب الفرغ الثاني يدعى المواء.

20663 - فَرْغُون \* Phryganea (S).

Phrigane, Phrygane (F). Phryganea (E).

جنس حشرات من فصيلة الفرجونيات ورتبة جلوليات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في منظر اقطار البلاد. المعتدلة الحارة والحارة || حشراتا الجملانة تعيش على اليابسة. اساديمها تموش في الماء ملتحفة بجلاييب متباينة الاشكال مصنوعة بالريال وحات الاصداف وقتات المواد الخشبية وغيرها .



فرقة



فرغون



فرغ



فرولة (صدفة)





فَرْقَى لَوْز

الصفحة السفلى من بطها تربية اللون. قوائمها مستطيلة  
الانقباض والظنايب || مرتتها اشباب البراري والحراج .

٢٠٦٨٩ - قَرْم ، قَرْمِيَّة  
Hachage (F).  
Chopping (E).  
هو قطع او تجزئة الملف الطويل او الكبير الحجم قبل  
تقديمه الى المائدة .

٢٠٦٩٠ - قَرْمَل ، كَبَّاحَة ، كَبَّاحَة  
Frein (F). Brake (E).  
اداة الكبح . اشكالها عديدة ومختلفة اما اشداهها واحدة .  
ج فرامل .

٢٠٦٩١ - فُورْمَلْدِهَيْد ، فُورْمَلْدِهَيْد  
Formaldéhyde (F). Formaldé-  
hyde (E).  
اطلب فورميدل .

٢٠٦٩٢ - فُورْمَلِين ، فُورْمَلِين  
Formaline (F).  
Formalin (E).  
اطلب فورمالين .

٢٠٦٩٣ - فُورْمُول ، فُورْمُول  
Formol  
هو الفورمول ، اطلبه .

٢٠٦٩٤ - فُورْمِيوم ، فُورْمِيوم  
Phormium (S). Phormier (F).  
جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه  
قليلة معظمها بري . اوراقها قرصية الانتشاح ، ثنائية  
الترتيب ، مستطيلة الجرم . نصلها خطي الصفحة ، جامد  
التسج اللينى التركيب . ازهارها كبيرة القد عقدية  
التجميع تركز على شراخ منتصب غليظ || اعرف انواعه  
واشهرها ما يلي .

٢٠٦٩٥ - فُورْمِيوم كُوكْ  
Phormium cookianum (S). Phormier de Cook (F).  
نوع من الفربيوم الزبني . اوراقه تطول من ٦٠ الى  
١٠٠ سم . نصلها قدي الشكل ، بارز الحد ، جامد  
الصفحة ، اخضر اللون ، احر الكظر . شراخه يعلو  
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ازهارها كبيرة القد منتصبه ، لونها  
الى الصفرة يعلوها موج اخضر || ازهاره يستمر طوال  
فصل الصيف .

٢٠٦٩٦ - فُورْمِيوم مُتَصَبَب \* ، كَتَّان زَيْتَنَدَه  
Phormium tenax (S). Phormier tenace, Lin de la  
Nouvelle-Zélande (F). Flax lily, New Zealand flax  
(E). Neuseelandflachs, Zähle Flachslilie (D). Formio  
tiglio, Lino della nuova Zelanda (I).

نوع من الفربيوم الزراعي الصناعي . يزرع لاوراقه  
اللينة الشائكة الاستعمال في ثي الصناعات النسيجية .  
اوراقه جامدة النصل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .  
وتعمر من ٤ الى ٦ نصلها اخضر اللون اسمر الموج  
يعلو على كامل استطالته كظر احر . شراخه الزهري  
يعلو من ٣ الى ٤ انتار . ازهارها كبيرة القد منتصبه صفراء  
اللون او حمراء .

٢٠٦٩٧ - فُورْن  
Four (F).  
Oven, Bakehouse, Kiln (E).  
بناء خاص يختلف الاشكال والاحجام ويواد البناء واللود  
يستعمل في تقجير الحرارة اللازمة لبقاد بعض الاعمال  
الصناعية .

٢٠٦٧٧ - فُورْقَى (F). Purgative flax (E).  
هو الكتان المسهل .

٢٠٦٧٨ - فُورْقَى النَّحْل ، فُورْقَى النَّحْل  
Essaim d'abeilles (F). Bee-Swarm (E).  
ثول من النحل هجر غليته لتعير غلية جديدة .

٢٠٦٧٩ - فُورْقَاه  
هي الشاة والتمر البعيدة ما بين الطيرين .

٢٠٦٨٠ - فُورْقَد  
الفرقد نجم من كوكبة فيفاوس قريب من القطب الشمالي  
يمتدح به . وهما فرقدان .

٢٠٦٨١ - فُورْقَد  
الفرقد : لشد البقرة وقيل لشد البقرة الوحشية . والفرقد  
كذلك .

٢٠٦٨٢ - فُورْقَع لَوْز \*  
Agrypnus notodonta (S).  
فرقع لوز هو الاسم المصري لخرقة من السالويات كبيرة  
القد ، طولها نحو ٤٠ سم . ثوبها الى الخنطي الاسمر .  
زبانها متوسطة الطول ، منشازية الشكل . ارساغها  
خسبية المغل || رقاتها ملكية الجسم ، مستطيلة ، صفراء  
اللون ، تعيش على جلود النبات وقد تركب البطاطا .  
اغزارها زعيمة لا تستويب المكافحة .

٢٠٦٨٣ - فُورْقِيَه \*  
Dichotomie (F). Dichotomy (E).  
الفريقية ، في علم النبات ، طريقة انقسام جزلي مفرق .  
وفي علم الفلك ، حالة القمر عندما يكون نصفه فقط  
مضاء .

٢٠٦٨٤ - فُورْك  
الفرك هو المتفرق تشتر من العجم وما اشبه . يقال لوز  
فرك وجوز فرك ...

٢٠٦٨٥ - فُورْك  
Bauhinia acuminée (F).  
هو البيونيه المؤنفة ، اطلبها .

٢٠٦٨٦ - فُورْكُولَة  
Virachola livia (S).  
حشرة من المرض ، ديدانها تركب الزمان . اطلب مرض  
الزمان .

٢٠٦٨٧ - فُورْلُودَة \*  
Firoloida (S).  
Firoloide (F). Firoloida (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل  
وفصيلة الرميانات . انواعها المعروفة قليلة المدد منتشرة  
في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة شبه  
الطليجية الشوزن ، حلدية المادة ، شفافة ، عادية  
الاصداد ، قليلة الانشاح الجعومة مع سائر الاشعاش في  
جراب منير مركزه تحت البطن .

٢٠٦٨٨ - فُورْلُودَة مُرْبَعَة \*  
Verlusia quadrata (S).  
Verlusée carré (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الكورسيات ورقتة مختلفات  
الاجتنح . جسمها معتدل التبطيط ، مربع البطن ، يطول  
نحو ١٢ سم . ثوبها الى الخنطي المذهب الموج . رأسها  
شبه مربع الشكل . غشها مستطيل . ازهارها ناشز . عيناها  
صغيرتان || بارزتان . زبانها مستطيلان ، اسودا الطرف .



فُورْلُودَة



فُورْمِيوم مُتَصَبَب

٢٠٧٠٣ - فَرْنَدَل مُسْتَدَق Basilic sauvage (F).

هو الزيجان البري ، اطبله .

٢٠٧٠٤ - فَرْنَد Rose rouge (F). Red rose (E).

الفَرْنَد : الورْد الاخر ويُدعى الحَرَم . والفَرْنَد هو ايضاً حَب الرِسَان .

٢٠٧٠٥ - فَرْنَدَا\* Lagerstroemia (S).

Lagerstrémie (F).

شجرة تَرْيِينَة من فصيلة الحَنَاتِيَّات . مَهْدَا الهَنْد . ساقها منتصبَة فَرَاة تَمَلو من ٥ الى ٨ اَمْتار . اوراقها لاطلة ، متقابلَة ، يَضِيضَة ؛ نَصلها مَزْبَج البَشْرَة يطول نحو ٧ سم . ويَمرُض ٤ سم . اَزهارها عَشْكَوَلِيَّة التَجَمُّع ، تاجِيَّة الازتِكَاز ، مَسْطَوِيَّة الشَّكْل ، مَجْمَدَة البَتَلات ، وَرْدِيَّة اللون . اَزهارها يَسْتَمِر من آب الى تَشْرِين الاول .

٢٠٧٠٦ - فَرْنَدَل Lythrum (S). Salicaire (F).

Loosestrife (E). Blutweiderich (D). Salicaria (I).

جَنس نَوائِث عَرَبِيَّة مَعْمَرَة من فصيلة الحَنَاتِيَّات . اَنواعه عَديدَة مَعظَها يَري مَرعَوِي وبَعضها تَرْيِين . سَوَها لَيفِيَة او عَشْوَثِيَّة . اوراقها لا قِياسِيَّة الازتِكَاز سَها لِلمَناقِبَة والمُتَناظِلَة وَالضَمِيَّة . اَزهارها لا نَظائِيَّة التَجَمُّع || اَعْرَف اَنواعه واشهرها ما يلي .

٢٠٧٠٧ - فَرْنَدَل غَرِيضَر Lythrum graefferi, L. meanthum (S).

Salicaire (F). نوع من الفَرْنَدَل التَرْيِين . ساقه فَرَاة تَمَلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه السَفل مُتَناظِلَة والعَليا مُتَناقِبَة ؛ نَصلها مَالِي البَشْرَة ، صَغير القد ، يطول نحو ٢٥ سم . ويَمرُض نحو ٥ سم . اَزهاره عَموَرِيَّة الازتِكَاز ، فَرْدِيَّة التَجَمُّع ، بَستَجيَّة اللون . اَزهاره يَسْتَمِر من حَزيران الى اَيلول .

٢٠٧٠٨ - فَرْنَدَل مَبْدَلُ\* Lythrum salicaria (S).

Salicaire commune, Lysimaque rouge (F). Purple loosestrife, Willow weed (E). Purpur-Weiderich (D). Salicaria commune, Lysimachia rossa, Verga rossa (I).

نوع من الفَرْنَدَل البري المَبْدَل . ساقه مَزْبَجَة ، فَرَاة ، منتصبَة ، تَمَلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه قَلْبِيَّة القَاعَة تَطول نحو ١٢ سم . وتَمرُض نحو ٣ . نَصلها خَلِي البَشْرَة على صَفتَحيه . اَزهاره سَنبِلِيَّة التَجَمُّع ، حَامِيَّة الازتِكَاز ، مَدَامِيَّة البَتَلات ، لَوْنُها الى الحَمْرَة القَرْمَزيَّة || اَزهاره يَسْتَمِر من تَمُوز الى اَيلول .

٢٠٧٠٩ - فَرْنَدَل مُجَسَّج Lythrum alatum (S).

Salicaire ailée (F).

نوع من الفَرْنَدَل التَرْيِين . ساقه فَرَاة تَمَلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروعها دَقِيقَة مُضَلَمَة . اوراقه قَلْبِيَّة القَاعَة تَطول نحو ٣ سم . وتَمرُض نحو ١ سم ؛ اَزهاره اَرَجَوَانِيَّة اللون . اَزهاره يَسْتَمِر من تَمُوز الى آب .

٢٠٧١٠ - فَرْنَدَل مُسْتَدَق Lythrum virgatum (S).

Salicaire effilée (F).

نوع من الفَرْنَدَل التَرْيِين . ساقه منتصبَة فَرَاة ، تَمَلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مُتَناظِلَة ، ضَمِيَّة ، لَافِيَّة ؛ نَصلها سَنائي الشَّكْل ، ذَلَق القَاعَة والطُرف ، يطول نحو ١٣ سم . ويَمرُض نحو ٢ سم . اَزهاره سَنبِلِيَّة التَجَمُّع ، حَامِيَّة

٢٠٦٩٨ - فَرْنَار \* ، فَرْنَار Furnarius (S).

Fournier (F). Oven-bird (E).

الاسم العلمي والفَرَنسي والانكَلِيزِي يدل على كَنِيَّة الطائر المَالِء الى الرُكَّة الشَّيْبَة بالفَرْنَد التي يَشِيدُها في زَمن الطَّيَران لَحْمَن يَبيض || والفَرَنَار طائر من فَصِيلَة الفَرَنَارِيَّات . موطنه بَعض مَنَاطِق اَمْرِيكَا الوُسطى والجنوبِيَّة . يَأْتِي الغَابَات الكَثِيفَة الاشجار واغصانها الرِياض || جِسمه مَمْدَل القد يطول نحو ١٨ سم . ثَوْبُه الى الشَّمْعَة الخَظِيَّة التي لا تَخْتَلِفُ عَن لَوْن الرَبْرَة . زُورُه اَبْيَض . مَتَنَادِه جَالِس ، مَسْتَدَق الطُرف . حَذَقَه عِيْنُه حَظِيَّة اللون . جَنَاحُه مَمْدَل الطول . ساقه دَقِيقَة ، رَيفَة ، سَمَرَاء اللون || قُوَّتُه جَمع اَنواع الحَشَرَات واغصانها النَمَل . يَسِي على الارض بِرَشَاقَة وَيَلْتَقَط الزُّور البريَّة المَختَلِفَة الاحجام || وَكَنَتُه كَالفَرْنَد المَسْتَدِير المَشْهُوف . مَدخلُها من الجَنُوب . يَشِيدُها بِالطِينِ الفَرَج ، السَّاف تَلو السَّاف ، على غِصْن اَفْعِي الِامْتِدَاد . الذَكَر والَاُنْثَى يَشْرَكَان في السَّعَل . اما طُول الرُكَّة من الدَاخِل فَنَحْوَ ٢٥ سم . وعَرضُها نَحْوَ ١٥ سم . وارتفاعُها نحو ١٧ سم . ويَدخلُها على ارتفاع ٦ سم . وَيَبيتُها بِالحَشِيشِ النَّاعِمِ وبِالرَّيشِ وَالزُّبُب . الاُنْثَى تَضَع ٣ الى ٤ بَيْضَات تَحْتَهَا بِمَناوِئِ الذَكَر نَحْوَ اسبوعين .

٢٠٦٩٩ - فَرْنَارِيَّات \* Furnariidae (S).

Furnaridés (F). Furnariidae (E).

فَصِيلَة طَير من الجَوَامِث لِاقْطَاع النَمَل رَيفَات المَناظِر . اجناسها واَنواعها المَعْرُوفَة قَلِيلَة المَعْدَد جَمِيعًا من طَيور اَمْرِيكَا الجَنُوبِيَّة والوُسطى || اجسامُها صَغيرَة او مُتَوَسَّطَة القَد . مَنَائِيها جَالِسة قَوِيَّة ، طَوِيلَة يَعاَدِل طول الرَاس . اجنَحُها مُتَوَسَّطَة الطول ، اطول قَوادِمها الثالِثَة . اذْناها قَصِيرَة ، وَفَالِها قَلِيلَة الصَّلَابَة شَب مَبْدَلَة . اَرسافُها رَيفَة . اصابعُها قَوِيَّة تَم عَن مَناسِبَتِها لِلْعَمَل على الارض || اَعْرَف اَنواعها واشهرها الفَرَنَار والجَزِيزَة والسَيِّين .

٢٠٧٠٠ - فَرْنَب Elomys (S).

Lérot (F). Dormouse (E).

جَنس سَیَّوَانَات لَبُونَة قاضِيَة من فَصِيلَة الفَرْنَدِيَّات . اَنواعه قَلِيلَة ، موطنُها العالَم القَدِيم . تَمَيِّز بِرُوسِها الاسْفِينِيَّة واذْناها الكَثِيرَة واذْناها الاسْطَوِيَّة الدَقِيقَة الثالِثَة اللون . قُوَّتُها الجَّارِ وبَعض الحَشَرَات . بَيَاتُها الشَّتَوِي يَدوم نَحْوَ ٦ اشهر .

٢٠٧٠١ - فَرْنَب شامَع \* ، فَرْنَب Elomys quercinus (S).

Lérot commun, Lait des jardins (F). Common dormouse, Garden dormouse (E).

نوع من الفَرْنَب ، طوله ١٤ سم . وذَنبُه ١٠ ، رَاسُه وطَهرُه وذَنبُه الى الصَّهْبَة السَّمَرَاء . صَدْرُه وِطَنُه وَصَفْعَة ذَنبُه السَّفل اَبْيَض . حَنار عِيْنِه واذْنيُه وَشِيع ذَنبُه الى السَّوَاد الفَحْشي || موطنُه بَعض مَنَاطِق الشَّرْق الاوسط وارُوبَة وافْرِيقِيَّة . يَأْتِي الِادْفِعال والحَدائِق والجَنَازِث . يَسْلَق الافرِيقَة والجِردان بَغْغَة مَدْحَة . قُوَّتُه الجَّارِ على اَختِلَاف اجناسِها . يَدخُل البيوت المَأْمُوءَة فَيَبيد الزَبَدَة والحَلِيب والثَّحْم والبَيش و|| جِسمه وَكَن يَدِيرُه اِيْنا اسْتَطَاع . اَنثاء تَضَع من ٤ الى ٦ اَدْرَاس تَسمُر وَكَنَتُي بِعد اسبوعين لَكَبًا تَرضع نَحْوَ ١٥ اسابيع .

٢٠٧٠٢ - فَرْنَجَمَشَك Basilic velu (F).

هو الحَقِيق الرُور ، اطبله .



فَرَنَار



فَرَنَب شامَع



فَرَنَدَا



فَرَنَدَل مَبْدَلُ



فرنج الأرنب

الإرتكاز، سداسية البلات، لونها ال حمرة البنفسجية .  
ازهاره يستمر من حزيران ال ايلول .  
٢٠٧٢٢ - **فِرْوَجَة** Poulette (F).  
أي الفروج وهي الفتية من الدجاج .  
Young hen, Pullet (E).

### ٢٠٧٢٣ - **فِرْوَعُ هَيْكَلِيَّة**

Branches charpentières (F). Carpenter branches (E).  
وسم من دعاءها فروع نجارية . هي الفروع الخشبية التي  
تحمل الاغصان ويتألف منها هيكل الشجرة الرئيسي .

٢٠٧٢٤ - **فِرْوَع** Orion  
الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار او الجوزاء .

٢٠٧٢٥ - **فِرْوَيْبِيَّةُ عُسْقُولِيَّة** \* ، **فَحْمَةُ السَّاق**  
Erwinia arbores (S). Maladie de la jambe noire (F).  
Black leg (E).

وسم تسببه بكتريه من الكرويات . يترى أنواع كثيرة  
من النبات اغصانها اللين والمفلون والجذر والبطاطا الخ ...  
تحاذي شديد الوقع على اللين يركب الساق فيسم بعض  
اقسامها بعد ان يسبب اسودادها وتلفها وقد تمتد الى السنج  
والجذور فيبدو كبقع مستطيلة متتابعة سواء اللون تحوها  
حالات سمر تقضي حل اغشية الساق ثم تجرد السنج وتلفها .  
وهو من الاوصام التي تعيش في التربة ولا تنتقل الا بواسطة  
الجروح والخدوش ولا تقتك الا في ظروف مناخية معينة  
اغصانها الرطوبية المستمرة وكثرة اليوم او قلة الفصح .  
اما انتقاله من التربة الى النبات فيم بواسطة الاوراق  
الساقل التي تلامس التربة .



فرنج البقر



فرنج الحمير

٢٠٧٢٦ - **فِرْيِي** هي الساق ، اطلبا .

٢٠٧٢٧ - **فِرْيَوْرَة** Athérine naine (F).  
هي النونة من الاسماك الصغيرة الدقيقة ، اطلبا .

٢٠٧٢٨ - **فِرْيَلَاكْرِيَا** Fritillaire (F).  
هي المرار نبات من الزنبقيات ، اطلبه .



فرنج الخنزير

٢٠٧٢٩ - **فِرْيَدِي ، مِرْجَان** Pagellus (S). Pagel, Pagelle, Pageau, Pageul (F).  
Braise, Red porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبرويات ورتبة شالكاك  
الزئاعنات . انواعه سبعة ، اعطاه مياه المناطق الحارة  
والمعتدلة سنة منها تعيش في المتوسط . اجسامها اهلبيجية  
الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها كبيرة  
القد . زئاعنها الظهريه مسطلة شاككة . اثناها الى  
الحمرة المرجانية تزهر وتبيض وتتوشع بالفضي والاصفر  
والخضلي والاسمر . جبينها مأكلة لذينة العلم . اعرفها  
واسهرها الفريدي الشائع .

٢٠٧٣٠ - **فِرْيَدِي شَالِع** \* Pagellus erythrinus (S). Pagel commun (F). Com-  
mon braise (E).

نوع من الفريدي كبير القد ، مرجاني اللون ، طوله  
يراوح . عند اكبال نموه وبلوغه الاربع سنوات ، من ٦٠  
الى ٧٥ سم . وهو من الاسماك المشهورة المستحبة المبذولة  
في المتوسط .

٢٠٧٣١ - **فِرْيَدِي مُسْتَج** \* ، **مِرْثَوْرَة**

Pagellus mormyrus (S).  
Pagel marbré, Mourme (F). Mormyrus (E).  
نوع من سمك الفريدي . موطنها البحر الابيض المتوسط .



فروية عسقلية



فريدي شائع



فريدي مستج

٢٠٧١٦ - **فِرْنَعِيَّات** Haematopinidae (S).  
Haematopinidés (F). Haematopinidae (E).

فصيلة حشرات جليدية من القمقيات . اجناسها نحو ٢٠  
جميعها صغيرة الجسم ، مفلطحة الشكل ، مبطنه ، كثيرة  
الغلب . قرونها الاستشعارية ثلاثية او خاسية المغل .  
مقارن ارساغها حادة وقوية || تركب الحيوانات اللبونة  
والوحشية والداجنة . اشهر اجناسها القرون بين انواعه فرنج  
البقر والحمار والاذنين والحزير .

٢٠٧١٧ - **فِرْنَكْلَم** هو الشفتين المعروف ، اطلبه .

٢٠٧١٨ - **فِرْنَوْبِيَّة** Vernonie (F).  
هي السرغل ، اطلبه .

٢٠٧١٩ - **فِرْهَوْد** الفرهد ولد الوعل . ملح فراheid . ومنهم من قال القراheid :  
صغار الغنم .

٢٠٧٢٠ - **فِرْو ، قِرْوَة** Fourrure (F). Fur (E).  
كل جلد يفرى به . ج . فراه .

٢٠٧٢١ - **فِرْوَج** Poulet (F). Chicken (E).  
القي من الدجاج . ج . فرايج .

**Physopode du tabac (F).** ٢٠٧٤٣ - **فُزُودُ التبغ** \*  
حشرة من الترييس ترتكب أوراق التبغ فتعسط الخشب وتمتص عصارة الخلايا والنسج الناضج . أطلب فيزودو التبغ .

**Sidérite (F).** ٢٠٧٤٤ - **فُزُور**  
هو الفقاح نبات طبي من الشفويات .

**Vaseline (F).** ٢٠٧٤٥ - **فُزُولِين**  
هو الزاوين ، أطلبه .

٢٠٧٤٦ - **فَسَاءُ الصَّنَوِير** \*  
**Chlorochroa pinicola (S).** **Punaise des pins (F).**  
حشرة مؤذية من فصيلة الفاسياتيات ، جسمها منقطع ، اهليجي الشكل ، يطول نحو ١٢ سم . ثوبها الى الخضار الاسمر المواج . يبتلها الى الخطي الاسفر يطلو في جانبيه تجذيع دقيق اسود || رأسها شبه مخروطي ، مقطوم الطرف . عظمها مستدل الطول . عينها صفراء ، زباناها مستطيلان اسمران . كرسها اغبر الخمار اخضرى . حشيتها غبراء الطرف . ظهرانها اريد اللون ، اخضر الخشب . قشرانها شفاف . قوائمها الى الخمار الالامس || ترتكب اهداب الصنوبر || راحتها كرية .

**Anserine fédec (F).** ٢٠٧٤٧ - **فَسَاءُ الكَلْب**  
عشة كريمة الرائحة تسمى منتنة ، أطلبها .

**Putréfaction (F).** ٢٠٧٤٨ - **فَسَاد ، تَفْسَخ**  
**Putrefaction (E).** انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٢٠٧٤٩ - **فَسَالَةُ الكرم ، فِشَل الكرم**  
**Aubernage, Cabuchage, Court-noué, Roncet (F).**  
مرض فيزيولوجي يجهول الاسباب يضعف الكرم بكامل اعضائها مَهْزَل .

٢٠٧٥٠ - **فُسْتَقِي \***  
**Pistacia vera (S).** **Pistachier, Pistachier du Levant (F).** **Pistachio tree (E).** **Echte Pistazie, Pistazienbaum (D).** **Pistachio, P. verde (I).**

شجرة زراعية عميرة تعيش من قرنين الى ثلاثة قرون . وهي من سبط الفستقيات وفصيلة البطانيات . غرسوها واصرارها عديدة ، منها حوض البحر المتوسط ، اشهرها الفستق الحلبي يختلف اصرامه كالمناشوري والمراسي والبانوري والعلمي ونساب الجمل . ثم الفستق التونسى والمفرى والصعلق والقيرصى والاراني . اقلها واسع الانتشار وهو انسح من اقليم الزيتون لانها تتحمل الصقيع حتى بعض درجات تحت الصفر . غير انها ترغب في المواعج الدارية من الرياح الجرد وفي المراضى الغريبة والغريبة الشالية || وهي تجود في جميع الارابة الخفيفة القليلة الاندماج ، الوارفة للمادة الكلكية ، المادمة الرطوبة المستحكمة || تملو ٤ م الى ٨ امتار وقطر دوحها براوح بين ٣ و ٧ امتار . جلوعها منتصبة وتدية تنور في الارض على اعماق بعيدة . ساقها منتصبة عقدية فروع . اوراقها مركبة وريية . وريقاتها اهليجية او بيضية الشكل . نصلها مستمس الصفعة الجامدة الكثيرة العروق الدقيقة المتوازية . ازهارها ثنائية المسكن ، عادمة البتلان ، بحورية الارتكاز ، تنشأ على الفروع المحولة . الذكرية منها قدية التجميع ، خماسية الاسدية ، اما الانثوية فضقودية وهي وسيمة المبيض والمخدر . ثمارها زيتونية الشكل تتكون عند اكملها نصفها

مسرحةا قرب الشطوط || جسمها اهليجي الشكل يطول نحو ٦٠ سم . ثوبها الى الشبهة الوردية الغضية المواج يطلوها في جانبها تسنج اسود والمطل || لها جيد الصنف في الربيع والصيف ، متوسط في الخريف والشتاء .

٢٠٧٤٢ - **فُريز**  
**Fraise (F).** **Strawberry (E).**  
هي ثمرة الشليك وتسمى شول فريز وشول شليك .

٢٠٧٤٣ - **فُريزَة \***  
**Freesia (S).** **Fréésie (F).** **Freesia (I).** **Knickschwertel (D).**

نبات دوقسي زريبي من فصيلة السوسليات . وحيد الجلس والنوع ، عديد الغروب والمعين . اوراقه قرصية الانتشاب ، سيقه الاشكال ، ثنائية الصف . ازهاره بريقه الشكل ، سداسية الاقسام ، عطرية العرف . منها الابيض والاصفر والبرتقالي والوردي الخ ... وهي متباينة الارتكاز من جهة واحدة جسمها مخروط نحيل يطلو نحو ٣٠ سم . ثم يروح تحت عيب الازهار || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٠٧٤٤ - **فُريزِيَة \***  
**Farysia (S).**  
جنس فلور بحيرية طفيلية من فصيلة الراهويات تتميز بطولسائها البسيط التركيب ثم بيضا الغضى التجميع ويوبناتها الزورية الانقسام والتكاثر || يصيب السعديات على اختلاف انواعها النباتية .

٢٠٧٤٥ - **فُريزَة**  
**Proie (F).** **Prey (E).**  
كل ما استولى عليه الحيوان الفاري لقرته .

٢٠٧٤٦ - **فُريش ، مَقَر**  
**Acaule (F).** **Acaulous, Stemless (E).**  
الفريش والمقر هو من النباتات ما ينبت على وجه الارض ولم يقم على ساق ج . فرائش .

٢٠٧٤٧ - **فُريش**  
الفريش : الفرس يمد نتاجها بتسع ليال وهو غير اوقات التزو عليها || والفريش ايضا الثور الذي لا سنام له .

٢٠٧٤٨ - **فُريزَة \***  
**Calocera (S).** **Calocère (F).** **Calocera (E).**  
جنس فلور غشائية من فصيلة البوسيات . انواعه قليلة العدد كثيرة الانتشار الذي يرم معظم مناطق الشرق الاوسط واروية وامريكة الشالية || تعيش على المواد الدالية والخشبية المنحلة . اشهر انواعها واعرفها الفريزة الزرية .

٢٠٧٤٩ - **فُريزَة لَزَجَة \***  
**Calocera viscosa (S).** **Calocère visqueuse (F).**  
نوع من الفريزة . اعطائها اقليم الصنوبر في معظم اقطار العالم . تعيش على التبال المقطوعة المفتة || تحتها غسروني الحمية الجامدة . ويتيسا متشعبة ، لزجة ، تملو نحو ٥ سم . لونها الى الصغار الناري .

٢٠٧٤٠ - **فُريزِيَة**  
**Fénugrec (F).**  
هي الحلبة الرومية . أطلبها .

٢٠٧٤١ - **فُزَ \***  
هو ولد البقرة الوحشية .

٢٠٧٤٢ - **فُزَاة**  
**Tigress (F).** **Tigress (E).**  
أنثى البر وتدعى فزرة ويقال لولدها الفز .



فريزة



فريزة لزجة



فستق

من غلاف خارجي هش السبيج لونه الى الجوزة يملوها  
توشيح رمادي . من غلاف داخلي خشبي المادة مؤلف  
من مصراعين ينفشان عن صلام أصفر اللون مأكول تلحفه  
قشرة رقيقة لونها الى الحمرية || يتكاثر الفستق بالذر  
او بالتصلب . فالتكاثر بالذر يكون في شتات خاصة  
ترتكز على طبق من الحصى مهمتها استنفاد الماء . وقد  
يم عادة في شهر شباط ويكون ذلك اما ثراً على كامل  
المثلث او محلولاً متوازياً يمدد الواحد منها عن الآخر  
من ٣٠ الى ٣٥ سم . ويبقى الفستق في المثلث من سنتين  
الى ثلاث سنوات قبل ان تنقل الى مستقرها || اما التكاثر  
بالتصلب فيجوز على الطبل اي الفصاة والبطل الاخير  
والمصطكاه وعلى سائر اجناس سبط الفستقيات . وللمعلوم  
يشد بصر خمس سنوات في حين ان الفرة لا تشر قبل  
تسع او عشر سنوات || ونجربة الفستق تبلغ كمال نموها  
بمر ٣٠ سنة وتستقر على حالها نحو ١٥٠ سنة قبل ان  
تدخل في طور الانحطاط الذي يدوم نحو نصف قرن .



فستق عيبد

## ٢٠٧٥٢ - فستق ملتغاشي \* ، حصص بنبارة ،

*Voandzeia subterranea* (S). **فوتلزيه**  
*Voandzeia, Pistache malgache, Pois bambara* (F).

نبات عشبي حولي زراعي وحيد الجنس والنوع من فصيلة  
القرقيات القرغزية . هذه البلاد الافريقية الحارة . ساقه  
مدادة . اوراقه مركبة ، مستطيلة الزناد القائم ، ثلاثية  
الورقات الطرفية السنانية النصال . ازهاره ابطية الارتكاز  
تنشب على السوق المدادة وهي صغيرة القند ترتكز على  
معاليق ليلية السبيج تنقل بالازهار ، بعد تأبيرها وتكون  
الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق تراوح من ٥ الى  
٨ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار ونضجها . اما  
الثمار فهي غالباً فردية الحبة وادماً مزدوجة وهي تحوي  
على البوب غزير المواد الغذائية المرموقة التي تعتبر من اكل  
الاغذية التي تنتجها المملكة البتاوية || يقول « بوانام »  
وفيره من حلولها حبوب الفستق الملتغاشي انها تحوي العناصر  
الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	١٤,٦٨ ٪
مواد دهنية	٦١,٤ ٪
مواد هيدروكربونية	٥٧,٠٧ ٪

زراعتها لا تختلف عن زراعة الفستق عيبد ونتاج الثم  
يراجع من ١٥٠ الى ٢٥٠ كيلو من الحبوب الملتفة .  
اما شتمه فيستعمل كمكاف لاثبات اخصها البقايا لانه  
يكثر الدر وينشط فيه المواد الزبدية .

## ٢٠٧٥٣ - فستق

*Pistache* (F).  
*Pistachio, Pistachio-nut* (E).  
ثمرة الفستق . لياها جامد المكسر . فستق اللين ، للذي  
العلم الخاص والشكة المستحبة . متوسط تركيبة العنصري  
ما يلي :

مواد آحبة	٢٢,٧ ٪
مواد دهنية	٥١,٩ ٪
هيدرات الكربون	١٣,٠ ٪

## ٢٠٧٥٤ - فستقيات (F). Pistacia (E).

سبط من فصيلة البطيئات يشمل ثمانية انواع بعضها بعض  
مناطق حوض البحر المتوسط . جميعها اشجار وشجيرات  
برية وزراعية وافرّة المادة الراتنجية الغلظلة العرف الشائعة  
الاستعمال الصناعي || اشهر انواعه الفستق .

## ٢٠٧٥٥ - فستوجة ٥ Physostegia (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها  
اهليلجية او سنانية مسنة المختار . ازهارها سنبل التجميع  
ازهارها صغيرة ودية اللون او بنفسجية || انواعها المعروفة  
قليلة العدد ، اشهرها التالية .

## ٢٠٧٥١ - فستق عيبد \* ، قول سوداني

*Arachis hypogaea* (S). **Arachide, Pistachier de terre,**  
*Pois de terre, Cacahouette* (F). **Earth nut, Ground**  
**nut, Pea nut** (E). **Echte Erdnuss, Erdmandel** (D).  
*Arachide, Pistachio di terra, Mani* (I).

نبات عشبي حولي زراعي صناعي من فصيلة القرقيات  
غروبها واصرامه عديدة تقسم الى قسمين : الافريقية  
وهي مدادة قليلة الزغب والاسيوية وهي متصببة السوق  
مزرقة الانشاء || جذوره كثيفة متشعبة . سوقه فراء  
مراكية ، اصولها اسطوانية ، اطرافها فضلة . اوراقه  
متناوبة مركبة لاقامية التجميع يكثر فيها العدد الشفهي  
للمركب من زرين . وريقاتها بيضبة الشكل تصلي  
تختلف باختلاف الاصرام منه مالم الصفحة العليا خلي  
السفل كما في الاصرام الافريقية ومنه مذهب الفصينتين  
كما في الاصرام الاسيوية || ازهاره ابطية تنشب عند  
قواعد الفروع بين زالنتين سمينتين وهي صغيرة القند صفراء  
اللون ترتكز على معاليق ليلية السبيج تنقل بالازهار ،  
بعد تأبيرها وتكون الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق  
تراوح بين ٦ و ١٠ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو  
الثمار ونضجها || اما الثمار فقرزية ، اسطوانية ، معززة ،  
متقبضة الوسط . طولها يراوح بالنسبة الى غروبها بين  
٢ و ٤ سم . وهي تحوي على البوب او البوين في الاصرام  
الافريقية وعلى ثلاثة الايبب في الاصرام الاسيوية .  
اما البوبها فهو غزير المواد الغذائية المرموقة التي تركب  
من العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	٢١,٨٠ ٪
مواد دهنية	٥١,٧٥ ٪
مواد هيدروكربونية	١٧,٦٦ ٪

زراعتها منتشرة في جميع البلاد الحارة اخصها البرازيل  
والكسبك وبعض مناطق امريكا الشمالية والسنغال والبودان  
ومصر ولغته . وهو مزرود على الشواطئ البتاوية السورية  
المروية الممتدة من عكار الى اللاذقية || يحمي في جميع  
الآربة الزراعية الكاملة التركيب الممكن رجا . انما  
يفضل الرسوبية المتوسطة او القليلة الاندماج الغنية بالمواد  
الفسفوية وبعنصري البواس والفسفور || يبلر في  
الدم الواحد من ٦ الى ٧ كيلو من الحبوب الملتفة او نحو  
٣ كيلو من الايوبب اي الحب المادم الغلاف . وذلك  
في اواخر شهر نيسان . فينتش الحب وتظهر بوارضه بعد  
الذر بثلاثة اسابيع . عندئذ يياثر بالري ويدلم عليه



فستق ملتغاشي

٥- ففة الفسفات التي عولجت ككياوياً وهي تشمل مختلف تراكيب السورفسفات والفسفات الامونياكي والمنيزني . الخ ...

فالاسمة الفسفافية اذاً عديدة الاشكال والتراكيب غير انها جميعها ترتكز على الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد الزلالية الموجودة في خلايا النسيج النباتي . وهي تحفز جلدور النبات على الانعاش والتكاثر السريع . وتوقد الانزهار الى الاثران . وتحسن الطلوع وقابلية الاخصاب وعقد الثمار . ثم تنشط المادة البقية في جرداة البحاء وتقوي المناعة الذاتية وتحبها على الصدو في وجه الامراض الفطرية وهي ايضاً تحول دون شلوة الازوت وينما ينجم عنه من عواقب وخيمة عندما تزيد نسبتة من المدل الاقصى . يادر الفسفات على التربة قبل زرعها بنحو ٧ اسابيع ويظهر جيداً لتتمكن الحثائر الجرثومية الطبيعية والانفعالات الكيمنية من تحويله الى مواد غذائية قابلة الاتصااص .

### ٢٠٧٦٤ - فُسْفَات الكلس

Phosphate de chaux, Ph. de calcium (F). Calcium phosphate (E).

مركب فسفوري يستعمل في تحضير السورفسفات .

### ٢٠٧٦٥ - فُسْفَات الكِلْس الطَبِيعِي ، فُسْفَات مُعَدَّلِي

Phosphate de chaux naturel, Ph. minéral (F). Natural calcium phosphate, Mineral phosphate (E).

مركب فسفوري طبيعي يستعمل اما مباشرة في تسميد التربة او في تحضير السورفسفات .

### ٢٠٧٦٦ - فُسْفُس

Peribals (S). Périale (F). فسفس ج . فسفس جين حشرات شديدة التتن من فصيلة الغاسيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، محببة الشكل ، مبطلة . طويلاً براوح بين ٧ و ١٠ مم . اولهايا مختلفة الالوان منها الاخضر الباهت والرمادي والحطلي والمسنج والمزركش . وهي شديدة الاذى تركب الاعشاب البرية والزراعية ومنها البقول والنباتات الصناعية كالتبغ والخرجوع .

### ٢٠٧٦٧ - فُسْفَسَة مُنْتَقَطَة

Brachynema cinctum (S). Brachynème ceint (F). حشرة مؤذية من فصيلة الغاسيات . جسمها كفيف الخمل القصير ، مقطوع ، مبطط ، بطول نحو ١١ مم . || ثوبها الى الخضار الالسى . رأسها شبه خرطوي . خطها مستطيل المثلث . عينها ناثرتان . زباناها اخضران . كوسها احر الخنار . حفيفها خرطوية الشكل ، يفضاء الطرف . ظهرانها وردي اللون ، اخضر الخنجب . بطنها الى الخضار الباهت ينمطه خنار احر . قشراتها شفافة . قوامها الى الخضار الاصفر الاسمر || تركب جميع انواع السرمقيات فتتصص عصارة الارواق والنواهي || رانحها كرية .

### ٢٠٧٦٨ - فُسْفَطَة

Phosphatage (F). تسميد التربة بالفسفات . ومنهم من كتبها لفصطة .

### ٢٠٧٦٩ - فُسْفُور ، فُسْفُور ، فُسْفُور

Phosphore (F). Phosphorus (E). جسم بسيط لا يوجد في الطبيعة الا متحداً مع غيره من العناصر . وهو اهم الاغذية النباتية بعد الآزوت . يوجد في

### ٢٠٧٥٦ - فُسْتُجَّةٌ صَغِيرَةٌ الزَّهْر

Physostegia parviflora (S).

Physostégie à petites fleurs (F).

نوع من الفستجة . ساقها نحيلة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها لامطة سنائية الشكل . نصلها منشورية الخنار . شبلتها الزهرية تطول نحو ١٠ سم . ازهارها ليدة بنفسجية اللون صغيرة القد . تطول من ١٠ الى ١٥ سم . لوها الى الوردي في تنويرها . يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٠٧٥٧ - فُسْتُجَّةٌ مُسَنَّنَةٌ

Physostegia denticulata (S).

Physostégie denticulée (F).

نوع من الفستجة . ساقها قوية متصلة الصلبة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها اهليلجية تطول نحو ٨ سم . نصلها خضراء اللون القام ، مسنة الخنار . ازهارها وردية اللون ، معتدلة القد ، تطول نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٠٧٥٨ - فُسْتُولَةٌ

Fistulana (S).

Fistulane (F). Fistulana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صغيفيات الخياشيم ونصيلة الفستقيات || انواعها الفائرة كثيرة المدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية ، اما الانواع الماصرة فتلافة جميعها من دوبيات اخند الصنيية || تعيش قرب الشواطئ مغمونة في الرمال المغمورة بالماء . اصداها انبوية طليقة .

### ٢٠٧٥٩ - فُسْخ

Pourridié, Rosellinia (F).

جنس فطور مجهرية عديدة الانواع (راجع رولينييه) .

### ٢٠٧٦٠ - فُسْخ ، فُسْخ ، فُسْخ

Résiliation (F).

Cancelling (E).

هو ابطال مفعول عقد باتفاق المتعاقدين .

### ٢٠٧٦١ - فُسْخَة

Eclat (F). Shiver, Splinder (E).

هي الملوقة ، قسيب يفسخ عن جلع امه .

### ٢٠٧٦٢ - فُسْدِيلَا

Phacidiella (S).

جنس فطور مجهرية يعرف بالرغز ، اطليه .

### ٢٠٧٦٣ - فُسْفَات ، فُسْفَات ، فُسْفَات

Phosphate

ملح يحصل من امتزاج حامض الفسفوريك باحدى القواعد من معادن او فلزات او غيرها كالپوتاس والكلس والحديد الخ . وهو من الاسدة الزراعية الجزيلة النفع الي تجمد النبات ببعض الفسفور . مصادره عديدة تقسم الى خن فئات :

١ - ففة الفسفات الطبيعي وهي تشمل الابيت والرمال الفسفافية والطباشير الفسفافية والفسفات الحجر والفسفوريث ...

٢ - ففة الفسفات الصنوي وهي تشمل مختلف مساحيق العظام ورياد النظام .

٣ - ففة الفسفات المستخرجة من التعدين وهي تشمل التوبال اي السكوري على اختلاف انواعه .

٤ - ففة الفسفات التي عولجت ككياً وكياوياً وهي تشمل البازيفسفات والفسفات الراسب ...



فسجلة

في نصل عايق المضار ثم تصفر وتيبس، فتذبل الاوراق وتيجها وتيمت النبات . راجع سرج .

٢٠٧٧٨ - **فُشِيكة** *Cisticola ordinare* (F).  
هي الكروان المبدول طائر من الفصليات . اطلبه .

٢٠٧٧٩ - **فُشِيكة** *Rejton* (F). Shoot (E).  
كل رلة او قضيب ينمو على اذوية قلمت مسح التربة .  
ج . فائتل . والفائتل والفائتل صفار النخل تنرس تنظم قصير نخلا .

٢٠٧٨٠ - **فُشِيُولُوجِيَّة، فُزِيُولُوجِيَّة**  
*Physiologie* (F). *Physiology* (E).  
علم يبحث عن ظواهر الحياة في الياهي ومن وظائف اعضاء الخلقة .

٢٠٧٨١ - **فُشِي**  
*Byrone* (F).  
هو الفاشرا . اطلبه .

٢٠٧٨٢ - **فُشَاغ، فُشَاغ**  
*Smilax* (S).  
*Salsepareille*, *Smilax* (F). *Sarsaparilla* (E).

جنس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠٠٠ جميعها جنات سريعة، معظمها بري وبعضها زراعي . اوراقها ابيدة، منقطة، متعاقبة، لاقياسية الشكل، كثيفة العروق . اذواها صغيرة القد ثلاثية او خالصة البتلات . انزهارها صيراني او عشودي التجميع، ابطي الارتكاز . ثمارها عتيبة ا اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٠٧٨٣ - **فُشَاغ امريكية**  
*Salsepareille d'Amérique* . اطلبه .

٢٠٧٨٤ - **فُشَاغ سَهْمِي، فُشَاغ قاسر**  
*Smilax aspera* (S). *Smilax rude*, *Salsepareille d'Europe*, *Liseron spinose* (F). *Prickly ivy*, *Rough bindweed* (E). *Stechwinde* (D). *Smilace*, *Smilacino*, *Rovo cervino* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري المبدول . ساقه ليفية سريعة مضلمة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه قلبية القاعدة، نصلها جامد التسج الاخضر اللامع الشائك الحافة . ثماره حر || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢٠٧٨٥ - **فُشَاغ شَالِك**  
*Smilax bona-nox* (S). *Smilax épineux*, *Salsepareille bonne-nuit* (F). *Rough bindweed* (E). *Rauhe Stechwinde* (D). *Smilace spinosa* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري والزراعي . ساقه ليفية سريعة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه اعطليجية الشكل . نصلها منقبض الوسط، جامد التسج، سباعي العروق، شائك الحافة || انزهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٠٧٨٦ - **فُشَاغ صِينِي**  
*Smilax china* (S).  
*Smilax de Chine*, *Salsepareille squine*, *Squine* (F). *China smilax*, *Chinese root* (E). *Chinasteckwinde*, *Chinawurzel* (D). *China carnosa*, *Salsapariglia della China*, *lcina* (I).

نوع من الفشاغ الزراعي مهدد الصين . جذره وندي الشكل تكثنته بعض المسائل المستطيلة الحمراء اللون . ساقه ليفية قليلة الشوك . اوراقه بيضية الشكل، قلبية القاعدة، مدينة المقعقة؛ نصلها جامد التسج الاخضر اللامع،

الربة الزراعية وفي التسج النباتية والحويانية لاسيا في النظام || والفسفور الخرج صلب، شفاف، كوري اللون، كربة الرائحة، نقيط للمادة السامة الفتالة . يتألف في الفلام، يشتمل في الهواة ولا يلوب في الماء . روزه (P-قو-) ثقله النقي ١,٨٤ وزنه الذري ٣٠,٩٨ . ينصهر بجمارة ٤٤,٢° مع حيث يذاب كالزيت ويحل في ٢٩٠° مع || ويوجد ايضا الفسفور الاخر الذي يحضر من الكوروني بالتسخين العالي، وهو اخر اللون عادم المم والرائحة لا يتألف في الفلام ولا يشتمل الا عند ٢٦٠° مع . يشتمل في عدة صناعات اخصها صناعة القاب .

٢٠٧٧٠ - **فُشُغُوت**  
*Phosphorite*  
نوع من فسفات الكلس الطبيعي للتخصير الشامي الوئل . يشتمل في تحضير الفسفور واليورفسفات .

٢٠٧٧١ - **فُسْكُل، فُسْكُون، فُسْكِل**  
*Dernier* (F). *Lost* (E).  
الفرس الذي يبي في الحلية آخر الجبل .

٢٠٧٧٢ - **فُسَل**  
*Plançon*, *Plantard* (F). *Sapling* (E).  
هو كل قضيب كبير من الحور والصفصاف وما اشبه شذب وحضر للفرس ان في الذندانة او في المستقر .

٢٠٧٧٣ - **فُسَلَّة**  
*Bouture* (F). *Slip* (E).  
هي العقلة كما انزمت قبل تقليمها وتحضيرها للفرس .

٢٠٧٧٤ - **فُسْمَة \***  
*Phasma* (S).  
*Phasme* (F). *Phasma* (E).

جنس حشرات من فصيلة الفسفيات . انواعها المعروفة عديدة اعطتها غابات البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها اسطوانية تشبه القصبان تطول من ١٠ الى ٤٠ سم . تعلموا مناس حادة . رؤوسها صغيرة . قربتها الاستعارية دقيقة مستطيلة . اجنتها، عند بعض الانواع، نيفة، شفافة متدلة الطول، وعند البعض الآخر جداد لا عمل لها . قوائمها مسنة الاخذ والاسراع || التوبها تمانن البيت وهي غالباً يلين الانثان والقصبان .

٢٠٧٧٥ - **فُسْمِيَّات \***  
*Phasmidæ* (S). *Phasmidæ* (E).

فصيلة حشرات من مستقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من اواخر العصر البليستوساني الماتد الى اواخر الايناج الرابع . اما المعاصر منها فلا يقل عن ٢٠٠ نوع معظمها من حشرات الغابات الاستوائية والحارة || من مييزات حشراتنا انها ثنائية الاشكال والاحجام تمانن المواقع التي تقم فيها . بعضها يشبه القصبان والبعض الآخر يشبه الازراق || اعرف اجناسها واشهرها الفسمة والقليلة .

٢٠٧٧٦ - **فُسُولَة**  
*Rachitisme* (F).  
هي الخروعة . اطلبه .

٢٠٧٧٧ - **فُسُفْسَاء، سُرُج \***  
*Mosaïque* (F). *Mosaic* (E).

مرض يكبري يسبب بعض النباتات اخصها التسج والبطاطا والخس . يقال انه ينتشر بواسطة بعض انواع الارق . مظهره الخارجي بقع سرجية الشكل والترتيب، لاقياسية المربع، تركب تسج الازراق فنبود مخطط اللون



فسة

Statice (F). **٢٠٧٩٥ - فُشَاغُش ، فُشَاغُش**  
هو الأريل وأحدته نشفاشة .

**٢٠٧٩٦ - فُشَق** الفشق : تباعد ما بين القرنين .

Roncet (F). **٢٠٧٩٧ - فُشَل الكَرَم**  
هو نسالة الكرم ، اطلبها .

Synchronisme (F). **٢٠٧٩٨ - فُشَن** °  
الفن والإفئان واحد .

Synchronism (E). **٢٠٧٩٩ - فُشَنِي** °  
Synchronique (F).  
Synchronistic (E).

Carpoaceae (S). **٢٠٨٠٠ - فُشَيْعِيَّات**  
Carpoacées (F). Carpoaceae (E).  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزقيات . تتميز بأوراقها  
المحفونة في الإصان . فصائلها أربع الإردادات  
والخشاريات والمشويات والوتيجيات .

Dicranocère (F). **٢٠٨٠١ - فُشِيغ** °  
Dicranoceros (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان منشعب القرن وعلى  
كل حشرة منشعبة الزبان .

Smilacina (S). **٢٠٨٠٢ - فُشَيْغَة** °  
Smilacine (F). Smilacina (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزقيات قريبة  
الشبه من الفُشَاغ . سوقها مدادة كاسية . أوراقها متعاقبة ،  
خلية الصفحات السفلى . أزهارها عنقودي التجميع ،  
طري . ثمارها عنبية || تزرع للزيت في معظم المواقع  
لأنها لا تنضج البرد . تزهر في الإترية المعتدلة الانساج  
الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومنعدنية || أنواعها  
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

**٢٠٨٠٣ - فُشَيْغَة بَقْلِيَّة** °

Smilacina oleracea (S). Smilacine légumière (F).  
ساقها من الفصيلة . مهددا جبال الهند والافغان .  
تطول نحو ١٢٠ سم . أوراقها متوسطة المدد ، سنانية  
الشكل ، تطول من ١٥ إلى ١٨ سم . أزهارها عنقودي  
التجميع . أزهارها وردية اللون ، جلبة الشكل . ثمارها  
عنبية اردوانية يملؤها مواج وردية || تنويرها يستمر  
طوال شهر ايار .

**٢٠٨٠٤ - فُشَيْغَة عُنُقُودِيَّة** °

Smilacina racemosa (S). Smilacine à grappes (F).  
نوع من الفصيلة . مهددا بعض مناطق امريكا الشمالية .  
ساقها تطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقها سنانية الشكل  
تطول من ٨ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٧ سم .  
أزهارها عنقودي التجميع ، كثير المدد ، يطول نحو  
١٠ سم . أزهارها بيضاء اللون . ثمارها عنبية ، بنفسجية  
عطرة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

**٢٠٨٠٥ - فُشَيْغَة تَجْمِيَّة** °

Smilacina stellata (S). Smilacine étoilée (F).  
نوع من الفصيلة . مهددا الشرق الأدنى . ساقها متبادعة  
الأوراق ، تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها قليلة المدد ،

عادم الفوك || عساقله مأكولة وهي لا تخلو من بعض  
الناصر البلية الناقمة .

**٢٠٧٨٧ - فُشَاغ مَحْزَنِي \* ، صَبْرِين**  
Smilax officinalis (S). Salsepareille officinale (F).  
Sarsaparilla (E). Salsaparilla (D). Salsaparilla offi-  
cinalis (I).

نوع من الفُشَاغ الطبي البري والزراعي . عساقله اهليلجية  
الشكل ، جوية اللون ، شائعة الاستعمال الطبي . ساقه  
ليفية تطول من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه بيضيه الشكل ،  
نصلها جامد النسيج عابق الحفرة اللامعة ، شائك الحافة .

**٢٠٧٨٨ - فُشَّة**  
Gousse d'anagrye (F).  
Shell of bean-truffol (E).

هي حنبلية البنيون تطول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم .  
زهورها مستديرة ، مقلطحة ، قاسية ، بنفسجية اللون ،  
جسالية المادة المذوية . ج . فُش .

**٢٠٧٨٩ - فُشَرَا**  
Bryone (F).  
هي الفاشرا ، اطلبها .

**٢٠٧٩٠ - فُشَع**  
فُشَع النبات . يبست اطرافه . وفُشَع اللذرة : يبست اطرافها  
فُحَان قُلُقُها .

**٢٠٧٩١ - فُشَع \* ، مِعَالِيَّة**  
Podocarpus (S).

Podocarpe (F). Chinese yew tree (E). Podocarpus,  
Steinheil (D). Podocarp, Lauro del Giappon (I).  
جنس اشجار حرجية وزيينية من فصيلة السنوبريات  
الطقسويات . أنواعه نحو ٤٠٠ جميعها من اشجار المناطق  
الحارة والمعتدلة . سوقها متعينة تطول ، حسب الانواع ، من  
مترين الى ٢٥ م . أوراقها متعاقبة ضيقة النصل السليك .  
أزهارها الذكورية قدية الشكل اما الانثوية فسلبية التجميع  
وهي عمودية او طرفية الارتكاز || اغصانها صلبة لا  
يمزجها فساد || اشهر انواعها ما يلي .

**٢٠٧٩٢ - فُشَع قَدْلِيَّ الرَّق**

Podocarpus nerifolia (S). Podocarpe à feuilles de  
laurier rose (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة حرجية سرودية تطول من ١٥ إلى  
٢٠ م . اغصانها فارشة لا متدلية . قنبها سيوانية الشكل .  
أوراقها مستقيمة الارتكاز ، منجلية الشكل ، تطول  
من ١٥ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم .  
زهورها اردوانية اللون ، بحرية للمواج .

**٢٠٧٩٣ - فُشَع كبير الرَّق**

Podocarpus macrophylla (S). Podocarpe à grandes  
feuilles (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة حرجية وزيينية جميلة الشكل تطول  
من ١٠ إلى ٢٠ م . قنبها فارشة ، اغصانها اقية الارتكاز  
متدلية الاطراف . أوراقها جالسة تطول نحو ١٢ سم .  
وتعرض نحو ١ سم . زهورها سنوبرية الشكل ، جوية  
اللون تطول نحو ٢ سم .

**٢٠٧٩٤ - فُشَع نَاجِي**

Podocarpus nageia (S).  
Podocarpe Nagi (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة حرجية سرودية تطول من ١٠  
إلى ٢٥ م . اغصانها فارشة متدلية الاطراف . أوراقها  
بيضيه سنانية تطول نحو ٩ سم وتعرض نحو ٤ . نصلها  
اغصن الصفحة العليا ، اصفر السفلى . زهورها تكبر  
نحو ٢ سم . وهي جوية اللون . بنفسجية المواج .



فُشَاغ مَحْزَنِي



فُشَع



ملونة || معظمها يعيش تحت الحجارة وبعضها في قري النمل. قوتها المواد العضوية والنباتية المنحلة || أشهر اجناسها القَصَاع .

### ٢٠٨١٧ - فصّة ، فصصّة ، رطبة ، قصب

Medicago (S). Luzerne, Lupuline (F). Lucern (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البقوليات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية جميعها معروية علفية . جلورها وتدية قليلة الانشعاب تنور نحو ٢٠٠ سم . سويها مستقيمة فراءه . اوراقها مركبة ثلاثية الورديات ، زنادية الرصلى اي العليا . ازهارها عقدوية التجميع فيها الالبيض والازرق والبنفسجي . ثمارها حنابل طرؤنية تلتف بالزور . يزورها صغيرة ، دقيقة ، لونها الى الجؤرة يعلوها مواج اخضر او اصفر || اعرف ازهارها واشهرها ما يلي .



فصّة مزروعة

### ٢٠٨١٨ - فصّة برّية ، قتب

Medicago ciliaris (S). Luzerne sauvage (F). Sea hedgehog medick (E). Hornigel, Dornenkron (D). Medica salvatica, Trafoglio tarpaterra (I).  
نوع من الفصّة البرية تكثر في المواقع الممتدة الرطوية اغصانها الجبال . وهي من اجود النباتات المرصوة العلفية . تتميز بكثافة زيتها وباعداد حار وريقاتها . ازهارها الى الزرة العابقة .

### ٢٠٨١٩ - فصّة مزروعة \* ، فصصّة معروّلة ، برسم حجازي

Medicago sativa (S). Luzerne cultivée, Trèfle de Bourgogne (F). Lucern, Alfalfa, Common medick (E). Lüzerne, Blauer Schneckenklee (D). Luzerna, Medica, Merica, Lupinella (I).  
هي الفصّة الزراعية الكلتية المشهورة بما تحويه من مواد غذائية منبسطة (رابع علف) || فروها دقيقة متنتية قليلة الخيل . وريقاتها قليلة الانشعاب للمبر . ازهارها بنفسجية اللون || تزرع في جميع البلاد المعتدلة الحرارة . تقم في الموقع الواحد نحو ١٢ سنة . ترغب في الاتربة العميقة النور ، المعتدلة الانفساج ، الفينة بنامر الكلس والفسفور والبوتاس . وهي تحب الاتربة الطينية والطينية الجصية || تحب في العام الواحد من اربع الى ثمان مرات . اما سبب هذا التفاوت فيمعد الى الاقليم وموقع الزراعة واسكانية الري || اما متوسط التاج الدائم في الموطن الواحد فارباع بين ٢٥٠٠ و ٤٠٠٠ كيلو عشب اخضر . واذا قسنا الانتاج بالكل الجاف الى العلف فيكون متوسط محصول الدّم السوي من ٧٥٠ الى ١٢٠٠ كيلو .



فصّة مشجرة

### ٢٠٨٢٠ - فصّة مشجرة \* ، قصاص

Medicago arborea (S). Luzerne en arbre (F). Tree medick, Moon trefoil (E). Baumartiger Schneckenklee (D). Erba medica arborecente, Medica citiso (I).  
نوع من الفصّة البرية وهي جنبة فراء تمل من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . وريقاتها بيضيه الشكل ، جيلة اخضر الجري . ازهارها منجنونية متنتية العرف الخابت . يقال انها طيبة ازهارها تقيد الاسد .



قصاص

### ٢٠٨٢١ - قصّد

Déplétion (F). Depletion (E).

### ٢٠٨٢٢ - قصصاء \* ، قارة الصحرَاء

Mus barbarus (S). Souris de Barbarie, S. du desert (F).  
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها فصيح الارباء يمتد من افريقية الشمالية الى الصحراء وبيتية . طولا نحو ١٠ سم .

سنانية الشكل ، لاطة ، طولها من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها شكلوكي التجميع . ازهارها متبسة البتلات ، نجمة الشكل ، خضراء اللون ، يفس الحفاف . ثمارها عتية شديدة الحمره القائمة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٠٨٠٦ - قصص

Caieu, Cayeu (F).  
سن التوية واشباهها .

### ٢٠٨٠٧ - قصص ، قلعة

Lobe  
كل جزء من الورقة او الزهرة بالغ التفرير مستدير .

### ٢٠٨٠٨ - قصص الحصار

هو الاقسن ، اطليه .

### ٢٠٨٠٩ - قصص التلك

Loge pollinique (F).  
Pollinic cell (E).

غياه يغلف جدرات الطلع في متك الزرة .

### ٢٠٨١٠ - قصص حيداري

Lobe pariétal (F).  
Parietal lobe (E).

### ٢٠٨١١ - قصص فكّي

Lobe maxillaire (F).  
Maxillary lobe (E).

### ٢٠٨١٢ - قصاصة

القصي حب الزبيب . الواحدة فصاة .

### ٢٠٨١٣ - قصاص ، قصّد

Saignée (F). Bleeding (E).  
فتح حرق الدم .

### ٢٠٨١٤ - قصاص

Syrinx, Siringe (F). Syrinx (E).  
القصاص عضو الصوت في الطير . مركزه عند انشعاب القصبة الزرؤية .

### ٢٠٨١٥ - قصاص

Thorictus (S).  
Thoricte (F). Thorictus (E).  
جنس حشرات من فصيلة القصاصيات ورؤية غدييات الاجنحة . انواعه المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اغصانها الممتدة من لبنان الى اليونان || اجسامها صغيرة ، معتدلة الانحداب ، طولها نحو ٣ م . رؤوسها غرؤوية . عيونها بارزة . تأثيرها وبلانها نفاقية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، جانبية الارتكاز . كواسلها قصيرة محدبة . اغمارها سالمة ، لافة . قوائمها نشطة . اذواها وسيدة اللون ، تكثر لها الشقعة السوداء فالدبة فالجؤة || تميش تحت الحجارة . مسرحها دبوي . قوتها المواد العضوية والنباتية المنحلة .

### ٢٠٨١٦ - قصاصيات

Thorictidae (S).  
Thorictidés (F). Thorictidae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، معتدلة النبط ، طولها من ٢ الى ٤ م . رؤوسها غرؤوية الشكل . عيونها بارزة . تأثيرها وبلانها نفاقية . قرونها الاستشعارية دبوسية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها محدبة . اغمارها لامة . قوائمها نشطة . اسرارها خاسية العقل . اذواها

Sépale (F). Sepal (E).

## ٢٠٨٣٢ - فصيلة

وريقة كأس الزهرة. ومنهم من سماها كأسية.

Métatars (F).  
Metatarsus (E).

## ٢٠٨٣٤ - فصيلة الرُسع الأولى

هي الرُسع، أطليه.

Phasmoptera (S).

## ٢٠٨٣٥ - فصليات

Phasmoptères (F), Phasmoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح. فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها كبير القند لاقيا الشكل واللون. وهي تتميز بتأثيرها الصغيرة وبسيفانها القصيرة التي لا تكفي من القفز، مكن أناتها كبير الحجم يشبه بر الحنطة.

٢٠٨٣٦ - فصيلة هي الفاصوليا، أطليه.

Cisticole (F).

## ٢٠٨٣٧ - فصيلة

هي الكروان طائر من الدخليات، أطليه.

## ٢٠٨٣٨ - قصيص

صوت الجنادب.

Lobule

## ٢٠٨٣٩ - فُصيص

## ٢٠٨٤٠ - فُصيصي، فُصلي

Lobulaire, Lobulé (F). Lobular (E).

ما كان شكله أو تفريفه يشبه الفص أو الفتلة.

Polystigma (S).

## ٢٠٨٤١ - فصيلة

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات تتميز بوضعية دالية جامدة القوس الأحمر. أصانها كهيئة. يوغها بسيط التركيب، أحليلجي الشكل، ثنائي العدد، تتجمعه تكات بيضية لونها إلى السرة الفاتحة له نوعان مؤذين هما فصية الخوخ وفصية اللوز.

## ٢٠٨٤٢ - فصيلة الخوخ

Polystigma rubrum, Libertella rubra, Polystigmia rubra (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق الخوخ فيذبلها ويؤذي الشجرة. مظهره الخارجي يقع لاقية الشكل والحجم تملو نصل الأوراق فتبدو صفراء اللون ثم حراء بنفسجية تمصب خلايا النسيج تنسب ذبول الأوراق وأعيالها الباكر ثم ازهار الشجرة في ثمرين بعد أن تقصد عليها دورها الحولية الطبيعية. يكاثف باستمال سائل بوردو المحلول ١ ٪ ثم بعد القعد. ومن الانفصل إعادة النضج مرة ثانية تكون بعد الاولي بثلاثة اسابيع.

## ٢٠٨٤٣ - فصيلة اللوز

Polystigma ochraceum, Polystigmia (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق اللوز وهو شديد الشبه بفصية الخوخ. مظهره الخارجي يقع لاقية الشكل والحجم تملو نصل الأوراق لونها إلى الجوزة الباقية تمصب خلايا النسيج وتصبب الأعيال الباكر الذي يضم الشجرة بعد أن يقصد عليها أزمان دورها الحولية. يكاثف كالخوخ باستمال سائل بوردو المحلول ١ ٪.

## ٢٠٨٤٤ - فصيل

الفصيل: ولد الهيمة اذا فصل عن رضاع امه.

وذئها ١٢ سم. ثوبها الى الصبهة الصناعية، يملو ظهرها عشرة خطوط سم رقابية. بطنها ونحوها جرمزها بيض. جرحها سرداب قنص عديد الانفاق والمناظف تحزن فيه ما تخرجه من حيوب وجبور.

Coprinus (S).

## ٢٠٨٢٢ - فصانة

Coprini (F), Coprinus (E).

جنس فطور من فصيلة الفاريتونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق الشرق الاوسط وادوية. تعيش في التربة على الدبال وعلى المواد النباتية المنحلة في المراتق المحتلة الرطوبة. معظم انواعها سريع الطيب والزوال. بعض انواعها كثيف التجميع، كشته تمد من ١٥ الى ٢٥ ذبياً. أشهر انواعها الفصانة الفرعة والفصانة السوداء.

## ٢٠٨٢٤ - فصانة سوداء

Coprinus atramentarius (S).

Coprini noir d'ence (F).

نوع من الفصانة المأكولة. لحيتها متوسطة الصنف. اروسيتها قمية الشكل، معتدلة الحجم، سمراء اللون، يملوها موج اريد اسود. ساقها معتدلة الطول، ربداء اللون، يكتنفها طوق غشائي المادة لاقيا الارتكاز.

## ٢٠٨٢٥ - فصانة فرعة

Coprinus comatus (S), Coprin chevelu (F).

نوع من الفصانة المأكولة. لحيتها جيدة الصنف في اول ندهما ثم ليقة عند الادراك التام. اروسيتها كبيرة القند، كشتانية الشكل، لونها الى الرعدة الموشمة بالاسمر العابق. ساقها معتدلة الطول، طحلاء اللون، يكتنفها طوق كالسول لاقيا الارتكاز يكثر وجوده في القسم الاعلى.

٢٠٨٢٦ - فصيل

نوع من المعرب وقيل ولدها الصغير.

Cresels (S).

## ٢٠٨٢٧ - فصيلة

Créséis (F), Cresels (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مجنحات الارجل وفصيلة الغنايات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة بما فيها البحر الابيض المتوسط. جميعها مية تعيش بعيداً عن الشطوط. اسرابها وافرة العدد. اجسامها صفراء. اريدتها وزعانفها قليلة الانفلاق. اصداها غرزوية الشوزن، مستقلة الاطراف، شائعة، سريعة الطيب.

Phosphore (F).

## ٢٠٨٢٨ - فُصفور

هو الفسفور، أطليه.

٢٠٨٢٩ - فُصيصة

هي الفصة، أطليه.

Sevrer (F), To wean (E).

## ٢٠٨٣٠ - فصل، فطم

فصل الخليب عن الرضع.

Saison (F), Season (E).

## ٢٠٨٣١ - فصل

الفصل زمن من ازمة السنة الاربعة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء.

Disjonction (F).

## ٢٠٨٣٢ - فصل

Severance of causes (E).

هو في قانون المرافعات الفصل بين قضيتين كانتا متصلتين حتى تنظر كل منها على حدة.



فصانة سوداء



فصانة فرعة



فصلة



فصية الخوخ



فصية اللوز

## ٢٠٨٥٢ - فضية

Protea (S).  
Protée (F). Silver tree (E). Proteusstrauch, Silberbaum (D). Protea, Legno argentino (I).  
جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الفصيات. أنواعها عديدة معظمها بري وبعضها زينة. أوراقها صغيرة الحجم، كاملة النصل الغني، أزهارها ريفية، طرفية، رشح الرشيق بقرارة وهي كبيرة القند، أرجوانية اللون أو فسقية أو ليلية. أخشابها خفيفة متينة تستعمل في عدة صناعات || أشهر أنواعها ما يلي.

## ٢٠٨٥٣ - فضية بهية

Protea speciosa (S).  
Protée superbe (F).  
نوع من الفضية وهي جنية زينة تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها متعقبة قصيرة الزناد، نصلها بيضي الشكل بطول من ٨ إلى ١٢ سم || أزهارها ريفية، ضمية، كبيرة القند، بيضاء اللون، حراء الرض. قناباتها ملغية الصفحة، كثيفة الاهداب المزخرفة، سود الحنار.

## ٢٠٨٥٤ - فضية حرشية

Protea cynaroides (S).  
Protée artichaut (F).  
نوع من الفضية وهي بجلة زينة سريوتية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعقبة مستطيلة الزناد، نصلها بيضي الشكل بطول من ٨ إلى ١٢ سم. مسفته خلية البيرة الفضية || أزهارها ريفية، ضمية، حراء اللون أو وردية، حجمها حجم كوز الارضي شوكي الكبير القند.

## ٢٠٨٥٥ - فضية مستطيلة الزرق

Protea longifolia (S). Protée à longues feuilles (F).  
نوع من الفضية وهي بجلة زينة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها سنانة مستطيلة طولا براوح بين ١٥ و ٣٥ سم. أزهارها بنفسجية عاقبة. قناباتها بحرية الحنار ملغوا توشيح أزرق || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

## ٢٠٨٥٦ - فضية مغشيرة

Protea mellifera (S).  
Protée mellifère (F).  
نوع من الفضية وهي جنية زينة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها خلية تفلو من ٨ إلى ١٢ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البيرة، ذلق الزام الأخير || أزهارها وردية أو بيضاء اللون، كبيرة القند، غزيرة الرشيق الثري، قناباتها بدقة الصفحة الداخلية وهي حراء اللون مجتمعة بالاسود || أزهارها يستمر من كانون الثاني إلى نيسان.

## ٢٠٨٥٧ - فضية

Jus de raisin (F).  
Juice of grapes (E).  
عصير العنب يتم ويحفظ في القناني المحكمة البله فلا يفسد.

## ٢٠٨٥٨ - فطاح

Pollination (F). Pollination (E).  
الفطاح زين ظهور الطلع وانتشاره عند النبات.

## ٢٠٨٥٩ - فطاحية

Autogamie (F).  
Autogamy (E).  
هي الاخصاب الذاتي الذي يرتكز على تأثير مدقة الزهرة من وليج اسديتها.

## ٢٠٨٦٠ - فطاركة

Mycétogénèse (F).  
Mycetogenesis (E).  
النظارة علم يبحث في إثبات الفطور ونهيتها.

## ٢٠٨٥٥ - فضية

Famille (F). Family (E).  
الفصيلة في تصنيف الاحياء هي جاع اجناس لما صفات مشتركة. او جاع الاجناس التي تتشابه بخصائص البناء المشتركة. ورتبة الفصيلة يأتي بعد الرتبة وقبل الجنس. راجع تصنيف.

## ٢٠٨٥٦ - قضاء اوسط

Mésosphère (F).  
Mesosphere (E).  
القضاء الاوسط او الوسطي طبقة من الجو تقع بين القضاء السفلي والقضاء الشاردي. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ٣٠ كيلومتر عن سطح الارض، اما سماكتها فتراوح من ٨٠٠ إلى ٨٠٠ كيلومتر وذلك لانها تتغير مع فصول السنة ومع المواقع نظراً لانتفاعها المكسي بالعوامل الحركية والحرارة وسرعة الصوت.

## ٢٠٨٥٧ - قضاء سديمي

Stratosphère (F).  
Stratosphere (E).  
القضاء السديمي طبقة من الجو تقع بين القضاء الكندي والقضاء الاوسط. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ١٢ كيلومتر عن سطح الارض. سماكتها نحو ٢٠ كيلومتر. تتميز بكثرة مجاري الهواء وبالحرارة القليلة الفروقات اذ انها تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ درجة ستيفراد تحت الصفر.

## ٢٠٨٥٨ - قضاء شاردي

Ionosphere (F).  
Ionosphere (E).  
القضاء الشاردي او الدالفي طبقة من الجو الخارجي تقع بعد القضاء الاوسط وتمتد عمقاً الى حيث تنقطع العوامل الشاردي.

## ٢٠٨٥٩ - قضاء كسقي

Troposphere (F).  
Troposphere (E).  
القضاء الكسقي او الجو الارضي طبقة من الجو تلتف الكرة الارضية. تبدأ من سطح الارض حتى ارتفاع ١٠ أو ١٢ كيلومتر. تتميز بكثافة الهواء وبالبحار وبالغابات المختلفة وبالأزوايح واليوم والامطار.

## ٢٠٨٥٠ - فضة

Argent (F). Silver (E).  
معدن ابيض اللون راق لا يتأثر بالهواء والماء. يفلو جميع الماد في دفع الحرارة والتور وفي ايسالية الكهرباء. رمزها (ف- Ag) وزنها الانومي ١٠٧,٨٨ ثقلها النوعي ١٠,٥ تصهر في نحو ١٠٠٠ سع || وهي متوصلة الجوية قابلة للتصدد والطرق والصلل. مرهنا الانسان واستخدمها منذ اقدم العصور. توجد في الطبيعة اما هي نقية بصورة بولورات او ذرات مختلفة الاحجام مرصوفة داخل بعد الصخور، او مزوجة بتناسر مختلفة الكالكريت والزيديخ والاندوم والبروم والكلور || ام مصادر استخلاصها في العالم كبريتة الفضة الذي يحوي نحو ٨٦ ٪ من الفضة الصرفة وكلوريد الفضة الذي يحوي نحو ٧٥ ٪.

## ٢٠٨٥١ - فضيات

Proteaceae (S).  
Protéacées (F). Protéacées (E).  
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، عديمات القنالة، مرتقعات البيض. أنواعها زعا ١٠٠٠ منبتها البلاد الحارة. فيها الاشجار والشجيرات والجنات والاعشاب. اوراثها متعاقبة مسننة. أزهارها خنثوية رباعية الاجزاء، سلبية او عنقودية التجميع. ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والخواص بعضها ما كويل.

**Cryptogamie (F).** ٢٠٨٧٥ - **فُطْرِيّ**  
Cryptogamic (E).  
نعت تعريفي توصف به الاوصام المتأنية عن الفطور .

**Fongiforme, Fongoide (F).** ٢٠٨٧٦ - **فُطْرِيّ**  
Fungiform, Fungoid (E).  
ما كان على شكل الفطر او هيئته .

**Champignons (F).** ٢٠٨٧٧ - **فُطْرِيَّات**  
Fungus (E).  
شعبة من النباتات الدنيا تنتمي الى صف المشريات . تشمل اربع رتب وهي البيضيئات والدعاميات والزقيات وانماطيات وفي كل منها مراتب وفصائل وانجاس وانواع عديدة .

**Baie de myrte (F).** ٢٠٨٧٨ - **فُطْرِيَّة**  
Berry of myrtle (E).  
هي حبة الآس . ج. فطس .

**Hyménomycètes** ٢٠٨٧٩ - **فُطُور غِشَائِيَّة**  
هي الفشائيات فطور من رتبة الدعاميات منها الغاريقون وانجاس اخرى عديدة .

٢٠٨٨٠ - **فُطُور مَعْدِيَّة**  
هي الفطريات فسيلة فطُور من الدعاميات .

**Adénophore (F).** ٢٠٨٨١ - **فُطُورِيَّة**  
هي الأنسفرة ، اطلمها .

**Autogame (F).** ٢٠٨٨٢ - **فُطُوح**  
Autogamous (E).  
نعت تعريفي يوصف به كل نبات اخصابه فطاحة .

**Sanderling** ٢٠٨٨٣ - **فُطْرِيَّة**  
هي الدرجة ، اطلمها .

٢٠٨٨٤ - **فُطْرِيَّة**  
مفطر ذوات الخف .

**Prion (S).** ٢٠٨٨٥ - **فُطْرِيَّة \***  
Prion (E).  
جنس طير من كفيات القدم وفصيله جليديات الماء .

انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها تمتد من بحار القطب الجنوبي الى المحيط الاطلسي حتى تقوم اربعة || اجسامها معتدلة القد . اجنحتها مستطيلة ، لاحفة ، ذلقة . اذنانها غشائية الشكل تتألف من ١٢ رفة . مناقبها ضلعية ، معتدلة الطول ، متعققة البهرة ، تعمل سطوح انفاكها العليا بعض الوقام || اثنائها تختلط مع الانواع . اعرف انواعها فطيمة اريال وفطيمة مجدة .

**Prion ariel (S).** ٢٠٨٨٦ - **فُطْرِيَّة اُريال**  
Prion ariel (F).  
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي الى الزرقه الشبه المواج . صدرها وبطنها واثنيتها الى البياض الماسجى || اعطائها المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في زين التسافد والحفانة على المجاذب الافريقية والاسبانية .

**Prion vittatus (S).** ٢٠٨٨٧ - **فُطْرِيَّة مُجَدَّة**  
Prion orné (F).  
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي الى الزرقه الزرادية المواج . يملؤها في جناحها وذنبها جميع اسود . صدرها وبطنها الى البياض الاغبر || اعطائها القطب الجنوبي وجواره .

**Sevrage (F).** ٢٠٨٨١ - **فُطَام**  
Weaning (E).  
انتقال اولاد الحيوانات من دور الرضاعة الى دور الاعتناء بغير الحليب .

٢٠٨٨٢ - **فُطَح**  
عرض في وسط الرأس .

**Polliniser (F).** ٢٠٨٨٣ - **فُطَح ، تَبَع**  
to pollinate (E).  
فطح وتبع وأر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٢٠٨٨٤ - **فُطَحَل**  
قيل الفطَحَل « دهر » لم يُفَحَلْ فيه الناس بعد . وقال ابو عبيدة « هو زمن كانت الحجابة فيه رطبة » . الفارق بين التحديدين يفقر بجليارات الستين لان الزمن التي كانت الحجابة فيه رطبة يعود الى اوائل الحقبة السحيقة من ابايح ما قبل الكمبري . راجع حياة .

٢٠٨٨٥ - **فُطَحَل**  
Proton  
وضع مصري للدلالة على الزوجة .

**Champignon (F).** ٢٠٨٨٦ - **فُطُر**  
Mushroom, Fungus (E).  
كل نبات من غفيات الوليج ينتمي الى شعبة الفطريات . ج. فطور .

**Ophiobolus (S).** ٢٠٨٨٧ - **فُطُر السَّاق**  
فطر مجهرى من الزقيات ركب الحنطة وغيرها في اسافل سوقها فيصيب لها مرض الساق .

٢٠٨٨٨ - **فُطُر الصُّوفَان**  
هو الصوفان فطر من السميات ، اطلمه .

**Acrospore (F).** ٢٠٨٨٩ - **فُطُر القِمَّة**  
Acrospore (E).  
جنس فطور مجهرية تركب قم النجيليات ، اى اطرافها النامية ، فتؤذيها .

**Fistuline (F).** ٢٠٨٩٠ - **فُطُر الكَبِد**  
هو الفيتستولينا فطر مأكول من السميات . يعيش على جذوع بعض الاجنار الحرجية في المواقع الظليلة الرطبة . وهو كبير القد ، كبدي الشكل ، حتملي اللون ، عابق القاعده .

**Clavaria (F).** ٢٠٨٩١ - **فُطُر المَرْتَجَان**  
هو الدبوسية ، اطلمها .

**٢٠٨٩٢ - فُطُر سَاقِ الزَّرْع**  
Ophiobolus graminis (S).  
نوع من فطور الساق يركب سوق النجيليات فيؤذيها .

**٢٠٨٩٣ - فُطُر مَالِطَة**  
Champignon de Malte (F).  
هو الطروث ، اطلمه .

**٢٠٨٩٤ - فُطُر مَرَجَانِي**  
Clavaria corall (F).  
هو الدبوسية المرجانية ، اطلمها .



فطمة

## ٢٠٨٩٥ - قَعْرِيَّة شَعْرَاء \*

*Dasyllirion acrotrichum* (S). *Dasylire chevelu* (F).  
نوع من القعريّة الزيّينية . ساقها قصيرة . أوراقها كثيفة  
التجميع طول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ١ سم . نصلها  
جبل الخضار الزاوي ، شائك الحافة ، أصفر الشوك .  
ينتهي بمخلة من الياف الاسفر النديق . أزهارها الى  
الخضار القسّتي . تنورها يستمر طوال الصيف .



فَقْد

## ٢٠٨٩٦ - قَعْرِيَّة مُشَارِيَّة

*Dasyllirion serratifolium* (S). *Dasylire denté en scie* (F).

نوع من القعريّة الزيّينية . ساقها تملو نحو ٣ أمتار .  
أوراقها لينة متراكبة طول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض  
نحو ٣ سم . نصلها أخضر اللون ، أزرق المواج ، مشاري  
الحافة ، تسنينة نحو ٢ سم . ينتهي بأغبرية متوسطة القد ،  
أزهارها الى الخضار المايق اللامع . تنورها يستمر طوال  
فصل الصيف .



فَقْر

## ٢٠٨٩٧ - قَعْرِيَّة تَجِيلِيَّة

*Dasyllirion graminifolium* (S). *Dasylire graminoides* (F).  
نوع من القعريّة الزيّينية . ساقها تملو نحو ١٥٠ الى  
٢٥٠ سم . أوراقها لينة متراكبة طول نحو ١٠٠ سم .  
نصلها عصي الشكل ، جبل الخضار اللامع ، قصير  
الشوك الميخر ، ينتهي بمخلة صغيرة من الياف الاسفر .  
أزهارها الى الخضار البايكات المادم القمّة . تنورها يستمر  
طوال فصل الصيف .

## ٢٠٨٩٨ - قَعْم ، زَهْرَةُ التَنَكِبُوتِ

*Anthericum Phalangium* (S). *Phalangère, Anthérie* (F).  
*Spider-wort* (E). *Kleine Graslinie* (D). *Anterio* (I).  
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنيقيات .  
انواعه قليلة العدد تتميز بأوراقها القرصية الانتشاب  
الميزائية للنصل || اعرف انواعه الزراعية الزيّينية ما يلي .



قعريّة شعراء

## ٢٠٨٩٩ - قَعْم زَلْبَكِيّ الزَهْر \*

*Anthericum liliago*, *Phalangium liliago* (S). *Phalangère à fleur de lis* (F).

نوع من القعم ، غروب ثلثة . سوقه شمراخية مرسمة تملو من  
٣٠ الى ١٠٠ سم . أوراقه قرصية ميزائية الانتشاب النصل  
تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . وتعرض نحو ٦ سم . أزهار  
هامة الاكازاد عادمة العرف ، بيضاء اللون تطول نحو  
٢ سم . اسديتها مقوصة || أزهاره يستمر من أيار الى  
حزيران .

## ٢٠٩٠٠ - قَعْم مُتَشَعَّب

*Anthericum ramosum*, *Phalangium ramosum* (S).  
*Phalangère rameuse* (F).

نوع من القعم . ساقه شمراخية فروع تملو من ٣٠ الى ٦٠  
سم . أوراقه قرصية الانتشاب ميزائية النصل تطول من  
٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . أزهاره تاجية عادمة  
العرف بيضاء اللون تطول نحو ١ سم . اسديتها جالسة .  
أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .



قعم زنبقيّ الزهر

## ٢٠٩٠١ - فَعَاء ، قَعْر ، قَعْم

*Epanouissement* (F). *قَعْر ، قَعْم ، فَعَاء* (E).  
فعا وأفنى الشجر : تفتح نوره . والفعا هو حالة الانزهار  
المختصة .

## ٢٠٨٨٨ - قَطْ \* ، فَيْلُ الْبَحْرِ

*Tricheus* (S). *Morse, Eléphant de mer, Cheval marin* (F).  
*Walrus* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة من فصيلة الفظيات أو فيلة  
البحر . له نومان الفظ الشائع والفظ النليظ || والفظ  
يشبه القفلة لكنه أكبر جثة وأقبح منظرًا . طول الذكور  
نحو ٧ أمتار وله نابان مستطيلان متدليان من فكه الأعلى .  
اصطانه مناطق الجليد الدائم . يعيش أسرابًا متوسطة العدد .  
قوته الاصملاك والاسداف .

## ٢٠٨٨٩ - قَطَبَات ، فَيْكَةُ الْبَحْرِ

*Trichaceae* (S). *Trichacées* (F). *Trichaceae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من رتبة زعنفيات الافدام ،  
وهي وحيدة الجنس ثنائية النوع فيلها تعتبر من سياع  
البحر .

## ٢٠٨٩٠ - قَعَالِيَّة

*Efficacité* (F). *Efficacy, Effectiveness* (E).

## ٢٠٨٩١ - قَعْر \* ، زَلْبَكِيّ الإفريقيّة، زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ

*Agapanthus* (S). *Agapanthe, Lis africain, Tubéreuse*  
*bleue* (F). *Blue african lily, Blue lily of the Nile* (E).  
*Afrikanische Liebesblume, Blaue Tuberosa* (D).  
*Tuberoso turchino* (I).

نبات عشبي جذموري معمّر وحيد الجنس والنوع من  
فصيلة الزنيقيات . غروبه عديدة . أوراقه صفوية الشكل  
تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٨ سم .  
شراخه يملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ينتهي بقرص من الزهر  
صيواني التجميع يعد من ١٠ الى ٣٠ زهرة عادمة العرف  
تطول من ٣ الى ٤ سم . ألوانها تختلف مع الضروب يكثر  
فيها الأزرق والايص || أزهاره يستمر من تموز الى  
آب .

## ٢٠٨٩٢ - قَعْرِيَّة

*Dasyllirion, Bonaparteae* (S).

*Dasylire* (F).

جنس نباتات برية وزيّينية من فصيلة الزنيقيات . انواعها  
عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها وسوقها  
لبينية التركيب . اوراقها خفيفة النصل ، مستطيلة ،  
متراكبة ، متدللة . أزهارها منبلي التجميع يرتكز على  
شمارخ منصّب مستطيل || تعيش في جميع الأثرية أما  
تخشي كثرة الكلس والرطوبة والمدارس الشمالية الباردة .  
اعرف انواعها وأشهرها ما يتبع .

## ٢٠٨٩٣ - قَعْرِيَّة بَحْرِيَّة

*Dasyllirion glaucophyllum* (S). *Dasylire glauque* (F).

نوع من القعريّة الزيّينية . ساقها تملو نحو ٤ أمتار .  
أوراقها متراكبة لينة تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض  
من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها بحري اللون ، شائك الحافة  
المسنة . اصفر التئين . سبلها كبيرة القند متعطفة الزام  
الاخير . أزهارها الى الخضار الازرق المواج . تنورها  
يستمر طوال الصيف .

## ٢٠٨٩٤ - قَعْرِيَّة تَرْغُونِيَّة

*Dasyllirion longissimum* (S). *Dasylire tétragone* (F).

نوع من القعريّة الزيّينية . ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم .  
أوراقها متراكبة لينة تطول من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . نصلها  
رباعي الزوايا يعرض نحو ٦ م . لونه الى الخضار البايكات .  
سبلها الزهرية كبيرة القند . أزهارها الى الخضار المايق .  
تنورها يستمر طوال الصيف .

- Vertébrés (F). **فَقَارِيَّات** ٢٠٩١٥ -  
هي الفقريات ، اطلبها .
- ٢٠٩١٦ - **فَقَّاش البُنْدُق**  
Casse-noix vulgaire (F).  
طائر يدعى الخساف ، اطلبه .
- ٢٠٩١٧ - **فَقَّاعَة**  
Bulle (F), Bubble (E).  
٢٠٩١٨ - **فَقَّاقَة**  
Tétrodon (F), Puffer (E).  
هي النفقة ، سمكة هزينة تكثر في النيل والنيجر . وقيل  
الفقاعة طائر (كذا) .
- ٢٠٩١٩ - **فَقَّالَة ٥**  
Eucinetus (S).  
Eucinète (F), Eucinetus (E).  
جنس حشرات من فصيلة الفَقَّالِيَّات ورتبة غديسات  
الاجنحة . انواعها المعروفة ١٢ اصلها من معظم المناطق  
الشالية وجبال المناطق المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،  
مبطلة ، شبه اعليلية الشكل ، تقوّل من ٣ الى ٧ م .  
رؤوسها صغيرة الجرم ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة ،  
بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها  
الاستشعارية غليظة او قلابية . كواسلها شبه مربعة .  
الحامدا لاسفة ، رباعية الاخاذيد التحيلة القلابية .  
قوائمها نشيطة . اثنائها ملونة يكثر فيها البني || الجملاة  
منها والبرقة تعيش في الجملاة وفي الاشجار النخرة على  
المواد النباتية المنحلة .
- ٢٠٩٢٠ - **فَقَّالِيَّات ٥**  
Eucinétidae (S).  
Eucinétidés (F), Eucinétidae (E).  
فصيلة حشرات من غديسات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
المعروفة بمجموعة الدم ، منتشرة في معظم حراج البلاد  
الباردة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه اعليلية  
الشكل ، مبطلة ، تقوّل من ٣ الى ٧ م . رؤوسها  
صغيرة ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة ، بارزة .  
تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية .  
الفصل . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة . قوائمها  
نشيطة . ارساغها خماسية المقل . اثنائها ملونة || جميعها  
دامنة تعيش على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها  
الفقالة .
- ٢٠٩٢١ - **فَقَّح** فقح الجرو : فقح صبي .
- ٢٠٩٢٢ - **فَقَّح**  
فقح الشجر : انشقق عيون ورقه وبدت اطرافه .
- ٢٠٩٢٣ - **فَقَّحَة** هي حلقة الدبر .
- ٢٠٩٢٤ - **فَقَّحْد**  
Cuscute à odeur suave (F).  
هو الكشوث المطر ، اطلبه .
- ٢٠٩٢٥ - **فَقَّحْد البَصَر** ، **فَقَّحْدَان البَصَر**  
Caligation  
٢٠٩٢٦ - **فَقَّر**  
Creuser (F), To hollow (E).  
فقر الأرض : فحرا . والفقرة : الحفرة . ج فقر .
- ٢٠٩٢٧ - **فَقَّر الدَّم**  
Anémie (F), Anaemia (E).  
عدم كفاية الدم اما من حيث تركيبه او من حيث  
مقداره . اسبابه عديدة اشيعها اللل واللود في المدة او  
الاماء .
- Epanthe (F), Epanthous (E). **فَقَّار ٥** ٢٠٩٢٢ -  
نمت تعريفي يطلق على كل ما يعيش طقيليا على الارض .
- ٢٠٩٢٣ - **فَقَّر ، فَقَّم**  
الفقر والققم : ازرار الورد عندما تفتح .
- ٢٠٩٢٤ - **فَقُّو** هو الياسم ، اطلبه .
- ٢٠٩٢٥ - **فَقَّوَة**  
Fragrance (F).  
هي الرائحة المستحبة ، يقال فوّه الطيب .
- ٢٠٩٢٦ - **فَقَّاح**  
Inflorescence (F).  
فقاخ وقفحة كل نبت : زهره .
- ٢٠٩٢٧ - **فَقَّاح** هو ذمرة الربيع ، اطلبه .
- ٢٠٩٢٨ - **فَقَّاح ، فَزْر**  
Sideritis (S).  
Sidéritide, Sidérite, Crapaudine (F), Iron wort (E).  
Gledkraut (D), Basilica salvatica (I).  
واحدته فقاخة . جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة  
الفقويات . مهدد المناطق الاسيوية والاروبية المعتدلة  
الحارة .
- ٢٠٩٢٩ - **فَقَّاحَات ٥**  
Spondillidae (S).  
Spondillidés (EF), Spondillidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم  
الرباعية ، عاداتها المتاعب . اجناسها وانواعها عديدة  
منظما من احافير الاراضي التالفة || انتشارها يعم معظم  
بحار المال اغصها بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها  
المعاصرة واشهرها الفقاخة والفقيينة .
- ٢٠٩٣٠ - **فَقَّاحَة ٥**  
Spondylus (S).  
Spondyle (F), Spondylus (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم  
الرباعية ، عاداتها المتاعب وفصيلة الفقاخات . انواعها  
المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد  
الحارة || اصداها شبه بيضية الشوزن ، لانساقية  
المصاريع الشائكة تملؤها زعمات متباينة الاستطالة ،  
دقيقة الاطراف الذرية || تعيش لاصقة بالصخور  
الممتدة القور .
- ٢٠٩٣١ - **فَقَّار الجَوْزَاء**  
Baudrier d'orion (F).  
فقار الجوزاء كواكبها ، وهي الثلاثة المستعرضة الوباسة  
في وسط الجوزاء . تسبها العرب النظم وتسبها ايضا نطاق  
الجوزاء ومنطقة الجوزاء ويد الجوزاء . وهي مثل في الانتظام  
والانتام .
- ٢٠٩٣٢ - **فَقَّار الشُّجَاع**  
فقار الشجاع كواكب .
- ٢٠٩٣٣ - **فَقَّارَة ، فَقَّرَة**  
Vertèbre (F).  
Vertebra (E).  
هي الفقرة ، اسطوانة عظمية صغيرة يتألف منها العمود  
الفقرى الحيواني .
- ٢٠٩٣٤ - **فَقَّارِيَّ**  
Rachidien (F).  
Rachidian, Spinal (E).  
نمت تعريفي يوصف به ما هو مختص بسلسلة الفقار .



فقّاحة

## ٢٠٩٢٨ - فقرات

الفقرات نجم نير من كوكبة برج القرب .

## ٢٠٩٢٩ - فقرة ، فقيرة

Allnée (F).

Indented line (E).

هي جزء من مادة من العقد تبتئ بسطر جديد وبمعى جديد .

## ٢٠٩٣٠ - فقارة ، فقارة

Vertèbre (F).

Vertebra (E).

كل واحدة من الاسطوانات العظمية التي يؤلف مجموعها السود الفقري . وهي صغيرة القد مثقوبة الوسط تحسن الشئاع الشوكي الذي يمر في ثقبها . ج فقر وفقر .

## ٢٠٩٣١ - فقرة

Trou de plantation (F).

Hole of planting (E).

هي الحفرة المعدة لاقبال الفرس . ويقال لها الحب والجورة والفقر .

## ٢٠٩٣٢ - فقريات ، فقاريات

Vertébrés (F).

Vertebrata (E).

قسم من المملكة الحيوانية يشمل جميع الحيوانات الفقرية التي تتجمع الى خسة صفوف : الأسماك والصفدييات والزحافات والطيور والثدييات .

## ٢٠٩٣٣ - ققع ، ققع الدب

Lycoperdon (S). Lycoperdon, Vesses-de-loup (F). Devil's snuff-box, Earth-ball, Puff-ball (E). Staubling (D). Lycoperdon, Vescia lupaja (I).

جنس فطور من فصيلة الفقييات ورتبة العمايات . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها مأكولة لكنها متوسطة الصنعة ويجدر انتزاعها واستعمالها قبل دخولها في طور الادراك لأنها تصبح اذ ذاك جلدية اللسج .

## ٢٠٩٣٤ - فققي

Phaps, Pigeons bronzés (F).

جنس طير من فصيلة الحماميات . أنواعه اربعة جميعها مربوعة القامة ، ممتطيلة الاجنحة الدافقة ، قصيرة الاذنان والارباع ، مستطيلة الاصابع ، متراكبة الالوان السعد المالح || واحداها ققع . اطلبه .

## ٢٠٩٣٥ - فققييات

Lycoperdaceae (S).

Lycoperdaceae (E).

فصيلة فطور مائية ملبولة توجد في جميع اقطار العالم . تتميز بنسجها الاسفنجية التي تبدو غبراء اللون ثم تتحرف مع اقترابها من الادراك الى السرة والصلابة او الزرارة وتندكها لتكتسب رائحة خاصة يسهبها اللوق .

## ٢٠٩٣٦ - فققل

Rendement (F). Produce, Yield (E).

النتقل هو الربيع . يقال ارض كثيرة الفقل وزراعة جيدة الفقل .

## ٢٠٩٣٧ - فققل

Vanner (F). To winnow, To fan (E).

فقل البير : ذراه وضع دقه بالفلقة .

## ٢٠٩٣٨ - فققل

سمكة مسومة لا تتحرك وهي صغيرة قدحها كاصبع (القماوس)

## ٢٠٩٣٩ - ققم ، ققم

Musau du chien (F).

الققم والققم طوط حنط الكلب . (E).

## ٢٠٩٤٠ - فققة ، عجل البحر

Phoca (S).

Phoque (F). Seal (E).

جنس حيوانات لبونة مائية من فصيلة الفقييات . انواعه عديدة معظمها يعيش في بحار البلاد الشمالية وبعضها في بحار البلاد للمتدلة منها المتوسط || اجناسها كثيرة القد خضة طولها يراوح بين ١٥٠ و ٦٥٠ سم . اولها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسمر الكسني الموشج بالابيض والاريد . رؤوسها وظهورها اعين من جوانبها . بطنها الى الصفار الابيض المالح . رؤوسها خفيفة . اعانها وقوائمها قصيرة . ذكورها اكبر جنس من انثاها || قتها الاسماك والقشريات والرخويات . الانثى تضع جرورا واسدا في الماء ذك في اواخر ايار || تصاد من اجل جلودها وزيتها ونهم من اكل اللحم واستعمل الاسماء عسلظام .

## ٢٠٩٤١ - فققة متوجرة

Phoque à capuchon (F).

حيوان بحري يدعى سينفور ، اطلبه .

## ٢٠٩٤٢ - فققييات

Phocidae (S).

Phocidés (F). Phocidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة مائية من رتبة زعنفيات الاقدام . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الفققة .

## ٢٠٩٤٣ - فققوس ، فققوس ، بققوس

Concombre chete (F).

هو القثاء ، اطلبه .

## ٢٠٩٤٥ - فقيرة

Achaine, Akène (F).

Achene, Akene (E).

هي الثمرة الفقيرة المنفصلة الجث من البلب .

## ٢٠٩٤٦ - فققيش ، عيش الغراب

Vichania somnifera (S). Coqueret somnifère (F).

Winter cherry (E). Vitania (I).

نبات عشبي حولي بري من المفدييات الباذغانيات . ساقه فروعها تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه منقطة متعاقبة تصلها كبير القد ثلاثي او خماسي التفريش . ازهاره ابطية الازنكار ، ثنائية او ثلاثية التجميع ، زرقاء اللون . ثماره عنبية ، كروية ، صغيرة القد ، بنسجية اللون لما استعمالها الطبي وتعتبر من المنوتات .

## ٢٠٩٤٧ - فققي الخلتج

Phaps lumschelle, Colombe verte

طائر من الفققي وفصيلة الحماميات . طول نحو ٣٥ سم . رأسه وظهوره الى السرة الخضيلة ، زوره ابيض اصفر ، صدره الى الخيرة ، بطنه الى الردة ، اجنحته مؤدرة وبشرة بالاخضر النحاسي الاسف المالح . اذنيكه حنطي الانشباب والوسط ، رمادي الاطار . منقاره اسود اللون . قوامه حر . يألف البراري وادغال الخلتج قرب المنافع ويحار الى الله . قوته الجبر على اختلاطها . يأن في الاجمار القليلة الارتفاع اناء تبيض بيضتين مرتين في السنة .

## ٢٠٩٤٨ - فققيع الغاب

Lauconarcia (F).

طائر من الفققي وفصيلة الحماميات . طول نحو ٣٨ سم . ثوبه لوب فققي الخلتج ، زوره خال من البياض . منقاره اسمر اللون حنطي الختار || يألف الغابات والاحراج . يأن في الاجمار الباسقة .



فقق



فققة



فققي الخلتج

## ٢٠٩٥٨ - فُلٌّ \* ، يَاسَمِين زَنْبَقِي

Jasminum sambac, Mogorium sambac (S). Jasmin sambac, J. d'Arable (F). Arabian Jasmine, Double Jasmine (E). Arabischer Jasmin, Sambac Jasmin (D). Mugarino doppio, Gelsomino d'Arabia (I).

جس فنباتات زنبقية ، سبوتية ، معمرة من سبط الياسمينيات وفصيلة الزيتونيات . انواحه اربعة جميعها جنبا على رعاها صغيرة القد تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كاملة متقابلة بيضبة الشكل . نصلها جامدة الصفحة ، ملس البشرة شديد الحفاط اللامع . ازهارها بيضاء اللون ، ذكية العرف العطر القويح || اشهر انواحه الغلل المكسب الذي يتميز بازهاره الكبيرة المتراكبة البتلات العديدة المستعرضة . ثم الغلل الطويق وهو صغير الازهار ، خاصي البتلات المنذغة . || واللغ يتكاثر بالتعقل وزراعه لا تتصلب عناية خاصة .

## ٢٠٩٥٩ - فُلٌّ \* ، قَلِيل

Faille, Barle, Géoclase, Paraclose (F). Fault (E). تصدع في الصخور يسبب انشقاقها .

## ٢٠٩٦٠ - فُلٌّ حَوْصِي \* Fosse d'effondrement (F). Trough fault (E).

## ٢٠٩٦١ - فُلٌّ عَادِي Faille normale (F). Normal fault (E).

## ٢٠٩٦٢ - فُلٌّ قَاعِر Faille béante (F). Open fault (E). تصدع واسع الشق .

## ٢٠٩٦٣ - فُلٌّ مَدْرَج Faille à gradins (F). Step fault (E). تصدع متتابع الشقوق .

## ٢٠٩٦٤ - فَلَاحَة ، قَيْقَاءَة ، سَهْبُ Steppe ج. فلوات ونياني وهبوب. سهول مرآمية الاطراف شاسعة المدى صحراوية البتوت.

## ٢٠٩٦٥ - قَلَانِي Steppique (F). Steppical (E). ما هو مختص بالفلاة كالعظم والبتوت .

## ٢٠٩٦٦ - قَلَاجَة Charrue fossoyeuse, Charrue rigoleuse (F).

## ٢٠٩٦٧ - قَلَّاح Laboureur, Cultivateur (F). Husbandman, Cultivator (E). من مارث حرت الربة وزرعها .

## ٢٠٩٦٨ - قَلَّاحَة ، حَرَائَة Labourage (F). Tillage, Ploughing (E). شق الربة وقلها بالحرث .

## ٢٠٩٦٩ - قَلَارِيس Phalaris (F). هو البشته نبات عشبي علني من النجيليات .

## ٢٠٩٧٠ - قَلَارِيس مُعَقَّد Phalaris noueux (F). هو البشته المقدية ، نبات عشبي علني من النجيليات .

## ٢٠٩٧١ - قَلَّاس Pallas (F). Pallas (E). اسم علم اسطوري لسيار بين المشتري والمريخ اكتشفه « أولبر » عام ١٨٠٢ .

## ٢٠٩٧٢ - قَلَّاط Voltmètre (F). Voltmeter (E). مقياس الفلط .

## ٢٠٩٦٩ - قَيْقِيعِ الْمَنَاقِعِ \*

Géophaps, Colombi-Caille (F). طائر من الفقيى وفصيلة الحماميات طوله نحو ٢٤ سم . صغير المنقار ، قصير الجناح المستدير ، مستطيل الارياح . لونه ثوب القيقع للمنى لكنه عادم الكشكة ونحال من لبقعة الحمراء . وهو قريب الشبه من السبا في يالفت المنقاع والرامي . يثنى الحوص في الربة بين الادغال والاعشاب الكثيفة .

## ٢٠٩٧٠ - قَيْقِيعِ مَدَامِي \* ، يَحْمُومُ

Phaps lophote, Colombe poligrardée (F). طائر من الفقيى وفصيلة الحماميات . طوله نحو ٣٣ سم . يتميز بكشكة مستطيلة تملو مؤخر الرأس . رأسه وعنقه ومدره ويطل الى الربة الرادية . يملو مقدم صدره بقعة حمراء كأنها صقعة من الدم . ظهره زيتوني ، اجنته الى الخضار النحاسي المؤزر بالاييض . منقاره اسود . قوامه حر || يالفت ضفاف الانهار والمستنعات . قوته الجيوب . يثنى في الاشجار والشجيرات الكثيفة . اناته قيقص بيضتين .

## ٢٠٩٧١ - قَيْقِيلَة \* ، جُوزُ الْأَفْعَى Fevilles (S). Févillée, Avila, Noix de serpent (F). Nhandirobe (E).

جس نباتات جنبيه عائرة ، ثنائية المسكن من فصيلة الزريعات . انواعها المعروفة سبعة منها معظم مناطق البلاد الحارة والاستوائية || سوقها عائرة عشوشة مستطيلة . اوراقها معتقة ، كفية الشكل ، خاصة التفتيص . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها خماسية البتلات الصفر . ثمارها تدمي جوز الثعبان وهي بطليخة الشكل ، صغيرة القد ، مائلة السطح ، تغلف بعض البلور المركزة على محور الثمرة الثلاثي الاصل . || يستخرج من بزورها مادة زيتية لها استعمالها الطبي .

## ٢٠٩٧٢ - قَلَك Mâchoire (F). Jaw (E). احد جزئي الفم حيث غزت الانسان وما فكان علوي وغللي .

## ٢٠٩٧٣ - قَلَك Maxille (F). Maxilla (E). ها في الحشرات فكان عريضان متساويان ، مركزهما في مقدمة الرأس بين التأثير ، يحلن الملاص الفكية .

## ٢٠٩٧٤ - قَلَكَاك من الانماط الزراعية . راجع قمرية .

## ٢٠٩٧٥ - قَلَكَة ، اِكَلِيل شَمَلِي Couronne boréale (F). Corona borealis (E).

الفكة او الاكليل الشمالي كوكبية نجوم شمالية الموق مركزها بين المراء والشميان والجاتي . عدد نجومها ثمانية وهي مستديرة الشكل وفي استداراتها ثلثة لذلك يقال لها ايضا « قصعة السالكين » . ومن نجومها الثمانية المزدوجة نجم ، من المرتبة الرابعة ، يدعى « ثير الفكة » . ونجم من المرتبة السادسة يدعى « ثير القصعة » .

## ٢٠٩٧٦ - قَلَش Entorse (F). Sprain (E). زوع المفاصل وربطها عن مواضعها .

## ٢٠٩٧٧ - قَلَكِي Maxillaire (F). Maxillary (E). ما هو مختص بالفك .



قَيْقِيعِ الْمَنَاقِعِ



قَيْقِيلَة



قَلَك





فلبوس الاجاص



فلبوس البتولا



فلبوس الحليجى



فلبوس نفثى



فليت



فلحوس

Philleptus (S).  
Philépitze (F).

مائل وحيد الجنس والنوع من الجوامث مشروبات المنافع  
وفصيلة الفناجيات. اصطناعه بعض مناطق افريقية الشرقية  
وبجزيرة مدفسكر || ثوبه الى الشقعة السراة. رأسه  
وزوره داخل صدره الى السرة الباقية. بطنه وانفكه  
واباهره مرقوفة || قوته الحشرات الصغيرة والنمل والبطور.  
يدفن عشه في الشجيرات البقلة. الاثني تخشن نحو ه  
بيضات من مرتين الى ثلاث مرات في الحول. الذكر  
يؤين لها الغذاء.

٢٠٩٨١ - فلتان

مائل زعموا انه يصيد القردة (البسان).

Répartir (F).  
To divide, To distribute (E).

٢٠٩٨٢ - فلتج، فلتج  
فلج الارض للزراعة: قسمها || وثلج المال بينهم:  
قسمه بالتساوي.

Moitié (F). Half (E).

٢٠٩٨٣ - فلتج  
فلج كل شيء: نصفه.

Fente branchiale (F).  
Branchial fissure (E).

٢٠٩٨٤ - فلتج خيشوي

٢٠٩٨٥ - فلتجة  
الفلجة: ساقية الزرع. ج فلجان.

Blastomère (F). Blastomere (E).  
٢٠٩٨٦ - فلتجة  
اسم تعريفي يطلق على كل بلسيدة او بوسية من البوسيات  
المتأينة عن تسكيم البيسة في طور نموها المتناهي المادي.

Labourer (F).

٢٠٩٨٧ - فلتج، حرت

شق التربة او قلبها بالمخراش. ||  
To plough, To till (E).

٢٠٩٨٨ - فلتحنس

الكلب المسن والدب ايضا.

Hemigalea (S).  
Hémigale (F).

٢٠٩٨٩ - فلتحنس  
جنس حيوانات لاحة مفترسة من فصيلة الزبديات.  
موطنها ملقة وصوميرا وبورنيو. تألف الاجراج والغابات.  
سرحها دجوي. ملجتها الحيائي فردي لا تجتمع الا في  
زين الوداق والكوم || اجسامها مستطيلة الشكل، هياها  
تطول من ٨٠ سم. بما فيه الذنب. رؤوسها  
زائفة. اعظامها ذلقة. عيونها صغيرة. اذانها دقيقة  
جالسة. قوائمها قصيرة. اذانها مستطيلة جللة. وبرها  
قصير، متوسط النعومة. الثوبها الى الشبهة الصفراء يعلوها  
تجذيع متفرق اسود او تيجج كسني وذلك بالنسبة الى  
النوع || قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والطيور  
والاناعي والزرع.  
نوعاها المروغان:

٢٠٩٩٠ - فلتحنس مجدع

Hemigalea Hosi (S). Hémigale de Hosi (E).

سرحه جبيل وبورنيو.

٢٠٩٩١ - فلتحنس مجدع

Hemigalea Hardwicki (S). Hémigale zébrée (F).

سرحه ملقة وصوميرا وبورنيو.

Polycotylédon (F).  
Polycotylédon (E).

٢٠٩٩٢ - فلتان

متعدد الفلق.

٢٠٩٩٤ - فلتانة

Astronomie (F). Astronomy (E).  
في علم الفلك، علم يبحث في الاجرام السماوية على  
اختلافها كالتجوم والكواكب والمذنبات الخ. وذلك  
من حيث نظر دورها وإبعادها وراكيبها المقدرة والقوانين  
التي تقصر ظواهرها المنظورة.

Phyllobius (S).

٢٠٩٩٥ - فلبوس

Phyllobie, Coupe-bourgeons (F).

جنس حشرات ناعمة من فصيلة السويات. انواعه عديدة  
تركب معظم الاشجار المثمرة والحرجية. جميعها صغيرة  
القد طولها يراوح بين ٤ و ٧ مم. اجسامها سفينة القشار  
سفينة اللامجة. امتاها غليظة الشكل قصيرة القد مستقيمة  
الانتشابل. يكثر وجودها في الربيع. رقاتها تعيش في  
التربة على المواد العضوية حتى اكتمال طولها البرقي.  
اضرارها محصورة بما تفرقه. الحشرات الكاملة، من اذى  
في قرض البراعم واظراف الاوراق.

٢٠٩٩٦ - فلبوس الاجاص

Phyllobius pyri (S). Phyllobie du poirier (F).

Large green weevil, Pear leaf eating weevil (E).  
Breiter Birnengrünrüssler, Grünrüssler (D).

نوع من الفلبوس. مرته الاشجار المثمرة اخضرها الاجاص.  
طوله يراوح بين ٥ و ٧ مم. ثوبه الى الخضار المذهب.  
ظهورانه كثير التعطيط. مدينه اسر الخضار باهت اللامجة.  
متك قصير القد بالغ التعديد. زبانه الى الشقعة الحطية.  
يسرح في النهار، يكثر في اوائل الربيع. قوته اطراف  
الاوراق الفتية ولا ينفذ من البراعم.

٢٠٩٩٧ - فلبوس البتولا

Phyllobius betulae (S). Phyllobie du bouleau (F).

نوع من الفلبوس. مرته الاشجار الحرجية اخضرها البتولا.  
طوله يراوح بين ٤ و ٦ مم. ثوبه الى الخضار اللامع.  
ظهورانه مبهر السهف والحلب المنتصب الدقيق. زبانه  
وسيقانه وارساه الى الصفار الحطلي. متك ضيق الطرف،  
عادم التعديد || يسرح في النهار. يكثر في اوائل الربيع.  
قوته الاوراق الفتية.

٢٠٩٩٨ - فلبوس اهلجي

Phyllobius oblongus (S). Phyllobie oblongue (F).

Leaf eating weevil, Brown leaf weevil (E).  
Gemmer Blattrüssler, Schmalbauch, Obstbäume-  
grünrüssler (D).

نوع من الفلبوس مرته الاشجار المثمرة. طوله يراوح بين  
٤ و ٦ مم. ثوبه الى السواد اللامع. ظهورانه احطيل  
السهف الدقيق. يسرح في النهار. يقضم البراعم والاوراق.

٢٠٩٩٩ - فلبوس فقي

Phyllobius argentatus (S). Phyllobie argentée (F).

نوع من الفلبوس مرته الاشجار الحرجية على اختلاف  
انواعها طوله يراوح بين ٣ و ٥ مم. ثوبه الى السرة  
الغبراء يعلوها مواج قصي. زبانه وسيقانه وارساه حطية  
اللون. متك عرطولي الشكل غليظ القاعدة || يسرح  
في النهار. يكثر في اوائل الربيع. قوته البراعم والاوراق  
الفتية.

٢١٠٠٥ - **فِلْتِي** (F). Voltaïque (F). Voltaic (E).  
نمت توصف به الكهرباء الفلظية المصدر .

٢١٠٠٦ - **فِلْطِيَّة** (F). Voltage (F).  
هو فرق الجهد بين طرفي السلك الموصل . وهو مقدار  
الفلط اللازم لتشغيل آلة ما .

٢١٠٠٧ - **فِلْطَت** (S). Valvata (S). Valvate (F). \*  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل  
وفصيلة التفلفيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة  
في بعض بحار البلاد الباردة || أصدانها حلزونة ، مبطنة ،  
شبه مستديرة الشكل يكثر فيها اللون الأبيض .

٢١٠٠٨ - **فِلْطِيَّات** (S). Valvatidae (S). Valvatidés (F). Valvatides (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل  
أمايات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة  
قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والشمالية  
نحو الباردة || أصدانها متباينة الاكسال يكثر فيها  
الخطوط والانسداد || اعرف اجناسها الفِلْطَت .

٢١٠٠٩ - **فِيلِيل** (S). Piper (S).  
Poirier (F). Pepper (E). Pfeffer (D). Pepe (I).  
جنس نباتات مختلفة الاحجام معمرة من فصيلة الفلفليات .  
انواعه نحو ٦٠٠ اصلاتها المناطق الحارة من المالين القديم  
والجديد . معظمها شجيرات ونباتات برية متسلقة وبعضها  
زرابي وتربيني . اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها جلدي  
الصفحة . ازهارها بحورية الارتكاز ، قدية التجميع ،  
متدلية . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القدر يكثر فيها  
اللون الكحلي ثم الجوزي || اشهر انواعه ما يتبع .

٢١٠١٠ - **فِيلِيل أَحْمَر** هو الفليفلة ، اطلبا .

٢١٠١١ - **فِيلِيل أَسْوَد** ، **فِيلِيل عَطِر**  
Piper nigrum, P. aromaticum (S). Poirier noir (F).  
Black pepper plant (E). Schwarzer Pfeffer, Gemeiner  
Pfeffer (D). Pepe nero, P. aromatico, Pever (I).  
نوع من الفلفل وهو شجيرة زراعية متسلقة ، حواملها غليظة  
تعيها على الارتفاع والتثبث || ثمارها حارة مشهورة  
تستعمل في الطعام .

٢١٠١٢ - **فِيلِيل الصَّقَالِيَّة** (S). Agnus castus (S).  
هو الاذنة والبرساد وكث مريم ، النج .

٢١٠١٣ - **فِيلِيل الماء \*** ، **زَنْجَبِيل الكلاب**  
Polygonum hydropiper (S). Curage, Poivre d'eau,  
Piment d'eau (F). Water pepper, Lake weed, Biting  
persicaria, Curage (E). Pfeffer-Knöterich (D). Polli-  
gono piperi, Pepe d'asino, Polygono acre (I).  
نبات عشبي بري من فصيلة البيلبليات . يعيش في  
المنطق . ساقه عقداء . اوراقه وجذوره حريفة الطعم كانت  
تستعمل قديماً في الطب .

٢١٠١٤ - **فِيلِيل حُلُو \*** ، **فِيلِيل إِرْتَجِي**  
Pimenta (S). Pimenta, Piment des angiais, Poivre  
de la Jamaïque, Toute-épice (F). Allspice, Pimento  
(E). Pimentbaum, Pimentmyrte (D). Pimento (I).  
شجرة برية وزراعية من فصيلة الآسيات . مهدا البلاد

٢٠٩٩٢ - **فِلْدَة** (F). Phyllode (F).  
ورقة عرضية ناتجة عن شلوح جسموري . ج فلد .

٢٠٩٩٣ - **فِلْدَسْبَاة** ، **فِلْدَسْبَار** (F). Feldspath (F). Feldspar (E).  
هي صوانات الالومين مع احدى التواعد القلوية كالبوتاس  
والصودا والكلس والمنيزا ... || يكثر وجودها في الصخور  
الاصيلة والبركانية . وهي تتألف مع الطلق والمرو مواد  
الاهيل البلورية .

٢٠٩٩٤ - **فِلْدُوس** ، **فِلْدُوس** (S). Phylloode (S). Phylloode (F). Phylloode (E).  
بصلة صغيرة معمرة من فصيلة الخننجيات . مهدا بعض  
جبال حوض البحر الابيض المتوسط . ساقها فراء تملو  
من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كثيرة العدد ، صغيرة القدر ،  
تطول نحو ١٠ سم . وتفرس نحو ٢ م . نصالها مائلة ،  
غضراء اللون ، مسننة الحار . ازهارها صوانات التجميع .  
ازهارها كبيرة جلجلية الشكل ، مستطيلة المالحات الحولية  
القشار . لونها الى الزرقاء البفسجية . تويجاتها خاسية  
الاستان . كمايرها خاسية المصارع || تنويرها يستمر  
من حزيران الى آب .

٢٠٩٩٥ - **فِلْز** ، **فِلْز** (F). Métal (F).  
هو المعدن ، اطلبه .

٢٠٩٩٦ - **فِلْز التَوَاقِيس** (F). Bronze de cloche (F). Bell-metal (E).  
مزيج من نحاس وزنك واثمد وقصدير يستعمل في صناعة  
الاجراس والتوانييس .

٢٠٩٩٧ - **فِلْزَات قِلْرِيَّة** (F). Métaux alcalins (F). Alkaline metals (E).  
٢٠٩٩٨ - **قِلْس** (F). Squamule (F). Squamula (E).  
فلس ج قلس هي الحراشف الصغيرة التي تنشئ جلود بعض  
الاسماك او روائش بعض الحشرات .

٢٠٩٩٩ - **قِلْسَا** (S). Valls (S).  
فطر مجهري من الفلفليات يدعى ذلعب ، اطلبه .

٢١٠٠٠ - **قِلْسِي** (F). Lépidote (F). Lepidot (E).  
نمت تعريفن وصي يطلق على الاغشية النباتية الحراشفية  
البشرة .

٢١٠٠١ - **فِلْسِي** (F). Felsitic (F). Felsitic (E).  
نمت تعريفن يطلق على الازربة والصخور الفلسيية التركيب .

٢١٠٠٢ - **فِلْسِيَّة** (F). Felsite, Pétrosilex (F). Felsite (E).  
طبقات صخرية ثوارة نحيفة متجانسة لا قياسية السمك .

٢١٠٠٣ - **فِلْسِيَّة** ، **فِلْسِي** (F). Felsitic (F). Felsitic (E).  
يقال صخور فلسية وربة فلسا .

٢١٠٠٤ - **فِلْط** (F). Volt (F).  
هو وحدة هبوط الجهد ، يعبر عنه بفرق الجهد بين نقطتين  
من سلك موصل اذا كان الجهد الذي يؤذي الكولوم بين  
هاتين النقطتين يساوي جولاً واحداً . ج افلاط .



فلقت




فلفل اسود



فلفل الماء



فلفل حلو



فلك البروج بأقسامه وأرقامه وعلاماته وأسمائه وصوره وشهوره






فلفل عرق الذهب



فلفل كريمة



فلقوس



فلقوس



فَلَنْجِي

الشمس الظاهر بما فيه النجوم وتبدى الثوابت. وهو منطقة سماوية عرضها نحو ١٨ درجة تطلو القضاة بموازاة مدار الشمس. وتقسّم الى قسمين، البروج الصاعدة والبروج الهابطة. فالصاعدة تتألف من ستة بروج والمهابطة كذلك. وهي باحاثها من الغرب الى الشرق: الحمل، الثور، الثورين، السرطان، الاسد، العقرب، الميزان، والقرب. والبروج الصاعدة فهي الجدي والدلو والحوت والتوأمن والثور والحمل. والبروج الهابطة هي السرطان والاسد والميزان والقرب والرامي.

٢١٠٢٤ - فَلَنْجِي اطلب مدار.

٢١٠٢٥ - فَلَنْجِي هي أم الخلول، اطلبها.

٢١٠٢٦ - فَلَنْجِي \*، صَبَّار دُومِي Phyllocactus (S), Phyllocacte (F).

جنس نباتات لحية معمرة من الصباريات. انواعه عديدة اعطانها البلاد الاستوائية. سوقها اوراق تتناوب مفصصة ومغدة. ازهارها كبيرة القند مستطيلة البتلات عديدة. الوانها تختلف مع انواعها منها الازرق والوردي والارنجي والقرمزي. ثمارها سائمة الطعم مأكولة || اشهر انواعه الثلاثية :

Ph. à grandes fleurs (F). فلقوس كبير الزهر  
Ph. crénéel (F). فلقوس مقرص  
Ph. anguleux (F). فلقوس مضلع

٢١٠٢٧ - فَلَنْجِي Sideral (F), Sideral (E). نعت تمرغني يطلق على مجرى النجوم والكواكب السابرة. فاليوم الفلكي هو دوران الارض اليومي. والسة الفلكية هي دوران الارض السنوي.

٢١٠٢٨ - فَلَنْجِي \*، مَدَارِي Orbital (F), Orbital (E). نعت وصفي خاص بمدار الكواكب، اي كوكب كان.

٢١٠٢٩ - فَلَنْجِي \* Arcade (S), Arcade (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجسامها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها متباينة الاشكال والاحجام والالوان. مفضلاتها مسنة. مصاريها لانطامية منها المتساوية ومنها المتناقلة. اجسامها ماسحة الخياشيم، مستطيلة الارجل || اعرف اجسامها واشهرها الفلكية والحويولة والطرزة.

٢١٠٣٠ - فَلَنْجِي \* Arca (S), Arca (F), Arca, Arc, Ark shell (E). وتدعى أم الخلول وفلك. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة الفلكيات. انواعها المرفوعة كثيرة العدد؛ معظمها من متحبرات الحقبة السيلورية، اي انه يعود الى اقدم التكوين الجيولوجية. اما الانواع الماصرة فنشرة في جميع بحار العالم اعصها لتتوسط || اصداؤها شبه بيضبة الشكل او املحلية معتدلة الحجم او صغيرة، محززة الاسفاد الملونة || تعيش لاصقة بالصخور المنفوعة المتوسطة النور.

الحارة اوراقها منقطة متقابلة كبيرة النصل. ثمارها حمية اللد والشكل، قمرية اللون، عطرة، يستخرج منها عطر يحل محل عطر القزفل. اما مسحوقها فيستعمل استعمال بعض القويات في عذ مأكول.

٢١٠٣٥ - فَلَنْجِي دُومِي هو الفلفيلة، اطلبها.

٢١٠٣٦ - فَلَنْجِي عَرَقِ الدَّهَبِ \* Piper longum (S), Polvriar long (F), Long pepper (E), Langer Pfeffer (D), Pepe longo, Albero del pepe (I). نوع من الفلفل وهو شجرة زينة جيلة الشكل. اوراقها موشحة بالاصفر ثمارها عناقيد مستطيلة متدلية، حبوبها كروية صغيرة ارجوانية اللون ذهبية المالحق.

٢١٠٣٧ - فَلَنْجِي كَبَابِي \*، حَبَّ العَرُوسِ، كَبَابِي Piper cubeba (S), Poivrier cubèbe, Poivre à queue, Cubèbe (F), Cubeb pepper (E), Cubebenpfeffer, Cubebenstrauch (D), Cubebe, Pepe a coda (I). نوع من الفلفل الثريبي وهو شجرة جيلة الشكل. وثمارها عناقيد مستطيلة مرجانية او ارجوانية اللون.

٢١٠٣٨ - فَلَنْجِيَاتِ Piperaceae (S), Pipéracées (F), Pipéracées (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القعالة، مرتفعات المبيض. انواعها زهاء ١٠٠٠ تنحصر الى عشرة اجناس معظمها جنات واشواب. اوراقها لاقسية الانظام فيها المتقابلة والمتناقلة والصفيحة. ازهارها ثدية الشكل، سلبية التجميع، لاقسية الارتكاز، منها المحورية والتاجية والمتقابلة مع الوراق. ثمارها عنبية كروية صغيرة القند مختلفة الالوان.

٢١٠٣٩ - فَلَنْجِي \*، زَبَارَة Cotylédon (F), Cotyledon (E). صفحة ورقة تلتصق جبين البزرة، راجع زبارة.

٢١٠٤٠ - فَلَنْجِي \*، فَلَنْجِي \*، قَصْر Lobe (F), Lobe, Lobus (E). كل جزء من الورقة او الزهرة بالغ التفرغض مستديره.

٢١٠٤١ - فَلَنْجِي \*، شَبْرَقَة Valgus hemipterus (S), Valgue hémiptère (F). شجرة من فصيلة الجملليات ورقية مقدمات الاجنحة. موطنها يشمل معظم مناطق البلاد المتدلة الحارة في العالم القديم || جسمها صغير القند يطول نحو ٨ م. عند الذكر ونحو ١٠ م. عند الانثى. ثوبها الى السمرة السوداء لتلوها زخاوت فلبية يبيضه اللون عند الذكر. ظهورها يلفح ستة اعشار الجسم. قصصية الانثى تنتهي بمرز مستن. مستطيل يمكنها من فتح المكن حتى في الخشب اليابس || تظهر من نيسان الى اواخر حزيران. مسرحها يستمر طوال الشتاء. مرتعا الاغزار || يرتقا حنطية اللون، سوداء الرأس، تنقب الخشب وتسرده اقبيا باتجاه القلب فيبدو كأنه سليما في حين انه لا يحتمل اية صدمة.

٢١٠٤٢ - فَلَنْجِي \*، قَصِي Lobulaire (F), Lobular (E).

٢١٠٤٣ - فَلَنْجِي \*، فَلَنْجِي البُرُوج le Zodiaque (F), the Zodiéc (E). الفلك وفلك البروج وبروج الاثلاك واحد. هو مجرى

قوائمها خاصة الاصابع ، حادة الاظافر . اصولها ناعمة لينة || انثائها مجهزة بجرباب في اسفل البطن تقيح فيه الرضيع حتى الفطام || اشهر اجناسها الفلتنجير واليهلثوان والكوكورج والكوكورج .

#### ٢١٠٣٨ - فُلْتَنُوكَة \* Euplures (S). Euplère (F).

فلتنوك هو الاسم الملقب . حيوان لبون مقترن وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف الغابات الساحلية . يسرح في النهار . قوته الحشرات والديدان واللبان || جسمه مستطيل الشكل ، كثيف الوبر المستطيل الناعم . طوله نحو ٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٣ سم . ارتفاعه الى الحاروك لا يتجاوز ١٨ سم . رأسه صغير الحجم ، غرطي الشكل وافر السبال . عيناه صغيرتان واذاً ذاك كذلك . قوائمها خاصة الاصابع الصغيرة النعيلة . غذائه رقيقة عجينة الاطراف . ثوبه الى الشقعة السوداء ، صدره وبعده الى الشقعة البرتقالية الملمع .

#### ٢١٠٣٩ - فُلْتَنَم ، تَوَف Vagin d'insecte (F).

Vagina of the insect (E). عضو من شوار انثى الحشرات وهو القناة التي توصل الفرج بحبيب الزكة .

#### ٢١٠٤٠ - فُلُو Poulain (F). Yearling, Foeal (E).

الفلو والفلو والمهر هو ولد الفرس قبل بروز شتيته الثابتين . ج . افلاء .

#### ٢١٠٤١ - فُلُوت Volute (F).

الفلوت حيوان بحري من الرغويات يدعى خذرقه ، اطلبا .

#### ٢١٠٤٢ - فُلُوَة Pouliche (F). Filly (E).

الفلوة والفلوة هي انثى الفلر .

#### ٢١٠٤٣ - فُلُوَة Vallota (S). Vallote (F).

عشبة دوفسية وحيدة الجنس والنوع ككثرة الفربوب من فصيلة الترجيبات . مهدا افريقية الجنوبية . دوفسها مستندرة الشكل . اوراقها جلدية اللاتشاب ثنائية التصنيف المتقابل ، نصلها بطول من ٤٠ الى ٨٠ سم . ويعرض نحو ٣ سم . لونه الى الخضر المايق . شرعاها الزهري اجوف القصبة بطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها متعاقبة الارتكاز . كبيرة اللقد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . الوانها تختلف باختلاف الفربوب منها الاحمر والكرزى والوردي والابيض والموشح . تنورها يستمر من ايار الى آب . ترغب في المواقع الرطبة والامراض الجنوبية . تعيش في المراكب ولا تخفى سوى البرد .

#### ٢١٠٤٤ - فُلُوَجَة Fallugia (S).

Fallugia (E). جنبة تزيينية معمرة من فصيلة الورديات . منبتها بعض اصقاع امريكا الشمالية . ساقها منتصبة الفراء تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . افنادها احولية مزينة احمر . اوراقها متعاقبة صغيرة الحجم ، ثلاثية الفلق . نصلها خضر الصفحات العليا ، بيض السفلى . ازهارها عابجة اللون مشعة بالوردي ، طهرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ٢١٠٣١ - فُلْمَار Fulmar (F). Fulmar (E).

طائر من الرغاء يدعى رغاء الجليد ، اطلبا .

#### ٢١٠٣٢ - فُلْتَنَجَر \*، كُسْكُوس Phalanger (S). Phalanger, Couscous (F).

Phalanger, Couscous (E). جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات . وفصيلة الفلتنجريات . انواعها المعروفة اربعة موطنها استراليا وغينيا الجديدة . تألف الغابات الباسقة الاشجار . قوتها الاوراق والازهار والثمار والصابون ويضها والحشرات . ترقد في النهار في قن الاشجار الرقيقة وتسرح في الليل في طلب القوت وتنقل بين الاشجار تحليفاً في الغشاء || اجسامها قريبة الشبه من السنور . رؤوسها شبه غرطية الشكل . آذانها صغيرة . قوائمها خاصة الاصابع . اغشيها الجناحية تمتد من الزور الى رؤوس الاقدام . آذانها مستطيلة اعادة . اولها مبيضة وميلقة || انثائها رباعية الاعلاف .

#### ٢١٠٣٣ - فُلْتَنَجَر اَبْلَق ، كُسْكُوس اَبْلَق Phalanger maculatus (S). Phalanger maculé,

Couscous tacheté (F). نوع من الفلتنجر . قده قد السنور . موطنه بعض مناطق استراليا ، اعصها الشمالية وجزر غينيا الجديدة واسيون وسيام وبنما . ثوبه الى الربعة السوداء الملققة بالابيض الالبر . يتنيز بكبر عينيه ويصفر اذنيه .

#### ٢١٠٣٤ - فُلْتَنَجَر السَالِب ، كُسْكُوس السَالِب Phalanger Celebensis (S). Phalanger de Célèbes,

Couscous de Célèbes (F). نوع من الفلتنجر . قده قد السنور . موطنه يمتد من القسم الشرقي الى الجنوبي من جزيرة السالب . ثوبه الى الربعة الشبه الغفيرة الملمع .

#### ٢١٠٣٥ - فُلْتَنَجَر دُبِّي ، كُسْكُوس دُبِّي Phalanger ursinus (S). Phalanger ourson,

Couscous ourson (F). نوع من الفلتنجر . قده قد السنور لكنه مكردم الشكل . موطنه القسم الشمالي من جزيرة السالب . يتنيز بغلاظة الرأس الذي يشبه رأس الدب . ثوبه الى الربعة السوداء السوية ، بطه الى الفيرة .

#### ٢١٠٣٦ - فُلْتَنَجَر شَرْقِي ، كُسْكُوس شَرْقِي Phalanger orientalis (S). Phalanger oriental,

Couscous oriental (F). نوع من الفلتنجر . قده قد السنور الاجل . موطنه غينيا

الجديدة وتيمور واسيون وسيام وسلا وارو... ثوبه الى الربعة السوية يقيق بعض الشئ في الظهر . ويتنيز ايضاً بكبر العين ويصفر الاذن .

#### ٢١٠٣٧ - فُلْتَنَجَرِيَّات Phalangeridae (S).

Phalangeridae (F). فصيلة حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من حيوانات استراليا وبعضها من الجزر القريبة منها || تألف الغابات والارحاج ، تتسلق الاشجار بمغدة مدعشة ونها انواع مجهزة بشاه جناسي الشكل يمكنها عند انتشاره من الانتقال بين الاشجار تحليفاً في الغشاء || جميعها وريقة ثامرة وبضها مباشرة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد . تتنيز باستقالة الاذنان .



فلنجر



فلنوك

٢١٠٥٤ - **فلرّة** \* ، **كليكار** \* Equula (S).  
Equule (F). Equula (E).

كليكار هو الاسم الهندي. جنس اسماك بحرية من فصيلة الشجيات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠. أصلها المحيط الهندي والبحر الأحمر || أجسامها شبه بيضية الشكل ، مبطلة ، صغيرة القد أو متوسطة ، تطول من ١٢ إلى ٢٤ سم. رؤوسها معتدلة الحجم ، ناشرة الأضلاع الناتئة. أشداقها صغيرة. عينها كبيرة جاحطة. زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، متقابلة يتقدمها بعض المناسخ الحادة. زعانفها الذيلية فارقة || لحمها جيدة الصنف ، مرغوب لها .

٢١٠٥٥ - **فلوكس** Phlox (F).  
هو الشوالة جنس نباتات زربية شائعة الاستعمال ، أكلها .

٢١٠٥٦ - **فلوميس** Phlomis (F).  
هو الميزارة ، أكلها .

٢١٠٥٧ - **فلوميس شرقي** Phlomis visqueuse (F).  
هو الازينة ، أكلها .

٢١٠٥٨ - **فلوميس فلسطيني** Phlomis de Palestine (F).  
هو الميزارة الحشوية ، أكلها .

٢١٠٥٩ - **فلبة** Marrube blanc (F).  
هي الفراسين الأبيض ، أكلها .

٢١٠٦٠ - **فلبة** Pouliot (F).  
هي الفتوتج البري ، نبات عشبي عطري ، أكلها .

٢١٠٦١ - **فليجييات** \* Schizomycetes (F).  
Schizomycophyta (E).  
فئة من النباتات وحيدات الخلية تكاثر بانقسام الخلية إلى فليجين متساويين .

٢١٠٦٢ - **فليدة** \* Phyllidia (S).  
Phyllidie (F). Phyllidia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الأرجل أماميات الخياشيم . فصيلة الفليديات . أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من عظم المحيط الهندي والبحر الأحمر تعيش على صخور الشواطئ || أصلها المحيطية ، صغيرة القد ، مستطيلة ، مدنية المقدم والمؤخر ، جلدية القشار المدرن المبقع بالأسود والأبيض . خياشيمها كثيرة العدد ، حثارية الارتكاز . لوانسها رباعية ، منها زوج علوي شبه انبوبي الشكل وزوج سفلي مخروطي مكرز قرب الفم . إرديتها لحية معتدلة الانعاط الطولي .

٢١٠٦٣ - **فليديات** \* Phyllidiidae (S).  
Phyllidides (F). Phyllidiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معديات الأرجل أماميات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد أكثرها من متحجرات الازينة الغائرة . المعاصر منها يعيش على شواطئ بحار البلاد الحارة || أصلها متباينة التركيب والأحجام منها وحيدات المصارع ومنها معدياتها . جميعها تستنشق الماء . خياشيمها حثارية الارتكاز || أعرف أجناسها المعاصرة القليلة .

٢١٠٥٥ - **فلرور** \* Phyllirroe (S).  
Phyllirrhoé (F). Phyllirroe (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الأرجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الفلوريات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أصلها بعض مناطق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . جميعها مية تسرح في الليل || أجسامها حلالية شفافة مبطلة لا تخلو من المواد الفسفورية المقصية . رؤوسها ثنائية الفلوس التي تبدو كقرون الثيران .

٢١٠٤٦ - **فلروريات** \* Phyllirrhoidae (S).  
Phyllirrhoidés (F). Phyllirrhoidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معديات الأرجل خلفيات الخياشيم || أنواعها قليلة العدد جميعها جنس واحد الفلور . جميعها مية لا تقرب الشطوط . تسرح في الليل . أجسامها شفافة تحمل بعض المواد الفسفورية المقصية .

٢١٠٤٧ - **فلوريد** Fluorure (F). Fluoride (E).  
ملح الحامض الفلوريدريكي .

٢١٠٤٨ - **فلوريد الباريوم** Fluorure de baryum (F).  
Berium fluoride (E).  
مركب الفلور مع الباريوم .

٢١٠٤٩ - **فلورين ، فلورور ، فلور** ، **لاصف** Fluor (F). Fluorine (E).  
غاز أصفر اللون ، كبريه الرائحة ، نشيط التفاعل . ثقله الذري ١٩,٣١ رقه الذري ٩ .

٢١٠٥٠ - **فلوس** \* ، **زب الكزم** ، **ستير** Phallus, Ph. impudicus (S). Phalle, Phallus impudique, Satire (F). Phallus, Devil's horn, Scink horn (E). Gichtschwamm (D). Spugnolo (I).

فطر دعامي من فصيلة الفلوسيات شائع الانتشار يوجد في جميع المواقع الرطبة من الأقاليم الحارة والمعتدلة || شكله ما حركه الرسم . ساقه اسطوانية ، أرسوتة مخروطية . لونها إلى الخضار القاتم || يؤكل في أول عهده ، عند انفلاق الفلوف ، قبل امتلائه وتصلب غلاياه || أعرف أنواعه الصيني والكليبي .

٢١٠٥١ - **فلوس صيني** Phallus mokusin (S).  
Phallus de Chine (F).

نوع من الفلوس صنبر القد والساق ، حنطي اللون ، أحر الارسوة النعومة الشكل .

٢١٠٥٢ - **فلوس كنليبي** Phallus canis (S).  
Phallus de chien (F).

نوع من الفلوس . ساقه دقيقة ، مستطيلة ، جزؤية اللون ، حنطية الملمح . أرسوته غليظة ، بلوطية الشكل ، خرية اللون .

٢١٠٥٣ - **فلوسيات** Phallaceae (S).  
Phallacées (F). Phallaceae (E).

فصيلة الفطور الفلوسية من رتبة الدعاميات . أجناسها وأنواعها عديدة يكثر وجودها في المناطق الحارة والاستوائية . أعرف أجناسها وأشهرها الفلوس ثم الديكوفوره الذي يركب الصان في المواقع الرطبة فيرق نمو ويؤذي .



فلور



فلوس



فلرّة



فلبة

Tribolites (F).

٢١٠٧٢ - فُليبيات °

قمة من القشريات تدعى ثلاثيات الفلج ، أطولها .

Navicella (S).

٢١٠٧٤ - فُليكة °

Navicelle (F). Navicella (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مدنيات الايريس  
وفصيلة الزيفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مواطنها  
انهر الهند || اصداها كبيرة القد ، شبه بيضية الشوزن ،  
فسيحة التجويف المقعر ، جؤوية اللون او بنية ||  
اجسامها كبيرة . رؤسها حلالية الشكل ، ثنائية الفؤاس  
المعززة المستطيلة الجاحة || جميع انواعها مأكولة .

Pébrine, Gattine, Etlise (F).

٢١٠٧٥ - فُليل °

الفليل او مرض التفليل او المرض الفليلي او ندوة دودة  
الحرير . مرض طفلي يصيب دود القز فيفقداه شهوة  
الاكل ويسوقه نحو الموت || مظهره الخارجي نقط سويد  
مبشرة تركب الجسم من الرأس الى الترج || يمتد من  
الامراض المميتة اذا حل بالودد في طورها الثاني . أما اذا  
اعترها في الطور الرابع فاسابته تكون قليلة الاذى وغير  
ميتة .

Phyllium (S).

٢١٠٧٦ - فُليكة °

Phyllie (F). Phyllium (E).

جنس حشرات من مستعجات الاجنحة وفصيلة القسميات .  
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد  
الحارة والاسوائية من العالم القديم || اجسامها مستدلة  
والقد طول من ٥ الى ١٠ سم . بطونها مبطلة بيضية الشوزن .  
رؤسها مكورة صغيرة . قرونها الاستشعارية دقيقة  
وقصيرة . اجنتها كثيرة الاعصاب الدقيقة ، قصيرة ،  
لا تلتصق كامل البطن . قوائمها معتدلة الطول ، مستعززة  
الاخذاء والسيقان تبدو كأنها مجنحة || وهي من الحشرات  
التي تحاكي البيئة التي تعيش فيها . يرقانها برتقالية اللون  
او حمراء .

Crinière du lion (F).

٢١٠٧٧ - فُليكة °

Mane of lion (E).

شعر زبرة الاليد .

Liège, Suber (F).

٢١٠٧٨ - فُليين ، فُروق °

Cork, Suber (E).

مادة دسنة ، مطاطة ، خفيفة ، تعوم في الماء لا تحترق  
ولا تفسدها الرطوبة ، تقطع من لحاء البش اي سديان  
الفلين .

Bouchon (F). Bush (E).

٢١٠٧٩ - فُليكة °

هي السادة ، أطولها .

٢١٠٨٠ - فُلييني ، بَهيئي °

Liégeux, Subéreux (F). Like cork, Suberous (E).

نمت تمريني يطلق على التسج النباتية الفليينية التركيب  
او الشبيهة بالفلين

٢١٠٨١ - فُلييني °

Phellogène (F) Phellogenetic (E).

نمت تمريني توصف به النباتات التي تنتج الفلين .

٢١٠٨٢ - فُليستين °

Subérine (F). Suberin (E).

المادة العضوية التي يتركب منها الفلين .

Tuf (F). Tuff, Tufa (E).

٢١٠٦٤ - فُليس °

اسم نقي يطلق على تكوينين مختلفين من طبقات الارض .  
التكوين الرسوبي والتكوين التوراني .

Tuffeau, Tufeau (F).

٢١٠٦٥ - فُليسة °

Micaceous chalk (E).

صفائح منفسدة طباشيرية التركيب ميكية تكون مهله  
الحفر لينة للكسر عند استخراجها من الارض ثم تتصلب  
وروبدا رويبدا مع تعرضها للهواء .

Gélif (F).

٢١٠٦٦ - فُليغ ° ، صديغ °

Frost-cleft (E).

نمت حال توصف به الاشياء المنفولة او القابلة الانصداد  
والفلج من تأثير قمل الصقيع فيها .

Capsicum (S).

٢١٠٦٧ - فُليكة °

Piment (F). Pepper (E).

جنس نباتات زراعية حولية ومعملة ومعمرة من فصيلة  
الباذنجانيات . منتهيا المناطق الحارة والمعتدلة . انواعها  
قليلة ، ضرورها كثيرة المدد . اوراقها بسيطة متعاقبة .  
ازهارها خشوية بيضاء اللون . ثمارها قرون مختلفة الاشكال  
والاجسام والالوان . بزورها مستندرة ، مبطلة ، رقيقة ،  
منفضة المنش || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٠٦٨ - فُليكة زراعية ° ، فُليل زُعي ° ،

فُليل أحمر °

Capsicum annuum (S).

Piment annuel, Poivre long, P. de Guinée, Poivron,  
Corail des jardins, Capsique (F). Capsicum, Red pepper (E).  
Echte Beilsbeere (D). Peperone, Pimento (I).

نوع من الفليكة ضرورها واصرارها كثيرة العدد شائعة  
الزراعة والاستعمال . جميعها نباتات حولية ومعملة تزرع  
لثمارها المأكولة الحارة او غير الحارة .

٢١٠٦٩ - فُليكة لبيكة °

Capsicum frutescens (S). Piment frutescent (F).

نوع من الفليكة الخشوية التي تعيش من ٤ الى ٦ سنوات .  
ساقها فرعاء تملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . فروعها دقيقة ،  
منسقة مرتفعة الاطراف . اوراقها بيضية الشكل مدببة  
الزمام الاخير . نصلها مائل الصفحة الخضراء يطول من ٧  
الى ١٥ سم . ويبرش من ٥ الى ٨ سم || ثمارها  
بيضية الشكل ، كبيرة القد تبدو خضراء اللون ثم تحترق  
الى الحمرة وتستقر عليها .

٢١٠٧٠ - فُليق °

Schistocarpe (F).

Schistocarpous (E).

نمت تمريني يطلق على كل نبات تنفاج ثماره عند الادراك .

٢١٠٧١ - فُليكة ، فُصيص °

Lobule (F).

Lobule, Lobulus (E).

الفلق الصغيرة القدر .

٢١٠٧٢ - فُليكة °

Otidea onotica (S).

Otode oreille de lièvre (F).

فطر من فصيلة الحشاريات ورتبة الزيفات . يكثر وجوده  
في الحراج الغظلية اخضرها حراج السديان . يعيش مجموعات  
على الدبال والمواد النباتية المنسقة . مجموعته تعد من زوسين  
الى حسة ازواج . سقها جعدة . نكاهما مستطيلة الشكل  
مفلقة ، جوفاء ، تبدو كأذان القرواع ، لونها الى الصفار  
الذهبي ، قواعدها بيض الداخلى || تعتبر من الفطور  
الكائعة الصنف الامأكولة .



فليكة زراعية (١)



فليكة زراعية (٢)



فليكة لبيكة



فليكة



فليكة



فليكة





فلْيُوت

Fluor

٢١٠٩٠ - فلْيُور

هو الفلور أو اللاصف .

Fomalhaut (F).  
Fomalhut (E).

٢١٠٩١ - فَمَّ الحُوت

فَم الحوت نجم ثَر من كوكبة الحوت الجنوبي . مركزه على القدم . يبعد عن الأرض نحو ٢٤ سنة ضوئية .



فلْيُوت المُشاحر

Pylote (F).  
Pylorus (E).

٢١٠٩٢ - فَمَّ المَعِدَّة ، يَوَّاب

Stomatopoda (S).  
Stomatopodes (F).

٢١٠٩٣ - فُصْمِيَّات الأَرْجُل

رَبْية حيوانات من القشريات .

Cour de ferme (F).  
Farm-yard (E).

٢١٠٩٤ - فَنَّاكَه  
ساحة تحيط بِهَا أبنية المستلَّ .



فلْيُوت مُتَغَلِّب

Branchue (F).  
Forked, Ramifying (E).

٢١٠٩٥ - فَنَّاكَه  
فناء وفنائه : شجرة كثيرة الأفران وأصمة النخل .



فلْيُوت مُعْرَش

Paris incompleta (S). Parisette, Raisin de renard (F).  
Fox grape, Herb Paris (E). Einbeer, Parisbeere (D).  
Paride, Uva di volpe (I).

٢١٠٩٦ - فَنَّاكَه  
بقرة القطيع لا عمل ولا درَج فنوات .

Ramure (F).  
Branches, Boughs (E).

٢١٠٩٨ - فَنَّاكَدَة  
مجموع اغصان وأفناد وأفنان الشجرة .



فلْيُوت مَرَن

Vanadium

٢١٠٩٩ - فَنَّاكِدِيوم ، فَنَّاكَدِم

معدن أبيض اللون متبلور . ثقله النوعي ٥.٥ وزنه الذرئوي ٥١.٣ . يتحد مع الأوكسجين والكبريت والأزوت . يذوب في المحالض المعدنية باستثناء المحالض الكلورية يكي . ألاملاح عديدة تستعمل في صناعات الصباغات .



فلْيُوت بَقَر

Scyphozaires (F).  
Scyphozoa (E).

٢١١٠٠ - فَنَجَنَائِيَّات

رَبْية حيوانات بحرية هلامية من شعبة الحفريات . فضائلها وأجناسها وأنواعها عديدة . أشهرها المنصوصات .

Lynx pardé (F).

٢١١٠١ - فَنَجْجُل

هو الوثق الفهدي ، أطلبه .



فَنَّاكَة

Gattilier commun (F).

٢١١٠٢ - فَنَجَنَكُفَت

هو الأرنبة جنبية طيبة معمرة ، أطلبه .

Fongque (F). Fungie (E).

٢١١٠٣ - فَنَجْجِيَة

ما كان فطراري الطبيعة أو الصفة .

Rameau (F). Bough (E).

٢١١٠٤ - فَنَدَد

هو النصن الصغير أو الصلة بين النصن والأفنان .

Pholiota (S).

٢١٠٨٣ - فَلْيُوت ٥

Pholiote (F). Pholiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقونيات . أنواعها المعروفة عديدة أعطتها بعض مناطق البلاد المختلفة الحرارة . يكثر ويوجد في الغابات والغضاب والجبال . معظمها يعيش على المواد النباتية المتحللة . تتميز ببؤفاها الاصفر اللون ويوفرة عدد مجموعاتها || أعرف أنواعها وأشهرها السلة التالية .

٢١٠٨٤ - فَلْيُوت أَسْمَر ٥

Pholiota picrea (S). Pholiote brune (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات السنوبر . ساقه جزلة ، مبطلة ، عرياء ، صلبة ، شبه غشورية . نكهته قبيحة الشكل ، قطرها نحو ٣ سم . لونها إلى السمر السعداء المالح . يفرغ منها رائحة لأمأولة || لحيته حاضرة العلم ، كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٥ - فَلْيُوت المُشاحِر ٥

Pholiota carbonaria (S). Pholiote des charbonnières (F).

نوع من الفليوت . يتكاثر في مواقع المشاحر . مجموعته وثرية العدد الذي يتألف من ٣ أو ٥ أو ٧ وحدات . ساقه دقيقة ، صفراء اللون . نكهته لزجة ، صابجة الشكل ، قطرها نحو ٢ سم . لونها إلى الصبغة السراء || لحيته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٦ - فَلْيُوت مُتَغَلِّب ٥

Pholiota mutabilis (S). Pholiote changeante (F).

نوع من الفليوت يعيش على أرويات الانجار المروية . مجموعته وثرية العدد تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وحدات . ساقه دقيقة ، عرياء ، مفلوطة حتى الزام الثالث . نكهته صابجة ، عادمة الأجزاء ، قطرها نحو ٢ سم . لونها إلى الصبغة البرتقالية وفي مستحبة الرائحة عند التس || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢١٠٨٧ - فَلْيُوت مُعْرَش ٥

Pholiota squarrosa (S). Pholiote écaillée (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الفص والسندباد . ساقه مفلوطة معرشة الأطراخ حتى أوائل الزام الرابع . نكهته مغلية الشكل ، صفراء اللون ، مدروية بالخراف السمر . قطرها نحو ٥ سم . أطراسها إلى الصفراء الاغضر المالح || لحيته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٨ - فَلْيُوت مَرَن ٥

Pholiota lenta (S).  
Pholiote flexible (F).

نوع من الفليوت . يعيش على الدبال في المواقع الظليلة . ساقه معتدلة الجرم والارتفاع ، غبراء اللون يعلوها زغب أصفر . نكهته صابجة الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها إلى التبرة الصفراء . أطراسها إلى الصفراء الباهت || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢١٠٨٩ - فَلْيُوت نَصِير ٥

Pholiota flammas (S). Pholiote éclatante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات السنوبريات . مجموعته وثرية العدد . ساقه معتدلة الجرم ، معرشة حتى أواسط الزام الرابع . نكهته صابجة الشكل ، صفراء اللون ، ذبجية المالح ، قطرها نحو ٣ سم . رائحتها رائحة اللث || لحيته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

كيرتان ، مستديرتان ، علويتا الارتيكار . زعنفتها الظهيرة الاولى ثلاثية الشع المستطيلة المناخس القوية || لحما متوسط الصنف ، مأكول في بعض فصول السنة ، سام في فصل الربيع .

٢١١١٥ - **فندقيات** **Balistidae (S).**  
**Balistidae (F).** **Balistidae (E).**

فصيلة اسماك بحرية من ملحومات الفك شاككات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سرسها حشاش المجاحد . قوتها الرخويات ونوامي الرجان والمرجان || اجناسها شبه يفيشي الشكل ، مبطلة الجرم ، عادمة الاعناق ، تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم . قشورها متراكب الغلوس الحريشة . رؤوسها مسلحة بزنانف مهازية مدببة حادة تستقر وتثبت عند الحاجة . استناتها صلبة قوية تمكنها من سحق صدف الحمار والرخويات ومن هرس نوامي الرجان والمرجان || انوثها ملوقة فيها الازرق والاصفر والبنيصجي والاصفر والبرتقالي والاحمر القويدي والبي والراسامي والاسود || لحومها جيدة الصنف ، مأكولة في بعض فصول السنة ، سامة في فصل الربيع من اواخر آذار الى اواخر حزيران || اشهر اجناسها الفنداق أو عز الماء .

٢١١١٦ - **فندقس** **Phoenix (S).**

**Phénix (F).** **Phoenix (E).**  
طائر غرائي ورد ذكره في اساطير الاولين . اما اليوم فلاس يطلق على ديك من الفروسيات هو الديك الياباني الطويل الزنكي الزاهي الالوان .

٢١١١٧ - **فندقل** **Funicule (F).** **Funicle (E).**  
هو من الزباني سويها اللدقيق الذي يحمل في نهايته الصقّ من الرصمان .

٢١١١٨ - **فندقلي** **Funifère (F).** **Funifer (E).**  
نمت تمريني يطلق في علم الاحياء على كل عضو مجهز بزوائد غليظة الشكل دقيقة شبيهة بالفنقل .

٢١١١٩ - **فندك** **Fennecus (S).**  
**Fennec, Fenec (F).** **Fennec (E).**

نوع من الثعالب صغير الجفة ، ناعم الوبر ، وسيق اللؤلؤ ، يتميز بكبر اذنيه وباستطالة وحيالة ذنبه || قوته المصافير والدوبيات والحشرات والزحافات واليرابيع ... مسرحه من الغروب الى الشروق ، ويبره نفق مستطيل موجب المنسل . اثناء تقعر من ٣ الى ٤ جراه || موطنه فسح الارباح ويشمل القارة الافريقية مع الجزيرة العربية وجوارها || ضروره المعروفة اربعة :

٢١١٢٠ - **فندك اغبر** **Fennecus pallipes (S).**  
**Fennec pale (F).**  
غرب من الفندك موطنه افريقية الشرقية والغربية وبلاد التوب وكردفان . ثوبه زلي اللون ، ظهره احمر المالح ، الذي اسود الطرف . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . منه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .

٢١١٢١ - **فندك البركادي** **Fennecus famelicus (S).**  
**Fennec sabora, Sabora (F).** **Sabora fennec (E).**  
ضرب من الفندك موطنه التوب وصحاري الجزائر وتونس وسورية والعجم والافغان . ثوبه بلون الرمل الاسمر . ظهره

٢١١٢٠ - **فنداق** **Facture (F).** **Invoice (E).**  
هي الفاتورة أي قائمة الحساب .

٢١١٢٦ - **فندة** **Vanda (S).**  
**Vanda (F).** **Vanda (E).**

جنس نباتات ايمية من السحليات . انواعها المعروفة نحو ٣٥ اعطائها البلاد الحارة . جميعها برية وتربينية . ازهارها كبيرة شبيهة الاشكال الجميلة . انوثها زاهرة زاهية || تزور في المراكب : تحشى الصنح || اشهر انواعها واعما زواة الثلاثة التالية :

٢١١٢٧ - **فندة البغعال** **Vanda cœrulea (S).**  
نوع من الفندة . مهدا البنغال وقد انتشرت زراعتها في معظم اقطار المسكونة || ازهارها كبيرة جميلة زرقاء اللون .

٢١١٢٨ - **فندة التيمور** **Vanda insignis (S).**  
نوع من الفندة . مهدا بلاد التيمور وقد انتشرت زراعتها في كل مكان || ازهارها متوسطة القد ، حطية اللون مبقعة بالارزواني .

٢١١٢٩ - **فندة الجزور** **Vanda lindeni (S).**  
نوع من الفندة . مهدا جزر الزابج ، ازهارها عتقوية التجميع لونها الى الصغار الكبريتي اللامع الجميل .

٢١١٣٠ - **فندود** **Ramaria botrytis (S).**  
**Ramairé chou-fleur (F).**

فطر من فصيلة الدوبيات . اعطانه غابات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يميل على المواد النباتية المتحللة . ساقه شديدة القصص متدججة مع التكمة . تكتمه تحت لحمي التكوين تتشب فيه مجموعات من المراجين الصغيرة تبدو كزهرة الانبيص يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم . قوتها الصغراء الى البقرة الصغراء المالح ، عراجيتها الى الصغراء السمراء السقاء . لحمتها جيدة الصنف ، لذينة الطعم ، مرغوب فيها .

٢١١٣١ - **فندي الزهر** **Ramiflore (F).**  
نمت تمريني يطلق على كل نبات ازهاره فندية الانتشاح .

٢١١٣٢ - **فندقيات** **Platyrrhiniens (F).**  
هي الحيات مجموعة قرد العالم الجديد .

٢١١٣٣ - **فندقس** **Groin (F).** **Snout (E).**  
هي القروسة والقروسيات أي غلم الحزير .

٢١١٣٤ - **فندق المتوسط** **\* عثر الماء المثلون**  
**Balistes capricus (S).** **Baliste caprisque (F).**  
**Trigger-fish, Balistes (E).**

نوع من الفندر . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفندقيات ودية ملحومات الفك شاككات الزعانف . اعطائها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . سرسها حشاش المجاحد . قوتها القشريات والرخويات ونوامي الرجان والمرجان || جسمها يفيشي الشكل ، مبطط الجرم ، عادم العنق ، يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . حراشفتها جامدة حريشة . ثوبها متداخل الالوان يغلب فيه البنيصجي المنطرات المالحات يملوه تبيج ازرق واجر وتضلع اصفر وبرتقالي وكسني ويؤوي || راسها خدروفي اللون صغير الخلم والخلم والشفد . استناتها قوية ، حادة ، ثنائية الصنف . عينها



فندة



فندود



فند المتوسط

فَنَتِي الْوَن يَطُولُ مِنْ ١٠ إِلَى ٢٥ سَم. وَيَرْضُ مِنْ ٨ إِلَى ١٥ سَم. || شُرَاخِهَا الزَّهْرِي يَطُولُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٥ سَم. عَنُقُودُهُ يَدُ مِنْ ٩ إِلَى ١٥ زَعْرَةً طَوَّلُ نَحْوِ ٤ سَم. لَوْنُهَا إِلَى الْبَيَاضِ النَّاصِعِ، عَرَفُهَا فَوَاحٍ الرَّائِحَةُ الْجَمِيلَةُ. أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ مَبْزُورٍ إِلَى الْإِيلُولِ.



فَنَك زَرْدَه

### ٢١١٢٩ - فَنَسْ، غُصْنُهُ، غُصْبُنْ

Ramille (F). Twig (E).

هُوَ مَا اسْتَقْدَمَ مِنْ قَضْبَانِ الْإِغْصَانِ بَلَغَ الْحُلُولَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ.

### ٢١١٣٠ - فَنَنْغُوسُ

Funingus (S). Fungio (F).

طَائِرٌ وَحِيدُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ مِنْ الْبِلَامِ وَفَصِيلَةُ الْحَامِيَاتِ. مَوْطَنُهُ أَفْرِيْقِيَّةُ الشَّرْقِيَّةِ وَبِزِيْرَةِ مَدَغَسْكَرٍ. مَلِجَتُهُ الْحَيَاتِي جَامِعِي. سَرَبُهُ يَدُ بَعْضِ الْمَثَاتِ || جِسْمُهُ مُتَوَسِّطُ الْقَدِّ، كَشْتُهُ قَصِيرَةٌ. جَنَاحُهُ ذَائِقُ الطَّرْفِ. ذَنَبُهُ مُشْتَبِلُ الطَّوْلِ، مَقْطُوعٌ. نَوْبُهُ أَزْرَقٌ وَآخَرُ مَتَفَاوُتِ الْمَاجَاتِ || قُوَّتُهُ الْبُلْدُورُ وَالْجُيُوبُ يَحْبُوبُ الْبِلَادِ فِي طَلَبِهَا || الْأَثَرُ تَدَنُّنُ عَشْيَاهَا فِي الْأَجْمَارِ الْغُلَّةُ حَضَنَتُهَا يَفِشْتَانُ، تَتَنَابَوْنَ عَلَى التَّرْخِيمِ مَعَ الذَّكْرِ.

### ٢١١٣١ - فَنُودُ تَمَرِيَّةٍ

Branches fruitières (F).

Fruit-boughs (E).

هِيَ الْإِغْصَانُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الثَّمَرَ بِدُونِ سَيْطٍ.

### ٢١١٣٢ - فَنُومِيْسُ

Aphanomyces (S).

جِنْسٌ فَطَوْرٌ مَجْهَرِيٌّ مِنَ الْبِيضِيَّاتِ أَنْوَالُهُ عَدِيدَةٌ تَتَفَلَّقُ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتِ، أَشْهَرُهَا أَغْرَاها مَا يَتَبَعُ.



فَنَك فَتْيِي

### ٢١١٣٣ - فَنُومِيْسُ لَايْسُ \*

Aphanomyces Levis, A. cochlioides (S).

فَطَرٌ مَجْهَرِيٌّ مِنَ الْفَنُومِيْسِ يَسَبِّبُ زُرُورَ الشَّوْطَرِ عِنْدَ انْتِشَاقِهَا فَيَقْبِضُ عَلَيْهَا وَإِذَا أَصَابَهَا بَعْدَ الْإِنْتِشَاقِ فِي زَمَنِ الْقَصْعِ وَالْإِدْبَاسِ أَوْقَعَهَا الْأَضْرَارُ الْجَمِيلَةَ. أَمَّا إِذَا أَصَابَ الشَّوْطَلُ بِهَا خَبَأَ فَهَاجًا تَقَارِبُهُ وَلَكِنَّا تَتَأَذَّى وَيَنْخَفِضُ انْتِجَاجُهَا || مَظْهَرُهُ عَلَى الْأَوْرَاقِ أَخْضَرَارُ زَيْتُونِي الْمَوَاجِ يَمُوتُ بِذَيْلِ الْفَنَصْلِ فِي النَّهَارِ وَتُصَلِّبُهُ فِي اللَّيْلِ. وَهُوَ فِي الْجُلُودِ عِنْدَ قَطْعِهَا عُرُوقٌ سَوْدٌ مَحْمُورَةٌ || يَكْفَأُ بِجَانِبِهَا الزَّرَاعَةُ فِي الْمَوَاقِعِ الْمُرْبُوبَةِ وَيَطْوِيهِ الْبَذَارُ وَالتَّرْبَةُ.

### ٢١١٣٤ - فَنُومِيْسُ مَتَوَسِّرِي

Aphanomyces Magnusi (S).

نَوْعٌ مِنَ الْفَنُومِيْسِ يَنْتَقِلُ عَلَى السَّلَاطِينِ الْبَهْرِيَّةِ فَيُؤْذِيهِمْ وَيَسَبِّبُ هَلَاكَهُمْ.

### ٢١١٣٥ - فَنِيْخُ

Flacherie (F). Flaccidity (E).

وَيَدْعُو «فَلَاشْرِي» مَرَضٌ مِيْكْرُوبِيٌّ فَذَالِكُ يَعْصِبُ دَوْدَ الْفَرْزِ فِي جِهَانِهَا الْخَمْصِي عِنْدَ اسْتِخْلَاصِهَا الرَّابِعَ.



فَنُومِيْسُ لَايْسِ

### ٢١١٣٦ - فَنِيدِيمُ \*

Venidium (S). Vénidie (F).

جِنْسٌ نَبَاتَاتٌ عَشْبِيَّةٌ حَوْلِيَّةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَرْكَبَاتِ. أَنْوَالُهُ نَحْوُ ٢٠ مَعْظَمُهَا بَرِّي وَبَعْضُهَا تَرَبِيِي. أَوْرَاقُهُ مُشَابِقَةٌ رَوَائِصَاتُ الزَّهْرِيَّةِ كَثِيفَةٌ التَّجْمِيعُ فَطَرُهَا نَحْوُ ٦ سَم. لَسَانُهَا مَسْنَنَةُ الطَّرْفِ، بِرْتَقَالِيَّةُ الْوَن. طَلِبَاطِي مَقَرُّ الشَّكْلِ قَنَائِيَتُهُ مُتَنَابِئَةٌ مَرْصُوفَةٌ، ثَلَاثِيَّةٌ أَوْ رُبَاعِيَّةٌ الصَّغُوفُ. أَشْهَرُ أَنْوَالِهِ مَا يَلِي.

إِلَى الْحَمْرَةِ، يَبْلُغُهُ إِلَى الْبَيَاضِ. جِسْمُهُ يَطُولُ نَحْوَ ٤٨ سَم. مِنْهُ الذَّنْبُ الَّذِي يَبْلُغُ ٢٢ سَم.

### ٢١١٣٢ - فَنَك زَرْدَه \*

Fennecus zerdia (S). Fennec zerdia, Renard du Sahara (F). Zerdia fennec, True fennec, Sahara fox, Fennec of bruce (E).

ضَرْبٌ مِنَ الْفَنَكِ مَوْطَنُهُ الصَّحَارَى الْأَفْرِيْقِيَّةُ وَوَادِي النَّبْلِ وَالنُّوْبَةِ وَسَنَارُ وَفَزَّانَ وَالْجَزِيرَةُ حَتَّى سِينَاءَ وَسُورِيَةَ. وَهُوَ أَصْفَرُ ضَرْبِ الْفَنَكِ وَأَحْسَنُهَا شَكْلًا وَأَقْرَبُهَا الْقَفَّ. نَوْبُهُ بَلَوْنُ الرِّمَالِ يَمُوتُ مَعَ اقْتِرَابِهِ مِنْ ثَبَجِ الْقَطْرِ. جِسْمُهُ يَطُولُ نَحْوَ ٤٠ سَم. مِنْهُ الذَّنْبُ الَّذِي يَبْلُغُ ١٨ سَم.

### ٢١١٣٣ - فَنَك لَفْيِي \*

Fennecus chama (S). Fennec chama, Chama, Asse (F). Caama, Asse (E).

ضَرْبٌ مِنَ الْفَنَكِ مَوْطَنُهُ غُصَفَاتُ نَهْرِ الْأُرَنْجِ مِنْ أَفْرِيْقِيَّةِ الْإِنْشُوبِيَّةِ. جِسْمُهُ يَطُولُ نَحْوَ ٦٣ سَم. مِنْهُ الذَّنْبُ الَّذِي يَبْلُغُ ٣٠ سَم. نَوْبُهُ إِلَى الصَّهْبَةِ الرِّبَالِيَّةِ الْمَوَاجِ. مَظْهَرُهُ ضَفِي الْوَن. طَرَفُ عُنُقِهِ وَذَنَبُهُ إِلَى السَّمَرَةِ السَّوْدَاءِ.

### ٢١١٣٤ - فَنُكَّةُ، هُسْتَهْ، زَبَقُ الشَّهَارِ

Funkia, Hosta (S). Funkie (F). Plantain lily, Japanese day lily (E). Herzillie, Hosta, Tagillie (D). Funkia, Hosta, Giglio plantaggine (I).

جِنْسُ نَبَاتَاتٍ عَشْبِيَّةٌ جَدْمُورِيَّةٌ مَعْمَرَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الزَّنْبِيَّاتِ. أَنْوَالُهُ قَلِيلَةٌ مَهْدَاهَا الصِّينَ وَالْيَابَانَ. سَوْفُهَا شُرَاخِيَّةٌ لِانْتِشَابِ أَزْهَارِهَا عَنُقُودِيَّةُ التَّجْمِيعِ. أَوْرَاقُهَا مَسْتَقَّةٌ ضَمِيَّةٌ قَاعَدِيَّةٌ أَصْفَرُ وَأَشْهَرُ أَنْوَالُهُ الزَّنْبِيَّةُ مَا يَلِي.

### ٢١١٣٥ - فَنُكَّةُ سَنَانِيَّةُ \*

Funkia lancifolia, Hosta lancifolia (S). Funkie lancéolée (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفَنَكَةِ أَوْرَاقُهَا سَنَانِيَّةُ النَّصْلِ جَمِيلَةُ الْخُضَارِ طَوَّلُهَا مِنْ ١٠ إِلَى ١٢ سَم. وَتَعْرِضُ مِنْ ٤ إِلَى ٥ سَم. || شُرَاخِهَا الزَّهْرِي يَرْتَفِعُ مِنْ ٢٠ إِلَى ٢٥ سَم. عَنُقُودُهُ يَدُ مِنْ ٦ إِلَى ١٠ أَزْهَارُهَا طَوَّلُهَا نَحْوَ ٣ سَم. لَوْنُهَا إِلَى الْبَيَاضِ النَّاصِعِ. أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ مَبْزُورٍ إِلَى آبِ.

### ٢١١٣٦ - فَنُكَّةُ سَيْبُولُ \*

Funkia Sieboldiana, Hosta Sieboldiana (S). Funkie de Siebold (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفَنَكَةِ أَوْرَاقُهَا بَيْضِيَّةُ الشَّكْلِ، نَصْلُهَا عَدِيدُ الْعُرُوقِ يَطُولُ مِنْ ٢٥ إِلَى ٣٠ سَم. وَيَعْرِضُ مِنْ ١٧ إِلَى ٢٣ لَوْنُهُ إِلَى الْخُضَارِ الْأَزْرَقِ الْمُسْتَبِجِ || شُرَاخِهَا الزَّهْرِي يَطُولُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٠ سَم. عَنُقُودُهُ يَدُ مِنْ ٥ إِلَى ٨ أَزْهَارُهَا طَوَّلُهَا مِنْ ٧ إِلَى ٥ سَم. لَوْنُهَا إِلَى الزَّرْقَةِ الْبَهْشِيَّةِ الزَّائِمَةِ. أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ سَبْرَانَ إِلَى آبِ.

### ٢١١٣٧ - فَنُكَّةُ قَلْبِيَّةُ \*

Funkia ovata, Hosta coerules (S). Funkie bleue (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفَنَكَةِ أَوْرَاقُهَا قَلْبِيَّةُ الشَّكْلِ، نَصْلُهَا مَالِسُ الْبِشْرَةِ، بَارِزُ الْعُرُوقِ، جَمِيلُ الْخُضَارِ تَعْلَمُوهُ رَقْشَةُ بَيْضَاءَ || شُرَاخِهَا الزَّهْرِي يَطُولُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٥٠ سَم. عَنُقُودُهُ يَدُ مِنْ ٦ إِلَى ٩ أَزْهَارُهَا طَوَّلُهَا مِنْ ٣ إِلَى ٥ سَم. لَوْنُهَا إِلَى الزَّرْقَةِ الْجَمِيلَةِ. أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَيْلَارِ إِلَى سَبْرَانَ.

### ٢١١٣٨ - فَنُكَّةُ يَابَانِيَّةُ \*

Funkia subcordata, Hosta japonica (S). Funkie du Japon (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفَنَكَةِ أَوْرَاقُهَا بَيْضِيَّةُ الشَّكْلِ، نَصْلُهَا مَالِسُ الْبِشْرَةِ

## ٢١١٣٧ - قَتِيدِيوم آذَرُوبِي الزَّهَرَة

Venidium calenduleum (S). Vénidie à fleurs de souci (F).

عشبة حولية سربوتية زينة مزينة الساق والفروع وتتلو نحو ٣٠ سم. فروها انيقة الانتشار. أوراقها مائلة الصفرة العليا الخضراء اللون. أما السفلى فزغبية قطنية. رؤوسها الزهرية تشبه رؤوس الأذريين. طباها حنطلي اللون، لسنتها برتقالية || أنزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

## ٢١١٣٨ - قَتِيدِيوم مَهْدَب ٥

Venidium wyleyi (S). Vénidie hérissée (F).

عشبة حولية زينة سربوتية مزينة الساق والفروع المنتصب. تتلو نحو ٢٠ سم. أوراقها غبراء اللون عنابية النصل على صفحتيها || رؤوسها الزهرية متوسطة القد، طباها جزوي اللون، لسنتها حنطلي الزام الأول، مذهبة الثاني والثالث، برتقالية الزام الأخير || أنزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

## ٢١١٣٩ - قَتِيق

الفريق نجم ثير من كوكبة برج الثور.

## ٢١١٤٠ - قَتِيق

الفحل الكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يان.

## ٢١١٤١ - قَتِيلَة

هي الزيلة، أطباها.

## ٢١١٤٢ - قَهَارَة ٥

Anémophilie (F).

Anemophily, Anemogamy (E).

القَهَارَة التأثير الطبيعي الذي قوته الرياح ينقلها الويلع أي جذرات الطلع من الإسمية الذكورية إلى المقاتلات الأنثوية.

## ٢١١٤٣ - قَهْد

Cynailurus (S). Guépard (F).

Cheetah, Chita (E). Gepard, Jagdleoparden (D).

القَهْد واحد الفهود. جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات. الأنواع المعروفة ثلاثة شكلها بين النمر والكلب: جسم كلب يحمل رأس سنور. مزاجه كزجاج النمر وفي طبيعه مشابه لطبع الكلب. ومن خلقه أنه يأكل لمن يحسن إليه ويكابر الفهود أقل لتأديب من صغارها. يقال أن أول من اصطاد به كليل بن وإثل وأول من خله على الخيل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان || ويضرب بالقهده للثل في كثرة النوم. وهو أحيث الجفة، وشيق القوام، مستطيل الذنب، جسمه يطول من ١٠٠ إلى ١٣٦ سم. ويطول من ٦٠ إلى ٧٥ سم. أما طول ذنبه فيراوح بين ٥٦ و ٧٦ سم. وهو مرقط الثوب أما رقبته متفرقة لا تجتمع كالحلق كما في النمر وليس لبرائته أكام كما في بران السنوريات. قوته ما استطاع إليه سبيلا من الظباء والمها والنم والمزمو والأيايل ويختلف الميترات. الآن تقسم من ٣ إلى ٥ جراء تموا وتربها بمزل عن الذكر || أما أنواعه الثلاثة فهي :

## ٢١١٤٤ - قَهْد أَرُقْط ٥

Cynailurus guttatus (S). Guépard moucheté (F). Chita (E). Fahhad (D).

نوع من القهده اصطناعه نسيمة الإرياء تشمل الهند والأفان وأران وحوض بحر قزوين والبلاد العربية وإفريقية الشرقية والبنالية مع الصحراء الكبرى والسنتال || جسمه يطول



قَهْد أَرُقْط



قَهْد أَرُقْط



قَهْد أَرُقْط



قَهْدَة



قَهْدَة سَامَة

نحو ١٣٥ سم. ويطول ٧٥، أما طول ذنبه فلا يقل عن ٧٥ سم. وهو اجلس وأكل شكلا من الاعرف. ثوبه كيف الور القصير. كبير الرقطة السوداء.

## ٢١١٤٥ - قَهْد أَعْرَف ٥

Cynailurus jubatus (S). Guépard à crinière (F). Hunting leopard, Cheta (E). Tschitah, Gemähnte gepard (D).

نوع من القهده اصطناعه نسيمة الإرياء تمتد من الهند إلى بلاد العرب وإفريقية الشرقية والغربية والبنالية || جسمه يطول نحو ١٣٠ سم. ويطول ٧٥ سم. أما ذنبه فلا يقل عن ٧٠ وهو رشيق القوام صغير الرأس مستدير. متوسط الأذن اعرف العنق. ثوبه قصير الور، صغير الرقطة.

## ٢١١٤٦ - قَهْد أَوْبَر ٥

Cynailurus lanus (S). Guépard lalieux (F).

نوع من القهده اصطناعه تشمل بلاد إفريقية الجنوبية. جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. ويطول ٦٠ سم. أما ذنبه فلا يقل عن ٥٥ سم || ثوبه كيف الور المستطيل، ورقته إلى الجفوة السوداء.

## ٢١١٤٧ - قَهْدَة

سمكة نهريّة من الشبوتيات تعرف باسم بني دجلة. يكثر وجودها في دجلة والفرات.

## ٢١١٤٨ - قَهْرَة نَبَاتِيَة

Phytonymie (F).

Phytonymy (E).

القَهْرَة النباتية مجموعة الألفاظ والمصطلحات الخاصة

العائدة إلى النبات.

## ٢١١٤٩ - قَهْقَة

Atlas, Vertèbre atlas (F).

the first cervical vertebra (E).

القَهْقَة هي أول فقرة من العنق تلي الرأس. وهي موصل

العنق بالرأس أو مركب الرأس في العنق.

## ٢١١٥٠ - قَهْكَة ٥ ، قَهْكَة ، قَهْقَة

Promecocephalus (S). Tétrodon (F). Globe fish,

Puffer (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القهقيات. أنواعها عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد الحارة. تتميز بقرابة اجسامها المتنفة التي تبهر كالبلاد خالية من الرأس.

## ٢١١٥١ - قَهْقَة سَامَة ٥

Canthigaster valentini (S). Tétrodon venimeux (F).

Venomous Globe-fish (E).

نوع من القهقهة. سمكة بحرية يوصف اصطناعها بعض مناطق البحر الأحمر والمحيط الهندي. ملحيها الحياتي جماعي، وأنها يرمي الشكل. عيناها كبيرتان، جاحشتان، ويقتا الارتكاز. ثوبها إلى الحلقة القفصية المرقطة بالبني ويملوها أربع جذات سود متعرجة، الأولى عند عتق الرأس والأخيرة عند قاعدة الزعنفة الذيلية || لحها سام لا يؤكل.

## ٢١١٥٢ - قَهْقِيَّات

Tetrodontidae (S).

Tétrodonitidés (F). Tetrodontidae (E).

فصيلة اسماك من رتبة ملحويات الفكوك عريانات الانسان. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد. اصطناعها بحار البلاد الحارة. جميعها من الاسماك المتنفة الغريبة الاشكال والأنواع.

## ٢١١٥٣ - قَهْقَة

Arnéble (F).

هي الأطن، اطلب.



فَهْرَة



فَوْه



فَوْشِيَا



فَوْشِيَا

Photomètre (F). **فُوتُوْمِتر ، مِصْبَاح**  
Photometer (E).  
جهاز قياس الضوء .

Photométrie (F). **فُوتُوْمِترِيَة ، ضِيَاءَة**  
Photometry (E).  
علم يبحث في قياس الاضوية وشدتها وبعدها .

Photon (F). Photon (E). **فُوتُون ، فُوتُون**  
الفوتون او الفوتون حزمة من الطاقة الضوئية في نظرية الكهنيات .

Photinia (S). **فُوتِينِيَة \* ، لَامَعَة**  
Photinia, Photinie (F). May bush (E). Glanzstrauch (D). Fotinia, Arguta (I).  
جنس اشجار من فصيلة الورديات. انواعها قليلة ، اكثرها بري وبعضها زراعي زينة || بعضها مالة منتصبه اوراقها ابيدة ، نملها جامد الصفرة ، جبل الخضار اللامع . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الازهر .

Tempe (F). Temple (E). **فُوتَم**  
هو في الحضرات الجزء الجانبى الخلفى من درع الرأس المعروف بالبنختر . وهما فودان والجسم الفودان .

**فُوتَدَج ، فُوتَدَج**  
هو الصمتر الشائع ، اطلبه .

Photodil (S). **فُوتَدِيل \***  
Photidile (F).  
جنس طير من الرواس الكواس وفصيلة البويوات .

انواعه المرفوعة قليلة العدد اعطائها تمتد من الاناثان الى الهند وجاوا || اجسامها صغيرة تطول من ٣٣ الى ٣٧ سم . رؤوسها مكورة . اجنتها لاحفة . اقوابها ثنائية اللون . تتميز بلذات ريشها الشديد النمو || ملجنتها الحياتى جامعي . تأت الفابات والحراج . قوتها القثان والزحافات والصفاد وكل ما تيسر لها .

Effervescence (F). **فُوتَرَان**  
الغليان الذي يحصل عند اقلاق الغاز وانغلاصه من السائل الذي كان متحدا به .

Folponnement (F). **فُوتَرَان**  
Expansion, Swarming (E).  
ازدياد حجم الكلس والاثرة الكلسية بتأثير الماء .

**فُوتَرَالِدِيد** هو الفرمليد ، راجعه .

Formol **فُوتَرْمُول**  
مطهر قوي يستعمل في تطهير الاماكن الموبوءة وبمكافحة الامراض الفطرية وتجبر بعض الفلات الزراعية .

Fusidium **فُوتَرِيدِيوم**  
هو السداغ ، راجعه .

Fuchsia (S). **فُوشِيَا ، جَمِيل**  
Fuchsia (F). Garden fuchsia (E). Fuchsia, Tapetenblume (D). Fuczia (I).  
جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الانجديات .

انواعها المرفوعة نحو ٥٠ اما غورها فزهاء ٥٠٠ سوقها وفروعها مخشوشة . اوراقها متعاقبة ثنائية او ثلاثية

Clavagella (S). **فُوشِيَة \***  
Clavagelle (F). Clavagella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الحياشيم

وفصيلة الفوتريات . انواعها المنقرضة المتجمعة توجد في الطبقة البيسانية . انواعها المعاصرة قليلة اعطائها البحر الابيض المتوسط والمحيط الهادى || اصداها ثنائية المصارع ، شبه انبوبية الشكل مستطيلة تنتهي بكمة مثقوبة .

**فُوش** هو ناردين الحدائق ، اطلبه .

Xylosma (S). Xylosme (F). **فُوشَاكَة**  
شجرة برية وزينية من فصيلة التمضيات . مدها الصين ساقها منتصبه سرمة ، اجنتها وافنادها شائكة . اوراقها ابيدة متعاقبة مثقبة . نملها يقضى الشكل ، مدب العقصة جامد الصفرة ، لامع البشرة . ازهارها وحيدة الشق صغيرة القد ، صفراء اللون ، فواصة العرف المطري . ازهارها عشقوي التجميع عمودي الارتكاز . ثمارها عنبية الشكل والقد ، بغسجية اللون يملؤها مواج اسود . ثورتها يستمر من آب الى ايلول .

Métopélies (F). **فُوشَاكَة**  
جنس طير من فصيلة الحمايات . انواعه قليلة منتشرة في معظم اصقاع العالم . تتميز بريشتها وارتفاع ارسافها واعتدال اجنتها وطول اذنانها || اشهر انواعه القاعنة الشرقية ، اطلبها .

Pivoine (F). **فُوشِيَا**  
هي الزبح ، اطلبه .

Cardiosperme (F). **فُوشِيَس**  
هو البكت ، اطلبه .

F.O.B. **فُوش**  
خالص الى السفينة . صيغة اشتراط تجب على البائع تسليم المبيع ، دون اجرة نقل ، على ظهر السفينة الشاحنة .

**فُوش \* ، فُوشَة الصَّابِين**  
Rubia tinctoria (S). Garance, Garance tinctoriale (F). Madder, Dyer's madder (E). Färberröte, Rote (D). Garanza, Rubbia, Robbia del tintori (I).  
نبات جذموري صباغي معمر من فصيلة الفويات . جذاميره مادة حمراء اللون مستطيلة الثرشوش الكثيفة التجميع . ساقه رباعية الانضغ شائكة الحروف ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، ضخمة ، رباعية او سداسية التجميع ، نملها سناني الشكل ، ازغب الصفرة اللؤلؤ ، مذهب الخمار . ازهاره خاسية التركيب لونها الصفرة يملؤها مواج اخضر || جذاميره غنية بالمواد الخفسية الحمراء وهي لا تحل من المنافع الطبية اجنتها در البول .

Menthe aquatique (F). **فُوشَتَج الماء**  
هو نمنع الماء ، اطلبه .

Poullot (F). **فُوشَتَج بَرِي**  
هو نمنع الحقل ، اطلبه .

Véronique d'eau (F). **فُوشَتَج مَصْرِي**  
هو فونريكا سيق المي ، اطلبها .

**Fuchsia** ٢١١٨٤ - **فُوشِين**  
صباغ احمر يستعمل في تلون الانسجة العضوية لتسكين من دربها المجهري . وهو يستحضر من تأكسد الانيلين بالنيروبزين .

**Foussa (F).** ٢١١٨٥ - **فُوصَة**  
الفوصة حيوان لاسم مفترس يدعى عساس ، اطلبه .

**Anarchisme (F).** ٢١١٨٦ - **فُوشِيَوِيَّة**  
**Anarchism (E).**  
الفوضوية مذهب سياسي قوامه ابدال اعمال السلطة الحاكمة بالمبادأة الفردية .

**Virulence (F).** ٢١١٨٧ - **فُوصَة**  
**Virulence, Malignity (E).**  
خاصة في بعض الميكروبات تجعلها اذا دخلت جسماً تكررت فيه بسرعة وخلفت افرازات وبيلة تحدث اوجم المواقب .

**Pellicule d'un noyau (F).** ٢١١٨٨ - **فُوقَة**  
**Pellicle of the stone (E).**  
الفوق ج فوف . هي غشاء التؤاة .

**Nauclea (S). Nauclee (F).** ٢١١٨٩ - **فُوقَل**  
**Nauclea (E). Morgenstern (D). Nauclea (I).**  
جنس نباتات برية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة نحو ٥٥ اصنافها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية . مظهرها اشجار شائكة السوق والفروع وبعضها جنبات متسلقة . اوراقها معتقة ، متقابلة ، بيضيه الشكل . نصلها جامد الصلابة ، مائل البثرة كثير المروق . ازهارها ابليهة شامعية ملونة || اشهر انواعها القوقل الهندي .

٢١١٩٠ - **فُوقَل هِنْدِي ، فُوقَل سَرَح**  
**Nauclea inermis (S). Nauclea inermis (F).**  
نوع من القوقل وهو جنبه متسلقة سرحة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها قليلة الفروع ، سمكة القشور العلوية الناعمة . تستعمل عند الحميات .

٢١١٩١ - **فُوقَلَة**  
**Dividivi (F).**  
هي العنم السباتي ، اطلبه .

٢١١٩٢ - **فُوق بَشْرِي**  
**Métahumain (F).**  
نمت تعريفه يطلق على ما هو فوق التفكير البشري وادراكه .

٢١١٩٣ - **فُوقُص**  
**Fucú, Varech**  
هو الصريع جنس نباتات بحرية من فصيلة الفوقسيات .

٢١١٩٤ - **فُوقُسيَّات**  
**Fucaceae (S).**  
**Fucacées (F). Fucaceae (E).**  
فصيلة نباتات مائية من رتبة الخفيات السرة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري المنيب .

٢١١٩٥ - **فُوقُزِيَّات**  
**Vochysiaceae (S).**  
**Vochysiacées (F). Vochysiacées (E).**  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القائلات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصنافها معظم اصقاع امريكا الاستوائية || جميع نباتاتها معمرة ، بعضها عشبي

التجميع . ازهارها جميلة الشكل ملونة الكؤوس ، رباعية الفصل والبتلات ، ثمانية الاسبدة || ترطب في الاربة المتوسطة الاندماج والرطوبة ، الغنية بالمواد العضوية والتماسر المعدنية . غير انها تخشى المراض الطليقة الكثيرة الاشخاص || اشهر انواعها ما يتبع .

٢١١٧٨ - **فُوشِيَا بَهِيَّة**  
**Fuchsia fulgens (S).**  
**Fuchsia éclatant (F).**

نوع من الفوشيا وهي بجملة زهرة تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها عشقوية . ساقها وفروعها كستنية . اوراقها خضراء اللون ، بيضيه الشكل ، مفتولة النصل ، تطلو من ١٠ الى ٢٠ سم . وتقرض من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها عشقوية التجميع متدلية . كؤوسها وفصلها مستطيلة مرجانية . يتلاتها الى الحمرة الازرقانية الساطعة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢١١٧٩ - **فُوشِيَا ثَلَاثِيَّة الْاَوْرَاق**  
**Fuchsia triphylla (S). Fuchsia à feuilles ternées (F).**  
نوع من الفوشيا وهي بجملة سبروتية صغيرة اللد تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقها خضيه ، ثلاثية ، سنانية الشكل تطلو من ٤ الى ٨ سم . نصلها احمر اللون ، اسفح الموج ، خلي المروق . ازهارها عشقوية التجميع متدلية ، لونها الى الحمرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال السنة .

٢١١٨٠ - **فُوشِيَا شَائِكَة**  
**Fuchsia magellanica, F. macrostemma, F. coccinea, F. corallina (S). Fuchsia commun (F). Common fuchsia (E).**

نوع من الفوشيا وهي بجملة سبروتية تملو نحو ١٠٠ سم . فروعها بجملة حراء اللون . اوراقها معتقة اهليجية . ازهارها متدلية جرسية الشكل . كؤوسها وفصلها اردوانية اللون . يتلاتها الى الزرققة البنفسجية المواج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢١١٨١ - **فُوشِيَا عَشَقِيَّة**  
**Fuchsia corymbiflora (S). Fuchsia en corymbe (F).**  
نوع من الفوشيا وهي جنبه جادحة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . فروعها دقيقة كستنية اللون . اوراقها اهليجية ذلقة تطلو من ٢٠ الى ٣٢ سم . نصلها خلي البثرة احمر الصلابة . ازهارها كبيرة اللد عطرية التجميع . كؤوسها ويتلاتها الى البياض الاغبر ، نصلها اردوانية عابقة المواج . ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢١١٨٢ - **فُوشِيَا لَامِيَّة**  
**Fuchsia splendens (S).**  
**Fuchsia brilliant (F).**  
نوع من الفوشيا وهي بجملة سبروتية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها جزوية اللون لزجة . اوراقها الى الخضار الزاهي . ازهارها فردية ، ابليهة ، مستطيلة المايق ، متدلية . كؤوسها وفصلها اردوانية اللون . يتلاتها سفنسية . ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢١١٨٣ - **فُوشِيَا مُشَجَّرَة**  
**Fuchsia arborescens (S). Fuchsia arborescent (F).**  
نوع من الفوشيا وهي جنبه جادحة فروع مهددا المكسك . تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل ، ذلقة الزايم الاخير . تطلو نحو ٣٠ سم . نصلها خلي البثرة جزوي اللون . ازهارها عشقوية التجميع ، طرية الاوتكاز ، متصلة اللد ، وردية اللون ، منتصبه . ازهارها يستمر من الخريف الى الربيع .



فُوشيا بهيَّة



فُوقَل

والبيض الآخر جنسي. اوراقها كاملة ، متقابلة او  
ضمية. ازهارها غشوية ، متدعة الزواجات. ثمارها جرد  
مستطيلة تحسن بعض البذور المذبة الاح .

٢١١٩٦ - فول \* ، بالقلي ، بالقلاء ، جمنى  
Vicia faba, Faba vulgaris (S). Fève (F). Broad bean

(E). Buffbohnen (D). Fava (I).  
نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة البقوليات الغراسية.  
وهو نوع عديد الصوروب والاصرام فوارقا اختلاف علو  
السوق ولون الازهار وسمم القرون وشكل الحبوب .  
والقول نبات غليظ الجذور المخورية القليلة الانتساب  
ساقه منتصب ، مرعبة ، جوفاء ، محزوزة ، عديمة الفروع  
تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متوالية مركبة. وريقاته  
شفعية الترتيب ، بيضية النصل البحري اللون. ازهار  
كبيرة القند ، عتقودية التجميع ، ابيلة الارتكاز ، بيضاء  
اللون او حمراء تعلوها رشفة بنفسجية سوداء المواج . ثمار  
قرون مفلطحة مستطيلة تلتف الحبوب التي يراوح عددها  
بين ٣ و ٨ . وحويبه هذه التي تعتبر من اقنى وانشط  
الماكك الزراعية تحوي نحو ٨١٪ من الوحدات الغذائية،  
تمريفها :

مواد ازوتية ٢١,٥١٪  
مواد دهنية ١,٥٤٪  
مواد هيدروكربونية ٥٥,٢٥٪

والقول يرطب في الارابة المنجعة ويفضل منها الطيبنة  
الرملية ثم الطيبنة الكلسية الرملية ثم الطيبنة. وهو قليل  
المجودة والانتاج في البيل، يفضل الري الذي يوافق مزاجه  
ويضاف انتاجه || حاجته الى الاسمدة المعدنية تقتصر  
على الحامض السفوري والبوتاس . لزوم التدم الواحد  
يقدر بنحو ٥٠ كيلو منها ٣٠ كيلو سوبرفوسفات و ٢٠  
كيلو كلورير البوتاس تذر على التربة وتعلم جيداً .

٢١١٩٧ - فول انجيليل  
Fève de cheval (F).  
هو القول المصري ، اطلبه .

٢١١٩٨ - فول اينيبياس  
Strychnos ignatier (F).  
هو سترينكوس اينيبياس ، اطلبه .

٢١١٩٩ - فول سبيسي  
Haricot-sabre (F).  
هو التفتنول السبي ، اطلبه .

٢١٢٠٠ - فول سوداقي  
Arachide (F).  
شائع باسم فستق سيدي ، اطلبه .

٢١٢٠١ - فول كلباس  
Physostigma venenosum (S). Physostigma vénéneux,  
Fève de Calabar (F). Calabar bean (E). Kalabarbohne  
(D). Fava del Calabara (I).

نبات عارض معمر من فصيلة القزليات . اوراقه متتاقية  
ازهاره ارجوانية . بزوره سامة لكنها لا تخلو من الناتج  
الطبيعي وقد تشمل في علاجات المين .

٢١٢٠٢ - فول مضري \* ، فول انجيليل  
Vicia faba equina, Faba equina (S). Féverolle, Fève

de cheval (F). Horse bean, Tick bean (E). Pterode-  
mone (D). Fava cavallina, Favetta cavallina (I).

ضرب من القول زراعت واسعة الانتشار تكثر في مصر  
والسودان . ساقه رقيقة تعلو نحو ١٠٠ سم. نصل وريقاته  
عابق الخضار . ثماره قرون صغيرة اسطوانية منتصبه .

حويبه اليابسة صغيرة القند عديمة التبلط تحمل بخواص  
وبزرات القول المادي .

٢١٢٠٣ - فول هندي  
Pois d'Inde (F).  
هو التفتنول البائر ، اطلبه .

٢١٢٠٤ - فول هندي مسهل  
Strychnos ignatier (F).  
هو سترينكوس اينيبياس ، اطلبه .

٢١٢٠٥ - قوتع  
وطائر احمر الرجلين كان رأسه شيب مصبوغ ونها ما  
يكون اسود الرأس وسائر خلقه اغير . ابن سيده .

٢١٢٠٦ - قوتف  
Enveloppe (F). Wrapper (E).  
القوتف : غطاء كل شي .

٢١٢٠٧ - قووم  
All (F).  
هو الثوم للزراعي ، اطلبه .

٢١٢٠٨ - قوماين  
Fumarine (F). Fumarin (E).  
مادة قلووية فعالة تستخرج من الشاهترج الخرنبي .

٢١٢٠٩ - قوماثة  
Fumana (S).  
جنس نباتات عشبية مجعولة من فصيلة الاديانات .

انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها برية . منتجها غابات  
وجراح وادغال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ||  
اوراقها وازهارها عطرية الريح || اعرف انواعها واشهرها  
الثلاثة التالية :

٢١٢١٠ - قوماثة عربية  
Fumana arabica (S).  
Fumane arabique (F).

نوع من القوماة . فروعه منتصبه . اوراقها مراكبة ،  
قصيرة الاديانات ، غليظة النصال المستطيلة المنطقة  
الرقوس . ازهارها صغيرة صفراء اللون || تنويرها اويبي .

٢١٢١١ - قوماثة لرجة  
Fumana glutinosa (S).  
Fumane glutineuse (F).

نوع من القوماة . فروعه منتصبه . اوراقها متقابلة ،  
عضائية ، لرجة . نصالها ضيقة ، مستطيلة . ازهارها  
الى الصفار الباهت . تنويرها رديي .

٢١٢١٢ - قوماثة متحنبة  
Fumana procumbens (S). Fumane penchée (F).

نوع من القوماة . فروعه متحنبة . اوراقها مترافدة ،  
جالسة ، غليظة . ازهارها ابلي الارتكاز . ازهارها  
صغيرة صفراء اللون . تنويرها صفي .

٢١٢١٣ - قومة  
Phoma (S).  
جنس فطور مجهرية من الصنبيات . بكتيدات كروية

الشكل او بيضية مفلطحة تنشأ تحت الادمة ثم ترقى الى  
السطح . مقه يركز على حلويات دقيقة . شفراته قصيرة ،  
بويغاته مستطيلة ، بسيطة ، شفافة || انواعه عديدة  
تركب تختلف اعضاء النبات . اشهرها :

٢١٢١٤ - قومة البطاطا  
Phoma solanicola (S).  
فطر مجهرى يصيب سوق البطاطا وعروقها فيؤذيها ويؤخر  
نموها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة ، يبيض او صفر .



فول (١)



فول (٢)



فول كلباس



فول مصري



قومة البطاطا

الملفوف والقنيطر واللفت والسلم والخرдол || مظهره الخارجي يقع مستعرضة تملو اطراف النصل . تبدو قمرزية اللون ثم سمراء حنطية المواج تفرح النسخ المتناثرة وتقتضي عليها || يركب النبات في مختلف ادواره لانه يعيش في التربة || يكالغ اولا باحتجاب تكرار زراعة الصليبيات في نفس الموقع . نائبا يظهر البذار ، قبل نثره ، بمحلول بيكلوريد الزئبق المركز ٪ .

Phoma linicola (S). \* قُوْمَةُ الكَتَان \*  
فطر مجهري يصيب سوق الكتان فيلونها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستطيلة حنطية اللون تركب الساق في زامه الأول من التربة وصاعداً فتفرح اللحاء والبشرة وتذبل النباتات . يكالغ يظهر التربة والنبات .

Phoma apicola (S). \* قُوْمَةُ الكَرَفَس \*  
Gale du céleri (F).  
فطر مجهري يصيب الكرفس والبقونس في اجنتها وازاد اوراقها || مظهره الخارجي يقع حنطية تفرح البشرة وتفرح قنصب رخاوة وذبول الاعضاء الموصومة || يكالغ يظهر التربة والبذار .

\* قُوْمِس الجُدُور \* ، \* قِشْد \*  
Hymenochaete noxia, Fomes lamaricensis, Fomes noxius (S). Hymenochaete (F).  
فطر من السميات موطنه البلاد الحارة . يركب جلود عدة نباتات اعصها القشقة والين والشاي والقطن || مظهره الخارجي انكاش فيجاف ذبول في الارراق يعقبها جيمش ويواس في الاثنان والنوامي || وهو على الجلود خيوط عفية مَرَامَة حنطية اللون تمتلج الجلود وقد تغلفها قشطب الجراة والايالات || اما القطر فهو كثانة من دملة زياء الجسم ، شويانية النكمة المستورة الخنطيط الجؤوية اللون || ليس له علاجات شافية حتى الآن .

\* قُوْمِس لِيْجِي \* ، \* سُمِيَّة وَشَاحِيَّة \*  
مرض الجندور الأبيض  
Fomes lignosus, Fomes semitostus, Rigidoporus microporus, Polyporus zonalis (S). Polypore zonale, Maladie des «racines blanches» (F). White rot (E).  
فطر من السميات موطنه البلاد الحارة يركب جنود عدة نباتات اعصها الكاكور والقشقة والمننا والخنطيل . مظهره الخارجي انكاش جزئي يحل بعض اقسام الشجرة يسبب جفاف الاوراق والاثنان وس حجوم النوامي . وهو على الجندور خيوط متوازية جندورية القعد المرسوفة كحب السبعة . تبدو بيضاء اللون ثم تبتنية وتنتهي بالوردي . مشيبه كثيف الهيف يقتسم الجراة فيطعها مع اوعيتها لا علاج له ، اما اجتنابه فيفسور بذلك بالابتعاد عن ارميات الاشجار الحرجية اليابسة المتروكة في التربة . او باقتلاع هذه الارومات قبل المباشرة بالفرس .

Phomopsis (S). \* قُوْمُويسيس \*  
جنس فطور مجهري من فصيلة السفنيات . يتميز بكنيتاته الاقياسية الشكل . شفراته غمرزية او خيطية . بويغاته بسيطة ، شفافة ، مستطيلة ، جاملة او منقطة . اعرف انواعه ما يتبع .

\* قُوْمُويسيس التَّنَوْب \*  
Phomopsis abietina (S).  
فطر مجهري يصيب افئاد التنوب في نوايبها . مظهره الخارجي اطار يحيط النوامي على حدود زامها الاخير

تركب الساق والمروق قنصب جفاف النسيج وانصداع البشرة || يكالغ يظهر التربة .

\* قُوْمَةُ التَّفَاح \*  
Phoma umbilicaris (S).  
فطر مجهري يصيب ثمار التفاح والاجناس في ابان نموها . مظهره الخارجي بقعة حنطية تركب الثمرة عند خاتمها ثم تتحد قليلا بعد ان تغني البشرة بولج من الشجج يرفنها ويصلها || يعتبر من الاوصام المهدومة الانتشار والاذى التي لا تستوجب المعالجة .

\* قُوْمَةُ الجَزَر \*  
Phoma sanguinolenta, Ph. rostrupli (S).  
فطر مجهري يصيب الجزر في قرص جنثه وقد يمتد الى الاوراق || مظهره الخارجي يقع طلاء اللون تبدو ميمرة ثم تنتشر وتتشارك فتفرح الادمة والبشرة وتمطليها . ينشط في الارربة الدبالية الرملية ويتلاشى بقدر ما يزداد انصاج التربة .

\* قُوْمَةُ الحَمْضِيَّات \*  
Phoma citricarpa (S).  
فطر مجهري يصيب اوراق وثمار الحمضيات . مظهره الخارجي ، حل الاوراق ، يقع صغيرة مستندرة سمراء اللون تركب النصل على صفحت العليا || وهو على الثمار يقع مستندرة قطرها من ١ الى ٥ مم . تبدو ميمرة ثم تمتد وتتشارك فتيلج مساحتها نحو ٢ سم ٢ . تكون في اول عهدها غراء اللون ثم تتحرف نحو الحنطي وتنتهي بسلاسر . بكنيتاته فردية او ضخمة التجميع ، حنطية او سمراء اللون ، قطرها من ١٠٠ الى ١٢٠ ميكرون . بويغاته اهليجية او مريدية الشكل ، قياسها نحو ٨×٩ ميكرون . يصيب الثمار ويقتصر مدة حفظها || يكالغ ينفض الاشجار بسائل بورود المحلول ٪١ على ثلاث او اربع مرات ، الاول بعد اكبال الانجرار اسبوع والثانية بعد الاول ثلاثة اسابيع والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع والرابعة بعد الثالثة خمسة اسابيع || ومنهم من استعمل الفوطاير غير المرتكزة على النحاس وقد يكونوا مسميين .

\* قُوْمَةُ الخَرْمَازِي \*  
Phoma lavendulae (S).  
فطر مجهري يصيب الخرمازي في فروصها المحوة والجديدة فيلونها || مظهره الخارجي ذبول يحل بالفروع القديمة والجديدة سببه انتشار الورص بين الادمة والبشرة التي تسر وتيس || بكنيتاته كروية قطرها يراوح بين ٨٠ و ١٥٠ ميكرون . بويغاته امطوانية قياسها نحو ٢×٥ ميكرون || يكالغ يظهر التربة بالكلس الحراق بعد اقتلاص ورمق النباتات للمصابة .

\* قُوْمَةُ الدَّرَّة \*  
Phoma insidiosa (S).  
فطر مجهري يصيب اوراق الدرة فيلونها . مظهره الخارجي يقع لاقسياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق . تبدو حنطية ثم تتصرف الى الراديي بعد ان يكتنفها اطار اصهب عالق || بكنيتاته مستندرة قطرها يراوح بين ٧٠ و ٨٠ ميكرون ، بويغاته اهليجية قياسها ٢×٦ ميكرون .

\* قُوْمَةُ الصَلِيْبِيَّات \*  
Phoma lingam (S).  
فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية اعصها



قوة التفاح



قوة الحمضيات



قوة الدرة



فوس الجندور



## ٢١٢٤٧ - فيتامين (F). Vitamine (F). Vitamin (E).

الفيتامين اسم يطلق على بعض المواد اللازمة لنمو الجسم ونموه مع العلم ان نقصه من احد الادرى يسبب بعض الأمراض المعينة المعروفة بأمراض النمو || والفيتامينات اذ ليست مركبات غذائية تستخدم في بناء الانسجة . او مركبات عضوية تحترق فتولد طاقة حرارية يستخدمها الجسم في نشاطه .. بل هي مواد واقية لازمة يفتقر اليها الجسم في جميع اعضائه واطواره || والفيتامينات صديقة الاقسام تختلف باختلاف غاياتها وفعاليتها . امربها حالياً الفيتامين «ا» و«ب» و«ث» و«د» و«هـ» و«ك» و«ج» || حاسبة الجسم اليومية الى تختلف الفيتامينات تراوح بين ٧٠ و ٩٠ مليغرام . متوسطها جسم وزنه ٧٠ كلو يقدر بنحو:

فيتامين «ث»	٧٠.٠٠٠ مع
فيتامين «ب» ١	١.٥٠٠ مع
فيتامين «ب» ٢	١.٥٠٠ مع
فيتامين «ا»	٣.٥٠٠ مع
فيتامين «د»	٥.٠٠٠ مع

## ٢١٢٤٨ - فيتامين «ا» Vitamine A (F).

يفيد العين لان نقصه في الجسم يسبب تصلب الملتحمة وضعف البصر والشا || مصادره حيوانية ونباتية كما هي مدونة ادناه وقد جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها .

مصادر حيوانية : زيت كبد النادس ، زيت كبد التونا ، السمك ، الكبد النوي ، النخاع ، صفار البيض ، البيض ، الكلوة ، الزبدة ، الشفلة ، الجبن ، السم ، لحم البقر ، الحمار ، الحليب المكثف المحلى ، الحليب المأزج ، اللحم المدخن .

مصادر نباتية : بقونس طرخشقون ، هندباء ، سلق ، اسبانخ ، ملوخية ، قرع حلو ، حبيص ، خس ، مشمش ، قرع ، ورق النفل ، جزر ، بزيلا ، غوخ ، فليفلة ، زيتون ، شوندر ، كرفس ، بنبورة ، لوز ، موز ، ثوم ، جوز .

## ٢١٢٤٩ - فيتامين «ب» Vitamine B (F).

اسم شامل يطلق على عدة فيتامينات تذوب في الماء . نشاطها كثير الفوائد اعضها تأمين للشوة ومضادة مرض البربري واداء الذرة || اما التمييز عن فوائدها ومصادرها فهو منوط بالمعدل اللاحق بها كما في التصنيف التالى حيث ذكرنا انواعها الثلاثة المشهورة مع مصادرها التي جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها .

فيتامين «ب» مضاد الكسح : زيت كبد التونا ، النادس ، الزنكة ، السردن ، النبر ، صفار البيض ، الزبدة الصيفية ، دهن النخيل ، الكبد النوي ، الحمار ، غنيس الحليب .

فيتامين «ب» ١ مضاد لالتهاب العصب : خيرة البيرة ، رشم الزروع ، كبد في ، صفار البيض ، حبوب القزليات ، دقيق العس ، بزيلا خضراء ، ربقال ، لينون ، حمار ، كسناط ، طرخشقون ، حبوب الزرع ، شوندر ، سلق ، تين ناشف ، جزر ، هندباء ، ورق النفل ، زبيب ، خوخ مجفف ، اسبانخ ، حبيص ، خبز اسمر ، بقونس ، موز ، قرع .

فيتامين «ب» ٢ يهدئ الشوة : خيرة البيرة ، كبد في ، صفار البيض ، كلوة ، سلق ، بادججان ،

فيسبب جفاف السنج وسقوط الاثر ثم يمتدح يباس الحشب الذي يمتد نزولاً وشيخاً فيه حتى يم كامل القند ثم الفس . يكائن بالتقطع وسرع الاعضاء الموصوبة ويتطهر الجروح بملوب سلفات النحاس .

## ٢١٢٤٧ - فومي Salsifs sauvage (F).

هو السلفيل البري ، اطلبه .

## ٢١٢٤٨ - فومي أسود Salsifs noir (F).

هو البوع الزراني ، اطلبه .

## ٢١٢٤٩ - فومي Pivoine (F).

هي البوع ، اطلبه .

## ٢١٢٥٠ - فومي Cratée (F). Crater (E).

منفذ حم البركان .

## ٢١٢٥١ - فومات Rubiaceae (S).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين وسيدات القعالة . انواعها نحو ٤٠٠٠ تنتمي الى ٣٤٠ جنساً تنجم الى ثلاثة اسباط : البليات والكيكات والشواسيات . معظمها اشجار وجنيات وبعضها اعشاب . جميعها كاملة الاوراق والا زهار .

## ٢١٢٥٢ - فومي Episperme (F).

اسم يطلق على الفشا الرقيق الذي يغلف التواة .

## ٢١٢٥٣ - فومي قطرة او سرب من الطير .

## ٢١٢٥٤ - فومي Erectile

قابل الجذل والاصتباب .

## ٢١٢٥٥ - فومي Hibou (mâle) (F). Owl (male) (E).

ذكر البوم ويقال له الصدى والصيح .

## ٢١٢٥٦ - فومي \* Picathartus (S). Picatharte (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفرايبات . موطنه بعض مناطق افريقية الشمالية . ملجته الحياتي جماعي . فوجيه يمد من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً . قوته الحشرات والنبويات والاسماك والقشريات والمحبوب واليدور || جسمه كبير القند يطول نحو ٥٥ سم . رأسه صغير الجرم . منقاده معتدل الفلانة . عنقه كمنق النسر مستطيل الشكل ازغب الريش . جناحاه قصيران . ذنبه مستطيل القند ، مستدير الطرف . فويه اسود الرءاء والجناب والذنب ، أبيض الرأس والعنق والبطن والايطل والفقذ .

## ٢١٢٥٧ - فومي Cornac (F). Elephant-driver (E).

من يقود الفيل ويضحي بامره .

## ٢١٢٥٨ - فيبروم هو الورم اللي ، اطلبه .

## ٢١٢٥٩ - فيبرون ، فيريون ، فيريون Vibration (F).

نوع من الكتيرية كثيرة الحركة لولبية الشكل او مقوية Vibrio (E).

٢١٢٤٠ - فيبرين ، ليفين Fibrine (E). Fibrin (E). مادة آسية بيضاء اللون عادمة الطعم والعرف تدخل في تركيب الدم والليل والسفلات .

٢١٢٤١ - فينيساس هو الكتان البري ، اطلبه .



فيان

موت الصيصان الحديثة التفق . مصادره عديدة أشهرها :  
زيت رشم الحنطة ، رشم الزروع ، الكبد اليء ، زيت  
فستق المبيد ، زيت الفقل ، زيت التفل ، زيت  
الصويا ، الخس ، الرشا ، القرء ، عضلات البقر ،  
دهن الخنزير ، زيت الزيتون ، زيت الجوز ، الزبدء ،  
الحبء الكامل .

Vitamines (F).

## ٢١٢٥٠ - فيتامينات

انظر الجدول في الصفحة المقابلة .

## ٢١٢٥١ - فيتين زيتي\* ، فيتودكتة زيتية ،

تجآر زيتي (Phytodecta olivaceus (S).  
Phytodecta olivatre (F). Phytodecta olivaceus (E)

حشرة خاضعة من فصيلة التضايريات ورتبة مغمذات  
الاجنسة . تألف البراري والاخراج الدفلة . خنافسها  
ويرقاتها تعيش عل نباتات القرنيات القرآشية واخصها الوزال  
والفنتول و جسمها صغير القعد يطول من ٤ الى ٥ سم .  
توفاها الى الصغار الزيتي الاسمر المراج يطول في الظهوران  
توشيح قائم وضعان اسودان قاطبان . رأسها كبير الجرم .  
عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهورها مسدول  
الاحديداب ، مستدير الطرف الاخر . غمدها متتابعتا  
التنقيط الخفيف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها  
جمل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في ايار  
وتبقى حتى ايلول . تسرح في التهار . تساءل بعد ظهورها  
باربعة اسابيع . تمتع المكان رزنا لاقائية الحميم ضمن  
غشاء غروي المادة يلتصق بصلال الازراق ويشرء البءاء ||  
البرقة عند طولها الادراك التام تطول نحو ٨ سم . جسمها  
وشبي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصغار  
القائم يطول تنقيط اسمر . رأسها وشربها ورواجبها الى  
السعة || طول الكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع  
يتنضي في التربة تحت الحجارة ضمن جراب من التراب  
والمواد النباتية .

## ٢١٢٥٢ - فيتوبنس الاجاص

Phytopte du poirier . هو خاشية الاجاص ، اطباها .

## ٢١٢٥٣ - فيتوبنس الكرمة

Phytopte de la vigne . هو خاشية الكرمة ، اطباها .

## ٢١٢٥٤ - فيتوثومة

Phytotoma (S).  
Phytotome (F).

جنس طير من الجلوم سنيات المناقير وفصيلة الفطنجيات .  
انواعه المروفة قليلة العدد جيمها من طمر امريكا الجنوبية |  
اجسامها متوسطة القعد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقيعها  
قصيرة ، مستعرجة الاشداق . اثلهاا متراكبة الالوان  
الجميلة . اطراف اجنحتها واذناتها تنتهي دائما بالاسود  
الاسفع . صدورها وبعطونها بيض || ملجها الحياتي جامعي .  
تألف الغابات والاشجار القرية من مجاري الماء . قوتها  
البذور والثار الائمة وبعض الحشرات والديدان .

## ٢١٢٥٥ - فيتوثومية ، متحاجة ٥

Phytotomie (F). Phytotomy (E).

الفيتوثومية علم يبحث في تشريع النبات .

غوخ مجفف ، حبوب القرنيات ، مشش مجفف ،  
كستاء ، زبلاء خضراء ، نياض البيض ، اسبانغ ،  
ورق الفجل ، حبض ، طرخشقون ، حبوب الزروع ،  
ملفوف ، قرء ، بقفوس ، غيض الحليب ، رشم  
الزروع ، محار .

## ٢١٢٥٥ - فيتامين ث

Vitamine C (F).  
Vitamin C (E).

يتميز من افيد الفيتامينات والزمها للجسم . نقصه يسبب  
ضعت البنية والصداع وسوء الهضم واين الفاسل وتآكل  
الانسان والحفر المروف بءاء الاسقربول || مصادره  
الرئيسي النبات حيث يكثر في بعض الثار والاوراق كا  
هو مين في التصنيف التابع . وقد جاء ترتيب المصادر الواردة  
بالنسبة الى غناها فالاولية للاشي :

اعرف مصادر فيتامين «ث» المألوفة : ثمرة الترسن ،  
ثمرة الزعرور ، ثمرة الاكدينيا ، بقفوس ، فليفلة ،  
ملفوف ، قرء ، حبض ، ورق الفجل ، زبلاء خضراء ،  
برتقال ، ليمون ، كريفروت (ليبون الجنة) ، يوسني ،  
اسبانغ ، سلق ، سمء ، كستاء ، طرخشقون ، كبد فيء ،  
فراسكين ، باذنجان ، هندباء ، ثوم ، كرات ، بنتوره ،  
كرفس ، بطاطا ، فجل .

## ٢١٢٤٦ - فيتامين ج

Vitamine G, Vitamine P.P. (F). Vitamin G. (E).  
يساعد وينشط جول الشعيرات الدموية فيزيها متانة  
ومحيها من سرعة الانزلاق || مصادره عديدة اخصها الليمون  
والبرتقال ثم الخوخ والمشمش ثم الاسبانغ والبقفوس والخس .

## ٢١٢٤٧ - فيتامين د

Vitamine D (F).  
Vitamin D (E).  
هو ما يدعونه فيتامين اشعة الشمس لانه يتكون في الجسم  
عندما يتعرض لاشعة الشمس وذلك لان الازسيتول الموجود  
في المادة الدنية التي يفرزها الجسم يتحول بفعل الاشعة  
وراء البنفسجية الى فيتامين «د» || والفيتامين «د»  
يؤتون توازن وتقبل الكليسيوم والفسفور في الدم والعظام .  
خلوه من الجسم يسبب غلوية العظام وليها وانماقتها وتشويه  
شكلها مما يؤدي الى الكسح || مصادره زيت كبد الفادس  
المروف بزيت السمك .

## ٢١٢٤٨ - فيتامين ك

Vitamine K (F).  
Vitamin K (E).  
يمتج الزيت ويساعد عل تجلط الدم تجلطا طبيعيا لذلك  
فهو من الضروريات لان نقصه في الجسم سيء المواقب .  
والفيتامين «ك» يقسم الى فئات اشهرها «ك» و«ك٢» .  
ومصادر الفيتامين «ك» هي الاسبانغ والملفوف والقيط  
واشباب البحر وهو يستخرج ، للاستعمال العلاجي ،  
من دقيق الفصة || اما الفيتامين «ك٢» فيستخرج  
من دقيق السمك .

## ٢١٢٤٩ - فيتامين هـ

Vitamine E (F).  
Vitamin E (E).  
هو ما يدعونه فيتامين التاسل او الفيتامين المانع للعقم وهو  
العامل الرئيسي في نمو الحجيرات التناسلية بين الزم  
ضروريات النشوء الجنيني ونسجه المولدة || وهو ذو علاقة  
كبرى باتناء بيض الدجاج لان نقصه في الغذاء يؤدي  
اولا الى انقراض عدد البيض . ثانيا الى تدني نسبة المبوك  
الصالح للتفقيس . ثالثا الى ارتفاع نسبة التنتل ثم الى



فيت نري

جدول بأشهر الثمار الفنية يختلف الفيتامينات مع المقدار النوعي والمحوى الفلوسيدي والفاقة الحرارية الخ...

Tableau des Vitamines, teneur en glucides et valeur calorique des principaux fruits

الموضوع	مقدار الفيتامينات الموجودة في كل ١٠٠ غرام من سؤدق الثمار المأكولة											
	التعبير عن المقدار بالوحدات الدولية						التعبير بالمليغرام عن الحامض الاسقربوطي					
	فيتامين «أ»			فيتامين «ب»			فيتامين «ث»			الحموضة	القياسي	عوى
	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى			
	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الوسط	الحد الأقصى
اجاص	١٠٠	—	١٢	—	٣٠	—	٥	—	٢	٠,٢٦	٢,٤٦	١٣
أكيدنيا	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,١٥	—	٢٣
انناس	١٦٠	—	١٠٠	—	٢٥	—	٢٠	—	١٥	—	—	—
بر بادريس	٤٠٠	٣٠٠	٩٠	—	١٠٠	—	١٠٠	—	٥٠	٠,٩٦	٦,٠٠	١٠
بنفق	—	—	—	—	٢٠٠	—	٣٠	—	١٠	—	—	—
بيلسان	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
تفاح	—	—	—	—	—	—	٢	—	٣٨	٠,٦٤	—	١٦
تمر	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٢٦	١٠,٥٥	٧٢
تين أخضر	—	١٠٠	—	٣٥	—	٥	٢	—	—	—	—	—
تين ناشف	—	٥٠	—	٢٥	—	—	—	—	—	١,٥٥	٢٨,٣٥	٥٨,٥٨
جوز ملازج	—	—	٤٥٠	—	١٥٠	—	٣٠	—	—	—	—	—
خوخ	١٥٠٠	—	١٠٠	٤٠	—	١٠	٥	—	٥	٠,٩٥	٦,٣٤	٧٦
خوخ مجفف	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٧٢	٢٢,٢٥	١٥
دراق	٢٠٠٠	٧٦٠	٩	٣	—	١٠	٥	—	٥	٠,٨١	٦,٥٦	١٣
زبيب	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٥٢	٢١,٨٥	٦٩
سفرجل	—	—	—	—	—	١٥	٥	—	٥	٠,٩٣	—	١٧
شوك القصار	—	—	—	—	—	٦٥٠	٤٥٠	—	—	—	—	—
عنب	—	٥٠	—	٧٥	—	٣٠	٣	٣	٢	٠,٧٧	٥,٣٦	١٧
عوسج	٨٠٠	—	٢٨٠	—	٣٠٠	—	١٤	—	١٠	—	—	—
غيراه الحابلين	—	—	—	—	—	—	٨٠	—	٢٠	—	—	—
غيراه برية	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	—	—	—	—
فوزان (فراولة)	٦٠	—	—	١٠٠	—	٥٠	٢٥	—	٢٥	١,٨٤	٤,٥٥	٨
قروص	—	—	—	—	—	—	٤٥	—	—	—	—	—
قام	٢	—	—	—	—	١٥	٥	—	٥	١,٩٨	٣,١٢	١٠
قام آسي	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	—	٢٨	—	١٠	—	١٠	٠,٨٥	—	١١
كرز	٦٠٠	—	٥٠٠	—	—	٥	١٠	—	١٠	٠,٦٨	٢,٧٤	١٤
كستناء	—	—	—	٩٠	—	—	٣٠	—	—	—	—	—
كشمش	—	—	—	—	—	٣٠	٢٥	—	٢٥	٢,٣٥	٦,٩٢	١٠
كشمش احمر	—	—	—	—	—	٥٠	٢٠	—	٢٠	١,٩٠	٤,٣٨	١٠
كشمش اسود	٥٠٠	٣٠٠	١٢	—	٦	٢٢٠	١٥٠	—	١٥٠	٢,٠٠	١٠,٧٤	١٥
لوز	—	—	—	—	—	—	٥	—	—	—	—	—
ليمون	—	٩٠	—	—	—	—	٥٠	—	٥٠	٣,٤٦	٦,٤٦	٧
مشمش	٢٠٠٠	—	٧٦٠	٩	٢	١٠	٥	—	٥	١,٢٧	٧,٥٠	١٢
مصمة (فرايمواز)	—	—	—	—	—	٢٥	٢٠	—	٢٠	١,٦٤	٦,٤٧	٩,٥
موز	٢٨٠	—	٢٥٠	—	٥٠	—	١٠	—	٣	٠,٢٦	٧,٥٦	١٨,٥
نسرين	—	٥٠٠٠	—	—	—	—	١٠٠٠	—	٤٠٠	—	—	—
يوسى (مندرلين)	—	—	—	١٠٠	—	٣٠	٢٠	—	٢٠	—	—	—



فيوتومه



فيوتومرا الحمايات



فيوتومرا المكروش



فيوتومرا غا



فيوتومرا مبقعة



فيوتومرا نحاسية



فيوتومه

٢١٢٥٦ - فيوتومسية \* (F). *Phytocaea* (S). *Phytécie* (F).  
جلس حشرات من فصيلة القرنيثيات أنواع عديدة جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل والزباني . طول اجسامها يراوح بين ٨ و ١٥ م . اقواها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر والاصفر || وهي تعيش على ازهار الحمصيات دون ان تؤذيها . اما يرقاتها فتركب السوق وتندثر عند جام الرية .

٢١٢٥٧ - فيوتومسجية (F). *Phytologie* (F). *Phytology* (E).  
الفيتولوجية علم يبحث في النبات ، راجع علم النبات .

٢١٢٥٨ - فيوتومسجرا \* (S). *Phytometra*, *Plusia* (S). *Phytometre* (F).  
جلس حشرات فراشية من فصيلة الليليات . انواعها عديدة . اجسامها مختلفة القد والالوان . قرونها الاستثمارية غليظة . واولاها الامامية مزركشة || انثاها اكبر حجما من ذكورها تنجح مكها افراديا على نصل الاوراق . يرقاتها قيامة تسطو على عدة نباتات بقلية وصناعية وزيينية . بعضها من القراشات القاطعة التي تجوب البلاد في طلب البيت والنبات المائل || اجيالها الحولية عديدة تراوح بين ٣ و ٥ || اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٥٩ - فيوتومسجرا الخمنانيات \* (S). *Phytometra pulchrina* (S).  
نوع من الفيتوميرا الابدية . متوسطة القد ، يسطها نحو ٥٠ م . صدرها الى الاجزوة الزاحية . يسطها الى السرة الحظيصة الصفراء المواج . واولاها سر الحنار || تظهر في لبنان من ايار الى حزيران وين آب الى ايلول ، اجيالها الحولية اربعة || يرقاتها تركب اوراق نباتات الفصيلة الحماية دون ان توقع بها شديدا الاذى .

٢١٢٦٠ - فيوتومسجرا المكروش \* (S). *Phytometra festucae*, *Plusia festucae* (S).  
نوع من الفيتوميرا الابدية . متوسطة القد . يسطها نحو ٤٠ م . ثوبا الى السرة الحظيصة . صدرها ابيض من يسطها . وروشاها الاماميان مجذمان بخطوط عابقة مستطيلة || تظهر في لبنان من حزيران الى ايلول . اجيالها الحولية اربعة . تعيش يرقاتها على النباتات النجيلية اغصانها المكروش والبطوط والسامد .

٢١٢٦١ - فيوتومسجرا عماما \* (S). *Phytometra gamma*, *Plusia gamma* (S). *Gamma*, *Noctuelle gamma* (F). *Silver y moth* (E). *Gammaleule*, *Ypsiloneule* (D).  
نوع من الفيتوميرا القاطعة . متوسطة القد طولا نحو ١٧ م . ويسطها ٤٠ م . ثوبا الى السرة البنية . صدرها ابيض من يسطها . وروشاها الاماميان بلون صدرها متمرضها خطوط سمير ويوجد على كل واحد منها عند اواخر زامه الاچدية علامة فارقة يبيض اللون تشبه سرف غا ثالث احرف الالچدية اليونانية || تظهر في لبنان من نيسان الى تشرين . اجيالها الحولية عديدة تراوح بين ٤ و ٥ || يرقاتها تجمد دقة و دودة غا || تركب اوراق مختلف البقول والنباتات الصناعية والزراينية .

٢١٢٦٢ - فيوتومسجرا مبقعة \* (S). *Phytometra ni*, *Plusia ni* (S).  
نوع من الفيتوميرا القاطعة . كبيرة القد ، يسطها نحو

٨٠ م . ثوبا متداخل الالوان . راسها وصدرها الى الشقار الحظي . يسطها الى الياس التي . وروشاها الاماميان بلون صدرها متمرضها توشح وتغطيط ويصل كل واحد منها بقبج قصي مستطيل . وروشاها الخلفيان بلون يسطها . تظهر في لبنان من ايار الى آب . اجيالها الحولية اربعة . يرقاتها تجمد تركب مختلف اوراق النباتات الزاحية والزراينية . اغصانها قليلة لا تستوجب المكافمة .

٢١٢٦٣ - فيوتومسجرا نحاسية \* (S). *Phytometra chalcites*, *Plusia chalcites* (S). *Phytometre cuivré* (F). *Phytometra chalcites* (E).  
حشرة مؤذية من فصيلة السفيقات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها غاشلة تعيش على اوراق النباتات البرية اغصانها الجذائجات وبها البتورة || جسمها شبه مردي الشكل يسطها نحو ١٥ م . يسطها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ م . راسها معتدل الحجم ، حطلي اللون ، اشقر الموج . عيناها زيتيخان ، ناشزاتان زباناها غليظتان . ملامسها صغيرة . مرقفتها معتدل اللون . جوشنها ويسطها الى الصخرة الحظيصة المواج || وروشاها الاماميان الى الصخرة تملوها زركشة سمراء وبقتجان متلاصقتان نحاسيتا اللون . وروشاها الخلفيان الى الصخرة الحظيصة السوية . اعداها الى الحظي الكلف || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان ||

الطور البرقي في ايلول الاول والثاني يستمر نحو ٣٨ يوما ويستمر في الجيل الثالث نحو ٢٠ اسبوعا || السرعة نحو اذراكها الكلال الجسوري طول نحو ٤٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، زبي اللون . حطلي الموج تملو ثلاثة خطوط لبيعية قاطعة وروشاها جانبيين جميعها متداخلة الاصفر والاصفر . راسها شديدة السرة . مذها ورواجها الى الحظي الاصفر || طور الكمال الذي يستمر في الجيلين الاول والثاني نحو ١٥ يوما . يستمر في الجيل الثالث نحو ثلاثة اسابيع وينتهي ضمن سلجة لتسجها السرة بين قفيان النبات المائل او تحت الاوراق الساقطة التي تلصق الرية .

٢١٢٦٤ - فيوتومسجرا \* (F). *Phyteuma* (S). *Raiponce*, *Raponce* (F). *Rampion* (E). *Lange Tenfelskralle* (D). *Raponzolo* (I).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقل وتزييني . جلورها وشية الشكل . اوراقها زراعية بسيطة ، القرصية منها مستطيلة الزناد ، كبيرة التصل اما الجمعية فمضرة . ازهارها هالية ، لياشمية التجميع ، يكثر فيها اللون الازرق . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٦٥ - فيوتومسجرا دبحية الورق (S). *Phyteuma scorzoneraefolium*, *Ph. betonicoefolium*, *Ph. Michelli* (S). *Raiponce de Micheli* (F).  
نوع من الفيتومه وهي عشبة بقلية برية تملو من ٤٠ الى ٧٠ م . جلورها وندي الشكل جامد المادة اللصبة للمأكولة البيضاء اللون . اوراقها القرصية شقيقة التصل ، قلبية القاعدة ، تشبه اوراق الدبع . ازهارها ليلكية اللون ، سلبية التجميع ، اسطوانية الترتيب ، ثنائية او ثلاثية السيات .

٢١٢٦٦ - فيوتومسجرا سلبكية ، عصا يعقوب (F). *Phyteuma spicatum* (S). *Raiponce en épi* (F).  
نوع من الفيتومه وهي عشبة بقلية برية عديدة القروب .

## \* ٢١٢٧٢ - فِتُونُومُ اسْوَدُ الْخِطِّ \*

Phytonomus nigrostris (S). Phytonome à rostre noir (F).



فيتون احمر الذنب

حشرة صغيرة اللون من فصيلة السويات طولها نحو ٤ م. لونها الى الخضار الداكن. خطمتها الى السرة القامقة. ريقها تتركب برامق وزهارا وارواق الغلاتيات على اختلاف انواعها فتؤذيها.

## \* ٢١٢٧٤ - فِتُونُومُ النَّقْلِ \*

Phytonomus zoilus, Ph. punctatus (S). Phytonome du trèfle (F). Clover bud weevil, Lesser clover leaf weevil (E). Schwarzzüseliger, Blattnager, Kleeblattnager (D).

حشرة من فصيلة السويات. طولها يراوح من ٧ الى ١٢ م. ريقها خضراء اللون يقلطها من الرأس الى الترحج خط ابيض كالثلج || وهي تتركب مع ريقها اوراق النفل قسرها وتوقع بها الاذى.



فيتونوم اسود الحظ

Phaetonidae (S). \* فِتُونِيَّات \* Phaetonidae (F). Phaetonidae (E).

فصيلة طير من كليات القدم، شملت الكف. مركها المري بين البجع والقطاير. اصحابها تتركبها من البجع وتقترب بيضها من القطاير || طيراتها سفيف متدل الارتفاع بعيد الشوط. قوتها الاسماك تصطادها بالنطس الى الماء كما يفعل العاق || انواعها المعروفة اربعة تنتمي الى جنس واحد يدعى فيتون.

Erection ٢١٢٧٦ - كَيْجَن هو الانتشار.

## \* ٢١٢٧٧ - فِتَجْرَة مَخْتُونَة \*

Pygera curtula (S). Pygère circoncise (F). Pygera curtula (E).



فيتونوم النفل

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها تميش على اوراق الحور والصفصاف || جسمها متوسط القد بطولي نحو ١٦ م. بسطها نحو ٣٦ م. رأسها اشهب اللون. عينها صفيرتان. زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر، عظيماني عند الانثى. جوشنها ويطعها الى الشبة || ريشها الالاميان الى الشبة يملؤها تمشيح حنطي وبقيعة بيضاء تتألفها اخرى طرية الى الربعة القلبية. ريشها الخلفيان الى البياض التبيي المواج. اهدابها تبتية || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتدح للمكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تقطع نحو ٣٤ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، فردي العمل السككية الجانبية. نوبها الى الخيطي الاسمر يملو خط لبيبي ناقص اسود وقسمه خطوط متعرجة تنتهي بالطاق حمر ترزق التمول. مدها ورواجها الى الطحلة السراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صليبة تحجبها السرة في شقوق حمار الحور او الصفصاف.



فيتورة عذرية

Rue (F). ٢١٢٧٨ - فِتْجَن هو الذباب، اطلبه.

جلدها وشعي الشكل، كبير القد، جامد المادة السمية المأكولة البيضاء اللون. ساقها قوية منتصبه جوفاء تملو من ٥٥ الى ١٠٠ م. اوراقها القرمزية بيضية الشكل، قليلة القاعدة، كبيرة التصل، مأكولة، طعمها يشبه طعم البندق. ازهارها متبيلة التجميع، كبيرة القد. لونها يختلف باختلاف الضروب فيها الاغبر والسمنجوني والازرق على اختلاف مجاماته. جميعها ثنائية السات.

## \* ٢١٢٦٧ - فِتُونَة مِدَوْرَة \*

Phyteuma orbiculare (S). Ralponce orbiculaire (F). نوع من الفيتونه وهي عشية برية ورتيبية تملو من ١٥ الى ٥٠ م. اوراقها القرمزية مستطيلة الزناد، بيضية التصل التلق الزام الانير. ازهارها حلقية التجميع، ثلاثية السات، لونها الى الزرقاء الداكنة || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول.

## \* ٢١٢٦٨ - فِتُونَة وَصِيْمَة ، لَفْت بَرِي \*

Phyteums humile (S). Ralponce naine (F). نوع من الفيتونه وهي عشية برية ورتيبية صغيرة القد تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها القرمزية صفحية الشكل. ازهارها حلقية التجميع، بنفسجية اللون، علفها يحمل من ١٢ الى ١٥ زهرة || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## \* ٢١٢٦٩ - فِتُونُومُ الْبَهْش \*

هي لاعة البهشية، الملبها.

## \* ٢١٢٧٠ - فِتُونُومُ قَرْنَة \*

هي لاعة الكرزيتم، الملبها.

٢١٢٧١ - فِتُون، طائر المَقَالِب \* Phaeton (S). Phaéton, Oiseau des tropiques, Paille-en-queue (F). Phaeton (E).

جنس طير من فصيلة الفيتونيات. انواعه المعروفة اربعة. اعطائها مجامح البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها متصلة القد. مناقيد جالسة، مسنفة الحامل. اجنتها كبيرة، ذلقة. اذناها مستطيلة المزال. ارسافها قصيرة. حطاب اصحابها شامل الكفاف || اعرف انواعه واشهرها الفيتون الاخر الذنب.

## \* ٢١٢٧٢ - فِتُونُ أَحْمَرُ الذَنْب \*

Phaeton rubricauda (S). Phaéton à queue rouge (F).

طائر من الفيتون. طوله الكامل نحو ٩٠ م. منها نحو ٥٠ م. للزان. ثوبه متراكب الالوان الهلجنة والرموشة، فيها الابيض والوردي والبرجاني والاحمر والاسود. ذنبه احمر اللون. مناقده مرجاني. صدقة عينه كستيتية. ريشه واصابعه حمر. حطابه احمر الانتشاب والازم الاول، اسود الباقى || اعطانه تشتمل معظم مجامح البلاد الاستوائية من العالم القديم. يالئ الموامع الصيفية الثانية. قوته الاسماك ينقض عليها. كاسهم ويغسطس في طلبها على غرق عدة اقدام || يدفن عشه، غالباً، في الفحوس يديره بين الصغور وقد يدفن أيضاً في الاشجار الداسية. انشاء قنص بيضة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو اربعة اسابيع.

Turquoise (F). ٢١٢٨٨ - فَيْرُوزُ ، فَيْرُوزُجْ

حجر نَينِ اَزْرَقِ الدِّينِ .

Virus ٢١٢٨٩ - فَيْرُوسْ

هو الفيرس ، اطلبه .

٢١٢٩٠ - فَيْرُولِيْتِ ٥ ، مَيْرُولُ ٥

Férolite, Mésolo (F).

سيليكات مركب من الالومنيوم والكلسيوم والصوديوم ونحو ٤٪ من السيليوس .

٢١٢٩١ - فَيْرُولِيْتِ ٥ ، نُفَاقِ الْفِيلِ

Feronia (S). Féronie, F. de l'Inde (F). Wood apple, Elephant apple tree (E). Elephanapfel (D). Feronia, Pomo d'elefante (I).

جنس اشجار برية مشمرة من فصيلة البرتقاليات . انواعه قليلة العدد جميعها شجيرات شائكة . اعطائها الهند وسرنديب واللاوس . ثمارها كروية الشكل حجمها حجم البرتقال . قشورها غليظة ليفية جامدة . لبها ردي اللون ، طعمه مزيج من الحلاوة والحامضة الحامضة .

Veronica (S). Véronique (F). ٢١٢٩٢ - فَيْرُونِيكا

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها عديدة منها العشبية الحولية والمعمرة ومنها الجنبات الليفية والخشوشية ومنها الاشجار التي يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم . اوراقها واغصانها لاقطبية الاشكال والارتكاز || اوراق انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٢٩٣ - فَيْرُونِيكا اَنْثَى ٥ ، لِنَارِيَةِ حَرْشَاءِ

Veronica teucrium, V. chamaedrys (S). Véronique germandrée, V. femelle, V. bâtarde (F). German-spedwell, Wild germander (E). Gemander-Ehrenpreis (D). Veronica piccola quercia, V. femina (I).

نوع من الفيرونيكاهي عشبة تربينية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقها منتصب . اوراقها متعقبة متقابلة ، نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة الزباء . ازهارها عشوية تنجم ، محورية الارتكاز ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٢٩٤ - فَيْرُونِيكا بَهْشِيَةِ الْوَرَقِ ٥

Veronica buxifolia (S). Véronique à feuilles de buis (F).

نوع من الفيرونيكاهي جنية تربينية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصب ، فرووها دقيقة جالسة ، اوراقها بهشية الشكل ، نصلها جامد الصفحة اللامعة . ازهارها سلبية التنجم ، تاجية الارتكاز ، بيضاء اللون او وردية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢١٢٩٥ - فَيْرُونِيكا حَبَقِ الْحَمَى ٥ ، فُونْتَجْ مَصْرِي

Veronica anagalis aquatica (S). Véronique d'eau (F). Water speedwell (E). Wasser Ehrenpreis (D). Veronica aquatica (I).

نوع من الفيرونيكاهي عشبة برية طيبة معمرة تعيش في الشامق وصل جوانب الاودية وجاري الماء ، تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متعقبة لسنة ، نصلها خلي البشرة متبادع التنسين المستدير ازهارها الى الزرقاء . الليفية .

Rue d'Alep (F). ٢١٢٧٩ - فَيْجَنْ حَلْبِي

هو الذئب السوري ، اطلبه .

Rue officinale (F). ٢١٢٨٠ - فَيْجَنْ تَنْ

هو الذئب الفزني ، اطلبه .

Rutine (F). Rutin (E). ٢١٢٨١ - فَيْجَنْ

الفيجنين او الحامض الفيجني ، غلوكوزيد تربى اللون يوجد في الفيجين اي الذئب وفي عدة نباتات اخرى اخصها الكبر والورد .

Feuilles de safran (F). ٢١٢٨٢ - فَيْدْ

Leaves of saffron (E). هو ورق الزعفران .

٢١٢٨٣ - فَيْدْ اَلِيَه

هي بنت العبد الكردنالية ، اطلها .

٢١٢٨٤ - فَيْدْ اَلِيَه كَرْدِيَالِيَه

Novius cardinal (F).

حشرة تدعى نفويس كردنالي ، اطلها .

٢١٢٨٥ - فَيْدْ اَلِيَه خَدِيْمَه ٥ ، بِيْكِرَه

خَدِيْمَه ٥

Fidonia famula, Bichroma famula (S).

Fidonie servante (F). Bichroma famula (E).

حشرة من فصيلة الايفيات ودتية حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها واشعة قوتها مفر الازهار . سرتها تعيش على اوراق الزوال وازهاره || جسمها نحيل ضئيف بطول نحو ١٠ م . يستلها نحو ٣١ م . رأسها اكهب اللون اصهب المولج . عيناها صغيرتان . زباناها شطيان عند الذكر ، غليظتان عند الانثى . جوشنها ويطها الى الكهبة || راشتها عند التفتين الى الكهبة الصفراء المولج يطها في الزوج الاسامي تفتيح وتجميع وزرقة ودرقة كستية اللون . ويطها في الزوج الخلفي شمة حنطية وضلعان متعرضان مقويان كستية اللون . اهداها الى الحنطية الاشجع || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتفتح المكان ميساديا على الصفحات السفلى من نعال الاوراق || السرقة تطول نحو ٢٣ م . جسمها مردوي الشكل مستفخم الرأس والمقدّم . ثوبها يماثل البيت التي تعيش فيها وهي يراوح بين الاخضر والاصفر . رأسها الى السرة . رواجها البنية الوسطى ماصة ما يجملها تنقص عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجالة اوبين فروع النبات ضمن صلبة متبدلة الجلك .

٢١٢٨٦ - فَيْرُوسْ ، فَيْرُوسْ ، فَيْرُوسْ ، فَيْرُوسْ

Virus

ج- فيروس وبولوس . هي اصول بعض الامراض الاوصام الجرثوية التي لم يتمكن العلم ، حتى الآن ، من تحديده اشكالها الا بواسطة المجهر الالكتروني . وهي كانتات حية ميكروية الحجم اي متناهية الصغر ، عديدة الاشكال القفصية ، كثيرة الاذى ، مستنصبة على كل علاج .

٢١٢٨٧ - فَيْرُوسِي

Viral (F).

نعت تدريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى الفيرس .



فيدونية عدية



فيرولية



فيرونيكاهي



فيرونيكاهي بهشية الورق



فيرونيكاهي حبق المي

٢١٣٠٣ - فيرونيكا معزّوية\* ، تيلاب التجوس  
Veronica officinalis (S). Véronique officinale, V. mâle, Thé d'Europe (F). Common speedwell, Medicinal tea speedwell (E). Echter Ehrenpreis, Speedwelltea (D). Veronica officinale, Thé d'Europe, Quadermuzzo (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. تأثت الأجزاء والمواقع الظليلة الرطبة. أوراقها لينة مستطبة العرف تستعمل استعمال الشاي وهي عديدة المنافع الصحية، تنيد الصدر والقلب || أثمارها سنبلية التجميع || زرقاء اللون. ساقها منطوية الحجم، كثيفة الأجزاء.

٢١٣٠٤ - فيزبود التسع\* ، فيز بود التسع\*  
Physopis nicotianae (S). Physopode du tabac (F). نوع من الترييس، حشرته تملو نحو ٢ م. لها اليمرة السرة الحظية السوداء الموح. تركب النبات تنفطح الخشب وتمتص السخ وعصاره أخلايا وتسبب ما يصنعونه مرض القرق الأبيض || الذكر عادم الاجنحة. البرقة صفراء اللون تملو من ١ إلى ٢ م. راجع ترييس وقرق أبيض.

٢١٣٠٥ - فيزود\*  
Physa (S). Physa (F). Physa (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مديات الأرجل وقصيلة الفيزيات. أنواعه المرفوعة المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم انهر العالم وينتاجه وينتاقه. فتيها النباتات المائية || أصدافها محزنة، صغيرة، رقيقة، مائلة، شفافة، شفافة الوب. أجسامها أهليجية ليلية، رؤوسها واضحة. لوامسها مستطيلة مبطلة. أرجلها وحيدة، مستديرة المقدم، ذلقة المؤخر، عادمة السقاط.

٢١٣٠٦ - فيزود  
Imperméable (F). Impermeable, Impervious (E). أرض فيزلة : سريمة السيل إذا أصابها الفيت.

٢١٣٠٧ - فيزكوس\*  
Physalus (S). Physale, Physalie (F). جنس عضاء من المثعبيات وقصيلة الفيزولويات. أنواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم مجار العالم || مستمراتها تلو كشلة من الألياف بنفسجية اللون وتوهها غلاف قابل للتديد، أروسي الشكل عند الانتفاخ فوق سطح الماء حيث يتوسع مع الريح أينا يشاء.

٢١٣٠٨ - فيزكوسيات\*  
Physalidae (S). Physalidés (F). Physalidae (E). فصيلة من العضاهيات المثعبيات البحرية. أنواعها المرفوعة تحة تتجمع إلى جنين الفيزولوس والمرفوز.

٢١٣٠٩ - فيزوكرب\*  
Physocarpus (S). Physocarbe (F). Physocarpus (E). جنس شجيرات معمرة من فصيلة الورديات. سؤفا منصبة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقها متعاقبة، معققة، عابدة، مفصصة ومنسدة الأطراف. أثمارها غنية التجميع، مختلفة الألوان || تزود للزئين في الخلاق. ترغب في الأثرية المعتدلة الانسجام || المنسوبة التركيب المنعري، الوافرة المواد الغذائية || أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

٢١٣١١ - فيرونيكا سرّوية

Veronica cupressoides (S). Véronique cyprès (F). نوع من الفيرونيكا وهي جنبة سرّوية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها مستطبة. فروعها دقيقة. أوراقها حرشفية تملو نحو ٢ م. أثمارها سنبلية التجميع، هابة الارتكاز، صفيرة اللد، ليلكية اللون || أثمارها يستمر طوال الصيف.

٢١٣١٧ - فيرونيكا سنبلية\*  
Veronica spicata (S). Véronique en épi (F). نوع من الفيرونيكا وهي بلجة تريينية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها معققة متعاقبة، نصلها أهليجي الشكل، منن الحافة، مدبب المقص. نورها سنبلية التجميع مستطيلة السلة الوسيدة. أثمارها كبيرة اللد وردية اللون || أثمارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٣١٨ - فيرونيكا شرقية\*  
Veronica orientalis (S). Véronique orientale (F). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تريينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. ساقها ملتوية الطرف. أوراقها ضيقة النصل المفروض والمنسن. أثمارها ليلكية أو وردية اللون، عنقودية التجميع، محورية الارتكاز، كؤوسها حشاية الفص. أثمارها يستمر من تموز إلى آب.

٢١٣١٩ - فيرونيكا صفراء\*  
Veronica lutea (S). Véronique jaune (F). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تريينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها يضيئة الشكل. نصلها منن الحافة ذات الزام الأتير. أثمارها عنقودية التجميع، صفراء اللون، مسخنة البلات العليا || أثمارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢١٣٢٠ - فيرونيكا عيش القلق\*  
Veronica anagaloïdes (S). Véronique des sables (F). Speedwell (E). Ehrenpreis (D). Veronica mucronata (I). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية طيبة معمرة منبها الأثرية الرملية. ساقها خشوية تحيلة. أوراقها صفيرة اللد، أهليجية الشكل، زباء النصل. أثمارها عنقودية التجميع || زرقاء اللون، بحرية الموح.

٢١٣٢١ - فيرونيكا غشيرة\*  
Veronica incana (S). Véronique blanchâtre (F). نوع من الفيرونيكا وهي بلجة تريينية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٧٠ سم. فروعها مزنية اللحاء. أوراقها معققة متعاقبة، نصلها ساني الشكل، منن الحافة، خلي البشرة على صفحتها، يلو كانه أغير اللون || أثمارها سنبلية التجميع، زرقاء اللون. أثمارها وحيد السلة يستمر من حزيران إلى تموز.

٢١٣٢٢ - فيرونيكا قرّة العين\*  
Veronica beccabunga (S). Véronique cressonnée, Beccabunga, Cressonnière, Cresson de cheval (F). Brooklime, Water pimpernel (E). Bachbunge Ehrenpreis (D). Bacabunga, Veronica cressone (I). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. تعيش في المنافع وعلى جوانب مجاري الماء. أوراقها صفيرة اللد، يضيئة الشكل || نصلها مائل البشرة، شديد الخضار. أثمارها صفيرة اللد ليلكية اللون، سنبلية التجميع || أوراقها مأكولة غشراء وطيوة.



فيرونيكا سنبلية      فيرونيكا عيش القلق



فيرونيكا قرّة العين      فيرونيكا غشيرة



فيز بود التسع



فيزة



فيزولوس

٢١٣١٠ - **فَيْزُوكَرْبُ الْفُلُوسِيِّ الْوَرَقِي**

Physocarpus opulifolia (S).

Physocarpe à feuilles d'obier (F).

خسة خطوط جزؤية قاطبة ، رأسها اسود . مدها ورواجها الى الحطلي || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع ينقضي ضمن صلبة تنسجها السرفة بين قشور الصنوبر .

٢١٣١٧ - **فَيْشَرَّة**

Fischæria (S).

Fischérie (F). Fischæria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم والاربل ومن فصيلة السبرينات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جميع بحيرات وأهر افريقية الشمالية || اصداها صغيرة القد ، شبه قلسوسية الشكل ، متساوية المصاريخ ، لامتساوية الاضلاع . مثاعها ثنائية ، بليلة صغيرة || تعيش في الاسمال . لحومها مأكولة مبتذلة الصنف .

٢١٣١٨ - **فَيْشَلَّة**

Gul (F).

هي الهدال ، ج. فيائل .

٢١٣١٩ - **فَيْسَم**

Sporobolus (S). Sporobole (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة .

٢١٣٢٠ - **فَيْسَمَة**

Nemestrina (S).

Némestrine (F). Nemestrina (E).

جنس حشرات من فصيلة القمصيات ورؤية ذوات الجناحين انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الافريقية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٦ م. رؤوسها مستعرجة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستعمارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . ملابسها نحيلة . اضطلامها شديدة الطول . كواسلها كثيفة الخمل . بطونها بارزة الحيد السكبي . الاطبا مبرقشة . رواشها شفافة . قواعها نشطة || جميعها واثمة تألفت الغابات والمواقع التي تكثر فيها الازهار . يرقاتها واثمة او طفيلية ، تنطفل على المفصليات .

٢١٣٢١ - **فَيْسَمِيَّات**

Nemestrinidae (S).

Némestrinidés (F). Nemestrinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة والحرارة . تألفت الغابات والرياض والمروج في زمن الازهار || اجسامها ضخمة ، شبه يبيضة الشكل ، تطول من ١٧ الى ٣٦ م. رؤوسها مستعرجة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستعمارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . اضطلامها متباينة الجرم منها الصغيرة ومنها الكبيرة المستطيلة . ملابسها نحيلة او ضامرة . كواسلها كثيفة الملب . بطونها بيضاء اسطوانية ، مقلوبة الخرش . رواشها شفافة || يرقاتها خاضعة ، دودية الشكل || اشهر اجناسها القيصمة والولانة .

٢١٣٢٢ - **فَيْض**

Plus-value (F).

Increase In value, Increment (E).

هو الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الشيء بين تقديرين يختلف زمانها . وهو أيضاً زيادة ما يستحقه الشيء من الثمن بيماء او تقديراً .

٢١٣٢٣ - **فَيْض ، طَفَح**

Débordement, Crue (F). Overflowing, Rising (E).

هو ازدياد المياه في الأنهر وارتفاعها عن مستواها المألوف .

نوع من الفيزوكرب . موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية . ساقه تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقه ثلاثية او خاسية القمصوس ، خلية الصفحات العليا ، مرطاة السفلى . ازهارها على التجميع . ازهاره يضاء اللون او ودية || تنويره يستمر من حزيران الى تموز

Physique (F). Physics (E).

٢١٣١١ - **فَيْزِيَاء**

علم الطبيعة او الطبييات .

Physidae (S).

Physidés (F). Physidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات معديات الاربل ورؤية الرخويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد معظمها من متحجرات الطبقة الجبورية . اما الانواع المعاصرة فنشتر في معظم انهر العالم وبحيراته وسناقه . قوتها النباتات المائية || اصداها صغيرة ، رقيقة ، لماعة ، شفافة ، محزنة . شفافه الوبل || اعرف اجناسها المعاصرة الفيرة .

Biophysique (F).

٢١٣١٢ - **فَيْزِيَّات**

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة . راجع فيزيوفياء .

Physiologie (F).

٢١٣١٤ - **فَيْزِيُولُوجِيَة**

هي الفيزيولوجية ، المطلبها .

٢١٣١٥ - **فَيْسُتُولِيَّات \* ، فُطَر الكبد**

Fistulina hepatica (F). Fistuline, Fistule hépatique, Foie de bœuf (F).

فطر مأكول من فصيلة السميات يركب جلود بعض الاشجار الحرجية في المواقع الظليلة الرطبة . وهو كبير القد ، كبدى الشكل والحمى ، حنطى اللون ، اسمر القاعدة ، عابق الركيزة المتبقية . اغراسه زهيدة لا تستحق الاهتمام .

٢١٣١٦ - **فَيْسِيَّة بَاهِرَة**

Phycita splendida (S).

Phycite splendide (F). Phycita splendide (E).

حشرة من فصيلة التاريات ورؤية حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم مناطق اوروبية المعتدلة الحرارة . فراشها واثمة قوتها رقيق الازهار واطلمها . سرقتها قرضابة تموش تحت طاء الصنوبر وتخلج الشكير قنصب سيلان الرائحة || جسمها يطول نحو ١٢ م. بسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م. رأسها صغير الجرم . والظفر . عيناها ينجمتان ، ماصتان . زباناها خطيطان . ملابسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الكسني الاشقر المراج || درشاها الاماميان الى السرة الكنتية يعلوها تبقيع ابيض وراكنش غرام . درشاها الخلفيان الى الطلحة يعلوها تمشيع كسني يكتنف الاعصاب وقاعدة الخنار الخارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط نيسان تسرح في الليل وتستنكس في النهار || الانثى تلقي المكن ميحادي بين شقوق اللحاء وتحت القشور . الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٥ م. جسمها بين التقسيم السكبي ، بني اللون تملو



فيسولينا



فيسمة



## ٢١٣٢٤ - فَيْصَان

Inondation (F).

Inundation, Flood (E).

غمر المياه الطافية لبلاد او مكان ما .

## ٢١٣٢٥ - فَيْصَم

Leptodermis (S).

Leptoderme (F).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المروقة قليلة . سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . قروصها مفصلة متعاقبة الاذنكاز . اوراقها ابيدة معتقة متعاقبة ، نصلها سائي الشكل خلى البشرة على صفحتيه . اضعارها انبوبية التوزيع ، رويحية التجميع ، يبيض اللون او زرقاء او بنفسجية .

## ٢١٣٢٦ - فَيْصَن ، قَرْقُ

Gloussment (F).

Clucking, Cluck (of hen) (E).

القيق : صوت الدجاج .

## ٢١٣٢٧ - فَيْصَل \* .

Figulus (S), Figule (F).

جنس نخافس من غديات الاجنحة صفحيةا القرون وفضيلة المتظويات . انواعه المروقة نحو ٢٠ اعطائها البلاد الحارة والاشترائية من العالم القديم || جميعها حرسية تعيش في الغابات على الاشعاب الشجرة اوتواها الى الشجعة الغمام او الكعبة السمراء السماء . يرقاها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، صلبة ، كستنية اللون . قويا المواد الخشبية السائرة الى الاحلال .

## ٢١٣٢٨ - فيكتوريا رجيا \* ، ذُرَّةُ الْمَاءِ

Victoria regia (S), Victoria (F). Giant water lily (E). Seekönigin (D), Victoria (I).

جنس نباتات مائية من فصيلة اليلوفاريات . اعطائها مياه مجرات البلاد الحارة والاشترائية || اوراقها مستديرة ، نصلها جاذب الصفة ، صاجي الشكل ، مكثف الحافة ، قطر يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . وهو ينفق على وجه الماء وراطله زناد ليبي التسج اسطواني الشكل يطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . || اضعارها كبيرة الحجم ، عديدة البتلات . بتلاتها بنفسجية القاعدة ، قرمزية الزام الاول ، يرقاها الثاني ، يبيض الثالث والرابع . ثمارها كروية ضخمة شائكة . بزورها نشوية مأكولة ولذا يدعونها ذرة الماء .

## ٢١٣٢٩ - فَيْكُس ، فَيْكُونُس

Ficus

هو البهب ، اطلبه .

## ٢١٣٣٠ - فَيْيل

Elephas (S).

Éléphant (F), Elephant (E).

ج. افيال وفيول وفيلة . كنيته ابو الحماج وابو الحرمان وابو غفل وابو كلدم وابو مزمار . الاثني فيلة ويعبوس كنيتهما ام شبل || القليل جنس حيوانات ضخمة لبونة من فصيلة الفيليات ورتبة الخرطوميات || جسمه مستدل للقول مغرط البتانة يرتكز على اربع قوائم غليظة عمودية الشكل . رأسه كبير ضخم . عيناه صغيرتان ، اذنان كبيرتان مروجيتان . خرطوميه جرم اللد ، بالغ الطول يلبس الربة . ناباه مستطيلتان ثخنتان مقوستان || والليل يبيض نحو ١٥٠ سنة وهو يبلغ كامل نشاطه بمر ٢٥ سنة . محبل الاثني يدم ٢٢ شهراً تقص في نهايته دغلاً واحداً وزنه نحو ١٠٠ كيلو . اعطائه البلاد الحارة يالاف الاحراج والمناطق الرطبة . قوته الاشعاب والجذور والثار يلتقطها بخرطوميه ويدخلها الى

فه يفسنها ويبتلعها || والليل يسرح في طلب القوت من الساعة الثالثة صباحاً الى الساعة التاسعة ثم يرقد على الخفيض كسائر الحيوانات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر فيقوم ويسرح عن جديد حتى انتصاف الليل حيث يرقد من جديد الى الساعة الثالثة صباحاً . وهو يثرب مرتين في اليوم ، الاول عند شروق الشمس والثانية قبل الغيب اما وجبته اليومية من القوت فتراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو || انواعه الثتان الهندي والافريقي .

## ٢١٣٣١ - فَيْيل افريقي \* .

Elephas africanus (S).

Éléphant d'Afrique (F), African elephant (E).

نوع من الفيل موطنه يمتد من غربي وجنوبي الصحراء الكبرى الى بلاد الحيف . وهو اكبر واضخم حيوان ارضي يعيش الآن . يملو من ٣ الى ٤ امتار . محيط بطنه يراوح بين ٧ و ٨ امتار . وزنه يراوح بين ٤٥٠٠ و ٥٥٠٠ كيلو اما ناباه فتراوح من ٧٠ الى ٩٠ كيلو .

## ٢١٣٣٢ - فَيْيل الْبَحْرِ

Éléphant de mer (F).

هو الفقد ، اطلبه .

## ٢١٣٣٣ - فَيْيل هندي \*

Elephas indicus (S).

Éléphant d'Asie, E.de l'Inde (F), Indian elephant (E).

نوع من الفيل موطنه اسراج الهند والاصام وبرمانيه والسيام والكوششين وملقه ... وهو عظيم الجفة جسمها يملو من ٢٧٠ الى ٣٦٠ سم . طوله يراوح من ٧ الى ٨ امتار بما فيه الخرطوم والذنب . وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو وكل واحدة من نابيه تزن من ٢٠ الى ٤٠ كيلو . والفيل الهندي مشهور بحسن الخلق واتباس القلب . وهو يستعمل في اثق الاعمال واضعها يقوم بها غير قيام . اما الفيل الايش فهو من ذات النوع انما اصيب بالاحساب اي باتدمار المادة للملوة في الجلة .

## ٢١٣٣٤ - فَيْيلادْفُوس

Philadelphus

نبات من السرفسيات يعرف بالسرجة ، اطلبه .

## ٢١٣٣٥ - فَيْيلارِيَه

Filaire (F).

هي الهادية ، اطلبه .

## ٢١٣٣٦ - فَيْيلارِيوز

Filarirose (F), Filariasis (E).

دويدات تصيب نسج الانسان والحيوان سببا وصول يويضات الهذاب الى الجسم اما بطريق الفم او عن طريق الجرح وما اشبه .

## ٢١٣٣٧ - فَيْيلَة الْبَحْرِ

هي الفليات ، اطلبه .

## ٢١٣٣٨ - فَيْيلَجَمَة

Cocon (F).

هي الصلجة ، اطلبه .

## ٢١٣٣٩ - فَيْيلَجُوس

Arum (F).

هو الزراق الايش ، اطلبه .

## ٢١٣٤٠ - فَيْيلَكُورَه

Phyllachora (F).

هي التبيكة ، اطلبه .

## ٢١٣٤١ - فَيْيلو تَرَاة

Altise des crucifères (F).

هي الخدوش ، اطلبه .

## ٢١٣٤٢ - فَيْيلوْلُكُيت

هو كهذب الزيتين ، اطلبه .



فيل



فيكتوريا رجيا



فيل افريقي



فيل هندي

## ٢١٣٤٨ - فيلوكسيرة الوزال ° *Phylus genistae* (S).

*Phylus des genêts* (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الفصميجيات. جسمها صغير يطول نحو ٥ مم. ثوبها كثيف اللون يعلو تمسحج أبيض وتنتفخ اسمر. رأسها عرجم، صغير خطمها مستدل الطول. عيناها صغيرتان، بارزتان. زباناها دقيقان. كسيتان. كسلها يرمي الشكل. حبيبتها صغيرة. ظهراتها لاحف، مستطيلة الخنجية الدققة. بطنها ومدها الى الخلف الاسمر || تألف البراري والمواقع الدغلة. يكثر وجودها على الوزال.

## ٢١٣٤٩ - فيلوكسيرة، فيلوكسيرة ° *Phylloxera* (S).

*Phylloxera* (F). *Phylloxera* (E).

جنس حشرات صغيرة القد وبعضها مجهرية من فصيلة الارقيات ورتبة متجانسات الاجنحة || انواعها عديدة جميعها مؤذية انما اضرها واشدها اذى فيلوكسيرة الكرمة.

## ٢١٣٥٠ - فيلوكسيرة السندبان ° *Phylloxera quercus*, *Ph. coccinea* (S).

*Phylloxera quercus*, *Ph. coccinea* (S). *Phylloxéra du chêne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة حرام اللون صغيرة القد تطول نحو ١ مم. تركب اوراق السندبان فتؤذيها. مظهرها الخارجي بقع صفر لاقية الانتظام تملو نصل الارقاق فتذبلها وتقصي عليها.

## ٢١٣٥١ - فيلوكسيرة الصقاصف ° *Phylloxera salicis* (S).

*Phylloxera salicis* (S). *Phylloxéra des saules* (F). نوع من الفيلوكسيرة صغيرة القد طولها نحو ١ مم. لونها الى السمرة تعيش ضمن جوالج شجيرة المادة تدقية الشكل كالغفلن تركز عند ابط الاناث والبرام والارقاق. تقتصر التسع من الاربعة الشبكية وتؤدي النبات وتضيقه.

## ٢١٣٥٢ - فيلوكسيرة الكرمة ° *Phylloxera vastatrix*, *Rhizaphis vastatrix*, *Peritymbia vitifolia*, *Pemphigus vitifoliae*, *Xerampelus vastator*, *Dactylospora vitifoliae* (S).

*Phylloxera vastatrix*, *Rhizaphis vastatrix*, *Peritymbia vitifolia*, *Pemphigus vitifoliae*, *Xerampelus vastator*, *Dactylospora vitifoliae* (S). *Phylloxéra de la vigne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة وهي حشرة صغيرة القد، رابعة الاشكال تتميز بالفوارق التالية : الشكل الاول يشمل الفيلوكسيرة الفصمية وهي معارة، لاشقية، مستطيلة المنك التائب تعيش على الارقاق || الشكل الثاني يشمل الفيلوكسيرة الجذرية وهي معارة، لاشقية، مستطيلة المنك التائب تعيش على الجذور || الشكل الثالث يشمل الفيلوكسيرة الخنجية وهي لاشقية مستطيلة المنك التائب تعيش على الارقاق وفي التربة حتى اصلاحها الاخير ثم تخرج وتطير || الشكل الرابع يشمل الفيلوكسيرة الشقية ذات الاعضاء التناسلية الكاملة وهي عادمة الجناح والمنك.

كيفية تطور الحشرة - ينبت بالانثى الحقة التي تمتع مكنة واحدة في ايلول تدعى مكنة الشتاء تمتع على اثرها. ومكنتها هذه اسطوانية الشكل زيتونية اللون، تكاد لاتكون منظورة، طولها ٢٥٠ مي. وعرضها ١٢٠ مي. تلتقيها عنقها في احدى طيات القشرة تنبت على حائلها حتى الربيع حيث يتحول لونها الى الاصفر ثم يعقبه التلف الذي يتم في نيسان. فاعشرة اذا تقضي الشتاء ككنة ثم تنبت في الربيع فينبعث عنها اما الفصمية التي تتسلق الساق والفروع الى ان تستقر على الارقاق او الجذرية التي تغور في التربة حتى مستوى الجذور والجذيرات.

## ٢١٣٤٩ - فيلن الأذغال ° *Philaenus spumarius* (S).

*Philaenus des buissons* (F).

حشرة من فصيلة السروكيات. جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ١٠ مم. ثوبها مختلط السواد والصفرة || رأسها نصف دائري الشكل، اصفر اللون. خطمها ثلاثي الاجزاء. عيناها كبيرتان. زباناها قصيران. كسلها اصفر اللون، اسود في الزايم الاخير. حبيبتها مزوانية. ظهراتها كامل الخنجية، لاحف، اسود اللون، اصفر الحمار. ريشاتها خضائيان، شفافان، بطنها شديد السمرة، اصفر الحيد. قوائمها الى السمرة || يكثر وجودها في البراري الدغلة وعلى السياجات الحية. قوتها ناع الاوراق.



فيلنوس السنانيير

## ٢١٣٤٨ - فيلنتسوس ° *Phyllanthus* (S).

*Phyllanthus* (F). *Phyllanthus*, *Tipsy-wood* (E). *Blattblume* (D). *Filanto* (I).

جنس اشجار وجنيات برية ورتبية من فصيلة السويبيات. اوراقها معتقة متعاقبة، نصلها بيضي الشكل جامد الصلصة. ازهارها صغيرة القد، فردية التجميع، ابطية الارتكاز، سداسية البتلات، ثلاثية الفصل والاسدية || انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ جميعها استوائية المنبت، معظمها بري وبعضها تربيته ومنها انواع طيبة تغيد السيلان وغيرها تنفرد الاصباح تستعمل في تدويغ السمك لاصطياده.

## ٢١٣٤٥ - فيلنتسوس السنانيير \*، أمليج ° *Phyllanthus emblica* (S).

*Phyllanthus emblica* (S). *Emblique officinale*, *Myrobalan emblic* (F). *Emblie-myrobalan* (E). *Grane myrobalane*, *Myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano emblica* (I).

شجيرة برية من البتيويات قريبة الشبه من الفيلنتسوس منبها الهند، تستعمل في الطب لمعالجة الزرقه.



فيلوريس

## ٢١٣٤٦ - فيلوبوتاميات ° *Philopotamidae* (S).

*Philopotamidae* (F). *Philopotamidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتلة الحرارة اغصها الجبال حيث الغابات وجداول الماء || اجسامها بيانية الخجرج، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ الى ٣٦ مم. اجنحتها شديدة السمرة يعلوها بقعيج مذهب. جميعها اسود اللون. رؤوسها وصلودها مشاة هلب اصفر تطير في النهار. طيراتها قصير الشوط، سريع الحركة || اساريها مفترسة، طليقة، تعيش في المياه الجارية. تصنع شبكا قوية الشكل لتلتقط فيها فرائسها.


اشهر اجناسها :

*Philopotamus* (S).

*Chimarra* (S).

الفيلوبوتاموس

الشماره



فيلوكسيرة الكرمة

## ٢١٣٤٧ - فيلوريسيس ° *Phyllornis* (S).

*Phyllornis* (F).

جنس طير من الجرام شرومات المتأثير وفصيلة الكيميتيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلحوا يمتد من الهند الى جزر الزايج || اجسامها تشبه البليل بهامت وشكله. اثوابها ملونة زاهرة الخضاب || جميعها غريضة، تألف حياة الاقر وتقتبس الاغان وترددها.



فيلمون

**الفصية -** تبلغ كامل نموها بعد الانسلاخ الثالث فيكون طولها اذا ذاك نحو ١٢٥٠ م. فتتخرج فصل الورقة الذي يرتفع كالقصبة ثم تستقر فيه ، اي داخل القصبة ، وتنتح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة تنقف بعد متنها بوضعة ايام . ثم يخرج الجبل الجديد من محضته سميأ وراء القوت واستمرار التسلف فيبلغ كامل نمو بعد الانسلاخ الثالث ويبدى عمل امه كما سبق ذكرنا . اجيالها الموسمية الربيعية والمصيفية تراوح بين ٥ و ٦ .

**الجنفوة -** اصغر قدأ من الفصية طولها نحو ١٠٠٠ م. لونها الى الصفار الكبير يهي وشديدة الاذى . اجيالها الموسمية تراوح بين ٦ و ٨ ومعلم حشرات الجبل الاخضر يقضي حياته الشتوي تحت قشور الجنفور || ضررها محصور بنشاط تناسلها لان وخرها الجنفوات والجنفور ، التي تبش عليها وفيها ، قد يبلغ بعض الربوات .

**المجنحة -** هي من حيث الاصل حشرة فصية دخلت التربة بعد انسلاخها الثالث فتحورت فيها بعد انسلاخ تكميل رابع الى عذراء ثم الى حشرة مجنحة طولها نحو ٢ م. اي ٢٠٠٠ م. وهي لا شقية الجنس ، صفراء اللون . رباعية الاجنحة الشفافة . تضع من ٤ الى ٨ مكبات مختلفة الاحجام تدعى مكن الصيف . الصغرى منها وقد تطول نحو ٢٦٠ م. تنقف عن الذكور . والكبرى تطول نحو ٤٠٠ م. تنقف عن الاناث .

**الثقبة -** هي الكاملة الاعضاء التناسلية تنقف عن مكن الصيف المائد الى الحشرة المجنحة . وهي صفراء اللون عادية المتك والاجنحة والاذى . الذكر منها يطول من ٢٦٠ الى ٣٨٠ م. والانثى من ٤٠٠ الى ٤٦٠ م. || سفادها يبتنى بعد الثلث يوم او يومين تضع الانثى بعده مكنة واحدة تعرف بمكنة الشتاء التي جنتا على ذكرها في اول هذا الجث .

**اضرار الحشرة -** اضرارها جسيمة لانها تحت الكومة بعد ان تقضي على الجنفور والاوراق . مكافحتها - طرق مكافحتها محدودة منها الغمر بالماء نحو ٢٥ يوماً او استعمال الحواشير النشيطة التفاعلة السامة التي يصعب القيام بها نظراً لبهاطة اكلافها وبا قد تسببه من عوالب . لذلك يحسن استعمال التلصم على كربة امريكية منية وهو ما مكن ابروة من تجديد كرومها بعد ان قفت عليها الفيلكوسه .

**٢١٣٥٣ - فيليبات** (E). **Elephantidae** (S). **Elephantidés** (E). فصيلة الفيلة من رتبة الحاروطيات .

**٢١٣٥٤ - فيليمون** \* (F). **Philémon, Phylédon** (F). جنس طير من الجواثم يقيقات المناشير وفضيلة المفريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهنا جزر الزايج ويرتدب || اجسامها مستطلة الحجم قدما قد الشحورر . رؤوسها صفرة . مناقيدها مقوسة مطلقة القواعد . اذنانها مستطيلة ، مقنونة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان يسود فيها الاخضر اللامس اما بطونها فبنية اللون اوبيضاء || تدنث في الانحجار الرقيقة . حشنتها من ٤ الى ٦ بيضات ترزها وسدا دون الذكر الذي يئثن لها الغذاء .

**٢١٣٥٥ - فيلاتوتريكم** (S). **Phymatostichum** (S). هو الدمية جنس فلور مجهرية ، اطليه .

**٢١٣٥٦ - فيسبة** (F). **Gyps de Ruppell** (F). هي القشام الارقش ، اطليه .

**٢١٣٥٧ - فيسولوجية** (F). **Phénologie** (F). **Phenology** (E). هي علم الظواهر ، علم يبحث في الوقت الذي تحصل فيه دورياً الظواهر المختصة بالدورة الحياتية النباتية وتأثير عوامل البيئة في هذه الظواهر اعصها البردة والاراقوا وانحرار وادراك الثمر والاعمال .

**٢١٣٥٨ - فينج** (F). **Vin (vieux)** (F). هو الخمر المتينة الصافية .

**٢١٣٥٩ - فيهم** (F). **Sigle** (F). **Sigla, Outline** (E). الفهم الحرف الرئيسي المفتاح المستعمل لتعبير عن كلمة . وهو ايضاً مجموعة من احرف رئيسية تستعمل لتعبير عن مجموعة كلمات . ج فيهم .

**٢١٣٦٠ - فيسبة** \* (S). **Spizaetus bellicosus** (S). **Spizæte belliqueux, Griffard** (F).

طائر من الاتياء ينتمي الى عمارة العقيان وفضيلة الصعربات . اعطاهنا البلاد الحارة الافريقية اخصها جبال الحبشة . طوله نحو ١٠٠ سم . وهو ابيض القوام ، منوج الرأس . قصير السقط ، مستطيل الذنب . ظهره ورأسه الى الكهبة تتخللها سمة فضمية . سقاطه الى السمة المنسقة المرقوفة يطرؤها خط اخير . بطنه وخوافيه الى البياض الازرق المراج . ذنبه الى الكهبة الرمادية تبرزه ٦ خطوط عابقة شديدة السمرة || وهو من الأوابد يعيش ذكراً وانثى لا يفترقا سوى الموت . قوته النفاذ والقواص والطير . يئن وكره في قنة الشجرة الرقيقة او في بعض اوقاب الصخور النائية الشارة || انناه تضع رقتين مستديرتين قطر الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم . تحضها وسدا نحو ٥ اسابيع .



فينة

أنجزت « المطبعة الكاثوليكية ش م ل »  
في عاريا - لبنان  
طباعة الجزء الثاني من « الموسوعة في علوم الطبيعة »  
في العام ١٩٨٨



*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature  
se compose de quatre volumes, dont le dernier  
comprend les lexiques des termes  
allemands,  
anglais,  
français,  
grecs,  
italiens et  
latins.*



Edouard Ghaleb  
Ingénieur agronome

---

# **ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE**

## **ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES**

---

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,  
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,  
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

**Volume II**  
2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



**Dar el-Machreq sarl**  
Beyrouth





**ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**







**Dar el-Machreq seri**  
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



**Librairie Orientale** -- Boîte Postale 1986  
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX  
en arabe, anglais, français  
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles  
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



**DAR EL-MACHREQ**  
BEYROUTH